

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PATOLOGI
PADA NY “D” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
GESTASI 16 – 18 MINGGU DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 31 MEI – 26 AGUSTUS
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar

ALAUDDIN

Oleh

MIFTAHUL KHAIR WAHID

NIM. 70400114057

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka KTI dan gelar yang diperoleh karenanya batal dem hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun,

Miftahul Khair Wahid
NIM: 70400114057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Miftahul Khair Wahid

NIM : 70400114057

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 16 – 18 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 31 Mei – 06 Agustus Tahun 2017

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I

Samata, 21 Agustus 2017

Pembimbing II


Aniq Mumthi'ah Alkautzar S.ST., M.Keb


dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH
NIP : 19760921 200502 2 004

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi pada Ny “D” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 16 – 18 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 31 Mei – 26 Agustus Tahun 2017”, yang disusun oleh Miftahul Khair Wahid NIM: 70400114057, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 25 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Agustus 2017 M

3 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.ST., SKM., M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH** (.....)

Penguji I : **dr. Darmawansyah, M.Kes** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.Ag** (.....)

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 195502031983121001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat kesehatan, kemampuan dan kegigihan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga mampu menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi pada Ny “D” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 16 – 18 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 31 Mei – 26 Agustus Tahun 2017”

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda nabi besar Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan ummat manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman kecerdasan seperti yang kita rasakan saat ini.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku, ayahanda Drs. Abdul Wahid dan Ibuku Masni Madeali, semoga keselamatan senantiasa bersama kalian kasihku dan rahmat Allah serta barakahnya, semoga Allah menyayangi kalian karena kalian telah mendidikku sedari kecil, *little thing but sure is i love you both*.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb, selaku ketua Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan arahan dalam penyusunan KTI ini.
5. Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.Ag, selaku penguji agama yang telah memberikan kritik dan saran yang erat kaitannya dalam ilmu agama sehingga KTI ini menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat.
6. dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH, selaku pembimbing yang juga berperan sangat penting dalam perbaikan dan penyusunan KTI.
7. dr. Darmawansyih, M.Kes selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga KTI ini jadi jauh lebih baik lagi.
8. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama menulis menjalani bangku perkuliahan.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk penelitian.
10. Kepala ruangan Antenar Care (ANC) dan stafnya di RSUD Syekh Yusuf Gowa
11. Kakakku Masyitha dan Hardiyanti dan kedua adikku Wafiq dan Faqih, yang senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan (Ira, Ria, Muli, Neni, Nur), semoga Allah kembali mempersatukan kita di lain waktu dan kesempatan.


13. Teman-teman kebidanan 2014, kalian luar biasa.

Akhirul kalam, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kebidanan. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam KTI ini, untuk itu penulis membuka tangan yang lebar dalam menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Terima kasih.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penulis,

Miftahul Khair Wahid
NIM: 70400114057



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALALMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat	9
E. Metode.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kehamilan	13
1. Pengertian.....	13
2. Tanda dan Gejala.....	13
3. Proses Kehamilan.....	15
4. Nutrisi dalam Kehamilan	19
B. Hiperemesis Gravidarum	25
1. Pengertian.....	25
2. Etiologi.....	25
3. Patofisiologi	27
4. Gejala Tingkatan.....	28
5. Komplikasi	29
6. Diagnosa.....	31
7. Pencegahan.....	32
C. Hiperemesis Gravidarum Tingkat I.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Penatalaksanaan	33
D. Pandangan Islam tentang Kehamilan dan Hiperemesis Gravidarum	35
1. Proses Kehamilan dalam Islam	35
2. Pandangan Islam tentang Hiperemesis Gravidarum	39
3. Pandangan Islam tentang Puasa Bagi Orang yang Sakit.....	41
4. Pandangan Islam tentang Puasa Wanita Hamil di Bulan Ramadhan.....	42

E. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan	46
1. Pengertian.....	46
2. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	46
3. Pendokumentasian dalam Bentuk SOAP	52
BAB III STUDI KASUS	
A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar).....	56
B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual).....	65
C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial).....	72
D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan).....	72
E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan).....	72
F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan).....	74
G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan).....	76
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar).....	108
B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual).....	112
C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial).....	115
D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan).....	116
E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan).....	119
F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan).....	123
G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan).....	127
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran II : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, MEI 2017

Nama : Miftahul Khair Wahid
NIM : 70400114057

Judul : “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi pada Ny “D” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 16 – 18 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 31 Mei – 26 Agustus Tahun 2017”

Hiperemesis Gravidarum adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan mual muntah berlebihan yang mempengaruhi keadaan umum ibu hamil. Hiperemesis Gravidarum diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yakni tingkat I (ringan), tingkat II (sedang), tingkat III (berat).

Studi kasus ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan antenatal care pada Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I gestasi 16 – 18 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 31 Mei – 26 Agustus Tahun 2017 berdasarkan 7 langkah proses manajemen asuhan kebidanan Varney dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus menunjukkan bahwa setelah observasi dilakukan selama 12 minggu, hasil menunjukkan bahwa Ny “D” dapat menerima asuhan dan menjalankan anjuran selama pemberian asuhan sehingga kondisi Ny “D” berangsur-angsur membaik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi terakhir yang menunjukkan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, mual dan muntah semakin berkurang dan nafsu makan ibu telah meningkat.

Berdasarkan pada studi kasus Ny “D” dapat disimpulkan bahwa hiperemesis gravidarum dialami Ny “D” pada kehamilan kedua dan tidak pernah mengalami mual dan muntah pada kehamilan pertamanya sehingga dapat kita pahami bahwa tidak selamanya hiperemesis gravidarum dialami oleh primigravida namun dapat pula dialami oleh multigravida.

Daftar Pustaka : 28 (2005-2017)
Kata Kunci : Kehamilan, Hiperemesis Gravidarum

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAKASSAR
RESEARCH PAPER, MAY 2017

NAME : Miftahul Khair wahid
Student Reg. No. : 70400114057

Title : “Midwifery Management Of Pathological Antenatal Care on Mrs “D” with Hyperemesis Gravidarum Grade I 16 – 18 Weeks Gestation in Regional Public Hospital Syekh Yusuf Gowa on 31st May – 26th August Year of 2017”

Hyperemesis Gravidarum is a pregnancy complication characterized by an excessive nausea and vomiting that affects the general condition of pregnant mothers. Hyperemesis gravidarum is classified into three grades i.e. grade I (mild), grade II (medium), grade III (severe).

This study aims to conduct the midwifery of antenatal care on Mrs “D” who suffered hyperemesis gravidarum grade I with gestation period of 16 – 18 weeks in regional public hospital Syekh Yusuf Gowa on 31st May – 26th August year of 2017 according to 7 steps Varney’s midwifery management process and documented in form of SOAP.

The result of the study showed that after observation for 12 weeks the result showed that Mrs “D” was able to receive the care and underwent the given suggestion during assistance so that pregnant mother’s condition gradually improved. It was proved by the last observation in which the general condition was good, vital signs were within normal limits, nausea and vomiting gradually decreased and mother’s appetite was improved.

Based on the results of case study on Mrs “D”, it can be concluded that hyperemesis gravidarum experienced by Mrs “D” on her second pregnancy and never experienced nausea and vomiting on her first pregnancy so that we can understand that hyperemesis gravidarum is not always experienced by primigravida but can also be experienced by multigravida.

Bibliography : 28 (2005-2017)
Keywords : Pregnancy, Hyperemesis Gravidarum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi setengah abad yang lalu umumnya mempunyai dua sebab pokok yaitu, masih kurangnya pengetahuan mengenai sebab-sebab dan penanggulangan komplikasi-komplikasi penting dalam kehamilan, persalinan, serta nifas. Kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, dan kurang meratanya pelayanan kebidanan yang baik bagi semua yang hamil (Evayanti, 2015: 82).

Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2014 dalam Kusmimdarti, dkk (2015: 2), menyatakan bahwa AKI di dunia yaitu 289.000 jiwa. Amerika Serikat yaitu 9.300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. AKI di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI menunjukkan penurunan dari SDKI 1997 sampai dengan SDKI 2007. AKI pada tahun 1997 adalah 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan menunjukkan penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada SDKI 2002-2003 dan

lebih menurun lagi pada tahun 2007 yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, angka ini meningkat pada SDKI 2012 menjadi 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012: 226).

Sebagai upaya penurunan Angka Kematian dan Angka Kesakitan Ibu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 1990 telah meluncurkan *safe motherhood initiative*, sebuah program yang memastikan semua wanita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan dan persalinannya. Upaya tersebut dilanjutkan dengan program Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden Republik Indonesia. Program ini melibatkan sektor lain di luar kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu yaitu penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat (Profil Kesehatan Indonesia, 2015: 134-135).

Upaya lain yang juga telah dilakukan yaitu strategi *Making Pregnancy Safer* yang dicanangkan pada tahun 2000. Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) dalam rangka menurunkan AKI dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut disebabkan

52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan AKI di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan AKI di Indonesia secara signifikan (Profil Kesehatan Indonesia, 2015: 134-135).

Kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Sekarang ini secara umum sudah diterima bahwa setiap kehamilan membawa resiko bagi ibu. WHO memperkirakan bahwa sekitar 15% dari seluruh wanita yang hamil akan berkembang menjadi komplikasi yang berkaitan dengan kehamilannya, serta dapat mengancam jiwanya. Dari 5.600.000 wanita hamil di Indonesia, sebagian besar akan mengalami komplikasi atau masalah yang bisa menjadi fatal. Survei Demografi dan Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 1997 menyatakan bahwa dari tahun 1992-1997, 26% wanita dengan kelahiran hidup mengalami komplikasi (dalam Fadlun, 2014: 1).

Menurut Tiran (2009) dalam Anggasari (2016: 18), ibu hamil akan mengalami perubahan dalam sistem endokrin, terutama disebabkan karena tingginya fluktuasi *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG), khususnya periode mual muntah gestasional karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG dalam serum. Meningkatnya kadar HCG, hormon seks seperti estrogen dan progesteron inilah yang diperkirakan menjadi faktor penyebab penting terjadinya salah satu komplikasi kehamilan yakni hiperemesis gravidarum (Martaadisoebata dkk, 2015: 70)

Hiperemesis gravidarum adalah ibu hamil yang memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum hingga berat badan sangat turun, turgor kulit kurang, diuresis kurang dan timbul aseton dalam air kencing (Pudiastuti. 2012: 1). Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan muda dan dikeluhkan oleh 50-70% wanita hamil dalam 16 minggu pertama. Kurang lebih 66% wanita hamil trimester pertama mengalami mual, dan 44% mengalami muntah. Angka kejadian hiperemesis gravidarum 4 : 1000 kehamilan. Sindrom ini ditandai dengan muntah yang sering, penurunan berat badan, dehidrasi, asidosis karena kelaparan yang ditandai dengan ketonuria, alkalosis karena penurunan asam HCl lambung dan hipokalemia (Martaadisoebrata dkk, 2015: 70)

Menurut Wiknjastro (2009) dalam Masruroh dan Ikke Ratnasari (2016: 205), hiperemesis gravidarum terjadi di seluruh dunia dengan angka kejadian yang beragam mulai dari 1-3% dari seluruh kehamilan di Indonesia, 0,3% dari seluruh kehamilan di Swedia, 0,5% di California, 0,8% di Canada, 10,8% di China, 0,9% di Norwegia, 2,2% di Pakistan dan 1,9% di Turki, di Amerika Serikat, prevalensi hiperemesis gravidarum adalah 0,5-2% .

Studi yang dilakukan di *Omdurman New Hospital* (ONH) Khartoum-Sudan, dari November 2013 sampai Mei 2014 ditemukan bahwa dari 1241 kehamilan dengan komplikasi terdapat 167 ibu hamil yang didiagnosa menderita hiperemesis gravidarum, sehingga didapatkan prevalensi dari HG di rumah sakit

tersebut yakni 13% (Fazari, 2016: 633). Selanjutnya studi yang dilakukan di *Jimma University Medical Center (JUMC)* Ethiopia, dari Januari 2015 hingga Desember 2015 ditemukan bahwa dari 2133 ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu yang memeriksakan diri di JUMC ditemukan bahwa terdapat 102 (4.8%) ibu hamil yang didiagnosa menderita hiperemesis gravidarum (Hailemariam dkk, 2016: 378 dan 380).

Data dari RSUD Syekh Yusuf Gowa ditemukan bahwa pada tahun 2013 dari 2567 ibu hamil terdapat 48 ibu yang didiagnosis menderita hiperemesis gravidarum, pada tahun 2014 dari 3090 ibu hamil terdapat 15 ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, pada tahun 2015 dari 2917 ibu hamil terdapat 74 ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, pada tahun 2016 dari 4151 ibu hamil terdapat 110 ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 dari 1190 ibu hamil terdapat 46 ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum.

Hiperemesis gravidarum jarang menyebabkan kematian, tetapi angka kejadiannya masih cukup tinggi. Hampir 25% pasien hiperemesis gravidarum dirawat inap lebih sekali. Terkadang kondisi hiperemesis gravidarum terus menerus dan sulit sembuh membuat pasien depresi. Pada kasus-kasus ekstrim, ibu-ibu hamil bahkan dapat merasa ingin melakukan terminasi kehamilan (Oktavia, 2016: 42)

Sebagian besar emesis gravidarum (mual muntah) saat hamil dapat diatasi dengan berobat jalan, serta pemberian obat penenang dan anti muntah. Akan tetapi, sebagian kecil wanita hamil tidak dapat mengatasi mual muntah yang berkelanjutan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan kekurangan cairan dan terganggunya keseimbangan elektrolit. Muntah yang berlebihan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler pada lambung dan esofagus, sehingga muntah bercampur darah. Hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran pada ibu hamil, dan mengagetkan keluarganya. Sekalipun kejadian mual muntah dalam bentuk hiperemesis gravidarum tidak banyak dijumpai, namun penanganannya memerlukan perhatian yang serius (Manuaba dkk, 2013: 229) .

Menurut Curtis (2000) dalam Azizah (2012: 2-3), hiperemesis gravidarum yang ringan (tingkat I) yang dialami secara terus menerus dapat menyebabkan kondisi ibu hamil menjadi lemah, nafsu makan menurun, sehingga asupan makanan sehat menjadi berkurang, hal ini dapat mempengaruhi kondisi tumbuh kembang janin dan memperburuk keadaan ibu serta memicu timbulnya hiperemesis berat.

Jika hiperemesis gravidarum berlanjut dari tingkat I ke tingkat II ataupun III, maka hal tersebut akan berdampak lebih buruk lagi bagi ibu dan juga janin. Ibu akan mengalami kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah selain itu mengakibatkan gangguan asam basa,

pneumoni aspirasi, robekan mukosa yang menyebabkan ruptur esophagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi janin yang mana menurut Wiknjastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 128-129) bahwa pada janin, jika hiperemesis ini terjadi hanya diawal kehamilan maka tidak akan berdampak terlalu serius, tapi jika disepanjang kehamilan Ibu mengalami hiperemesis gravidarum maka kemungkinan bayinya mengalami Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), prematur hingga terjadi abortus.

Mansjoer (2010) dalam Anggasari (2016: 18), menyatakan bahwa komplikasi yang terjadi pada hiperemesis gravidarum terdapat pada sekitar 60-80% primigravida dan 40-60% multigravida. Mansjoer menambahkan bahwa gejala ini menjadi lebih berat pada 1 dari 1000 kehamilan, namun kejadian ini akan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menunjukkan bahwa masih tingginya kemungkinan ibu mengalami komplikasi kehamilan berupa hiperemesis gravidarum dan besarnya kemungkinan hiperemesis gravidarum tingkat I berubah menjadi hiperemesis gravidarum yang lebih berat maka penulis tertarik untuk melakukan “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Di RSUD Syekh Yusuf Gowa”

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini mencakup penerapan “Manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengumpulan data pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- b. Dirumuskan interpretasi data pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- c. Diidentifikasi diagnosa potensial pada Ibu hamil dengan Hiperemesis gravidarum Tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- d. Dilaksanakan antisipasi penanganan segera dan kolaborasi pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- e. Disusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- f. Dilaksanakan asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa

- g. Dievaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RSUD Syekh Yusuf Gowa

D. Manfaat

1. Manfaat Institusi

Sebagai sumber informasi dan referensi baru sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa(i) kesehatan pada umumnya dan mahasiswa kebidanan pada khususnya mengenai kasus hiperemesis gravidarum

2. Manfaat Diri sendiri

Sebagai tambahan ilmu bagi diri saya sendiri serta mendapatkan pengalaman langsung dalam mengamati, menilai, serta memberikan asuhan pada pasien hiperemesis gravidarum.

3. Manfaat RSUD Syekh Yusuf Gowa

Menjadi sumber informasi dan pengetahuan terkini mengenai kasus hiperemesis gravidarum di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

E. Metode

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan

dengan hiperemesis gravidarum, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah Varney (2003) yaitu : Identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, antisipasi diagnosa/masalah potensial, *emergency*, kolaborasi dan rujukan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi hasil tindakan terkait kasus hiperemesis gravidarum tingkat I.

a. Anamnesa/wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan suami maupun keluarganya serta bidan dan dokter yang dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan lain-lain terkait kasus hiperemesis gravidarum tingkat I.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap konsisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan pasien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Kasus

Mengadakan konsultasi dengan bidan, dokter yang menangani pasien serta pembimbing karya tulis ilmiah mengenai masalah yang dialami pasien yakni hiperemesis gravidarum tingkat I

F. Sistematika Penulisan

BAB I, bab ini berisi latar belakang pengambilan kasus hiperemesis gravidarum, tujuan penulisan karya tulis ilmiah berjudul hiperemesis gravidarum, manfaat penulisan karya tulis ilmiah, metode penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah.

BAB II, pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum kehamilan (pengertian kehamilan, tanda dan gejala kehamilan, proses kehamilan, nutrisi dalam kehamilan), hiperemesis gravidarum (pengertian, etiologi, patofisiologi, gejala tingkatan, komplikasi, diagnosa, pencegahan, hiperemesis gravidarum

tingkat I (pengertian, penatalaksanaan), pandangan islam tentang kehamilan dan hiperemesis gravidarum (pandangan islam tentang kehamilan, pandangan islam tentang hiperemesis gravidarum, pandangan islam tentang puasa bagi orang yang sakit, pandangan islam tentang puasa bagi ibu hamil di bulan Ramadhan) dan yang terakhir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan (pengertian manajemen asuhan kebidanan dan proses manajemen asuhan kebidanan).

BAB III, membahas tentang langkah I pengkajian dan analisa data dasar, langkah II merumuskan diagnosa/masalah aktual, langkah III antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan.

BAB IV, pada bab ini menjelaskan makna hasil penelitian. Pembahasan membahas kesenjangan antara teori dan hasil penelitian serta menjawab tujuan penelitian. Teori yang dikemukakan adalah teori (jurnal dan *text book*) yang sudah termuat dalam Bab II.

BAB V, bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan yang disusun untuk menjawab tujuan penelitian kasus hiperemesis gravidarum dan saran sebagai implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kehamilan*

1. Pengertian

Proses kehamilan merupakan mata rantai berkesinambungan dan terdiri dari: ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 2013: 75). Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3, triwulan pertama dimulai sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan (Pudiastuti, 2012: 1)

2. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala kehamilan dapat dibagi dalam 3 bagian yakni :

a. Tanda Dugaan Kehamilan

Tanda dugaan kehamilan merupakan tanda presumtif atau perubahan-perubahan yang dirasakan oleh ibu (subjektif) yang timbul selama kehamilan.

Berikut ini adalah tanda-tanda adanya dugaan kehamilan :

- 1) Amenorea (Terlambat datang bulan) .
- 2) Mual dan muntah (*emesis*)
- 3) Payudara tegang
- 4) Sering miksi
- 5) Konstipasi atau obstipasi
- 6) Pigmentasi kulit
- 7) Epulis
- 8) Varices atau penampakan pembuluh darah vena.

b. Tanda Tidak Pasti Hamil

Disebut sebagai tanda tidak pasti hamil karena pada beberapa kasus menunjukkan adanya penyakit yang memiliki tanda hampir mirip hamil sehingga tanda-tanda berikut dikategorikan dalam tanda tidak pasti hamil.

Tanda tidak pasti kehamilan dapat ditentukan oleh:

- 1) Rahim membesar sesuai dengan tuanya hamil
- 2) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda Chadwicks, tanda piscoeck, kontraksi Braxton Hicks, dan teraba *ballotement*.
- 3) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif, tetapi sebagian kemungkinan positif palsu.

c. Tanda Pasti Kehamilan

Tanda pasti hamil merupakan tanda yang menunjukkan kepastian bahwa ibu benar hamil. Tanda pasti kehamilan dapat ditentukan melalui :

- 1) Gerakan janin teraba dalam janin
- 2) Terlihat atau teraba gerakan janin dan bagian-bagian janin
- 3) Denyut jantung janin. Didengar dengan stetoskop laenec, alat kardiokografi, alat doopler. Dilihat dengan ultrasonografi. Pemeriksaan dengan alat canggih, yaitu rontgen untuk melihat kerangka janin, ultrasonografi (Manuaba dkk, 2013: 107-109)

3. Proses Kehamilan

Proses kehamilan merupakan proses yang terjadi dalam beberapa tahap, dimulai dari terjadinya ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan uterus dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (cukup bulan). Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan dalam proses terjadinya kehamilan :

a. Ovulasi

Ovulasi merupakan proses terlepasnya ovum dari ovarium karena dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur wanita (25 – 35 tahun), hanya terdapat 420 ovum yang dapat mengikuti proses pematangan dan kemudian terjadi ovulasi. Pada proses pembentukan ovum (oogenesis) diawali dengan epitel germinal → oogonium → folikel primer → proses pematangan pertama. Adanya *Folicle Stimulating Hormon* (FSH) yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, folikel primer akan mengalami

perubahan menuju folikel de Graaf yang kemudian bergerak menuju ke permukaan ovarium dan disertai pembentukan cairan folikel. Desakan folikel de Graaf yang semakin membesar ke permukaan ovarium menyebabkan terjadinya penipisan dan devaskularisasi.

Selama pertumbuhannya menjadi folikel de graaf, ovarium terus mengeluarkan hormon estrogen yang mempengaruhi gerak dari tuba yang makin mendekati ovarium, gerak sel rambut lumen tuba makin tinggi, peristaltik tuba makin aktif. Karena telah ada folikel yang dianggap matang maka dikirimlah umpan balik positif ke *hypothalamus* sehingga terjadi lonjakan *Luteinizing Hormon* (LH) yang menyebabkan terjadinya pelepasan ovum dari folikel dan ovarium atau disebut dengan ovulasi.

Kemudian dengan gerakan aktif ovum akan ditangkap oleh tuba tepatnya pada bagian *fimbriae*, proses penangkapan ini disebut *ovum pick up mechanism*. Ovum yang ditangkap akan terus digiring oleh *sillia* menuju uterus, dalam bentuk pematangan pertama, artinya telah siap untuk dibuahi.

b. Konsepsi

Proses persenyawaan yang terjadi antara inti ovum dan inti spermatozoa disebut dengan konsepsi atau fertilisasi yang kemudian membentuk zigot. Adapun proses terjadinya konsepsi dapat dijabarkan seperti berikut ini :

- 1) Ovum yang dilepaskan pada prose ovulasi, diliputi oleh korona radiata yang mengandung persediaan nutrisi
- 2) Pada ovum, dijumpai inti dalam bentuk metaphase di tengah sitoplasma yang disebut vitelus
- 3) Dalam perjalanan, korona radiata makin berkurang pada zona pelusida. Nutrisi dialirkan ke dalam vitelus, melalui saluran pada zona pelusida
- 4) Konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba, yang merupakan tempat terluas pada tuba, dindingnya penuh dengan jonjot dan tertutup sel yang mempunyai silia. Ovum mempunyai waktu hidup terlalu lama dalam ampulla tuba.
- 5) Ovum telah siap dibuahi setelah 12 jam dan bertahan hidup selama 48 jam. Spermatozoa menyebar dan masuk melalui kanalis servikalis dengan kekuatan sendiri. Pada kavum uteri terjadi proses kapasitasi, yaitu pelepasan lipoprotein dari sperma sehingga mampu mengadakan fertilisasi. Kemudian spermatozoa melanjutkan perjalanan menuju tuba fallopi. Spermatozoa hidup selama tiga hari dalam genitalia interna. Spermatozoa akan mengelilingi ovum yang telah siap dibuahi serta mengikis korona radiata dan zona pelusida dengan proses enzimatik: hialuronidase. Melalui “stomata” spermatozoa memasuki ovum, ekornya lepas dan tertinggal di luar. Kedua inti ovum dan inti spermatozoa bertemu dan membentuk zigot.

c. Proses Nidasi atau Implantasi

Dengan masuknya spermatozoa ke dalam sitoplasma, “vitelus” membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam keadaan “metafase”. Proses pemecahan dan pematangan mengikuti bentuk anaphase dan “telofase” sehingga pronukleusnya menjadi “haploid”. Pronukleus spermatozoa dalam keadaan haploid saling mendekati dengan inti ovum yang kini haploid dan bertemu dalam pasangan pembawa tanda dari pihak pria maupun wanita.

Pada manusia terdapat 46 kromosom dengan rincian 44 dalam bentuk “autosom” sedangkan 2 kromosom sisanya sebagai pembawa tanda seks. Wanita selalu resesif dengan kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki dua bentuk kromosom yakni kromosom X dan kromosom Y. Bila spermatozoa kromosom X bertemu sel ovum, terjadi jenis kelamin wanita sedangkan apabila kromosom Y bertemu dengan sel ovum, terjadi jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu pihak wanita tidak dapat disalahkan atas jenis kelamin bayi yang dilahirkannya karena hal tersebut ditentukan oleh pihak suami.

Setelah pertemuan kedua inti ovum dan spermatozoa, terbentuk zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya. Berbarengan dengan pembelahan inti, hasil konsepsi terus berjalan menuju uterus. Hasil pembuahan memenuhi seluruh ruangan dalam ovum yang besarnya 100 MU atau 0,1 mm dan disebut stadium morula.

Selama pembelahan sel di bagian dalam, terjadi pembentukan sel di bagian luar morula yang kemungkinan berasal dari korona radiata yang menjadi sel trofoblas. Sel trofoblas dalam pertumbuhannya, mampu mengeluarkan hormon HCG, yang mempertahankan korpus luteum gravidarum.

Pembelahan berjalan terus dan di dalam morula terbentuk ruangan yang mengandung cairan yang disebut blastula. Perkembangan dan pertumbuhan berlangsung, blastula dengan vili korealisnya yang dilapisi sel trofoblas telah siap untuk mengadakan nidasi. Sementara itu, pada fase sekresi, endometrium telah makin tebal dan makin banyak mengandung glikogen yang disebut desidua. Sel trofoblas meliputi “primer vili korealis” melakukan destruksi enzimatik-proteolitik, sehingga dapat menanamkan diri di dalam endometrium. Proses penanaman blastula yang disebut nidasi atau implementasi terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium, mungkin terjadi perdarahan yang disebut tanda Hartman (Manuaba dkk, 2013: 75 - 82)

4. Nutrisi dalam Kehamilan

Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Kemudian sepanjang trimester II dan III kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak.

Selama trimester III energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Sukarni K dkk, 2013: 90)

Berikut adalah beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilannya :

a. Karbohidrat

Janin memerlukan 40 gram glukosa setiap harinya yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi. Glukosa sangat dibutuhkan karena akan membantu dalam sintesis lemak, glikogen dan pembentukan struktur polisakarida.

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Beberapa pilihan karbohidrat yang dianjurkan adalah seperti roti, sereal, nasi dan pasta. Karbohidrat mengandung vitamin dan mineral, selain itu juga dapat meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil karena dapat mencegah terjadinya konstipasi (sulit buang air besar) dan hemorroid (wasir).

b. Protein dan Asam amino

Selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, protein dan asam amino juga berperan dalam pembentukan plasenta dan cairan amnion, pertumbuhan jaringan maternal seperti pertumbuhan mammae ibu dan jaringan uterus, dan penambahan volume darah. Kebutuhan akan protein

selama kehamilan bergantung pada usia kehamilan, total protein fetal yang diperlukan selama masa gestasi berkisar antara 350-450gr.

Tambahan protein untuk ibu hamil adalah 0,75 gram/kg berat badan. Secara keseluruhan jumlah protein yang diperlukan oleh ibu hamil yaitu kurang lebih 60-76 gram setiap hari atau sekitar 925 gram dari total protein yang dibutuhkan selama kehamilan.

Dapat diartikan bahwa wanita hamil membutuhkan 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Terjadinya peningkatan volume darah hingga 50% selama kehamilan menyebabkan protein sangat diperlukan untuk menghasilkan sel darah yang baru. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani dan nabati. Protein nabati seperti : kacang-kacangan, tahu, tempe, oncom, selai kacang dan lain-lain. Sedangkan untuk protein hewani seperti: daging, ikan, unggas, telur ataupun kerang.

c. Lemak

Asam lemak *Eicosapentanoic Acid* (EPA) dan *Docosa hexanoic Acid* (DHA) memainkan peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus, khususnya untuk mata dan otak. Lemak merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester III.

Lemak dibutuhkan tubuh terutama untuk membentuk energi dan serta perkembangan sistem syaraf janin. Oleh karena itu ibu hamil jangan sampai

kurang mengkonsumsi lemak tubuh. Namun ibu hamil juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang berlebih karena dapat mengakibatkan berat badan ibu hamil meningkat tajam yang nantinya dapat menyulitkan ibu dalam menjalani kehamilan dan pasca persalinan. Oleh karena itu ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tidak lebih dari 25% dari seluruh kalori yang dikonsumsi sehari.

d. Vitamin

Vitamin yang larut dalam lemak :

- 1) Vitamin A. Vitamin A dari ibu dibutuhkan oleh janin yaitu kurang dari 25 mg/hari, sedangkan vitamin A yang dibutuhkan pada trimester III yaitu berkisar 200 mg/hari. Ibu yang sedang hamil sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi vitamin A dalam jumlah yang besar karena akan menjadi stimulator yang mengakibatkan feratogen.
- 2) Vitamin D. Kebutuhan vitamin D selama kehamilan belum diketahui pasti tetapi diperkirakan 10 mg/hari, sedangkan *Recommended Daily Allowance* (RDA) atau Asupan Harian yang Disarankan) menganjurkan 5 mg/hari untuk wanita hamil pada usia 25 tahun atau lebih.
- 3) Vitamin E. untuk ibu hamil kebutuhannya sekitar 15 mg (22,5 IU) dan ibu menyusui sekitar 19 mg (28,5 IU). Vitamin E dibutuhkan sebagai

antioxidan alamiah dan sebagai pembentukan eritrosit untuk , mencegah anemia.

- 4) Vitamin K. Fungsi vitamin K belum begitu optimal pada masa kehamilan dalam fetus.

Vitamin larut dalam air :

- 1) Vitamin C. Kebutuhan vitamin C untuk ibu hamil yakni sebanyak 70 mg perhari. Untuk mencegah kekurangan vitamin C selama proses kehamilan diperlukan tambahan vitamin C sebanyak 10 mg perhari dengan peningkatan sebanyak 33%. Dibutuhkan untuk memperkuat pembuluh darah dan mencegah perdarahan, mengurangi resiko infeksi setelah melahirkan dan membantu untuk pertumbuhan gigi dan tulang bayi serta membantu memperbesar penyerapan zat FE.
- 2) Thiamin. Thiamin meningkat selama kehamilan sebanyak 25% namun tetap diperlukan tambahan thiamin sebanyak 0,4 mg/hari.
- 3) Niasin dan Riboflavin. Niasin diperlukan selama kehamilan yaitu 2 mg/hari dan 0,3 mg/hari dari riboflavin.
- 4) Vitamin B6. Vitamin B6 diperlukan dalam jumlah yang besar untuk melakukan metabolisme dengan peningkatan 100%. Vitamin B6 dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengatasi mual.
- 5) Asam folat. Asam folat merupakan kelompok vitamin B paling utama selama masa kehamilan kerana dapat mencegah cacat tabung syaraf

(*neural tube defects*) seperti Spina Bifida. Ibu hamil harus meningkatkan asupan folat hingga 0,4-0,5 mg per hari.

e. Mineral

- 1) Kalsium. Pada usia 20 minggu laju penyaluran kalsium dari ibu ke fetus mencapai 50 mg/hari dan mencapai puncaknya apabila mendekati kelahiran yaitu 330 mg/hari. RDA untuk kalsium selama kehamilan adalah 1200 mg. Kalsium mengandung mineral yang penting untuk pertumbuhan janin dan membantu kekuatan kaki serta punggung.
- 2) Magnesium. Magnesium dibutuhkan untuk perkembangan jaringan lunak. Konsentrasi magnesium meningkat selama kehamilan dengan RDA 320 mg dan 50% dari magnesium diserap oleh ibu.
- 3) Fosfor. RDAnyanya sama dengan wanita yang tidak hamil yaitu 1250 mg/hari untuk wanita yang hamil dibawah 19 tahun dan 700 mg/hari untuk wanita diatas 19 tahun.
- 4) Zat Besi (Fe). Berperan dalam produksi dan fungsi sel darah merah. RDA wanita hamil yakni 30 mg/hari.
- 5) Seng. Seng diperlukan untuk mengembangkan jaringan tisu, terutama otak dan jenis kelamin. RDA wanita hamil mencapai 15 mg/hari.
- 6) Sodium. Selama kehamilan naik 5000-10000 Meq/hari sehubungan dengan peningkatan volume darah maternal (Sukarni K dkk, 2013 : 99-109)

B. Hiperemesis Gravidarum

1. Pengertian

Mual dan muntah terjadi pada kehamilan hingga usia 16 minggu. Pada keadaan muntah-muntah yang berat, dapat terjadi dehidrasi, gangguan asam basa dan elektrolit dan ketosis; keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum (Kemenkes RI, 2013: 82)

2. Etiologi

Penyebab utamanya belum diketahui pasti. Dahulu, penyakit ini dikelompokkan ke dalam penyakit *toksemia gravidarum* karena diduga terdapat semacam ‘racun’ yang berasal dari janin atau kehamilan. Sekarang diperkirakan bahwa sindrom ini terjadi akibat peningkatan kadar serum HCG atau hormon estrogen dengan cepat di dalam darah ibu hamil. Ibu penderita hiperemesis gravidarum ditemukan mengalami peningkatan kadar serum korionik gonadotropin total maupun β -subunit bebasnya yang bermakna bila dibandingkan dengan ibu hamil normal. Gangguan keseimbangan hormon, seperti HCG, tiroksin kortisol dan hormon seks seperti estrogen dan progesteron, diperkirakan menjadi faktor penyebab yang penting.

Perubahan metabolisme hati juga dapat menjadi penyebab penyakit ini. Oleh karena itu, pada kasus berat, harus dipikirkan

kemungkinan gangguan fungsi hati, kandung empedu, pankreatitis atau ulkus peptikum (Martaadisoebrata dkk, 2015: 70).

Selain hal tersebut di atas, berikut adalah faktor predisposisi yang diduga menjadi penyebab hiperemesis gravidarum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor adaptasi dan hormonal. Yang termasuk dalam faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida, dan overdistensi rahim pada hamil kembar dan hamil molahidatidosa. Pada wanita dengan primigravida, sebagian kecil belum mampu beradaptasi dengan hormon estrogen dan hormon HCG sedangkan wanita dengan kehamilan *gemelli* dan molahidatidosa mengeluarkan hormon yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan hiperemesis gravidarum.
- b. Faktor Psikologi. Hubungan antara faktor psikologis dan kejadian hiperemesis gravidarum masih belum jelas. Besar kemungkinan bahwa wanita yang menolak hamil, takut kehilangan pekerjaan, keretakan hubungan dengan suami dan sebagainya, diduga dapat menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum.
- c. Faktor Alergi. Pada kehamilan, ketika diduga terjadi invasi jaringan vili korialis yang masuk kedalam peredaran darah ibu, maka faktor alergi dianggap dapat menyebabkan kejadian hiperemesis gravidarum (Manuaba dkk, 2013: 230).

3. Patofisiologi

Ada yang menyatakan bahwa perasaan mual adalah akibat dari meningkatnya kadar estrogen, oleh karena keluhan ini terjadi pada trimester pertama. Pengaruh fisiologis hormon estrogen ini tidak jelas, mungkin berasal dari sistem saraf pusat akibat berkurangnya pengosongan lambung. Penyesuaian terjadi pada kebanyakan wanita hamil, meskipun demikian mual dan muntah dapat berlangsung berbulan-bulan (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2014: 120).

Hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat habis dipakai untuk keperluan energi, sehingga pembakaran tubuh beralih pada cadangan lemak dan protein. Karena pembakaran lemak yang kurang sempurna maka mengakibatkan terbentuknya badan keton didalam darah yang dapat menambah beratnya gejala klinik. Muntah yang dikeluarkan oleh ibu mengandung sebagian cairan lambung, serta elektrolit natrium, kalium dan kalsium. Terjadinya penurunan kalium menyebabkan mual dan muntah ibu menjadi lebih berat karena kurangnya kalium dalam keseimbangan tubuh. Muntah yang berlebihan menyebabkan cairan tubuh semakin berkurang, sehingga darah menjadi kental (hemokonsentrasi) yang kemudian memperlambat peredaran darah sehingga konsumsi O₂ dan makanan menjadi berkurang. Kekurangan makanan dan O₂ ke jaringan dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang

dapat menambah beratnya keadaan janin dan juga ibu (Manuaba dkk, 201: 229).

4. Gejala Tingkatan

a. Tingkat I

Pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1 akan mengalami :

- 1) Lemah
- 2) Nafsu makan menurun
- 3) Berat badan menurun
- 4) Nyeri epigastrium
- 5) Nadi meningkat
- 6) Turgor kulit berkurang
- 7) Tekanan darah menurun
- 8) Lidah kering
- 9) Mata cekung

b. Tingkat II

Selanjutnya untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat II akan mengalami :

- 1) Apatis
- 2) Nadi cepat dan kecil
- 3) Lidah kering dan kotor
- 4) Mata sedikit ikterik

- 5) Kadang suhu sedikit meningkat
- 6) Oliguria
- 7) Aseton tercium dalam hawa pernafasan

c. Tingkat III

Sedangkan untuk hiperemesis gravidarum tingkat III, pasien akan mengalami:

- 1) Keadaan umum lebih lemah lagi
- 2) Muntah-muntah berhenti
- 3) Kesadaran menurun dari samnolen sampai koma
- 4) Nadi lebih cepat
- 5) Tekanan darah lebih turun komplikasi fatal ensefalopati Wernicke: nustagmus, diploopia, perubahan mental dan ikterik.
(Fadlun dan Achmad Feryanto, 2014: 39).

5. Komplikasi

Menurut Setiawan (2007) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 128-129), dampak yang ditimbulkan dapat terjadi pada ibu dan janin, seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah selain itu mengakibatkan gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa yang menyebabkan ruptare esophagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal, ini akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin karena

nutrisi yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang mengakibatkan peredaran darah janin berkurang.

Wiknjosastro (2005) dalam Rukiyah Lia Yulianti (2014: 128-129), menyatakan bahwa pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya diawal kehamilan maka tidak akan berdampak terlalu serius, tapi jika disepanjang kehamilan Ibu mengalami hiperemesis gravidarum maka kemungkinan bayinya mengalami Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), prematur hingga terjadi abortus. Sebagaimana yang diketahui bahwa hiperemesis gravidarum menyebabkan darah menjadi kental (hemokonsentrasi) yang kemudian memperlambat peredaran darah sehingga konsumsi O₂ dan makanan menjadi berkurang, akibatnya pertumbuhan janin akan terhambat sehingga mendorong terjadinya terminasi kehamilan lebih dini

Makanan ibu selama hamil dan keadaan gizi ibu sewaktu hamil berhubungan erat dengan BBLR. Apabila makanan yang dikonsumsi ibu kurang dan keadaan gizi ibu jelek maka besar kemungkinan BBLR (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2014: 128-129).

6. Diagnosa

Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis yang khas dan bila perlu, dilakukan hasil pemeriksaan laboratorium. Muntah-muntah yang tidak membaik dengan pengobatan biasanya harus dicurigai disebabkan oleh penyakit lain seperti gastritis, kolesistitis, pankreatitis, hepatitis, ulkus peptikum, pielonefritis dan *fatty liver* (Martaadisoebrata dkk, 2013: 71).

Diagnosis hiperemesis gravidarum ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang.

a. Anamnesis

Dari anamnesis didapatkan amenorea, tanda kehamilan muda, mual, dan muntah. Kemudian diperdalam lagi apakah mual dan muntah terjadi terus menerus, dirangsang oleh jenis makanan tertentu, dan mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Selain itu dari anamnesis juga dapat diperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan terjadinya hiperemesis gravidarum seperti stres, lingkungan sosial pasien, asupan nutrisi dan riwayat penyakit sebelumnya (hipertiroid, gastritis, penyakit hati, diabetes mellitus, dan tumor serebri).

b. Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik perhatikan keadaan umum pasien, tanda-tanda vital, tanda dehidrasi, dan besarnya kehamilan. Selain itu perlu juga

dilakukan pemeriksaan tiroid dan abdominal untuk menyingkirkan diagnosis banding.

c. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding. Pemeriksaan yang dilakukan adalah darah lengkap, urinalisis, gula darah, elektrolit, USG (pemeriksaan penunjang dasar), analisis gas darah, tes fungsi hati dan ginjal (Widayana, 2013: 6-7).

7. Pencegahan

Pencegahan terhadap hiperemesis gravidarum perlu dilaksanakan dengan jalan memberikan penerangan tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologis, memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang muntah merupakan gejala yang fisiologis pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan bulan, menganjurkan mengubah makanan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil, tetapi lebih sering. Waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur, tetapi dianjurkan untuk makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat.

Makanan berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan. Makanan dan minuman sebaiknya disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Defekasi yang teratur hendaknya dapat dijamin,

menghindarkan kekurangan karbohidrat merupakan faktor yang paling penting, oleh karenanya dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2014: 122-123)

C. Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

1. Pengertian

Menurut Wiknjosastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 121), hiperemesis gravidarum tingkat 1 merupakan mual dan muntah berlebihan yang dialami ibu hamil namun masih masuk dalam kategori hiperemesis ringan, yang ditandai dengan muntah terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum penderita, berat badan menurun serta nyeri epigastrium.

2. Penatalaksanaan

Sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan layanan masyarakat, bidan harus mengenali tanda dan gejala terjadinya hiperemesis gravidarum sehingga dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini. Jika didapati kasus ibu dengan keadaan dehidrasi disertai penurunan tingkat kesadaran, lakukan penatalaksanaan awal sebagai upaya penstabilan keadaan ibu sebelum dilakukan penatalaksanaan lebih lanjut. Penatalaksanaan lebih lanjut dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang berwenang pada unit pelayanan yang lebih tinggi (Irianti dkk, 2014: 70)

Penderita dengan mual dan muntah yang ringan dianjurkan untuk makan dalam porsi yang kecil. Tidak usah menganjurkan makanan tertentu yang dianggap sehat karena untuk ibu hamil dengan komplikasi hiperemesis gravidarum, makanan yang diterima dan masuk adalah makanan terbaik.

Meskipun begitu, namun makanan yang berlemak tetaplah dilarang untuk pasien hiperemesis gravidarum karena pada umumnya dapat menyebabkan mual. Makanan ini diselingi oleh makanan kecil berupa biskuit, roti kering dengan teh, sebelum bangun tidur, pada siang hari dan sebelum tidur (Pudiasuti, 2014: 189-191).

Memberikan obat untuk pasien hiperemesis gravidarum sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, sehingga dapat dipilih obat yang tidak bersifat teratogenik (dapat menyebabkan kelainan kongenital – cacat bawaan bayi). Komponen (susunan obat) yang dapat diberikan adalah:

- a. Sedatif ringan (Fenobarbital [luminal] 30 mg, Valium)
- b. Antialergi (AntiHistamin, Dramamin, Avomin)
- c. Obat antimual-muntah (Mediamer B6, Emetrole, Stimetil, Avopreg)

(Manuaba, dkk, 2013: 232).

D. Pandangan Islam Tentang Kehamilan dan Hiperemesis Gravidarum

1. Proses Kehamilan dalam Islam

Al-Qur'an membahas mengenai berbagai hal dalam kehidupan manusia dengan sangat teliti dan tepat jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya, termasuk diantaranya yaitu proses terjadinya kehamilan. Al-Qur'an membicarakan mengenai proses\perkembangbiakan (reproduksi) manusia dengan menyebut tempat-tempat mekanisme yang tepat serta tahap-tahap reproduksi tanpa keliru sedikitpun. Allah berfirman dalam Q.S. Al- Mu'minun/ 23: 12-14 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah." (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2012)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

"Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2012)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

"Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2012)

Uraian tentang proses tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah sang pencipta serta keharusan untuk mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Ayat-ayat tersebut di atas lebih kurang menyatakan: *Dan sesungguhnya Kami bersumpah bahwa Kami telah menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya, yakni saripati itu, nuthfah yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim ibu. Kemudian, Kami ciptakan, yakni jadikan, nuthfah itu'alaqah, lalu Kami Ciptakan, yakni jadikan, 'alaqah itu mudhgah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, lalu Kami ciptakan, yakni jadikan, mudhgah itu tulang belulang, lalu Kami bungkus*

tulang belulang itu dalam bentuk daging. Kemudian, Kami mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging itu menjadi setelah Kami meniupkan ruh ciptaan Kami kepadanya makhluk lain daripada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan makhluk lain.

Thâhir Ibn Âsyûr, memahami kata *al-insân* dalam arti Âdam, cenderung berpendapat bahwa *al-insân* yang dimaksud adalah putra-putri Âdam as. *Saripati dari tanah* itu, menurutnya, adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan makanan yang kemudian menjadi darah, yang kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika terjadi hubungan seks. Inilah yang dimaksud dengan saripati tanah karena Ia berasal dari makanan manusia baik tumbuhan ataupun hewan yang bersumber dari tanah.

Kata *nuthfah* dalam bahasa Arab berarti *setetes yang dapat membasahi*. Ada juga yang memahami kata itu dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja.

Kata *'alaqah* terambil dari kata *'alaq*. Dalam kamus-kamus bahasa, kata itu diartikan dengan (a) segumpal darah yang beku, (b)

sesuatu yang seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air mani, bila air itu diminum cacing tersebut menyangkut di kerongkongan, dan (c) sesuatu yang bergantung dan berdempet. Dahulu kata tersebut dipahami dalam arti segumpal darah, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan serta maraknya penelitian, para embriolog enggan menafsirkannya dalam arti tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam arti sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim. Menurut mereka, setelah terjadi pembuahan (*nuthfah* yang berada dalam rahim itu), terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yang kemudian terbelah menjadi dua, lalu yang dua menjadi empat, empat menjadi delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua, dan dalam proses itu, ia bergerak menuju dinding rahim dan akhirnya bergantung dan berdempet disana.

Kata *mudghah* terambil dari kata *madhgha* yang berarti *mengunyah*. *Mudghah* adalah sesuatu yang kadarnya kecil sehingga dapat dikunyah. Kata *kausanâ* diambil dari kata *kasâ* yang berarti *membungkus*. Daging diibaratkan pakaian yang *membungkus tulang*. Sayyid Quthub sebagaimana dikutip dari M.Quraish Shihab menulis bahwa di sini seseorang berdiri tercengang dan kagum di hadapan apa yang diungkap al-Qur'an menyangkut hakikat pembentukan janin yang tidak diketahui secara teliti kecuali baru-baru ini setelah kemajuan yang dicapai oleh

embriologi. Kekaguman itu lahir antara lain setelah diketahui bahwa sel-sel daging berbeda dengan sel-sel tulang, dan juga setelah terbukti bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel-sel tulang, persis seperti yang diinformasikan ayat diatas (Shihab, 2002: 335-338).

2. Pandangan Islam Tentang Hiperemesis Gravidarum

Allah berfirman dalam Q.S Luqman ayat 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan Kami wasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua tahun: Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak kamu, hanya kepada-Kulah kembali kamu.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012)

Ayat di atas dan ayat berikut dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia disisipkan al-Qur’an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orangtua menempati tempat kedua setelah penghormatan kepada Allah swt. Ayat diatas bagaikan menyatakan : *Dan Kami wasiatkan*, yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua *manusia menyangkut kedua*

orang ibu-bapaknya; Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu, dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyukannya setiap saat. Demikian hingga tiba masa menyapiannya dan penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan.

Kata *wahnan* berarti *kelemahan atau kerapuhan*. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan oleh ayat inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya (Shihab, 2002: 209-301).

Ayat tersebut di atas menurut penulis sangat berkaitan dengan kasus hiperemesis gravidarum, karena pasien dengan hiperemesis gravidarum memiliki kondisi fisik yang sangat lemah, ibu terus mengalami mual muntah dan merasa enggan untuk makan sehingga mengakibatkan keadaan umum ibu lebih buruk bahkan pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat III pasien dapat mengalami koma atau bahkan kematian.

3. Pandangan Islam tentang Puasa bagi Orang yang Sakit

Agama Allah swt berdiri berdasarkan kasih sayang dan rahmat. Sehubungan dengan puasa, Dia berkata dalam Q.S. Al-Baqarah: 185 yang berbunyi:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012)

Ketika Allah swt mewajibkan puasa, maka Dia mewajibkannya bagi orang yang mampu, sedangkan orang yang sakit termasuk orang-orang yang berhalangan (mempunyai uzur), yang dibolehkan bagi mereka untuk berbuka pada hari-hari Ramadhan selama sakit itu belum sembuh, dan kemudian setelah sakit mereka sembuh, maka mereka harus mengganti puasa yang mereka tinggalkan selama bulan Ramadhan. Seandainya seseorang melewati satu tahun penuh tanpa atau belum mengganti (meng-*qadha*) puasa yang ditinggalkannya, maka hendaklah ia menunggu sampai ia berpuasa pada Ramadhan yang akan datang,

kemudian ia meng-*qadha* Ramadhan yang lalu yang ditinggalkannya, dan ia tidak dikenakan *fidyah* dalam kasus ini, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa ia harus membayar *fidyah* (Asy-Syarbashi, 2008: 61)

4. Pandangan Islam tentang Puasa Wanita Hamil di bulan Ramadhan

Ahli ilmu sependapat bahwa jika wanita hamil atau menyusui merasa khawatir terhadap diri mereka, atau merasa khawatir terhadap diri mereka dan anak mereka, maka mereka boleh tidak berpuasa. Mereka hanya wajib meng-*qadha* puasa saja. Sebab, mereka seperti orang sakit yang mengkhawatirkan dirinya. Dan Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah: 184 yang berbunyi:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (dia wajib berpuasa) sebanyak hari ditinggalkan itu pada hari yang lain” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012).

Standar bahaya yang membolehkan berbuka diketahui secara meyakinkan dengan mengacu pada pengalaman yang terjadi sebelumnya atau keterangan seorang dokter muslim yang pandai dan adil.

Berdasarkan keduanya ditetapkan kekhawatiran bahwa anak yang dikandung akan mengalami kekurangan kecerdasan, ataupun meninggal. Jadi, yang dimaksud dengan kekhawatiran bukanlah sekedar prasangka dan khayalan belaka.

Ahli ilmu berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan ini, ke dalam enam pendapat :

Pendapat pertama : Jika wanita hamil hanya mengkhawatirkan anaknya saja, maka mereka harus meng-*qadha* puasa dan membayar *fidyah*. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi’I berdasarkan yang kuat dan dijadikan sandaran dalam mazhab mereka, dan pendapat para ulama mazhab Hanbali. Pendapat ini juga diutarakan oleh Mujahid, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Atha’. Ibnu Umar pernah ditanya mengenai wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya. Dia berkata “Dia boleh berbuka, dan memberi makan orang miskin dengan satu *mud* (sekitar 543 gram) sebagai ganti satu hari puasa.

Pendapat Kedua : Wanita hamil wajib meng-*qadha* puasa saja dan tidak wajib membayar *fidyah*. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Maliki. Pendapat ini diutarakan oleh Laits. Dan ini adalah salah satu pendapat asy-Syafi’I dalam kitab al-Buwaithi

Pendapat Ketiga : Wanita hamil hanya wajib membayar *fidyah* dan tidak wajib meng-*qadha* puasa. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, Ibnu Umar, Said ibn Jabir, Qasim ibn Muhammad, dan sekelompok ulama. Dan ini adalah salah satu riwayat dari Ishaq ibn Rahawiah. Asing-masing dari Said ibn Jabir, Atha', dan Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan Sanad yang hasan bahwa ibu hamil boleh berbuka dan memberi makan orang miskin. Tidak wajib atas mereka Kada.

Pendapat Keempat : Wanita hamil tidak wajib meng*qadha* puasa dan tidak pula membayar *fidyah*. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri.

Pendapat Kelima : Memberikan pilihan. Jika wanita hamil mau memberi makan orang miskin, maka mereka berdua tidak wajib meng*qadha* puasa. Dan jika mereka mau meng*qadha* puasa, mereka tidak wajib memberi makan orang miskin. Ini adalah pendapat Ishaq ibn Rahawiah.

Pendapat Keenam : Wanita hamil wajib meng*qadhaa* puasa mereka saja. Ia tidak wajib membayar *fidyah*. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafi. Ini juga adalah pendapat asy-Syafi'i dan al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakh'I, al-Auza'I Atha', az-Zuhri, Said ibn Jabir, Dhahhak, Rabi'ah, ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsaur, ashab ar-ra'yi (para pengikut aliran rasionalis dalam mazhab Hanafi), dan Ibnu Mundzir.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Laits. Dan ini adalah pendapat ath-Thabari (Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, 2005: 41 - 42).

Hadis Anas ibn Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya Allah mengangkat puasa dan separuh shalat dari musafir, dan mengangkat puasa dari wanita hamil dan menyusui”

Tentang hadis ini, Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadis hasan. Dan pengalaman hadis ini, menurut ahli ilmu, jika wanita hamil dan menyusui mengkhawatirkan anak mereka, maka mereka harus berbuka dan *mengqadha* puasa”. Zahir hadis ini menetapkan agar ibu hamil ataupun menyusui berbuka dan *mengqadha* puasa. Khususnya karena puasa diangkat dari mereka berdua sebagaimana diangkat dari musafir, untuk digantikan pada hari yang lain. Sementara zahir al-Qur'an menetapkan agar orang yang berat menjalankan puasa memberi makan orang miskin dan tidak berpuasa.

Makna hadis di atas adalah bahwa puasa diangkat dari wanita hamil dan menyusui selama mereka berdua tidak mampu melakukannya, sebagaimana diangkat dari musafir dalam perjalanannya sampai dia menetap dan mengadanya. Maknanya bukanlah bahwa mereka berddua diperintahkan untuk membayar *fidyah* dan berbuka, tanpa wajib *mengqadha' puasa*. Seandainya di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud oleh Nabi saw adalah bahwa Allah swt mengangkat puasa dari mereka dengan firman-Nya “Dan orang-orang

yang berat menjalankannya wajib membayar *fidyah*, yaitu memberi makan orang miskin,” niscaya *qadha* tidak wajib atas musafir jika dia berbuka dalam perjalanannya, dan dengan berbuka dia tidak wajib kecuali membayar *fidyah*. Sebab, Nabi saw telah menyamakan antara kaum musafir dan hukum wanita hamil dan menyusui (Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, 2005: 55-56)

E. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian

Manajemen kebidanan adalah bentuk pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pemecahan masalah (Nurhayati, 2012: 139)

2. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Proses manajemen adalah proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang terorganisasi, meliputi pikiran dan tindakan dalam urutan yang logis untuk keuntungan pasien dan pemberian asuhan (Nurhayati, 2012: 139)

Pengertian manajemen asuhan kebidanan dan prosesnya perlu dijelaskan untuk memberikan kesamaan pandangan. Helen Varney (2003) menyatakan bahwa proses manajemen terdiri dari 7 langkah sekuensial yang secara berkala disempurnakan. Ini dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan evaluasi. Langkah 7 Varney ini merupakan keseluruhan kerangka kerja yang

berlaku dalam semua situasi. Setiap langkah kemudian dapat dipecah menjadi tugas yang terbatas yang bervariasi sesuai dengan kondisi pasien. Harus diakui bahwa langkah-langkah ini diambil berkolaborasi dengan pasien atau bekerjasama dengan pasien atau keluarga pasien.

Tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney (2003) yaitu :

a. Langkah I (Identifikasi dan Analisa Data Dasar)

Langkah pertama merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang pasien. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber diharapkan dapat memberikan informasi yang paling akurat dan dapat diperoleh dengan cepat serta upaya sekecil mungkin. Data secara garis besar diklasifikasikan menjadi data subjektif dan data objektif. Untuk kasus hiperemesis gravidarum, beberapa data yang diperlukan adalah : Data Subjektif (Identitas pasien, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat KB, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat ekonomi, riwayat ekonomi, psikologis dan spiritual dan pola kebiasaan sehari-hari).

Data Objektif (Keadaan umum, kesadaran, tinggi badan, berat badan, LILA (Lingkar Lengan Atas), pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sistematis) selain itu pemeriksaan penunjang sangat membantu dalam

menegakkan diagnosa yaitu pemeriksaan laboratorium, apabila ibu menderita hiperemesis gravidarum maka akan didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa protein, aceton, urobilinogen, porphyrin dalam urine bertambah, silinder+.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual)

Pada langkah ini, identifikasi dilakukan terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis spesifik.

Pada kasus hiperemesis gravidarum, jika telah mendapatkan data subjektif dari ibu berupa Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) ibu (agar dapat ditentukan usia kehamilan), ibu merasa mual dan muntah yang hebat, ibu memuntahkan segala apa yang ia makan, nyeri epigastrium dan pada data Objektif didapatkan KU ibu yang lemah, kesadaran masih composmentis, tekanan darah menurun, nadi meningkat, turgor kulit berkurang, mata cekung, ibu tampak pucat maka ibu didiagnosa mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Pudiastuti (2012), yang menyatakan seorang ibu hamil yang memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum hingga berat badan sangat turun, turgor kulit kurang, diurese kurang dan

timbul aceton dalam air kencing, maka keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum dan memerlukan perawatan di rumah sakit.

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Langkah ketiga ini bertujuan untuk mengantisipasi semua kemungkinan tidak diinginkan yang dapat muncul sewaktu-waktu. Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Pada kasus hiperemesis gravidarum, diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada ibu dan janin adalah ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah dapat pula mengakibatkan gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa pada hubungan gastroesofagi yang menyebabkan peredaran ruptur esophagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal, ini akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang mengakibatkan peredaran darah janin berkurang. Selain itu diagnosa potensial dari hiperemesis gravidarum tingkat I ialah antisipasi terjadinya hiperemesis gravidarum tingkat II.

d. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)

Tindakan segera adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan ataupun dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi pasien. Pada pasien hiperemesis gravidarum tindakan segera dilakukan apabila di dapati ibu mengalami penurunan kesadaran menjadi apatis, kemudian pada pemeriksaan fisik didapati nadi cepat dan kecil lidah kering dan kotor, mata sedikit ikterik, aseton tercium dalam hawa pernafasan. Selanjutnya pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I kolaborasi dilakukan dalam hal pemberian obat-obatan dan vitamin.

e. Langkah V (Merencanakan Asuhan Kebidanan)

Langkah ini merupakan rencana asuhan menyeluruh terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat dilengkapi. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori terbaru, *evidence based care*, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan. Sebaiknya pasien dilibatkan dalam perencanaan asuhan karena pada akhirnya keputusan dilakukan atau tidaknya tindakan berada di tangan pasien.

Pada pasien hiperemesis gravidarum langkah ini dilakukan berdasarkan tingkatan hiperemesis gravidarum yang dialami oleh pasien. Untuk pasien dengan hiperemesis gravidarum tingkat I, bidan berencana untuk memberikan *health education* dalam hal pemenuhan nutrisi ibu yakni anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering dan hindari makan makanan

berlemak dan rencana kolaborasi dengan dokter dalam pemberian vitamin untuk mengatasi mual muntah.

f. Langkah VI (Melaksanakan Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini seluruh rencana asuhan yang telah ditetapkan pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan sepenuhnya oleh bidan atau sebagian oleh pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. Bidan dalam manajemen asuhan bagi pasien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Pada pasien hiperemesis gravidarum bidan melaksanakan semua rencananya pada langkah V yakni memberikan *Health Education* tentang pemenuhan nutrisi ibu yakni menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering dan menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak, dan berkolaborasi dengan dokter dalam memberikan vitamin untuk mengatasi mual dan muntah.

g. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)

Pada tahap ini, kita perlu mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telah kita berikan kepada pasien, untuk itu kita perlu melakukan evaluasi dengan cara mengacu pada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektifitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Hasil yang diharapkan dari kasus hiperemesis gravidarum tingkat I

adalah teratasinya mual dan muntah pada ibu, mengembalikan keadaan umum, tanda vital, dan kondisi ibu menjadi lebih baik.

3. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP :

Varney (2003), menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a. Subjektif (S)

Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa. Data Subjektif termasuk dalam langkah I pada tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney. Tahap ini dikumpulkan semua data yang diperlukan dari pasien ataupun keluarga pasien. Pada kasus hiperemesis gravidarum, yang perlu kita kaji yakni Identitas pasien, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat KB, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat ekonomi, riwayat ekonomi, psikologis dan spiritual dan pola kebiasaan sehari-hari.

b. Objektif (O)

Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnos. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur,

informasi kajian teknologi (hasil laboratorium, sinar X, rekaman CTG, USG, dan lain-lain) dan informasi dari keluarga atau orang lain yang dapat dimasukkan dalam kategori ini. Apa yang dimasukkan oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan. Data Objektif juga termasuk dalam langkah I pada tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney.

Pada kasus hiperemesis gravidarum pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah memeriksa keadaan umum, kesadaran, tinggi badan, berat badan, LILA (Lingkar Lengan Atas), pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik sistematis selain itu pemeriksaan penunjang sangat membantu dalam menegakkan diagnosa yaitu pemeriksaan laboratorium, apabila ibu menderita hiperemesis gravidarum maka akan didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa protein, aceton, urobilinogen, porphyrin dalam urine bertambah, silinder+.

c. Assessment (A)

Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif atau objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Untuk Assessment, merupakan gabungan dari beberapa langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yakni langkah II, III, IV. Dalam tahap ini ditentukan diagnosis masalah, antisipasi masalah potensial dan juga tindakan segera.

Pada kasus hiperemesis gravidarum langkah ini kita sudah menegakkan diagnosa bahwa benar pasien menderita hiperemesis gravidarum berdasarkan dari data subjektif dan objektif yang didapatkan. Setelah menegakkan diagnosa hiperemesis gravidarum kita perlu mengantisipasi terjadinya dehidrasi pada ibu karena ibu yang terus memuntahkan apa yang dimakan dan juga diminum. Kemudian kita perlu pula untuk menegakkan diagnosa potensial yang mana pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I perlu dilakukan antisipasi terhadap terjadinya dehidrasi, kekurangan nutrisi, dan hiperemesis gravidarum tingkat II. Pada kasus ini kolaborasi dilakukan dengan dokter dalam hal pemberian obat-obatan dan vitamin.

d. Planning (P)

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien yang sebaik mungkin setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana tindakan untuk mengatasi masalah atau keluhan dan yang terakhir dilakukan evaluasi dari tindakan yang telah ditentukan. Plan termasuk dalam langkah ke V, VI VII dalam tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney.

Pada kasus hiperemesis gravidarum di langkah ini kita telah merencanakan, mengimplementasikan serta mengevaluasi asuhan berupa pemberian *health education* (HE) yakni menganjurkan untuk makan sedikit

tapi sering dan menganjurkan untuk menghindari untuk makan makanan berlemak, selain pemberian HE kita perlu memberikan vitamin untuk mengatasi mual dan muntah.

Pada pasien dengan kasus hiperemesis gravidarum tingkat I yang ditangani di rumah sakit dan telah dibolehkan untuk pulang maka tetap akan dilakukan rencana untuk melakukan kunjungan rumah terhadap pasien. Rencana asuhan yang akan dilakukan yakni mengkaji keadaan umum dan kesadaran ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital, mengkaji apakah ibu masih merasakan mual dan muntah atau tidak, memberikan konseling kepada ibu dan menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA
NY “D” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI
16 – 18 MINGGU DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 31 MEI 2017

No. Register : 47XXXX
Tanggal Masuk : 31 Mei 2017 , pukul 11.00 wita
Tanggal Pengkajian : 31 Mei 2017, pukul 11.00 wita
Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid

A. Langkah I (Identifikasi dan Analisa Data Dasar)

1. Data Subjektif (S)

a. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “D” / Tn “K”
Umur : 29 tahun / 28 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu

Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirannuang,
Kec.Bontamarannu, Kab.Gowa, Provinsi
Sulawesi Seatan

b. Keluhan Utama

Ibu mengeluh mual dan muntah berlebihan

c. Riwayat Keluhan Utama

- 1) Keluhan dialami ibu sejak diawal kehamilan yakni saat ibu memasuki bulan ketiga kehamilan
- 2) Ibu lebih sering muntah di pagi hari
- 3) Pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati
- 4) Frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak Ia bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak > 7 kali
- 5) Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati
- 6) Ibu malas makan selama Ia mengalami mual dan muntah
- 7) Ibu memuntahkan segala apa yang Ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat
- 8) Ibu dapat menoleransi air putih dengan tidak memuntahkannya

d. Riwayat Kehamilan Sekarang

- 1) Kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran
- 2) Hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 28 Januari 2017

- 3) Menurut ibu Ia tidak pernah merasakan mual dan muntah pada kehamilan sebelumnya.
- 4) Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan
- 5) Berat badan ibu sebelum hamil adalah 65 kg

e. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang Lalu

Tahun	Tempat Persalinan	Jenis Persalinan	Penolong	Data Bayi				Nifas
				Berat Badan	Panjang Badan	Sex	Apgar Score	
2011	Rumah Sakit	Spontan	Bidan	2700 Gram	49 cm	Laki-laki	Niai apgar score tidak diketahui, namun menurut ibu bayinya menangis kuat.	Tidak ada keluhan perdarahan, riwayat penyembuhan baik.

f. Riwayat Menstruasi

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus Haid : 28 – 30 hari
- 3) Durasi : 5-7 hari
- 4) *Dismenorrhea* : Tidak Pernah

g. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan

h. Riwayat Kesehatan yang Lalu dan Sekarang

- 1) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun

- 2) Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius seperti jantung, diabetes mietus, ataupun maag akut.
 - 3) Ibu tidak sedang menderita penyakit berat seperti jantung, diabetes miletus ataupun maag akut.
 - 4) Ibu tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat dan juga makanan
- i. Riwayat Ekonomi, Psikologis dan Spiritual
- 1) Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga
 - 2) Suami adalah pencari nafkah dalam keluarga
 - 3) Suami dan keluarga senang dengan kehamilan ibu
 - 4) Ibu tidak sedang memiliki masalah yang serius
 - 5) Ibu mengaku menjalankan sholat 5 waktu dan cukup memahami kewajiban beribadah dalam kondisi kehamiannya.
- j. Pola Kebiasaan sehari-hari
- 1) Pola Nutrisi
 - a) Sebelum hamil

Pola makan : 3 kali sehari

Komposisi : Nasi, ikan/telur, sayur, tahu/tempe.

Pola minum : 10 kali sehari (termasuk satu gelas teh di pagi hari dan segelas teh di sore hari)
 - b) Selama hamil

Pola makan : Ibu memuntahkan segala sesuatu setiap kali makan

Pola minum : Ibu berusaha minum sebanyak mungkin

2) Pola Eliminasi

a) Sebelum hamil

BAB (Buang Air Besar)

Konsistensi : Lunak

Warna : Kuning kecoklatan, tidak ada darah, tidak ada lendir

Frekuensi : 1 kali sehari

Flatus : $\pm 2 - 3$ kali/jam

BAK (Buang Air Kecil)

Warna : Kuning, tidak ada batu, tidak ada darah.

Bau : Amoniak

b) Selama hamil

BAB (Buang Air Besar)

Konsistensi : Lunak

Warna : Kuning kecoklatan, tidak ada darah, tidak ada lendir.

Frekuensi : 1 kali sehari namun kadang-kadang tidak BAB dalam sehari

Flatus : $\pm 2 - 3$ kali/jam

BAK (Buang Air Kecil)

Warna : Kuning, tidak ada batu, tidak ada darah.

Bau : Amoniak

3) Pola Istirahat

a) Sebelum hamil

Tidur siang : 1 jam/ hari (mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.00)

Tidur malam : 8 jam/ hari (mulai pukul 22.00 hingga pukul 06.00)

b) Selama hamil

Tidur siang : 2 jam/ hari (mulai pukul 13.00 hingga pukul 15.00)

Tidur malam : 9 jam/ hari (mulai pukul 21.00 hingga pukul 06.00)

4) Personal Hyegine

a) Sebelum hamil

Ibu mandi 2 kali setiap hari setiap pagi dan sore

Ibu keramas 3 kali seminggu

Ibu sikat gigi 3 kali sehari

Ibu selalu mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau basah

b) Selama hamil

Ibu mandi 2 kali setiap hari setiap pagi dan sore

Ibu keramas 3 kali seminggu

Ibu sikat gigi 3 kali sehari

Ibu selalu mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau basah

2. Data Objektif (O)

- a. Keadaan umum ibu lemah
- b. Kesadaran composmentis
- c. Tinggi Badan : 158 cm
Berat Badan : 63 kg
LILA : 26 cm
- d. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - 2) Nadi : 98 x/menit, teratur.
 - 3) Suhu : 36,7°C, aksila
 - 4) Pernapasan : 20x/menit, teratur
- e. Pemeriksaan USG :
Oleh dokter Obgyn : dr.R.A
Tanggal 31 Mei 2017
 - 1) Jenis Kehamilan : Tunggal
 - 2) Keadaan Janin : Hidup
 - 3) Letak Kehamilan : Intra Uteri
 - 4) Letak Plasenta : Fundus Uteri
 - 5) HTP : 30 Oktober 2017
 - 6) Usia Kehamilan : 18 Minggu 5 Hari
 - 7) DJJ : 140x/menit

f. Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Protein Urin : Tidak dilakukan
- 2) Glukosa : Tidak dilakukan
- 3) HB : Tidak dilakukan
- 4) Plano test : Tidak dilakukan

g. Pemeriksaan Fisik Sistematis

a. Kepala

Inspeksi : Rambut bersih, tidak rontok, tidak ada kutu, tidak ada ketombe.

Palpasi : Tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

b. Wajah

Inspeksi : Tampak pucat, tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Inspeksi : Tampak cekung, konjungtiva pucat, sklera putih

d. Hidung

Inspeksi : Tidak ada polip, tidak ada sekret, tidak ada pengeluaran darah

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

e. Telinga

Inspeksi : Pada kedua telinga terdapat serumen namun sedikit

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tarik.

f. Mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak ada stomatitis, gusi merah muda, tidak ada gusi berdarah, tidak ada gigi berubang, hygiene mulut secara umum baik.

g. Leher

Inspeksi : Tidak ada benjolan

Palpasi : Tidak pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

h. Payudara

Inspeksi : Puting menonjol, tampak hiperpigmentasi areola

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, asi beum ada.

i. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra

Palpasi kebidanan : Leopold I : 3 jari atas simpisis
 Leopold II : Ballotement
 Leopold III : Ballotement
 Leopold IV : Ballotement

Palpasi Umum : Terdapat nyeri tekan epigastrium, tidak teraba
 masaa abdomen dan lien hepar tidak teraba.

Auskultasi kebidanan : DJJ belum terdengar dengan laenec

Auskultasi umum : Peristaltik usus terdengar

j. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak lembab, tidak ada
 pembesaran kelenjar bartholini, tidak ada pelepasan
 lendir dan darah.

Palpasi : Tidak ada oedema

k. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, kaki kanan dan kiri simetris, tangan
 kiri dan kanan simetris.

Palpasi : Tidak ada pitting oedema

Perkusi : Refleks patella (+/+)

B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 17 Minggu 4 Hari, Intrauterin, Hidup,
 Tunggal, Ballotement, Hiperemesis gravidarum tingkat I

Masalah Aktual : Hiperemesis gravidarum tingkat I

1. GIPIA0

a. Data Subjektif

Menurut ibu ini adalah kehamilan kedua dan tidak pernah mengalami abortus.

b. Data Objektif

Tampak striae alba dan linea nigra pada inspeksi abdomen, pembesaran perut sesuai usia kehamilan, puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola dan pada pemeriksaan USG terlihat janin.

Analisa dan interpretasi data :

Tanda dugaan kehamilan yaitu terdapat hiperpigmentasi areola, ini diakibatkan karena keluarnya *melanophore stimulating hormone* hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit pada dinding perut (striae livide (pada primigravida), striae alba (pada multigravida)) dan sekitar payudara terdapat hiperpigmentasi areola, puting susu makin menonjol. Sedangkan pada tanda pasti janin akan terlihat pada pemeriksaan USG (Manuaba, dkk, 2013: 107-109)

2. Gestasi 17 Minggu 4 Hari

a. Data Subjektif

Menurut ibu hari pertama haid terakhirnya adalah tanggal 28 Januari 2017

b. Data Objektif

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan

Tinggi Fundus Uteri yakni 3 jari di atas pusat

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

Dalam menentukan usia kehamilan menurut hukum Neagle ditentukan melalui HPHT, jadi dari HPHT yang didapatkan dari ibu yakni tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal pengkajian yakni tanggal 31 Mei 2017 maka usia kehamilan ibu tersebut adalah 17 Minggu 4 hari (Manuaba, dkk, 2013: 128).

3. Intrauterin

a. Data Subjektif

Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan

b. Data Objektif

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, tidak terdapat nyeri tekan,

dan pada pemeriksaan USG didapati janin berada dalam uterus

Analisa dan Interpretasi Data :

Kehamilan Intrauterin sejak hamil muda dapat dipastikan, yaitu perkembangan rahim sesuai dengan usia kehamilan, janin teraba intrauterin, dan pada palpasi terjadi kontraksi *Braxton Hicks* dan janin di dalam rahim. sedangkan nidasi hasil konsepsi di luar endometrium normal disebut kehamilan ektopik uterin, kehamilan ini sebagian besar tidak dapat berlangsung sampai aterm, dan pecah pada usia kehamilan muda dengan tanda hamil ektopik (terlambat datang bulan, terjadi nyeri perut mendadak, atau berkelanjutan, dan terjadi perdarahan per vagina) (Manuaba, dkk, 2013: 131).

4. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janinnya

b. Data Objektif

1) Tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilan

2) Pada pemeriksaan USG terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 140x/menit

Analisa dan Interpretasi data

Jika janin hidup pada usia kehamilan muda dengan usia kehamilan di atas 17 minggu akan didapati tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan, palpasi janin dalam rahim jelas, terdengar denyut jantung janin, terasa gerakan janin, pada pemeriksaan USG terdapat denyut jantung janin,

air ketuban janin tidak berkurang, tidak terdapat tanda Spalding pada kepala janin (Manuaba, dkk, 2013: 127).

5. Tunggal

a. Data Subjektif

-

b. Data Objektif

1) Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan

2) Pada pemeriksaan USG didapatkan janin tunggal

Analisa dan Interpretasi Data:

Menetapkan kehamilan kembar ataupun tunggal pada usia kehamilan yang masih muda sulit dilakukan, kecuali dengan USG. Dengan anamnesis dapat diduga hamil kembar (ganda) yaitu perut cepat membesar, gejala emesis gravidarum lebih hebat, perut dirasakan lebih berat, gerak janin lebih banyak, dan dapat disertai sesak napas (Manuaba, dkk, 2013: 129).

6. Ballotement

a. Data Subjektif

Menurut ibu usia kehamilannya adalah 4 bulan

b. Data Objektif

Pada pemeriksaan palpasi abdomen teraba janin yang memantul atau membentur secara perlahan kearah tangan pemeriksa.

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

Teraba ballottement, pengapungan. Pada usia kehamilan di bawah 20 minggu, secara abdominal dengan satu ketukan tiba-tiba pada uterus menyebabkan janin tenggelam dalam cairan amnion dan memantul kembali atau membentur secara perlahan terhadap jari pemeriksa. Ballottement terjadi karena perbandingan ukuran janin yang masih kecil dengan volume air ketuban yang banyak (Megasari, Mirato, dkk, 2014: 89).

7. Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

a. Data Subjektif

- 1) Ibu mual dan muntah yang hebat
- 2) Ibu lebih sering muntah di pagi hari
- 3) Pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati
- 4) Namun pada hari ini frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak > 7 kali
- 5) Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati
- 6) Ibu malas makan selama ia mengalami mual dan muntah
- 7) Ibu memuntahkan segala apa yang ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat.

b. Data Objektif

- 1) Keadaan umum ibu lemah
- 2) Kesadaran composmentis

- 3) Tanda-tanda vital :
- a) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b) Nadi : 98x/menit, teratur
 - c) Suhu : 36.7°C, aksila
 - d) Pernapasan : 20x/menit, teratur
- 4) Pemeriksaan fisik :
- a) Ibu tampak pucat
 - b) Mata tampak cekung

Analisa dan Interpretasi Data

Hiperemesis gravidarum tingkat 1 merupakan mual dan muntah berlebihan yang dialami ibu hamil namun masih masuk dalam kategori hiperemesis ringan, yang ditandai dengan muntah terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum penderita, berat badan menurun serta nyeri epigastrium (Wiknjosastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 121), selain itu gejala yang dapat dilihat pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I adalah nafsu makan menurun, berat badan menurun, nyeri epigastrium, nadi meningkat, turgor kulit berkurang, tekanan darah menurun lidah kering, mata cekung (Fadlun dan Achmad Feryanto, 2014: 39).

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya dehidrasi berat, kekurangan nutrisi kekurangan nutrisi bagi ibu dan janin, hiperemesis gravidarum tingkat II

D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)

Tindakan segera dilakukan apabila didapati ibu mengalami penurunan kesadaran menjadi apatis, kemudian pada pemeriksaan fisik didapati nadi cepat dan kecil lidah kering dan kotor, mata sedikit ikterik, aseton tercium dalam hawa pernafasan. Selanjutnya pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I kolaborasi dilakukan dalam hal pemberian obat-obatan dan vitamin.

E. Langkah V (Merencanakan Asuhan Kebidanan)

Tujuan :

1. Keluhan ibu teratasi
2. Tidak terjadi dehidrasi
3. Tidak terjadi kekurangan nutrisi bagi ibu dan janin
4. Tidak terjadi terjadi hiperemesis gravidarum lebih berat

Kriteria :

1. Mual dan muntah berkurang

2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
5. Selera makan ibu pulih

Intervensi tanggal 31 Mei 2017, Pagi hari pukul 11.30 wita

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
 Rasional : Dengan memberitahu ibu mengenai kondisi yang Ia alami maka ibu akan merasa waspada sehingga bersedia mengikuti anjuran agar tidak terjadi kondisi yang lebih berat
2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
 Rasional : Istirahat dan tidur yang teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan ibu serta perkembangan dan pertumbuhan janin.
3. Jelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada awal kehamilan
 Rasional : Dengan menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang normal, maka hal tersebut akan mengurangi kecemasan ibu sehingga tidak akan memperburuk kondisi ibu dan janin
4. Anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
 Rasional : Dengan minum air putih yang banyak maka ibu akan terhindar dari dehidrasi

5. Anjurkan pada ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat

Rasional : Pada umumnya makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat dapat merangsang ibu untuk mual.

6. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering

Rasional : Makan dengan porsi yang banyak sekaligus dapat memicu terjadinya mual dan muntah.

7. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin

Rasional : Makanan yang hangat atau benar-benar dingin dapat mencegah terpicunya mual dan muntah.

8. Anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Rasional : Berdo'a dan sholat 5 waktu dapat menenangkan pikiran dan mendekatkan ibu kepada Allah

9. Berikan vitamin B6 (*pyridoxine*)

Rasional : Vitamin B6 diperlukan dalam jumlah yang besar untuk melakukan metabolisme dengan peningkatan 100%., vitamin B6 dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengatasi mual dan muntah.

F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan kebidanan)

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan

2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup

3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa tenang

4. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak

5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

7. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

9. Memberikan vitamin B6 (*pyridoxine*)

Hasil : Vitamin telah diberikan

G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)

1. Hasil pemeriksaan telah disampaikan dan ibu merasa tenang
2. Istirahat yang cukup telah dianjurkan dan ibu bersedia mengikuti anjuran
3. Telah dijelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis dan ibu merasa tenang
4. Telah dianjurkan untuk minum air putih dalam jumlah yang banyak dan ibu bersedia mengikuti anjuran
5. Telah dianjurkan untuk menghindari makanan berlemak serta makanan yang berbau menyengat dan ibu bersedia mengikuti anjuran
6. Telah dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering
7. Telah dianjurkan untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin
8. Telah dianjurkan untuk sholat dan melaksanakan sholat 5 waktu
9. Telah diberikan vitamin B6 (*pyridoxine*)

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PATOLOGI PADA NY "D" DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM
TINGKAT I GESTASI 16 – 18 MINGGU
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 31 MEI 2017

No. Register : 47XXXX

Tanggal Masuk : 31 Mei 2017 , pukul 11.00 wita

Tanggal Pengkajian : 31 Mei 2017, pukul 11.00 wita

Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "D" / Tn "K"

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu

Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirannuang,
Kec.Bontamarannu, Kab.Gowa, Provinsi
Suawesi Selatan

A. Subjektif (S)

1. Kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran
2. Hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 28 Januari 2017
3. Ibu mengeluh mengalami mual dan muntah berlebihan
4. Keluhan dialami ibu sejak diawal kehamilan yakni saat ibu memasuki bulan ketiga kehamilan
5. Ibu lebih sering muntah di pagi hari
6. Pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati
7. Frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak Ia bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak > 7 kali
8. Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati
9. Ibu malas makan selama Ia mengalami mual dan muntah
10. Ibu memuntahkan segala apa yang Ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat
11. Ibu dapat menoleransi air putih dengan tidak memuntahkannya
12. Menurut ibu Ia tidak pernah merasakan mual dan muntah pada kehamilan sebelumnya.
13. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan
14. Berat badan ibu sebelum hamil adalah 65 kg

15. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang Lalu

Tahun	Tempat Pesalinan	Jenis Persalinan	Penolong	Data Bayi				Nifas
				Berat Badan	Panjang Badan	Sex	Apgar Score	
2011	Rumah Sakit	Spontan	Bidan	2700 Gram	49 cm	Laki-laki	Niai apgar score tidak diketahui, namun menurut ibu bayinya menangis kuat.	Tidak ada keluhan perdarahan, riwayat penyembuhan baik.

16. Riwayat Menstruasi :

- a. Menarche : 14 tahun
- b. Siklus Haid : 28-30 hari
- c. Durasi : 5-7 hari
- d. *Dismenorrhea* : Tidak pernah

17. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan

18. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun

19. Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius

20. Ibu tidak sedang menderita penyakit apapun

21. Ibu tidak memiliki alergi terhadap obat dan juga makanan

22. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga

23. Suami adalah pencari nafkah dalam keluarga

24. Suami dan keluarga senang dengan kehamilan ibu

25. Ibu tidak sedang memiliki masalah yang serius

26. Ibu senantiasa menjalankan sholat 5 waktu

B. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesedaran composmentis
3. Tinggi Badan : 158 cm
4. Berat Badan Sekarang : 63 kg
5. LILA : 26 cm
6. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - Nadi : 98 x/menit, teratur
 - Suhu : 36,7°C, aksila
 - Pernapasan : 20x/menit, teratur
7. Pemeriksaan USG :
Oleh dokter Obgyn : dr.R.A

Tanggal 31 Mei 2017

Jenis Kehamilan : Tunggal

Keadaan Janin : Hidup

Letak Kehamilan : Intrauterin

Letak Plasenta : Fundus Uteri

Usia Kehamilan : 18 Minggu 2 Hari

HTP : 30 Oktober 2017

DJJ : 140x/menit

8. Pemeriksaan Laboratorium

Protein Urin : Tidak dilakukan

Glukosa : Tidak dilakukan

HB : Tidak dilakukan

Plano test : Tidak dilakukan

9. Pemeriksaan Fisik Sistematis

- a. Kepala : Rambut bersih, tidak rontok, tidak ada kutu, tidak ada ketombe tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.
- b. Wajah : Tampak pucat, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan
- c. Mata : Tampak cekung, konjungtiva pucat, sklera putih
- d. Hidung : Tidak ada polip, tidak ada sekret, tidak ada pengeluaran darah, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- e. Telinga : Pada kedua telinga terdapat serumen namun sedikit, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tarik.
- f. Mulut : Bibir lembab, tidak ada stomatitis, gusi merah muda, tidak ada gusi berdarah, tidak ada gigi berubang, hygiene mulut secara umum baik.
- g. Leher : Tidak ada benjolan, tidak pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

- h. Payudara : Puting menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, pengeluaran ASI belum ada.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, DJJ belum terdengar dengan laenec, peristaltic usus terdengar
- Leopold I : 3 jari atas simpisis
- Leopold II : Ballotement
- Leopold III : Ballotement
- Leopold IV : Ballotement
- Terdapat nyeri tekan epigastrium, tidak teraba massa abdomen dan lien hepar tidak teraba.
- j. Genetalia : Tidak ada varices, tampak lembab, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, tidak ada pelepasan lendir dan darah, tidak ada oedema
- k. Ekstremitas : Tidak ada varices, kaki kanan dan kiri simetris, tangan kiri dan kanan simetris, tidak ada pitting oedema, refleks patella (+/+)

C. Assessment (A)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 17 Minggu 4 Hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis gravidarum tingkat I

D. PLANNING (P)

Tanggal 31 Mei 2017, Pukul 11.20 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan

2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup

3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa tenang

4. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak

5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

7. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin

Hasi : Ibu bersedia mengikuti anjuran

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

9. Memberikan vitamin B6 (*pyridoxine*) dengan dosis 2 x 1

Hasil : Vitamin



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
 PATOLOGI PADA NY “D” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM
 TINGKAT I GESTASI 18 – 20 MINGGU DI RUMAH PASIEN
 TANGGAL 10 JUNI 2017

Tanggal Pengkajian : 10 Juni 2017, pukul 16.00 wita

Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid

Lokasi Pengkajian : Di rumah pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “D” / Tn “K”

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / S MP

Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu

Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirannuang,

Kec.Bontomarannu, Kab.Gowa, Provisnsi Sulawesi

Selatan.

A. Subjektif (S)

1. Ibu masih mual dan muntah sejak kepulangannya dari rumah sakit namun sudah mulai berkurang, biasanya dalam sehari ibu muntah sebanyak lebih dari 10 kali.

2. Sejak 2 hari yang lalu mual muntah ibu sudah berkurang menjadi sekitar 5 – 6 kali sehari
3. Frekuensi muntah ibu pada hari ini mulai dari pukul 05.30 wita hingga 16.00 wita adalah sebanyak 4 kali
4. Ibu masih mengeluh nyeri pada ulu hati
5. Ibu mulai bisa makan dalam porsi yang sedikit namun sering
6. Ibu banyak mengonsumsi air putih
7. Ibu merasakan pergerakan janinnya
8. Ibu tetap mengonsumsi vitamin yang diperoleh dari rumah sakit
9. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat, perdarahan, ataupun tanda-tanda bahaya kehamilan selain hiperemesis gravidarum

B. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 88 x/menit, teratur

Suhu : 36.6°C, aksila

Pernapasan : 22x/menit, teratur

4. Data Penunjang

Berat badan ibu pada tanggal kunjungan pemeriksaan kehamilan terakhir yakni tanggal 31 Mei 2017 adalah 63 kg

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Mata : Mata tampak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Payudara : Puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, ASI belum ada
- c. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, tidak ada nyeri tekan
- Leopold I : 2 jari di bawah pusat, teraba bokong.
- Leopold II : Ballotement
- Leopold III : Ballotement
- Leopold IV : Ballotement
- d. Genetalia : Tidak ada varices, tampak lembab, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, tidak ada pelepasan lendir dan darah.
- e. Ekstremitas : Tidak ada varices, kaki kanan dan kiri simetris, tangan kiri dan kanan simetris. tidak ada pitting oedema, refleks patella +/-

C. Assessment (A)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 19 Minggu, Intrauterin, Hidup, Tunggal,
Ballotement, Hiperemesis gravidarum tingkat I

D. Planning (P)

Tanggal 10 Juni 2017, Pukul 16.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup
3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa tenang
4. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak
5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran
6. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

7. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

8. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia untuk tetap mengkonsumsi vitamin

9. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

10. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “D” DENGAN EMESIS GRAVIDARUM GESTASI
24 – 26 MINGGU DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 15 JULI 2017

Tanggal Pengkajian : 31 Juli 2017, pukul 15.00 wita
Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid
Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien
Identitas Istri/Suami
Nama : Ny “D” / Tn “K”
Umur : 29 tahun / 28 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu
Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirannuang,
Kec.Bontomarannu, Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan.

A. Subjektif (S)

1. Ibu masih merasa mual namun muntah sudah berkurang
2. Ibu mual jika mencium bau-bau yang menyengat

3. Sejak bangun tidur pukul 05.30 wita hingga pukul 15.00 wita ibu muntah sebanyak 2 kali
4. Ibu mual muntah sebanyak 2 kali pada pagi hari sekitar pukul 07.00
5. Ibu sudah tidak merasakan nyeri ulu hati
6. Ibu tetap makan dalam porsi yang sedikit namun sering
7. Ibu tetap banyak mengonsumsi air putih
8. Ibu telah mendapatkan suntik TT (Tetanus Toksoid) pertama pada tanggal 30 Juni 2017

B. Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 84 x/menit, teratur

Suhu : 36.5°C, aksila

Pernapasan : 20x/menit, teratur

4. Berat badan ibu pada kunjungan pemeriksaan kehamilan terakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah 63 kg

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Mata : Mata tidak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih

- b. Payudara : Puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, ASI belum ada
- c. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, tidak ada nyeri tekan.

Leopold I : Setinggi Pusat, teraba bokong.

Leopold II : Puka (Punggung Kanan)

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP (Bergerak Atas Panggul)

DJJ terdengar kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit

- d. Genetalia : Tidak ada avarices, tidak ada oedema, tidak ada pembesaran kelenjar barthololini, tidak ada pelepasan lendir dan darah.

- e. Ekstremitas : Tidak ada varices, tidak ada oedema, kaki kiri dan kanan simetris, tangan kiri dan kanan simetris, refleks patella ++

C. Assessment (A)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 24 Minggu, Intrauterin, Hidup, Tunggal, Emesis gravidarum.

D. PLANNING (P)

Tanggal 15 Juli 2017, Pukul 15.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup
3. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak
4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran
5. Mengajnrurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran
6. Menganjurkan ibu untuk menghindari segala sesuatu yang berbau tajam
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran
7. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia untuk tetap mengkonsumsi vitamin
8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

9. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “D” DENGAN GESTASI 26 – 28 MINGGU DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 30 JULI 2017

Tanggal Pengkajian : 30 Juli 2017, pukul 11.00 wita

Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “D” / Tn “K”

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu

Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirannuang, Kec.

Bontomarannu, Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

A. Subjektif (S)

1. Menurut ibu mual dan muntahnya sudah semakin berkurang namun ibu masih merasa mual jika mencium bau-bau yang menyengat
2. Ibu belum pernah muntah sejak 3 hari yang lalu
3. Ibu sudah tidak merasakan nyeri epigastrium

4. Selera makan ibu telah membaik, ibu sudah tidak memuntahkan setiap makanan yang Ia makan
5. Ibu tetap menghindari makanan yang berlemak dan makanan yang berbau menyengat
6. Ibu telah mendapatkan suntikan TT (Tetanus Toksoid) kedua pada tanggal 22 Juli 2017

B. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 82 x/menit, teratur

Suhu : 36.5°C, aksila

Pernapasan : 20x/menit, teratur

4. Data Penunjang

Berat badan ibu pada kunjungan pemeriksaan kehamilan terakhir tanggal 22 Juli 2017 adalah 64 kg

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Mata : Mata tidak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Payudara : Puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, ASI belum ada
- c. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, tidak ada nyeri tekan.
- Leopold I : 2 jari di atas pusat, teraba bokong.
- Leopold II : Puka (Punggung Kanan)
- Leopold III : Kepala
- Leopold IV : BAP (Bergerak Atas Panggul)
- DJJ terdengar kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit
- d. Genitalia : Tidak ada varices, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, tidak ada pelepasan lendir dan darah, tidak ada nyeri tekan, tidak ada oedema
- e. Ekstremitas : Tidak ada varices, kaki kiri dan kanan simetris, tangan kanan dan kiri simetris, tidak ada pitting oedema, refleks patella +/-.

C. Assessment (A)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 26 Minggu 2 Hari, Intrauterin, Hidup,
Tunggal.

D. Planning (P)

Tanggal 30 Juli 2017, Pukul 11.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan

2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup

3. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak

4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

5. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Menganjurkan ibu untuk menghindari segala sesuatu yang berbau tajam

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

7. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
DENGAN GESTASI 26 – 28 MINGGU DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 06 AGUSTUS 2017

Tanggal Pengkajian : 06 Agustus 2017, pukul 16.00 wita

Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “D” / Tn “K”

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu

Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirnannuang, Kec.

Bontomarannu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

A. Subjektif (S)

1. Menurut ibu mual dan muntahnya semakin berkurang
2. Menurut ibu sejak tanggal terakhir kunjungan peneliti yakni tanggal 30 Juli 2017, ibu belum pernah muntah

B. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesedaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80 x/menit, teratur

Suhu : 36.6°C, aksila

Pernapasan : 20x/menit, teratur

4. Data Penunjang

Berat badan ibu pada kunjungan pemeriksaan kehamilan terakhir tanggal 22 Juli 2017 adalah 64 kg

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Mata : Mata tidak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Payudara : Puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, ASI belum ada
- c. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, tidak ada nyeri tekan.
 Leopold I : 3 jari di atas pusat, teraba bokong.
 Leopold II : Puka (Punggung Kanan)
 Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP (Bergerak Atas Panggul)

DJJ terdengar kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah
perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit

- d. Genitalia : Tidak ada varices, tidak ada pembesaran kelenjar
bartholini, tidak ada pelepasan lendir dan darah tidak
ada oedema
- e. Ekstremitas : Tidak ada varices, kaki kanan dan kiri simetris, tangan
kanan dan kiri simetris, tidak ada oedema, refleks
patella +/+

C. Assessment (A)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 27 Minggu 1 Hari, Intrauterin, Hidup,
Tunggal

D. Planning (P)

Tanggal 06 Agustus 2017, Pukul 16.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan

2. Mengajukan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup

3. Mengajukan ibu untuk minum air putih yang banyak

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang
banyak

4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

5. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

7. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “D” DENGAN GESTASI 30 – 32 MINGGU DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 26 AGUSTUS 2017

Tanggal Pengkajian : 26 Agustus 2017, pukul 17.00 wita

Nama Pengkaji : Miftahul Khair Wahid

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “D” / Tn “K”

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / 8 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Tukang Kayu

Alamat : Jl. Kampung Baru, Desa Nirnannuang, Kec.

Bontomarannu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

A. Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak pernah merasa mual dan muntah
2. Ibu mengaku selera makannya sudah kembali normal

B. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis

3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82 x/menit, teratur

Suhu : 36.7°C, aksila

Pernapasan : 22x/menit, teratur

4. Berat badan : 67 kg

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Mata : Mata tidak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Payudara : Puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, ASI belum ada
- c. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, tidak ada nyeri tekan.

Leopold I : 29 cm, teraba bokong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Leopold II : Puka (Punggung Kanan)

ALAUDDIN
Leopold III : Kepala

MAKASSAR
Leopold IV : BAP (Bergerak Atas Panggul)

DJJ terdengar kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit

- d. Genetalia : Tidak ada varices, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, tidak ada pelepasan lendir dan darah tidak ada oedema
- e. Ekstremitas : Tidak ada varices, kaki kanan dan kiri simetris, tangan kanan dan kiri simetris, tidak ada oedema, refleks patella +/+

C. Assessment (A)

Diagnosa : GIIP1A0, Gestasi 30 Minggu, Intrauterin, Hidup, Tunggal

D. Planning (P)

Tanggal 26 Agustus 2017, Pukul 17.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup
3. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

4. Mengajukan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

5. Mengajukan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan makna hasil penelitian. Pembahasan membahas kesenjangan antara teori dan hasil penelitian serta menjawab tujuan penelitian. Teori yang dikemukakan adalah teori (jurnal dan *text book*) yang sudah termuat dalam bab II. Penulis akan membahas kesenjangan antara teori yang dimuat pada bab II dengan manajemen asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada Ny “D” dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu: langkah I (identifikasi dan analisa data dasar), langkah II (identifikasi diagnosa atau masalah aktual), langkah III (identifikasi diagnosa atau masalah potensial), langkah IV (tindakan segera, kolaborasi dan rujukan), langkah V (rencana tindakan asuhan kebidanan), langkah VI (melaksanakan hasil asuhan kebidanan), langkah VII (mengevaluasi hasil tindakan). Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

A. Langkah I (Identifikasi dan Analisa Data Dasar)

Teori menjelaskan bahwa identifikasi dan analisa data dasar merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang pasien. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber diharapkan dapat

memberikan informasi yang paling akurat dan dapat diperoleh dengan cepat serta upaya sekecil mungkin.

Mual dan muntah terjadi pada kehamilan hingga usia 16 minggu, pada keadaan muntah-muntah yang berat, dapat terjadi dehidrasi, gangguan asam basa dan elektrolit dan ketosis; keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum (Kemenkes RI, 2013: 82). Hiperemesis gravidarum terbagi lagi dalam beberapa tingkatan yakni tingkat I, II dan III.

Terkhusus pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I menurut Wiknjosastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 121), hiperemesis gravidarum tingkat 1 merupakan mual dan muntah berlebihan yang dialami ibu hamil namun masih masuk dalam kategori hiperemesis ringan, yang ditandai dengan muntah terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum penderita, berat badan menurun serta nyeri epigastrium. Adapun tanda dan gejalanya adalah yakni keadaan umum ibu lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, nyeri pada daerah epigastrium, nadi meningkat, turgor kulit berkurang, tekanan darah menurun, lidah kering, dan mata tampak cekung.

Pada kasus hiperemesis gravidarum didapatkan hasil pengkajian anamnesa akurat berupa riwayat rinci mengenai identitas pasien, keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat KB, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat

kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat ekonomi, riwayat ekonomi, psikologis dan spiritual dan pola kebiasaan sehari-hari dan dilakukan pemeriksaan fisik yang lengkap selanjutnya

Pada kasus Ny “D” didapatkan keluhan utama pasien yakni ibu mengeluh mual muntah berlebihan, riwayat keluhan utama ibu yakni keluhan dialami ibu sejak diawal kehamilan yakni saat ibu memasuki bulan ketiga kehamilan, ibu lebih sering muntah di pagi hari, pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati, frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak Ia bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak > 7 kali, ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati, ibu malas makan selama Ia mengalami mual dan muntah, ibu memuntahkan segala apa yang Ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat, ibu dapat menoleransi air putih dengan tidak memuntahkannya.

Riwayat kehamilan sekarang ibu yakni merupakan kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran, hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 28 Januari 2017, menurut ibu Ia tidak pernah merasakan mual dan muntah pada kehamilan sebelumnya, ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan, berat badan ibu sebelum hamil adalah 65 kg. Riwayat kehamilan yang lalu yakni ibu pernah melahirkan pada tahun 2011 di rumah sakit secara spontan, ditolong oleh bidan dengan berat badan bayi

yakni 2700 gram, panjang badan 49 cm, jenis kelamin laki-laki, nilai apgar score tidak diketahui namun menurut ibu bayinya menangis kuat segera setelah lahir, serta tidak ada masalah perdarahan pada masa nifas.

Riwayat menstruasi yakni menurut ibu, Ia mendapatkan menarche pada usia 14 tahun, siklus haid ibu yakni 28 – 30 hari, lama haid ibu yakni 5 – 7 hari, dan ibu tidak pernah merasakan *Dismenorrhea*. Riwayat KB yakni ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan. Riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang didapatkan bahwa ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun, ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius seperti jantung, diabetes miletus, ataupun maag akut, ibu tidak sedang menderita penyakit berat seperti jantung, diabetes miletus ataupun maag akut, ibu tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat dan juga makanan. Riwayat ekonomi, psikologis dan spiritual ibu yakni suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga, suami adalah pencari nafkah dalam keluarga, suami dan keluarga senang dengan kehamilan ibu, ibu tidak sedang memiliki masalah yang serius, ibu mengaku menjalankan sholat 5 waktu dan cukup memahami kewajiban beribadah dalam kondisi kehamiannya.

Pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa keadaan umum ibu lemah, kesadaran composmentis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 98x/menit, suhu 36.7°C, dan pernapasan 20 x/menit. Tinggi badan ibu yakni 158 cm, berat badan yakni 63 kg, LILA 26 cm. Kemudian pada pemeriksaan fisik

didapatkan wajah tampak pucat, mata tampak cekung, terdapat nyeri tekan epigastrium.

.Peneliti tidak menemukan kesulitan dalam melakukan pengkajian terhadap pasien karena pasien bersifat terbuka dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan yang telah didapatkan dari pasien Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I, penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada.

B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Pada langkah ini, identifikasi dilakukan terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis spesifik.

Masalah aktual dari kasus Ny “D” yakni hiperemesis gravidarum tingkat I hal ini ditunjukkan dari data subjektif yang didapatkan yakni ibu mengeluh mual dan muntah, ibu mengeluh nyeri epigastrium, ibu memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum, kemudian dari data objektif didapatkan keadaan umum ibu lemah, kesadaran composmentis, mata tampak cekung, konjungtiva pucat, berat badan yang turun, tekanan darah yang turun, dan nadi yang meningkat. Berdasarkan teori yang ada bahwa hiperemesis gravidarum tingkat I adalah mual muntah yang berlebihan

yang dialami oleh ibu yang ditandai dengan muntah terus menerus, sehingga mempengaruhi keadaan umum penderita, berat badan menurun hingga nyeri epigastrium (Wiknjastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 121). Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang didapatkan dari Ny “D” sesuai dengan teori yang ada oleh karena itu pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus dalam hal penentuan masalah aktual pasien

Pada kunjungan pertama di rumah pasien tanggal 10 Juni 2017 didapatkan masalah aktual yakni hiperemesis gravidarum tingkat I hal ini ditunjukkan berdasarkan data subjektif yakni ibu masih mengalami mual dan muntah, Ibu masih mengeluh nyeri ulu hati sedangkan pada data objektif didapatkan nadi ibu masih cepat meskipun telah menurun dari sebelumnya, kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan mata masih tampak cekung. Pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan penetapan masalah aktual pada kunjungan pertama.

Pada kunjungan kedua di rumah pasien tanggal 15 Juli 2017 didapatkan masalah aktual yakni emesis gravidarum, hal ini ditunjukkan berdasarkan data subjektif yakni ibu masih mual dan muntah namun sudah tidak berlebihan, ibu mual dan muntah di pagi hari sedangkan pada data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung. Teori menyatakan bahwa emesis gravidarum

adalah mual dan muntah yang biasanya terjadi di pagi hari namun tidak menyebabkan gangguan semua aktivitas sehari-hari (Manuaba,dkk, 2013: 348). Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan penetapan masalah aktual pada kunjungan kedua.

Teori menjelaskan bahwa salah satu faktor predisposisi terjadinya hiperemesis gravidarum adalah wanita dengan primigravida karena sebagian kecil belum mampu beradaptasi dengan hormon estrogen sehingga mereka lebih beresiko mengalami hiperemesis gravidarum (Manuaba dkk, 2013: 230), namun pada kasus Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I didapatkan dari anamnesa bahwa NY “D” tidak mengalami mual dan muntah pada kehamilan pertamanya sedangkan pada kehamilan kedua Ia mengalami mual dan muntah yang berlebihan. Pada tahap ini penulis menemukan kesenjangan antara teori dan kasus dalam hal faktor predisposisi hiperemesis gravidarum.

Teori menyatakan bahwa perkiraan kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus Naegle yakni dengan menentukan hari pertama haid terakhir yang kemudian ditambah 288 hari, rumus Naegle dapat dihitung dengan menambahkan hari pertama haid terakhir dengan tujuh dan bulannya ditambah Sembilan (Manuaba, dkk, 2013: 100), berdasarkan dari data HPHT yang didapatkan dari ibu yakni tanggal 28 Januari 2017 maka dapat diketahui bahwa HTP (Hari Tafsiran Persalinan) ibu adalah tanggal 04 Nopember

2017. Sedangkan pada pemeriksaan USG didapatkan bahwa HTP ibu adalah 30 Oktober 2017. Pada tahap ini penulis menemukan kesenjangan antara teori hukum Neagle dan penetapan HTP berdasarkan hasil pemeriksaan USG.

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Langkah ketiga ini bertujuan untuk mengantisipasi semua kemungkinan tidak diinginkan yang dapat muncul sewaktu-waktu. Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Berdasarkan teori yang ada bahwa masalah potensial dari hiperemesis gravidarum menurut Setiawan (2007) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 128-129), dampak yang dapat ditimbulkan dapat terjadi pada ibu dan janin, seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah selain itu mengakibatkan gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa yang menyebabkan rupture esophagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal, ini akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang mengakibatkan peredaran darah janin berkurang.

Berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi penulis mengantisipasi terjadinya dehidrasi, kekurangan nutrisi dengan masalah potensial yakni hiperemesis gravidarum tingkat II.

Sebagaimana yang diketahui bahwa hiperemesis gravidarum dibagi atas tiga tingkatan, sehingga ketika telah ditetapkan masalah aktual yakni hiperemesis gravidarum tingkat I pada langkah ke II maka kita harus mengantisipasi terjadinya hiperemesis gravidarum yang lebih berat yakni hiperemesis gravidarum tingkat II.

Pada tahap ini, penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus Ny “D”

D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)

Tindakan segera adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan ataupun dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi pasien.

Sebagaimana yang telah didapatkan pada langkah III bahwa masalah potensial dari hiperemesis gravidarum tingkat I adalah terjadinya hiperemesis gravidarum yang lebih berat yakni hiperemesis gravidarum tingkat II. Oleh karena itu jika didapati tanda dan gejala hiperemesis gravidarum tingkat II yakni menurut Fadlun dan Achmad Feryanto (2014: 39) adalah apabila kesadaran ibu menurun menjadi apatis, nadi cepat dan kecil, lidah kering dan kotor, mata sedikit ikterik, kadang suhu sedikit meningkat, oliguria, aseton tercium dalam hawa pernafasan maka perlu dilakukan tindakan segera serta kolaborasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut.

Pada kasus ini tidak dilakukan tindakan segera karena tidak didapatkan tanda-tanda hiperemesis gravidarum tingkat I berubah menjadi hiperemesis gravidarum yang lebih berat. Hal ini ditentukan dari pengkajian lebih lanjut yang dilakukan di rumah pasien yang mana pada kunjungan pertama didapatkan masalah aktual yakni masih dengan hiperemesis gravidarum tingkat I dan tidak ditemukan tanda-tanda hiperemesis gravidarum tingkat I berubah menjadi lebih berat yakni dari data subjektif mual dan muntah ibu sudah berkurang, pada kunjungan kedua tersebut ibu masih mengalami nyeri ulu hati kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan nadi masih cepat, mata masih tampak cekung. Berdasarkan data pada kunjungan pertama, tidak ada data yang menunjukkan hiperemesis gravidarum tingkat I berubah menjadi hiperemesis gravidarum tingkat II.

Selanjutnya pada kunjungan kedua penulis menemukan masalah aktual yakni emesis gravidarum dan tidak ada tanda-tanda emesis gravidarum berubah menjadi hiperemesis gravidarum. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data subjektif yakni mual dan muntah ibu sudah semakin berkurang, ibu tidak merasakan nyeri ulu hati, ibu mual dan muntah di pagi hari dan pada data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung. Berdasarkan data pada kunjungan kedua, tidak

ada data yang menunjukkan emesis gravidarum berubah menjadi hiperemesis gravidarum tingkat I.

Selanjutnya pada kunjungan ketiga penulis tidak menemukan adanya tanda-tanda adanya hiperemesis gravidarum tingkat I, hal ini ditunjukkan dari data subjektif yakni ibu belum pernah muntah sejak tiga hari yang lalu, ibu tidak merasakan nyeri epigastrium dan pada data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung. Berdasarkan data pada kunjungan ketiga, tidak ada data yang menunjukkan keadaan ibu sekarang berubah menjadi hiperemesis gravidarum tingkat I.

Pada kunjungan keempat penulis kembali tidak menemukan adanya tanda-tanda hiperemesis gravidarum, hal ini ditunjukkan dari data subjektif yakni ibu belum pernah muntah sejak 6 hari terakhir, ibu tidak merasakan nyeri ulu hati dan pada data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung. Berdasarkan data pada kunjungan keempat tidak ada data yang menunjukkan keadaan ibu sekarang berubah menjadi hiperemesis gravidarum tingkat I.

Pada kunjungan terakhir yakni kunjungan kelima, penulis tidak menemukan tanda-tanda hiperemesis gravidarum dan penyulit kehamilan lainnya. hal ini ditunjukkan dari data subjektif yakni ibu sudah tidak pernah

merasakan mual dan muntah lagi dan pada data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung. Berdasarkan data pada kunjungan kelima tidak ada data yang menunjukkan keadaan ibu sekarang berubah menjadi hiperemesis gravidarum tingkat I

Sehingga pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus Ny “D”.

E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan)

Langkah ini merupakan rencana asuhan menyeluruh terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat dilengkapi. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori terbaru, *evidence based care*, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan.

Pada teori perencanaan asuhan kebidanan terhadap kasus hiperemesis gravidarum yakni dalam hal pemberian nutrisi berupa anjuran kepada ibu untuk makan sedikit tapi sering, anjurkan untuk menghindari makanan berlemak dan anjurkan memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi serta pemberian obat yang tidak bersifat teratogenik (dapat menyebabkan kelainan kongenital – cacat bawaan bayi).

Hal ini sesuai dengan perencanaan asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I, yakni :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Jelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada awal kehamilan dan pada kehamilan pertama
4. Anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
5. Anjurkan pada ibu untuk menghindari makanan berlemak
6. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
7. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau makanan yang benar-benar dingin
8. Anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan menjalankan sholat 5 waktu
9. Berikan vitamin B6 (*Pyridoxine*)

Pada kunjungan pertama yakni tanggal 10 Juni 2017 ibu masih mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 1, oleh karena itu rencana tindakan yang dilakukan yakni :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Jelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda
4. Anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak

5. Anjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
6. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
7. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin
8. Anjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit
9. Anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
10. Anjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Pada kunjungan kedua yakni tanggal 15 Juli 2017 ibu sudah tidak mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I namun mengalami emesis gravidarum, oleh karena itu rencana tindakan yang dilakukan yakni :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
4. Anjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
5. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
6. Anjurkan ibu untuk menghindari segala sesuatu yang berbau tajam

7. Anjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit
8. Anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
9. Anjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Pada kunjungan ketiga dan keempat yakni tanggal 30 Juli dan 06 Agustus 2017 ibu sudah tidak mengalami hiperemesis gravidarum ataupun emesis gravidarum, oleh karena itu rencana tindakan yang dilakukan yakni :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
4. Anjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
5. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.
6. Anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
7. Anjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Pada kunjungan kelima yakni tanggal 26 Agustus 2017 ibu sudah tidak mengalami hiperemesis gravidarum ataupun emesis gravidarum, oleh karena itu rencana tindakan yang dilakukan yakni :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.
4. Anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
5. Anjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Berdasarkan teori dan perencanaan asuhan yang telah diberikan, penulis tidak menemukan kesenjangan dengan kenyataan yang ada.

F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan)

Teori menyatakan bahwa langkah VI merupakan pelaksanaan seluruh rencana asuhan yang telah ditetapkan pada langkah V yang dilaksanakan secara efisien dan aman. Pada kasus hiperemesis gravidarum melaksanakan hasil asuhan kebidanan adalah yakni dalam hal pemberian nutrisi berupa

menganjurkan kepada ibu untuk makan sedikit tapi sering, menganjurkan untuk menghindari makanan berlemak dan menganjurkan memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi serta pemberian obat yang tidak bersifat teratogenik (dapat menyebabkan kelainan kongenital – cacat bawaan bayi).

Pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny “D” telah sesuai dengan teori yakni :

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda
4. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak
6. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
7. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau makanan yang benar-benar dingin
8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo’a dan menjalankan sholat 5 waktu
9. Memberikan vitamin B6 (*Pyridoxine*)

Pada kunjungan pertama yakni tanggal 10 Juni 2017 pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny “D” adalah :

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu

2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda
4. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
6. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
7. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin
8. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit
9. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
10. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis.

Pada kunjungan kedua yakni tanggal 15 Juli 2017 pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny "D" adalah :

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat

5. Mengajjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
6. Mengajjurkan ibu untuk menghindari segala sesuatu yang berbau tajam
7. Mengajjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit
8. Mengajjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
9. Mengajjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Pada kunjungan ketiga dan keempat yakni tanggal 30 Juli dan 06 Agustus 2017 pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny "D" adalah :

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Mengajjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Mengajjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
4. Mengajjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
5. Mengajjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.
6. Mengajjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu

7. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis.

Pada kunjungan kelima tanggal 26 Agustus 2017 pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny "D" adalah :

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
3. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat yang diperoleh dari nasi, jagung, roti dan ubi. Protein hewani dan nabati yang diperoleh dari telur, ikan, unggas, tempe, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, daun kelor, daun kacang, kangkung, dan lain-lain.
4. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu
5. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan medis

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan juga kasus.

G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)

Teori menyatakan bahwa mengevaluasi hasil tindakan adalah penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telah kita berikan kepada pasien, untuk itu kita perlu melakukan evaluasi dengan cara mengacu pada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektifitas

tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Pada kasus hiperemesis gravidarum, diharapkan mual dan muntah teratasi, mengembalikan keadaan umum, tanda vital, dan kondisi ibu menjadi lebih baik.

Bedasarkan hasil manajemen asuhan yang telah dilakukan di rumah sakit serta manajemen asuhan pada kunjungan rumah terakhir ditemukan bahwa mual muntah berlebihan telah teratasi, pada pemeriksaan fisik didapatkan mata ibu sudah tidak cekung, keadaan umum ibu telah membaik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital :

1. Tekanan darah : 110/80 mmHg
2. Nadi : 82 x/menit
3. Suhu : 36.7°C
4. Pernapasan : 22x/menit

Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut Wiknjastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014: 121), hiperemesis gravidarum tingkat 1 merupakan mual dan muntah berlebihan yang dialami ibu hamil namun masih masuk dalam kategori hiperemesis ringan, yang ditandai dengan muntah terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum penderita, berat badan menurun serta nyeri epigastrium.

Sehingga apabila didapati ibu sudah tidak mengeluh mual dan muntah, ibu tidak mengeluh nyeri eepigastrium, keadaan umum ibu telah

baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung maka ibu dinyatakan sudah tidak mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I sehingga pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan juga kasus.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan manajemen asuhan kebidanan antenatal care patologi dengan hiperemesis gravidarum tingkat I gestasi 16 – 18 minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 31 Mei – 06 Agustus tahun 2017 yang telah dilakukan pada Ny “D” maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna terhadap peningkatan pelayanan asuhan kebidanan pada ibu hamil utamanya bagi ibu hamil dengan komplikasi kehamilan berupa hiperemesis gravidarum.

A. Kesimpulan

1. Pengumpulan data dasar ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum dilakukan dengan mengumpulkan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara/anamnesa ibu yakni ibu mengeluh mual muntah berlebihan, ibu malas makan, ibu mengeluh nyeri ulu hati, ibu memuntahkan segala sesuatu yang Ia makan utamanya pada makanan yang berbau menyengat. Kemudian pada data objektif didapatkan bahwa keadaan umum ibu lemah, kesadaran composmentis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 98x/menit, mata tampak cekung, dan adanya pemeriksaan USG yang menunjukkan bahwa ibu benar sedang hamil dan letak janin yakni

intrauterin sehingga menghilangkan diagnosis banding untuk kemungkinan penyakit yang lain.

2. Pada tahap ini semua data dikumpulkan untuk diinterpretasikan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah aktual dari pasien. Pada Ny “D” semua data subjektif dan objektif telah dikumpulkan dan diinterpretasikan dengan benar dan teliti sehingga didapatkan masalah aktual Ny “D” adalah adanya komplikasi kehamilan yakni hiperemesis gravidarum tingkat I.
3. Pada manajemen asuhan yang telah dilakukan pada Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I, diagnosa potensial yakni terjadinya hiperemesis gravidarum tingkat II tidak terjadi karena terlaksananya penanganan yang tepat serta pemantauan ibu secara *continue* hingga kondisi ibu membaik.
4. Tidak dilakukan tindakan segera dalam penanganan kasus hiperemesis gravidarum hal ini disebabkan karena data hasil pengkajian kunjungan rumah pasien yang menunjukkan keadaan pasien berangsur-angsur membaik dan tidak ada data yang menunjang terjadinya hiperemesis gravidarum yang lebih berat sehingga tidak dibutuhkan tindakan segera.
5. Rencana asuhan yang diberikan kepada Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I adalah yakni sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, jelaskan bahwa mual dan muntah

sadalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada awal kehamilan, anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak, anjurkan pada ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat, anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering, anjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin, anjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu berikan vitamin B6 (*pyridoxine*), serta rencana untuk kunjungan rumah pasien hingga kondisi pasien membaik.

6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada Ny "D" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan.
7. Evaluasi, berdasarkan hasil manajemen asuhan yang telah dilakukan di rumah sakit serta manajemen asuhan pada kunjungan rumah terakhir ditemukan bahwa mual muntah berlebihan telah teratasi, pada pemeriksaan fisik didapatkan mata ibu sudah tidak cekung, keadaan umum ibu telah membaik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal.
8. Seluruh temuan dan asuhan yang diberikan pada Ny "D" telah didokumentasikan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan antara teori dan kasus yakni kesenjangan antara teori penggunaan rumus Neagle dalam penentuan hari tafsiran persalinan, berdasarkan dari data HPHT yang didapatkan dari ibu yakni tanggal 28 Januari 2017 maka dapat diketahui

bahwa HTP (Hari Tafsiran Persalinan) ibu adalah tanggal 04 Nopember 2017, sedangkan pada pemeriksaan USG didapatkan bahwa HTP ibu adalah 30 Oktober 2017.

Selanjutnya kesenjangan yang penulis temukan adalah dalam hal penentuan faktor predisposisi hiperemesis gravidarum, teori menyatakan bahwa salah satu faktor predisposisi hiperemesis gravidarum adalah ibu dengan primigravida karena ibu dianggap belum dapat beradaptasi terhadap perubahan hormon yang terjadi namun pada kasus Ny “D” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I didapatkan dari anamnesa bahwa NY “D” tidak mengalami mual dan muntah pada kehamilan pertamanya sedangkan pada kehamilan kedua Ia mengalami mual dan muntah yang berlebihan.

B. SARAN

Berdasarkan atas tinjauan dan pembahasan kasus penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pelayanan kebidanan yang baik.

1. Bagi rumah sakit

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan kebidanan utamanya pada pelayanan antenatal care yang baik sehingga dapat diantisipasi terjadinya komplikasi-komplikasi kehamilan

khususnya hiperemesis gravidarum yang dapat membahayakan kondisi ibu dan juga janin .

2. Bagi Pendidikan

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi terbaru sehingga dapat membantu penulis ataupun mahasiswa lainnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah dan skripsi.

3. Bagi Profesi

Diharapkan dapat meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*; Penerjemah: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Anggassari, Yasi. “Kejadian Hiperemesis gravidarum Ditinjau Dari Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Saat Pra Konsepsi Di BPM Kusmawati Surabaya” *Jurnal Kesehatan Ilmiah*, Vol 9 No 1 (Februari 2016). <http://journal.unusa.ac.id/index.php/jhs/article/viewFile/79/71> (Diakses tanggal 22 April 2017).
- Asy-Syarbashi, Ahmad. Yas'alunaka: *Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*; Penerjemah, Ahmad Subandi; Penyunting, Ali Yahya, Cet.4-Jakarta: Lentera, 2008.
- Azizah, Hamidah Nur. “Perilaku Ibu Hamil Dalam Pencegahan Hyperemesis gravidarum”. <http://eprints.umpo.ac.id/2063/1/jkptumpo-gdl-hamidahnur-109-1-abstrak-i.pdf> (Diakses tanggal 22 April 2017).
- Badan Pusat Statistik, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Jakarta: BPS, 2012.
- Dewi, Vivian Nanny Lia dan Tri sunarsih, *Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan*, Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Evayanti , Yulistiana. “Hubungan Pengetahuan Ibu Dan Dukungan Suami Pada Ibu Hamil Terhadap Keteraturan Kunjungan Antenatal Care (ANC) Di Puskesmas Wates Lampung Tengah Tahun 2014” *Jurnal Kebidanan*, Vol 1 No 2 (Juli 2015). <http://malahyati.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/18-60-1-PB.pdf> (Diakses tanggal 22 April 2017)
- Fadlun dan Achmad Feryanto. *Asuhan Kebidanan Patologis*, Jakarta: Salemba Medika, 2014.
- Fazaril, Atif B, dkk. “Management and Outcome of Hyperemesis Gravidarum at Tertiary Obstetric Facility Khartoum-Sudan” *Scientist Research Publishing* (September 22, 2016) https://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/5252/Khalifa_2016_management.pdf?sequence=2 (Diakses tanggal 1 Juni 2017).

- Hailemariam, Segni, dkk. "Prevalence of Hyperemesis Gravidarum and Associated Factors Among Pregnant Women at Jimma University Medical Center, South West Ethiopia: A Cross-Sectional Study" *Research Article* (Desember 31, 2016) <https://www.econicon.com/ecgy/pdf/ECGY-03-000068.pdf> (Diakses tanggal 1 Juni 2017)
- Handayani, Desi. *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*, Jakarta : TIM, 2012.
- Irianti, Bayu, dkk. *Asuhan Kehamilan berbasis Bukti*, Jakarta : Sagung Seto, 2014.
- Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku: Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*, Jakarta: Kemenkes RI, 2013.
- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Kemenkes RI, 2016.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*, 2012.
- Kusmindarti, Indah dan Kholifah. "Faktor Dominan Penyebab Kehamilan Risiko Tinggi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto" *Jurnal Penelitian Kesehatan*, Volume 12 NO 2. <http://ejournal.stikes-ppni.ac.id/index.php/JKS/article/view/203> (Diakses tanggal 25 Mei 2017).
- Martaadisoebrata, Djamhoer, dkk. *Obstetri Patologi: Ilmu Kesehatan Reproduksi*/editor, Jakarta: EGC , 2015.
- Manuaba, Ida Ayu handranita, dkk. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*, Jakarta: EGC, 2013.
- Masruroh., Ikke Ratnasari. "Hubungan Antara Umur Ibu dan Gravida Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang". https://ppnijateng.org/wp-content/uploads/2016/11/PROSIDING-MUSWIL-II-IPEMI-JATENG_MAGELANG-17-SEPTEMBER-2016.215-222.pdf (Diakses tanggal 13 Mei 2017)
- Megasari, Miratu, dkk. "*Panduan Belajar Asuhan Kebidanan I*", Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Oktavia, Lina. "Kejadian Hiperemesis Gravidarum Ditinjau dari Jarak Kehamilan dan Paritas" *Jurnal Ilmu Kesehatan Aisyah*, Vol 1 No 2

(Juli – Desember 20116).<http://www.stikesaisyah.info/ejurnal/index.php/KESEHATAN/article/download/34/25> (Diakses tanggal 18 Mei 2017)

Pudiastuti, Ratna Dewi. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Normal dan Patologi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

Rukiyah, Ai Yeyeh dan Lia Yulianti. *Asuhan Kebidanan 4 (Patologi)*, Jakarta: TIM, 2014.

Shihab, M.Quraish. Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M.Quraish. Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sukarni K, Icesmi dan Margareth ZH. *Kehamilan, Persalihan dan Nifas*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Varney, Helen dkk. *Varney's Midwifery*, America: Jones and Bartlett Publisher, 2003.

Widayana, Ari, dkk. "Diagnosis Dan Penatalaksanaan Hiperemesis gravidarum".
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/5114/3904>
 (Diakses tanggal 22 April 2017)

