

**SKRINING PARTISI-PARTISI DAN FRAKSI-FRAKSI TIDAK LARUT  
HEKSAN DARI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAYU JAWA  
(*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) SEBAGAI ANTIPLASMODIUM  
SECARA *IN VITRO***



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**MUH. IHSAN H**  
**NIM. 70100113030**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ihsan H  
Nim : 70100113030  
Tempat/Tgl Lahir : Bontosunggu, 5 Maret 1996  
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi  
Fakultas/ Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan  
Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar  
Judul : Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak  
Larut Heksan Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang  
Kayu Jawa (*Lannea Coromandelica* Houtt. Merr.)  
Sebagai Antiplasmodium Secara *In Vitro*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Agustus 2017

Penyusun,



**MUH. IHSAN H**  
**NIM. 70100113030**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr) sebagai Antiplasmodium Secara *In Vitro*”, yang disusun oleh **Muh Ihsan H.**, NIM : 70100113030, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 M yang bertepatan dengan 22 Dzulqa’idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M  
22 Dzulqa’idah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.,	(.....)
Penguji I	: Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.	(.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
NIP. 195502031983121001

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga dan para sahabat serta para pengikutinya.

Skripsi dengan judul “**Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) Sebagai Antiplasmodium Secara *In Vitro*.**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Skripsi ini dengan terselesaikannya, tentu tak lepas dari dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do’a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan bapak **DR. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

2. Ibu **Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes** selaku Wakil Dekan I, ibu **Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes** selaku Wakil Dekan II, dan bapak **Dr. Mukhtar Lutfi, M.Ag.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu **Haeria, S.Si., M.Si.** Selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Bapak **Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.** Selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan ibu **Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.,** selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis. Semoga Allah swt. membalas bantuan **bapak** dan **ibu** dengan pahala bahkan hal yang lebih baik, di dunia dan akhirat.
5. Bapak **Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt.** Selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini, serta Bapak **Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.** selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan sekaligus bimbingan terhadap kelengkapan dan perbaikan khususnya, tinjauan agama skripsi ini.
6. Orang tua, **Ayahanda** tercinta **Drs. Haeruddin** dan **Ibunda** tercinta **Jumriati, S.Pd,** untuk semua dukungan berharga yang pasti takkan pernah bisa kubalaskan setimpal, baik berupa kasih sayang, materi, nasehat dan do'a yang tulus. Juga, kedua saudara, **Kak Emma Kurniah H,** dan **Muhammad Ridhah H** serta **keluarga** besar yang senantiasa memberikan restu dan Do'a-Nya.

7. **Bapak, Ibu Dosen**, serta seluruh **Staf Jurusan Farmasi** atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan Farmasi hingga saat ini.
8. Teman-teman seperjuangan sepembimbing (Pak Salam Squad), kepada **Faradhiba, Nurfadilah Absa** sebagai partnert Antiplasmodium dalam suka duka penelitian ini. Saudara **Arditya, Zakiah, Nurwa** sebagai partner Kayu Jawa, juga teman-teman seperjuangan **Faris, Amir, Anwar, Dayat, Rahmah Akbar, Ifah kholifah** untuk kebersamaan dan perjuangan bersama.
9. Teman-teman Seangkatan **Farmasi 2013 UIN Alauddin Makassar** “**FAR13ION**” untuk kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, kasih sayang, serta persahabatan berharga yang selalu didapatkan.
10. **Kakak-kakak dan adik-adik** di Farmasi UIN Alauddin Makassar, **Alumni SMP N 3 Takalar 2010, Alumni SMA N 3 Takalar 2013, Teman-teman Posko Desa Tanahkaraeng, Teman-teman KKN Angk. 53 Kecamatan Manuju**, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekuangan pada skripsi ini. Oleh karena, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepan-Nya. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT. dan bermanfaat bagi bagi semua pihak. Aamiin.

Gowa, Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	4
1. Defenisi operasional.....	4
2. Ruang lingkup penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	12
A. Tinjauan Islam .....	12
B. Kayu Jawa ( <i>Lannea coromandelica</i> Houtt. Merr.).....	14
1. Klasifikasi Tumbuhan .....	14
2. Nama Lokal .....	15
3. Nama Luar.....	15
4. Uraian Tanaman .....	15
5. Kandungan Kimia .....	16
C. Fraksinasi .....	21
D. Malaria .....	23



1. Pengertian.....	23
2. Etiologi.....	26
3. Siklus hidup malaria.....	28
4. Masa Inkubasi Plasmodium .....	31
E. Mekanisme Kerja Obat Antimalaria .....	31
1. Gangguan pencernaan hemoglobin dalam lisosom vakuola makanan parasit. ....	31
2. Gangguan pada jalur folat dalam sitoplasma parasit.....	32
3. Pengantar proses alkilasi. ....	32
4. Fungsi mitokondria. ....	32
5. Apikoplas. ....	32
F. Mekanisme Kerja Obat dan Mekanisme Resistensi.....	33
1. Klorokuin .....	33
2. Meflokuin.....	35
3. Obat-obat yang Mengganggu Jalur Folat Parasit .....	36
4. Obat Antimalaria yang Bekerja sebagai Pengantar Proses Alkilasi (Qinghaosu Artemisinin).....	38
5. Mekanisme kerja pada Arthemisin Combine Therapy (ACT) dengan obat antimalaria lain .....	42
G. Teknik Pengujian Antimalaria Secara <i>In Vitro</i> .....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
1. Lokasi Penelitian .....	49
2. Waktu Penelitian .....	49
C. Pendekatan Penelitian .....	49
D. Bahan dan Peralatan.....	49
1. Bahan Tanaman.....	49
2. Bahan Uji.....	50
3. Peralatan .....	50
E. Prosedur Kerja .....	50
1. Penyiapan sampel.....	50
2. Ekstraksi Sampel .....	51



3. Partisi cair padat .....	51
4. Penentuan Eluen .....	52
5. Fraksinasi .....	52
6. Penentuan Golongan Senyawa .....	53
F. Prosedur Uji Aktivitas Antiplasmodium Secara <i>In Vitro</i> .....	54
1. Pembuatan Medium Tidak Lengkap ( <i>Incomplete Medium</i> ).....	54
2. Persiapan Medium Lengkap.....	54
3. Pembiakan Kultur Parasit <i>Plasmodium falciparum</i> .....	55
4. Pengamatan Pertumbuhan <i>Plasmodium falciparum</i> .....	55
5. Prosedur pengujian.....	56
6. Pembuatan Larutan Kontrol Negatif dan Kontrol Positif.....	57
7. Preparasi <i>Plat Well 24</i> .....	58
G. Analisis Data Penelitian .....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Hasil Pengamatan.....	60
1. Ekstraksi Sampel .....	60
2. Partisi Cair-Padat.....	60
3. Penentuan Eluen .....	60
4. Fraksinasi .....	60
5. Uji Aktivitas Antiplasmodium .....	62
6. Identifikasi Golongan Kimia .....	63
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
KEPUSTAKAAN .....	76
LAMPIRAN .....	84
BIOGRAFI.....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kandungan kimia dan aktivitas kulit batang Kayu Jawa .....	16
2. Aktifitas dan jenis ekstrak kulit batang Kayu Jawa .....	20
3. Karakteristik morfologi <i>Plasmodium falciparum</i> .....	30
4. Masa Inkubasi dan prapaten Malaria. ....	31
5. Target dan Komponen Aktif Antimalaria. ....	32
6. Strain <i>Plasmodium falciparum</i> Standar .....	45
7. Model Plat Well 24 .....	58
8. Bobot Ekstrak Metanol kulit batang kayu jawa .....	60
9. Bobot Partisi Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa .....	60
10. Hasil Fraksinasi Ekstrak Kayu Jawa .....	61
11. Hasil Penggabungan Fraksi Ekstrak Kayu Jawa.....	61
12. Hasil Pengujian Antiplasmodium terhadap <i>Plasmodium falciparum</i> .....	62
13. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa.....	63




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. <i>Lannea coromandelica</i> .....	15
2. Nyamuk <i>Anopheles sp.</i> .....	26
3. Siklus Hidup Plasmodium.....	29
4. Jalur Folat.....	37
5. Mekanisme Kerja Arthemisinin .....	40
6. Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa ( <i>Lannea coromandelica</i> Houtt. Merr.).....	93
7. Hasil Partisi Larut n-Heksan .....	93
8. Hasil Partisi Tidak Larut n-Heksan.....	93
9. Hasil Fraksinasi Partisi Tidak Larut n-Heksan .....	94
10. Hasil Pengamatan Eritrosit Dibawah Mikroskop.....	94
11. Hasil Identifikasi Partisi Larut Heksan .....	95
12. Hasil Identifikasi Fraksi F2 .....	95
13. Perendaman Sampel Kulit Batang Kayu Jawa.....	96
14. Penguapan Ekstrak Kayu Jawa dengan <i>Vakum Rotary Evaporator</i> .....	96
15. Proses Partisi Cair Padat pada <i>Sentrifuge</i> .....	96
16. Proses Fraksinasi Metode Kromatografi Cair Vakum .....	97
17. Proses Pencarian Profil KLT.....	97
18. Profil KLT eluan Etil Asetat : Metanol (10:1) .....	97
19. Proses Pengelusian Fraksi Kayu Jawa .....	98
20. Penampakan Noda pada UV 254 .....	98
21. Penampakan Noda Pada UV 366 .....	98
22. Proses pengujian Antiplasmodium.....	99
23. Metode Candle Jar.....	99
24. Inkubator suhu 37 <sup>0</sup> C.....	99
25. Pengujian dalam Plat well 24 .....	100
26. Pembuatan Apusan Darah Tipis .....	100
27. Proses Fiksasi dengan Metanol .....	101
28. Pemberian Pewarna Giemsa 20% .....	101
29. Pemberian Minyak Emersi .....	101
30. Pengamatan Dibawah Mikroskop .....	102
31. Alat untuk Menghitung Jumlah Eritrosit .....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Alur Penelitian .....	84
2. Penyiapan Sampel Fraksi Kulit Batang Kayu Jawa.....	85
3. Pembuatan Medium .....	86
4. Pembuatan Bahan Uji.....	87
5. Pengujian Antiplasmodium.....	88
6. Contoh Perhitungan.....	89
7. Gambar Penelitian.....	93
8. Keterangan Hasil Penelitian.....	103



## ABSTRAK

**Nama** : Muh. Ihsan H  
**NIM** : 70100113030  
**Judul Skripsi** : **SKRINING PARTISI-PARTISI DAN FRAKSI-FRAKSI TIDAK LARUT HEKSAN DARI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAYU JAWA (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) SEBAGAI ANTIPLASMODIUM SECARA *IN VITRO***

---

Malaria merupakan salah masalah utama kesehatan masyarakat global yang menyebabkan kematian. Penyebaran resistansi obat yang mengkhawatirkan dan terbatasnya jumlah obat efektif yang sekarang tersedia menggaris bawahi betapa pentingnya menemukan senyawa antimalaria baru. Kayu jawa merupakan salah satu tanaman tradisional yang berkhasiat sebagai antimikroba dan diduga berkhasiat sebagai antiplasmodium. Penelitian ini dilakukan dalam upaya penemuan partisi dan fraksi tidak larut heksan dari ekstrak kayu jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) yang paling efektif menghambat perkembangan *Plasmodium falciparum* secara *in vitro*. Prosedur dimulai dari ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol, dipartisi metode cair padat dengan menggunakan pelarut n-heksan. Hasil partisi tidak larut n-heksan difraksinasi dengan menggunakan eluen etil asetat : metanol. Sampel uji Ekstrak Kayu jawa, Partisi tidak larut n-heksan, partisi larut n-heksan, Fraksi F1, Fraksi F2, Fraksi F3, Fraksi F4, Fraksi F5, Fraksi F6, dan juga Fraksi F7 masing-masing konsentrasi 100 ppm dilakukan pengujian terhadap *Plasmodium falciparum* strain 3D7 diukur berdasarkan persen hambatan rata-rata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua sampel uji mampu menghambat pertumbuhan dari *Plasmodium falciparum* dengan nilai persen hambatan berada diatas 30%. Partisi dan Fraksi yang menunjukkan persen hambatan paling tinggi adalah Partisi larut heksan dengan nilai persen hambatan  $89,50 \pm 0,77$  % dan Fraksi F2 dengan nilai  $96,80 \pm 0,16$  %. Identifikasi golongan senyawa menunjukkan Partisi larut heksan mengandung alkaloid, Flavonoid dan terpenoid. Fraksi F2 memiliki golongan senyawa Alkaloid, Terpenoid, Flavonoid dan Fenolik.

**Kata kunci** : Fraksi Kayu jawa, Partisi, ekstrak Metanol, Antiplasmodium, Antimalaria, *Plasmodium falciparum*, *Lannea coromandelica*, *in vitro*

## ABSTRACT

**Name** : Muh. Ihsan H  
**NIM** : 70100113030  
**Title** : *In Vitro Antiplasmodium Screening of Partitions and Fractions Insoluble Hexane From The Methanol Stembark Extract of Kayu Jawa (Lannea coromandelica Houtt. Merr.)*

---

*Malaria is one of the major problems of global public health that causes death. The alarming spread of drug resistance and the limited number of effective drugs currently available highlight the importance of finding new antimalarial compounds. Kayu Jawa is one of the traditional plants are efficacious as antimicrobials and allegedly efficacious as antiplasmodium. This research was conducted in an effort to find partition and the fractions hexane insoluble from Stembark extract of Kayu Jawa (Lannea coromandelica Houtt. Merr.) Which most effectively inhibited the development of Plasmodium falciparum in vitro. The procedure begins with the extraction of the maceration method using a methanol solvent, respectively with a solid liquid method partition using a n-hexane solvent. The result of the insoluble partition of n-hexane is fractionated by using eluent ethyl acetate : methanol. Test sample of Kayu Jawa Extract, n-hexane Partitioned Partition, N-hexane soluble partition, Fraction F1, Fraction F2, Fraction F3, Fraction F4, Fraction F5, Fraction F6, and also Fraction F7 respectively 100 ppm concentration were tested Plasmodium falciparum strain 3D7 is measured by percent of average resistance. From this study it was found that all test samples were able to inhibit the growth of Plasmodium falciparum with a percent inhibition value above 30%. Partition and Fraction which shows the highest percent inhibition is the hexane soluble partition with the value of percent inhibition  $89.50 \pm 0.77\%$  and Fraction F2 with a value of  $96.80 \pm 0.16\%$ . The identification of the class of compounds shows hexane-soluble particles containing alkaloids, Flavonoids and terpenoids. Fraction F2, has a group of compounds Alkaloid, Terpenoid, Flavonoid and Phenolic.*

**Keywords:** *Kayu Jawa Fractions, Partitions, Methanol extract, Antiplasmodium, Antimalaria, Plasmodium falciparum, Lannea coromandelica, in vitro*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hampir setengah populasi dunia, hidup di hampir 100 negara dan wilayah dengan risiko malaria (WHO, 2016). Berbagai kawasan di Afrika, Negara-negara di Amerika, bagian dari Mediterania, wilayah Pasifik Barat, bahkan berbagai negara dikawasan Asia Tenggara. Tercatat pada tahun 2015 lalu dibagian Afrika Barat 355 juta orang berisiko malaria dengan 297 juta berisiko tinggi. Dibagian Afrika Tengah 174 juta orang berisiko malaria dengan 161 juta berisiko tinggi. Dibagian Afrika Timur dan Selatan 319 juta orang berisiko malaria dengan 232 juta orang yang memiliki risiko tinggi. Dibeberapa negara Benua Amerika 132 juta orang berisiko malaria dengan 21 juta berisiko tinggi. Di kawasan Mediterania 291 juta orang berisiko malaria dengan 111 juta berisiko tinggi. Di kawasan Pasifik Barat sebanyak 740 juta orang berisiko malaria dengan 32 juta risiko tinggi malaria. Di kawasan Asia Tenggara sebanyak 1,4 miliar orang berisiko malaria dengan 237 berisiko tinggi (WHO, 2016).

Jumlah kasus malaria diperkirakan 262 juta pada tahun 2000 kemudian pada tahun 2015, diperkirakan sebanyak 214 juta kasus, sehingga kasus malaria masih tergolong kasus tinggi yang terjadi secara global. Sebagian besar kasus pada tahun 2015 diperkirakan telah terjadi di Wilayah Afrika sebanyak 88%, diikuti oleh wilayah Asia Tenggara sebanyak 10% dan Wilayah Mediterania Timur 2% (WHO, 2015). Tingkat kejadian malaria adalah 91 per 1000 orang yang berisiko, dengan perkiraan 214 juta insiden dan 438 ribu kematian serta lebih dari dua pertiga dari



kematian ini terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Sub-Sahara Afrika menanggung beban tertinggi dengan tingkat kejadian 246 per 1000 orang yang beresiko, terhitung sekitar 90% kasus kematian yang terjadi secara global terjadi di wilayah Sub Sahara Afrika (WHO, 2016).

Di kawasan Asia Selatan sampai Asia Timur perkiraan kasus malaria yang terjadi pada tahun 2015 adalah 89% di Negara India, 9% di Indonesia, dan 2% Negara lain. Pada tahun yang sama kasus malaria di Indonesia yaitu sebanyak 12.520.343 orang (WHO, 2016). Sebagian besar wilayah yang terjangkit malaria adalah kawasan indonesia bagian timur. Jika dilihat dari nilai *Annual parasite incidence* (API) yaitu jumlah positif terjangkit malaria per seribu dalam satu tahun, maka Papua menempati nilai tertinggi sebanyak 31,93, kemudian Papua barat sebanyak 31,29, diikuti NTT sebanyak 7,04, Maluku 5,81, serta kawasan lain yang nilai API <5 seperti Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, termasuk juga Sulawesi selatan (Pusdatin, 2016).

Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria ini terjadi diberbagai tempat di Indonesia. Berdasarkan persentase kasus malaria Indonesia dibagi menjadi empat kawasan, yaitu daerah endemis tinggi, endemis sedang, endemis rendah dan daerah bebas malaria. Persentase kawasan kasus malaria dari tahun 2011 ke 2015 adalah daerah endemis tinggi dari 17,4% menjadi 8,8%, daerah endemis sedang dari 18,6% menjadi 17%, serta daerah endemis rendah dari 42,8% menjadi 28,8%. Sedangkan daerah bebas malaria mengalami peningkatan dari 21,5% menjadi 45,4% (Kemenkes RI, 2016).

Faktor penyebab besarnya angka kematian malaria salah satunya adalah meningkatnya kasus resistensi parasit malaria terhadap obat-obat yang diandalkan pemerintah saat ini. Kegagalan pengobatan bahkan kematian dapat terjadi oleh resistensi plasmodium (WHO, 2016). Kasus resistensi Plasmodium terhadap obat-obat sintetik mendorong peneliti untuk berupaya menemukan antimalaria baru, salah satunya melalui eksplorasi senyawa aktif dari bahan alam berupa tanaman obat yang secara tradisional digunakan masyarakat untuk mengobati malaria diberbagai daerah endemik di dunia. Tumbuhan diciptakan dan memberikan manfaat yang baik bagi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Luqman ayat 10, tentang ciptaan Allah swt berupa tumbuhan-tumbuhan yang baik dan bermanfaat sebagai berikut:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ  
 أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ○

Terjemahan:

*“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik”* (Kementrian Agama RI, t.th).

Kayu jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) dalam masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan “tammate” merupakan tanaman yang biasanya dijadikan tanaman pagar, tanaman ini seringkali ditemukan dipinggir jalan, selain itu kayu jawa juga merupakan salah satu tanaman tradisional yang

digunakan masyarakat sebagai obat (Rahmadani, 2015). Bagian yang sering digunakan masyarakat dalam pengobatan adalah kulit batang. Kulit batang tanaman kayu jawa mengandung metabolit sekunder: Alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, flavonoid, dan glikosida jantung (Wahid, 2012).

Berdasarkan penelitian sebelumnya Senyawa yang memiliki aktifitas antiplasmodium adalah 5,7,2',5'',7'',4''-Heksahidroksiflavanon-[3,8'']-Flavon (Sara & Ersam, 2011); 13b-hidroksi-pheophorbide, Kaempferol, dan etil ester (Jansen, et al., 2017). Selain itu metabolit sekunder yang diduga memiliki efek antiplasmodium adalah alkaloid (Lusiana, 2009), tanin, dan steroid (Hayati, et al., 2012), serta terpenoid (Kusumaningrum, 2016). Hal inilah yang kemudian melatar belakangi dilakukan penelitian skrining partisi-partisi dan fraksi-fraksi tidak larut heksan yang aktif sebagai antiplasmodium secara *in vitro*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Partisi-partisi dan fraksi-fraksi tidak larut heksan dari ekstrak kulit batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) memiliki aktivitas sebagai antiplasmodium?
2. Manakah partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif menghambat perkembangan *Plasmodium falciparum* secara *in vitro*?

#### **C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup**

1. Defenisi operasional
  - a. Skrining adalah proses pencarian partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif sebagai antiplasmodium dari tanaman kayu jawa melalui uji aktivitas antiplasmodium dan uji golongan senyawa.

- b. Antiplasmodium merupakan kemampuan partisi-partisi dan fraksi-fraksi tidak larut heksan dari ekstrak metanol kulit batang kayu jawa dalam menghambat perkembangan *Plasmodium falciparum* secara *in vitro* yang dihitung berdasarkan nilai persentase penghambatan.
- c. Ekstrak adalah hasil ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol pada kulit batang kayu jawa.
- d. Kultur *Plasmodium falciparum* adalah biakan parasit uji yang diperoleh dari Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya.
- e. Kayu jawa adalah tumbuhan famili anacardiaceae dengan spesies *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. yang diperoleh dari Daerah Takalar.
- f. Partisi merupakan hasil pemisahan ekstrak yang larut heksan dan tidak larut heksan dari ekstrak kulit batang kayu jawa.
- g. Fraksi merupakan hasil fraksinasi partisi tidak larut heksan dengan menggunakan perbandingan pelarut etil asetat : metanol dari ekstrak metanol kulit batang kayu jawa.

## 2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi partisi dan fraksi tidak larut heksan yang diperoleh dari ekstrak metanol kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica* Houtt.) kemudian dilakukan uji antiplasmodium secara *in vitro* pada *Plasmodium falciparum* yang telah dikembang biakkan sebelumnya dalam medium.

### D. Kajian Pustaka

1. (Wahid, 2012). “*In-vitro Phytochemical and biological Investigation of plant Lannea coromandelica (Family: Anacardiaceae)*”. Thesis to Department of

Pharmacy, East West University. Bangladesh. Dalam penelitiannya mengemukakan kulit batang tanaman kayu jawa mengandung metabolit sekunder: Alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, flavonoid, dan glikosida jantung. Kemudian menuliskan Dari kulit batang dapat ditemukan  $\beta$ -sitosterol, physcion, dan physcion anthranol B. Dikemukakan ekstrak kulit batang kayu jawa memiliki potensi sebagai antioksidan, antimikroba pada berbagai jenis mikroba berupa bakteri maupun golongan fungi, serta memperlihatkan aktifitas trombolitik.

Dalam penelitian saya, dilakukan skrining terhadap kulit batang kayu jawa, diduga senyawa-senyawa dalam kulit batang kayu jawa selain berkhasiat sebagai antibakteri dan antimikroba, juga berkhasiat sebagai antiplasmodium. Untuk itu dilakukan pengujian antiplasmodium secara *in vitro* terhadap *Plasmodium falciparum* dan menemukan partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif.

2. (Kaur, et al., 2013), “*Protective effect of Lannea coromandelica Houtt. Merril. against three common pathogens*”. Menyatakan Ayurvedic menyarankan agar *Lannea coromandelica* digunakan pada berbagai kelainan asal mikroba seperti disentri, mata sakit dan kusta, luka kelamin. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui efek antimikroba *L. coromandelica* Houtt. Merril. Family Anacardiaceae pada mikroba yang menyebabkan infeksi saluran reproduksi wanita. Dengan ekstrak kulit alkohol air (Ext.) Dari *L. coromandelica* diputar melawan strain *Streptococcus pyogens*, *Staphylococcus aureus*, dan *Candida albicans*. Uji antimikroba telah

dilakukan dengan metode difusi agar-agar. Hasilnya Ekstrak etanol sebesar 100% (16 mg), 75% (12 mg) dan 50% (8 mg)] *L. coromandelica* menunjukkan zona penghambatan (ZI) 19,21 mm , 18,45 mm, 16,41 mm dan 18,12 mm, 17,35 mm, 16,35 mm terhadap *S. aureus* dan *S. pyogens*. Namun, hanya ekstrak etanol 100% dan 75% yang menunjukkan aktivitas (ZI-19,18 mm, 16,29 mm) terhadap *C. albicans*. Meskipun demikian, ekstrak air (100%) menunjukkan aktivitas antijamur yang lebih tinggi (ZI-16,97 mm). Ciprofloxacin dan amfoterisin B digunakan sebagai obat standar dalam penelitian ini. *L. coromandelica* Houtt. Merrill. Memiliki aktivitas antibakteri terhadap *S. pyogens*, *S. aureus* dan antijamur terhadap *C. albicans*. Hal ini menjadi kajian pustaka karena *L. coromandelica* efektif sebagai antimikroba dalam menghambat perkembangan bakteri dan jamur.

Dalam penelitian saya, kayu jawa yang sering digunakan masyarakat dalam pengobatan tradisional diduga senyawa-senyawa yang terkandung dalam kulit batang kayu jawa selain berkhasiat sebagai antimikroba, juga mampu berkhasiat sebagai antiplasmodium. Untuk itu dilakukan pengujian antiplasmodium secara *in vitro* terhadap *Plasmodium falciparum* dan menemukan partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif.

3. (Jansen, et al., 2017). “*Antiplasmodial activity of Mezoneuron benthamianum leaves and identification of its active constituents*”. Dalam penelitiannya menunjukkan penggunaan ekstrak daun *Mezoneuron benthamianum* dalam malaria. Senyawa aktif yang berpotensi antiplasmodial dan untuk digunakan sebagai penanda kualitas untuk standarisasi obat herbal ini dari apotek

tradisional Guinea. Ekstrak hidrolisis (70% v/v) daun *M. benthamianum* menunjukkan aktivitas *in vitro* sedang terhadap *P. falciparum* 3D7, dengan IC50 pada kisaran 22,5 - 32,6 µg/mL, lama penguapan etanol menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi (IC50 = 6,5µg/mL). Fraksinasi dilakukan pada fraksi yang paling aktif ini dan diikuti dengan uji antiplasmodial *in vitro*. Senyawa aktif yaitu senyawa etil ester, kaemferol, dan 13b-*hidroksi-pheoporbide* termasuk dalam beberapa kelas fitokimia, berkontribusi bersamaan dengan aktivitas antiplasmodial global ekstrak hidroksanolik terhadap parasit *P.falciparum*. Penelitian ini akhirnya memungkinkan isolasi tiga diterpen termasuk dua senyawa baru yang diberi nama Mezobenthamic acids A (1) dan B (2) dan neocaesalpin H (3), serta quercetin (4), kaempferol (7), resveratrol (6) Asam empedu (9) dan etilesternya (5), β-sitosterol glukosida (10) dan 13b-*hidroksi-pheophorbide* a (8).

Dalam penelitian saya, menggunakan kulit batang dari tanaman kayu jawa diduga kandungan senyawa yang terkandung dalam kulit batang kayu jawa memiliki khasiat sebagai antiplasmodium. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pengujian antiplasmodium secara *in vitro* terhadap *Plasmodium falciparum* dalam penemuan partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif.

4. (Sara & Ersam, 2011). “*Pengujian Aktivitas Antimalaria dan Insektisida Fraksi Etil Asetat dan Senyawa 5,7,2',5'',7'',4''-Heksahidroksiflavanon-[3,8'']-Flavon* dari Batang *Garcinia celebica* L”. Dalam penelitiannya menggunakan *Plasmodium falciparum* sebagai parasit uji, dan pengujian



secara *in vitro* menggunakan metode Desjardins *et al.*,. Aktivitas antimalaria dan insektisida fraksi etil asetat dan senyawa 5,7,2',5",7",4"-heksahidroksiflavanon-[3,8"]-flavon(1) dari batang spesies *Garcinia celebica* linn. DMSO digunakan sebagai kontrol dibuat menjadi lima konsentrasi (10; 1; 0,1; 0,01; 0,001)  $\mu\text{g/mL}$  dengan penambahan senyawa uji dan dibuat lima konsentrasi (100; 10; 1; 0,1; 0,0)  $\mu\text{g/mL}$  dengan penambahan fraksi uji. Aktivitas antimalaria kemudian ditentukan dengan menghitung banyaknya eritrosit yang terinfeksi parasit setiap 1000 eritrosit dan dianalisis dengan menggunakan probit SPSS 16.0 sehingga didapatkan nilai IC50. Uji aktivitas insektisida dilakukan terhadap larva instar III nyamuk *Aedes Aegypti*. Variasi konsentrasi senyawa uji adalah 400, 40, 4, dan 0.4  $\mu\text{g/mL}$  sedangkan variasi konsentrasi fraksi uji adalah 1000, 500, 250, 125, 62.5, dan 31.25  $\mu\text{g/mL}$ . Aktivitas insektisida ditentukan dengan menghitung % mortalitas yang terjadi selama pemaparan 24 jam sehingga didapatkan nilai LC50. Senyawa (1) menunjukkan IC50 sebesar 0,47  $\mu\text{g/mL}$  dan LC50 125,92  $\mu\text{g/mL}$  sedangkan fraksi etil asetat menunjukkan IC50 sebesar 0,027  $\mu\text{g/mL}$  dan LC50 691,67  $\mu\text{g/mL}$ . Penggunaan metode *in vitro* dan penggunaan kontrol serta analisis data yang didasarkan pada perhitungan IC50 merupakan bentuk kajian pustaka dalam penelitian ini, selain itu senyawa yang menghambat perkembangan *Plasmodium falciparum* disini adalah 5,7,2',5",7",4"-heksahidroksiflavanon-[3,8"]-flavon(1) yang dimana *Lannea coromandelica* memiliki senyawa yang sejenis yang dimaksudkan mampu sebagai antiplasmodium.

Dalam penelitian saya, menggunakan kulit batang dari tanaman kayu jawa. Diduga kandungan senyawa yang terkandung dalam kulit batang kayu jawa memiliki khasiat sebagai antiplasmodium, menggunakan satu konsentrasi dengan sepuluh macam sampel uji. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pengujian antiplasmodium secara *in vitro* terhadap *Plasmodium falciparum* dalam penemuan partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif.

5. (Syamsuddin, 2008). “*Penapisan Senyawa Antimalaria yang Berasal dari Tumbuhan*”. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengujian antimalaria secara *in vivo* dan *in vitro*, salah satu metode secara *in vitro* adalah metode *up take* 3H-hipoksantin. Metode yang dikembangkan oleh Desjardins *et al.*, 1979 dengan mengukur inkorporasi dari hipoksantin oleh parasit. Dijelaskan bahwa semua senyawa dinilai pada awalnya dalam satu atau lebih model utama. Senyawa yang dianggap aktif oleh kriteria mapan dalam tes skrining primer dipertimbangkan untuk evaluasi lebih lanjut dalam uji klinis yang lebih ketat secara berturut-turut. Pada akhir setiap tahap pengujian, sebuah keputusan diambil untuk memajukan senyawa ke tahap berikutnya atau untuk menghentikannya. Tes skrining primer harus memiliki sensitivitas optimal, tingkat reproduktivitas tinggi, *throughput* yang tinggi, harus memerlukan jumlah senyawa uji minimum dan menanggung biaya rendah. Karena ada kebutuhan yang meningkat untuk obat antimalaria yang lebih baru dan lebih manjur terutama di negara-negara tropis, dibutuhkan model skrining yang lebih sensitif dan ekonomis. Kajian ini merupakan update dari berbagai

metode skrining *in vitro* dan *in vivo* konvensional dan terbaru yang digunakan untuk evaluasi senyawa antimalaria.

Dalam penelitian saya, menggunakan salah satu metode secara *in vitro* yang ada dalam kajian pustaka ini. Upaya Penelusuran untuk menemukan antimalaria baru melalui eksplorasi senyawa aktif dari bahan alam berupa tanaman obat dalam hal ini kayu jawa yang secara tradisional digunakan masyarakat diduga berkhasiat sebagai antiplasmodium.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Partisi-partisi dan fraksi-fraksi tidak larut heksan dari ekstrak kulit batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) memiliki aktivitas sebagai antiplasmodium.
2. Mengetahui partisi dan fraksi tidak larut heksan yang paling aktif menghambat perkembangan *Plasmodium falciparum* secara *in vitro*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat daerah Sulawesi Selatan tentang pemanfaatan kayu jawa sebagai antiplasmodium dan dapat memberikan informasi secara ilmiah kepada para bidang kesehatan maupun para peneliti untuk dapat melakukan penemuan senyawa obat baru dari kulit batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) sebagai antiplasmodium.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Islam

Dalam firman Allah QS. Yunus/10: 57 yang selaras dengan ayat tersebut.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”* (Kementrian Agama RI, t.th).

Al-Qur’an telah menjadi obat lahiriyah dan batiniyah. Al-Qur’an menjadi obat lahiriyah dengan dibacakan kepada orang yang sakit jasadnya. Al-Qur’an menjadi obat batiniyah dengan seorang mempelajarinya, merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan dengan penuh keyakinan menjadikan jiwanya tenang. Syaikhul Islam Ibnul Qayyim -rahimahullahu- dalam kitabnya *Zadul Ma’ad*, berkata, “Al-Qur’an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufiq untuk menjadikannya sebagai obat (Al-Jauziah & Qayyim, t.th).

Sehingga, selain al-Qur’an sebagai penyembuh dan penawar terhadap penyakit dalam hal ini penyakit hati, manusia dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mencari, memahami dan mendapatkan obat dari penyakit selain penyakit hati yakni penyakit jasmani. Seiring perkembangan zaman, begitu

banyak perkembangan ilmu pengobatan dan teknologi pengobatan yang kini dapat memaksimalkan kesembuhan jasmani. Dari 'Abdu Rabbih bin Sa'iddari Abu AzZubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

Artinya: *«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدِّاءِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزِيزٍ وَجَلٍّ»*

*"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azzawajalla." (Muslim, t.th: 1729).*

Hadits tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia akan diturunkan obatnya oleh Allah swt. Setiap hari pakar spesialis menemukan obat bagi penyakit yang belum diketahui obatnya. Dapat diperhatikan bahwa ilmuwan terus berupaya menemukan obat bagi segala penyakit dengan satu keyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Meskipun mereka belum mengetahuinya sekarang, mereka merasa harus mengetahuinya kelak. Masalah ini menjadi aksioma dalam hati mereka. Dari semua itu, akan ditemukan bahwa tidak ada kesalahan sedikitpun pada sabda Rasulullah saw. melainkan yang ada hanyalah kebenaran dengan sebenar-benarnya (Hawwa, 2007).

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

*عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً*

*Artinya :*

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya (Muhsin, 2009).*


Semua Penyakit Ada Obatnya, penegasan dari hadist tersebut menunjukkan bahwa setiap penyakit yang ada didunia memiliki obatnya, Rasulullah saw. mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah swt. yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya (Muadzin, 2009). Sebagai salah satu ciptaan-Nya, yang dibekali akal dan fikiran untuk itu senantiasa ikhtiar dan tawakkal kepada-Nya, juga berupaya dalam menemukan dan mengemban tugas tersebut.

## **B. Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.)**

### 1. Klasifikasi Tumbuhan

Secara kedudukan dalam taksonomi tumbuhan Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) adalah sebagai berikut (Merrill, 1938) :

Regnum	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Subdivisi	: Magnoliopsida
Kelas	: Dicotyledoneae
Subkelas	: Diallypetalae
Ordo	: Sapindales
Family	: Anacardiaceae
Genus	: <i>Lannea</i> A. Rich
Spesies	: <i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.



Gambar 1. *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. (a) Daun (b) Batang  
(Koleksi pribadi. Diambil maret 2017)

## 2. Nama Lokal

Tammate (Sulawesi), kayu Cina, kayu Jawa, kedongdong laki (tangerang),  
Pohon Reo (flores).

## 3. Nama Luar

Bangladesh : Jiga, jigar, kasmala, ghadi, kocha; India: Mohin, Kiamil,  
jhingan; Nepal: Halonre, thulo dabdabe; Myanmar: Baing; Pakistan: Jailbhadi,  
jhingan, wodier; Indonesia: kayu Jawa, kayu cina (Wahid, 2012).

## 4. Uraian Tanaman

Kayu Jawa merupakan *deciduous tree* atau pohon gugur yang dapat tumbuh  
hingga mencapai 25 m (umumnya 10-15 m). Permukaan batang berwarna abu-abu  
sampai coklat tua, kasar, ada pengelupasan serpihan kecil yang tidak teratur, batang  
dalam berserat berwarna merah atau merah muda gelap, dan memiliki eksudat yang  
bergetah. Daun imparipinnate, meruncing, dan berjumlah 7-11. Bunga berkelamin  
tunggal berwarna hijau kekuningan. Buah berbiji, panjang 12 mm, bulat telur,










kemerahan, dan agak keras. Tanaman ini berbunga dan berbuah dari bulan Januari hingga Mei. *Lannea coromandelica* memiliki sinonim *Odina wodier* yang tersebar di Himalaya (Swat-Bhutan), Assam, Burma, Indo-China, Ceylon, Pulau Andaman, China, dan Malaysia (Reddy, et al., 2011).







Tanaman Kayu Jawa merupakan tanaman pekarangan yang dapat dimanfaatkan daun dan kulit batangnya dengan cara ditumbuk ataupun direbus untuk mengobati luka luar, luka dalam, dan perawatan paska persalinan (Rahayu, et al., 2006). Kulit batang dapat digunakan sebagai astringen, mengobati sakit perut, lepra, ulcer, penyakit jantung, disentri, dan sariawan. Kulit batang digunakan bersama dengan kulit batang *Aegle mermelos*, *Artocarpus heterophyllus* dan *Sygygium cumini* berguna dalam penyembuhan impotensi. Kulit batang dapat dikunyah selama 2-3 hari untuk menyembuhkan glossitis. Perebusan daun juga dianjurkan untuk pembengkakan dan nyeri lokal (Wahid, 2012).







## 5. Kandungan Kimia



Tabel 1. Kandungan Kimia dan Aktivitas Kulit Batang Kayu Jawa

No	Senyawa Kimia	Aktivitas	Referensi
1.	 <p>Quercetin</p>	Anti inflamasi, stimulan and astringen	(Division of Applied Bioscience; et al., 2000); (Reddy, et al., 2011); (Vikrant & M.L., 2011); (Xiao-juan, et al., 2014);
2.		Antiinflamasi	(Reddy, et al., 2011)

3.	<p style="text-align: center;">Isoquercetin</p>  <p style="text-align: center;">Physicion</p>	Antimikroba, trombolitik, dan antioksidan, Ulcers,	(Reddy, et al., 2011) (Wahid, 2012)
4.	 <p style="text-align: center;">Leucocyanidin</p>	Anti inflamasi, stimulan and astringen	(Reddy, et al., 2011) (Vikrant & M.L., 2011)
5.	 <p style="text-align: center;">Leucodelpidin</p>	-	(Reddy, et al., 2011)
6.	 <p style="text-align: center;">Morin</p>	-	(Reddy, et al., 2011)
7.	 <p style="text-align: center;">Kaempferol</p>	Antimikroba, Disentri, Diare	(Reddy, et al., 2011) (Division of Applied Bioscience; et al., 2000)

8.	 <p><math>\beta</math> - Sitosterol</p>	Antimikroba, Trombolitik, Antioksidan, Kanker, Ulcer	(Xiao-juan, et al., 2014) (Vikrant & M.L., 2011) (Reddy, et al., 2011) (Wahid, 2012)
9.	 <p>Asam Gallat</p>	Antioksidan	(Alam, et al., 2017) (Vikrant & M.L., 2011)
10.	 <p>Epigallocatecin</p>	Antioksidan, Stimulan	(Alam, et al., 2017) (Vikrant & M.L., 2011)
11.	 <p>Aralia Cerebroside</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
12.	 <p>5,5'-dibutoxy-2,2'-bifuran</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
13.	 <p><math>\beta</math>-sitosteryl-3<math>\beta</math>-glucopyranoside-6'- O-palmitat</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)

14.	 <p><math>\beta</math>-sitosterol palmitat</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
15.	 <p>Myricadiol</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
16.	 <p>Asam Protocatechuic</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
17.	 <p>(2R,3S)-(+)-3',5-dihydroxy-4',7-dimethoxy dihydroflavonol</p>	-	(Tofazzal & Satoshi, 2000)
18.	 <p>2R3R Dihydroflavonols A</p>	-	(Tofazzal & Satoshi, 2000)
19.	 <p>2R3R Dihydroflavonols B</p>	-	(Tofazzal & Satoshi, 2000)

20.	 <p>2R3R Dihydroflavonols C</p>	-	(Tofazzal & Satoshi, 2000)
21.	 <p>2R3R Dihydroflavonols D</p>	-	(Tofazzal & Satoshi, 2000)

Tabel 2. Aktifitas dan jenis ekstrak Kulit Batang kayu jawa

No.	Aktivitas	Jenis Ekstrak	Referensi
1.	Antioksidan dan Analgesik	Ekstrak Metanol	(Alam, et al., 2012)
2.	Antimikroba	Ekstrak Etanol, Ekstrak aseton	(Reddy, et al., 2011)
3.	Antagonisme Glukagon terhadap terapi DM Tipe 2 (T2DM), Penurunan kadar glukosa	Ekstrak Air	(Walunj, et al., 2015)
4.	Penyembuhan Luka	Ekstrak Etanol, Ekstrak Aseton	(Reddy, et al., 2011)
5.	Antiinflamasi	Ekstrak Etanol 96%	(Saputra, 2015)
6.	Penurunan Tekanan darah	Ekstrak Etanol	(Reddy, et al., 2011)
7.	Antihiperlikemik, Penurunan kadar glukosa	Ekstrak Metanol	(Mannan, et al., 2010)
8.	Antifungi	Ekstrak Etanol 96%	(Mozer, 2015)
9.	Antimikroba	Ekstrak Etanol dan Ekstrak Air	(Kaur, et al., 2013)
10.	Antibakteri	Ekstrak Etanol 96%	(Rahmadani, 2015)
11.	Induksi Apoptosis terhadap sel kanker HepG <sub>2</sub>	Ekstrak Kombinasi Etanol 50% dan air.	(Weerapreeyakul, et al., 2016)
12.	Antibakteri	Ekstrak Air, ekstrak kloroform dan ekstrak methanol.	(Venkatesan, et al., 2015)
13.	Antioksidan menggunakan sel RAW 264.7	Ekstrak Metanol	(Alam, et al., 2017)

14.	Hepatokprotektif dan Antioksidan	Ekstrak Kombinasi alcohol dan air	(Rao, et al., 2014)
-----	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

### C. *Fraksinasi*

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non-polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non-polar akan larut dalam pelarut yang non-polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, 2012).

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), kromatografi kolom (KK), *size-exclusion chromatography* (SEC), *solid-phase extraction* (SPE) (Mukhriani, 2014).

Kromatografi vakum cair merupakan modifikasi dari kromatografi kolom gravitasi. Metode ini lebih banyak digunakan untuk fraksinasi sampel dalam jumlah besar (10-50 gr). Kolom yang digunakan biasanya terbuat dari gelas dengan lapisan berpori pada bagian bawah. Ukuran kolom bervariasi tergantung ukurannya. Kolom

disambungkan dengan penampung eluen yang dihubungkan dengan pompa vakum. Pompa vakum akan menghisap eluen dalam kolom, sehingga proses pemisahan berlangsung lebih cepat. Penggunaan tekanan dimaksudkan agar laju aliran eluen meningkat sehingga meminimalkan terjadinya proses difusi karena ukuran silika gel yang biasanya digunakan pada lapisan kromatografi KLT sebagai fasa diam dalam kolom yang halus yaitu 200-400 mesh. Kolom yang digunakan berukuran lebih pendek dari pada kolom kromatografi gravitasi dengan diameter yang lebih besar (5-10 cm). Kolom KVC dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Sampel yang akan dipisahkan biasanya sudah diadsorbsikan ke dalam silika kasar terlebih dahulu (ukuran silika kasar 30-70 mesh) agar pemisahannya lebih teratur dan menghindari sampel langsung menerobos ke dinding kaca tanpa melewati adsorben terlebih dahulu, yang dapat berakibat gagalnya proses pemisahan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap yang sebelumnya sudah dimasukkan sampel. Kolom dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi, sehingga kromatografi cair vakum disebut juga kolom fraksinasi (Atun, 2014).

Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi adsorpsi. Senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang sama dengan jenis kromatografi lain yaitu berkaitan dengan perbedaan gaya-gaya antarmolekul dalam sampel dengan fase gerak dan antara komponen dengan fasa

diam. Prinsip kerja kromatografi kolom yaitu zat cair sebagai fasa gerak akan membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fasa diam sehingga terjadi interaksi berupa adsorpsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan bergerak suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar/lama komponen tersebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang diperoleh berupa fraksi-fraksi senyawa yang ditampung pada bagian bawah kolom (Rubiyanto, 2016).

*Air murni < metanol < etanol < propanol < aseton < etil asetat < dietil  
eter < kloroform < metilen klorida < benzena < toluena < trikloro etilen < karbon  
tetraklorid < sikloheksana < heksana*

Urutan pelarut-pelarut diatas menunjukkan bahwa semakin turun kepolarannya maka semakin bertambah kekuatan pelarut tersebut untuk mengelusi senyawa yang teradsorpsi oleh silika gel (Rubiyanto, 2016).

#### **D. Malaria**

##### **1. Pengertian**

Malaria merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya dapat menyebabkan kematian, terutama pada kelompok-kelompok yang mempunyai risiko tinggi seperti bayi, anak balita dan ibu hamil, serta kelompok usia produktif, sehingga secara langsung dapat menurunkan produktivitas kerja (Hasan, 2006)

Penyakit malaria adalah salah satu penyakit yang penularannya melalui gigitan nyamuk *anopheles* betina. Penyebab penyakit malaria adalah genus *plasmodia* family *plasmodiae*. Malaria adalah salah satu masalah kesehatan penting di dunia. Secara umum ada 4 jenis malaria, yaitu tropika, tertiana, ovale dan



quartana. Di dunia ada lebih dari 1 juta meninggal setiap tahun (Dirjen PP&PL, 2011).

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk (Dirjen PP&PL, 2008)

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit (protozoa) dari genus plasmodium, yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk *anopheles*. Penyebab malaria adalah plasmodium; termasuk dalam famili plasmodiae. Parasit ini menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Pembiasaan seksual plasmodium terjadi dalam tubuh nyamuk, yaitu *anopheles* betina. Selain menginfeksi manusia plasmodium juga menginfeksi binatang seperti golongan burung, reptil dan mamalia. Pada manusia, plasmodium menginfeksi sel darah merah dan mengalami pembiasaan aseksual di jaringan hati dan eritrosit (Dirjen BFKK, 2008).

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus Plasmodium yang dapat dengan mudah dikenali dari gejala meriang (panas, dingin dan menggigil) serta demam berkepanjangan. Penyakit ini menyerang manusia dan juga sering ditemukan pada hewan berupa burung, kera, dan primata lainnya (Ahmadi, 2008).

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit (Plasmodium) yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi (*vector borne disease*). Malaria pada manusia dapat disebabkan oleh *P. malariae*, *P. vivax*, dan *P. ovale*.

Pada tubuh manusia, parasit membelah diri dan bertambah banyak di dalam hati dan kemudian menginfeksi sel darah merah (Depkes RI, 2003).

Penyakit malaria juga dapat dikatakan sebagai penyakit yang muncul kembali (*reemerging disease*). Hal ini disebabkan oleh pemanasan global yang terjadi karena polusi akibat ulah manusia yang menghasilkan emisi dan gas rumah kaca, seperti CO<sub>2</sub>, CFC, CH<sub>3</sub>, NO, *Perfluoro Carbon* dan *Carbon Tetra Fluoride* yang menyebabkan atmosfer bumi memanas dan merusak lapisan ozon, sehingga radiasi matahari yang masuk ke bumi semakin banyak dan terjebak di lapisan bumi karena terhalang oleh rumah kaca, sehingga temperatur bumi kian memanas dan terjadilah pemanasan global (Soemirat, 2004).

Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh *protozoa obligat* intraseluler dari genus *Plasmodium sp.* Penyakit ini secara alami ditularkan oleh gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Penyakit malaria ini dapat menyerang siapa saja terutama penduduk yang tinggal di daerah dimana tempat tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk berkembang (Arsunan A, 2012).



Gambar 2. Nyamuk *Anopheles sp.* (Dirjen BFKK, 2008)

## 2. Etiologi

Spektrum Determinan Epidemiologi malaria sangat luas yaitu dari aspek faktor agen, riwayat alamiah malaria, faktor lingkungan, faktor pencegahan dan pengobatan, faktor rumah tangga, sosial ekonomi bahkan politik.

Infeksi malaria disebabkan oleh parasit (*Plasmodium sp.*) yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles sp.*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Parasit ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Parasit harus melewati siklus hidup pada tubuh nyamuk dan manusia sebelum ditularkan (Direktur PPBB, 2014).

Penyebab malaria adalah plasmodium; termasuk dalam famili plasmodiae. Parasit ini menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Pemiakan seksual plasmodium terjadi dalam tubuh nyamuk, yaitu

*anopheles* betina. Selain menginfeksi manusia plasmodium juga menginfeksi binatang seperti golongan burung, reptil dan mamalia. Pada manusia, plasmodium menginfeksi sel darah merah dan mengalami pembiakan aseksual di jaringan hati dan eritrosit (Dirjen BFKK, 2008)

Parasit malaria merupakan suatu protozoa darah yang termasuk dalam Phylum Apicomplexa, kelas Protozoa, subkelas *Coccidiida*, ordo *Eucudides*, sub ordo *haemosporidiidae*, famili *plasmodiidae*, genus plasmodium dengan spesies yang menginfeksi manusia adalah *P.vivax*, *P. malariae*, *P. ovale*. subgenus *Lavarania* dengan spesies yang menginfeksi malaria adalah *P. falcifarum*, serta subgenus *Vinkeia* yang tidak menginfeksi manusia (menginfeksi kelelawar, binatang pengerat dan lain-lain) (Yawan, 2006).

Morfologi plasmodium pada manusia di dalam darah memiliki sitoplasma dengan bentuk tidak teratur pada berbagai stadium pertumbuhan dan mengandung kromatin, pigmen serta granula. Pigmen malaria ialah suatu kompleks yang terdiri dari protein yang telah didenaturasi, yaitu hamozoin atau hamatin, suatu hasil metabolisme parasit dengan bahan-bahan dari eritrosit. Pigmen ini tidak ada pada parasit eksoerotositik yang terdapat dalam sel hati. Gametosit dapat dibedakan dari trophozoit tua karena sitoplasma lebih padat, tidak ada pembelahan kromatin dan pigmen yang tersebar dibagian tepi (Arsunan A, 2012)


Pada manusia plasmodium terdiri dari 4 spesies, yaitu *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. Akan tetapi jenis spesies *Plasmodium falciparum* merupakan penyebab infeksi berat bahkan dapat menimbulkan kematian (Dirjen BFKK, 2008).

- a. *Plasmodium falciparum*, plasmodium ini merupakan penyebab malaria tropika, secara klinik berat dan dapat menimbulkan komplikasi berupa malaria cerebral dan fatal. Masa inkubasi malaria tropika ini sekitar 12 hari, dengan gejala nyeri kepala, pegal linu, demam tidak begitu nyata, serta kadang dapat menimbulkan gagal ginjal (Achmadi, 2010).
- b. *Plasmodium vivax*, memiliki distribusi geografis terluas, mulai dari wilayah beriklim dingin, subtropik hingga daerah tropik. Demam terjadi setiap 48 jam atau setiap hari ketiga, pada siang atau sore. Masa inkubasi *Plasmodium vivax* antara 12 sampai 17 hari dan salah satu gejala adalah pembengkakan limpa atau splenomegali (Achmadi, 2010).
- c. *Plasmodium ovale*, masa inkubasi malaria dengan penyebab *Plasmodium ovale* adalah 12 sampai 17 hari, dengan gejala demam setiap 48 jam, relatif ringan dan sembuh sendiri (Achmadi, 2010).
- d. *Plasmodium malariae*, merupakan penyebab *malaria quartana* yang memberikan gejala demam setiap 72 jam. Malaria jenis ini umumnya terdapat pada daerah gunung, dataran rendah pada daerah tropik, biasanya berlangsung tanpa gejala, dan ditemukan secara tidak sengaja (Achmadi, 2010).

### 3. Siklus hidup malaria

Siklus hidup plasmodium mempunyai 2 hospes yaitu pada manusia dan nyamuk. Siklus aseksual yang berlangsung pada manusia disebut *skizogoni* dan siklus seksual yang membentuk *sporozoit* dalam nyamuk disebut *sporogoni*. (Soedarmo, et al., 2008).

Siklus hidup Plasmodium penyebab malaria dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Siklus Hidup Plasmodium (Direktur PPBB, 2014)

a. Siklus aseksual

Sporozoit infeksius dari kelenjar ludah nyamuk anoples betina dimasukkan ke dalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. Sporozoit itu akan masuk ke dalam parenkim hati akan menjadi skizon hati dan berkembang menjadi merozoit. Sel hati yang mengandung parasit pecah dan merozoit keluar dengan bebas. Siklus ini disebut siklus eksoeritrositer yang berlangsung selama lebih kurang dua minggu. Merozoit yang berasal dari skizon hati yang pecah akan masuk ke peredaran darah dan menginfeksi sel darah merah (stadium eritrositer), tampak sebagai kromatin kecil yang dikelilingi oleh sedikit sitoplasma yang mempunyai bentuk cincin disebut trophozoit. Trophozoit berkembang menjadi skizon muda, kemudian berkembang menjadi skizon matang dan membelah banyak menjadi

merozoit, pigmen dan sisa sel keluar memasuki plasma darah. Siklus eritositer ini yang menyebabkan timbulnya gejala malaria. Setelah 2 sampai 3 siklus skizogoni darah, sebagian merozoit yang menginfeksi sel darah merah akan membentuk stadium seksual (gametosit jantan dan betina) (Krogstad DJ, 2000).

#### b. Siklus seksual

Terjadi dalam tubuh nyamuk, parasit berkembang secara seksual (sporogoni). Sporogoni memerlukan waktu 8 sampai 12 hari. Makrogametosit dan mikrogametosit yang ada di lambung nyamuk berkembang menjadi makrogamet dan mikrogamet yang akan membentuk zigot yang disebut ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan membran basal dinding lambung. Di tempat ini ookinet membesar disebut ookista. Ookista membentuk ribuan sporozoit menembus kelenjar nyamuk dan bila nyamuk menusuk manusia maka sporozoit masuk kedalam darah. Siklus tersebut disebut masa tunas ekstrinsik (Krogstad DJ, 2000).

Tabel 3. Karakteristik morfologi *Plasmodium falciparum* (Prasetyanto, 2016)

Bentuk stadium	Keadaan eritrosit	Keadaan parasit
Ring	Normal, sering dijumpai lebih dari satu parasit dalam eritrosit.	Sitolasma halus, 1-2 titik kromatin kecil, bentuk bulat seperti cincin.
Trofozoit	Normal, jarang, tampak bercak Maurer (di bawah kondisi pewarnaan tertentu).	Jarang terlihat dalam darah perifer, itoplasma rapi, pigmen berwarna gelap.
Skizon	Normal, jarang, tampak bercak Maurer (di bawah kondisi pewarnaan tertentu).	Jarang terlihat dalam darah prifer, matang dengan 8-24 merozit kecil, pigmen berwarna gelap, menumpuk pada suatu bagian.
Gametosit	Berubah menyesuaikan bentuk parasit.	Seperti sosois atau bulan sabit, kromatin dalam bagian tunggal (makrogametosit) atau menyebar (mikrogametosit), bagian pigmen gelap.



#### 4. Masa Inkubasi Plasmodium

Masa inkubasi adalah rentang waktu sejak sporozoit masuk sampai timbulnya gejala klinis yang ditandai dengan demam. Masa inkubasi bervariasi tergantung spesies plasmodium. Masa prapaten adalah rentang waktu sejak sporozoit masuk ke tubuh manusia sampai parasit dapat dideteksi dalam sel darah merah dengan pemeriksaan mikroskopik (Dirjen PP&PL, 2008).

Tabel 4. Masa Inkubasi dan prapaten Malaria (Dirjen BFKK, 2008).

Jenis Plasmodium	Masa inkubasi (rata-rata)	Periode Prapaten
<i>Plasmodium falciparum</i>	9-14 hari (12)	11 hari
<i>Plasmodium vivax</i>	12-17 hari (15)	12.2 hari
<i>Plasmodium ovale</i>	16-18 hari (17)	12 hari
<i>Plasmodium malariae</i>	18-40 hari (28)	32.7 hari

#### E. Mekanisme Kerja Obat Antimalaria

Obat antimalaria dapat dikelompokkan menurut efek atau cara kerja obat pada parasit stadium eritrositik. Beberapa mekanisme kerja dan target dari obat malaria yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti pendahulu, antara lain (Simamora & Fitri, 2007):

##### 1. Gangguan pencernaan hemoglobin dalam lisosom vakuola makanan parasit.

Obat golongan aminokuinolin sangat esensial dalam mengganggu proses pencernaan hemoglobin oleh parasit dengan jalan mengadakan interaksi dengan *heme* atau menghambat pembentukan hemozoin. Target baru obat golongan ini adalah menghambat enzim *plasmepsin* dan enzim *falcipain* yang berperan dalam pemecahan *globin* menjadi asam-asam amino. *Hemozoin* dan asam-asam amino diperlukan untuk pertumbuhan parasit, sehingga jika pembentukan dihambat maka parasit akan mati (Winstanley, et al., 2004).



## 2. Gangguan pada jalur folat dalam sitoplasma parasit.

Obat antimalaria Sulfadoxine Pyrimethamine (SP) dan kombinasi baru chlorproguanil-dapsone (Lapdap) merupakan inhibitor kompetitif yang berperan dalam jalur folat (Winstanley, et al., 2004).

## 3. Pengantar proses alkilasi.

Generasi obat dari artemisinin menghasilkan radikal bebas yang berfungsi untuk mengalkilasi membran parasit (Winstanley, et al., 2004).

## 4. Fungsi mitokondria.

Mitokondria merupakan target obat baru yang potensial. Kerja *Atovaquone* melalui penghambatan reduktase *sitokrom C* menjadi dasar bersinergi dengan obat-obatan proguanil (Winstanley, et al., 2004).

## 5. Apikoplas.

Kerja obat antibiotik tetrasiklin di dalam apikoplast adalah dengan mengganggu translasi protein (Winstanley, et al., 2004).

Tabel 5. Target dan Komponen Aktif Antimalaria (Simamora & Fitri, 2007).

Lokasi Target	Jalur Mekanisme	Molekul Target	Terapi
Sitosol	Metabolisme folat	Dihidrofolat reduktase	Pirimetamin, Proguanil, Korproguanil
		Sintesis dihidropteroate	Sulfadoksin, Dapsone
		Sintesis timidilate	5flororotate
	Glikolisis	Dehidrogenase laktat	Derivat gossipol
Membran parasit	Sintesis fosfolipid	Kolin Transporter	G25
	Transport membran	Kanal Unique	Dinukleosida damar
Vakuola makanan	Polimerasi heme	Hemozoin	Kuinolon, Kuinolon baru
	Hidrolisis Hemoglobin	Plasmepsin	Inhibitor protease

		Falsipains	Inhibitor protease
	Pembentukan radikal bebas	-	Arthemisinin, Peroksida baru
Mitokondria	Transpor elektron	Cyt C Oksidareduktase	Atovakuonin
Apikoplas	Sintesis Protein	Apikoplas ribosom	Antibiotik
	Sintesis DNA	Girase DNA	Kuinolon
	Transkripsi	Polimerase RNA	Rifampin
	Biosintesis asam lemak Tipe II	FabH	Tiolaktomisin
		FabI	Triklosan
	Sintesis Isoprenoid	DOXP Reduktoisomerase	Fosmidomisin
Farnesilasi Protein	Famesil Transferase	Peptidomimetik	

## F. Mekanisme Kerja Obat dan Mekanisme Resistensi

### 1. Klorokuin

Efektifitas klorokuin terbatas pada saat parasit malaria berada dalam tahap eritrositik. klorokuin bekerja di dalam FV dari parasit. Degradasi hemoglobin pada FV menghasilkan heme sebagai produk. Pada parasit terdapat enzim yang penting diantaranya adalah *aspartic protease* dikenal dengan plasmepsin yang secara *in vitro* maupun *in vivo* berperan inisiasi degradasi hemoglobin (Liu, et al., 2005). Klorokuin bekerja dengan cara berikatan dengan cincin feriprotoporfirin IX suatu hematin hasil metabolisme hemoglobin didalam parasit. Ikatan feriprotoporfirin IX dari klorokuin ini bersifat melisiskan membran parasit sehingga mati. Konsentrasi sitotoksik dari klorokuin pada vakuola dapat menghambat pembentukan hemozoin pada eritrosit (Kublin, et al., 2003).

Penyebaran galur *P. falciparum* menyebabkan level resistensi parasit terhadap klorokuin menjadi tinggi, walaupun demikian sampai sekarang klorokuin

masih digunakan di beberapa tempat di dunia (Winstanley, et al., 2004). Diduga mekanisme resistensi terhadap klorokuin sama dengan obat antimalaria yang lain. Tekanan obat yang terus menerus menyebabkan parasit akan memasuki jalur metabolisme yang lain dan menyebabkan terjadinya mutasi. Dengan demikian parasit terhindar dari pengaruh obat. Hal inilah yang menyebabkan resistensi parasit terhadap obat antimalaria terjadi secara perlahan-lahan (Cowman, et al., 1994).

Resistensi parasit terhadap klorokuin pada manusia disebabkan adanya penurunan akumulasi obat pada pencernaan parasit di vakuola, terutama karena pH dikompartemennya berubah menjadi asam (Saliba, et al., 1998), galur *P. falciparum* yang sensitif dan yang resisten terhadap klorokuin dengan menggunakan *dextran linked pH sensitive fluorescent dyes*. Estimasi konsentrasi dan tekanan serta perubahan pada pencernaan di vakuola memiliki pH yang bervariasi berkisar antara 3.7-6.5. Ternyata konsentrasi dye pada pencernaan di vakuola rendah, yaitu pHnya berkisar antara 4.5-4.9, baik pada parasit yang resisten maupun yang sensitif terhadap klorokuin (Hayward, et al., 2006).

Resistensi *P. falciparum* terhadap klorokuin bersifat multigenik karena mutasi terjadi pada gen yang mengkode *Plasmodium falciparum chloroquine resistant transporter (pfcr1)* transporter pertama dan *Plasmodium falciparum multidrug resistant (pfmdr-1)* transporter kedua. Sejumlah laporan penelitian terbaru memprediksi bahwa resistensi parasit terhadap klorokuin terjadi karena adanya peningkatan pada *pfcr1* dan *pfmdr-1*. *Pfmdr-1* merupakan kontributor utama parasit menjadi resisten terhadap klorokuin (White, 2004).

## 2. Meflokuin

Meflokuin adalah obat antimalaria golongan 4-metanol kuinolin memiliki mekanisme kerja yang sama dengan kloroquin. Meflokuin bersifat skizontosida darah untuk ke 4 spesies Plasmodium manusia dan galur *P. falciparum* yang MDR, dosis yang dianjurkan adalah 15–29 mg/kgbb, peroral, dosis tunggal atau terbagi dalam 2 dosis tiap 12 jam. Obat ini tidak diberikan pada wanita hamil trimester pertama. Pengobatan dengan pemberian meflokuin pada penderita malaria *falciparum* dengan atau tanpa komplikasi menunjukkan bahwa meflokuin efektif dan aman (Winstanley, et al., 2004).

Resistensi *P. falciparum* terhadap meflokuin dan *arylaminoalkohol* terkait dengan amplifikasi (yaitu duplikasi, bukan mutasi) pada *Pfmdr* yang mengkode pompa glikoprotein (Pgh) dan membutuhkan energi (Saliba, et al., 1998). Faktor genetik yang beragam mempunyai konsekuensi terhadap berkurangnya konsentrasi intraseluler dari kuinolin. Dengan demikian pemberian antimalaria kuinolin dapat mempengaruhi penurunan kemampuan dari parasit untuk mendetoksifikasi heme yang dikeluarkan oleh hemoglobin (Winstanley, et al., 2004).


Analisis molekuler gen *pfmdr-1* yang diisolasi dari *P. falciparum*, 523a R dari Jepang, menunjukkan bahwa *pfmdr-1* mempunyai alela yang transgenik dari galur *P. falciparum* sehingga menyebabkan resisten terhadap meflokuin dan beberapa antimalaria lain. Pada analisis DNA urutan gen *pfmdr 1* yang bergabung pada galur alela intragenik resisten terhadap meflokuin. Ekspresi mRNA *pfmdr-1* yang berlebihan menyebabkan mekanisme resisten meflokuin menjadi 7,2 kali lebih tinggi (Kim, et al., 2001).

### 3. Obat-obat yang Mengganggu Jalur Folat Parasit

Resistensi *P. falciparum* dan *P. vivax*, terhadap antifolat (*pyrimethamin* dan *cycloguanil*) dihasilkan dari akuisisi sekuensial mutasi pada gen *dihydrofolate reduktase (dhfr)*. Mutasi juga menyebabkan terjadinya penurunan terhadap kerentanan. Resistensi parasit terhadap sulfonamida dan sulfone yang dikombinasikan dengan antifolate menghasilkan mutasi akuisisi sekuensial pada gen *dihydropteroate synthase (dhps)* yang mengkode enzim *sinthase dihidropteroate* (Plowe, 2003).

Reaksi yang ditimbulkan dari obat golongan antifolate sangat luas sehingga dapat mengganggu sintesa DNA melalui depleksi pada *tetrahydrofolate* dan merupakan kofaktor yang penting pada jalur folat. Ada dua jalur penting yang terkait, yaitu (Winstanley, et al., 2004):

- a. Sebagai kompetitif inhibitor pada enzim *dihydrofolate reduktase (DHFR)*. Kelompok tersebut antara lain *pyrimethamine* dan *biguanides proguanil* serta *chlorproguanil* (keduanya dibutuhkan pada biotransformasi untuk *triazines cycloguanil* dan *chlorcycloguanil* pada enzim *DHFR* (Winstanley, et al., 2004)
- b. Sebagai kompetitif inhibitor dari enzim *dihydropteroate synthase (DHPS)* menjadi enzim yang utama pada jalur folat (Winstanley, et al., 2004)



Gambar 4. Jalur Folat (Simamora & Fitri, 2007)

Inhibitor *DHFR* seperti proguanil mempunyai beberapa fungsi pada terapi, jika digunakan sendiri biasanya menjadi kemoprofilaksis, namun hal ini tidak terjadi pada inhibitor *DHPS*. Pada terapi malaria inhibitor *DHFR* dan *DHFS* dapat dikombinasikan secara bersinergi, misalnya seperti *Pyrimethamine* dan *sulfadoxine* (*SP*) dan *pyrimethamine-dapsone* (Simamora & Fitri, 2007).

Pirimetamin bekerja dengan menghambat enzim *DHFR* sehingga parasit tidak mampu membentuk asam tetrahidrofolat. Dengan demikian parasit tidak mampu melanjutkan siklus hidupnya, akhirnya difagosit. Pada parasit *P. falciparum* yang telah mengalami satu kali mutasi pada gen menyebabkan resistensi lebih cepat terjadi. Sulfadoxin bekerja berkompetisi dengan PABA (*para amino benzoic acid*) untuk mendapatkan enzim *dihydrofolate sintetase* (*dhfs*), sehingga pembentukan asam dihidrofolat terganggu. Dengan demikian asam folat yang diperlukan parasit

tidak terbentuk. Resistensi terhadap sulfadoxin karena parasit mampu menggunakan jalur lain sehingga terhindar dari pengaruh sulfadoksin (Kublin, et al., 2001).

Resistensi terhadap Inhibitor *DHFR* dihasilkan dari mutasi yang spesifik dari gen *dhfr* dalam *DHFR*. Mutasi pada *Ser-108* menjadi *Asn-108* merupakan mutasi pertama pada *pyrimethamine*. Mutasi subsekuen pada *Asn-51* menjadi *Ile-51* dan *Cys-59* menjadi *Arg-59* mempertinggi tingkat resistensi terhadap obat. Mutasi pada *Ile-164* menjadi *Leu-164* akan semakin melengkapi tingginya tingkat resistensi terhadap obat (Cortese, et al., 2002). Mutasi *dhfr-164* mempunyai frekuensi yang rendah pada isolat Tanzania. Mutasi gen *dhps* secara *in vitro* berhubungan dengan kemosensivitas pada sulfonamide. Parasit yang memiliki tingkat mutasinya dua kali akan menyebabkan resistensi yang lebih tinggi (Plowe, et al., 1997). Hal tersebut akan memicu terjadinya mutasi pada *dhps* yang lain, dan mengubah *ser-436* menjadi *Ala-613*. Pada mutasi tunggal dapat mempengaruhi *Ala-581*. Kombinasi mutasi pada *dhfr* dan *dhps* akan menyebabkan kegagalan pengobatan pada kasus klinis. Melalui uji coba pada urutan gen *pfdhfr* menunjukkan parasit yang resisten memiliki kemampuan menyebar menjadi luar biasa (Bousema, et al., 2003).

#### 4. Obat Antimalaria yang Bekerja sebagai Pengantar Proses Alkilasi (Qinghaosu Artemisinin)

Qinghaosu merupakan obat antimalaria golongan seskuiterpen lakton yang bersifat skizontosida darah untuk *P. falciparum* dan *P. vivax*. Obat ini merupakan obat tradisional Cina untuk penderita demam yang dibuat dari ekstrak tumbuhan

*Artemisia annua* (qinghao) yang sudah dipakai sejak ribuan tahun lalu. Qinghaosu tidak diberikan pada wanita hamil karena efek toksik Artemisinin termasuk ke dalam kelompok senyawa seskuiterpen lakton, bukan alkaloid atau amina seperti pada kuinin. Struktur molekul artemisin mengandung jembatan peroksida, diyakini ampuh pada kerja obat dan dapat menginduksi oksidatif stres. Obat artemisin diketahui bekerja secara spesifik pada tahap eritrositik (Simamora & Fitri, 2007).

Artemisinin mempunyai 4 derivat yaitu (Winstanley, et al., 2004):


- a. Artemisinin (tablet untuk peroral dan supositoria untuk perrektal)
- b. Artesunate (tablet untuk peroral dan bubuk kering yang dilarutkan dengan larutan NaHCO<sub>3</sub> 5% untuk pemberian in-travena atau intramuskular).
- c. Artemether (larutan minyak dalam kapsul untuk peroral dan dalam ampul untuk pemberian intramuskular)
- d. Arteether (dalam larutan ether untuk pemberian intramuskular) (Winstanley, et al., 2004).

Artemisinin digunakan untuk pengobatan malaria falciparum yang resisten terhadap klorokuin atau multidrug dan malaria berat atau dengan komplikasi karena efek obat yang sangat cepat namun toksisitasnya rendah. Dosis yang efektif masih terus diteliti. Tablet Artesunate telah diuji secara klinik pada penderita malaria falciparum tanpa komplikasi di daerah resisten multidrug dengan dosis 600 mg dalam 5 hari yaitu 100 mg tiap 12 jam pada hari 1, kemudian dilanjutkan 50 mg tiap 12 jam pada 4 hari berikutnya. Sampai dengan hari ke 14 angka kesembuhan mencapai 100% kemudian menjadi 75% pada hari ke 28, dengan waktu bebas panas dan waktu bebas parasit yang dibutuhkan adalah  $14,0 \pm 4,6$  jam dan  $32,0 \pm 5,9$  jam.



Tidak ditemukan efek samping secara klinis laboratoris (Meshnick, 2002). Parenteral intravena artesunat sedang diteliti pada penderita malaria berat dengan dosis 1,2 mg/kgbb, diberikan pada 0, 4, 24, dan 48 jam (3 hari) sehingga dosis total mencapai 240 – 300 mg (Giao, et al., 2001).

Struktur jembatan peroksida pada molekul artemisin diputus oleh ion  $\text{Fe}^{2+}$  (ion Fe ini) menjadi radikal bebas yang sangat reaktif. Radikal-radikal artemisin ini kemudian menghambat dan memodifikasi berbagai macam molekul dalam parasit, sehingga parasitnya mati. Seperti diketahui bahwa sumber ion  $\text{Fe}^{2+}$  intrasel adalah heme (komponen penting dalam hemoglobin). Oleh karena itu maka  $\text{Fe}^{2+}$  bertanggung jawab untuk mengaktifkan artemisin untuk membunuh parasit. Pada metabolisme parasit dalam sel darah merah, parasit memakan dan menghancurkan sampai 80 % sel hemoglobin inang pada FV. Selanjutnya akan melepaskan  $\text{Fe}^{2+}$  heme, lalu teroksidasi menjadi  $\text{Fe}^{3+}$  hematin, kemudian mengendap dalam FV membentuk kristal disebut hemozoin (Bousema, et al., 2003).



Gambar.5. Mekanisme Kerja Arthemisinin (Simamora & Fitri, 2007)

Komponen artemisin diaktivasi oleh heme atau molekul Fe untuk memproduksi radikal bebas dan elektrofilik (alkilasi) intermediet. Kemudian terjadi reaksi spesies yang reaktif diikuti kerusakan pada membran spesifik dari parasit malaria yang terhubung dengan protein (Bousema, et al., 2003).

Artemisinin dan dihidroartemisinin memiliki kemampuan untuk berakumulasi dengan eritrosit terinfeksi namun hubungannya dengan konsentrasi plasma di eritrosit belum diketahui (Simamora & Fitri, 2007). Target untuk artemisinin telah diketahui (PfATPase6), namun studi sebelumnya belum menghubungkan polimorfisme gen yang mengkode enzim ini apakah dapat menurunkan kerentanannya (Rath, et al., 2004).

Penggunaan artemisin yang dilabel dengan molekul pendar hijau menunjukkan bahwa molekul artemisin tersebar ke seluruh bagian sel parasit dan tidak terlokalisasi dalam FV. Jadi bukan seperti pada obat antimalaria klorokuin yang bekerja melalui pengikatan hem, aktivitas artemisinin tidak memerlukan hem (Rath, et al., 2004).

Artemisin bekerja melalui penghambatan enzim ATPase bergantung kalsium (PfATP6). PfATP6 mirip dengan ATPase mamalia *sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium* ATPase (*SERCA*) yang terletak dalam kompartemen intrasel terbungkus membran yang disebut retikulum endoplasma/sarco. Pada parasit, kompartemen ini tersebar luas dalam sitoplasma di luar FV parasit. Artemisin yang terbungkus di dalam gelembung membran diangkut dari sel darah merah ke dalam parasit. Setelah dalam parasit, artemisin diaktifkan

oleh ion  $Fe^{2+}$  atau proses-proses yang bergantung Fe lain dekat dengan PfATP6 dalam retikulum endoplasma (Price, et al., 2004).

5. Mekanisme kerja pada Artemisin Combine Therapy (ACT) dengan obat antimalaria lain

Arthemisin combine therapy (ACT) mempunyai banyak manfaat karena akan memperpanjang waktu resistensi dan mencegah terjadinya resistensi (Woodrow, et al., 2005). ACT juga dapat mengurangi resiko terjadinya pengulangan gejala klinis '*recrudescence*' (Gupta, et al., 2002).

Kombinasi artemisin dan meflokuin pada kasus klinis sangat relevan karena keduanya dapat bersinergi dengan baik pada rasio konsentrasi <40. Kombinasi meflokuin dan artemisin secara *in vitro* dan *in vivo* dapat bersinergi dengan baik dan sudah digunakan pada kasus klinis di Thailand dengan parasit yang MDR (Simamora & Fitri, 2007).

Pada pertengahan siklus hidup pendek, derivat semisintesis, dan derivat metabolit dihydroartemisinin dosis tunggal mengharuskan perawatan 5-7 hari atau lebih. Pengobatan dengan kombinasi dapat mengurangi waktu paruh obat yang panjang sehingga dapat mempercepat kesembuhan (Ridley, 2002). Derivat artemisin yang dikombinasikan dapat menurunkan perkembangan resistensi dari parasite (Simamora & Fitri, 2007). Di Thailand penggunaan kombinasi artesunat dengan meflokuin direkomendasikan karena dapat digunakan pada situasi epidemiologi yang berbeda (Ridley, 2002).

Secara universal pendekatan aplikabilitas dan kepraktisan menjadi perhatian secara penuh terutama di Africa. WHO melaporkan ada tiga masalah penting yang

muncul. Pertama mengapa penggunaan komponen kombinasi dari artemisin harus mempunyai waktu paruh yang lebih panjang? Kemungkinan penggunaan salah satu dari mitra kombinasi tersebut pada daerah yang luas dengan transmisi yang kuat tidak cocok, karena waktu paruh yang terlalu panjang, namun dengan penggunaan bersama derivat artemisin, parasit dapat dibersihkan dari sirkulasi lebih cepat sehingga perkembangan parasit kearah yang resisten dapat dihambat. Kedua pengobatan harus dapat menjangkau penderita yang miskin. Pengembangan komponen kombinasi yang dilakukan dengan campuran dua atau lebih bahan aktif dalam suatu tablet dapat mengurangi masalah ini. Ketiga relatif murah tetapi terstandart sebagai obat kombinasi. Meski murah oleh dari patokan-patokan internasional, derivat artemisinin tetap lebih mahal dibanding antimalarial tradisional seperti klorokuin dan sulphadoxine/pyrimethamine, namun tidak semua komponen obat selain artemisin yang dikombinasi potensial untuk melindungi parasit yang resisten (Rosenthal, 2003).

Sinergi pada terapi kombinasi dengan artemisin terjadi melalui beberapa factor yaitu heme atau heme polimerase pada FV merupakan target dari derivat kuinolin. Artemisin juga, bereaksi dengan heme di dalam FV dan juga kombinasi meflokuin dan artemisin dengan affinitas yang tinggi akan mengikat membran pospolipid (Simamora & Fitri, 2007). Dengan demikian kombinasi artemisin dan meflokuin akan berinteraksi dengan membran parasit lebih tinggi/meningkat (Woodrow, et al., 2005).

Kombinasi terapi yang lain dari kelompok kuinolin metanol yaitu kuinin dan meflokuin. Keduanya bersinergi aktif dengan artemisin, namun bukan untuk semua

komponen dari kuinolin metanol. Hal serupa ditemukan bahwa artemisin juga dapat bersinergi dengan komponen obat antimalaria dari kelompok 2 amino aril alkohol (Simamora & Fitri, 2007).

### **G. Teknik Pengujian Antiplasmodium Secara In Vitro**

Metode pengujian antimalaria atau antiplasmodium ada dua jenis yaitu pengujian antimalaria secara *in vivo* dan *in vitro*. Teknik pengujian antimalaria secara *in vitro* disajikan dengan beberapa metode (Syamsuddin, 2008).

Beberapa Metode telah dikembangkan untuk mengetahui pengaruh obat terhadap *P. falciparum* secara *in vitro*, antara lain Metode yang dikembangkan oleh Rieckmann. Dalam Metode ini sampel darah dari penderita ditambahkan ke dalam *microplate* yang mengandung obat dengan beberapa dosis (Rieckmann, et al., 1978). Kerugian dari teknik ini hanya dapat mengamati parasit di dalam stadium cincin yang bersirkulasi di dalam darah tepi, dan kesimpulan diambil dengan mengukur hambatan maturasi pada stadium *schizon* dari parasit (Syamsuddin, 2008).

Metode yang saat ini sering digunakan adalah yang dikembangkan oleh Desjardins et al., (1979) dengan mengukur inkorporasi dari hipoksantin oleh parasit (Desjardins, et al., 1979). Metode ini sangat cepat, sensitif, dan objektif. Metode lain adalah dengan mengidentifikasi produksi laktat dehidrogenase parasit sebagai indikator pertumbuhan parasit. Metode ini tidak memerlukan radioisotop dan dapat dipergunakan pada daerah endemik (Mackler, et al., 1993). Beberapa strain Plasmodium yang dapat dipergunakan untuk pengujian secara *in vitro* disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Strain *Plasmodium falciparum* Standar (Syamsuddin, 2008)

Nama	Asal Negara	Resisten terhadap
Dd2	Indochina	Klorokuin, kuinin, pirimetamin, sulfadoksin
W2	Indochina	Klorokuin, kuinin, pirimetamin, sulfadoksin
HB3	Honduras	Pirimetamin
3D7	Afrika Barat	-
D6	Sierra Leone	-
D10	Papua New Guinea	-
CAMP	Malaysia	Pirimetamin
FBC	Asia	Klorokuin, pirimetamin, sikloguanil
7G8	Brazil	Klorokuin, kuinin, sikloguanil
K1	Thailand	Klorokuin, pirimetamin

a. Media kultur

Kultur *Plasmodium falciparum* dibuat menurut Metode Trager dan Jensen, 1976. Kultur terdiri dari sel darah merah dan medium komplit sehingga hematokrit menjadi 2,5%. Kultur ini dibiakkan di dalam cawan Petri yang diletakkan dalam *candle jar*. *Candle jar* beserta isinya diinkubasi pada 37°C selama 24 jam. Medium komplit diganti setiap 24 jam (Trager & Jensen, 1976).

b. Pelarut.

Pelarut yang digunakan adalah etanol, air, atau DMSO (untuk senyawa yang tidak larut di dalam etanol). Senyawa yang diuji dilarutkan di dalam etanol absolut, lalu air steril ditambahkan sampai konsentrasi 1 mg/ml. Senyawa yang larut dalam air dilarutkan terlebih dahulu dengan air steril, kemudian diikuti dengan penambahan etanol dengan konsentrasi yang sama (Webster, et al., 1985).

Berikut ini adalah penjelasan mengenai teknik pengujian antimalaria secara *in vitro* (Syamsuddin, 2008).

a. Schizont maturation test

Pada prinsipnya adalah sebagai berikut: Ke dalam sumur mikro yang terdiri atas 96 sumur, 20  $\mu$ l suspensi 10% eritrosit dengan parasitemia 1,0% dan DMSO 0,1% dimasukkan ke dalam setiap sumur yang telah berisi medium RPMI dengan 10% serum dan 0,1% DMSO yang mengandung beberapa macam dosis senyawa yang diuji sehingga volume akhir 200  $\mu$ l setiap sumur. Kemudian, semua sumur yang telah terisi senyawa uji ditambah 20  $\mu$ l suspensi parasit dengan 10% eritrosit dengan parasitemia 1,0%. Lempeng sumur selanjutnya dimasukkan ke dalam *candle jar* dan diinkubasi selama 18-24 jam tergantung umur parasit pada awal inkubasi. Metode ini didasarkan pada bentuk cincin (trofozoit muda) yang setelah 24 jam akan berubah menjadi preschizon dan schizon. Evaluasi dilakukan setelah inkubasi selama 24 jam. Setelah inkubasi selama 24 atau 48 jam, lempeng sumur mikro dikeluarkan, suspensi bagian atas yang jernih dibuang, suspensi yang pekat dibuat sediaan apus darah, sediaan dikeringkan pada suhu kamar, kemudian diwarnai dengan larutan Giemsa (Wernsdorfer & Payne, 1988).

b. Metode up take 3H-hipoksantin

Metode yang dikembangkan oleh Desjardins et al., 1979 dengan mengukur inkorporasi dari hipoksantin oleh parasit. Pertumbuhan parasit diamati dari pemakaian isotop hipoksantin oleh metabolisme parasit yang tumbuh di dalam kultur. Dengan mengetahui jumlah penggunaan isotop oleh parasit, akan diketahui besarnya pertumbuhan parasit di dalam kultur. Setelah kultur diinkubasi 60 jam dan pertumbuhan kultur sehat serta tidak terkontaminasi, ditambahkan 50 ml campuran RPMI dan serum yang mengandung isotop sebesar 0,25  $\mu$ Ci. Kultur dalam sumuran dicampur agar homogen, kemudian dimasukkan ke dalam *candle jar* untuk

dikultur lagi selama 12 jam pada 37°C sehingga didapatkan masa inkubasi 72 jam. Selanjutnya, parasit dipanen menggunakan pemanenan sel semi-otomatik. Inkorporasi dari radiolabel ditentukan dengan Liquid Scintillation Analyzer. Data dari Metode schizont maturation test dan up take 3H-hipoksantin dianalisis dengan mengukur persentase penghambatan pertumbuhan parasit. Konsentrasi penghambatan 50% (IC50) senyawa uji ditetapkan dengan analisis probit, berdasarkan hubungan log kadar senyawa uji dengan % penghambatan pertumbuhan parasit (Desjardins, et al., 1979).


#### c. Metode pLDH

Metode ini dikembangkan oleh Mackler dkk. dengan mengukur kadar laktat dehidrogenase plasmodium (pLDH). pLDH adalah enzim glikolitik yang diekspresikan dengan kadar tinggi pada stadium aseksual parasit malaria. LDH dapat diukur dengan menggunakan substrat 3-asetilpiridin adenin dinukleotida (APAD), yang merupakan analog dari NAD. pLDH dapat digunakan untuk mengukur antigen malaria yang berbeda dan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi dari beberapa spesies Plasmodium (Webster, et al., 1985).

Prinsip pengukurannya adalah sebagai berikut: Sepuluh mikroliter dari tiap kultur dimasukkan ke dalam 96 sumuran yang mengandung 100 µl reagent. Lempeng ini ditempatkan ke dalam pembaca ELISA dan penurunan APAD diikuti secara kinetik pada panjang gelombang 365 nm selama 10 menit (koefisien ekstingsi APADH adalah 366nm) (Iqbal, et al., 2001). Pada titik akhir setiap sumuran diberikan 20 µl campuran nitrosoluble tetrazolium dan garam fenasetin etosulfat dengan perbandingan 20:1. Penurunan tetrazolium menjadi garam



formazan biru diikuti selama 10 menit pada panjang gelombang 650 nm (K650 nm). Pada akhirnya, terbentuknya formazan biru dievaluasi setelah penambahan 30  $\mu$ l 2NH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Interpretasi pertumbuhan parasit dilakukan secara evaluasi visual melalui penurunan warna setelah 60 menit inkubasi. Reaksi warna dihentikan dengan penambahan 5% asam asetat. Data melalui Metode pLDH ini dianalisis dengan Metode Log-Logit menggunakan Softmax<sup>TM</sup> Software (Molecular Devices) dengan ekstrapolasi langsung data titrasi ke dalam % penghambatan pertumbuhan (IC<sub>50</sub>) (Mackler, et al., 1993).



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu berdasarkan pada analisis kuantitatif eksperimen terhadap uji penghambatan perkembangan plasmodium penyebab malaria oleh partisi dan fraksi tidak larut heksan yang aktif terhadap plasmodium dari ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Malaria di Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada 20 April 2017 - 7 Juli 2017.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan bentuk *True Eksperiment* dengan desain penelitian *Posttest Only Control Design*.

#### **D. Bahan dan Peralatan**

##### **1. Bahan Tanaman**

Bahan tumbuhan kayu jawa (*Lannea coromandelica*) yang diperoleh dari Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

## 2. Bahan Uji

Bahan-bahan lain yang digunakan adalah Kapas, Kertas saring, Lempeng KLT GF254, Pelarut Etil asetat, Pelarut Metanol, Pelarut n-Heksan, Silika Gel G60<sub>F254</sub>, Pereaksi Dragendorf, Pereaksi Wagner, Pereaksi Mayer, Pereaksi FeCl<sub>3</sub>, Pereaksi AlCl<sub>3</sub>, Peraksi *Lieberman-Bouchard*, parasit *Plasmodium falciparum* (Strain 3D7), HEPES, RPMI 1640 (*Rosewell Parla Memorial Institute*), Natrium bikarbonat (NaHCO<sub>3</sub>), Hiposantin, gentamisin, aquademineralisasi (aqua DM), serum darah manusia (PMI, Surabaya), natrium klorida (NaCl), dimetilsulfoksida (DMSO), minyak *immerse*, dan pewarna Giemsa 20%.

## 3. Peralatan

Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik, Lemari pengering, alat untuk ekstraksi seperti gelas erlenmeyer, Corong Kaca, Sentrifuge, Tabung *Sentrifuge*, *Vacum rotary evaporator*, Sendok Ekstrak, Pipa kapiler, Kromatografi Cair Vakum, *Chamber*.

Alat yang digunakan pada penelitian antimalaria antara lain tabung *ependorf*, *laminer air flow*, lemari pendingin, *candle jar*, *sentrifuge*, tabung *sentrifuge*, botol scot, labu erlenmeyer steril, kertas saring berukuran pori 0,22 µm, kaca preparat, inkubator CO<sub>2</sub>, pipet pasteur, mikropipet, pipet volume, cawan petri, termometer, *plat well 24*, mikroskop dan tabung reaksi.

## E. Prosedur Kerja

### 1. Penyiapan sampel

#### a. Pengambilan sampel

Sampel berupa kulit batang tanaman kayu jawa *Lannea coromandelica* yang diambil pada pagi hari pukul 9.00 pada bagian batang utama dengan ukuran tertentu diambil tidak secara melingkar.

#### b. Pengolahan Sampel

Sampel kulit batang tumbuhan *Lannea coromandelica* dicuci dengan air mengalir dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dalam lemari pengering.

### 2. Ekstraksi Sampel

Cara kerja dengan metode ini dimulai dengan kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dipotong kecil-kecil, sebanyak 2000 gram dan dimasukkan ke dalam 5 toples masing-masing 400 gram, sampel dibasahi dan direndam menggunakan pelarut Metanol, dan ditutup menggunakan aluminium foil dan dengan penutup toples. Dibiarkan sampel terendam selama  $\pm 3 \times 24$  jam, lalu dilakukan proses penyarian setelah  $\pm 3 \times 24$  jam menggunakan kertas saring dan corong yang telah disumbat kapas, dilakukan proses remaserasi sampel yang telah disaring, kemudian ditampung hasil maserasi. Lalu diuapkan dengan menggunakan alat *rotary evaporator*.

### 3. Partisi Cair Padat

Partisi dilakukan dengan metode cair padat dengan cara ditimbang ekstrak metanol sebanyak 20,514 gram, dimasukkan ke dalam lumpang, dilarutkan dengan n-heksan dan digerus lalu disentrifugasi hasil gerusan yang diperoleh dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Dipisahkan antara ekstrak larut n-heksan

dengan ekstrak tidak larut n-heksan kemudian dilakukan berulang hingga larutan n-heksan yang diperoleh jernih.

#### 4. Penentuan Eluen

Eluen ditentukan dengan berdasarkan profil KLT yang diperoleh dari metode Kromatografi Lapis Tipis, Partisi larut n-Heksan dilarutkan dengan n-Heksan, dan partisi tidak larut n-Heksan dilarutkan dengan metanol. Kemudian dielusi dengan menggunakan perbandingan eluen tertentu dari tingkat kepolaran terendah dan terus meningkat. Kemudian diamati penampakan noda dibawah lampu UV 254 nm dan 366 nm serta penampakan noda pada H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dengan cara disemprotkan asam sulfat 10% pada lempeng kemudian dipanaskan dalam oven hingga noda terbentuk. Pemilihan eluen didasarkan pada kepolaran dan prinsip *Like Dissolves Like*.

#### 5. Fraksinasi

##### a. Kromatografi Cair Vakum

Kromatografi Cair Vakum (KCV) dilakukan dengan cara ditimbang silika sebanyak 60 gram, lalu ditimbang ekstrak kayu jawa (*Lannea coromandelica*) yang tidak larut n-hexan sebanyak 5 gram. Digerus ekstrak 5 gram dengan silika 5-10 gram, dan dimasukkan silika 50 gram ke dalam center glass sambil dimampatkan dalam keadaan pompa vakum aktif. Dimasukkan ekstrak ditambah silika ke dalam center glass dan dimampatkan. Dilapisi dengan kertas saring pada bagian atas, kemudian dihubungkan dengan pompa vakum. Setelah itu ditambahkan pelarut atau eluen sebanyak 120 ml dengan perbandingan tertentu, lalu ditampung dalam mangkuk, 1 mangkuk untuk 1 perbandingan eluen, kemudian diuapkan.

#### b. Penggabungan Fraksi

Diperoleh fraksi hasil dari kromatografi cair vakum, dilarutkan lalu ditotol pada lempeng fraksi yang diperoleh, kemudian dielusi menggunakan eluen yang sesuai. Setelah itu diamati dibawah lampu UV 366 nm dan 254 nm, dan didapatkan fraksi terbaik. Digabungkan fraksi yang memiliki noda yang hampir sama atau sama.

### 6. Penentuan Golongan Senyawa

#### a. Uji alkaloid

Ekstrak sebanyak 5 mg digerus dengan penambahan kloroform hingga larut. Ditambahkan 0,5 mL asam sulfat 1 M, kemudian dikocok perlahan. Didiamkan beberapa saat sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas yang jernih dibagi dua, 1 bagian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendorff dan bagian berikutnya ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Mayer. Endapan merah bata yang terbentuk oleh pereaksi Dragendorff dan endapan putih oleh pereaksi Mayer menunjukkan adanya senyawa alkaloid.

#### b. Uji Flavonoid

Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dalam 5 mL air panas, didihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat yang didapat lalu ditambah bubuk Magnesium secukupnya, 1 ml asam sulfat pekat dan 2 mL etanol. Dikocok kuat dan biarkan terpisah. Terbentuknya warna merah, kuning atau jingga pada lapisan etanol menunjukkan adanya senyawa flavonoid.

c. Uji Terpenoid

Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dalam kloroform dan disaring. Kemudian filtrat ditambahkan beberapa tetes reagent *Lieberman Bouchard*. Terbentuknya warna coklat mengindikasikan adanya senyawa terpenoid.

d. Uji Fenolik

Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl<sub>3</sub>. Terbentuknya warna hitam kebiruan mengindikasikan adanya senyawa fenol.

**F. *Prosedur Uji Aktivitas Antiplasmodium Secara In Vitro***

Uji aktivitas antiplasmodium dilakukan dengan menggunakan metode Desjardins (1979), juga metode yang dikembangkan *Institut of Tropical Disease* atau Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

**1. Pembuatan Medium Tidak Lengkap (*Incomplete Medium*)**

Medium tidak lengkap dibuat dengan mencampurkan 10,4 gram RPMI-1640, 5,96 gram HEPES, 2,1 gram natrium bikarbonat, 0,05 gram hiposantin dan 0,5 mL gentamisin, lalu ditambahkan aqua DM sampai volume 1000 mL. Larutan disaring dengan kertas saring berukuran pori 0,22 µm, dimasukkan ke dalam botol scot, disimpan pada suhu 4°C. Medium ini diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37°C dan pH 7,3 – 7,4 sebelum digunakan.

**2. Persiapan Medium Lengkap**

Medium lengkap adalah medium yang mengandung 10% serum manusia. Serum manusia ini berasal dari darah manusia yang diperoleh langsung dari PMI

Surabaya. Medium lengkap dibuat dengan mencampur medium tidak lengkap sebanyak 90 mL dengan serum darah manusia 10 mL.

### **3. Pembiakan Kultur Parasit *Plasmodium falcifarum***

Prosedur biakan dibuat berdasarkan metode Trager dan Jensen (1976). Proses pembiakan kultur parasit *P. falcifarum* yaitu: Tabung yang berisi parasit beku dicairkan hingga suhu 37°C dan ditambahkan natrium klorida 3,5% kemudian dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge. Kultur *disentrifuge* dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit pada suhu 4°C dan supernatan dibuang. Endapan disuspensikan dengan 5 mL medium tidak lengkap, kemudian *disentrifuge* dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit pada suhu 4°C dan supernatan dibuang. Langkah ini diulang sebanyak 3 kali. Endapan ditambahkan 4,5 mL medium lengkap dan 0,5 mL eritrosit 50% dicampur secara perlahan. Kultur dipindahkan ke cawan petri dan dimasukkan ke dalam *candle jar* dan disimpan dalam inkubator CO<sub>2</sub> pada suhu 37°C

### **4. Pengamatan Pertumbuhan *Plasmodium falcifarum***

Pembuatan Sediaan Hapusan Darah Tipis. Diteteskan kurang lebih 1 tetes suspensi sel parasit pada gelas objek, lalu dengan bantuan satu sisi cover glass, suspensi sel parasit tersebut diratakan. Kemudian dibiarkan di udara terbuka hingga kering. Dilakukan fiksasi hapusan darah tipis tersebut dalam metanol absolut, kemudian diletakkan dalam udara terbuka hingga metanol kering. Pewarna Giemsa 20% dalam aquadest diteteskan pada hapusan darah tipis hingga menutupi seluruh permukaan hapusan darah, kemudian dibiarkan selama 20 menit lalu dicuci dengan air dan dibiarkan di udara terbuka hingga kering. Setelah sediaan



kering, hapusan diperiksa dengan mikroskop pada perbesaran 10 x 100 untuk menghitung parasitemia.

## 5. Prosedur pengujian

### a. Preparasi Suspensi Sel Parasit Uji

Kadar parasitemia awal tiap well pada pengujian aktivitas antimalaria secara in vitro adalah 1% parasitemia dan 5% hematokrit. Dalam 1 plate terdapat 24 well. Seluruh suspensi dalam petri ( $\pm 5$  mL) dimasukkan tabung falcon steril bertutup 15 mL kemudian disentrifugasi 1500 rpm selama 5 menit. Sebanyak 4,5 mL supernatan dibuang sehingga diperkirakan terdapat 5% sel darah merah terinfeksi parasit dan 50% hematokrit dengan jumlah total  $\pm 1000 \mu\text{L}$ . Dibuat suspensi sel parasit agar kandungan parasitemia menjadi 1% dan hematokrit menjadi 5%, dengan menambahkan larutan RBC 50% sebanyak 2000  $\mu\text{L}$  ke dalam tabung, kemudian ditambahkan larutan media lengkap sebanyak 10,0 mL, kemudian suspensi tersebut dicampur dengan hati-hati menggunakan mikropipet hingga tercampur rata. Sebelum dimasukkan ke dalam microwell, dibuat hapusan darah tipis sebagai Do, yaitu kadar parasitemia awal pada jam ke-0 sebelum diberi zat uji. Dimasukkan sebanyak 500  $\mu\text{L}$  suspensi sel parasit ke dalam masing-masing well yang sudah berisi 500  $\mu\text{L}$  larutan uji. Volume suspensi sel dibuat cukup untuk 24 well.

### b. Preparasi Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekstrak Kayu Jawa, Partisi tidak larut n-heksan, Partisi larut n-heksan, Fraksi F1, Fraksi F2, Fraksi F3,

Fraksi F4, Fraksi F5, Fraksi F6, dan Fraksi F7. Masing-masing sampel dibuat dengan konsentrasi 100 ppm. Prosedur preparasi sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing sampel ditimbang sejumlah 10 mg, lalu dilarutkan dalam 100  $\mu\text{L}$  DMSO (dimetil sulfoksida) (100000  $\mu\text{g}/\text{mL}$ )
- 2) Larutan induk sampel 100000  $\mu\text{g}/\text{mL}$  dipipet sebanyak 10  $\mu\text{L}$ , kemudian ditambah 490  $\mu\text{L}$  media lengkap (2000  $\mu\text{g}/\text{mL}$ )
- 3) Larutan induk sampel 2000  $\mu\text{g}/\text{mL}$  dipipet sebanyak 120  $\mu\text{L}$  dan dimasukkan ke dalam microwell. Kemudian ditambahkan 1080  $\mu\text{L}$  media lengkap (200  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ). Selanjutnya dilakukan duplikasi dengan cara memipet 500  $\mu\text{L}$  larutan 200  $\mu\text{g}/\text{mL}$  tersebut, lalu dimasukkan ke well di bawahnya dan masing-masing well skemudian ditambah 500  $\mu\text{L}$  suspensi parasit. Selanjutnya larutan tersebut disebut dengan U1 (100  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ).

#### **6. Pembuatan Larutan Kontrol Negatif dan Kontrol Positif**

Kontrol negatif dibuat dari larutan tanpa sampel diambil sebanyak 490  $\mu\text{L}$  dan DMSO 10  $\mu\text{L}$ , homogenkan. Kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing microwell dan dilakukan replikasi. Kemudian ditambahkan 500  $\mu\text{L}$  suspensi parasit tiap well. Larutan ini selanjutnya disebut dengan K(-).

Kontrol positif dibuat dari obat klorokuin pada media dengan bahan uji dan pelarut (DMSO) dengan konsentrasi 0,5% sebanyak 500  $\mu\text{L}$  dalam pelarut aqua DM dan dibuat duplo.

## 7. Preparasi Plat Well 24

Uji aktivitas antiplasmodium pada penelitian ini dilakukan dalam *microwell plate disposable* yang steril. Microwell terdiri dari 24 well dengan 6 baris (A-F) dan 4 kolom (1-4) yang diberi larutan uji dan kontrol negatif.

Tabel 7. Model Plat Well 24 (Sara & Ersam, 2011)

Kode	1	2	3	4
A	○	○	○	○
B	○	○	○	○
C	○	○	○	○
D	○	○	○	○
E	○	○	○	○
F	○	○	○	○

Keterangan:

Kontrol Negatif (K(-)) = Kolom A Baris 1-2

Kontrol Positif (K(+)) = Kolom A Baris 3-4

Fraksi F1 (F1) = Kolom C Baris 1-2

Fraksi F2 (F2) = Kolom B Baris 1-2

Fraksi F3 (F3) = Kolom F Baris 3-4

Fraksi F4 (F4) = Kolom E Baris 3-4

Fraksi F5 (F5) = Kolom D Baris 3-4

Fraksi F6 (F6) = Kolom C Baris 3-4

Fraksi F7 (F7) = Kolom B Baris 3-4

Partisi Larut n-heksan = Kolom D Baris 1-2

Partisi Tidak Larut n-heksan = Kolom E Baris 1-2

Ekstrak kayu Jawa = Kolom F Baris 1-2

Microwell yang telah diisi larutan uji dan suspensi parasit selanjutnya dimasukkan dalam *candle jar* dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C.

### G. Analisis Data Penelitian

Setelah diinkubasi selama 48 jam, kultur dipanen dan dibuat hapusan darah tipis pada kaca preparat lalu difiksasi dengan metanol. Setelah kering diberi pewarna Giemsa 20%. Kemudian dibiarkan selama 15 menit, dialiri dengan aqua DM dan dikeringkan. Minyak *immerse* diteteskan pada daerah yang monolayer (hapusan yang tipis) untuk memudahkan pengamatan pada mikroskop dengan perbesaran 1000x. Hitung % parasitemia dan % penghambatan pertumbuhan parasit dengan menghitung jumlah eritrosit yang terinfeksi setiap 1000 eritrosit di bawah mikroskop sebagai berikut:

$$\text{a. \% Parasitemia} = \frac{\Sigma \text{eritrosit yang terinfeksi}}{1000 \text{ eritrosit}} \times 100\%$$

$$\text{b. \% Pertumbuhan} = \% \text{ Parasitemia parasit (48 jam - 0 jam)}$$

$$\text{c. \% Penghambatan} = 100\% - \frac{X_p}{X_k} \times 100\%$$

Dimana :  $X_p$  = parasitemia uji

$X_k$  = parasitemia kontrol (-)

$$\text{d. \% Hambatan rata-rata} = \frac{\% \text{ hambatan } ((1)+(2))}{2}$$

Selanjutnya data diolah dalam bentuk tabel pengamatan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

##### 1. Ekstraksi Sampel

Kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) sebanyak 2000 gram diekstraksi menggunakan metode maserasi. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan pelarut metanol 12000 ml sebanyak 96,247 gram.

Tabel 8. Berat Ekstrak Metanol kulit batang kayu jawa

No.	Sampel	Berat sampel	Pelarut	Berat Ekstrak
1.	Kulit Batang Kayu Jawa	2000 gram	Metanol	96,247 gr

##### 2. Partisi Padat – Cair

Ekstrak metanol kulit batang kayu jawa dipartisi menggunakan metode cair padat dengan pelarut n-heksan sebanyak 1700 ml. Hasil partisi yang larut heksan sebanyak 4,38 gram, sedangkan yang tidak larut heksan sebanyak 16,13 gram.

Tabel 9. Berat Partisi Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa

No.	Partisi	Berat (gr)
1.	Partisi Larut Heksan	4,38 gr
2.	Partisi Tidak Larut Heksan	16,13 gr

##### 3. Penentuan Eluen

Eluen yang didapatkan adalah dengan perbandingan pelarut etil asetat : metanol (10:1), ditentukan berdasarkan profil Kromatografi Lapis Tipis.

##### 4. Fraksinasi

Fraksinasi ekstrak metanol tidak larut heksan kulit batang kayu jawa dengan metode kromatografi cair vakum menggunakan campuran perbandingan eluen hasil profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan hasil KCV, diperoleh 16

hasil fraksi, yang kemudian dielusi dengan campuran eluen etil asetat : metanol untuk ekstrak tidak larut heksan sehingga diperoleh 7 gabungan fraksi yang sama melalui penampakan bercak lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Tabel 10. Hasil Fraksinasi Ekstrak Kayu Jawa

No.	Eluen	Perbandingan eluen	Volume (mL)
1.	Etil asetat	-	120
2.	Etil asetat : Metanol	60 : 1	120
3.	Etil asetat : Metanol	50 : 1	120
4.	Etil asetat : Metanol	40 : 1	120
5.	Etil asetat : Metanol	30 : 1	120
6.	Etil asetat : Metanol	20 : 1	120
7.	Etil asetat : Metanol	10 : 1	120
8.	Etil asetat : Metanol	1 : 1	120
9.	Etil asetat : Metanol	1 : 10	120
10.	Etil asetat : Metanol	1 : 20	120
11.	Etil asetat : Metanol	1 : 30	120
12.	Etil asetat : Metanol	1 : 40	120
13.	Etil asetat : Metanol	1 : 50	120
14.	Etil asetat : Metanol	1 : 60	120
15.	Etil asetat : Metanol	1 : 70	120
16.	Metanol	-	140

Tabel 11. Hasil Penggabungan Fraksi Ekstrak Kayu Jawa

No.	Fraksi gabungan	Fraksi	Berat (gr)
1.	Fraksi F1 (F1)	60:1 50:1 40:1 30:1	0,1057
2.	Fraksi F2 (F2)	1:1	0,1799
3.	Fraksi F3 (F3)	20:1 10:1	0,1684
4.	Fraksi F4 (F4)	1:10	2,2708
5.	Fraksi F5 (F5)	1:20	1,4595
6.	Fraksi F6 (F6)	1:30	0,5128
7.	Fraksi F7 (F7)	1:40	0,1069

## 5. Uji Aktivitas Antiplasmodium

Tabel 12. Hasil Pengujian Antiplasmodium terhadap *Plasmodium falciparum*

Larutan Uji	R	% Parasitemia		% Pertumbuhan	% Hambatan	% Hambatan rata-rata
		0 jam	48 jam			
Kontrol (-)	1	1,07	4,36	3,29	-	-
	2	1,07	4,35	3,28	-	
Kontrol (+)	1	1,07	0,49	0	100,00	100,00
	2	1,07	0,45	0	100,00	
E0	1	1,07	2,39	1,32	59,88	60,12 ± 0,25
	2	1,07	2,37	1,30	60,37	
P1	1	1,07	3,16	2,09	36,47	36,68 ± 0,21
	2	1,07	3,14	2,07	36,89	
P2	1	1,07	1,39	0,32	90,27	89,50 ± 0,77
	2	1,07	1,44	0,37	88,72	
F1	1	1,07	1,20	0,13	96,05	96,35 ± 0,30
	2	1,07	1,18	0,11	96,65	
F2	1	1,07	1,17	0,10	96,96	96,80 ± 0,16
	2	1,07	1,18	0,11	96,65	
F3	1	1,07	1,19	0,12	96,35	96,65 ± 0,30
	2	1,07	1,17	0,10	96,95	
F4	1	1,07	2,99	1,92	41,64	42,47 ± 0,82
	2	1,07	2,93	1,86	43,29	
F5	1	1,07	3,20	2,13	35,26	34,40 ± 0,86
	2	1,07	3,25	2,18	33,54	
F6	1	1,07	3,24	2,17	34,04	34,55 ± 0,51
	2	1,07	3,20	2,13	35,06	
F7	1	1,07	3,07	2,00	39,21	40,18 ± 0,97
	2	1,07	3,00	1,93	41,16	

Keterangan :

R = Replikasi

E0 = Ekstrak kayu jawa

P1 = Partisi Tidak Larut Heksan

P2 = Partisi Larut Heksan

F1 = Fraksi F1

F2 = Fraksi F2

F3 = Fraksi F3

F4 = Fraksi F4

F5 = Fraksi F5

F6 = Fraksi F6

F7 = Fraksi F7

## 6. Identifikasi Golongan Kimia

Partisi dan Fraksi dengan aktivitas penghambatan yang tinggi ditunjukkan oleh Partisi Larut Heksan dan Fraksi F2. Masing-masing rata-rata penghambatan sebesar  $89,50 \pm 0,77 \%$  dan  $96,80 \pm 0,16 \%$ . Hasil Uji identifikasi golongan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 13. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa

No.	Pereaksi	Jenis Senyawa	E0	Partisi		Fraksi						
				P1	P2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
1.	Dragendorf	Alkaloid	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-
2.	Wagner		+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
3.	Mayer		+	-	+	+	+	-	-	-	-	-
4.	AlCl <sub>3</sub>	Flavonoid	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5.	FeCl <sub>3</sub>	Fenolik	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
6.	Lieberman-Bouchard	Steroid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Terpenoid / Triterpenoid	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+

Keterangan:

(+) = Positif

(-) = Negatif

E0 = Ekstrak kayu jawa

P1 = Partisi Tidak Larut Heksan

P2 = Partisi Larut Heksan

F1 = Fraksi F1

F2 = Fraksi F2

F3 = Fraksi F3

F4 = Fraksi F4

F5 = Fraksi F5

F6 = Fraksi F6

F7 = Fraksi F7

### B. Pembahasan

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit (*Plasmodium sp*) yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles sp*) betina, dapat menyerang semua



orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Parasit ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina (Direktur PPBB, 2014). Jenis *Plasmodium* yang biasa menyerang manusia adalah *Plasmodium falciparum*. *Plasmodium falciparum* adalah penyebab malaria tropika, masa inkubasinya adalah 12 hari (Achmadi, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiplasmodium pada fraksi-fraksi yang diperoleh dari ekstrak kayu jawa (*Lanne coromandelica* Houtt. Merr.), terhadap *Plasmodium falciparum* secara *in vitro*. Hasil uji aktivitas tersebut nantinya akan ditentukan dari fraksi-fraksi yang memiliki aktivitas antiplasmodium paling tinggi berdasarkan nilai persen penghambatan. Penelitian ini menggunakan sampel kulit batang Kayu jawa, sering digunakan masyarakat sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Kayu jawa digunakan untuk luka, mengatasi memar, diare ophthalmia, asam urat, keseleo dan disentri. Di Sulawesi selatan masyarakat menggunakan kulit batang kayu jawa sebagai obat luka, hal ini disebabkan kemampuan kulit batang kayu jawa sebagai antibakteri, antimikroba, antiinflamasi. Sehingga dapat menekan pertumbuhan bakteri atau mikroba patogen dan mencegah terjadinya infeksi pada luka sehingga kesembuhan luka dapat dipercepat, dan diduga memiliki kemampuan sebagai antiplasmodium.

Pengambilan sampel dilakukan pada jam 9.00 karena pada jam tersebut terjadi fotosintesis. Fotosintesis maksimal terjadi yaitu sekitar pukul 08.00 – 12.00, dimana pada saat fotosintesis maksimal terjadi pembentukan zat aktif (senyawa metabolit primer maupun sekunder). Sampel yang diambil berupa kulit batang kayu

jawa, sampel yang diambil dari batang utama atau cabang, diambil tidak secara melingkar, dimaksudkan agar pohon yang digunakan mengambil sampel tetap mampu hidup. Sampel yang telah diperoleh disortasi dan dipisahkan dari kulit paling luar atau pengotor, setelah itu dibersihkan dengan cara dicuci dengan air mengalir. Setelah itu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Sampel kemudian dipotong-potong kecil untuk memudahkan dalam proses pengeringan selanjutnya dan hal ini dilakukan untuk memperbesar luas permukaan sampel sehingga kontak antara cairan penyari dan sampel lebih besar sehingga memudahkan penyarian komponen kimia yang terdapat dalam sampel. Dilanjutkan dengan pengeringan didalam lemari pengering. Tujuan pengeringan ini dimaksudkan untuk menghindari pertumbuhan mikroba sebagaimana telah diketahui bahwa medium berair dan lembab akan lebih mudah ditumbuhi mikroba atau jamur. Setelah sampel benar-benar kering, selanjutnya sampel akan diekstraksi. Adapun tujuan dari proses ekstraksi ini adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam simplisia.

Pengolahan sampel kering yang telah diserbukkan diekstraksi dengan metode maserasi. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Prinsip dari metode maserasi adalah penyarian komponen zat aktif dari simplisia, dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan masuk ke rongga sel menembus dinding sel dan melarutkan zat aktif yang ada dalam sel. Karena perbedaan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel menyebabkan terjadinya difusi zat aktif yang ada dalam sel akan keluar sel. Demikian seterusnya sampai terjadi kesetimbangan. Dalam tahap ini, sebanyak 1800 gram kulit batang kayu jawa kering dimaserasi menggunakan pelarut metanol

dan dibiarkan terendam selama  $\pm 3 \times 24$  jam, lalu dilakukan proses penyarian setelah  $\pm 3 \times 24$  jam menggunakan kertas saring dan corong yang telah disumbat kapas, dilakukan proses remaserasi sampel yang telah disaring, kemudian ditampung hasil maserasi.

Setelah diperoleh ekstrak metanol yang cair maka dipekatkan dengan bantuan alat *Rotary evaporator*. Prinsip pemekatan ekstrak pada alat ini yaitu dengan cara memisahkan ekstrak dengan cairan penyarinya berdasarkan titik didihnya, sehingga akan didapatkan ekstrak yang lebih pekat atau ekstrak yang lebih kental. Sedangkan ekstrak air yang cair dipekatkan menggunakan water bath hingga didapatkan ekstrak yang lebih pekat. Ekstrak dari kulit batang kayu jawa yang diperoleh yaitu ekstrak metanol sebanyak 96,247 gram.

Sampel ekstrak kayu jawa kemudian dilanjutkan dengan tahap partisi. Tujuan partisi adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa yang kepolaran yang rendah, dengan kepolaran yang lebih tinggi. Sampel dipartisi dengan metode Cair-Padat, menggunakan pelarut n-heksan. Penggunaan pelarut n-heksan didasari pada tingkat kepolaran yang paling rendah, dan paling sering digunakan. Metode Partisi cair Padat menggunakan alat sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Hal ini bertujuan untuk memisahkan ekstrak yang larut n-heksan dan mengendapkan ekstrak yang tidak larut heksan. Hal ini dilakukan hingga berulang kali sampai larutan n-heksan yang diperoleh jernih. Hasil partisi larut n-heksan dan tidak larut n-heksan sebanyak 1700 ml kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Partisi selanjutnya ditimbang masing-masing. Sehingga diperoleh ekstrak

larut n-heksan sebanyak 4,38 gram dan ekstrak tidak larut n-heksan sebanyak 16,13 gram.

Selanjutnya dilakukan pencarian dan penentuan eluen fraksinasi. Eluen ditentukan berdasarkan profil KLT dari ekstrak metanol kayu jawa menggunakan perbandingan eluen tertentu. Prinsip dari KLT yaitu pemisahan komponen kimia berdasarkan prinsip adsorpsi dan partisi, yang ditentukan oleh fase diam (adsorben) dan fase gerak (eluen), komponen kimia bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap adsorben terhadap komponen-komponen kimia tidak sama sehingga komponen kimia dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya, hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Jika pada penampakan noda belum didapat atau jika posisi noda yang terlalu ke atas maka kepolaran eluen diturunkan atau jika posisi noda terlalu dibawah maka kepolaran eluen perlu ditingkatkan. Ekstrak yang ditotolkan pada lempeng dibuat dalam konsentrasi yang rendah, karena jika konsentrasinya terlalu pekat, maka akan diperoleh noda yang berekor atau yang bertumpuk. Selanjutnya lempeng dielusi dalam chamber yang telah jenuh. Penjenuhan chamber ini dimaksudkan agar proses elusi dari eluen hanya berasal dari eluen dari dasar chamber dan bukan dari eluen yang menguap jika chamber tidak jenuh. Setelah itu Lempeng dimasukkan dalam chamber yang telah dijenuhkan.

Setelah lempeng dielusi, lempeng dikeluarkan dari chamber kemudian dibiarkan hingga mengering. Selanjutnya noda-noda pada lempeng diamati dibawah lampu UV 254nm, 366nm kemudian disemprot dengan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10% dan dipanaskan di atas pemanas hingga tampak noda pada lempeng. Pada UV 254 nm,

lempeng akan berfluoresensi sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 254 nm adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Pada UV 366 nm noda akan berfluoresensi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 366 nm adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh auksokrom yang ada pada noda tersebut. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Sehingga noda yang tampak pada lampu UV 366 terlihat terang karena silika gel yang digunakan tidak berfluoresensi pada sinar UV 366 nm. Sedangkan penampakan noda oleh  $H_2SO_4$  10 % adalah karena asam sulfat ini bersifat reduktor sehingga dapat memutuskan ikatan rangkap yang akan mengakibatkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih panjang sehingga dapat terlihat oleh mata. Konsentrasi asam sulfat yang digunakan adalah 10%, karena jika konsentrasinya terlalu rendah maka kemampuan pemutusan ikatannya tidak maksimal. Proses pemanasan dimaksudkan untuk membantu proses pemutusan ikatan rangkap oleh asam sulfat.

Hasil uji KLT ekstrak kulit batang kayu jawa pada partisi tidak larut heksan yaitu dengan eluen Etil asetat : metanol memiliki pemisahan yang paling baik dengan perbandingan cairan pengelusi Etil asetat : metanol (10:1).

Selanjutnya dilakukan fraksinasi dengan menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV). Kromatografi cair vakum digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa dengan prinsip adsorpsi dan partisi. Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan pemisahan senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan alat vakum. Pemilihan metode ini karena prosesnya cepat dan mudah. Metode ini dilakukan menggunakan fase diam silika gel 60PF<sub>254</sub> dan fase gerak dengan gradien kepolaran yang dari terendah kemudian semakin meningkat yaitu berturut-turut etil asetat : metanol {(1:0), (60:1), (50:1), (40:1), (30:1), (20:1), (10:1), (1:1), (1:10), (1:20), (1:30), (1:40), (1:50), (1:60), (1:70), (0:1)}. Kemudian ke-16 fraksi diuapkan dengan cara diangin-anginkan. Hasil fraksinasi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT). Hal ini dilakukan dengan tujuan pengelompokan lebih lanjut terhadap fraksi-fraksi yang diperoleh berdasarkan kesamaan profil kandungan kimia dari bercak KLT yang terbentuk. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh 7 fraksi yaitu fraksi F1 {(60:1), (50:1), (40:1), (30:1)}, fraksi F2 {(1:1)}, fraksi F3 {(20:1), (10:1)}, fraksi F4 {(1:10)}, fraksi F5 {(1:20)}, fraksi F6 {(1:30)}, fraksi F7 {(1:40)}.

Metode pembiakan parasit dilakukan dengan metode Trager dan Jensen (1976) dengan menggunakan candle jar untuk meminimalkan gas O<sub>2</sub>. Parasit tumbuh optimal pada kondisi gas O<sub>2</sub> yang sedikit dan 5% CO<sub>2</sub> (Jensen, 2002). Sebanyak sepuluh sampel diuji yaitu Ekstrak kayu jawa (E0), Partisi tidak larut

heksan (P1), Partisi larut heksan (P2), fraksi F1 (F1), fraksi F2 (F2), Fraksi F3 (F3), fraksi F4 (F4), fraksi F5 (F5), fraksi F6 (F6), dan Fraksi F7 (F7) yang akan dilakukan uji. Pada uji aktivitas antiplasmodium *in vitro* digunakan *Plasmodium falciparum* strain 3D7 yang sensitif terhadap klorokuin. Uji aktivitas dilakukan dengan cara melarutkan bahan uji dalam DMSO kemudian dibuat pengenceran dalam media RPMI sampai diperoleh konsentrasi akhir sebesar 100 µg/ml. Pada larutan uji ditambahkan suspensi parasit dengan kadar parasitemia  $\pm 1\%$  dan hematokrit 5%. Kultur diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C. Kultur kemudian dipanen dan dibuat sediaan lapisan darah tipis dengan pewarnaan giemsa 20%. Selanjutnya dihitung persen parasitemia dan persen penghambatan pertumbuhan *P. falciparum* dengan menghitung jumlah eritrosit yang terinfeksi setiap 1000 eritrosit di bawah mikroskop.

Uji aktivitas antiplasmodium *in vitro* dilakukan terhadap ekstrak, hasil partisi larut heksan dan partisi tidak larut heksan, serta 7 fraksi hasil KCV yaitu fraksi F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan F7. Masing-masing diuji pada konsentrasi 100 µg/mL. Data persentase parasitemia, persentase penghambatan terhadap *P. falciparum* strain 3D7 dengan masa inkubasi 48 jam terdapat pada Tabel 11.

Dari hasil perhitungan persentase parasitemia, selanjutnya dilakukan perhitungan persentase penghambatan pertumbuhan Plasmodium. Persentase penghambatan pertumbuhan Plasmodium dihitung dari persentase parasitemia dan kontrol negatif. Persen parasitemia awal menunjukkan 1,07 %. Hasil menunjukkan persen parasitemia setelah inkubasi pada kontrol negatif mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,07% menjadi 4,36% dan 4,35%, sehingga persen pertumbuhan

plasmodium adalah 3,29% dan 3,28%. Pada kesepuluh sampel uji dan kontrol positif menunjukkan persen parasitemia dan persen pertumbuhan lebih kecil dibandingkan pada kontrol negatif.

Hasil pengolahan data pada tabel 11 bahwa rata-rata persen penghambatan untuk tiap larutan uji masing-masing yaitu E0 =  $60,12 \pm 0,25\%$ , P1 =  $36,68 \pm 0,21\%$ , P2 =  $89,50 \pm 0,77\%$ , F1 =  $96,35 \pm 0,30\%$ , F2 =  $96,80 \pm 0,16\%$ , F3 =  $96,65 \pm 0,30\%$ , F4 =  $42,47 \pm 0,82\%$ , F5 =  $34,40 \pm 0,86\%$ , F6 =  $34,55 \pm 0,51\%$ , dan F7 =  $40,18 \pm 0,97\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa Sampel kayu jawa memiliki aktivitas sebagai antiplasmodium, Suatu ekstrak atau senyawa dikatakan mempunyai sifat antiplasmodium apabila dapat memberikan penghambatan parasit lebih dari 30% (Pouplin, et al., 2007). Partisi dan Fraksi yang menunjukkan aktifitas tertinggi adalah Partisi Larut Heksan dan Fraksi F2.

Uji identifikasi golongan senyawa menggunakan pereaksi *Dragendorf* untuk uji alkaloid, pereaksi *Wagner* untuk uji alkaloid, pereaksi *Mayer* untuk uji Alkaloid, pereaksi  $\text{AlCl}_3$  untuk uji Flavonoid, pereaksi  $\text{FeCl}_3$  untuk uji Fenolik, dan pereaksi *Lieberman Bouchard* untuk uji Steroid, Terpenoid, Triterpenoid.

Hasil yang diperoleh menunjukkan Partisi larut heksan setelah ditambahkan pereaksi *Wagner* memperlihatkan endapan coklat, dan ditambahkan pereaksi *Mayer* memperlihatkan warna putih kekuningan, ditambahkan pereaksi  $\text{AlCl}_3$  memperlihatkan warna kuning, kemudian pereaksi *Lieberman Bouchard* memperlihatkan warna coklat. Hal ini menunjukkan bahwa Partisi larut heksan positif mengandung senyawa Alkaloid, Flavonoid, dan Terpenoid.



Pada Fraksi F2 setelah ditambahkan pereaksi Wagner memperlihatkan endapan coklat, dan ditambahkan pereaksi Mayer memperlihatkan warna putih kekuningan, ditambahkan pereaksi  $AlCl_3$  memperlihatkan warna kuning, kemudian  $FeCl_3$  memperlihatkan warna biru gelap, ditambahkan pereaksi Lieberman Bouchard memperlihatkan warna coklat. Hal ini menunjukkan bahwa Fraksi F2 positif mengandung senyawa Alkaloid, Flavonoid, Fenolik, dan Terpenoid.

Sebelumnya telah dilaporkan dalam penelitian Wahid (2012) Kayu jawa mengandung metabolit sekunder seperti Alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, flavonoid, dan glikosida jantung (Wahid, 2012).

Dilaporkan dalam penelitian Hayati, et.al (2012) golongan senyawa yang aktif menghambat pertumbuhan plasmodium terhadap *Plasmodium berghei* adalah Alkaloid, Tanin, dan Steroid. Juga dalam penelitian Lusiana (2009) yang melakukan pengujian Antiplasmodium secara *in vitro* terhadap *Plasmodium falciparum* strain W2 yang resisten klorokuin dan *Plasmodium falciparum* yang sensitif klorokuin, senyawa yang aktif sebagai antiplasmodium diidentifikasi mengandung golongan senyawa Alkaloid.

Dalam penelitian Kusumaningrum (2016) pengujian antiplasmodium terhadap *Plasmodium falciparum* strain 3D7 dilakukan secara *in vitro*, terbukti ekstrak yang aktif menghambat pertumbuhan *Plasmodium falciparum*, dalam kesimpulannya identifikasi golongan senyawa mengandung terpenoid.

Dalam penelitian Kakisina (2011) pengujian antiplasmodium terhadap *Plasmodium berghei* ditemukan senyawa yang aktif sebagai antiplasmodium mengandung golongan senyawa Flavonoid (Kakisina & Ukratalo, 2011). Juga

dilaporkan dalam flavonoid juga berperan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit malaria (Resi & Andis, 2009).

Partisi larut heksan dan Fraksi F2, diidentifikasi mengandung golongan senyawa Alkaloid, Terpenoid, Flavonoid, dan Fenolik pada fraksi F2. Senyawa-senyawa fenolik dan flavonoid yang terkandung dalam kayu jawa adalah Quersetin, Isoquersetin, Leukosianidin, leukodelpidin, morin, kaempferol (Reddy, et al., 2011), Asam gallat, Epigallocatechin (Alam, et al., 2017), Dyhidroflavonols (Tofazzal & Satoshi, 2000).

Derivat Flavonoid dan senyawa fenolik dalam kandungan kayu jawa memiliki aktivitas sebagai antiplasmodium yang telah dilaporkan dalam penelitian yang berbeda adalah senyawa quercetin, isoquercetin, kaempferol (Beroa, et al., 2009) (Hassan, et al., 2013) (Dondee, et al., 2016) (Rudrapal & Chetia, 2017), dan dyhidroflafanols (Beroa, et al., 2009) (Tofazzal & Satoshi, 2000).

Mekanisme penghambatan terhadap plasmodium golongan senyawa alkaloid telah dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan parasit dengan menghalangi pertumbuhan parasit melalui transport intraseluler kolin, sejumlah karbon yang mampu mengkelasi kation seperti  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ , dan  $\text{Mg}^{2+}$  yang ada di dalam parasit. Kelasi kation ini menghalangi sejumlah proses sintesis asam nukleat karena enzim ribonukleotida reduktase membutuhkan logam transisi sebagai kofaktor (Hilou, et al., 2006).

Begitu pula dengan senyawa golongan terpenoid juga telah diketahui dapat menghambat pertumbuhan *Plasmodium* dengan cara menghambat sintesis protein pada sel mamalia dan juga parasit malaria (Pouplin, et al., 2007).

Senyawa golongan Flavonoid sebagai antiplasmodium memiliki mekanisme menghambat jalur permeasi baru (NPP) pada membran eritrosit yang terinfeksi plasmodium serta mekanisme lain yang belum diketahui (Widyawaruyanti, et al., 2011).

Semua ekstrak dan obat mempunyai mekanisme penghambatan yang spesifik, begitu pula dengan senyawa-senyawa yang berasal dari tumbuhan (Hayati, et al., 2012).

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, menjelaskan kepada kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*Artinya :*

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya (Muhsin, 2009).*

Semua Penyakit Ada Obatnya, penegasan dari ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap penyakit yang ada didunia memiliki obatnya, Rasulullah saw. mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah swt. yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya (Muadzin, 2009).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Partisi-partis dan Fraksi-fraksi tidak larut heksan dari ekstrak kulit batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) memiliki aktivitas sebagai antiplasmodium, dilihat dari aktivitas persen penghambatan diatas 30%.
2. Partisi dan Fraksi yang paling aktif sebagai antiplasmodium adalah partisi larut heksan dan Fraksi F2. Pada Partisi larut heksan menunjukkan nilai persen penghambatan  $89,50 \pm 0,77\%$  dan mengandung golongan senyawa Alkaloid, Flavonoid, dan Terpenoid. Pada Frasi F2, nilai persen penghambatan  $96,80 \pm 0,16\%$ , mengandung senyawa Alkaloid, Flavonoid, Fenolik, dan Terpenoid.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada partisi larut heksan untuk mendapatkan fraksi-fraksi aktif sebagai antiplasmodium dari Kulit Batang Kayu Jawa serta dapat dilakukan uji aktivitas antimalaria secara *in vivo*.

## KEPUSTAKAAN

- Achmadi, U., 2010. *Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah*, Jakarta: UI Press.
- Ahmadi, S., 2008. *Faktor Risiko Kejadian Malaria di Desa Lubuk Nipis Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Alam, B. et al., 2012. Antioxidan and Analgesic Activities of *Lannea coromandelica* Linn. Bark Ekstrak. *International journal Of Pharmacology*, 8(4), pp. 224-233.
- Alam, M. B., Kwon, K.-R., Lee, S.-H. & Lee, S.-H., 2017. *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway. *International Journal Molecular Science*, 18(266), pp. 1-18.
- Al-Jauziah & Qayyim, I., t.th. *Zadul Ma'ad Jilid IV*. Jilid IV penyunt. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arsunan A, A., 2012. *Malaria Di Indonesia Tinjauan Aspek Epidemiologi*, Makassar: Masagena Press.
- Atun, S., 2014. Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, 8(2), pp. 53-61.
- Beroa, J., Frederichb, M. & Quetin-Leclercq, J., 2009. Antimalarial compounds isolated from plants used in traditional medicine. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 61(11), p. 1401–1433.
- Bousema, J. et al., 2003. Treatment failure of Pyrimethamine-Sulphadoxine and Induction of *Plasmodium falciparum* Gametocytaemia in Children. *Tropical Medicine and International Health*, 8(5), p. 427–430.
- Cortese, J., A, C., CE, C. & CV, P., 2002. Origin and Dissemination of *Plasmodium falciparum* Drug-Resistance Mutations. *Journal of Infectious Diseases*, 186(7), p. 999–1006.
- Cowman, A., Galatis, D. & Thompson, J., 1994. Selection for Mefloquine Resistance in *Plasmodium falciparum* is linked to Amplification of the *pfmdr1* Gene and Cross-Resistance to Halofantrine and Quinine. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 91(3), p. 1143–1147.
- Depkes RI, 2003. *Epidemiologi Malaria*. Jakarta: Direktorat Jenderal PPM-PL Departemen Kesehatan RI.

- Desjardins, R., CJ, C., DE, H. & JD, C., 1979. Quantitative assessment of antimalarial activity in vitro by a semiautomated microdilution technique.. *Antimicrobial Agents Chemother*, 16(6), pp. 710-718.
- Direktur PPBB, 2014. *Pedoman Manajemen Malaria*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dirjen BFKK, 2008. *Pelayanan Kefarmasian Untuk Penyakit Malaria*, Jakarta: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dirjen PP&PL, 2008. *Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria di Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dirjen PP&PL, 2011. *Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria di Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Division of Applied Bioscience; et al., 2000. Dihydroflavonols from *Lannea coromandelica*. *Journal Of Phytochemistry*, pp. 901-907.
- Dondee, K. et al., 2016. The protective effect of *Moringa oleifera* leaf extract on liver damage in mice infected with *Plasmodium berghei* ANKA. *Journal of Coastal Life Medicine*, 4(9), pp. 742-746.
- Giao, P. et al., 2001. Artemisinin for Treatment of Uncomplicated *Falciparum* Malaria: Is There Place for Monotherapy. *American Journal Tropical Medicine*, 65(6), p. 690–695.
- Gupta, S., MM, T., WH, W. & A, B., 2002. In vitro Interactions of Artemisinin with Atovaquone, Quinine and Mefloquine against *Plasmodium falciparum*. *Antimicrobial Agents and Chemoterapy*, 46(5), pp. 1510-1515.
- Hasan, D., 2006. *Rasio Efektifitas Biaya Obat Antimalaria Kombinasi Artesunate + Amodiaquin Dan Kombinasi Sulfadoksin + Pirimetamin Dalam Terapi Malaria Falsiparum*, Jakarta: Disertasi Program Doktor UI.
- Hassan, S., Verma, S., S.K.Srivastava & Drawn, S., 2013. Activity Guided Isolation and Characterization of Antiplasmodial Agents of some Local medicinal Plants. *Nigerian Journal of Basic and Applied Science*, 21 (3), pp. 177-185.
- Hawwa, S., 2007. *Ar-Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Jakarta: Daarussalam.
- Hayati, E. K., Jannah, A. & Ningsih, R., 2012. Compound Identification and In Vivo Antimalarial Activity Of Extract Ethyl Acetate Extract From Anting-Anting Plant (*Acalypha indica* L.). *Jurnal Molekul*, 7(1), pp. 20-32.

- Hayward, R., Saliba, K. J. & Kirk, K., 2006. The pH of the Digestive Vacuole of *Plasmodium falciparum* is not Associated with Klorokuin Resistance. *Journal of Cell Science*, 119(6), pp. 1016-1025.
- Hilou, A., OG, N. & TR, G., 2006. In vivo antimalarial activities of extracts from *Amaranthus spinosus* L. And *Boerhavia erecta* L. In mice. *Journal of ethnopharmacology*, 103(236), p. 40.
- Iqbal, J., Hira, P., Sher, A. & Al-Eneji, A., 2001. Diagnosis of imported malaria by *Plasmodium lactate dehydrogenase* (pLDH) and histidine-rich protein-2 (PfHRP-2)-based immunocapture assays. *American Journal Tropical Medicine*, 64(1), pp. 20-23.
- Jansen, O. et al., 2017. Antiplasmodial activity of *Mezoneuron benthamianum* leaves and identification of its active constituents. *Journal of Ethnopharmacology*, 203(8), pp. 20-26.
- Kakisina, P. & Ukratalo, A. M., 2011. Efek Ekstrak Metanol Kulit Batang Pohon Pule (*Alstonia scholaris* L.R. Br) Terhadap Penurunan Parasitemia Mencit (*Mus musculus*) Terinfeksi *Plasmodium berghei* ANKA secara In Vitro. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 4(1), pp. 49-60.
- Kaur, R., Jaiswal, M. L. & Jain, V., 2013. Protective effect of *Lannea coromandelica* Houtt. Merrill. against three common pathogens. *Journal of Ayurveda*, 4(4), pp. 224-227.
- Kemenkes RI, 2016. *Profil Kesehatan Indonesia 2015*, Jakarta: Bakti Husada.
- Kementrian Agama RI, t.th. *Al Qur'anul Karim*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kim, H. et al., 2001. Analysis of *pfmdr1* Gene in Mefloquine Resistant *Plasmodium falciparum*. *Nucleic Acids Symposium Series*, 1(1), pp. 231-232.
- Krogstad DJ, 2000. *Plasmodium species (malaria)*. Dalam : Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, penyunting. *Principles and practice of infectious diseases*. 5 penyunt. USA: Churchill Livingstone.
- Kublin, J. et al., 2003. Reemergence of Chloroquine-Sensitive *Plasmodium falciparum* Malaria after Cessation of Chloroquine Use. *The Journal of Infectious Diseases*, 187(12), p. 1870–1875.
- Kublin, J. et al., 2001. Molecular Markers for Failure of Sulfadoxine-Pyrimethamine and Chlorproguanil-Dapsone Treatment of *Plasmodium falciparum*. *Journal of Infectious Diseases*, 185(3), p. 380–388.



- Kusumaningrum, N. A., 2016. *Skripsi Uji Aktivitas Antimalaria Daun Helianthus annuus L. dengan Ekstraksi Bertingakterhadap Plasmodium falciparum secara In Vitro*, Surabaya: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Departemen Farmakognosi dan Fitokimia.
- Liu, J., IY, G., ME, D. & DE., G., 2005. The Role of Plasmodium falciparum Food Vacuole Plasmepsin. *The Journal of Biological chemistry*, 280(2), pp. 1432-1437.
- Lusiana, H., 2009. *Skripsi Isolation and In Vitro Antiplasmodial Test of Alkaloid Compounds from Albertisia papuana Becc.* Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mackler, M., JM, R., JA, W. & sensitivity., e. a., 1993. Parasite lactate dehydrogenase as an assay for Plasmodium falciparum drug. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 48(6), pp. 739 - 741.
- Mannan, A. et al., 2010. Antihyperglycemic Activity Evaluation of Leucas Aspera (Willd.) Link Leaf and Stem and Lannea Coromandelica (Houtt.) Merr. Bark Extract in Mice. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 4(3), pp. 385-388.
- Merrill, E. D., 1938. Journal Article A Critical Consideration Of Houttuyn's New Genera And New Species Of Plants. *Journal of the Arnold Arboretum*, 19(4), pp. 291-375.
- Meshnick, S. R., 2002. Artemisinin: Mechanism of Action, Resistance and Toxicity. *International Journal Parasitology*, 32(13), pp. 1655-1660.
- Mozer, H., 2015. *Antifungal Activity Test of ethanol extract 96% stem bark of kayu jawa (Lannea coromandelica) Against Aspergillus niger, Candida albicans, and Trichophyton rubrum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muadzlin, M. d., 2009. *Semua Penyakit ada Obatnya, Menyembuhkan Penyakit Ala Rasulullah*. Jakarta: Mutiara Medika.
- Muhsin, M., 2009. *Sahih Bukhari*. Jakarta: s.n.
- Mukhriani, 2014. Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), pp. 361-367.
- Mutiasari, I., 2012. *Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi Aktif*, Jakarta: UI Press.
- Paloque, L. et al., 2016. Plasmodium falciparum: multifaceted resistance to artemisinin. *Malaria Journal*, 15(149), pp. 1-12.
- Plowe, C. V., 2003. Monitoring Antimalarial Drug Resistance: Making the Most of The tools. *Journal of Experimental Biology*, 206(21), pp. 3745-3752.




- Plowe, C. V. et al., 1997. Mutations in Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Dihydropteroate Synthase and Epidemiologic Patterns of Pyrimethamine-Sulfadoxine Use and Resistance. *Journal of Infectious Diseases*, 176(6), p. 1590–1596.
- Pouplin, et al., 2007. Antimalarial and Cytotoxic Activities of Ethnopharmacologically Selected Medicinal Plants from South Vietnam. *Journal of ethnopharmacology*, 109(3), pp. 417-427.
- Prasetyanto, B., 2016. *Identifikasi Senyawa dan Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak dan Fraksi Kulit Kayu Pohon Mahoni (Swietenia macrophylla KING)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Price, R. N. et al., 2004. Mefloquine Resistance in Plasmodium falciparum Results from Increased pfmdr1 Gene Copy Number.. *Internal Medicine Journal*, 364(9432), p. 438–447..
- Pusdatin, 2016. *Infodatin Malaria*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Rahayu, M., Sunarti, S., Sulistiarini, D. & Prawiroaatmodjo, S., 2006. Pemanfaatan Tumbuhan Obat secara Tradisional oleh Masyarakat Lokal di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. *LIPI Journal*, 7(3), pp. 245-250.
- Rahmadani, F., 2015. *Skripsi Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Pseudomonas*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rao, V. S., Einstein, J. W. & Das, K., 2014. Hepatoprotective and antioxidant activity of Lannea coromandelica Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats. *International Letters of Natural Sciences*, 3(1), pp. 30-43.
- Rath, K. et al., 2004. Pharmacokinetic Study of Artemisinin after Oral Intake of a Traditional Preparation of Artemisia annua L. (Annual wormwood). *American Journal Tropical Medicines Hyginie*, 70(2), pp. 128-132.
- Reddy, A. K., Joy, J. M. & Kumar, C. A., 2011. Review Article Lannea coromandelica: The Researcher's Tree. *Journal Of Pharmacy Research*, 4(3), pp. 577-579.
- Resi, A. W. & Andis, S., 2009. *Makalah Kimia Organik Bahan Alam Flavonoid (Quercetin)*, Makassar: Program S2 Kimia FMIPA. Universitas Hassanudin.
- Ridley, R. G., 2002. Medical Need, Scientific Opportunity and the Drive for Antimalarial Drugs. *Journal Nature*, 415(6872), pp. 686-693.

- Rieckmann, K., LJ, S., GH, C. & JE, M., 1978. Drug Sensitivity of Plasmodium falciparum. An in vitro microtechnique. *Lancet*, 311(8054), pp. 22-23.
- Rosenthal, P. J., 2003. Antimalarial Drug Discovery: Old and New Approach. *Journal of Experimental Biology*, 206(21), pp. 3735-3744.
- Rubiyanto, D., 2016. *Teknik Dasar Kromatografi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rudrapal, M. & Chetia, D., 2017. Plant Flavonoids as Potential Source of Future Antimalarial leads. *journal in the field of Pharmacy*, 8(1), pp. 13-18.
- Saliba, K., PI, F. & PJ, S., 1998. Role for the Plasmodium falciparum Digestivevacuole in Klorokuin Resistance. *Journal Biochemical Pharmacology*, 56(3), p. 313–320.
- Saputra, A., 2015. *Anti-inflammatory Activity Assay Toward Ethanol 96% Extract of Java Wood Bark (Lannea coromandelica) with Human Red Blood Cell Stabilization In vitro*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sara, M. S. F. & Ersam, T., 2011. Pengujian Aktivitas Antimalaria dan Insektisida Fraksi Etil Asetat Dan Senyawa 5,7,2',5",7",4"-Heksahidroksiflavanon-[3,8"]-Flavondari Batang Garcinia celebica Linn. *Prosiding Kimia*, pp. 572-592.
- Shihab, M. Q., 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, keserasian Al- Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simamora, D. & Fitri, L. E., 2007. Antimalarial Drug Resistance: Mechanim and The Role Combination In Preventing It. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 13(2), pp. 82-90.
- Slater, H. C. et al., 2016. Assessing the potential impact of artemisinin and partner drug resistance in sub-Saharan Africa. *Malaria Journal*, 15(10), pp. 1-11.
- Soedarmo, S., H, G., SR, H. & HI., S., 2008. *Buku ajar infeksi dan pediatrik tropis*. Jakarta: IDAI.
- Soemirat, J., 2004. *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syamsuddin, 2008. Penapisan Senyawa Antimalaria yang berasal dari Tumbuhan. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 6(2), pp. 95-99.
- Tjitrosoepomo, G., 2010. *Taksonomi Tumbuhan Spermatopyta*. Yogyakarta: UGM Press.
- Tofazzal, M. & Satoshi, T., 2000. Dihydroflavonols from Lannea coromandelica. *Phytochemistri*, 54(8), pp. 901-907.


- Trager, W. & Jensen, J., 1976. Human malaria parasites in continuous culture. *Science*, 193(4254), pp. 673-678.
- Venkatesan, S. et al., 2015. Phytochemical Analysis and Antibacterial Activity On Medicinal Plant *Lannea coromandelica* Linn. Bark Extract. *International Journal of Modern Research and Review*, 3(12), pp. 1070-1074.
- Vikrant, A. & M.L., A., 2011. A Review on Anti-Inflammatory Plant Barks. *International Journal of PharmTech Research*, 3(2), pp. 899-908.
- Wahid, A., 2012. *In Vitro Phytochemical and Biological Investigation of Plant Lannea coromandelica (Famili: Anacardiaceae)*, Bangladesh: Thesis to Departemen Pharmacy East West University.
- Walunj, S. et al., 2015. *Lannea coromandelica* attenuates glucagon and oxymodulin mediated cAMP formation in HEK cells stably-expressing human glucagon receptor. *Journal Herbal Medicine*, 5(3), pp. 153-157.
- Webster, H. K. et al., 1985. Antimalarial Drug Susceptibility Testing of *Plasmodium Falciparum* in Thailand Using a Microdilution Radioisotope Method. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 34(2), pp. 228 - 235.
- Weerapreeyakul, N., Junhom, C., Barusrux, S. & Thitimetharoch, T., 2016. Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. and *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher. *Chinese Medicine*, 11(19), pp. 1-10.
- Wernsdorfer, W. & Payne, D., 1988. *Drug sensitivity test in malaria parasites*. In: *Wernsdorfer WH and Mc Gregor. Malaria principles and practice on malariology*, London: Churchill.
- White, N. J., 2004. Antimalarial Drug Resistance. *Journal of Clinical Investigations*, 113(2), pp. 1084-1092.
- WHO, 2015. *World Report Malaria*, Perancis: World Health Organization.
- WHO, 2016. *Status Report Artemisinin and artemisinin-based Combination Therapy Resistance*, Perancis: World Health Organization.
- WHO, 2016. *World Health Statistics Monitoring Health For The SGDs Sustainable Development Goals*, Perancis: WHO Press.
- WHO, 2016. *World Malaria Report 2016*, Perancis: World Health Organization Press.
- Widyawaruyanti, A., Zaini, N. C. & Syafruddin, 2011. Antimalarial Activity and Mechanism of Action of Flavonoid Compounds Isolated from *Artocarpus Champeden Spreng* Stembark. *Journal BP*, 13(2), pp. 67-77.

- Winstanley, P., S, W., R, S. & A., B., 2004. Therapy of Falciparum Malaria. *Molecule Journal*, 17(3), pp. 612-637.
- Woodrow, C., RK, H. & S., K., 2005. Artemisinins. *Postgraduate Medical Journal*, 81(952), pp. 71-78.
- Xiao-juan, Y. et al., 2014. Chemical Constituents from Barks of *Lannea coromandelica*. *Chinese Herbal Medicine*, 6(1), pp. 65-69.
- Yawan, S., 2006. *Analisis Faktor Risiko Kejadian Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Bosmik Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak-Numfor Papua*, Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro.





## LAMPIRAN


## Lampiran 1. Alur Penelitian



**Lampiran 2. Penyiapan Sampel Fraksi Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*)**




**Lampiran 3. Pembuatan Medium**

**Lampiran 4. Pembuatan Bahan Uji**



### Lampiran 5. Pengujian Antiplasmodium



## Lampiran 6. Contoh Perhitungan

### 1. Nilai Persen Rendamen

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen ekstrak} &= \frac{92.247 \text{ gr}}{2000 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 4,61\% \end{aligned}$$

### 2. Nilai Rf Pada Profil KLT

Jarak Tempuh Eluen	= 5,50 cm
Jarak Noda 1	= 5,32 cm
Jarak Noda 2	= 4,47 cm
Jarak Noda 3	= 3,78 cm
Jarak Noda 4	= 2,75 cm
Jarak Noda 5	= 1,72 cm
Jarak Noda 6	= 0,69 cm

$$R_f = \frac{\text{Jarak Noda}}{\text{Jarak Tempuh Eluen}}$$

$$R_{f1} = \frac{\text{Jarak Noda 1}}{\text{Jarak Tempuh Eluen}} = \frac{5,32 \text{ cm}}{5,50 \text{ cm}} = 0,97$$

Sehingga Nilai Rf Noda adalah

$$R_{f1} = 0,97; R_{f2} = 0,81; R_{f3} = 0,69; R_{f4} = 0,50; R_{f5} = 0,31; R_{f6} = 0,12$$

### 3. Analisis Data Penelitian

Kontrol Negatif (K(-))

- $X_{k1} = D48_1 - D0$   
 $= 4,36\% - 1,07\%$   
 $= 3,29\%$
- $X_{k2} = D48_2 - D0$   
 $= 4,35\% - 1,07\%$

$$= 3,28\%$$

#### Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa (E0)

$$\begin{aligned}
 - \text{ \% Pertumbuhan(1) (X}_{u_1}\text{)} &= D48_1 - D_0 \\
 &= 2,39\% - 1,07\% \\
 &= 1,32\% \\
 - \text{ \% Pertumbuhan(2) (X}_{u_2}\text{)} &= D48_2 - D_0 \\
 &= 2,37\% - 1,07\% \\
 &= 1,30\% \\
 - \text{ \% Hambatan(1)} &= 100\% - \frac{X_{u_1}}{X_{k_1}} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{1,32\%}{3,29\%} \times 100\% \\
 &= 100\% - 40,12\% \\
 &= 59,88\% \\
 - \text{ \% Hambatan(2)} &= 100\% - \frac{X_{u_2}}{X_{k_2}} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{1,30\%}{3,28\%} \times 100\% \\
 &= 100\% - 39,63\% \\
 &= 60,37\% \\
 - \text{ \% Hambatan Rata-rata} &= \frac{\text{\% Hambatan ((1)+(2))}}{2} \\
 &= \frac{59,88\% + 60,37\%}{2} \\
 &= \frac{120,25\%}{2} \\
 &= 60,12\%
 \end{aligned}$$

#### Partisi Larut n-Heksan (P2)

$$- \text{ \% Pertumbuhan(1) (X}_{u_1}\text{)} = D48_1 - D_0$$

$$\begin{aligned}
 &= 1,39\% - 1,07\% \\
 &= 0,32\% \\
 - \text{ \% Pertumbuhan(2) (X}_{u_2}\text{)} &= D48_2 - D0 \\
 &= 1,44\% - 1,07\% \\
 &= 0,37\% \\
 - \text{ \% Hambatan(1)} &= 100\% - \frac{X_{u1}}{X_{k1}} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{0,32\%}{3,29\%} \times 100\% \\
 &= 100\% - 9,73\% \\
 &= 90,27\% \\
 - \text{ \% Hambatan(2)} &= 100\% - \frac{X_{u2}}{X_{k2}} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{0,37\%}{3,28\%} \times 100\% \\
 &= 100\% - 11,28\% \\
 &= 88,72\% \\
 - \text{ \% Hambatan Rata-rata} &= \frac{\% \text{ Hambatan } ((1)+(2))}{2} \\
 &= \frac{90,27\% + 88,72\%}{2} \\
 &= \frac{178,99\%}{2} \\
 &= 89,50\%
 \end{aligned}$$

Fraksi F2 (F2)

$$\begin{aligned}
 - \text{ \% Pertumbuhan(1) (X}_{u_1}\text{)} &= D48_1 - D0 \\
 &= 1,17\% - 1,07\% \\
 &= 0,10\% \\
 - \text{ \% Pertumbuhan(2) (X}_{u_2}\text{)} &= D48_2 - D0 \\
 &= 1,18\% - 1,07\% \\
 &= 0,11\% \\
 - \text{ \% Hambatan(1)} &= 100\% - \frac{X_{u1}}{X_{k1}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 100\% - \frac{0,10\%}{3,29\%} \times 100\%$$

$$= 100\% - 3,04\%$$

$$= 96,96\%$$

$$- \text{ \% Hambatan(2)} = 100\% - \frac{X_{u2}}{X_{k2}} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{0,11\%}{3,28\%} \times 100\%$$

$$= 100\% - 3,35\%$$

$$= 96,65\%$$

$$- \text{ \% Hambatan Rata-rata} = \frac{\text{\% Hambatan ((1)+(2))}}{2}$$

$$= \frac{96,96\% + 96,65\%}{2}$$

$$= \frac{193,61\%}{2}$$

$$= 96,80\%$$

### Lampiran 7. Gambar Penelitian



Gambar 6. Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.)



Gambar 7. Hasil Partisi Larut n-Heksan




Gambar 8. Hasil Partisi Tidak Larut n-Heksan



Gambar 9. Hasil Fraksinasi Partisi Tidak Larut n-Heksan

Keterangan:

1. Etil Asetat : Metanol (1:0)
2. Etil Asetat : Metanol (60:1)
3. Etil Asetat : Metanol (50:1)
4. Etil Asetat : Metanol (40:1)
5. Etil Asetat : Metanol (30:1)
6. Etil Asetat : Metanol (20:1)
7. Etil Asetat : Metanol (10:1)
8. Etil Asetat : Metanol (1:1)
9. Etil Asetat : Metanol (1:10)
10. Etil Asetat : Metanol (1:20)
11. Etil Asetat : Metanol (1:30)
12. Etil Asetat : Metanol (1:40)
13. Etil Asetat : Metanol (1:50)
14. Etil Asetat : Metanol (1:60)
15. Etil Asetat : Metanol (1:70)



Gambar 10. Hasil Pengamatan Eritrosit Dibawah Mikroskop

Keterangan: Eritrosit Terinfeksi Plasmodium (A) akan Berwarna Ungu oleh warna Schizont dibawah Mikroskop dan Eritrosit Tidak Terinfeksi (B) Plasmodium akan berwarna Putih.



Gambar 11. Hasil Identifikasi Partisi Larut Heksan

Keterangan: Dg = Dragendorf; My = Mayer; Wg = Wagner; FC =  $\text{FeCl}_3$ ; AC =  $\text{AlCl}_3$ ; LB = Lieberman Bouchard



Gambar 12. Hasil Identifikasi Fraksi F2

Keterangan: Dg = Dragendorf; My = Mayer; Wg = Wagner; FC =  $\text{FeCl}_3$ ; AC =  $\text{AlCl}_3$ ; LB = Lieberman Bouchard





Gambar 13. Perendaman Sampel Kulit Batang Kayu Jawa



Gambar 14. Penguapan Ekstrak Kayu Jawa Menggunakan Vakum Rotarry Evaporator




Gambar 15. Proses Partisi Cair Padat pada Sentrifuge



Gambar 16. Proses Fraksinasi Metode Kromatografi Cair Vakum



Gambar 17. Proses Pencarian Profil KLT



Gambar 18. Profil KLT eluan Etil Asetat : Metanol (10:1)

Keterangan: Noda 1 (A) dengan  $R_f = 0,97$ ; Noda 2 (B) dengan  $R_f = 0,81$ ; Noda 3 (C) dengan  $R_f = 0,69$ ; Noda 4 (D) dengan  $R_f = 0,50$ ; Noda 5 (E) dengan  $R_f = 0,31$ ; dan Noda 6 (F) dengan  $R_f = 0,12$



Gambar 19. Proses Pengelusian Fraksi Kayu Jawa



Gambar 20. Penampakan Noda pada UV 254

Keterangan: Noda dari kiri ke kanan masing- masing adalah Partisi tidak larut heksan dan Fraksinasi Etil Asetat : Metanol {(1:0) (60:1) (50:1) (40:1) (30:1) (20:1) (10:1) (1:1) (1:10) (1:20) (1:30) (1:40) (1:50) (1:60) (1:70) (0:1)}



Gambar 21. Penampakan Noda Pada UV 366

Keterangan: Noda dari kiri ke kanan masing- masing adalah Partisi tidak larut heksan dan Fraksinasi Etil Asetat : Metanol {(1:0) (60:1) (50:1) (40:1) (30:1) (20:1) (10:1) (1:1) (1:10) (1:20) (1:30) (1:40) (1:50) (1:60) (1:70) (0:1)}



Gambar 22. Proses pengujian Antiplasmodium



Gambar 23. Metode Candle Jar



Gambar 24. Inkubator suhu 37°C



Gambar 25. Pengujian dalam Plat well 24

Keterangan:


Kontrol Negatif (K(-))	= Kolom A Baris 1-2
Kontrol Positif (K(+))	= Kolom A Baris 3-4
Fraksi F1 (F1)	= Kolom C Baris 1-2
Fraksi F2 (F2)	= Kolom B Baris 1-2
Fraksi F3 (F3)	= Kolom F Baris 3-4
Fraksi F4 (F4)	= Kolom E Baris 3-4
Fraksi F5 (F5)	= Kolom D Baris 3-4
Fraksi F6 (F6)	= Kolom C Baris 3-4
Fraksi F7 (F7)	= Kolom B Baris 3-4
Partisi Larut n-heksan	= Kolom D Baris 1-2
Partisi Tidak Larut n-heksan	= Kolom E Baris 1-2
Ekstrak kayu Jawa	= Kolom F Baris 1-2



Gambar 26. Pembuatan Apusan Darah Tipis



Gambar 27. Proses Fiksasi dengan Metanol




Gambar 28. Pemberian Pewarna Giemsa 20%



Gambar 29. Pemberian Minyak Emersi



Gambar 30. Pengamatan Dibawah Mikroskop




Gambar 31. Alat untuk Menghitung Jumlah Eritrosit  
Keterangan : Alat untuk menghitung jumlah eritrosit terinfeksi (A),  
Dan eritrosit tidak terinfeksi (B)

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## Lampiran 8. Keterangan Hasil Penelitian

**NPMRD**  
Natural Product Medicine Research & Development  
 Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga  
 Jln. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 62-31-5992445-46 ext 305



**UJI AKTIVITAS ANTIMALARIA IN VITRO**  
**TERHADAP *Plasmodium falciparum* 3D7**

Nama : Muh. Ihsan H (Peneliti 1 – Sampel A)  
 : Nurfadilah Absa (Peneliti 2 – Sampel B)  
 Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Email / HP : nurfadilah14absa@gmail.com/082187785485  
 Jumlah sampel : 2 sampel (20 sampel 1 konsentrasi)

**Prosedur pengujian**  
 Pada uji aktivitas antimalaria *in vitro* digunakan *Plasmodium falciparum* strain 3D7 yang sensitif terhadap klorokuin. Uji aktivitas dilakukan dengan cara melarutkan bahan uji dalam DMSO kemudian dibuat pengenceran dalam media RPMI sampai diperoleh konsentrasi akhir sebesar 100 µg/ml. Pada larutan uji ditambahkan suspensi parasit dengan kadar parasitemia ±1% dan hematokrit 5%. Kultur diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C. Kultur kemudian dipanen dan dibuat sedian lapisan darah tipis dengan pewarnaan giemsa 20%. Selanjutnya dihitung persen parasitemia dan persen penghambatan pertumbuhan *P. falciparum* dengan menghitung jumlah eritrosit yang terinfeksi setiap 1000 eritrosit di bawah mikroskop. Persen pertumbuhan didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{pertumbuhan} = \% \text{parasitemia} - DO$$

Keterangan:  
 DO = % pertumbuhan pada jam ke-0

Rumus untuk perhitungan % penghambatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persen penghambatan} = 100\% - ((Xu/Xk) \times 100\%)$$

Keterangan:  
 Xu = % pertumbuhan pada larutan uji  
 Xk = % pertumbuhan pada kontrol negatif

Berdasarkan data persen penghambatan dilakukan analisis antara konsentrasi uji terhadap persen penghambatan dengan menggunakan analisis probit log untuk mengetahui nilai  $IC_{50}$  atau konsentrasi bahan uji yang dapat menghambat pertumbuhan parasit sebanyak 50%.



**NPMRD**

Natural Product Medicine Research & Development  
 Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga  
 Jln. Muliyorejo Surabaya 60115 Telp. 62-31-5992445-46 ext 305

**Hasil Uji Sampel I. SAMPEL A1-A10**

Konsentrasi (µg/ml)	R	% Parasitemia		% Perumbuhan	% Hambatan	% Hambatan rata-rata
		0 jam	48 jam			
Kontrol (-)	1	1,07	4,36	3,29	-	-
	2	1,07	4,35	3,28	-	-
K+	1	1,07	0,49	0	100	100
	2	1,07	0,45	0	100	100
A1	1	1,07	2,39	1,32	59,88	60,12
	2	1,07	2,37	1,30	60,37	
A2	1	1,07	3,16	2,09	36,47	36,68
	2	1,07	3,14	2,07	36,89	
A3	1	1,07	1,39	0,32	90,27	89,50
	2	1,07	1,44	0,37	88,72	
A4	1	1,07	1,20	-0,13	96,05	96,35
	2	1,07	1,18	0,11	96,65	
A5	1	1,07	1,17	0,10	96,96	96,80
	2	1,07	1,18	0,11	96,65	
A6	1	1,07	1,19	0,12	96,35	96,65
	2	1,07	1,17	0,10	96,95	
A7	1	1,07	2,99	1,92	41,64	42,47
	2	1,07	2,93	1,86	43,29	
A8	1	1,07	3,20	2,13	35,26	34,40
	2	1,07	3,25	2,18	33,54	
A9	1	1,07	3,24	2,17	34,04	34,55
	2	1,07	3,20	2,13	35,06	
A10	1	1,07	3,00	2,00	39,21	40,18
	2	1,07	3,00	1,93	41,16	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**NPMRD**

Natural Product Medicine Research & Development  
 Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga  
 Jln. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 62-31-5992445-46 ext 305

**2. SAMPEL B1-B10**

Konsentrasi (µg/ml)	R	% Parasitemia		% Pertumbuhan	% Hambatan	% Hambatan rata-rata
		0 jam	48 jam			
Kontrol (-)	1	1,07	4,36	3,29	-	-
	2	1,07	4,35	3,28	-	
K+	1	1,07	0,49	0	100	100
	2	1,07	0,45	0	100	
B1	1	1,07	0,59	0	100	100
	2	1,07	0,52	0	100	
B2	1	1,07	0,5	0	100	100
	2	1,07	0,48	0	100	
B3	1	1,07	0,78	0	100	100
	2	1,07	0,70	0	100	
B4	1	1,07	0,48	0	100	100
	2	1,07	0,45	0	100	
B5	1	1,07	0,4	0	100	100
	2	1,07	0,42	0	100	
B6	1	1,07	0,60	0	100	100
	2	1,07	0,57	0	100	
B7	1	1,07	0,50	0	100	100
	2	1,07	0,47	0	100	
B8	1	1,07	0,38	0	100	100
	2	1,07	0,30	0	100	
B9	1	1,07	0,45	0	100	100
	2	1,07	0,43	0	100	
B10	1	1,07	3,10	2,03	38,30	39,12
	2	1,07	3,04	1,97	39,94	

Surabaya, 8 Juli 2017

**ALAUDIN**  
 M A K A S A R  
 Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si., Apt.

## BIOGRAFI



Nama Lengkap : Muh. Ihsan H  
Tanggal Lahir : Bontosunggu, 5 Maret 1996  
Umur : 21 Tahun  
Alamat : Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto,  
Kecamatan Polongbangkeng selatan,  
Kabupaten Takalar  
Nomor Hp : 085146045177  
Email : ihsan101114@gmail.com

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Haeruddin dg. Ngalle, dan Ibu Jumriati dg. Te'ne. Pernah menempuh jenjang pendidikan di SDN No. 154 Inp. Bantinoto, dan SMP Negeri 3 Takalar, serta SMA Negeri 3 Takalar. Penulis kini tengah menempuh jenjang pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan menyusun tugas akhirnya. Penulis berharap, serangkaian tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang Farmasi khususnya dan bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan umumnya. Motto dari penulis adalah "*Inna ma'al usri yusro*" "*Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan*".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R