

**UJI AKTIVITAS HEPATOPROTEKTOR AIR REBUSAN TUMBUHAN
SARANG SEMUT (*Myrmecodia pendans*) TERHADAP TIKUS PUTIH
JANTAN (*Rattus norvegicus*) YANG DI INDUKSI
DENGAN PARACETAMOL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

Nur Amirah Reski
NIM.70100113082

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AMIRAH RESKI
Nim : 70100113082
Tempat, Tanggal Lahir : Hila-bila, 16 Mei 1995
Jur./Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Btu Pao-Pao Permai Blok D8 No.4, Gowa
Judul : Uji Aktivitas Hepatoprotektor Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) terhadap Tikus Putih Jantan (*Rattus norvegicus*) yang Diinduksi Paracetamol

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 November 2017

Penyusun,



NUR AMIRAH RESKI

70100113082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Hepatoprotektor Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) Terhadap Tikas Putih Jantan (*Rattus moerhousii*) Yang Diinduksi Dengan Parasetamol" yang disusun oleh Nur Amrullah Reski, NEM: 70100113082, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 November 2017 M yang bertepatan dengan 04 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 November 2017 M
04 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	Dr. dr. H. Andi Arsyin Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	Mukhlis, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	Dr. Hj. Laila Yenny Nanci, M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	Hurris, S.Eam., M.Sc., Apt	(.....)
Penguji I	A. Temugi, S.Sc., M.Si	(.....)
Penguji II	Dr. Abdullah, M.Ag	(.....)


Dekan
Dr. dr. H. Andi Arsyin Nurdin, M.Sc.
NIP. 19630203 198312 1 001

ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Hepatoprotektor Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) terhadap Tikus Putih Jantan (*Rattus novergicus*) yang Diinduksi Paracetamol” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda “Bahtiar” dan Ibunda “Kasmawati” dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
3. Ibu Dr. NurHidayah, S. Kep., Ns., M. Kes., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Ibu Dra. Hj.Faridha Yenny Nonci., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan ibu Hurria, S.Farm., M.Sc., Apt selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
6. Ibu A. Tenriugi, S.Si., M,Si. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
7. Bapak Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
9. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (FAR13ION) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, Sahabat-sahabatku Nita, Uswa,

Nunung, Rina, Andira, Putri, Imma, Tetty, Ayu, Dia, dan Kak Iccank yang sudah setia memberi dukungan, semangat, doa dalam mengerjakan skripsi ini,

11. Temanku Muhammad Ikram yang selalu ada, selalu setia menemani saya dalam pengurusan skripsi ini, hingga bisa selesai, serta

12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian, terimakasih atas kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gowa, November 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah dan Definisi Operasional	5
Ruang Lingkup Penelitian	7
Kajian Pustaka	7
Tujuan Penelitian	9
Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11-31
Uraian Tanaman	11
Uraian Hewan Coba	15
Uraian Rebusan	18
Uraian Hati	19
Enzim Transaminase	25
Uraian Obat	27
Tinjauan Islam	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36-39
Jenis dan Lokasi Penelitian	36
Pendekatan Penelitian	36
Sampel	36
Metode Pengumpulan Data	36
Analisis Data	39
Instrument Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40-41
Hasil Penelitian	40
Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	50
Kesimpulan	50
Saran	50
KEPUSTAKAAN	51-53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54-72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Biologik Tikus	17
2. Perbedaan Infusa, Dekokta dan Rebusan	19
3. Data Hasil Pengamatan Kadar SGPT	40
4. Data Hasil Pengamatan Kadar SGOT	41
5. Konversi dosis hewan coba	59
6. Analisis data	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Kenaikan Kadar SGPT	41
2. Kenaikan Kadar SGOT	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tumbuhan Sarang Semut Yang Utuh.....	67
2. Tumbuhan Sarang Semut Yang Telah Dibelah.....	67
3. Tumbuhan Sarang Semut Yang Telah Dikeringkan	67
4. Proses Perebusan Sarang Semut	68
5. Tikus Putih Yang Digunakan.....	68
6. Bahan Yang Digunakan	68
7. Proses Pengambilan Darah Tikus	69
8. Darah Tikus Yang telah diambil	69
9. Darah Tikus yang disentrifuge.....	69
10. Pemisahan Darah dan Serum Darah.....	70
11. Serum darah yang telah dipisahkan	70
12. Alat Pengukuran SGOT dan SGPT.....	70
13. Pemberian perlakuan secara oral pada tikus	71-72
14. Reagen yang digunakan	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema penyiapan sampel	54
2. Skema perebusan sampel	55
3. Skema pembuatan NaCMC 1%	56
4. Skema pembuatan Suspensi Temulawak	56
6. Skema Pengujian pada Hewan Coba.....	57
7. Perhitungan	58
8. Analisis Data	64
9. Gambar.....	67



ABSTRAK

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Hepatoprotektor Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) Terhadap Tikus Putih Jantan (*Rattus norvegicus*) Yang Di Induksi Parasetamol
Nama Penyusun : Nur Amirah Reski
NIM : 70100113082

Telah dilakukan penelitian dengan judul Uji Aktivitas Hepatoprotektor Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) Terhadap Tikus Putih Jantan (*Rattus norvegicus*) Yang DiInduksi Parasetamol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas rebusan Tumbuhan sarang semut dalam melindungi hati dari kerusakan yang disebabkan oleh paracetamol dengan menggunakan parameter kadar enzim SGPT Dan SGOT.

Tumbuhan sarang semut direbus dengan menggunakan aquadest, kemudian diujikan pada 15 ekor tikus yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif, kontrol positif, ekstrak 100 g/kgBB, 200 g/kgBB, 300 g/kgBB yang diinduksi menggunakan parasetamol 2,5 g/kgBB dan diberi terapi selama 7 hari. Pengukuran kadar SGPT dan SGOT dilakukan pada hari pertama sebelum diterapi. Setelah diterapi dilanjutkan dengan penginduksian parasetamol yang diberikan bersamaan dengan terapi lanjutan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut memiliki aktivitas hepatoprotektor yang ditandai dengan kenaikan kadar enzim SGPT dan SGOT yang tidak terlalu meningkat dari kadar awal enzim SGPT dan SGOT. Dosis air rebusan 100g/kg BB tikus memiliki nilai signifikansi $>0,05$ dengan Temulawak® yang artinya pemberian dosis air rebusan sarang semut 100 g/KgBB tidak berbeda nyata dengan pemberian suspensi Temulawak® pada kenaikan kadar SGPT dan SGOT darah.

Kata kunci: Tumbuhan sarang semut, Hepatoprotektor, SGPT, SGOT

ABSTRACT

Thesis Title : Test Activity Hepatoprotektor Water Rice Plant Ants Nest (Myrmecodia pendans) Against Male Rats (Rattus norvegicus) Parasetamol Induction
Name Composer : Nur Amirah Reski
NIM : 70100113082

A research titled Test Activity Hepatoprotektor Water Rice Plant Ants Nest (Myrmecodia pendans) Against Male Rats (Rattus norvegicus) Parasetamol Induction

This study aims to determine the activity of the ant nest stew Plant in protecting the liver from damage caused by paracetamol using parameter levels of the enzyme SGPT and SGOT.

Plant anthill boiled by using distilled water, and then tested on 15 rats were divided randomly into 5 groups: control group of negative, positive control, extract 100 g/kgBB, 200 g/kgBB, 300 g/kgBB induced using paracetamol 2,5 g/kgBB and were treated for 7 days. Measurement of SGPT and SGOT levels on the first day before treatment. After treatment followed by inducing paracetamol are given in conjunction with continued therapy.

The research proves that the water decoction of herbs Ants Nest has a hepatoprotective activity characterized by increased levels of the enzyme SGPT and SGOT are not too increased from the initial levels of the enzymes SGPT and SGOT. Dosage boiled water 100 g/kgBB mice had significant value > 0.05 Temulawak® which means dosing the cooking water anthill 100 g/KgBB not significantly different from the administration of the suspension Temulawak® on SGPT and SGOT levels rise in the blood.

Keywords: Plant Ants Nest, *Hepatoprotective*, *SGPT*, *SGOT*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hati adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh, yang terletak di bagian atas dalam rongga abdomen di sebelah kanan di bawah diafragma. Hati secara luas dilindungi iga-iga. Fungsi hati bersangkutan dengan metabolisme tubuh. Khususnya mengenai pengaruhnya atas makanan dan darah. Hati merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh dalam hal bahwa ia menjadi "pengantara metabolisme", artinya ia mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan di suatu tempat di dalam tubuh guna dibuat sesuai untuk pemakaiannya di dalam jaringan. Hati juga mengubah zat buangan dan bahan racun untuk dibuat mudah untuk ekskresi ke dalam empedu dan urin (Evelyn, 2009).

Penyakit hati menduduki urutan kedelapan penyebab kematian di Indonesia. Menurut Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi hepatitis tahun 2013 (1,2%) dua kali lebih tinggi dibanding tahun 2007. Dikonversrasi ke dalam jumlah absolut penduduk Indonesia tahun 2013 sekitar 248.422.956 jiwa, maka bisa dikatakan bahwa 2.981.075 jiwa penduduk Indonesia terinfeksi Hepatitis (Balitbangkes RI, 2013).

Paracetamol (acetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem Saraf Pusat (SSP). Paracetamol digunakan secara luas diberbagai negara baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik-antipiretik maupun kombinasi dengan obat lain dalam sediaan obat flu, melalui resep dokter atau yang dijual bebas (Lusiana Darsono, 2002).

Keracunan parasetamol merupakan keracunan obat yang paling sering terjadi terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura. Food and Drug Administration (2009) menyatakan bahwa pada tahun 1998 hingga 2003, parasetamol menjadi penyebab kerusakan hati akut di Amerika Serikat. Sebenarnya dalam dosis terapeutik, penggunaan parasetamol tidak menimbulkan bahaya. Namun efek yang berbahaya muncul pada dosis berlebihan (Dalimartha, 2005).

Kelainan atau kerusakan hati ditandai dengan meningkatnya beberapa parameter biokimia hati yang dapat dilihat di darah seperti aminotransferase (transaminase), alkaline fosfatase, serum protein, dan bilirubin. Enzim golongan aminotransferase yang termasuk parameter adalah enzim golongan aminotransferase seperti alanine aminotransferase (ALT) atau serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) dan aspartate aminotransferase (AST) atau serum glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT) (Chopra, 2001).

Antioksidan merupakan senyawa yang terdapat secara alami dalam bahan pangan. Senyawa ini berfungsi untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan yang disebabkan terjadinya reaksi oksidasi lemak atau minyak yang sehingga bahan pangan yang beraroma dan beraroma tengik (Andarwulan, 1995). Menurut Wildman (2001) antioksidan merupakan agen yang dapat membatasi efek dari reaksi oksidasi dalam tubuh. Secara langsung efek yang diberikan oleh antioksidan dalam tubuh, yaitu dengan mereduksi radikal bebas dalam tubuh, dan secara tidak langsung, yaitu dengan mencegah terjadinya pembentukan radikal. Antioksidan juga mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengan radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan polisakarida (Winarsi, 2007)

Pencegahan kerusakan hati oleh parasetamol dapat dilakukan dengan memakai obat dalam dosis yang dianjurkan serta mengkonsumsi bahan pangan yang memiliki khasiat hepatoprotektor (Dalimartha, 2005).

Hepatoprotektor adalah suatu senyawa obat yang dapat memberikan perlindungan pada hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh obat, senyawa kimia, zat-zat beracun, baik yang berasal dari luar tubuh seperti obat maupun dari sisa metabolisme yang dihasilkan sendiri oleh tubuh akan didetoksifikasi oleh enzim-enzim hati sehingga menjadi zat yang tidak aktif (Anonimus, 2000).

Beberapa tanaman obat yang telah diteliti dan diakui bersifat sebagai hepatoprotektif adalah tanaman kunyit, sambiloto, dan temulawak. Ketiga tanaman tersebut diketahui mengandung antioksidan yang sangat tinggi, dimana antioksidan ini sangat diperlukan dalam menangkal radikal bebas yang merupakan salah satu penyebab kerusakan hati (Tjay dan Rahardja, 2002).

Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Indonesia yang beriklim tropis merupakan negara dengan keanekaragaman hayati kedua di dunia setelah Brazil. Indonesia memiliki sekitar 25.000-30.000 spesies tanaman yang merupakan 80% dari jenis tanaman yang ada di dunia dan 90% dari jenis tanaman di Asia (Dewoto, 2007).

World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan penggunaan obat herbal dalam bidang kesehatan guna melakukan pencegahan serta penanganan suatu penyakit terhadap penyakit kronis serta degeneratif. WHO juga memperkirakan 80% penduduk dunia saat ini bergantung pada penggunaan obat herbal dalam aspek kesehatan primer (WHO, 2015).

Dalam dunia kesehatan banyak dihasilkan berbagai macam obat dan kebanyakan yang diproduksi adalah obat sintetik. Dewasa ini penggunaan obat-obat sintetik beralih ke obat-obatan tradisional melalui pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat. Salah satu tumbuhan yang potensial sebagai tumbuhan obat adalah tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) (Subroto, 2006).

Tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) dianggap mampu mengatasi berbagai penyakit seperti kanker, asam urat, liver, stroke, jantung, wasir (ambien), nyeri punggung, alergi, sebagai tonikum hingga meningkatkan gairah seksual (Subroto, 2006).

Berdasarkan hasil uji penapisan kimia, diketahui tumbuhan sarang semut mengandung senyawa kimia golongan flavonoid dan tanin. Flavonoid merupakan antioksidan alam yang mampu bertindak sebagai pereduksi radikal hidroksil, superoksida dan radikal peroksil. Selain itu juga mengandung 313 ppm tokoferol yang meredam 96% radikal bebas pada konsentrasi 12 ppm. Persentase inhibisi ini tetap konstan sampai pada konsentrasi yang lebih tinggi (Harun, 2002).

Mengingat telah beredarnya produk sarang semut di pasaran dan masih jarang nya publikasi ilmiah dari tanaman ini, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tanaman ini tentang aktivitas hepatoprotektor air rebusan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) terhadap hati tikus putih jantan yang dirusakkan melalui induksi dengan Paracetamol.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai kemampuan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) sebagai hepatoprotektor. Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) bisa menjadi sumber yang berguna untuk obat hepatitis dan gangguan hati lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) sebagai hepatoprotektor pada tikus putih jantan yang diinduksi Paracetamol?
2. Berapa dosis Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) yang memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektor pada tikus putih jantan yang diinduksi paracetamol?
3. Bagaimana pandangan islam tentang pemanfaatan Tumbuhan Sarang semut (*Myrmecodia pendans*) dalam pengobatan?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*)

Tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) merupakan tumbuhan epifit yang bersifat tidak parasit dan telah lama dikenal sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu obat tradisional dan memiliki potensi sebagai antioksidan alami. Tumbuhan yang menyerupai umbi ini berongga pada bagian batang, biasanya tumbuh menempel pada beberapa jenis tumbuhan seperti kayu putih, cemara gunung, kaha dan *beech*. Bagian dalam batang berbentuk rongga bersekat-sekat, menyerupai labirin dan biasa dijadikan tempat tinggal koloni semut. Keunikan tanaman sarang semut terletak pada interaksi semut yang bersarang pada lorong-lorong di dalamnya. Kestabilan suhu di dalamnya membuat koloni semut betah berlama-lama bersarang di dalam tumbuhan ini. Dalam jangka waktu yang lama terjadilah reaksi kimia secara alami antara senyawa yang di keluarkan semut dengan zat yang terkandung di dalam buah sarang semut. Akar tanaman sarang semut tidak berfungsi sebagai penyerap unsur hara, hanya sebagai pengikat terhadap pohon inangnya (Subroto, 2006).

b. Hati

Hati adalah organ tubuh yang berfungsi dalam menetralkan zat toksik yang masuk dalam tubuh, serta menjadi sasaran peningkatan konsentrasi radikal bebas (Halliwell dan Gutteridge 2007).

c. Induksi

Induksi adalah influensi, imbasan atau yang menyebabkan. Dalam penelitian ini induksi parasetamol merupakan tindakan atau proses merangsang atau menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGPT dan SGOT.

d. Parasetamol

Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem Syaraf Pusat (SSP). Parasetamol tergolong analgesik non-narkotik yang hanya mempunyai sedikit efek anti-inflamasi, tetapi banyak digunakan sebagai analgesik ringan dan dapat diabsorpsi dengan baik secara peroral.

e. SGPT (*Serum Glutamic Pyruvic Transaminase*)

SGPT adalah Enzim yang mengkatalis pemindahan satu gugus amino antara lain dan asam alfa ketoglutarat. Enzim SGPT merupakan indikator yang sensitif mengenali adanya penyakit pada hati yang bersifat akut.

f. SGOT (*Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase*)

Enzim ini terdapat dalam sel sel organ tubuh, terutama pada otot jantung baru kemudian pada sel sel hati, otot tubuh, ginjal dan pankreas. SGOT sebagian besar terikat pada organel dan sisanya yang hanya sebagian kecil dalam sitoplasma.

g. Hepatoprotektor

Hepatoprotektor adalah suatu senyawa obat yang dapat memberikan perlindungan pada hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh obat, senyawa

kimia, zat-zat beracun, baik yang berasal dari luar tubuh seperti obat maupun dari sisa metabolisme yang dihasilkan sendiri oleh tubuh akan didetoksifikasi oleh enzim-enzim hati sehingga menjadi zat yang tidak aktif (Hadi, 2000).

h. Aklimatisasi

Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya (Harjanto, 2007).

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada bidang Fitokimia dan Farmakologi yang di mana pengujian dilakukan mulai dari pengolahan sampel yaitu tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) mulai dari tahap rebusan sampel hingga Uji Aktivitas Hepatoprotektor Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) dengan parameter enzim SGPT dan SGOT pada tikus putih jantan yang diinduksi menggunakan Paracetamol. Waktu yang diperlukan kurang lebih 4 minggu.

E. Kajian Pustaka

Oktavia Sri, Cylia Willa Pebriandini et al (2015) dengan judul “Uji Aktivitas Hepatoprotektor Ekstrak Daun Sukun (*Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg) terhadap Kerusakan Hati yang Diinduksi CCl₄”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat aktivitas hepatoprotektor ekstrak daun sukun terhadap kerusakan hati yang diinduksi oleh CCl₄ pada mencit putih jantan dengan parameter penetapan aktivitas SGOT dan SGPT. Aktivitas hepatoprotektor dilihat berdasarkan variasi dosis ekstrak daun sukun (dosis 125 mg/kgBB, 250 mg/kgBB, dan 500mg/kgBB) dan lama waktu pemberian ekstrak (14, 21 dan 28 hari). Hasil penetapan aktivitas SGOT dan SGPT menunjukkan bahwa ekstrak daun sukun dosis 500mg/kgBB dapat menurunkan rata-

rata aktivitas SGOT dan SGPT terbesar dengan persentase penurunan aktivitas sebesar 62,73% dan 60,22%.

Patricia Tatukude, Lily Loho, Poppy Lintong (2014) dengan jurnal penelitian yang berjudul “ Gambaran Histopatologi Hati Mencit Swiss Yang Diberi Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia Pendans*) Paska Induksi Dengan Carbon Tetrachlorida (CCl_4)”. Dalam jurnal penelitian menunjukkan bahwa Pemberian CCl_4 dosis 0,05 ml selama 5 hari menyebabkan steatosis dan nekrosis sel hati serta sel-sel radang. Pemberian air rebusan sarang semut dosis 0,24 cc/hari selama 10 hari menunjukkan regenerasi sel-sel hati dan selama 14 hari tingkat maturasi sel hati lebih baik. Pemberian air rebusan sarang semut dosis 0,48 cc/hari selama 10 hari menimbulkan perlemakan hati secara difus namun pada hari ke 14 terlihat regenerasi sel hati, namun masih tampak steatosis.

Arif Soeksmanto, Partomuan Simanjuntak, Muhammad Ahkam Subroto (2010) dengan jurnal penelitian yang berjudul “Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air Tanaman Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) Terhadap Histologi Organ Hati Mencit”. Dalam jurnal penelitian menunjukkan bahwa Pada pemberian dosis 3750 mg/kg bb keadaan nekrosis dipertahankan hingga hari ke 12, bahkan hingga akhir penelitian hari ke 26 masih menyisakan kelainan berupa vakuolisasi yang disertai infiltrasi sel-sel makrofag dan neutrofil. Meskipun demikian tidak terjadi kematian yang disebabkan oleh pemberian dosis selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini tidak mendapatkan nilai LD50, bahkan tidak dijumpai kematian meskipun menggunakan dosis hingga 3750 mg/kg bb. Diduga ekstrak air tanaman sarang semut cukup aman untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat.

Silaban, GPC Sarai. Institut Pertanian Bogor. 2012. Dengan judul “Uji aktivitas hepatoprotektor ekstrak air pegagan (*Centella asiatica*) terhadap tikus putih

jantan yang diinduksi parasetamol". Dalam penelitian ini diperoleh hasil formula ekstrak air pegagan pada F16 memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga kelangsungan hepatosit normal dan memulihkan hepatosit yang mengalami kerusakan yang ditandai dengan penurunan nilai enzim SGPT, SGOT setelah diinduksi parasetamol. Penulis kemudian menjadikan penelitian ini sebagai salah satu dasar penggunaan parasetamol sebagai penginduksi untuk meningkatkan kadar enzim SGPT, SGOT sehingga terjadi kerusakan hati.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) sebagai hepatoprotektor pada tikus putih jantan yang diinduksi Paracetamol
- b. Untuk mengetahui dosis Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) yang mempunyai aktivitas sebagai hepatoprotektor pada tikus putih jantan yang diinduksi paracetamol
- c. Untuk mengetahui pandangan islam tentang pemanfaatan tumbuhan Sarang semut (*Myrmecodia pendans*) dalam pengobatan

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh air rebusan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) sebagai hepatoprotektor serta dosis air rebusan sarang semut yang mempunyai aktivitas sebagai hepatoprotektor terhadap tikus yang diinduksi dengan paracetamol.

- b. Untuk masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanaman sarang semut dapat digunakan sebagai pelindung hati (hepatoprotektor) dan dapat menambah

pengetahuan masyarakat tentang alternative pengobatan yang lebih terjangkau, aman, dan mempunyai khasiat yang mudah didapatkan.

c. Untuk institusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh air rebusan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) terhadap tikus yang diinduksi dengan paracetamol

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang manfaat Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) sebagai hepatoprotektor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Sarang Semut

1. Klasifikasi Tanaman

Menurut Plantamor (2011) sistematika tumbuhan sarang semut adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae (tumbuhan)
Subkingdom	: Tracheobionta
Superdivisio	: Spermetophyta
Divisio	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Asteridae
Ordo	: Rubiales
Familia	: Rubiaceae
Genus	: <i>Myrmecodia</i>
Spesies	: <i>Myrmecodia pendans</i>

2. Deskripsi

Tanaman sarang semut (*Myrmecodia pendans*) merupakan tumbuhan epifit yang bersifat tidak parasit dan telah lama dikenal sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu obat tradisional dan memiliki potensi sebagai antioksidan alami. Tumbuhan sarang semut tersebar di Semenanjung Malaysia, Filipina, Kamboja, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Papua Nugini, Cape York hingga Kepulauan Solomon (Wikipedia, 2011). Tumbuhan yang menyerupai umbi yang berongga pada bagian batang ini biasanya tumbuh menempel pada beberapa jenis tumbuhan seperti kayu putih, cemara gunung, kaha dan *beech*. Bagian dalam

batang berbentuk rongga bersekat-sekat, menyerupai labirin dan biasa dijadikan tempat tinggal koloni semut. Koloni semut yang tinggal di dalam rongga batang spesies *Myrmecodia pendans* adalah *Ochetellus sp.* Keunikan tumbuhan sarang semut terletak pada interaksi semut yang bersarang pada lorong-lorong di dalamnya. Kestabilan suhu di dalamnya membuat koloni semut betah berlama-lama bersarang di dalam tumbuhan ini. Dalam jangka waktu yang lama terjadilah reaksi kimia secara alami antara senyawa yang di keluarkan semut dengan zat yang terkandung di dalam buah sarang semut. Akar tanaman sarang semut tidak berfungsi sebagai penyerap unsur hara, hanya sebagai pengikat terhadap pohon inangnya (Subroto, 2006).

3. Nama Daerah

Di Indonesia, namanya berbeda - beda. Di Papua, sarang semut disebut sebagai nongon. Di Jawa dikenal sebagai urek - urek polo. Sedangkan di Sumatera disebut kepala beruk dan rumah semut (Subroto, 2006).

4. Morfologi

Batang. Batangnya jarang ada yang bercabang, jika ada hanya satu atau beberapa cabang saja. Bahkan ada beberapa spesies yang tidak memiliki cabang sama sekali. Batangnya tebal dan internodalnya sangat dekat, kecuali pada pangkal sarang semut dari beberapa spesies.

Daun. Daunnya tebal seperti kulit. Pada beberapa spesies memiliki daun yang sempit dan panjang. Stipula (penumpu) besar, persisten, terbelah dan berlawanan dengan tangkai daun (petiol), serta membentuk seperti “telinga” pada kliepeoli. Terkadang terus berkembang menjadi sayap di sekitar bagian atas kliepeolus.

Bunga. Pembungaan dimulai sejak adanya beberapa ruas (intermodal) pada tiap-tiap nodus (buku). Dua bagian pada setiap bunga berkembang pada suatu kantong udara (alveolus) yang berbeda. Alveoli tersebut mungkin ukurannya tidak

sama dan terletak pada tempat yang berbeda di batang. Kuntum bunga muncul pada dasar alveoli. Setiap bunga berlawanan oleh suatu brakteola. Bunga jarang kleistogamus (menyerbuk tidak terbuka) dan terkadang heterostilus. Kelopak biasanya terpotong. Polennya 1-, 2-, atau 3- porat (kolporat) dan sering 1,2,atau 3 visikel sitoplasma yang besar. Buah berkembang dalam alveolus dan memanjat pada dasarnya menjadi menonjol keluar hanya setelah masak (Subroto, 2006).

Tumbuhan ini dapat melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan banyak buah beri yang berwarna merah atau orange ketika masak yang di dalamnya terdapat sepasang biji. Biji-biji tersebut dapat tumbuh pada media yang sesuai dan akan berkecambah dengan cepat. Biji yang kering dan tua tidak akan berkecambah (Subroto, 2006).

Bagian hipokotil akan membengkak dengan cepat ketika biji berkecambah. Ketika berumur beberapa bulan bagian ini akan membentuk lubang-lubang. Pencahayaan sangat diperlukan selama masa perkecambahan, bila tidak tanaman akan tumbuh memanjang, bagian bonggolnya menciut, dan daunnya akan sangat banyak. Saat ini perbanyak tumbuhan sarang semut dapat diperbanyak melalui kultur jaringan. Tumbuhan ini merupakan tanaman sukulen, yaitu tanaman yang dapat menyimpan cadangan air pada jaringannya dan memiliki morfologi berdaging (seperti kaktus dan lidah buaya) sehingga sangat toleran terhadap kekeringan. Penyiraman sebaiknya dilakukan dua hari sekali atau pada malam hari saja, ketika hendak melakukan penyiraman pastikan tanaman dalam keadaan yang kering, bila terlalu sering disiram maka akan terjadi pembusukan yang menyebabkan tumbuhan mati. Pemupukan dapat dilakukan 2 atau 3 minggu sekali, dan sebaiknya menggunakan pupuk organik seperti kompos. Pada habitat liar tumbuhan ini memperoleh pupuk dari debris atau sampah yang diperoleh dari hasil simbiosis

mutualisme tumbuhan sarang semut dengan semut yang menghuninya (Subroto, 2006)

5. Manfaat Tanaman

Sarang semut selain mampu mencegah dan mengobati kanker juga efektif membantu penyembuhan penyakit gangguan jantung, ambien (wasir), rematik, stroke, maag, gangguan fungsi, prostat, pegal linu, melancarkan ASI, migren, melancarkan pembuluh darah, lever, memulihkan gairah seksual, mampu menghambat enzim xantin oksidan yang memicu asam urat dan radikal bebas (Subroto, 2006)

6. Kandungan Kimia

Berdasarkan hasil uji penapisan kimia, diketahui tanaman sarang semut mengandung senyawa kimia golongan flavonoid dan tanin. Flavonoid merupakan antioksidan alam yang mampu bertindak sebagai pereduksi radikal hidroksil, superoksida dan radikal peroksil. Selain itu juga mengandung 313 ppm tokoferol yang meredam 96% radikal bebas pada konsentrasi 12 ppm. Persentase inhibisi ini tetap konstan sampai pada konsentrasi yang lebih tinggi (Subroto, 2006).

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Tikus Putih

Sistem klasifikasi tikus putih menurut Ruedas (2008) adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Kelas	: Mammalia
Ordo	: Rodentia
Subordo	: Sciurognathi
Famili	: Muridae
Subfamili	: Murinae
Genus	: <i>Rattus</i>
Spesies	: <i>Rattus norvegicus</i>

2. Karakteristik Tikus Putih

Hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah tikus. Secara garis besar fungsi dan bentuk organ serta proses biokimia dan biofisik antara tikus dan manusia memiliki banyak kemiripan sehingga dapat diaplikasikan pada manusia. Spesies tikus yang paling sering digunakan sebagai hewan model pada penelitian mengenai manusia maupun mamalia lain adalah tikus putih (*Rattus norvegicus*) (Harmita & Radji, 2010).

Menurut Malole dan Pramono (1989), keunggulan tikus putih sebagai hewan percobaan karena siklus hidupnya yang relatif pendek dan dapat berkembangbiak dengan cepat. Hewan ini berukuran kecil sehingga pemeliharaannya relatif mudah serta relatif sehat sehingga cocok untuk berbagai penelitian.

Dibandingkan dengan tikus liar, tikus laboratorium lebih cepat dewasa, tidak memperlihatkan perkawinan musiman, dan umumnya lebih mudah berkembang biak.

Jika tikus liar dapat hidup 4-5 tahun, tikus laboratorium jarang hidup lebih dari 3 tahun. Umumnya berat badan tikus laboratorium lebih ringan daripada tikus liar. Biasanya pada umur empat minggu, berat badan tikus liar mencapai 40-50 g dan setelah dewasa sampai 300 g atau lebih, sedangkan tikus laboratorium pada umur empat minggu, beratnya hanya 35-40 g dan berat dewasa rata-rata 200-250 g, tetapi bervariasi tergantung pada galur. Tikus jantan tua dapat mencapai 500 g tetapi tikus betina jarang yang lebih dari 350 g. Galur yang paling besar ukuran tubuhnya adalah galur *Sprague Dawley* yang hampir sebesar tikus liar. Ada dua sifat yang membedakan tikus dari hewan percobaan lain, yaitu tikus tidak dapat muntah karena struktur anatominya yang tidak lazim di tempat esofagus bermuara ke dalam lambung (Harmita & Radji, 2010).

Tikus terutama yang muda memiliki jaringan lemak berwarna coklat di bagian leher sampai scapula yang jumlahnya berkurang setelah 14 dewasa. Tikus dapat dikandang bersama dalam satu kelompok besar yang terdiri dari jantan dan betina dari berbagai tingkat tanpa terjadinya perkawinan. Tikus dapat hidup lebih dari tiga tahun dan produktif untuk berkembangbiak selama lebih dari sembilan bulan atau sampai usia satu tahun (Harmita & Radji, 2010).

Tabel 1. Data biologik tikus (Harmita & Radji, 2010)

- Konsumsi pakan per hari	5 g/100 g bb
- Konsumsi air minum per hari	8-11 ml/100 g bb
- Diet protein	12%
- Ekskresi urine per hari	5,5 ml/100 g bb
- lama hidup	2,5- 3 tahun
- Bobot badan dewasa	
-Jantan	300-400 g
-Betina	250-300 g
- Bobot lahir	5-6 g
-Dewasa kelamin (jantan=betina)	50 \pm 10 hari
- Siklus estrus (menstruasi)	5 hari (polyestrus)
- Umur sapih	21 hari, 40-50 g
- Mulai makan pakan kering	12 hari
- Rasio kawin	1 jantan – 3 atau 4 betina
- Jumlah kromosom	42
- Suhu rektal	37,5°C
- Laju respirasi	85 x/mn
- Denyut jantung	300 – 500 x/mn
- Pengambilan darah maksimum	5,5 ml/Kg
-Jumlah sel darah merah (Erytrocyt)	7,2-9,6 X 10 ⁶ / μ l
- Kadar haemoglobin(Hb)	15,6 g/dl
- Pack Cell Volume (PCV)	46%
- Jumlah sel darah putih (Leucocyte)	14 10 ³ / μ l

3. Teknik Handling (Harmita & Radji, 2010)

a. Handling

- 1) Tikus diletakkan diatas ram kawat, kemudian ditarik sedikit
- 2) Ekor dipegang di daerah tengah ekor dengan tangan kiri
- 3) Tikus diangkat dan digoyang – goyangkan

b. Restrain

- 1) Ekor dipegang di daerah tengah ekor

- c. Jari telunjuk dan ibu jari tangan lain memegang kuduk, jari kelingking menjepit ekor (sebaiknya dengan tangan kiri) Pengambilan darah

Pengambilan sampel darah pada tikus dilakukan pada vena lateralis ekor, dengan cara buat lubang pada vena lateralis ekor. Setelah darah keluar, masukkan mikrohematokrit, diputar sedikit, biarkan darah mengalir.

C. Uraian Rebusan

1. Rebusan

Rebusan merupakan cara yang penyarian yang sedikit berbeda dengan infuse dan dekok. Rebusan dilakukan menggunakan panas yang bersumber dari api lnsung bukan dari penangas air seperti infuse dan dekok. Waktu ekstraksi biasanya lebih lama, namun lamanya ekstraksi belum ada literature pasti yang menentukannya. Umumnya ekstraksi dihentikan bila miscela sudah mencapai $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah awal atau 2-3 bagian pelarut menghasilkan satu bagian ekstrak. Miscella adalah pelarut yg sdh terlarut didalamnya hasil ekstrak. Jumlah simplisia disesuaikan dengan dosis simplisia masing-masing. Waktu yang diperlukan menurut percobaan berkisar antara 45-60 menit dihitung mulai air mendidih. Cara ini terbatas untuk simplisia yang tahan pemanasan atau yang tidak mudah rusak karena pemanasan karena suhu ekstraksi mencapai 100°C (Anonim, 2013).

Perbedaan infuse, dekok, dan rebusan antara lain :

Tabel 2. Perbedaan Infusa, Dekok dan Rebusan

Hal yang membedakan	Infusa	Dekok	Rebusan
Suhu	90-98°C	90-98°C	100°C
Waktu ekstraksi	15 menit (dari suhu mencapai 90°C)	30 menit (dari suhu mencapai 90°C)	45-60 menit (dari suhu mencapai 100°C) atau 2-3 bagian menjadi 1 bagian
Hasil akhir ekstrak	ditambahkan pelarut sampai 100 bagian	ditambahkan pelarut sampai 100 bagian	tidak ditambahkan pelarut
Sumber panas	penangas air	penangas air	api langsung

D. Uraian Hati

1. Anatomi Hati

Hepar atau hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Letaknya sebagian besar di regio hipokondrika dekstra, epigastrika dan sebagian kecil di hipokondrika sinistra. Bentuknya menyerupai pahat yang menghadap ke kiri. Beratnya pada pria dewasa antara 1,4-1,6 kg (1/36 berat badan), sedangkan pada wanita dewasa antara 1,2-1,4 kg. Ukuran hepar normal pada orang dewasa : panjang kanan-kiri = 15 cm, tinggi bagian yang paling kanan (ukuran superior-inferior) = 15-17 cm, tebal (ukuran anteroposterior) setinggi ren dekstra = 12-15 cm. Warna permukaan hati adalah coklat kemerahan. Konsistensinya padat kenyal. Hepar mempunyai 5 permukaan, yaitu fasies superior, fasies dekstra, fasies anterior, fasies posterior, dan fasies inferior (Sulaiman, ali, 2012).

Hepar mendapat darah dari dua macam peredaran darah yaitu vena porta dan arteria hepatica. Vena porta menerima aliran darah dari saluran cerna, limpa dan pankreas. Darah vena porta ini berbeda dengan darah vena lain karena:

- a. Tekanan sedikit lebih tinggi, untuk mengatasi tekanan pada sinusoid hepar
- b. Oksigen lebih tinggi, karena aliran darah splanknikus ini relative lebih banyak
- c. Mengandung lebih banyak zat makanan
- d. Mengandung banyak sisa-sisa bakteri dari saluran pencernaan.

Volume total darah yang melalui hati 1.200-1.500 mL tiap menit dan dialirkan melalui vena hepatica kanan dan kiri yang mengosongkannya ke vena kava inferior (Dharmawati, 2012).

Darah dari lambung dan usus dialirkan terlebih dahulu ke hati melalui vena porta sebelum diedarkan ke sistem sirkulasi. Dengan demikian hati menjadi organ pertama yang berhadapan dengan berbagai materi yang diingesti tubuh seperti sari-sari makanan, vitamin, logam, obat-obatan, dan toksikan yang berasal dari lingkungan. Serangkaian proses fisiologis yang terjadi di sel-sel hati mengekstraksi materi-materi tersebut dari darah untuk selanjutnya dikatabolisme, disimpan, atau diekskresikan melalui getah empedu (Corwin, 2010).

2. Fungsi Hati

Hati adalah organ viseral (dalam rongga abdomen) terbesar yang terletak di bawah kerangka iga. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah dan kaya nutrient dari vena portal dan vena hepatica.

Fungsi hati adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Metabolik

Metabolisme asimilasi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan produksi energi. Seluruh monosakarida akan diubah menjadi glukosa. Pengaturan glukosa

dalam darah terjadi di hati. Pembentukan asam lemak dan lipid serta pembentukan fosfolipid terjadi di hati. Metabolisme protein serta pembentukan albumin dan globulin juga terjadi di hati.

b. Fungsi Ekskretori

Produksi empedu oleh sel hati (bilirubin, kolesterol, dan garam empedu), ke dalam empedu juga diekskresikan zat yang berasal dari luar tubuh seperti logam-logam berat, bermacam zat warna, dan lain-lain.

c. Fungsi Pertahanan Tubuh

Detoksikasi racun siap untuk dikeluarkan, melakukan fagositosis terhadap benda asing langsung membentuk antibodi. Bila hati rusak, maka berbagai racun akan meracuni tubuh. Beberapa macam cara mendetoksikasikan racun misalnya: pembentukan urea dari amoniak atau zat beracun dioksidasi (dikeluarkan) direduksi (dipindahkan) dihidrolisis (pemecahan) dengan zat-zat yang lain untuk mengurangi toksik dari racun tersebut.

d. Pengaturan dalam Peredaran Darah

Berperan membentuk darah dan heparin di hati dan mengalirkan darah ke jantung. Dalam hati, sel darah merah akan rusak karena terdapat sel-sel Retikulo Endotelium Sistem (RES). Perusakan ini juga terjadi dalam limpa dan sum-sum tulang.

e. Hati membentuk Asam Empedu

Terutama dari kolesterol membentuk pigmen-pigmen empedu terutama dari hasil perusakan hemoglobin (Syarifuddin, 2009).

f. Penyimpanan Vitamin

Hati mempunyai kecenderungan tertentu untuk menyimpan vitamin dan telah lama diketahui sebagai sumber vitamin yang baik untuk pengobatan pasien. Vitamin yang terbanyak disimpan dalam hati adalah vitamin A, tetapi sejumlah besar vitamin D dan B1-2 dalam keadaan normal juga disimpan. Kecuali besi dalam hemoglobin darah, sebagian besar besi tubuh biasanya disimpan di hati dalam bentuk ferritin. Sel hati berisi sejumlah besar protein yang disebut apoferritin yang dapat bergabung dengan besi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, maka besi akan berikatan dengan apoferritin membentuk ferritin dan disimpan dalam bentuk ini sampai diperhatikan. Hati membentuk berbagai bahan yang sangat diperlukan untuk proses pembekuan darah. Bahan-bahan tersebut adalah fibrinogen protrombin dan beberapa faktor pembekuan lainnya.

g. Fungsi Sintesis

Sintesis adalah penyusunan atau pembuatan suatu senyawa dari zat atau molekul yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Fungsi sintesis hati antara lain pembuatan protein dan lipoprotein plasma (Smeltzer, 2011).

3. Kerusakan Pada Hati

Kerusakan hati dapat berupa perlemakan hati, nekrosis, kolestatis dan sirosis hati (Cotran & Robbins, 2011).

a. Perlemakan Hati (Steatosis)

Perlemakan hati adalah penumpukan lemak lebih dari 5% pada organ hati. Penyebab perlemakan hati terdiri dari dua faktor utama. Pertama berhubungan dengan peningkatan kadar asam lemak bebas dalam plasma yang terjadi akibat mobilisasi lemak dari jaringan adiposa atau dari hidrolisis triasilgliserol lipoprotein oleh lipase sensitif hormon di jaringan ekstrahepatik. Pembentukan VLDL (Very

Low Density Lipoprotein) tidak dapat mengimbangi meningkatnya influx dan esterifikasi asam lemak bebas sehingga terjadi penumpukan triasilgliserol yang menyebabkan perlemakan hati. Kedua, karena adanya penghambat metabolik dalam produksi lipoprotein plasma sehingga terjadi penimbunan triasilgliserol (Cotran & Robbins, 2011).

b. Nekrosis Hati

Nekrosis merupakan kematian sel hati yang ditandai dengan rusaknya struktur lobulus hati. Manifestasi dari toksikan yang berbahaya dapat menimbulkan nekrosis. Perubahan biokimia yang terjadi bersifat kompleks dan berbagai hepatotoksikan bekerja melalui berbagai mekanisme. Mekanisme terjadinya nekrosis diantaranya hepatotoksikan secara kovalen mengikat protein dan lipid tidak jenuh dan menyebabkan peroksidasi lipid.

c. Kolestasis

Kolestatis merupakan kerusakan hati yang bersifat akut disebabkan karena aktivitas ekskresi empedu pada membran kanalikuli biliaris. Penyakit kolestatis lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan perlemakan hati dan nekrosis.

d. Sirosis Hati

Sirosis ditandai oleh adanya septa kolagen yang tersebar di sebagian hati. Kumpulan hepatosit muncul sebagai nodul yang dipisahkan oleh lapisan seberat ini. Beberapa karsinogen kimia dan pemberian CCl_4 jangka panjang dapat menyebabkan sirosis pada hewan. Pada manusia penyebab sirosis yang paling penting adalah konsumsi kronis minuman beralkohol. Mekanisme penyakit hati akibat konsumsi alkohol masih belum pasti, diperkirakan mekanismenya yaitu sel hati mengalami fibrosis dan destruksi protein yang berkepanjangan akibat metabolisme alkohol yang menghasilkan acetaldehyde. Fibrosis yang terjadi merangsang pembentukan kolagen.

Regenerasi sel tetap terjadi tetapi tidak dapat mengimbangi kerusakan sel. Penimbunan kolagen terus berlanjut, ukuran hati mengecil, berbenjol-benjol dan mengeras sehingga terjadi sirosis hati.

4. Evaluasi Kerusakan Hati

- a. Patologi makroskopik warna dan penampilan sering dapat menunjukkan sifat toksisitas, seperti perlemakan hati atau sirosis. Biasanya berat organ merupakan petunjuk yang sangat peka dari efek pada hati. Dalam kasus tertentu peningkatan berat hati merupakan kriteria paling peka untuk toksisitas.
- b. Pemeriksaan mikroskopik cahaya dapat mendeteksi berbagai jenis kelainan histologi seperti perlemakan, nekrosis, sirosis, nodul hiperplastik dan neoplasia. Mikroskopi elektron dapat mendeteksi perubahan dalam berbagai struktur subset. Pengamatan perubahan subset, serta penemuan biokimia, sering berguna untuk menggambarkan cara kerja toksikan.
- c. Uji biokimia beberapa enzim serum sebagai indikator kerusakan hati, bila terjadi kerusakan hati, enzim ini dilepaskan ke dalam darah dari sitosol dan organel sebasei, seperti mitokondria, lisosom dan nukleus. Enzim tertentu meningkat dengan nyata pada keadaan kolestatik, tetapi hanya meningkat sedikit pada nekrosis hati. Pemeriksaan berbagai enzim serum terutama enzim transaminase yang terdiri dari enzim SGPT dan SGOT, terbukti paling praktis sebagai indikator untuk mengukur banyaknya kerusakan hati. Enzim serum lain yang digunakan untuk menilai penyakit hati adalah bilirubin serum, urobilinogen, alkali fosfat dan α -nukleotidase.
- d. Sifat toksisitas umumnya hepatotoksikan mengganggu struktur membran retikulum endoplasma, menurunkan kandungan sitokrom P-450, menurunkan

aktivitas metabolisme obat, dan meningkatkan jumlah rantai samping asli jenuh (Sacher & Mc Person, 2002).

E. Enzim Transaminase

Transaminase adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari suatu asam amino kepada asam amino yang lain. Dalam reaksi transaminase ini gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam piruvat, oksaloasetat dan α -ketoglutarat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Enzim transaminase di dalam serum tidak mempunyai fungsi, karena di dalam serum tidak terdapat koenzim serta substrat yang tepat. Enzim transaminase yang terdapat dalam serum merupakan indikator terjadinya kerusakan jaringan pada penyakit tertentu (Sacher & Mc Person, 2002).

Hepar sendiri mampu mensekresikan enzim-enzim transaminase disaat sel-selnya mengalami gangguan. Kadar transaminase yang tinggi biasanya menunjukkan kelainan dan nekrosis hati. Enzim-enzim tersebut masuk dalam peredaran darah. Transaminase merupakan indikator yang peka pada kerusakan sel-sel hati (Husadha, 1996). Enzim-enzim tersebut adalah:

1. *Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase (SGOT)/ Aspartat Amino Transaminase (AST)*

AST adalah enzim mitokondria yang juga ditemukan dalam hati, jantung, ginjal, dan otak. Bila jaringan tersebut mengalami kerusakan yang akut, kadarnya dalam serum meningkat. Diduga hal ini disebabkan karena bebasnya enzim intraseluler dari sel-sel yang rusak ke dalam sirkulasi. Kadar yang sangat meningkat terdapat pada nekrosis hepatoseluler atau infark miokard (Hadi, 1995).

AST melakukan reaksi antara asam aspartat dan asam-ketoglutamat. AST berada dalam sel parenkim hati. AST meningkat pada kerusakan hati akut, tetapi juga terdapat dalam sel darah merah dan otot skelet. AST berfungsi untuk mengubah aspartat dan asam-koteglutamat menjadi oksaloasetat dan glutamat. Terdapat 2 isoenzim, yaitu AST 1 merupakan isoenzim sitosol yang terutama berada dalam sel darah merah dan jantung. Kemudian AST 2 merupakan isoenzim mitokondria yang predominan dalam sel hati. Kadar normal dalam darah 10-40 U/liter. Meningkatkan tajam ketika terjadi perubahan infark miokardium (Sacher dan Mc Person, 2002).

2. *Serum Glutamat Piruvat Transaminase (SGPT)/ Alanin Amino Transferase (ALT)*

Enzim ini mengkatalisis pemindahan 1 gugus amino antara lain alanin dan asam alfa ketoglutarat. Terdapat banyak di hepatosit dan konsentrasinya relatif rendah di jaringan lain. Kadar normal dalam darah 5-35 U/liter dan ALT lebih sensitif dibandingkan AST (Sacher dan McPerson, 2002).

Kadar SGPT dan SGOT serum meningkat pada hampir semua penyakit hati. Kadar yang tertinggi ditemukan dalam hubungannya dengan keadaan yang menyebabkan nekrosis hati yang luas, seperti hepatitis virus yang berat, cedera hati akibat toksin, atau kolaps sirkulasi yang berkepanjangan. Peningkatan yang lebih rendah ditemukan pada hepatitis akut ringan demikian pula pada penyakit hati kronik difus maupun lokal. Kadar mendadak turun pada penyakit akut, menandakan bahwa sumber enzim yang masih tersisa habis. Kalau kerusakan oleh radang hati hanya kecil, kadar SGPT lebih dini dan lebih cepat meningkat dari kadar SGOT (Podolsky dan Isselbacher, 2000).

F. Uraian Obat

Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem Syaraf Pusat (SSP). Parasetamol digunakan secara luas di berbagai negara baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik-antipiretik maupun kombinasi dengan obat lain dalam sediaan obat flu, melalui resep dokter atau yang dijual bebas. (Lusiana Darsono, 2002).

Parasetamol telah lama diketahui mempunyai mekanisme yang sama dengan aspirin oleh karena persamaan struktur kedua zat tersebut. Parasetamol bekerja menghambat enzim cyclooxygenase (COX) sehingga dapat mengurangi produksi prostaglandin, yang terlibat di dalam proses demam dan sakit. Bagaimanapun, ada perbedaan penting antara efek aspirin dan parasetamol. Aspirin mengandung prostaglandin yang berperan di dalam proses peradangan, tetapi parasetamol tidak dapat berfungsi sebagai antiinflamasi. Selain itu, aspirin bekerja menghambat enzim COX yang tidak dapat diubah, secara langsung menghalangi lokasi aktif enzim dan mempunyai efek merugikan pada lapisan perut. Parasetamol secara tidak langsung menghalangi enzim COX sehingga menjadi tidak efektif terhadap peroksida. Hal ini menyebabkan parasetamol menjadi efektif bekerja pada susunan saraf pusat dan sel endotel, tetapi bukan pada platelet dan sel imun yang mempunyai tingkat peroksida tinggi (Katzung, 2010).

1. Farmakokinetik

Parasetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu $\frac{1}{2}$ jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam (Freddy, 2007). Parasetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diubah

menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung, 1997).

2. Farmakodinamik

Parasetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek analgetiknya serupa salisilat yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol merupakan penghambat biosintesa PG yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan perdarahan lambung tidak terlihat dengan obat ini, demikian juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa (Freddy, 2007).

3. Efek Samping

Reaksi alergi terhadap parasetamol jarang terjadi, manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa (Freddy, 2007). Pada dosis terapi, kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati dalam darah tanpa disertai ikterus; keadaan ini reversibel bila obat dihentikan (Katzung, 1997). Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang tidak reversibel (Tjay, 2002).

Parasetamol merupakan salah satu obat yang paling sering menyebabkan kematian akibat keracunan (self poisoning). Toksisitas parasetamol terjadi pada penggunaan dosis tunggal 10 sampai 15 gram (150 sampai 250 mg/kg BB); dosis 20 sampai 25 gram atau lebih kemungkinan menyebabkan kematian (Goodman dan Gilman, 2008; Wilmana dan Gunawan, 2007). Sedangkan dosis toksik untuk mencit atau LD50 mencit adalah 6,76 mg/20 gr BB mencit (Wishart dan Knox, 2006). Akibat dosis toksik yang paling serius adalah nekrosis hati, walaupun nekrosis tubuli renalis dan koma hipoglikemik juga dapat terjadi. Sekitar 10% pasien yang

mengalami keracunan yang tidak mendapatkan penanganan khusus mengalami kerusakan hati yang parah; sebanyak 10-20% di antaranya akhirnya meninggal karena kegagalan fungsi hati. Gagal ginjal akut juga terjadi pada beberapa pasien (Goodman dan Gilman, 2008).

4. Dosis

Oral: dewasa tiap 3-4 jam 325-650 mg, maksimum 4 g sehari. Untuk anak: 10-20 mg/kgBB/dosis per oral/1x pemberian, maksimal 5x pemberian/ hari atau 80 mg/kgBB/hari (Chan dan Gennrich, 2004).

5. Interaksi

Parasetamol memperkuat daya kerja antikoagulan, antidiabetika oral, dan metotreksat. Efek obat encok probenesid dan sulfinpirazon berkurang bila disertai dengan penggunaan parasetamol, begitu pula dengan diuretika furosemid dan spironolakton. Kerja analgetiknya diperkuat oleh antara lain kodein dan d-propoksifen. Penggunaan alkohol disertai parasetamol akan meningkatkan resiko perdarahan lambung usus. Karena efek antitrombotiknya yang mengakibatkan perdarahan meningkat, penggunaan parasetamol perlu dihentikan satu minggu sebelum pencabutan gigi (Tjay, 2002).

6. Mekanisme Hepatotoksik Parasetamol

Pemberian parasetamol secara oral dengan penyerapan yang cepat dan hampir sempurna di saluran pencernaan. Penyerapan dihubungkan dengan tingkat pengosongan lambung, dan konsentrasi dalam plasma mencapai puncak dalam 30 sampai 60 menit (Katzung, 2002). Waktu paruh dalam plasma 1 sampai 3 jam setelah dosis terapeutik dengan 25% parasetamol terikat protein plasma dan sebagian dimetabolisme enzim mikrosom hati (Wilmana dan Gunawan, 2007). Hati merupakan tempat metabolisme utama parasetamol. Di dalam hati,

60% dikonjugasikan dengan asam glukuronat, 35% asam sulfat, dan 3% sistein; yang akhirnya menghasilkan konjugat yang larut dalam air serta diekskresi bersama urin. Jalur konjugasi pertama (terutama glukuronidasi dan sulfasi) tidak dapat digunakan lagi ketika asupan parasetamol jauh melebihi dosis terapi dan sebagian kecil akan beralih ke jalur sitokrom P450 (CYP2E1) (Defendi dan Tucker, 2009; Goodman dan Gilman, 2008).

Metabolisme melalui sitokrom P450 membuat parasetamol mengalami N-hidroksilasi membentuk senyawa antara, N-acetyl-para-benzoquinoneimine (NAPQI), yang sangat elektrofilik dan reaktif. Pada keadaan normal, senyawa antara ini dieliminasi melalui konjugasi dengan glutathione (GSH) yang berikatan dengan gugus sulfhidril dan kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi suatu asam merkapturat yang selanjutnya diekskresi ke dalam urin. Ketika terjadi overdosis, kadar GSH dalam sel hati menjadi sangat berkurang yang berakibat kerentanan sel-sel hati terhadap cedera oleh oksidan dan juga memungkinkan NAPQI berikatan secara kovalen pada makromolekul sel, yang menyebabkan disfungsi berbagai sistem enzim (Goodman dan Gilman, 2008). Ikatan kovalen dengan makromolekul sel terutama pada gugus tiol protein sel dan kerusakan oksidatif juga merupakan patogenesis utama terjadinya nefropati analgesik (Cotran *et al.*, 2007; Neal, 2006).

Rangkaian metabolisme minor parasetamol ini dapat menyebabkan efek merugikan. Pengurangan GSH secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya stres oksidatif akibat penurunan proteksi antioksidan endogen (antioksidan enzimatik), yang juga dapat menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid (Maser *et al.*, 2002). Peroksidasi lipid merupakan suatu proses autokatalisis yang mengakibatkan kematian sel. Produk akhir peroksidasi lipid di dalam tubuh

adalah malondialdehid (MDA) yang dapat menyebabkan kematian sel akibat proses oksidasi berlebihan dalam membran sel (Mayes, 2008; Winarsi, 2007). Selain itu, reaksi pembentukan NAPQI akibat detoksifikasi oleh sitokrom P450 memacu terbentuknya radikal bebas superoksida (O_2^-) yang dinetralkan oleh superoksida dismutase (SOD) menjadi H_2O_2 , suatu Reactive Oxygen Species (ROS) (Ojo *et al.*, 2006). Namun, melalui reaksi Haber-Weiss dan Fenton, adanya logam transisi seperti Cu dan Fe akan membentuk radikal hidroksil yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan struktur sel (Winarsi, 2007).


7. Dosis Toksik

Parasetamol dosis 140 mg/kg pada anak-anak dan 6 gram pada orang dewasa berpotensi hepatotoksik. Dosis 4g pada anak-anak dan 15g pada dewasa dapat menyebabkan hepatotoksitas berat sehingga terjadi nekrosis sentrolobuler hati. Dosis lebih dari 20g bersifat fatal. Pada alkoholisme, penderita yang mengkonsumsi obat-obat yang menginduksi enzim hati, kerusakan hati lebih berat, hepatotoksik meningkat karena produksi metabolit meningkat.

G. Tinjauan Islam

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 7




Terjemahnya: “Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik ?

Dari ayat tersebut dapat dipahami adanya perintah kepada manusia untuk memperhatikan bumi, yang mana dapat diartikan sebagai perintah untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit.

Ayat ini membuktikan keniscayaan keESAan Allah swt., karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2002).

Kaum musyrikin enggan percaya dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi, berapa banyak kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat (Shihab 2002).

Untuk dapat mengetahui tentang pengobatan terhadap penyakit maka dibutuhkan penelitian-penelitian terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah swt baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan dan lainnya. Firman Allah swt dalam QS Al-Yunus/10 : 101





Terjemahnya : “Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dengan mata, kepala dan hati masing-masing tentang makhluk atau sistem kerja yang ada di langit dan di bumi. Sungguh banyak yang dapat kamu perhatikan satu diantaranya saja. Bila kamu menggunakan akalmu yang dianugerahkan Allah swt, sudah cukup untuk mengantarkan kamu semua beriman dan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Dia Maha Esa dan dia membimbing manusia antara lain melalui para nabi guna mengantar mereka ke jalan bahagia (Shihab 2002).

Allah swt. memberi pengarahannya kepada hamba-hamba-Nya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal. Apa yang Allah turunkan darinya berupa hujan, maka ia menghidupkan bumi setelah matinya, mengeluarkan darinya pohon-pohon dan buah-buahan, tanaman-tanaman, bunga-bunga dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Apa yang Allah ciptakan padanya dari binatang-binatang yang beragam bentuk, warna dan manfaatnya (Abdullah, 2004).

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah swt atas hamba-hambaNya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan Allah swt menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dari kesalahan mereka.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 80.



Terjemahnya: “*Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.*”

Ayat tersebut disandarkan penyakit kepada dirinya (Nabi Ibrahim as.), sekalipun hal itu merupakan qadar, qadha dan ciptaan Allah. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Makna hal itu berarti, jika aku menderita sakit, maka tidak ada seorang pun yang kuasa menyembuhkanku selain-Nya sesuai takdirNya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Abdullah, 2004).

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah swt. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh dan ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah swt.

Hadis Nabi Muhammad saw bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadist Abu Zubair, dari Zabir bin Abdillah dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya :

“*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula*” (H.R. Al-Bukhari).

Hadis di atas, dijelaskan bahwa penyakit berasal dari Allah, maka obatnya pun berasal dari Allah. Hal ini tentunya menjadi penyemangat bagi kita dalam mencari obat yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh dan adapula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah SWT.

Sanad secara bahasa berarti sandaran atau tempat bersandar atau sesudah sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Bentuk jamak *sanad* adalah *asnad* atau *sanadat* yang berarti *jalan*. Secara bahasa, *matan* berarti membelah, mengeluarkan, mengikat, seperti mengikat busur dengan tali. *Matan* juga berarti punggung jalan (muka jalan), tanah yang keras dan tinggi. *Rawi* adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. *Rawi* pertama adalah seorang sahabat dan *rawi* terakhir adalah orang yang membukukan, seperti Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad, dan sebagainya. Sanad dari hadis di atas adalah Abu Zubair, Zahir bin Abdullah, matannya yaitu isi dari hadis tersebut, sedangkan *Rawinya* adalah H.R Bukhari Muslim.

Dalam penelitian ini, maka ditemukanlah tanaman sarang semut (*Myrmecodia pendans*) yang memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektor yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Eksperimen Laboratorium.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Praliniik Universitas Muslim Indonesia

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Eksperimental.

C. Sampel

Tumbuhan Sarang semut (*Myrmecodia pendans*)

D. Metode pengumpulan data

1. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penyiapan Sampel

Sampel penelitian di ambil dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana dengan Ketinggian tempat 100 m – 2.800 m dpl, pada pohon inang manggi-manggi. Sampel sarang semut dibersihkan dari kotoran. Bagian ujung sarang semut yang berdaun dibuang dengan menggunakan pisau. Kulit luar sarang semut dikupas dengan menggunakan pisau kemudian dicuci dengan air mengalir. Sarang semut yang sudah terkelupas dirajang tipis-tipis. Kemudian dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung hingga kering.

b. Pembuatan air rebusan sarang semut

Ditimbang sarang semut yang telah dikerigkan berupa rajangan sebanyak 100 g, 200 g dan 300 g. Setelah itu, sarang semut yang telah ditimbang, direbus dalam 1000 ml hingga tersisa 500 ml. Perebusan dilakukan di atas kompor dengan suhu 100⁰ selama 45 menit atau 2-3 bagian dari pelarut awal.

c. Pembuatan koloidal Na-CMC 1% b/v

Sebanyak 100 ml aquadest dimasukkan Na-CMC sebanyak 1 gram sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk elektrik dengan suhu 70°C hingga terbentuk larutan koloid.

d. Pembuatan Suspensi Temulawak[®]

Suspensi Temulawak[®] dibuat dengan menimbang 870,007 mg lalu ditambahkan Na-CMC 1% sebanyak 100 ml dan diaduk hingga homogen.

e. Pembuatan suspensi dan penentuan dosis parasetamol

Suspensi parasetamol dalam Na-CMC 1 % dibuat dengan cara melarutkan sejumlah gram parasetamol yang telah ditimbang ke dalam Na-CMC 1 % hingga konsentrasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dosis hepatotoksik. Dosis parasetamol dipilih berdasarkan dosis hepatotoksiknya terhadap tikus yaitu 2,5 g/kg BB (Donatus *et al.*, 1983).

f. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba

Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan yang sehat berumur 2-3 bulan dengan berat badan 150-250 gram sebanyak 15 ekor. Hewan diaklimatisasi selama 7 hari sebelum perlakuan. Hewan dinyatakan sehat apabila selisih berat sebelum dan sesudah diadaptasikan tidak lebih dari 10% dan secara visual menunjukkan perilaku normal.

g. Perlakuan Dan Penyiapan Hewan Uji

Sebanyak 15 ekor tikus putih jantan dengan bobot badan antara 150-250 gram. Sampel dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor tikus.

1. Kelompok I merupakan kontrol negatif yang diberikan secara p.o NaCMC 1% selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian paracetamol selama 3 hari. Darah dianalisis pada hari 0, 8, dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT dan SGOT
2. Kelompok II merupakan kontrol positif yang diberikan secara p.o obat Temulawak[®] yang disuspensikan dalam NaCMC 1% selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian induksi paracetamol selama 3 hari berturut-turut. Darah dianalisa pada hari 0, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT dan SGOT.
3. Kelompok III merupakan perlakuan yang diberikan secara p.o air rebusan sarang semut 100g/1liter aquadest/bb/tikus/hari selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian paracetamol selama 3 hari berturut-turut. Darah dianalisa pada hari 0, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT dan SGOT
4. Kelompok IV merupakan perlakuan yang diberikan secara p.o air rebusan sarang semut semut 200g/1liter aquadest/bbtikus/hari selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian paracetamol selama 3 hari berturut-turut. Darah dianalisa pada hari 0, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT dan SGOT
5. Kelompok V merupakan perlakuan yang diberikan secara p.o air rebusan sarang semut semut 300g/1liter aquadest/bbtikus/hari selama 7 hari berturut-

turut kemudian dilanjutkan pemberian paracetamol selama 3 hari berturut-turut. Darah dianalisa pada hari 0, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT dan SGOT

Bahan yang akan diujikan diantaranya: rajangan sarang semut, Paracetamol, NaCMC dan Temulawak[®]. Cara pemberian dilakukan secara peroral (p.o) menggunakan sonde oral yang dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut. Pada hari ke 8 dilakukan pengukuran kadar SGPT dan SGOT dengan menggunakan human analyzer setelah sebelumnya dipuasakan selama 16-18 jam. Semua kelompok selanjutnya diinduksikan dengan Paracetamol selama 3 hari berturut-turut, kemudian dilakukan pengukuran kadar SGPT dan SGOT pada hari ke 11 dengan menggunakan human analyzer setelah sebelumnya dipuasakan selama 16-18 jam.

E. Analisis Data

Data kadar SGPT dan SGOT tikus dianalisis dengan Analisis One Way Anova dengan menggunakan program SPSS 23.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan adalah batang pengaduk, corong, gelas piala, gelas ukur, gelas kimia, human analyzer (microlab 300), kandang, kompor, sonde oral, neraca analitik (Sartorius), sendok tanduk, sentrifuge, tabung eppendorf dan timbangan O'hauss.

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan antara lain aluminium foil, NaCMC, ekstrak sarang semut, Temulawak[®], aquadest, kapas, kertas saring, kertas timbang, pakan tikus, paracetamol, pereaksi SGPT dan SGOT, Tikus (*Rattus norvegicus*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Air Rebusan Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) sebagai hepatoprotektor yang diujikan pada hewan coba, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 3. Data Hasil Pengamatan Kadar SGPT

Perlakuan	Replikasi	Pengukuran			% Kenaikan
		SGPT U/L Kadar Normal : 18 – 45 U/L			
		Awal	Terapi	Terapi+Induksi	
NaCMC 1%	1	26.3	46.7	133.9	187%
	2	25.2	45.6	163.3	258%
	3	25	46.3	164.6	256%
Rata – rata		25.5	46.2	153.9	233%
Temulawak®	1	25.4	24.1	27.5	14%
	2	28.7	26.9	30.0	12%
	3	26.1	27.2	29.6	9%
Rata – rata		26.7	26	20	12%
Dosis Air Rebusan 100 g	1	24.5	22.8	29.5	29%
	2	26	25.6	28.8	13%
	3	28.8	26.3	30.2	15%
Rata – rata		26.4	24.9	29.5	19%
Dosis Air Rebusan 200 g	1	35.1	34.2	47.9	40%
	2	30.8	29.2	37.4	28%
	3	31.3	29.9	41.8	40%
Rata – rata		32.4	31.1	42.3	36%
Dosis Air Rebusan 300 g	1	34.3	33.1	39.7	20%
	2	38.2	37.9	41.9	11%
	3	32.8	31.3	43.6	39%
Rata – rata		27.1	26.1	41.7	23%

Tabel 4. Data Hasil Pengamatan Kadar SGOT

Perlakuan	Replikasi	Pengukuran			% Kenaikan
		SGOT U/L Kadar Normal : 45,7-80,8			
		Awal	Terapi	Terapi+Induksi	
NaCMC 1%	1	60.2	67.6	150.2	122%
	2	61.3	68.2	125.3	84%
	3	65.4	64.1	148.2	131%
Rata – rata		62.3	66.6	141.2	112%
Temulawak	1	67,6	62	80.4	30%
	2	68.3	63.8	77.8	22%
	3	65.1	62.4	79.3	27%
Rata – rata		67	62.7	79.6	26%
Dosis Air Rebusan 100 g	1	60.8	60	77.6	29%
	2	61.9	61.3	80.3	31%
	3	63.6	62.4	79.8	28%
Rata – rata		62.1	61.2	79.2	29%
Dosis Air Rebusan 200 g	1	64.2	63.2	80.7	28%
	2	75.2	68.8	89.7	30%
	3	71.6	70.2	88.6	26%
Rata - rata		70.3	67.4	86.3	28%
Dosis Air Rebusan 300 g	1	70.2	69.8	92.6	33%
	2	69.2	68.9	97.9	42%
	3	74.3	71.2	95.6	34%
Rata - rata		71.2	69.9	95.3	36%

**Grafik 1.** Grafik Kenaikan Kadar SGPT



Grafik 2. Grafik Kenaikan Kadar SGOT

B. Pembahasan

Hati adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh, yang terletak di bagian atas dalam rongga abdomen di sebelah kanan di bawah diafragma. Hati secara luas dilindungi iga-iga. Fungsi hati bersangkutan dengan metabolisme tubuh. Khususnya mengenai pengaruhnya atas makanan dan darah. Hati merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh dalam hal bahwa ia menjadi "pengantara metabolisme", artinya ia mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan di suatu tempat di dalam tubuh guna dibuat sesuai untuk pemakaiannya di dalam jaringan. Hati juga mengubah zat buangan dan bahan racun untuk dibuat mudah untuk ekskresi ke dalam empedu dan urin (Evelyn, 2009).

Fungsi hati bersangkutan dengan metabolisme tubuh, khususnya mengenai pengaruhnya atas makanan dan darah. Hati merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh dalam hal bahwa ia menjadi "pengantara metabolisme". Artinya ia mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan disuatu tempat di dalam tubuh, guna dibuat sesuai untuk pemakaiannya di dalam jaringan. Hati juga

mengubah zat buangan dan bahan racun untuk dibuat mudah untuk ekskresi kedalam empedu dan urin (Evelyn, 2009).

Evaluasi kerusakan hati, dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan melakukan uji biokimia serum sebagai indikator kerusakan hati. Pemeriksaan berbagai enzim serum terutama enzim transaminase yang terdiri dari enzim SGPT dan SGOT, terbukti paling praktis sebagai indikator untuk mengukur banyaknya kerusakan hati. Uji enzim sering menjadi satu-satunya petunjuk adanya cedera sel pada penyakit dini hati atau lokal. Dua enzim Transaminase yang paling sering diukur pada penyakit hati yaitu *Serum Glutamate Oxaloacetic Transaminase* (SGOT) dan *Serum Glutamic Pyruvic Transaminase* (SGPT).

Serum Glutamat Oksaloasetat Transminase (SGOT)/ Aspartat Amino Transminase (AST) adalah enzim mitokondria yang juga ditemukan dalam hati, jantung, ginjal, dan otak. Bila jaringan tersebut mengalami kerusakan yang akut, kadarnya dalam serum meningkat. Diduga hal ini disebabkan karena bebasnya enzim intraseluler dari sel-sel yang rusak ke dalam sirkulasi. Kadar yang sangat meningkat terdapat pada nekrosis hepatoseluler atau infark miokard (Hadi, 1995).

Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)/ Alanin Aminotransferase (ALT) adalah Enzim yang mengkatalis pemindahan satu gugus amino antara lain alanin dan asam alfa ketoglutarat. Terdapat banyak di hepatosit dan konsentrasinya relatif rendah di jaringan lain. Kadar normal dalam darah 5-35 U/L dan ALT lebih sensitif dibandingkan AST (Sacher dan McPerson, 2011).

Adapun prosedur kerja dari penelitian ini yaitu Sarang semut dibersihkan dari kotoran (disebut sampel sarang semut basah), bagian ujung sarang semut yang berbentuk daun dibuang dengan menggunakan pisau, kulit luar sarang semut dikupas menggunakan pisau, sarang semut yang sudah dikupas dibelah menjadi 4

bagian, sarang semut yang sudah dikupas dirajang tipis – tipis, irisan sarang semut kemudian dikeringkan (disebut sampel Rajang kering).

Selanjutnya dilakukan pengujian pada hewan coba untuk melihat efek hepatoprotektor dari Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendens*). Pada penelitian ini digunakan tikus putih jantan (*Rattus norvegicus*) sebagai hewan coba. Adapun alasan digunakan tikus sebagai hewan coba dikarenakan tikus tidak bersifat fotofobik, aktivitasnya tidak terganggu oleh manusia, lebih tenang, lebih besar, relatif resisten terhadap infeksi. Penggunaan tikus jantan dikarenakan tikus jantan mempunyai kecepatan metabolisme yang lebih cepat dan kondisi biologi yang relatif stabil dibanding tikus betina. Tikus yang akan digunakan terlebih dahulu diadaptasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium.

Dalam penelitian ini untuk menginduksi kerusakan hati digunakan parasetamol dosis toksik (2,5 g/kgBB). Parasetamol dimetabolisme melalui sitokrom P450 membuat parasetamol mengalami N-hidroksilasi membentuk senyawa antara, N-acetyl-para-benzoquinoneimine (NAPQI), yang sangat elektrofilik dan reaktif. Pada keadaan normal, senyawa antara ini dieliminasi melalui konjugasi dengan glutathione (GSH) yang berikatan dengan gugus sulfhidril dan kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi suatu asam merkapturat yang selanjutnya diekskresi ke dalam urin. Apabila mengkonsumsi parasetamol pada dosis tinggi, glutathione akan mengalami deplesi sekitar 90% sehingga konsentrasi metabolit toksik ini menjadi jenuh. NAPQI yang berada dalam keadaan bebas akan berikatan dengan makromolekul protein pada membran hepatosit sehingga menyebabkan kerusakan membran sel hati. Sel-sel hepatosit akan pecah sehingga enzim golongan aminotransferase seperti ALT atau SGPT dan AST atau SGOT yang terdapat dalam sel

hepatosit akan keluar dan masuk aliran darah di sekitar vena sentralis sehingga terjadi kenaikan aktivitas enzim SGPT dan SGOT melebihi normal (Cooper, 2010).

Pada penelitian ini sebagai indikator kerusakan hati digunakan kadar enzim SGPT dan SGOT. Enzim SGPT merupakan indikator yang sensitif dalam mengenali adanya penyakit pada hati yang bersifat akut. Hal ini disebabkan hepatosit yang rusak atau mati akan melepaskan enzim SGPT ke dalam aliran darah (Chopra, 2001). Enzim SGPT merupakan enzim yang lebih dipercaya dibandingkan SGOT dalam menentukan kerusakan sel hati. Hal ini disebabkan SGPT banyak ditemukan terutama di hati sedangkan SGOT dapat ditemukan selain di hati, seperti di otot jantung, otot rangka, ginjal, pankreas, otak, sel darah merah, dan sel darah putih. Dengan demikian, jika hanya terjadi peningkatan SGOT maka dapat saja yang mengalami kerusakan adalah sel-sel organ lainnya yang mengandung SGOT (Sari et al, 2008).

Dalam penelitian ini digunakan 15 ekor tikus putih jantan (*Rattus norvegicus*) dengan berat 150-200 gram yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan. kelompok I terapi dengan NaCMC 1 % kemudian diinduksi dengan Parasetamol, kelompok II terapi dengan Temulawak yang disuspensikan ke dalam NaCMC 1 % kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol, kelompok III terapi dengan air rebusan 100 g/1liter aquadest/kkBB kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol, kelompok IV terapi dengan air rebusan 200 g/1 liter aquadest/kkBB kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol, kelompok V terapi dengan air rebusan 300 g/1 liter aquadest/kkBB kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol.

Sebelum diberi perlakuan, hewan coba dipuasakan selama 16-18 jam kemudian dilakukan pengambilan darah melalui vena lateralis untuk mengukur kadar SGPT dan SGOT awal. Selanjutnya pada hari ke 8 setelah setelah pemberian terapi Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) selama 7 hari berturut-turut

kemudian diukur kembali kadar SGPT dan SGOT. Kemudian pada hari ke 11 setelah terapi Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) dan diinduksikan dengan parasetamol, diukur kembali kadar SGPT dan SGOT akhir pada masing-masing kelompok.

Reagen yang digunakan adalah jenis reagen semitemik dimana reagen tersebut harus dicampur terlebih dahulu antara reagen pertama dan reagen kedua dengan perbandingan 5:1 kemudian reagen dapat digunakan untuk menganalisis. Prinsip pengukuran aktivitas SGPT dan SGOT adalah mengukur laju berkurangnya jumlah NADH menjadi NAD⁺ pada reaksi yang terjadi antara enzim dan substrat yang dapat diukur pada panjang gelombang 340 nm.

Adapun hasil penelitian pada pengukuran SGPT adalah sebagai berikut; untuk kelompok pertama yaitu kontrol negatif menggunakan NaCMC rerata kadar SGPT pada awal pemeriksaan adalah 25,5 U/L, setelah pemberian terapi 46,2 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 153,9 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGPT untuk kelompok NaCMC adalah 233%. Untuk kelompok kedua yaitu kontrol positif menggunakan Temulawak[®] rerata kadar SGPT pada awal pemeriksaan adalah 26,7 U/L, setelah pemberian terapi 26 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 20 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGPT kelompok Temulawak[®] adalah 12%. Untuk kelompok ketiga yaitu perlakuan pertama dengan menggunakan Air rebusan Sarang Semut 100 gram dalam 1 liter rerata kadar SGPT pada awal pemeriksaan adalah 26,4 U/L, setelah pemberian terapi 24,9 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 29,5 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGPT kelompok Air Rebusan 100 gram 19%. Untuk kelompok keempat yaitu perlakuan kedua dengan menggunakan Air rebusan Sarang Semut 200 gram dalam 1 liter rerata kadar SGPT pada awal pemeriksaan adalah 32,4 U/L, setelah pemberian terapi 31,1 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 55,7 U/L, dan

persentasi kenaikan kadar SGPT untuk kelompok Air Rebusan 200 gram 79%. Untuk kelompok kelima yaitu perlakuan pertama dengan menggunakan Air rebusan Sarang Semut 300 gram dalam 1 liter rerata kadar SGPT pada awal pemeriksaan adalah 27,1 U/L, setelah pemberian terapi 26,4 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 78,6 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGPT untuk kelompok Air Rebusan 300 gram adalah 200%. Dosis 100 g/kgBB menjadi dosis yang tidak berbeda nyata hasilnya dengan kontrol positif karena memiliki kadar awal SGPT yang normal. Adapun dosis 200 g/KgBB dan 300 g/KgBB, tikus yang digunakan itu mempunyai kadar SGPT yang lebih tinggi dari yang lain, ini disebabkan karena tikus yang digunakan dalam penelitian ini sangat dimungkinkan mengalami stress yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi ruangan yang kurang ideal bagi tikus untuk hidup. Penyondean suspensi paracetamol dan air rebusan sarang semut yang diberikan secara oral selama 11 hari dan 2 kali sehari juga turut berperan dalam menyebabkan tikus menjadi stress. Stress akan menyebabkan ujung-ujung saraf mengirimkan sinyal ke hipofisis sebagai alarm, selanjutnya mengirimkan sinyalnya ke kelenjar anak ginjal untuk melepaskan hormon kortisol. Kortisol mempunyai efek menghambat sistem imun sehingga tubuh semakin rentan terhadap penyakit (Corwin,1996). Menurut Pramono dan Sumastuti (2003) kandungan flavonoid yang tinggi pada sampel dapat meningkatkan resistensi dan dapat mengurangi permeabilitas kapiler darah yang dapat mengganggu transportasi metabolisme dalam darah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan flavonoid maka memungkinkan terjadinya peningkatan enzim dalam darah.

Adapun hasil penelitian pada pengukuran SGOT adalah sebagai berikut; untuk kelompok pertama yaitu kontrol negatif menggunakan NaCMC rerata kadar pada awal pemeriksaan adalah 62,3 U/L, setelah pemberian terapi 66,6 U/L, dan

setelah diinduksi menjadi 141,23 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGOT untuk kelompok NaCMC adalah 112%. Untuk kelompok kedua yaitu kontrol positif menggunakan Temulawak[®] rerata kadar SGOT pada awal pemeriksaan adalah 67 U/L, setelah pemberian terapi 62,73U/L, dan setelah diinduksi menjadi 79,6 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGOT kelompok Temulawak[®] adalah 26%. Untuk kelompok ketiga yaitu perlakuan pertama dengan menggunakan Air rebusan Sarang Semut 100 gram dalam 1 liter rerata kadar SGOT pada awal pemeriksaan adalah 62,1 U/L, setelah pemberian terapi 61,23 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 79,23 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGOT kelompok Air Rebusan 100 gram 29%. Untuk kelompok keempat yaitu perlakuan kedua dengan menggunakan Air rebusan Sarang Semut 200 gram dalam 1 liter rerata kadar SGOT pada awal pemeriksaan adalah 70,33 U/L, setelah pemberian terapi 67,4 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 86,33 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGOT untuk kelompok Air Rebusan 200 gram 28%. Untuk kelompok kelima yaitu perlakuan pertama dengan menggunakan Air rebusan Sarang Semut 300 gram dalam 1 liter rerata kadar SGOT pada awal pemeriksaan adalah 71,23 U/L, setelah pemberian terapi 69,96 U/L, dan setelah diinduksi menjadi 95,36 U/L, dan persentasi kenaikan kadar SGOT untuk kelompok Air Rebusan 300 gram adalah 36%.

Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan pengujian statistik dimana hasil statistik data menunjukkan distribusi data, terdistribusi normal dimana dikatakan normal karena nilai $P > 0,05$. Maka digunakan Uji statistik parametrik.

Hasil yang didapatkan di analisis dengan uji One Way Anova. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah perbedaan dosis dari sampel memberikan efek pada kenaikan kadar SGPT dan SGOT yang signifikan atau tidak.

Data dikatakan signifikan apabila nilai $p < 0,000$. Dan hasil analisis statistik dengan uji *One Way ANOVA* menyatakan bahwa data kadar SGPT dan SGOT tiap perlakuan diperoleh nilai $p = 0,000$. sehingga dapat disimpulkan bahwa air rebusan tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektor dalam pemulihan organ hati yang rusak dan tidak berfungsi normal, dan pemberian air rebusan tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendans*) dosis 100g/kgBB menunjukkan aktivitas kadar enzim SGPT dan SGOT yang tidak berbeda nyata dengan pembanding suspensi Temulawak[®].



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) memiliki aktivitas hepatoprotektor yang ditandai dengan kenaikan kadar enzim SGPT dan SGOT yang tidak terlalu meningkat dari kadar awal enzim SGPT dan SGOT. Kadar SGPT 100 g/KgBB, 200 g/KgBB dan 300 g/KgBB setelah pemberian Paracetamol berturut-turut yaitu 29.5 U/L, 42.3 U/L dan 41.7 U/L. Kadar SGOT 100 g/KgBB, 200 g/KgBB dan 300 g/KgBB setelah pemberian Paracetamol berturut-turut yaitu 79.2 U/L, 86.3 U/L dan 95.3 U/L.
2. Air Rebusan Sarang Semut (*Myrmecodia pendans*) 100 gram/1 liter aquadest menunjukkan aktivitas terbaik dalam mempertahankan nilai kadar enzim SGPT dan SGOT.
3. Agama islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk variasi dosis yang lebih efektif dengan kontrol pembanding yang berbeda dengan penelitian ini
2. Dapat dikembangkan menjadi sediaan suplemen obat dengan tujuan pemeliharaan atau perlindungan pada hati.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsiir*. Terj. M. Abdul Ghofur E.M., Abdurrohim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam Syafii. 2004.

Arif Soeksmanto, Partomuan Simanjuntak, Muhammad Ahkam Subroto. *Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air Tanaman Sarang Semut (Myrmecodia pendans) Terhadap Histologi Organ Hati Mencit*. Jurnal Natur Indonesia 12(2), April 2010.

Anonim. 2011. Plantamor. *Klasifikasi Sarang Semut*. Diakses juli 2017

Anonim, 2013. *Serial Buku Ajar Farmasi Fitokimia II*. Politeknik Kesehatan: Kementerian Kesehatan Jakarta.

Baker, F. S., T. W. Daniel, dan J. A. Helms. *Principles of Silviculture*. McGraw-Hill Inc. Book Co. New York. 1979

Balitbang Kemenkes RI, *Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS*. Jakarta: Balitbang Kemenkes. 2013

Cotran & Robbins, *Buku Saku Dasar Patologis Penyakit* Ed. 7. EGC. Jakarta. 2011

Corwin, E.Z. *Buku saku patofisiologi*. Terj. Dari *Handbook of pathophysiology* oleh Brahm, U. Penerbit Buku Kedokteran EGC. edisi revisi ke 3 Jakarta. 2010

Darmawati, SL. *Efek hepatoprotektif daun kelor (Moringa oleifera Lam.) terhadap kerusakan hepar akibat obat isoniazid pada tikus wistar*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2012.

Depkes RI. *Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hati*. Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik. 2007.

Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Ed. III*; Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1979.

Donatus, I. A. 1983. *Peranan Obat Tradisional Dalam Meningkatkan dan Meratakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Risalah Siniopium Penelitian Tumbuhan Obat III, 1-2*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM.



- . *Sediaan Galenik Ed II*; Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1986.
- Evelyn, *Anatomi dan Fisiologis untuk Paramedis*. Jakarta: Gramedia. 2009
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia-Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan (Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro, Penerjemah.)*. Bandung: Penerbit ITB, 1987
- Hadi S. *Gastroenterologi Edisi 6*. Alumni, pp.Bandung. 1995
- Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C. *Free Radicals in Biology and Medicine*. Oxford: Oxford University Press dalam Henry, J. 2014. *Advances in Food and Nutrition Research*. Volume 71-Academic Press, 2007
- Harun N. & Syari, W. *Aktivitas antioksidan ekstrak daun dewa dalam menghambat sifat hepatotoksik halotan dengan dosis sub anastesi pada mencit*. Jurnal Sains dan Teknologi Farmasi 7(2): 63-70, 2002
- Harmita, Radji. *Buku ajar Analisis Hayati*. EGC. Jakarta. 2010
- Irma Trisanti, Fatimawali, Widdhi Bodhi. *Uji Efek Hepatoprotektor Ekstrak Etanol Daun Benalu Langsung (Dendrophthoe Petandra (L.) Miq.) Terhadap Kadar Malondialdehid (MDA) Pada Hati Tikus Putih Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Karbon Tetraklorida (CCL₄)*. Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT Vol. 2 No. 03. Agustus 2013
- Malole, M.B.M. and Pramono, C.S.U. *Pengantar Hewan-Hewan Percobaan di Laboratorium*. Bogor. Pusat Antara Universitas Bioteknologi IPB. 1989
- Oktavia, sri dan Cylia Willa Pebriandin. *Uji Aktivitas Hepatoprotektor Ekstrak Daun Sukun (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg) terhadap Kerusakan Hati yang Diinduksi CCl₄* . Prosiding Seminar Nasional & Workshop “Perkembangan Terkini Sains Farmasi & Kl inik 5”. November 2015.
- Patricia Tatukude, Lily Loho, Poppy Lintong. *Gambaran Histopatologi Hati Mencit Swiss Yang Diberi Air Rebusan Sarang Semut (Myrmecodia Pendans) Paska Induksi Dengan Carbon Tetrachlorida (CCL₄)*. Jurnal e-Biomedik (eBM), Volume 2, Nomor 2, Juli 2014.
- Podolsky D.K., and Isselbacher K.J. *Tes Diagnostik Pada Penyakit Hati. Dalam: Ahmad H., dan Asdie eds. Prinsip-prinsip ilmu penyakit dalam, edisi 3. jilid 4*. Jakarta: EGC. 2000.

- Retno dwi. *Optimasi Rendamen, Kadar Mineral dan Metabolit Sekunder pada Ekstrak Akua Sarang Semut (Myrmecodia pendans Merr. & Perry) dari Wamena Papua dengan Variasi Metode Ekstraksi*. Jurnal Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VII. Surakarta, 18 April 2015
- Ruedas, L., Rattus norvegicus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Online: www.iucnredlist.org/details/19353/0, 2008. Diakses pada 11 Maret 2017.
- Sacher dan McPerson, *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium. Edisi 11*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2002.
- Sen, S. Et Al. *Free Radicals , Antioxidants , Diseases And Phytomedicines : Current Status And Future Prospect Nitrogen Species*, 2010
- Smeltzer S, *Buku ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner Suddarth. Volume 2* Edisi 8. Jakarta : EGC, 2011
- Shihab, Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 10*.
- Syaifuddin. *Fisiologi Tubuh Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan Edisi 2*. Salemba Medika. Jakarta. 2009
- Syilfia Hasti, Husni Muchtar, dan Amri Bakhtia. Uji Aktivitas Hepatoproteksi dan Toksisitas Akut dari Ekstrak Gambir Terstandarisasi. Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia 1(1), September 2012
- Subroto, M.A. & Saputro, H. *Gempur penyakit dengan sarang semut*. Cetakan pertama, Penebar Swadaya Trubus no 438 edisi XXXVII, 2006
- Sulaiman, ali. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Hati*. Edisi Pertama Revisi. Jakarta: CV Agung Seto, 2012
- Tjay, T.H. & Raharja, K. *Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek Efek Sampingnya Edisi 5*. Gramedia. Jakarta. 2002
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995
- Wahyuningsih, Sri. *Uji aktivitas hepatoprotektor ekstrak air Akar kuning (Fibraurea tinctoria lour) pada tikus putih Betina galur wistar*. Jurnal Aristoteles vol. 4 No. 1. 2006.
- World Health Organization (WHO). *Global Tuberculosis Report 2015*. Switzerland, 2015.


Lampiran 1. Skema Kerja
A. Penyiapan sampel



B. Perebusan sampel

C. Pembuatan koloidal Na-CMC 1%**D. Pembuatan Suspensi Temulawak®**

E. Pengujian Hepatoprotektor



Lampiran 2. Perhitungan Dosis

A. Perhitungan Dosis untuk air rebusan sarang semut

Dosis tanaman sarang semut yang digunakan 100 gram, 200 gram dan 300 gram, direbus dengan 1 liter air. Setelah tanaman sarang semut direbus maka air yang tersisa setengah dari volume awal. Jika dosis tanaman sarang semut yang diberikan pada orang dewasa dengan berat rata-rata 50 kg adalah 1000 ml per hari, maka tikus yang beratnya 200 gram, dosisnya adalah $(200 \text{ gram} / 50000 \text{ gram}) \times 500 \text{ ml} = 2 \text{ ml/Kgbb/hari}$ (Tatukude patricia, 2014. Jurnal e-Biomedik.pdf)

B. Perhitungan Dosis Parasetamol

$$\begin{aligned}
 \text{Dosis toksik untuk tikus} &= 2,5 \text{ g/kgBB tikus} \\
 \text{Berat Rata-rata tablet} &= 598,98 \text{ mg} \\
 \text{Untuk 200 g BB tikus} &= 2,5 \text{ g} \times \frac{200 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \\
 &= 0,5 \text{ g} \\
 \text{Pembuatan larutan stok} &= \frac{50}{2} \times 0,5 \text{ g} \\
 &= 12,5 \text{ g/50 ml} \\
 \text{Berat tablet yang ditimbang} &= \frac{12,5 \text{ g}}{500 \text{ mg}} \times \text{berat rata-rata 20 tablet} \\
 &= \frac{12,5 \text{ g}}{500 \text{ mg}} \times 598,98 \text{ mg} \\
 &= 14,97 \text{ g}
 \end{aligned}$$

Jadi berat Parasetamol yang ditimbang yaitu 14,97 g kemudian dilarutkan

C. Perhitungan Dosis untuk hepatoprotektor standart (Legalon®)

Diketahui dosis etiket dari obat Legalon® adalah 140 mg.

Menurut Shannon et al, 2007 perhitungan konversi dosis ekuivalen pada manusia (Human Equivalent Doses HED) adalah sebagai berikut:

$$\text{HED (mg/KgBB)} = \text{Dosis hewan coba (mg/KgBB)} \times \frac{\text{Faktor Km hewan coba}}{\text{Faktor Km manusia}}$$

Tabel 5. Konversi dosis hewan coba berdasarkan BSA (FDA Draft Guidelines, 2005)

Spesies	Berat (Kg)	BSA (m2)	Faktor Km
<u>Manusia</u>	<u>60</u>	<u>1,6</u>	<u>37</u>
<u>Anjing</u>	<u>10</u>	<u>0,5</u>	<u>20</u>
<u>Monyet</u>	<u>3</u>	<u>0,24</u>	<u>12</u>
<u>Kelinci</u>	<u>1,8</u>	<u>0,15</u>	<u>12</u>
<u>Babi</u>	<u>0,4</u>	<u>0,05</u>	<u>8</u>
<u>Tikus</u>	<u>0,15</u>	<u>0,025</u>	<u>6</u>
Mencit	0,20	0,007	3

Tiap kapsul mengandung : Curcuma zanthoriza rhizoma 500 mg

Dosis pemeliharaan 2 x 2 kapsul sehari

Berat rata-rata 20 kapsul = 651,23 mg

Perhitungan Dosis :

Bobot manusia = 60 kg

Dosis Manusia = 1000 mg (2 x 2 bobot kapsul)

HED = 2000 mg

HED = $\frac{2000 \text{ mg}}{60 \text{ kg}} = 33,33 \text{ mg/kgBB}$

HED (mg/kgBB) = dosis hewan (mg/kgBB) x $\frac{Km \text{ manusia}}{Km \text{ hewan}}$

33,33 mg/kgBB = dosis hewan (mg/kgBB) x $\frac{37}{6}$

Dosis hewan = 205,53 mg

Untuk tikus 200 gram = 205,53 mg x $\frac{200 \text{ gram}}{1000 \text{ gram}}$

= 41,106 mg

Dibuat larutan stok = 100 ml

Pembuatan larutan stok = $\frac{130 \text{ ml}}{2 \text{ ml}} \times 41,106 \text{ mg}$

= 2671,89 mg

$$\begin{aligned}\text{Berat yang ditimbang} &= \frac{2671,89 \text{ mg}}{2000} \times 651,23 \text{ mg} \\ &= 870,007 \text{ mg}\end{aligned}$$

Jadi dosis Temulawak[®] yang digunakan pada hewan uji adalah 205,53 mg dan berat yang ditimbang adalah 870,007 mg.

D. Dosis pemberian sampel uji pada hewan coba

1. Hari pertama dan hari kedua

a. Untuk kontrol negatif

Tikus dengan bobot 189 gram

$$\frac{189 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,89 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 165 gram

$$\frac{165 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,65 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 200 gram

$$\frac{200 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 2 \text{ ml}$$

b. Untuk kontrol positif

Tikus dengan bobot 174 gram

$$\frac{174 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,74 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 189 gram

$$\frac{189 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,89 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 171 gram

$$\frac{171 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,71 \text{ ml}$$

c. Untuk kelompok perlakuan pertama (100 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 189 gram

$$\frac{189 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,89 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 196 gram

$$\frac{196 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,96 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 187 gram

$$\frac{187 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,87 \text{ ml}$$

d. Untuk kelompok perlakuan kedua (200 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 168 gram

$$\frac{168 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,68 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 159 gram

$$\frac{159 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,59 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 154 gram

$$\frac{154 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,54 \text{ ml}$$

e. Untuk kelompok perlakuan ketiga (300 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 175 gram

$$\frac{175 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,75 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 196 gram

$$\frac{196 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,96 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 170 gram

$$\frac{170 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,70 \text{ ml}$$

2. Hari ketiga dan keempat

a. Untuk kontrol negatif

Tikus dengan bobot 191 gram

$$\frac{191 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,91 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 170 gram

$$\frac{170 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,70 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 219 gram

$$\frac{219 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 2,19 \text{ ml}$$

b. Untuk kontrol positif

Tikus dengan bobot 176 gram

$$\frac{176 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,76 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 185 gram

$$\frac{185 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,85 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 172 gram

$$\frac{172 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,72 \text{ ml}$$

c. Untuk kelompok perlakuan 1 (100 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 184 gram

$$\frac{184 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,84 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 210 gram

$$\frac{210 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 2,1 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 172 gram

$$\frac{172 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,72 \text{ ml}$$

d. Untuk kelompok perlakuan 2 (200 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 156 gram

$$\frac{156 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,56 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 161 gram

$$\frac{161 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,61 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 155 gram

$$\frac{155 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,55 \text{ ml}$$

e. Untuk kelompok perlakuan 3 (300 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 173 gram

$$\frac{173 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,73 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 193 gram

$$\frac{193 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,93 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 168 gram

$$\frac{168 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,68 \text{ ml}$$

3. Hari ke lima, ke enam dan ke tujuh

a. Untuk kontrol negatif

Tikus dengan bobot 183 gram

$$\frac{183 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,83 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 165 gram

$$\frac{165 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,65 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 212 gram

$$\frac{212 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 2,12 \text{ ml}$$

b. Untuk kontrol positif

Tikus dengan bobot 165 gram

$$\frac{165 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,65 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 176 gram

$$\frac{176 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,76 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 159 gram

$$\frac{159 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,59 \text{ ml}$$

- c. Untuk kelompok perlakuan 1 (100 gram/1 liter aquadest)

Tikus dengan bobot 179 gram

$$\frac{179 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,79 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 204 gram

$$\frac{204 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 2,04 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 164 gram

$$\frac{164 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,64 \text{ ml}$$

- d. Untuk kelompok perlakuan 2 (200 gram/1 liter air)

Tikus dengan bobot 154 gram

$$\frac{154 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,54 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 156 gram

$$\frac{172 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,72 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 155 gram

$$\frac{155 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,55 \text{ ml}$$

- e. Untuk kelompok perlakuan 3 (300 gram/1 liter air)

Tikus dengan bobot 168 gram

$$\frac{168 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,68 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 187 gram

$$\frac{187 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,87 \text{ ml}$$

Tikus dengan bobot 166 gram

$$\frac{166 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 2 \text{ ml} = 1,66 \text{ ml}$$

Lampiran 3. Analisis Data

1. Untuk kadar SGPT

Tests of Normality

	Sampel	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum	kontrol negatif	.333	3	.	.862	3	.274
	kontrol positif	.309	3	.	.900	3	.387
	dosis 100 g	.245	3	.	.970	3	.670
	dosis 200 g	.347	3	.	.836	3	.203
	dosis 300 g	.280	3	.	.938	3	.520
Sesudah	kontrol negatif	.372	3	.	.782	3	.072
	kontrol positif	.330	3	.	.866	3	.286
	dosis 100 g	.175	3	.	1.000	3	1.000
	dosis 200 g	.209	3	.	.991	3	.822
	dosis 300 g	.201	3	.	.995	3	.859

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
sebelum	1.448	4	10	.289
sesudah	1.402	4	10	.302

ANOVA

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
sebelum	Between Groups	217.420	4	54.355	12.596	.001
	Within Groups	43.153	10	4.315		
	Total	260.573	14			
sesudah	Between Groups	34064.711	4	8516.178	179.80 4	.000
	Within Groups	670.687	10	67.069		
	Total	34735.397	14			

Hasil

Tukey HSD^a

Sampel	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol positif	3	29.0333	
dosis 100 g	3	29.5000	
dosis 300 g	3	41.7333	
dosis 200 g	3	42.3667	
kontrol negatif	3		153.9333
Sig.		.334	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

2. Untuk kadar SGOT

Tests of Normality

	Sampel	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
sebelum	kontrol negatif	.309	3	.	.900	3	.386
	kontrol positif	.306	3	.	.905	3	.400
	sampel 100 g	.223	3	.	.985	3	.765
	sampel 200 g	.256	3	.	.962	3	.624
	sampel 300 g	.316	3	.	.890	3	.355
sesudah	kontrol negatif	.359	3	.	.810	3	.138
	kontrol positif	.207	3	.	.992	3	.831
	sampel 100 g	.320	3	.	.883	3	.334
	sampel 200 g	.345	3	.	.840	3	.214
	sampel 300 g	.202	3	.	.994	3	.855

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
sebelum	2.333	4	10	.126
sesudah	8.893	4	10	.102

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
sebelum	Between Groups	222.916	4	55.729	5.454	.014
	Within Groups	102.173	10	10.217		
	Total	325.089	14			
sesudah	Between Groups	8112.080	4	2028.020	44.80 1	.000
	Within Groups	452.673	10	45.267		
	Total	8564.753	14			

Hasil

		Subset for alpha = 0.05	
sampel		N	
			1
Tukey HSD ^a	kontrol positif	3	79.1667
	sampel 100 g	3	79.2333
	sampel 200 g	3	86.3333
	sampel 300 g	3	95.3667
	kontrol negatif	3	
	Sig.		.085
			1.000


Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Lampiran 4. Gambar Pengamatan



Gambar 1. Tumbuhan Sarang Semut



Gambar 2. Tumbuhan Sarang semut Yang telah dibelah



Gambar 3. Tumbuhan sarang semut yang telah dikeringkan



Gambar 4. Proses perebusan



Gambar 5. Tikus Putih Jantan



Gambar 6. Bahan



Gambar 7. Proses Pengambilan Darah



Gambar 8. Darah Tikus




Gambar 9. Darah dimasukkan ke dalam alat Sentrifuge



Gambar 10. Darah disentrifuge



Gambar 11. Pemisahan darah dan serum darah



Gambar 12. Serum darah Tikus



Gambar 13. Alat Pengukuran SGOT dan SGPT



Gambar 14. Pemberian Secara Oral



Gambar 15. Reagen SGOT



Gambar 16. Reagen SGPT



RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Nur Amirah Reski lahir di Hila-Hila, Sulawesi Selatan 16 Mei 1995. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bahtiar, S.Pd dan Kasmawati S.Pd.

Memulai pendidikan di SDN 195 Ekatiro, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bontotiro. Setelah itu di lanjutkan ke jenjang sekolah menengah di Man 2 Model Makassar. Setelah lulus dari MAN masuk Perguruan Tinggi tepatnya di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013 melalui jalur UMM sampai saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R