

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY”S“
DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 26 APRIL-14 MEI 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH:
NUR HERBIYANTI RUKMANA
NIM : 70400114044

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESAHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR HERBIYANTI RUKMANA

Nim : 70400114044

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung pandang, 25 Maret 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok G9/12

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny
“S” Dengan Pre Eklampsia Berat Di RSUD Syekh
Yusuf Gowa Tanggal 27 April 2017 s/d 14 Mei 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, Oktober 2017

Penyusun

NUR HERBIYANTI RUKMANA
NIM.70400114044

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Herbiyanti Rukmana

Nim : 70400114044

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "S" Dengan Pre Eklampsia Berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 27 April 2017

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, November 2017

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.keb

Pembimbing II



dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2017", yang disusun oleh NUR HERBYANTI RUKMANA, NIM : 70400114044, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 November 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 14 November 2017 M
24 Safar 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S. SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Salcha, S. SiT., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Syatirah Jalaluddin M.Kes., S.Pa	(.....)
Penguji I	: dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Drs. Syamsyul Bahri, M.Si	(.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Pre Eklampsia Berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Muh. Yasir dan Ibunda tercinta Almh. Herni Siamin yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada;

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. Wakil Dekat I Dr. Nurhidayah S.Kep., Ns., M.Kes, Wakil Dekan II Ibunda Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes, Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Muchtar Lutfi, M.Pd.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S. SiT., SKM., M. Keb, dan ibu Firdayanti, S. SiT., M. Keb, selaku Ketua Jurusan Kebidanan dan sekertaris jurusan kebidanan

fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun

4. Teruntuk ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S. SiT., SKM., M.Keb, dan dr. Syatirah Jalaluddin M.Kes., S.Pa sebagai pembimbing I dan Pembimbing II, Selaku pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi saran yang membangun dalam penyusunan KTI ini.
5. Ibunda dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes, selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar baik saran maupun motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan KTI ini.
6. Bapak Drs. Syamsyul Bahri, M.Si, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini.
7. Segenap Dosen terkhususnya di lingkup Prodi Kebidanan, staf Akademi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas kontribusinya dalam penyelesaian penyusunan KTI ini.
8. Bidang Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan atas pemberian izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Direktur RSUD Syech Yusuf Gowa dan jajarannya atas bantuannya dan perizinannya sehingga KTI ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman Kebidanan angkatan 2014

11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, Oktober 2017

Penyusun,

NUR HERBIYANTI RUKMANA
NIM: 70400114044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penulisan.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kehamilan	16
1. Pengertian Kehamilan	16
2. Perubahan Anatomi dan Fisiologi pada Kehamilan	16
3. Perubahan dan adaptasi Psikologis dalam Masa Kehamilan	34
4. Tanda-Tanda Diagnosa Kehamilan	36
B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care	38
1. Pengertian Antenatal Care.....	38

2. Tujuan Pelayanan Antenatal Care	39
3. Kunjungan Pelayanan Antenatal Care	40
4. Standar Pelayanan Antenatal Care	42
5. Kebijakan Pelayanan Antenatal Care	66
C. Tinjauan Khusus Tentang Pre Eklampsia	67
1. Defenisi	67
2. Epidemiologi	68
3. Faktor resiko	69
4. Etiologi dan Patofisiologi	69
5. Diagnosa Pre eklampsia	76
6. Manajemen Pre eklampsia	80
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	87
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	87
2. Tahapan Manajemen dalam Asuhan Kebidanan	88
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	94
F. Tinjauan Umum Tentang Pre eklampsia pada Ibu Hamil dengan Pendekatan Agama Islam	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Perubahan Anatomi dan Fisiologi pada kehamilan,

17



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbagda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Gowa Atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepada Kepala Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN UIN ALAUDDIN

MAKASSAR KARYA TULIS ILMIAH,

OKTOBER 2017

Nur Herbiyanti Rukmana, 70400114044

Pembimbing I : Hj. Sitti Saleha

Pembimbing II : Syatirah Jalaluddin

“Manajemen asuhan kebidanan Ibu hamil pada Ny “S” dengan Pre Eklampsia Berat di RSUD Syech Yusuf Gowa “

Pre eklampsia berat ialah pre eklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Ny “S” dengan Preeklamsia Berat di RSUD Syech Yusuf Gowa sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “S” dengan Preeklamsia Berat tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny “S” yaitu memasang infus RL, memantau tekanan darah ibu, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat untuk mencegah kejang, keadaan ibu mulai membaik. Keadaan umum ibu baik, dan tekanan darah sudah normal.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data pada Ny “S” dengan Preeklamsia Berat di RSUD Syech Yusuf Gowa selama 2 hari kunjungan rumah 2 kali kunjungan maka didapatkan hasil yaitu keadaan umum ibu sudah baik, tekanan darah dalam batas normal, dan sudah tidak ada tanda-tanda ibu mengalami preeklamsia berat. Dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “S” dengan hasil terdapat ada perbedaan tindakan antara teori dan praktek

Daftar pustaka : 26 (2008-2017)

Kata kunci : Ibu Hamil, Pre Eklampsia Berat

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, OCTOBER 2017

Nur Herbiyanti Rukmana, 70400114044

Supervisor I : Hj. Sitti Saleha

Supervisor II : Syatirah Jalaluddin

“Midwifery Care Management of Pregnant Mothers on Mrs. “S” with Severe Pre-Eclampsia at Syech Yusuf Gowa Regional Hospital “

Severe pre-eclampsia is pre-eclampsia with systolic blood pressure ≥ 160 mmHg and diastolic blood pressure ≥ 110 mmHg with proteinuria over 5g/24 hours.

This scientific paper is aimed at implementing the Midwifery Care Management of Pregnant Mother on Mrs. "S" with Severe Pre-eclampsia at Syech Yusuf Gowa Regional Hospital based on 7 steps of Varney and SOAP.

The results from a case study conducted on Mrs. "S" with Severe Pre-eclampsia is discovered no obstacles during the case treatment. The management performed on Mrs. "S" is to install an RL infusion, monitor the mother's blood pressure, collaborate with the doctor for drug therapy to prevent seizures; then the mother's condition starts to improve. The general condition of the mother is good as well as the blood pressure is normal.

The conclusion of the case is 7 steps of Varney and SOAP implemented on the process of obstetrics problem solving has been conducted an assessment in the form of monitoring and data analysis on Mrs. "S" with severe pre-eclampsia at Syech Yusuf Gowa Regional Hospital for 2 days home visit, then it is identified the results that the general condition of the mother is good, blood pressure in normal limit, and there is no sign of mother having severe pre-eclampsia. It has been carried out a documentation review of all findings and actions that have been implemented on Mrs. "S" with the result of the differences in action between the theory and practice are existed.

References : 26 (2008-2017)

Keywords : Pregnant Mother, Severe Pre-Eclampsia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data WHO tahun 2012 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih lebih tinggi dari negara Asean yang lain seperti Philipina 99 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 40 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup (Maternal Mortality Estimation Group: WHO, UNICEF, UNFPA: World Bank, 2012). Sedangkan pada tahun 2015 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup (Indonesian Profil Health, 2015).

Rasio kematian ibu di Negara berkembang menempati grade tertinggi, dengan 290 per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Negara maju yaitu, 14 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa negara telah berhasil mencapai target MMR (Maternal Mortality Ratio).

Peningkatan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia adalah salah satu komitmen Depkes melalui penerapan rencana pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup masih terlalu lamban untuk mencapai target Indonesia sehat 2010 dan tujuan MDGs (Millenium Development Goals)

tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup (WHO 2012). Laporan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menyebutkan Angka Kematian Ibu pada tahun 2012 di Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

Jumlah kematian di provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2013 sebanyak 115 orang dengan angka kematian ibu hamil sebanyak 18 orang (15,6%), ibu bersalin sebanyak 59 orang (51,3%), dan ibu nifas sebanyak 38 orang (33%). Dan penyebab kematian ibu yaitu hipertensi 68 %, perdarahan 30% dan infeksi 4 % (Dinas Kesehatan provinsi Sul-Sel, 2013).

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari, dan tidak lebih 300 hari (43 minggu) (Nadyah, 2013:37).

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al Mu'minin ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عَظْمًا ۖ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۖ آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۚ ۱۴

Terjemahnya:

”Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani

itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Tujuan dari pelayanan ANC adalah menjaga agar ibu hamil dapat memantau kemajuan kehamilan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan yang mungkin terjadi selama kehamilan, mempersiapkan agar masa nifas berjalan dengan normal dan mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima bayi (Nurul Jannah, 2012:5). Pada pemeriksaan ANC ibu hamil diberikan konseling mengenai-mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Pengetahuan ibu hamil mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan sangat penting agar ibu dapat memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Eri Susanti tentang pengetahuan ibu hamil tentang pre eklampsia dan eklampsia di Suminten Mantingan Ngawi sudah cukup baik.

Pada umumnya kehamilan akan berlangsung normal dan sering kali kehamilan berubah menjadi kehamilan patologi. Deteksi dini gejala dan tanda bahaya selama kehamilan merupakan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan ataupun keselamatan ibu hamil. Deteksi dini didapatkan dari pemeriksaan tekanan darah secara rutin pada saat pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*). Karena itu pemeriksaan

kehamilan rutin mutlak dilakukan agar pre eklampsia dapat dideteksi lebih awal (Sarwono, 2014).

Gambaran klinik preeklampsia bervariasi luas dan sangat individual. Kadang-kadang sukar untuk menentukan gejala preeklampsia mana yang timbul lebih dahulu. Secara teoritik urutan-urutan gejala yang timbul pada preeklampsia ialah edema, hipertensi, dan terakhir protein merupakan gejala yang paling penting. Namun sayangnya penderita sering kali tidak merasakan perubahan ini. Bila penderita sudah mengeluh adanya gangguan penglihatan, atau nyeri epigastrium, maka penyakit ini sudah cukup lanjut (Sarwono, 2014).

Tidak sedikit ibu yang mengalami komplikasi-komplikasi pada kehamilan salah satunya pre eklampsia berat. Pre eklampsia berat adalah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik >160 mmHg dan tekanan darah diastolik >110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Sarwono, 2014).

Dampak pre eklampsia pada ibu kerusakan organ-organ tubuh seperti, sistem saraf pusat, perdarahan intrakranial, gagal jantung, gagal ginjal, gangguan fungsi hati dan edema paru, sedangkan pada janin ialah *intrauterine fetal growth restriction*, solusio plasenta, prematur, sindroma distress, kematian janin, kematian neonatal perdarahan intraventikular (Sarwono, 2014:550).

Penanganan pada preeklampsia bertujuan untuk menghindari kelanjutan menjadi eklampsia dan pertolongan dengan melahirkan janin dalam keadaan optimal dan bentuk pertolongan dengan trauma minimal.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Suresh Candra Mondal, dkk di India tentang dosis profilaksis awal MgSO₄ pada pre eklampsia berat untuk memperbaiki keadaan ibu dan perinatal mengatakan dosis awal magnesium sulfat dapat mencegah perinatal dan kematian ibu. Jadi, profilaksis magnesium sulfat (MgSO₄) harus dimulai pada titik kontak pertama dengan penyedia kesehatan yang terlatih (Suresh, dkk, 2014).

Kematian ibu terjadi akibat berbagai komplikasi dalam kehamilan, persalinan atau periode setelah melahirkan. Komplikasi tersebut disebabkan oleh penyakit langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung terjadi akibat komplikasi obstetrik atau penyakit kronik yang menjadi lebih berat selama kehamilan. Penyebab langsung yang sering ditemui antara lain perdarahan, eklampsia, dan sifat infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung terjadi akibat penyakit yang telah ada sejak atau sebelum kehamilan atau penyakit yang timbul selama kehamilan seperti malaria dan anemia. (Sarwono, 2014). Sebagaimana penelitian yang dilakukan Ahmed, dkk mengenai kematian ibu pengalaman Rumah Sakit tersier di Mesir Bagian Atas menyebutkan rasio kematian ibu menurun secara progresif 2009-2014. Selain itu, menemukan bahwa penyebab tidak langsung kematian ibu melahirkan sebanyak 24,9% dari semua kematian. Mengenai penyebab langsung kematian ibu hamil, pre eklampsia tetap menjadi penyebab utama (Ahmed, dkk 2016).

Di Sulawesi-Selatan penyebab langsung kematian ibu adalah hipertensi, hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ansariadi tentang Epidemiologi Kematian Ibu di Sulawesi-Selatan 2008-2013 menunjukkan bahwa 61% (15 kabupaten) di Sulawesi-Selatan mengalami penurunan MMR pada tahun 2013. Peningkatan dan penurunan MMR tersebut bervariasi antar kabupaten. Pada tahun 2013, hanya 6 kabupaten yang memiliki MMR di atas 100 per 100.000 kelahiran hidup. Hasil spasial analisis menunjukkan bahwa kenaikan MMR terjadi pada kabupaten di wilayah bagian tengah Sulawesi-Selatan. Pola penyebab langsung kematian maternal mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 kematian karena hipertensi menjadi penyebab utama kematian ibu yaitu 38%, sedangkan perdarahan menempati urutan kedua yaitu 30%. Selain itu terdapat variasi penyebab kematian ibu pada tingkat kabupaten (Ansariadi, 2014).

Insiden pre eklampsia di negara berkembang sekitar 1,8%-18%. Pre eklampsia dan eklampsia menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian ibu di Indonesia dengan presentasi sebesar 26,9% pada tahun 2012 dan meningkat 27,1% pada tahun 2013 (Depkes RI, 2015).

Berdasarkan laporan data Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa tentang jumlah pre eklampsia berat pada tahun 2014 sebanyak 18 kasus, tahun 2015 sebanyak 17 kasus, sedangkan tahun 2015 sebanyak 14 kasus, dan pada tahun 2017 bulan januari-maret sebanyak 8 kasus.

Berdasarkan kasus yang saya angkat sesuai dengan standar 7 Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan yang memiliki tujuan untuk mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Pernyataan standar bidan menemukan secara dini setisp kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala pre-eklampsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Keumudian dapat di temukan hasil bahwa ibu hamil dengan tanda preeklampsia mendapat perawatan yang memadai dan tepat waktu dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat eklampsia

Adapun persyaratannya yakni bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan darah. Bidan mampu mengukur tekanan darah dengan benar, mengenali tanda-tanda preeklampsia dan mendeteksi hipertensi pada kehamilan, dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan (Purwoastuti dan Walyani, 2014: 15-20).

Dari uraian diatas, pre eklampsia berat pada kehamilan merupakan masalah yang penting karena dapat berlanjut menjadi eklampsia yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal. Maka dari itu penulis tertarik menerapkan prinsip-prinsip Asuhan Manajemen Kebidanan Ibu Hamil Dengan Pre Eklampsia Berat di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa Tahun 2017.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi: Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny “X” dengan Pre eklampsia Berat di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny “ “ dengan Pre eklampsia Berat di Rumah Sakit Syech Yusuf dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan sesuai wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat melaksanakan pengakajian dan analisis data Ibu Hamil pada Ny “ S” dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.
- b. Dapat merumuskan diagnosa/maslah aktual Ibu Hamil pada Ny “S “ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.
- c. Dapat merumuskan diagnosa/masalah potensial Ibu Hamil pada Ny “S “ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.
- d. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi Ibu Hamil pada Ny “S “ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.

- e. Dapat menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan Ibu Hamil pada Ny “S “ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan yang disusun pada Ibu Hamil pada Ny “ S“ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.
- g. Dapat mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ibu Hamil pada Ny “S “ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.
- h. Dapat mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ibu Hamil pada Ny “S “ dengan Pre eklampsia Berat, di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa 2017.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah:

1. Manfaat Praktis

Adapun sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program KIA.

2. Manfaat Institusi

Untuk menambah wacana bagi pembaca di perpustakaan dan informasi mengenai asuhan kebidanan pada ibu hamil khususnya ibu hamil dengan pre eklampsia berat.

3. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang ibu hamil dengan pre eklampsia berat.

5. Manfaat Bagi Pembaca Khususnya Ibu hamil

Sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya ibu hamilnya yang mengalami pre eklampsia berat.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan ibu hamil khususnya dengan pre eklampsia berat.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan emergency/ kolaborasi.

Rencana asuhan / intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anammnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.

2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.

3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.

4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untyk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-par, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah sedangkan lenec digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter dan bidan.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Ruang Lingkup Penulisan

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

2. Tujuan Khusus

- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan
 - 1. Pengertian Kehamilan
 - 2. Perubahan Anatomi dan Fisiologis pada Kehamilan
 - 3. Perubahan dan Adaptasi Psikologis dalam Kehamilan
 - 4. Tanda-Tanda Diagnosa Kehamilan
- B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care
 - 1. Pengertian Antenatal Care
 - 2. Tujuan Pelayanan Antenatal Care
 - 3. Kunjungan Pelayanan Antenatal Care
 - 4. Standar Pelayanan Antenatal Care
 - 5. Kebijakan Pelayanan Asuhan Antenatal Care
- C. Tinjauan Khusus Tentang Pre Eklampsia
 - 1. Definisi
 - 2. Epidemiologi
 - 3. Faktor resiko
 - 4. Etiologi dan Patofisiologi
 - 5. Diagnosa Pre eklampsia

6. Manajemen Pre eklampsia

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan
2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

F. Tinjauan Umum Tentang Pre eklampsia dengan Pendekatan Agama Islam

BAB III STUDI KASUS

- A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar
- B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual
- C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial
- D. Langkah IV : Tindakan Emergency / Kolaborasi
- E. Langkah V: Rencana Tindakan / Intervensi
- F. Langkah VI : Implementasi
- G. Langkah VII : Evaluasi
- H. Pendokumentasian (SOAP)

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membandingkan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan dan praktek yang dilaksanakan di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa dalam menangani kasus Pre Eklampsia Berat pada ibu hamil.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari, dan tidak lebih 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur (Nadyah, 2013:37).

2. Perubahan Anatomi dan Fisiologi pada kehamilan

a. Sistem reproduksi

1. Uterus

- a. Ukuran uterus pada wanita hamil yang kehamilan cukup bulan, ukuran uterus adalah $30 \times 25 \times 20$ cm dengan kapasitas lebih dari 4.000 cc. Hal ini rahim membesar akibat hiperplasia otot polos rahim, serabut-serabut kolagennya menjadi higroskopik, dan endometrium menjadi desidua.

Pembesaran uterus meliputi :

Tidak hamil/normal : sebesar telur ayam (30gr)

Kehamilan 8 minggu : sebesar telur bebek

Kehamilan 12 minggu : sebesar telur angsa

Kehamilan 16 minggu : sebesar kepala bayi


Kehamilan 20 minggu : pinggir bawah pusat

Kehamilan 24 minggu : pinggir atas pusat

Kehamilan 28 minggu : sepertiga pusat-xypoid

Kehamilan 32 minggu : setengah pusat-xypoid

Kehamilan 36-42 minggu : 3 sampai 1 jari dibawah xypoid.



a) Gambar 2.1 (Yulia Fauziyah, 2012:30-32).

b. Posisi rahim pada permulaan kehamilan dalam posisi antefleksi atau retrofleksi. Pada bulan kehamilan, rahim tetap berada dalam rongga pelvis. Setelah itu mulai memasuki rongga perut yang dalam pembesarannya dapat mencapai batas hati. Pada ibu hamil, rahim biasanya mobile, lebih mengisi rongga abdomen kanan dan kiri.

c. Vaskularisasi

Arteri uterine dan ovarika bertambah dalam diameter, panjang, dan anak-anak cabangnya, pembuluh darah vena mengembang dan bertambah.

d. Servik uteri

Bertambah vaskulereisasinya dan menjadi lunak, kondisi ini disebut tanda goodell. Kelenjar endoservikal membesar dan mengeluarkan banyak cairan mucus. Oleh karena pertambahan dan pelebaran pembuluh darah, warnanya menjadi livid dan ini disebut dengan tanda chadwick.

2. Ovarium

Ovulasi berhenti namun masih tetap terdapat korpus luteum graviditas sampai terbentuknya plasenta yang akan mengalami ahli pengeluaran estrogen dan progesteron.

3. Vagina dan Vulva

Oleh karena pengaruh estrogen, terjadi hipervasikularisasi pada vagina dan vulva sehingga pada bagian tersebut terlihat lebih merah atau kebiruan kondisi ini disebut tanda chadwick (Nurul Jannah, 2012:87-90).

b. Payudara

Karena adanya peningkatan suplai darah dibawah pengaruh aktivitas hormon, jaringan glandular dari payudara membesar dan puting menjadi lebih efektif walaupun perubahan payudara dalam bentuk yang membesar terjadi pada waktu menjelang persalinan. Estrogen menyebabkan penumpukan lemak. Progesteron menyebabkan tumbuhnya lobus, alveoli lebih tervekularisasi dan mampu bersejresi. Hormon pertumbuhan dan glukokortikoid juga mempunyai peranan penting dalam perkembangan ini. Prolaktin merangsang produksi kolostrum dan air susu ibu (Nurul Jannah, 2012:87-90).

c. Sistem Metabolisme

a. Rongga mulut

Salivasi mungkin akan meningkat sehubungan dengan kesukaran menelan akibat nausea. Gusi dapat menjadi hiperemis dan melunak kadang berdarah kalau terkena cedera ringan saja. Contohnya pada saat gosok gigi. Pembengkakan gusi sangat vaskuler yang disebut epulsi kehamilan kadang-kadang timbul terapi secara khas

mengecil secara spontan setelah kelahiran. Keadaan tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen yang meningkat atau kadang terjadi pada pengguna kontrasepsi oral dan ibu mengalami defisiensi Vitamin C. Tidak ada bukti yang baik bahwa kehamilan mendorong proses pembusukan pada gigi.

b. Motilitas saluran gastrointestinal

Biasanya ada penurunan tonus dan motilitas saluran gastrointestinal yang menimbulkan pemanjangan waktu pengosongan lambung dan transit usus. Ini merupakan akibat jumlah progesteron yang besar selama proses kehamilan dan menurunnya kadar motilin, suatu peptida hormonal yang diketahui mempengaruhi otot-otot halus (Christofides dkk, 1982) atau keduanya. Pada saat persalinan khususnya setelah pemberian analgetik waktu pengosongan vambung secara khas sangat memanjang. Bahaya utama anstesi umum adalah regurgitasi dan aspirasi, baik isi makanan maupun asam lambung.

Karena pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran air liur yang berlebihan, daerah vambung terasa panas, terjadi mual dan sakit/pusing kepala terutama pagi hari yang disebut morning sickness, muntah yang terjadi diebut emesis gravidarum. Bila muntah

berlebihan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari disebut hiperemesis gravidarum.

c. Lambung dan esophagus

Pirosis umum pada kehamilan, paling mungkin disebabkan oleh refleksi sekret-sekret asam ke esophagus bagian bawah, posisi vambung yang berubah mungkin ikut menyumbang pada seringnya terjadi peristiwa ini. Tonus esopagus dan vambung berubah selama kehamilan dengan tekanan intraesopagus yang lebih rendah dari tekanan vambung lebih tinggi selain itu pada saat yang bersamaan peristaltis esopagus mempunyai kecepatan gelombang dan amplitudo yang rendah. Perubahan-perubahan tersebut menyokong terjadi refluks gastroesophageal yang menimbulkan keart burn.

d. Usus kecil, besar dan appendix

Karena kehamilannya berkembang terus lambung dan usus digeser oleh uterus yang membesar ke arah atas dan ke arah lateral. Sebagai akibatnya appendix sebagai contoh biasanya bergeser ke arah atas dan ke arah vateral dan seringkali mencapai pinggang kanan. Seperti telah dijevaskan sebelumnya tonus ott dan motilitas dari lambung dan usus berkurang selama kehamilan.

Hormon progesteron menimbulkan gerakan usus makin berkurang (relaksasi otot-otot polos), makanan lebih lama berada di dalam

lambung, dan apa yang telah dicernakan lebih lama di dalam usus. Hal ini mungkin baik untuk reabsorpsi akan tetapi menimbulkan pula konstipasi yang merupakan keluhan dari ibu hamil. Konstipasi bisa juga terjadi karena kurangnya aktivitas/ senam dan penurunan intake cairan.

e. Hati

Meskipun hati pada beberapa binatang jelas bertambah ukurannya namun tidak ada bukti pembesaran tersebut pada kehamilan manusia. Selain itu, dengan evaluasi histologis hati yang didapat dengan biopsi termasuk pemeriksaan dengan mikroskop elektron tidak ada perbedaan yang jelas dari morfologi hati yang terjadi sebagai respn terhadap kehamilan normal.

Perubahan terjadi secara fungsional yaitu dengan menurunnya albumin plasma dan globulin plasma dalam ratoi tertentu merupakan hal yang normal pada wanita hamil. Pada wanita yang tidak hamil kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit hati.

f. Kandung empedu

Fungsinya berubah selama kehamilan karena pengaruh hipotoni dari otot-otot halus. Potter (1936) menemukan selama

melakukan SC cukup sering empedu teregang namun hipotonik, aspirat empedu cukup kental (Nurul Jannah, 2012:90-94).

d. Sistem muskuloskeletal

Keseimbangan kadar kalsium selama kehamilan biasanya normal apabila asupan nutrisi khususnya produk susu terpenuhi. Tulang dan gigi biasanya berubah pada kehamilan yang normal. Karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron, terjadi relaksasi dari ligamen-ligamen dalam tubuh menyebabkan peningkatan mobilitas dari sambungan / otot terutama otot –otot pelpik.

Bersamaan dengan membesarnya ukuran uterus menyebabkan perubahan yang drastis pada kurva tulang belakang yang biasanya menjadi salah satu ciri pada seorang ibu hamil. Perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan resiko ketidaknyamanan dan rasa sakit pada bagian belakang yang bertambah seiring dengan penambahan umur kehamilan.

Sejak trimester I akibat peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron, terjadi relaksasi dari jaringan ikat, kartilago, dan ligamet juga meningkatkan jumlah cairan synovial. Bersamaan dua keadaan tersebut meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas persendian. Selama trimester kedua mobilitas persendian akan berkurang terutama pada daerah sikut dan pergelangan tangan dengan meningkatkan

retensi cairan pada jaringan konektif/ jaringan yang berhubungan di sekitarnya.

Pada trimester II dan III hormon progesteron dan hormon relaxing menyebabkan relaksasi jaringan ikat dan otot-otot. Hal ini terjadi maksimal pada satu minggu terakhir kehamilan. Proses relaksasi ini memberikan kesempatan pada panggul untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai persiapan proses persalinan, tulang pubik melunak menyerupai tulang sendi, sambungan sendi sacrococcigius mengendur membuat tulang coccigius bergeser ke arah belakang sendi panggul yang tidak stabil. Pada ibu hamil, hal ini menyebabkan sakit pinggang. Postur tubuh wanita secara bertahap mengalami perubahan karena janin membesar dalam abdomen sehingga untuk mengkompensasi penambahan berat ini. Bahu lebih tertarik kebelakang dan tulang lebih lentur, dan dapat menyebabkan nyeri punggung pada beberapa wanita.

e. Sistem Kardiovaskuler

Yang khas denyut nadi istirahat meningkat sekitar 10-15 denyut per menit pada kehamilan. Karena diafragma semakin naik terus selama kehamilan, jantung digeser ke kiri dan ke atas. Sementara pada waktu yang sama, organ ini agak berputar pada sumbu panjangnya. Akibatnya apeks jantung digerakkan agak ke lateral dari posisinya pada keadaan tidak hamil normal, dan membesarnya ukuran bayangan

jantung ditemukan pada radiogra. Luasnya perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh ukuran dan posisi uterus, kekuatan otot-otot abdomen dan konfigurasi abdomen dan thorak. Besar dari jantung bertambah sekitar 12% dan meningkatkan kapasitas jantung sebesar 70-80% ml.

Pada trimester I sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta. Uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang membesar pula, mammae dan alat lain-lain yang memegang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. Suplai darah ke dalam rahim harus meningkat seiring dengan perkembangan rahim dan memenuhi kebutuhan plasenta. Hormon estrogen menyebabkan perkembangan pembuluh-pembuluh darah baru. Pada awalnya pembuluh-pembuluh darah baru ini membentuk jaringan berliku-liku melalui dinding rahim.

Pada trimester II ukuran jantung membesar karena ada peningkatan beban kerja yang disebabkan oleh meningkatnya cardiac output. Jantung juga dapat bergeser ke kanan dan ke kiri serta berputar di muka karena tekanan uterus meningkat yang disebabkan oleh perkembangan uterus. Cardiac output jantung yang meningkat mengakibatkan menurunnya sedikit daya tahan tubuh. Dinding-dinding pembuluh darah mengalami relaksasi dan membesar akibat pengaruh hormon progesteron. Kapasitas pembuluh darah dan kapiler

bertambah, curah jantung akan bertambah sekitar 30%. Bertambahnya hemodelusi darah mulai tampak sekitar umur kehamilan 16 minggu. Volume darah meningkat tetapi tekanan darah cenderung akan menurun.

Pada trimester III volume darah semakin meningkat dimana jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah sehingga terjadi pengenceran darah. Hemodelusi mencapai puncaknya pada umur kehamilan 32 minggu, serum darah volume darah bertambah sebesar 25-30%. Selama kehamilan, dengan adanya peningkatan volume darah pada hampir semua organ dalam tubuh, terlihat adanya perubahan yang signifikan pada kardiovaskuler.

1. Jantung

Perubahan-perubahan pada jantung sebagai berikut.

- a) Cardiac output, jumlah darah yang dikeluarkan dari jantung per menit, meningkat 30-50% karena adanya peningkatan volume darah.
- b) Sebagian besar dari peningkatan output terjadi karena peningkatan stroke volume, jumlah darah yang dikeluarkan per detakan jantung.
- c) Namun ada juga yang dipengaruhi oleh peningkatan heart rate sekitar 15%

- d) Pada wanita dengan ukuran jantung kecil atau dengan badan besar, detak jantung akan meningkat sekitar 90-100 detakan/denyut per menit dan mereka mengalami pula kesulitan dalam menghadapi perubahan cardiovasculer dalam kehamilan.
- e) Oleh karena itu, dapat terlihat penambahan beban pada jantung selama kehamilan. Pada kehamilan hipertensi dalam kehamilan terjadi vasospasme yang sangat meningkatkan beban jantung.

2. Tekanan darah

Penurunan tahanan vascular perifer selama kehamilan terutama disebabkan karena relaksasi otot polos sebagai akibat pengaruh hormon progesteron. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan tekanan darah selama usia kehamilan pertama. Ada sedikit penurunan pada sistolik 5-10 mmHg dan diastolik 10-15 mmHg. Tekanan darah sedikit demi sedikit akan naik ke level sebelum hamil pada saat usia kehamilan lanjut. Perasaan lelah dan menurunnya semangat/ lesu merupakan hal yang biasa terjadi selama kehamilan. Peningkatan hormon darah bersamaan dengan distensi dari vena dan penambahan tekanan mekanik dari pembesaran uterus dapat menyebabkan odema pada kaki, vulva, dan anal, varises pada vena, dan haemoroid adalah hal yang umum ditemukan pada trimester III.

3. Sindrom hipotensi supinasi

Hal ini disebabkan oleh tekanan dari uterus yang terus menerus membesar terhadap vena cava inferior yang berdilatasi pada saat wanita hamil terlalu lama berada pada posisi terlentang. Uterus memblok pengembalian darah ke jantung dan berakibat timbulnya persaan akan pingsan, pucat, berkeringat. Pada saat tekanan darahnya kita periksa maka hasilnya akan rendah atau tidak teratur sama sekali. Kadaan ini dapat mempengaruhi janinnya terutama karena adanya pengurangan suplai oksigen dari plasenta. Tindakan asuhannya adalah dengan membaringkan wanita tersebut pada posisi miring sehingga uterus tidak lagi menghalangi aliran darah ke jantung.

4. Distribusi aliran darah

Proporsi terbesar aliran darah diarahkan ke uterus 500 ml/ menit dengan tujuan untuk memberikan nutrisi yang baik pada uterus yang sedang berkembang dan janin di dalamnya. Terdapat aliran dalam jumlah yang besar pula pada paru-paru, kulit 200ml/menit, membran mukosa dan pada ginjal 400 ml/ menit. Pada kulit ditujukan untuk menghilangkan kelebihan panas yang ditimbulkan oleh meningkatnya metabolisme yang dialami pada kehamilan (Nurul Jannah, 2012:96-101).

f. Sistem Integumen

Sehubungan dengan tingginya kadar hormonal, terjadi peningkatan pigmentasi selama kehamilan. Keadaan ini sangat jelas terlihat pada kelompok wanita dengan warna kulit gelap atau hitam dan dapat dikenali pada payudara, abdomen, vulva dan wajah. Ketika terjadi pada kulit muka dikenal sebagai cloasma atau topeng kehamilan. Bila terjadi pada muka biasanya pada daerah pipi dan dahi dan dapat mengubah penampilan wanita tersebut.

Linea alba garis putih tipis yang membentang dari simphysis pubis sampai umbilicus, dapat menjadi gelap yang biasa disebut linea nigra. Peningkatan pigmentasi ini akan berkurang sedikit demi sedikit setelah masa kehamilan. Tingginya kadar hormon yang tersirkulasi dalam darah dan peningkatan regangan pada kulit abdomen, paha, dan payudara bertanggung jawab pada timbulnya garis-garis yang berwarna merah muda atau kecoklatan pada daerah tersebut. Tanda tersebut biasa dikenal dengan nama striae gravidarum dan bisa menjadi lebih gelap warnanya pada multipara dengan warna kulit gelap atau hitam. Striae gravidarum ini akan berkurang setelah masa kehamilan dan biasanya nampak seperti garis-garis yang berwarna keperakan pada wanita kulit putih atau wana gelap/ hitam akan mengkilat.

Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi avat-alat tertentu. Pigmentasi ini disebabkan oleh pengaruh melanophore stimulating hormon (MSH) yang meningkat. MSH ini adalah salah satu hormon yang juga dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Kadang-kadang terdapat deposit pigment pada dahi, pipi, hidung, yang disebut chloasma gravidarum. Estrogen dan progesteron telah divaporikan menimbulkan efek perangsangan melanosit (Nurul Jannah, 2012:101-103).

g. Sistem gastrointestinal

Rahim semakin membesar akan menekan rectum dan usus bagian bawah, sehingga terjadi sembelit atau konstipasi. Sembelit semakin berat karena gerakan otot di dalam usus diperlambat oleh tingginya kadar progesteron. Wanita hamil sering mengalami rasa panas di dada (heartburn) dan sendawa, yang memungkinkan terjadi karena makanan lebih lama berada di dalam lambung dan karena relaksasi spinter dikorongkonan bagian bawah yang memungkinkan isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Ulkus dastrikum jarang ditemukan pada wanita hamil dan jika sebelumnya menderita ulkus gastrikum biasanya membaik karena asma lambung yang dihasilkan lebih sedikit.

h. Sistem urinaria

Pada trimester kedua aliran darah ginjal meningkat dan tetap terjadi hingga usia kehamilan 30 minggu, setelah itu menurun secara perlahan. Ginjal mengalami pembesaran dan filtrasi glomerular. Perubahan dalam filtrasi glomerulus adalah penyebab peningkatan klirens kreatinin, urea, dan asam urat yang sangat direabsorpsi pada awal kehamilan. Protein dan asam amino sangat sedikit direabsorpsi, sementara asam amino dan vitamin ditemukan dalam jumlah yang banyak dalam urin wanita hamil hanya protein yang tidak bisa ditemukan pada urin wanita hamil.

Ekskresi glukosa meningkat sebagai hasil peningkatan filtrasi glomerulus terhadap glukosa dibandingkan dengan pengurangan reabsorpsi. Glikosuria merupakan hal yang umum dalam kehamilan dan biasanya berhubungan dengan kadar gula tinggi dalam darah. Dalam hal ini, keadaan wanita hamil harus dipantau untuk menghindari diabetes militus. Glukosuria dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Walaupun ada 100 liter cairan ekstra yang dapat melalui tubuler ginjal setiap harinya, saluran urine mengalami pengurangan karena peningkatan reabsorpsi.

i. Sistem endokrin

1. Hormon plasenta

Sekresi hormon plasenta dan HCG dari plasenta janin mengubah organ endokrin secara langsung. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan produksi globulin meningkat dan menekan produksi tiroksin, kortikosteroid dan steroid. Akibatnya plasenta yang mengandung hormon-hormon ini akan meningkat jumlahnya, tetapi kadar hormon bebas tidak mengalami peningkatan besar.

2. Kelenjar hipofisis

Berat kelenjar hipofisis anterior meningkat sampai 30-50% yang menyebabkan wanita hamil menderita pusing. Sekresi hormon provaktin, adrenokortikosteroid, tiotropik, dan melanocyt stimulatiting hormone meningkat. Produksi hormon perangsang folikel dan LH dihambat oleh estrogen dan progesteron plasenta. Efek meningkatnya sekresi prolaktin adalah ditekannya produksi estrogen dan progesteron pada masa kehamilan.

3. Kelenjar tyroid

Dalam kehamilan, normal ukuran kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran kira-kira 13% karena adanya hyperplasia dari jaringan glandula dan peningkatan vaskularisasi. Secara fisiologi akan terjadi peningkatan ambilan iodine sebagai kompensasi kebutuhan ginjal terhadap iodine yang meningkatkn laju filtrasi glomerulus. Walaupun kadang-kadang kehamilan dapat menunjukkan hipertiroid, fungsi tiroid biasanya normal. Namun, peningkatan

konsentrasi T4 (tiroksin) dan T 3 (triiodotironin) juga dapat merangsang peningkatan laju basal. Hal ini disebabkan oleh produksi estrogen stimulated hepatic dari tiroksin yang menekan glubolin.

4. Kelenjar adrenal

Karena dirangsang oleh hormon estrogen, kelenjar adrenal memproduksi lebih banyak kortisol plasma bebas dan juga kortikosteroid termasuk ACTH dan hal ini terjadi di usia kehamilan 12 minggu sampai aterm (Nurul Jannah, 2012:104-105).

j. Sistem pernapasan

Ruang abdomen yang membesar karena meningkatnya ruang rahim dan pembentukan hormon progesteron menyebabkan paru-paru berfungsi sedikit berbeda dari biasanya. Wanita hamil bernapas lebih cepat dan lebih dalam karena memerlukan oksigen lebih banyak untuk janin dan untuk dirinya. Lingkar dada wanita hamil agak lebih membesar, lapisan salurann pernapasan menerima lebih banyak darah dan menjadi agak tersumbat oleh penumpukkan darah (kongesti). Kadang hidung dan tenggorokkan mengalami penyumbatan parsial akibat kongesti ini (Nurul Jannah, 2012:106).

3. Perubahan dan Adaptasi Psikologis dalam Masa Kehamilan

a. Kehamilan trimester I

Trimester pertama sering dianggap periode penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan wanita terhadap kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas psikologis yang paling penting pada trimester pertama kehamilan.

Sebagian besar wanita merasa sedih dan ambivalen tentang kenyataan bahwa ia hamil. Kurang lebih 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Hingga kini masih diragukan bahwa seorang wanita lajang bahkan telah merencanakan dan menginginkan kehamilan atau telah berusaha keras untuk hamil tidak mengatakan pada dirinya sedikitnya satu kali bahwa ia sebenarnya berharap tidak hamil. Keseragaman kebutuhan ini perlu dibicarakan dengan wanita karena ia cenderung menyembunyikan ambivalensi atau perasaan negatifnya ini karena perasaan tersebut bertentangan dengan apa yang menurutnya semestinya ia rasakan. Jika ia tidak dibantu memahami dan menerima ambivalensi dan perasaan negatif tersebut sebagai suatu hal yang normal dalam kehamilan, maka ia akan merasa sangat bersalah jika nantinya bayi yang ia kandung meninggal saat dilahirkan atau terlahir cacat atau abnormal. Fokus wanita adalah pada dirinya sendiri. Beberapa wanita, terutama mereka yang telah merencanakan kehamilan atau telah berusaha keras untuk

hamil, merasa suka cita sekaligus tidak percaya bahwa dirinya telah hamil dan mencari bukti kehamilan tiap jengkal pada tubuhnya. Trimester pertama sering menjadi waktu yang sangat menyenangkan untuk melihat apakah kehamilan berkembang dengan baik. Hal ini akan terlihat jelas terutama pada wanita yang telah beberapa kali mengalami keguguran dan bagi para tenaga kesehatan profesional wanita yang cemas akan memungkinkan terjadinya keguguran kembali atau terotoma. (Elizabeth, 2013:67).

b. Kehamilan trimester II

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. Namun trimester kedua juga merupakan fase ketika wanita menelusur dan paling banyak mengalami kemunduran. Trimester kedua sebenarnya terbagi atas dua fase yaitu pra queckening dan pasca queckening. Queckening menunjukkan adanya kenyataan kehidupan yang terpisah, yang menjadi dorongan bagi wanita dalam melaksanakan tugas psikologis utamanya pada trimester kedua, yakni mengembangkan identitas sebagai ibu bagi dirinya sendiri yang berbeda dari ibunya.

Queckening memudahkan wanita untuk mengkonseptualisasi banyinya sebagai individu yang terpisah dari dirinya sendiri.

Kesadaran baru ini merupakan perubahan dalam fokusnya dari diri sendiri kepada bayi yang dikandungnya. (Elizabeth, 2013:68).

c. Kehamilan trimester III

Trimester ketiga sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Sejumlah ketakutan muncul pada trimester ketiga. Wanita mungkin merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri, seperti apakah banyinya nanti akan lahir abnormal, terkait persalinan dan kelahiran 9 nyeri, kehilangan kendali, hal-hallain yang tidak diketahui), apakah ia akan menyadari bahwa ia akan bersalin, atau bayinya tidak mampu keluar karena perutnya sudah luar biasa besar. Atau apakah organ vitalnya akan mengalami cedera akibat tendangan bayi (Elizabeth, 2013:69).

4. Tanda-tanda Diagnosa Kehamilan

Perubahan endokronologis, fisiologis, dan anatomis yang menyertai kehamilan menimbulkan gejala dan tanda yang memberikan bukti adanya kehamilan. Gejala dan tanda tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu tanda persumtif (tidak pasti), tanda-tanda kemungkinan, dan tanda-tanda positif kehamilan.

a. Bukti persumtif kehamilan (Tanda tidak pasti hamil)

Bukti persumtif kehamilan umumnya didasarkan pada gejala-gejala subjektif berupa:

1. Mual muntah atau tanpa muntah
2. Gangguan berkemih
3. Fatigue
4. Persepsi adanya gerakan jani

Yang termasuk tanda persumtif adalah

1. Terhentinya menstruasi
2. Perubahan pada payudara
3. Perubahan warna mukosa vagina
4. Meningkatnya pigmentasi kulit dan timbulnya striae abdomen
5. Yang terpenting apakah wanita yang bersangkutan merasa dirinya hamil (Elizabeth, 2013:71).

b. Bukti kemungkinan hamil

Tanda-tanda kemungkinan kehamilan mencakup

1. Pembesaran abdomen
2. Perubahan bentuk, ukuran, dan konsistensi uterus
3. Perubahan anatomis pada serviks
4. Kontraksi braxton hicks
5. Ballotement
6. Konstruksi fisik janin
7. Adanya gonadotropin korionik di urine atau serum (Elizabeth, 2013:75).

c. Bukti positif hamil

1. Identifikasi kerja jantung janin yang terpisah dan tersendiri dari kerja jantung wanita hamil.
2. Persepsi gerakan janin aktif oleh pemeriksa
3. Pengenalan mudigah dan janin setiap saat selama kehamilan dengan tehnik sonografi atau pengenalan janin yang lebih tua secara radiografis pada paruh kedua kehamilan (Elizabeth, 2013:78).

B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care (ANC)

1. Pengertian AntenatalCare

Kehamilan merupakan suatu proses yang fisiologis dan alamiah. Namun pada saat kehamilan sering diikuti komplikasi-komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Maka dari itu, pentingnya antenatal care, antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan terutama di tujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibunya

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar(G.A.Mandriwati, 2012:3).

2. Tujuan Pelayanan Antenatal Care

Tujuan utama ANC adalah menurunkan atau mencegah kasakitan dan kematian maternal dan perinatal (Elisabeth, 2016 :11). Selain itu tujuan umum anc menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama kehamilan, persalinan dan nifas, sehingga didapatkan ibu dan anak sehat (dr. Dewi Setiawati, 2013:14).

Adapun tujuan khusus adalah:

- a. Memonitor kemajuan kehamilan guna memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayi normal.
- b. Mengenali secara dini penyimpangan dari normal dan memberikan penatalaksanaan yang diperlukan.
- c. Membina hubungan saling percaya antara ibu dan bidan dalam rangka mempersiapkan ibu dan keluarga secara fisik, emosional, dan logis untuk menghadapi kelahiran serta memungkinkan adanya komplikasi (Elisabeth, 2016 :11).
- d. Mengenali dan menangani penyakit-penyakit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan dan nifas misalnya pada kehamilan adanya hiperemesis gravidarum yaitu muntah yang berlebihan yang dapat membahayakan ibu hamil karena keluarnya cairan dan berkurangnya masukan nutrisi karena mual muntah.

- e. Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita sedini mungkin, misalnya adanya penyakit hipertensi yang menyertai kehamilan.
- f. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak.
- g. Memberikan nasehat-nasehat tentang cara hidup sehari-hari berkaitan dengan kehamilan, nifas, laktasi dan keluarga berencana (dr. Dewi Setiawati, 2013:14).

3. Kunjungan Pelayanan Antenatal Care

Kunjungan antenatal pertama mungkin hal yang paling penting dalam kehamilan dan merupakan kesempatan bagi ibu dan bidan untuk saling mengenal (Helen dan Jennifer, 2013:21).

Kunjungan ANC dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan yaitu:

- a. Trimester I sebelum 14 minggu
 - a) Mendeteksi masalah yang dapat ditangani sebelum membahayakan jiwa
 - b) Mencegah masalah, misalnya tetanus neonatal, anemia, kebiasaan tradisional yang berbahaya
 - c) Membangun hubungan saling percaya
 - d) Memulai persiapan kelahiran dan kesiapan menghadapi komplikasi
 - e) Mendorong perilaku sehat (nutrisi, kebersihan, olahraga, istirahat, seks, dan sebagainya)

- b. Trimester II 14-28 minggu
- a) Mendeteksi masalah yang dapat ditangani sebelum membahayakan jiwa
 - b) Mencegah masalah misalnya tetanus neonatal, anemia, kebiasaan tradisionalnya yang berbahaya
 - c) Membangun hubungan saling percaya
 - d) Memulai persiapan kelahiran dan kesiapan menghadapi komplikasi
 - e) Mendorong perilaku sehat (nutrisi, kebersihan, olahraga, istirahat, seks, dan sebagainya)
 - f) Kewaspadaan khusus terhadap hipertensi kehamilan (deteksi gejala pre eklampsia, pantau TD, evaluasi edema dan proteinuria)
- c. Trimester III 28-36 minggu
- a) Mendeteksi masalah yang dapat ditangani sebelum membahayakan jiwa
 - b) Mencegah masalah misalnya tetanus neonatal, anemia, kebiasaan tradisionalnya yang berbahaya
 - c) Membangun hubungan saling percaya
 - d) Memulai persiapan kelahiran dan kesiapan menghadapi komplikasi
 - e) Mendorong perilaku sehat (nutrisi, kebersihan, olahraga, istirahat, seks, dan sebagainya)
- d. Setelah 36 minggu

- a) Mendeteksi masalah yang dapat ditangani sebelum membahayakan jiwa
 - b) Mencegah masalah misalnya tetanus neonatal, anemia, kebiasaan tradisionalnya yang berbahaya
 - c) Membangun hubungan saling percaya
 - d) Memulai persiapan kelahiran dan kesiapan menghadapi komplikasi
 - e) Mendorong perilaku sehat (nutrisi, kebersihan, olahraga, istirahat, seks, dan sebagainya)
 - f) Deteksi kelainan letak atau kondisi yang memerlukan persalinan di RS (Elisabeth, 2016:19-20).
- e. Minggu 38 (ulangi pada minggu ke-40 untuk nulipara)
- Pemeriksaan antenatal lengkap
- f. Minggu 41
- a) Pemeriksaan antenatal lengkap seperti sebelumnya
 - b) Pengkajian untuk induksi persalinan atau peningkatan pengawasan janin (S. Elisabeth dan Jason, 2013: 5).

4. Standar Pelayanan Antenatal Care

Pelayanan kesehatan ibu penting bagi perempuan sejak sebelum hamil atau saat merencanakan kehamilan. Berbagai persoalan seperti sulitnya mengandung atau bagaimana membuat program kehamilan memerlukan dukungan dari orang lain maupun bidan. Demikian pula saat masa

kehamilan. Faktor minimnya pengetahuan ibu, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh pada cara setiap ibu menjaga dan merawat kandungannya. Yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada kesehatan bayi yang akan lahirkan. Sebab tak semua ibu hamil memahami hal itu. Kondisi-kondisi seperti naiknya kadar gula darah, tekanan darah yang akan berpengaruh pada ibu hamil dapat saja muncul di luar dugaan. Atau misalnya pengaruh fisik dan psikis bagi ibu hamil (Ringgi dan Rosmauli, 2014:112-113).

Standar minimal pelayanan ANC yaitu standar 7T yaitu Timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet fe,tes terhadap penyakit menular dan temuwicara (konseling). (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 18).

Standar pelayanan antenatal terdiri atas 6 standar yaitu sebagai berikut

1. Identifikasi ibu hamil

Tujuan

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur (Elisabeth, 2014:).

Pernyataan standar

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.

Prasyarat

- a. Bidan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur.
- b. Bidan harus memahami
 - a) Tujuan pelayanan antenatal dan alasan ibu tidak memeriksakan kehamilannya secara dini.
 - b) Tanda dan gejala kehamilan
 - c) Keterampilan berkomunikasi secara efektif
- c. Bahan penyuluhan kesehatan yang tersedia dan sudah siap digunakan oleh bidan.
- d. Mencatat hasil pemeriksaan pada KMS Ibu hamil/ buku KIA dan kartu ibu.
- e. Transportasi untuk melakukan kunjungan ke masyarakat tersedia bagi bidan.

Proses

Bidan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, keluarga, maupun masyarakat.
- b. Bersama kader kesehatan mendata ibu hamil serta memotivasinya agar memeriksakan kehamilannya sejak dini (segera setelah terlambat haid atau diduga hamil).
- c. Melakukan komunikasi dua arah dengan beberapa kelompok kecil masyarakat untuk membahas manfaat pemeriksaan kehamilan. Ajak mereka memanfaatkan pelayanan KIA terdekat atau sarana kesehatan lainnya untuk memeriksakan kehamilan.
- d. Melalui komunikasi dua arah dengan pamong, tokoh masyarakat, ibu, suami, keluarga, dan dukun bayi. Jelaskan prosedur pemeriksaan kehamilan yang diberikan. Hal tersebut akan mengurangi keraguan mereka tentang apa yang terjadi pada saat pemeriksaan antenatal dan memperjelas manfaat pelayanan antenatal dan mempromosikan kehadiran ibu untuk pemeriksaan antenatal.

- e. Tekankan bahwa tujuan pemeriksaan kehamilan adalah ibu dan bayi yang sehat pada akhir kehamilan. Agar tujuan tersebut tercapai, pemeriksaan kehamilan harus segera dilaksanakan begitu diduga terjadi kehamilan dan dilaksanakan terus secara berkala selama kehamilan.
- f. Ibu harus melakukan pemeriksaan antenatal paling sedikit empat kali. Satu kali kunjungan pada trimester pertama, satu kali pada trimester dua, dan dua kali pada kunjungan trimester ketiga.
- g. Berikan penjelasan kepada seluruh ibu tentang tanda kehamilan dan fungsi tubuhnya. Tekankan perlunya ibu mengerti bagaimana tubuhnya berfungsi. Tekankan perlunya ibu mengerti bagaimana tubuhnya berfungsi. (wanita harus memperhatikan siklus haidnya, mengetahui dan memeriksakan diri bila terjadi keterlambatan atau haid kurang dari biasanya).
- h. Bimbingan kader untuk mendata/mencatat semua ibu hamil di daerahnya. Lakukan kunjungan rumah kepada mereka yang tidak memeriksakan kehamilannya. Pelajari alasannya, mengapa ibu hamil tersebut tidak memeriksakan diri, jelaskan manfaat pemeriksaan kehamilan.
- i. Perhatikan ibu bersalin yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya. Lakukan kunjungan rumah, pelajari alasannya,.

Berikan penyuluhan dan konseling yang sesuai untuk kehamilan berikutnya, keluarga berencana, dan penjarangan kehamilan.

- j. Jelaskan tingkatan penggunaan KMS Ibu Hamil/Buku KIA dan Kartu Ibu (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 167-169).

2. Pemeriksaan dan pemantauan antenatal

Tujuan

Memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan.

Prasyarat

- a. Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas, termasuk penggunaan KMS Ibu Hamil dan kartu pencatatan hasil pemeriksaan kehamilan (Kartu Ibu).
- b. Alat untuk pelayanan antenatal tersedia dalam keadaan baik dan berfungsi, antara lain: stetoskop, tensimeter, meteran kain, timbangan, pengukur lingkaran lengan atas, dan stetoskop janin.
- c. Tersedia obat dan bahan lain, misalnya: vaksin TT, tablet Fe, asam folat, dan obat anti malaria (pada daerah endemis malaria), serta alat pengukur Hb sahli.
- d. Menggunakan KMS Ibu hamil/Buku KIA dan Kartu Ibu.

- e. Terdapat sistem rujukan yang berfungsi dengan baik, ibu hamil resiko tinggi atau mengalami komplikasi dirujuk agar mendapatkan pertolongan yang memadai.

Proses

Bidan harus melakukan hal-hal berikut:

- a. Bersikap ramah, sopan, dan bersahabat pada setiap kunjungan.
- b. Pada kunjungan pertama, bidan melakukan hal-hal berikut
 - a) Melakukan anamnesis riwayat dan mengisi KMS Ibu Hamil/ Buku KIA dan Kartu Ibu.
 - b) Memastikan bahwa kehamilan itu diharapkan.
 - c) Tentukan hari taksiran persalinan (HTP). Jika hari pertama haid terakhir (HPHT) tidak diketahui, tanyakan kapan pertama kali dirasakan pergerakan janin dan cocokan dengan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri. Jelaskan bahwa hari taksiran persalinan hanyalah suatu perkiraan.
 - d) Memeriksa kadar Hb
 - e) Berikan imunisasi TT (tetanus toksoid) sesuai dengan ketentuan.
- c. Pada setiap kunjungan, bidan harus melakukan hal-hal berikut ini
 - a) Menilai keadaan umum (fisik) dan psikologis ibu hamil.

- b) Memeriksa urine untuk tes protein dan glukosa urine atas indikasi. Bila ada kelainan ibu dirujuk.
- c) Mengukur berat badan dan lingkar lengan atas. Jika beratnya tidak bertambah atau pengukuran lengan menunjukkan kurang gizi, beri penyuluhan tentang gizi dan rujuk untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut.
- d) Jika berat badan lebih dari 1 ½ kg perminggu, segera rujuk.
- e) Mengukur tekanan darah dengan posisi ibu hamil duduk atau berbaring, posisi tetap sama pada pemeriksaan pertama maupun berikutnya. Letakkan tensimeter dipermukaan yang datar setinggi jantungnya. Gunakan selalu ukuran manset yang sesuai. Ukur tekanan darah. (Tekanan darah di atas 140/90 mmHg, peningkatan diastolik 15 mmHg/15 menit atau lebih sebelum kehamilan 20 minggu atau paling sedikit pada pengukuran dua kali berturut-turut pada selisih 1 jam, berarti ada kenaikan nyata dan ibu perlu di rujuk).
- f) Periksa Hb pada kunjungan pertama dan pada kehamilan 28 minggu atau lebih sering jika ada tanda-tanda anemia. Pada daerah endemis malaria beri profilaksis dan penyuluhan saat kunjungan pertama.

g) Tanyakan apakah ibu hamil meminum tablet zat besi sesuai dengan ketentuan dan apakah persediaannya cukup. Tablet zat besi berisi 60 mg zat besi dan 500 mg asam folat paling sedikit diminum satu tablet sehari selama 90 hari berturut-turut. Ingatkan ibu hamil agar tidak meminumnya dengan teh/kopi.

h) Tanyakan dan periksa tanda/gejala penyakit menular seksual (PMS) dan ambil tindakan sesuai dengan ketentuan.

i) Tanyakan apakah ibu hamil merasakan hal-hal seperti perdarahan, nyeri epigastrium, sesak napas, nyeri perut, dan demam.

j) Lakukan pemeriksaan fisik ibu hamil secara lengkap.

Periksalah payudara, lakukan penyuluhan, dan perawatan untuk pemberian ASI eksklusif. Pastikan bahwa kandung kemih ibu kosong sebelum diperiksa.

k) Ukur tinggi fundus uteri dalam cm dengan menggunakan meteran kain. (Sesudah kehamilan dari 24 minggu tinggi fundus dalam cm diukur dan simfisis pubis sampai ke fundus uteri, sesuai dengan umur kehamilan dalam minggu).

- l) Tanyakan apakah janin sering bergerak dan dengarkan denyut jantung janin.
- m) Rujuk jika tidak terdengar atau pergerakan janin menurun pada bulan terakhir kehamilan.
- n) Berikan nasehat tentang cara perawatan diri selama kehamilan, tanda bahaya pada kehamilan, perawatan payudara, kurang gizi, dan anemia.
- o) Dengarkan keluhan yang disampaikan ibu dengan penuh minat dan beri nasehat atau rujuk jika diperlukan. Igat semua ibu memerlukan dukungan moral selama kehamilannya.
- p) Bicarakan tentang tempat persalinan, persiapan transportasi untuk rujukan jika diperlukan. Beri nasehat mengenai persiapan persalinan.
- q) Catat semua temuan pada KMS Ibu Hamil/Buku KIA dan Kartu Ibu. Pelajari semua temuan untuk menentukan tindakan selanjutnya, termasuk rujukan ke fasilitas rujukan / rumah sakit (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 170-172).

3. Palpasi abdominal

Pernyataan standar

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara saksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.

Tujuan

Memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi, dan bagian bawah janin.

Prasyarat

- a. Bidan telah dididik tentang prosedur palpasi abdominal yang benar.
- b. Alat misalnya meteran kain, stetoskop, tersedia dalam kondisi baik.
- c. Tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima masyarakat.
- d. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA. Kartu Ibu untuk pencatatan.
- e. Adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan.

Proses

Bidan harus melakukan hal-hal berikut ini

- a. Melaksanakan palpasi abdominal pada setiap kunjungan antenatal.
- b. Tanyakan pada ibu hamil sebelum palpasi apa yang dirasakannya, apakah janinnya bergerak, kapan haid terakhir atau kapan pertama kali merasakan pergerakan janin.
- c. Sebelum palpasi abdominal, mintalah ibu hamil mengosongkan kandung kemihnya.
- d. Baringkan ibu hamil telentang dengan bagian atas tubuhnya disangga bantal. Jangan membaringkan ibu hamil telentang dengan punggung datar, karena berat uterus dapat menekan pembuluh darah balik ke jantung sehingga akan mengakibatkan pingsan.
- e. Periksa abdomen adakah jaringan parut (tanyakan penyebabnya), tanda-tanda kehamilan sebelumnya, tanda-tanda peregarangan uterus yang berlebihan atau kehamilan ganda (perut lebih besar, banyak bagian janin yang teraba, terabanya lebih dari satu kepala janin). Catat semua temuan dan rujuk tepat waktu ke rumah sakit jika ditemukan bekas bedah sectio sesarea, tanda berlebih/kurangnya cairan amion dan kehamilan ganda.
- f. Perkirakan usia kehamilan setelah minggu ke 24, cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan meteran kain.

- g. Ukur dengan meteran kain dari simfisis pubis ke fundus uteri, catat hasilnya dalam cm. Jika hasilnya berbeda dengan perkiraan umur kehamilan (dalam minggu) atau tidak sesuai dengan gravidogram berarti terdapat pertumbuhan janin lambat/tidak ada, ibu perlu dirujuk.
- h. Lakukan palpasi dengan hati-hati untuk memeriksa letak janin 9 usia kehamilan 36 minggu seharusnya memanjang, jika tidak, dan atau lebih rujuk ke rumah sakit).
- i. Dengan menggunakan dua tangan, lakukan palpasi abdominal untuk menentukan bagian bawah janin (kelapa teraba keras, dan lebih besar dibandingkan bokong. Jika kepala berada di fundus uteri, biasanya melenting).
- j. Pada trimester ketiga, jika bagian bawah janin bukan kepala, persalinan harus dilakukan di rumah sakit.
- k. Setelah umur kehamilan 37 minggu, terutama pada kehamilan pertama, periksa apakah telah terjadi penurunan kepala janin (kepala janin sudah melewati pintu atas panggul atau kepala janin teraba hanya dua jari diatas pintu atas panggul). Bila kepala tidak masuk ke panggul (CPD,DKP) persalinan harus di rumah sakit.
- l. Periksa letak janin dan dengarkan denyut jantung janin (dengarkan selama satu menit penuh, perhatikan kecepatan dan

iramanya). Jika tidak ditemukan denyut jantung janin atau pergerakan janin sangat lemah, rujuklah ibu ke rumah sakit.

m. Bicarakan hasil pemeriksaan dengan ibu hamil, suami/anggota keluarga yang mengantarnya.

n. Catat semua temuan, pelajari, dan jika ada kelainan secepatnya rujuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 172-174).

4. Pengelolaan anemia pada kehamilan

Pernyataan standar

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Menemukan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung.

Prasyarat

- a. Ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan.
- b. Bidan mampu
 - a) Mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan.
 - b) Memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia.

- c. Alat untuk mengukur kadar Hb yang berfungsi baik.
- d. Tersedia tablet zat besi dan asam folat.
- e. Obat anti malaria di daerah endemis malaria.
- f. Obat cacing.
- g. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA dan Kartu Ibu.

Proses

Bidan harus melakukan hal-hal berikut

- a. Memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada minggu ke 28. Hb dibawah 11 gr/% pada kehamilan termasuk anemia, dibawah 8 gr/% adalah anemia berat. Bila alat pemeriksaan tidak tersedia, periksa kelopak mata dan perkirakan ada/tidaknya anemia.
- b. Beri tablet zat besi pada semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut-turut. Bila Hb kurang dari 11 gr/%, teruskan pemberian tablet zat besi.
- c. Beri penyuluhan gizi pada setiap kunjungan antenatal, mengenai perlunya minum tablet zat besi, makanan yang mengandung zat besi dan kaya vitamin C, serta menghindari minum teh/kopi atau susu dalam 1 jam sebelum/sesudah makan (teh/kopi atau susu mengganggu penyerapan zat besi). Beri contoh makanan setempat yang kaya zat besi.

- d. Jika prevalensi malaria tinggi, selalu ingatkan ibu hamil untuk berhati-hati agar tidak tertular penyakit malaria. Berikan tablet klorokuin 10 mg/KgBB peroral, sehari satu kali selama 2 hari. Kemudian dianjurkan dengan 5 mg/KgBB pada hari ke 3 (klorokuin aman dalam 3 trimester kehamilan).
- e. Jika ditemukan / diduga anemia berikan 2-3 kali tablet zat besi per hari.
- f. Rujuk ibu hamil dengan anemia untuk pemeriksaan terhadap penyakit cacing/ parasit atau penyakit lainnya dan sekaligus untuk pengobatannya.
- g. Jika diduga ada anemia berat misalnya wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya.

Ibu hamil dengan anemia pada trimester ketiga perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM.

- h. Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin di rumah sakit.
- i. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 175-176).

5. Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan

Tujuan

Mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan.

Pernyataan standar

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala pre eklampsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

Prasyarat

- a. Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan darah.
- b. Bidan mampu
 - a) Mengukur tekanan darah dengan benar
 - b) Mengenali tanda-tanda pre eklampsia
 - c) Mendeteksi hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan lanjut sesuai dengan ketentuan.
- c. Tersedianya tensimeter air raksa dan stetoskop berfungsi dengan baik.
- d. Menggunakan KMS Ibu Hamil/ Buku KIA dan Kartu Ibu.
- e. Alat pemeriksaan protein urine

Proses

- a. Memeriksa tekanan darah secara tepat pada setiap pemeriksaan kehamilan, termasuk pengukuran tekanan darah dengan teknik yang benar.
- b. Melakukan pemeriksaan pada setiap pagi hari.
- c. Ukur tekanan darah pada lengan kiri. Posisi ibu hamil duduk atau berbaring dengan posisi yang sama pada setiap kali pengukuran.
 - a) Letakkan tensimeter ditempat yang datar, setinggi jantung ibu hamil.
 - b) Gunakan ukuran manset yang sesuai.
- d. Catat tekanan darah
 - a) Jika tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau peningkatan diastolik 15 mmHg atau lebih (sebelum 20 minggu), ulangi pengukuran tekanan darah dalam 1 jam. Bila tetap, maka berarti ada kenaikan tekanan darah. Periksa adanya edema, terutama pada wajah atau tungkai bawah/tulang kering dan daerah sakral (pembengkakan jari dan pergelangan kaki mungkin bersifat fisiologis, terutama karena cuaca panas atau karena berjalan atau berdiri lama).

- b) Bila ditemukan hipertensi pada kehamilan, lakukan pemeriksaan urine terhadap albumin pada setiap kali kunjungan.
- c) Segera rujuk ibu hamil ke rumah sakit jika tekanan darah sangat tinggi misalnya 160/110 mmHg atau lebih. Kenaikan tekanan darah terjadi secara tiba-tiba, atau berkurangnya air seni (sedikit dan berwarna gelap, edema berat yang timbul mendadak, khususnya pada wajah, daerah sakral, punggung bawah atau proteinuria. Catatan jika tidak dirujuk bolus MgSO₄ 2 g IV dilanjutkan dengan MgSO₄ 4 gr IM setiap 4 jam dan nifedipin 10 mg peroral dilanjutkan 10 mg setiap 4 jam.
- e. Jika tekanan darah naik namun tidak ada edema, sedangkan dokter tidak mudah dicapai, maka pantaulah tekanan darah, periksa urine terhadap proteinuria dan denyut jantung janin dengan saksama pada keesokan harinya atau sesudah enam jam istirahat.
- f. Jika tekanan darah tetap naik, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, walaupun tak ada edema atau proteinuria.
- g. Jika tekanan darah kembali normal, atau kenaikannya kurang dari 15 mmHg

- h. Beri penjelasan pada ibu hamil, suami atau keluarganya tentang tanda-tanda eklampsia yang mengancam, khususnya sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, pembengkakan mendadak pada kaki, dan punggung dan wajah (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 176-178).

6. Persiapan persalinan

Tujuan

Untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil.

Pernyataan standar

Bidan memberi saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, keluarga, dan keluarganya pada trimester ketiga, dengan tujuan memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih, aman, dan suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat.

Prasyarat

- a. Semua ibu harus melakukan dua kali kunjungan antenatal pada trimester terakhir kehamilannya.
- b. Adanya kebijaksanaan dan protokol nasional atau setempat tentang indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit.

- c. Bidan terlatih dan terampil dalam melaksanakan pertolongan persalinan yang aman dan bersih.
- d. Peralatan penting untuk melakukan pemeriksaan antenatal tersedia dalam keadaan berfungsi termasuk air mengalir, sabun, handuk bersih untuk mengeringkan tangan, beberapa pasang sarung tangan bersih dan DTT/ steril, fetoskop / doppler, pita pengukur yang bersih, stetoskop, dan tensimeter.
- e. Perlengkapan penting yang diperlukan untuk melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan desinfeksi tingkat tinggi termasuk partus set DTT/ steril, sarung tangan DTT dan peralatan yang memadai untuk merawat bayi baru lahir.
- f. Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat jika terjadi kegawatdaruratan ibu dan janin.
- g. Menggunakan KMS Ibu Hamil / Buku KIA, Kartu Ibu dan partograf.
- h. Sitem rujukan yang efektif untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi selama kehamilan.

Proses

Bidan harus melakukan hal-hal berikut ini

- a. Mengatur pertemuan ibu hamil dan suami / keluarga pada trimester ketiga untuk membicarakan tempat persalinan dan hal-hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan.
- b. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian keringkan hingga betul-betul kering dengan handuk bersih (kuku harus dipotong pendek dan bersih) setiap kali sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan pasien. Gunakan sarung tangan bersih kapan pun menangani benda yang terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh. Gunakan sarung tangan bersih untuk semua pemeriksaan vagina. Jika dicurigai bahwa ketuban sudah pecah atau ibu dalam proses bersalin gunakan sarung tangan DTT.
- c. Melakukan anamnesis dan riwayat kehamilan ibu secara rinci hingga yang terbaru dan melaksanakan seluruh pemeriksaan antenatal sebelum memberikan nasehat kepada ibu hamil.
- d. Memberikan informasi agar mengetahui saat akan melahirkan dan kapan harus mencari pertolongan, termasuk pengenalan tanda bahaya (sakit kepala, pusing, gangguan penglihatan, nyeri dibagian perut, ketuban pecah sebelum waktunya, dan perdarahan pada kehamilan yang bukan darah lendir normal perlu pertolongan secepatnya).

- e. Jika direncanakan persalinan di rumah atau di daerah terpencil
- a) Beritahukan kepada ibu hamil perlengkapan yang diperlukan untuk persalinan yang bersih dan aman. Minimal tersedia tempat yang bersih untuk ibu berbaring sewaktu persalinan, sabun yang baru, air yang bersih dan mengalir, handuk yang bersih, kain bersih untuk membersihkan dan menghangatkan bayi, runagan yangb bersih dan sehat, 2-3 handuk/ kain yang kering dan bersih untuk bayi, air matang, pembalut wanita/ kain yang bersih, serta sarung atau selimut untuk menyelimuti ibu dan bayi.
 - b) Sistem yang berjalan dengan baik dalam menyediakan obat-obatan perlengkapan yang tepat saat persalinan.
 - c) Atur agar ibu memilih sendiri orang yang membantu proses persalinan dan kelahiran.
 - d) Beri penjelasan kepada ibu hamil mengenai waktu yang tepat untuk memanggil bidan.
 - e) Harus disepakati tentang bagaimna dan ke mana merujuk ibu jika terjadi kegawatdaruratan.
 - f) Harus ada rencana untuk mendapatkan dan membayar transfusi darah bila transfusi diperlukan.
 - g) Sebagai persiapan untuk merujuk ataur transportasi ke rumah sakit bersama ibu hamil dan suami atau keluarga.

- f. Jika direncanakan persalinan di rumah sakit beri penjelasan pada ibu hamil, suami ataupun keluarga untuk membawa persiapan.
- g. Ibu hamil dengan kondisi di bawah ini harus dirujuk untuk melahirkan di rumah sakit atau puskesmas yang memiliki perawatan kegawatdaruratan atau obstetri yang penting
- a) Riwayat sectio cesaria
 - b) Penyakit kronis misalnya kencing manis, jantung, asma berat, TBC dan kesulitan bernafas.
 - c) Perdarahan pervaginam
 - d) Kehamilan kurang bulan (<37 minggu)
 - e) Ketuban pecah dengan mekonium yang kental
 - f) Ketuban pecah pada persalinan kurang dari 37 minggu
 - g) Ikhterus
 - h) Anemia berat
 - i) Pre eklampsia berat
 - j) Tinggi fundus uteri > 40 cm (makrosomia, kehamilan kembar dan polihidramnion).
 - k) Demam suhu > 36 °C
 - l) Gawat janin
 - m) Presentasi bukan belakang kepala

- n) Tali pusat menubung(M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 178-182).

5. Kebijakan Pelayanan Asuhan Antenatal Care

Kebijakan pelayanan asuhan antenatal bertujuan memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan melakukan deteksi dini terhadap komplikasi sedini mungkin. Proses pelaksanaannya selama kehamilan yaitu bidan mengupayakan memberi asuhan antenatal paling sedikit 4 kali selama kehamilan.

Pelayanan asuhan antenatal yang harus diberikan bidan setiap kehadiran ibu di unit pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi:

- a. Anamnesis untuk mengumpulkan data subjektif yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan janin.
- b. Pemantauan pertumbuhan janin, termasuk penimbangan berat badan pada ibu hamil, pemantauan penambahan tinggi fundus uteri, dan pemantauan denyut jantung janin melalui pemeriksaan fisik dengan inspeksi, palpasi, dan auskultasi.
- c. Pemantauan kesehatan ibu, meliputi pemantauan status gizi melalui pengukuran lingkaran lengan atas dan pemantauan tanda vital termasuk tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan, serta refleksi patela. Untuk

mendeteksi dini adanya kelainan atau komplikasi kehamilan dilakukan beberapa hal yaitu:

- a) Inspeksi mata untuk melihat adanya tanda anemia pada konjungtiva dan ikterus pada sklera mata.
 - b) Inspeksi daerah leher untuk mengetahui pelebaran vena jugularis dan palpasi untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid.
 - c) Palpasi payudara untuk mengetahui kelainan.
 - d) Inapeksi alat kelamin luar untuk mengidentifikasi tanda infeksi atau penyakit menular seksual.
- d. Interpretasi dan analisis data sampai memperoleh rumusan diagnosis. Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan, dibuat perumusan rencana asuhan, seperti pemberian informasi dan pendidikan kesehatan tentang kehamilan dan persiapan persalinan, pemberian suplemen gizi, imunisasi tetanus toksoid, melakukan konseling pada masalah-masalah kehamilan, serta senam hamil (G.A. Mandriwati, 2011:5).

C. Tinjauan Umum Khusus Preeklampsia

1) Definisi

Preeklampsia dan eklampsia merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi dalam kehamilan. Preeklampsia dan eklampsia dapat menyebabkan retardasi mental, morbiditas dan mortalitas bayi, kelahiran prematur, dan kematian ibu. Preeklampsia didefinisikan sebagai timbulnya

hipertensi disertai dengan proteinuria pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu atau segera setelah persalinan. Preeklampsia merupakan gangguan multisistem pada kehamilan yang dikarakteristikan disfungsi endotelial, peningkatan tekanan darah karena vasokonstriksi, proteinurine akibat kegagalan glomeru, dan edema akibat peningkatan permeabilitas vaskular.

Eklampsia adalah preeklampsia yang disertai kejang tonik klonik yang dissusul dengan koma. Kejang eklampsia dapat terjadi pada saat antepartum (53%), intrapartum (19%), dan postpartum (28%). Sangat jarang eklampsia terjadi pada akhir masa postpartum (48 jam setelah kelahiran) (Yulia Fauziyah, 2012:17).

Pre eklampsia berat ialah pre eklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Sarwono, 2014:544).

Pre eklampsia berat dibagi atas 2 kategori yaitu, pre eklampsia berat tanpa *impending eclampsia*, dan pre eklampsia berat dengan *impending eclampsia* dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179).

2) Epidemiologi

Insiden pre eklampsia di negara berkembang sekitar 1,8%-18%. Pre eklampsia dan eklampsia menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian

ibu di Indonesia dengan presentasi sebesar 26,9% pada tahun 2012 dan meningkat 27,1% pada tahun 2013 (Depkes RI, 2015).

3) Faktor Resiko

Beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya preeklampsia dan eklampsia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Risiko yang berhubungan dengan partner laki-laki berupa primigravida (resiko primigravida 2 kali lebih besar daripada multigravida), umur yang ekstrim terlalu muda atau terlalu tua untuk kehamilan, partner laki-laki yang pernah menikahi wanita yang kemudian hamil dan mengalami preeklampsia, inseminasi donor dan donor oocyte.
- b. Resiko yang berhubungan dengan riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga berupa riwayat penyakit preeklampsia, hipertensi kronis, penyakit ginjal, obesitas, diabetes gestasional.
- c. Resiko yang berhubungan dengan kehamilan berupa mola hidatidosa kehamilan multipel, hydrops fetals (Yulia Fauziah, 2012:18).

4) Etiologi dan Patofisiologi

Hingga saat ini etiologi dan patogenesis dari preeklampsia masih belum diketahui dengan pasti. Telah banyak hipotesis yang diajukan untuk mencari etiologi dan patogenesis dari preeklampsia namun kini belum

memuaskan sehingga preeklampsia sebagai the diseases of theories. Adapun hipotesis yang diajukan diantaranya adalah:

1) Genetik

Terdapat suatu kecenderungan bahwa faktor keturunan berperan dalam patogenesis preeklampsia. Telah dilaporkan adanya peningkatan angka kejadian preeklampsia pada wanita yang dilahirkan oleh ibu yang menderita preeklampsia.

Bukti yang mendukung berperannya faktor genetik pada kejadian preeklampsia adalah peningkatan Human leukocyte antigens (HLA) pada penderita preeklampsia. Beberapa peneliti melaporkan hubungan antara histokompatibilitas antigen HLA-DR4 dan proteinuria hipertensi. Diduga ibu-ibu dengan HLA haplotipe A23/29, B 44 dan DR 7. memiliki resiko lebih tinggi terhadap perkembangan preeklampsia dan IUGR daripada ibu-ibu tanpa haplotipe tersebut.

Peneliti lain menyatakan kemungkinan preeklampsia berhubungan dengan gen resesif tunggal. Meningkatnya prevalensi preeklampsia pada anak perempuan yang lahir dari ibu yang menderita preeklampsia mengindikasikan adanya pengaruh genotip fetus terhadap kejadian preeklampsia. Walaupun faktor genetik nampaknya berperan pada preeklampsia tetapi manifestasinya pada penyakit ini secara jevas belum dapat diterangkan (Yulia Fauziyah, 2012:19-20).

2) Iskemik Plasenta

Pada kehamilan normal, proliferasi trofoblas akan menginvasi desidua dan miometrium dalam 2 tahap. Pertama, sel-sel trofoblas endovaskuler menginvasi arteri spiralis yaitu dengan mengganti endotel, merusak jaringan elastis pada tunika media dan jaringan otot polos di dinding arteri serta mengganti dinding arteri dengan material fibrinoid. Proses ini selesai pada akhir trimester I dan pada masa ini proses tersebut telah sampai pada deciduometrial junction.

Pada usia kehamilan 14-16 minggu terjadi invasi tahap kedua dari sel trofoblas dimana sel-sel trofoblas tersebut akan menginvasi arteri spiralis lebih dalam hingga ke dalam miometrium. Selanjutnya terjadi proses seperti tahap pertama yaitu penggantian endotel, perusakan jaringan muskulo elastis serta perubahan material fibrinoid dinding arteri. Akhir dari proses ini adalah pembuluh darah yang berdinding tipis, lemas dan berbentuk seperti kantong yang memungkinkan terjadinya dilatasi secara pasif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan aliran darah yang meningkat pada kehamilan.

Pada preeklampsia, proses pasentasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh karena disebabkan 2 hal yaitu:

- a. Tidak semua arteri spiralis mengalami invasi oleh sel-sel trofoblas.

- b. Pada arteri spiralis yang mengalami invasi, terjadi tahap pertama invasi sel trofoblas secara normal tetapi invasi tahap kedua tidak berlangsung sehingga bagian arteri spiralis yang berada dalam miometrium tetap mempunyai dinding muskulo elastik yang reaktif yang berarti masih terdapat resistensi vaskuler.

Disamping itu juga terjadi arterosclerosis akut (lesi seperti atherosclerosis) pada arteri spiralis yang dapat menyebabkan lumen arteri bertambah kecil atau bahkan mengalami obliterasi. Hal ini akan menyebabkan penurunan aliran darah ke plasenta dan berhubungan dengan luasnya daerah infark pada plasenta.

Pada preeklampsia, adanya daerah pada arteri spiralis yang memiliki resistensi vaskular disebabkan oleh karena kegagalan invasi trofoblas ke arteri spiralis pada tahap kedua. Akibatnya, terjadi gangguan aliran darah di daerah intervilli yang menyebabkan penurunan perfusi daerah ke plasenta. Hal ini dapat menimbulkan iskemia dan hipoksia di plasenta yang berakibat terganggunya pertumbuhan bayi intrauterine (IUGR) hingga kematian bayi (Yulia Fauziah, 2012:20-22).

3) Hipoksia pada fetus / plasenta

Hipoksia yang terjadi pada fetus atau plasenta merupakan faktor patogenik pada preeklampsia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

kekurangan oksigen akan menginduksi vasokonstriksi fetoplasenta. Pada manusia, resiko preeklampsia meningkat pada asma dan individu dengan aktivitas yang tinggi, karena akan mempengaruhi hipoksia plasenta. Aliran darah yang abnormal di uterus, dan arteri arkuata merupakan faktor prediktor untuk preeklampsia. Lebih lanjut, pada kehamilan normal, kebutuhan oksigen meningkat, kurva disosiasi oxyhaemoglobin akan berubah kekanan dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Kebalikan pada pasien preeklampsia, kurva disosiasi oxyhaemoglobin bergerak kekiri, hal ini menunjukkan terjadi penurunan oksigen.

Hipoksia juga dapat menginduksi kegagalan fungsi trofoblas. Pada penelitian menggunakan media kultur menunjukkan bahwa kadar oksigen yang rendah pada media kultur akan menghambat diferensiasi sitotrofoblas pada awal kehamilan (Yulia Fauziah, 2012:23).

4) Disfungsi Endotel

Saat ini salah satu teori tentang preeklampsia yang sedang berkembang adalah teori disfungsi endotel. Endotel menghasilkan zat-zat penting yang bersifat relaksasi pembuluh darah, seperti nitric oxide (NO) dan prostasikin (PGE₂) disfungsi endotel adalah suatu keadaan dimana didapatkan adanya ketidakseimbangan antara faktor vasodilatasi dan vasokonstriksi.

Prostakilin merupakan suatu prostaglandin yang dihasilkan di sel endotel yang berasal dari asam arakidonat dimana dalam pembuatannya dikatalisir oleh enzim siklooksigenesis. Prostasikilin akan meningkatkan Camp intraseluler pada sel otot polos dan trombosit dan memiliki efek vasodilator dan anti agregasi trombosit.

Tromboksen A₂ dihasilkan oleh trombosit, berasal dari asam arakidonat dengan bantuan enzim siklooksigenase. Tromboksen memiliki efek vasokonstriktor dan agregasi trombosit. Prostasiklin dan tromboksen A₂ mempunyai efek yang berlawanan dalam mekanisme yang mengatur interaksi antara trombosit dan dinding pembuluh darah.

Pada kehamilan normal terjadi kenaikan prostasikilin oleh jaringan ibu, plasenta dan janin. Sedangkan pada preklampsia terjadi penurunan produksi prostasiklin dan kenaikan tromboksen A₂ sehingga terjadi peningkatan rasio tromboksen A₂ dan prostasiklin.

Pada preklampsia terjadi kerusakan sel endotel akan mengakibatkan menurunnya produksi prostasiklin karena endotel merupakan tempat pembentukan prostasiklin dan meningkatnya produksi tromboksen sebagai kompensasi tubuh terhadap kerusakan endotel tersebut. Preklampsia berhubungan dengan adanya vasospasme dan aktivasi sistem koagulasi hemostatis. Perubahan aktifitas tromboksen memegang peranan sentral pada proses ini dimana hal ini sangat berhubungan dengan ketidakseimbangan antara tromboksen dan protasiklin.

Kerusakan endotel vaskuler pada preeklampsia menyebabkan penurunan produksi prostasiklin, peningkatan aktivasi agregasi trombosit dan fibrinolisis yang kemudian akan diganti trombin dan plasmin. Trombin akan mengkomsumsi antitrombin III sehingga terjadi deposit fibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan tromboksan A2 dan serotonin sehingga akan terjadi vasospasme dan kerusakan endotel (Yulia Fauziyah, 2012:23-25).

5) Imunologis

Beberapa penelitian menyatakan kemungkinan maladaptasi imunologis sebagai patofisiologi dari preeklampsia . Pada penderita preeklampsia terjadi penurunan proporsi T –helper dibandingkan dengan penderita normotensi yang dimulai sejak awal trimester dua. Antibodi yang melawan sel endotel ditemukan pada 50% wanita dengan preeklampsia , sedangkan pada kontrol hanya terdapat 15%.

Maladaptasi sistem imun dapat menyebabkan invasi yang dangkal dari arteri spiralis oleh sel sitotrofoblast endovaskuler dan disfungsi sel endotel yang dimediasi oleh peningkatan pelepasan sitokin (TNF- dan IL-1), enzim proteolitik dan radikal bebas oleh desidua.

Sitokin TNF- dan IL-1 berperan dalam stress oksidatif yang berhubungan dengan preeklampsia. Didalam mitokondria, TNF- akan merubah sebagian aliran elektron untuk melepaskan radikal bebas oksigen

yang selanjutnya akan membentuk lipid peroksida dimana hal ini dihambat oleh antioksidan.

Radikal bebas yang dilepaskan oleh sel desidua akan menyebabkan kerusakan sel endotel. Radikal bebas oksigen dapat menyebabkan pembentukan lipid peroksida yang akan membuat radikal bebas lebih toksik dalam merusak sel endotel. Hal ini akan menyebabkan gangguan produksi nitrit oksida oleh endotel vaskuler yang akan mempengaruhi keseimbangan prostasiklin dan tromboksan dimana terjadi peningkatan produksi tromboksan A2 plasenta dan inhibisi produksi prostasiklin dari endotel vaskuler.

Antioksidan merupakan kelompok besar zat yang ditujukan untuk mencegah terjadinya over produksi dan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Telah dikenal beberapa antioksidan yang poten terhadap efek buruk dari radikal bebas diantaranya vitamin E (tocopherol) vitamin C. Zat antioksidan ini dapat digunakan untuk melawan kerusakan sel akibat pengaruh radikal bebas pada preeklampsia (Yulia Fauziyah, 2012:25-26).

5) Diagnosa Preeklampsia

1). Diagnosa Preeklampsia

Preeklampsia sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pre eklampsia ringan dan preeklampsia berat.

- a. Kriteria dianosis untuk pre eklampsia ringan meliputi:

- 1) Tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg atau terjadi peningkatan tekanan darah sistolik hingga 30 mmHg atau peningkatan tekanan darah diastolik hingga 15 mmHg dari tekanan darah awal.
- 2) Ambang batas untuk proteinuria yaitu 300 mg pada urin 24 jam. Pengumpulan urin 24 jam merupakan metode yang lebih akurat. Rasio protein urin/kreatinin kurang dari 0,21 mengindikasikan proteinuria, namun demikian kadar protein urin 24 jam lebih direkomendasikan.
- 3) Secara umum, edema (pada muka dan tangan) sering terjadi pada pasien preeklampsia, tetapi bukan merupakan kriteria diagnosa.

b. Untuk diagnosa preeklampsia berat

Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan atau edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih.

Gejala dan tanda preeklampsia berat : tekanan darah sistolik >160 mmHg, tekanan darah sistolik >110 mmHg, peningkatan kadar enzim hati atau ikhterus, trombosit $<100.000/mm^3$, Oliguria <400 ml/24 jam, proteinuria >3 gr/liter, nyeri epigastrium, skotoma dan

gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat, perdarahan retina dan odema pulmonum.

Penyulit lain juga bisa terjadi, yaitu kerusakan organ-organ tubuh seperti gagal jantung, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan pembekuan darah, sindroma HELLP, bahkan dapat terjadi kematian pada janin, ibu, atau keduanya bila preeklampsia tak segera diatasi dengan baik dan benar.

Ditinjau dari umur kehamilan dan perkembangan gejala-gejala preeklampsia berat selama perawatan maka perawatan dibagi menjadi perawatan aktif yaitu kehamilan segera diakhiri atau diterminasi ditambah pengobatan medicinal dan perawatan konservatif yaitu kehamilan tetap dipertahankan ditambah pengobatan medisinal.

1) Perawatan aktif sedapat mungkin sebelum perawatan aktif pada setiap penderita dilakukan pemeriksaan fetal assessment yakni pemeriksaan Nonstress test (NST) dan Ultrasonografi (USG), dengan indikasi (salah satu atau lebih) yakni:

- a) Ibu : Usia kehamilan 37 minggu atau lebih, adanya tanda-tanda atau gejala impending eklampsia, kegagalan terapi konservatif yaitu setelah 6 jam pengobatan meditasi terjadi kenaikan desakan darah atau setelah 24 jam perawatan edicinal, ada gejala-gejala status quo (tidak ada perbaikan).

- b) Janin: Hasil fetal asesment jelek (NST & USG) adanya tanda intra uterin Growth Retardation (IUGR).
- c) Hasil laboratorium: adanya HELLP Syndrome (hemolisis dan peningkatan fungsi hepar, trombositopenia).
- 2) Pengobatan medisinal pasien preeklampsia berat (dilakukan dirumah sakit atas intruksi dokter) yaitu segera masuk rumah sakit, tirah baring miring kesatu sisi. Tanda vital diperiksa setiap 30 menit, refleks patella setiap jam, infus dextrose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan infus RL (60-125 cc/jam) 500 cc, berikan antasida, diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam. Pemberian obat anti kejang: MgSO₄ diuretikum tidak diberikan kecuali bila ada tanda-tanda edema paru, payah jantung kongesif atau edema anasarka. Diberikan furosemid injeksi 40 mg/IM.
- 3) Antihipertensi diberikan bila: tekanan darah sistolis lebih 180 mmHg, diastolis lebih 110 mmHg atau MAP lebih 125 mmHg. Sasaran pengobatan adalah tekanan diastolis kurang 105 mmHg (bukan kurang 90 mmHg) karena akan menurunkan perfusi plasenta, dosis antihipertensi sama dengan dosis antihipertensi pada umumnya.
- 4) Bila dibutuhkan penurunan tekanan darah secepatnya, dapat diberikan obat-obat hipertensi parenteral (tetesan kontiyu),

catapres injeksi. Dosis yang biasa dipakai 5 ampul dalam 500 cc cairan infus atau press disesuaikan dengan tekanan darah.

- 5) Bila tidak tersedia anti hipertensi parenteral dapat diberikan anti hipertensi tablet anti hipertensi secara sublingual diulang selang 1 jam, maksimal 4-5 kali. Bersama dengan awal pemberian sublingual maka obat yang sama mulai diberikan secara oral.
- 6) Pengobatan jantung jika ada indikasi yakni tanda-tanda menjurus payah jantung, diberikan digitalisasi cepat dengan cedilanid D.
- 7) Lain-lain : konsul bagian penyakit dalam /jantung, mata: obat-obat antipiretik diberikan bila suhu rectallebih $38,5^{\circ}$ C dapat dibantu dengan pemberian kompres dingin atau alkohol atau xylomidon 2 cc IM: antibiotik diberikan atas indikasi. Diberikan ampicilin 1 gr/6 jam/IV/hari: anti nyeri bila penderita kesakitan atau gelisah karena kontraksi uterus. Dapat diberikan petidin HCL 50-75 mg sekali saja, selambatlambatnya 2 jam sebelum janin lahir (Yulia Fauziyah, 2012:26-27).

6) Manajemen Preeklampsia

Penanganan pada preeklampsia bertujuan untuk menghindari kelanjutan menjadi eklampsia dan pertolongan dengan melahirkan janin dalam keadaan optimal dan bentuk pertolongan dengan trauma minimal

Tabel 1.1 Manajemen umum pada preeklampsia

Monitoring pada maternal	Monitoring pada fetus
Pengukuran tekanan darah seminggu 2 kali	Pemeriksaan nonstress setiap satu atau dua minggu sekali
Uji lab seminggu sekali meliputi CBC, jumlah platelet, ALT, AST, LDH, dan kreatinin	Pengukuran index cairan amnion setiap satu atau dua minggu sekali
Uji untuk proteinuria pemeriksaan dengan dipstick atau protein spot/rasio kreatinin, dan pengumpulan urin 24 jam secara periodek	Pemeriksaan usg untuk mengetahui pertumbuhan fetus setiap tiga atau empat minggu sekali

Pada preeklampsia ringan penanganan simtomatis dan berobat jalan dengan memberikan:

a. Sedative ringan

- a) Phenobarbital 3×30 gr

- b) Valium 3×10 gr
- c. Obat penunjang
 - a) Vitamin B kompleks
 - b) Vitamin C atau Vitamin E
 - c) Zat besi
- d. Nasihat
 - b) Garam dalam makanan dikurangi
 - c) Lebih banyak istirahat baring ke arah punggung janin
 - d) Segera memeriksakan diri, bila terjadi gejala sakit kepala, mata kabur, edema mendadak, atau berat badan naik, pernapasan semakin sesak, nyeri epigastrium, kesadaran berkurang, gerak janin melemah, berkurang, pengeluaran urine berkurang.
 - e) Jadwal pemeriksaan hamil dipercepat atau diperketat (Yulia Fauziah, 2012:30-32).

Pada preeklampsia berat, pasien harus segera dirujuk. Petunjuk untuk segera memasukkan penderita ke rumah sakit atau merujuk penderita perlu memperhatikan hal berikut:

- a. Bila tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih
- b. Protein dalam urin 1 plus atau lebih
- c. Kenaikan berat badan 1 ½ kg atau lebih dalam seminggu

- d. Edema bertambah dengan mendadak
- e. Terdapat gejala atau keluhan subjektif

Bidan dapat merawat pasien preeklampsia berat untuk sementara, sampai menunggu kesempatan melakukan rujukan sehingga pasien dapat mendapat pertolongan yang sebaik-baiknya. Pasien diusahakan agar:

- a. Terisolasi sehingga tidak mendapat rangsangan suara atau sinar
- b. Infus glukosa 5 %
- c. Dilakukan pemeriksaan
- d. Pengobatan
 - a) Sedative: phenobarbital 3V100 mgr, valium 3×20 mgr
 - b) Menghindari kejang: MgSO₄ insial dosis 8 gr IM, dosis selanjutnya 4 gr/6 jam dan observasi pernapasan tidak kurang dari 16 per menit, refleks patella positif, urin tidak kurang dari 600 cc/24 jam
 - c) Valium dosis insial 20 mgr IV, dosis selanjutnya 20 mgr/drip/20 tetes/menit. Dosis maksimal 120 mgr/24 jam.
 - d) Kombinasi pengobatan: Pethidine 50 mgr IM, klorpromazin 50 mgr IM
 - e) Bila terjadi oliguria berikan glukosa 40 % IV untuk menarik cairan dari jaringan sehingga dapat merangsang diuresis.

e. Setelah preeklampsia berat dapat diatasi, pertimbangan mengakhiri kehamilan berdasarkan:

- a) Kehamilan cukup bulan
- b) Mempertahankan kehamilan sampai mendekati cukup bulan
- c) Apabila pengobatan pre eklampsia berat gagal, kehamilan diakhiri tanpa memandang usia kehamilan.

Merujuk ke rumah sakit untuk pengobatan yang adekuat. Mengakhiri kehamilan merupakan kelanjutan pre eklampsia menjadi eklampsia (Yulia Fauziah, 2012:30-34).

Perawatan pre eklampsia berat sama halnya dengan perawatan pre eklampsia ringan dilakukan pengelolaan dasar yaitu rencana terapi pada penyulitnya yaitu terapi medikamentosa dengan pemberian obat-obatan untuk penyulitnya dan menentukan rencana sikap terhadap kehamilannya yang tergantung pada umur kehamilan. Sikap terhadap kehamilan dibagi 2 yaitu, ekspektatif atau konservatif bila umur kehamilan < 37 minggu, artinya kehamilan dipertahankan selama mungkin sambil memberikan terapi medikamentosa dan yang kedua yaitu aktif atau agresif bila umur kehamilan ≥ 37 minggu artinya kehamilan diakhiri setelah mendapat terapi medikamentosa untuk stabilisasi ibu (Dewi Setiawati, 2013:180).

e. Standar Prosedur Operasional Pre Eklampsia Berat DI RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

Pre eklampsia berat merupakan Peningkatan tekanan darah $>$ systole 140 mmHg, diastole $>$ 110 mmHg disertai tanda lain protein urine ++ oliguria, hiperfleksian, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium dan kejang. Tujuan dari standar operasional ialah Mengenali gejala pre eklampsia berat/ eklampsia, melakukan penatalaksanaan pre eklampsia/ eklampsia, Memberikan obat anti kejang (magnesium sulfat atau diazepam).

Adapun prosedur Pre eklampsia berat ialah dalam peengeloan di IGD Jika tekanan diastolic $>$ 110 mmHg, berikan anti hipertensi sampai diastolic 80-100 mmHg , Pasang infus RL dengan jarum besar no.16, Ukur keseimbangan cairan jangan sampai terjadi overload, Infuse cairan di pertahankan 1,5 -2 liter/24 jam, Pasang dower kateter untuk pengukuran volume dan pemeriksaan proteinuria, Observasi tanda vital, reflex dan DJJ setiap 1 jam , Auskultasi paru untuk mencari tanda edema paru jika ada edema paru hentikan pemberian cairan dan berikan diuretic.

Kemudian nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan, jika pembekuan tidak terjadi setelah 7 menit kemungkinan terdapat koagulapati, Berikan anti konvulsan dosis awal $MgSO_4$ 40% 4 gram (10 ml) IV bolus selama 5 menit lanjutan dengan 6 gram $MgSO_4$ 40 % dalam larutan RL

selama 6 jam, Pasien dapat di kirim ke ruang perawatan jika tekanan diastolic > 110 mmHg.

Jika terjadi kejang berikan obat anti kejang (anti konvulsan). Adapun Perlengkapan untuk penanganan kejang (jalan nafas, penghisap lendir, masker oksigen, oksigen). Kemudian lindungi pasien dari kemungkinan trauma, Aspirasi mulut tenggorokkan, Baringkan pasien pada sisi kiri posisi trandeleburg untuk mengurangi resiko aspirasi.

Anti konvulsan yang dapat di berikan yakni $MgSO_4$ dengan dosis awal 40 % 4 gr (10 ml) $MgSO_4$ dalam larutan NaCl 100 cc larutkan selama 10 menit, Segera dilanjutkan dengan 6 gr (15 ml) $MgSO_4$ 40 % dalam larutan RL selama 6 jam, Jika kejang berulang setelah 15 menit berikan $MgSO_4$ (40%) 2 gr IV selama 5 menit, Dosis pemeliharaan $MgSO_4$ 1 gr/jam melalui infuse RL diberikan sampai 24 jam post partum, hentikan pemberian $MgSO_4$ jika reflex patella (-) bradipnea (<10 kali/menit) .

Untukantisipasi Bantu pernapasan dengan ventilator, berikan kalsium glukonas 1 gr (20 ml dalam larutan 10 % IV perlahan-lahan sampai pernapasan mulai lagi, diazepam (dengan resiko terjadinya depresi neonatal). Dosis awal 10 mg IV pelan-pelan selama 2 menit jika kejang berulang, ulangi pemberian sesuai dosis awal.

Obat anti hipertensi yang dipilih dan di berikan bagi ibu hamil yang aman adalah nifedipine diberikan 5-10 mg oral yang dapat diulang sampai 8

kali/24 jam, jika respon tidak membaik selama 10 menit, berikan tambahan 5 mg nifedipine sub lingual.

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Proses manajemen adalah proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang terorganisasi, meliputi pikiran dan tindakan dalam urutan yang logis untuk keuntungan pasien dan pemberian asuhan (Nurhayati, 2012:139).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk mengambil sebuah keputusan yang terfokus pada klien (Ellisabeth M.F.Lalita, 2013:125).

2. Tahapan Dalam manajemen Asuhan Kebidanan

Varney mengatakan bahwa seorn Bidan perlu lebih kritis melakukan analisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis dan masalah potensial.

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk mengambil sebuah keputusan yang terfokus pada klien (Ellisabeth M.F.Lalita, 2013:125).

2. Tahapan Manajemen Dalam Asuhan Kebidanan

Langkah I (Tahap Pengumpulan Data Dasar)

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1. Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan biodata, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, bio-psiko-sosio-spiritual, serta pengetahuan klien.
2. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi) dan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan catatan terbaru serta catatan sebelumnya).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada formulir pengumpulan data kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Dalam manajemen kolaborasi, bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan pada dokter, bidan akan melakukan upaya konsultasi. Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi klien yang sebenarnya dan valid. Kaji ulang data yang sudah dikumpulkan apakah sudah tepat, lengkap dan akurat.

Pengkajian ibu hamil dengan pre eklampsia berat, meliputi pertanyaan seputar sejarah pribadi sebelum hamil, riwayat kesehatan keluarga, pekerjaan serta kebiasaan social lainnya. Pemeriksaan fisik lengkap di lakukan khususnya terfokus pada penampilan umum (tanda- tanda pusing dan bengkak pada wajah maupun bagian tungkai bawah) dan pemeriksaan tanda- tanda vital. Dalam tes laboratorium adanya pre eklampsia berat umumnya ditentukan melalui pengukuran kadar proteinuria.

Langkah II (Interpretasi Data Dasar)

Pada langkah kedua ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpersi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan ehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah sering

berkaitan dengan hal-hal yang dialami wanita diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis.

Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan. Pada kasus pre eklampsia berat di dapatkan data subjektif nyeri epigastrium, gangguan penglihatan dan nyeri kepala.

Langkah III (Diagnosis / Masalah Potensial)

Langkah ketiga merupakan langkah ketika bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis / masalah yang sudah diidentifikasi.

Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosis/ masalah potensial ini menjadi kenyataan. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada langkah ketiga ini bidan dituntut mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis tersebut

tidak terjadi. Langkah ini bersifat antisipasi yang rasional atau logis. Diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada pre eklampsi berat adalah eklampsia.

Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera)

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Pada langkah ini, mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Langkah keempat mencerminkan kesinambungan proses manajemen kebidanan. Jadi, manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodic atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama-sama bidan terus-menerus, misalnya pada waktu wanita tersebut dalam persalinan.

Data baru mungkin saja dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data mungkin mengidentifikasi situasi yang gawat ketika bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu atau anak. Dari data yang dikumpulkan dapat menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara yang lain menunggu intervensi dari seseorang dokter, misalnya prolaps tali pusat. Situasi lainnya bisa saja merupakan kegawatan tetapi memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter.

Dalam kondisi tertentu seorang wanita mungkin juga akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lain seperti pekerja sosial, ahli gizi, atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir. Dalam hal ini bidan mampu mengevaluasi kondisi setiap klien untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang paling tepat dalam manajemen asuhan klien.

Antisipasi masalah pertama yang dilakukan pada ibu hamil dengan pre eklampsia berat adalah memantau tekanan darah dan protein urine, kolaborasi dengan dokter SpOG dan melakukan rujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan.

Langkah V (Penyusunan Rencana Asuhan Menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut, apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya apakah dibutuhkan

penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi, kultur atau masalah psikologis.

Rencana asuhan pada ibu hamil dengan pre eklampsia berat yaitu:

- 1) Penderita pre eklampsia berat harus segera masuk rumah sakit untuk rawat inap dan dianjurkan tirah miring ke satu sisi (kiri).
- 2) Beri obat hipertensi metildopa dan nifedipin
- 3) Pemeriksaan proteinuria
- 4) Pengukuran tekanan darah

Langkah VI (Implementasi)

Pelaksanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dikerjakan oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Langkah ini dilaksanakan secara efisien dan aman, manajemen yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien. Pelaksanaan rencana asuhan pada ibu hamil dengan pre eklampsia berat yaitu:

- 1) Penderita pre eklampsia berat harus segera masuk rumah sakit untuk rawat inap dan dianjurkan tirah miring ke satu sisi (kiri).
- 2) Beri obat hipertensi nifedipin dan metildopa
- 3) Pemeriksaan proteinuria

4) Pengukuran tekanan darah

Langkah VII (Evaluasi)

Evaluasi ini dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan. Pada langkah ini meliputi evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Pada kasus pre eklampsia berat pada ibu hamil evaluasi yang diharapkan yaitu, proteinuria <4+, tekanan darah ibu <140/90 mmHg dan ibu sudah boleh pulang karena sudah mencapai tanda-tanda pre eklampsia ringan (Ellisabeth M.F. Lalita, 2013:125-130).

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berfikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

S (Subjektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I Varney).

O (Objektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah I Varney).

A (Pengkajian/Assessment)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam indentifikasi diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau rujukan (langkah II,III,IV Vareny).

P (Planing)

Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan asesment (langkah V, VI, dan VII Varney) (Rita Yulifah dan Surachmindari, 2013:136).

F. Tinjauan Umum tentang Preeklampsia pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Islam

Kehamilan merupakan suatu hal yang alamiah dan fisiologi, kehamilan akan berlangsung normal selama tidak ada komplikasi yang menyertai pada masa kehamilan sampai proses persalinan. Namun kehamilan patologis atau yang disertai penyulit sendiri tidak terjadi secara mendadak. Seperti halnya pre eklampsia berat yang muncul pada kehamilan yang dapat membahayakan ibu dan janin. Deteksi dini terhadap gejala dan tanda merupakan upaya

terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan maupun keselamatan ibu dan janinnya. Ibu hamil yang mengalami pre eklamsia berat saat kehamilan maupun menjelang persalinan harus tetap sabar dan berfikir positif bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S Al –Anbiya 21:83

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝٨٣﴾

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang". (Departemen Agama RI).

Ayat ini menjelaskan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Hal itu dengan memberi contoh melalui kisah Nabi Ayyub as yang juga memperoleh limpahan karunia, tetapi diuji dengan kebinasaan dan kehancuran anugrah itu, bahkan dengan penyakit yang beliau derita. Namun demikian, hendaklah yang diuji meneladani sikap Nabi Ayyub as yang diuraikan sekelumit kisahnya oleh ayat ini. Nabi Muhammad saw, diperintahkan agar mengingat dan mengingatkan pula tentang kisah Nabi Ayyub as, ketika ia menyeru yakni mengadu dan berdoa kepada Tuhan Pemelihara dan pembimbingn-nya. Beliau tidak menggerutu, tidak pula mengadu kepada selain Allah. Beliau hanya menjadikan kedaannya dengan berkata :”Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesulitan menyangkut diriku disebabkan oleh ulah setan. Demekian beliau tidak bermohon agar kesulitannya disingkirkan

Allah karena beliau sadar bahwa hidup harus disertai ujian dan karena beliau siap untuk bersabar. Karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taghabun/64 : 11-13

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ۱۱ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۙ ۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۙ ۱۳

Terjemahnya :

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanah Allah) dengan terang, (Dialah) Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.” (Kementrian Agama RI, 2013)

Kata (إِذْنٌ) *idzn* pada mulanya berarti *ketiadaan halangan untuk melakukan satu aktivitas*. Dari sini ia digunakan untuk membolehkan seseorang memasuki satu tempat atau disingkirkannya penghalang, yang menghambat masuknya. Yang *mengizinkan* tentu mengetahui tentang apa yang diizinkan itu. Dengan demikian izin mengandung arti *pengetahuan plus penyingkiran halangan*, bagi terlaksananya apa yang diizinkan itu.

Yang dimaksud di sini adalah penciptaan sebab dan faktor-faktor bagi terjadinya sesuatu. Ini adalah sistem dan hukum-hukum alam yang diciptakan Allah bagi terjadinya segala sesuatu. Dia yang menciptakan sistem dan hukum-hukum alam itu. Manusia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya, dan jika ia tidak mengidahnya, maka itu dapat merugikan dirinya

sendiri. Ayat ini mendorong kaum muslim untuk memahami hukum-hukum alam dan memanfaatkannya. Sang muslim dituntut juga untuk melakukan introspeksi guna melihat sampai di mana persesuaian tindakannya dengan sistem dan hukum-hukum itu dalam rangka memperbaiki diri.

Perlu dicatat bahwa izin Allah bagi terjadinya sesuatu tidak otomatis menandai restu dan ridha-Nya. Karena itu izin-Nya ada yang bersifat *syar'iy* dalam arti diizinkan atau dibolehkannya untuk dilakukan tanpa sanksi apapun, dan arti yang bersifat *takwini* dalam arti Dia tidak menghalangi terjadinya, karena itu merupakan bagian dari sistem yang diberlakukan-Nya bagi semua pihak. Atas dasar itu pula bisa jadi ada musibah atau petaka yang menimpa seseorang yang tentu saja diizinkan-Nya tetapi tidak diizinkan-Nya. Bisa juga ada musibah yang menimpa yang dituntut oleh-Nya untuk dibendung dan diatasi. Seperti kezaliman yang menimpa. Itu adalah atas izin-Nya melalui sistem yang Dia tetapkan, tetapi Dia juga yang mendorong untuk menanggulangi musibah kezaliman itu, dengan menggunakan bagian dari sistem yang ditetapkan-Nya dan juga keberhasilan atau kegagalan menanggulangnya adalah bagian dari sistem itu.

Penyebutan kata *Allah* yang merupakan nama bagi Dzat yang wajib wujud-Nya dan menyandang semua sifat-sifat sempurna padahal bisa saja digunakan kata Dia bertujuan mengundang mitra bicara untuk menghadirkan semua sifat-sifat Allah serta menyadari kebesaran dan keagungan-Nya yang dicakup oleh nama mulia itu. (Tafsir Al-Misbah, 2009).

Pre eklampsia berat dapat di tangani dengan tindakan dan penanganan yang sesuai dengan standar kesehatan yang dapat mencegah pre eklampsia berat menjadi eklampsia. Dalam perspektif islam, setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk menguji keimanan hamba-Nya. Sebagai hamba Allah yang beriman, manusia harus senantiasa percaya bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan suatu penyakit apabila tidak menurunkan juga obatnya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS.al-Israa/17:82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا ٨٢

Terjemahnya :

“Dan kami turunkan dari Al-quraan suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-quraan itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain keruguan”.(Kementerian Agama RI,2013).

Hadis diatas mengantarkan pada sebuah pemahaman bahwa setiap ada penyakit pasti ada obatnya, dan apabila obatnya itu mengenai penyakitnya sehingga memperoleh kesembuhan, maka kesembuhannya itu adalah atas izin dari Allah SWT.

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL PADA NY”S“

DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT

DI RSUD SYECH YUSUF GOWA

TANGGAL 26 APRIL 2017

No. Register : 468871
Tanggal Masuk : 26 April 2017, pukul 13.15 wita
Tanggal Pengkajian : 26 April 2017, pukul 13.16 wita
Nama Pengkaji : Nur Herbiyanti Rukmana

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

1. Data Subjektif

a. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “

Umur : 42 tahun / 42 tahun

Nikah : 1 X / 20 ± tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / B. Harian

Alamat : Borong Jati

b. Keluhan utama

Ibu mengeluh merasa pusing.

c. Riwayat keluhan utama:

- 1) Pusing dirasakan sejak 2 hari yang lalu dan ibu datang memeriksakan diri di puskesmas Bontonompo dan dirujuk ke RSUD pada tanggal 26-04-2017 Jam 9: 30 wita.
- 2) Sifat keluhan menetap

d. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Kehamilan ketiga dan tidak pernah keguguran
- 2) Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 14 Oktober 2016
- 3) Ibu mendapatkan imunisasi TT sebanyak 1X di puskesmas pada tanggal 7 januari 2017.
- 4) Ibu telah 3 kali memeriksa kehamilannya di puskesmas.

e. Riwayat kehamilan dan persalinan lalu

Tahun	Kehamilan	Persalinan			Bayi			Nifas
		Jenis	Tempat	Penolong	Sex	BBL	Keadaan	
1997	Aterm	PBK	Puskesmas	Bidan	♀	2700 gr	Hidup	Normal
2009	Aterm	PBK	Puskesmas	Bidan	♂	3000 gr	Hidup	Normal

f. Riwayat kesehatan yang lalu

- 1) Ibu tidak ada riwayat PMS
- 2) Ibu tidak ada alergi terhadap makanan dan minuman
- 3) Ibu tidak pernah mengalami penyakit serius
- 4) Ibu tidak ada riwayat penyakit menurun seperti DM, hipertensi, dan Penyakit jantung.
- 5) Ibu tidak ada riwayat ketergantungan obat-obatan dan minuman keras.
- 6) Ibu tidak pernah menderita penyakit infeksi pada sistem organ reproduksi.
- 7) Tidak ada riwayat penyakit menular.

g. Riwayat Menstruasi

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus : 28 – 30 hari
- 3) Durasi : 4 – 5 hari
- Dismenhorrea* : Tidak ada

h. Riwayat KB

Ibu merupakan akseptor KB suntik 3 bulan.

i. Riwayat pola kegiatan sehari-hari

- 1) Pola Nutrisi

a) Sebelum hamil

Pola makan : 3 kali sehari

Komposisi : Nasi, Ikan, Sayur

Pola minum : 10 kali sehari

b) Selama hamil

Pola makan : 4 – 5 kali sehari

Pola minum : 15 kali sehari

2) Pola Eliminasi

a) Sebelum hamil

BAB (Buang Air Besar)

Konsistensi : Lunak

Warna : Kuning kecoklatan

Frekuensi : 1 kali sehari

BAK (Buang Air Kecil)

Warna : Kuning

Bau : Amoniak

b) Selama hamil

BAB (Buang Air Besar)

Konsistensi : Lunak

Warna : Kuning kecoklatan

Frekuensi : 1 kali sehari

BAK (Buang Air Kecil)

Warna : Kuning

Bau : Amoniak

3) Pola Istirahat

a) Sebelum hamil

Tidur siang : 1 jam/ hari

Tidur malam : 8 jam/ hari

b) Selama hamil

Tidur siang : 2 jam/ hari

Tidur malam : 9 jam/ hari

4) Personal Hyegine

a) Sebelum hamil

Ibu mandi 2 kali setiap hari setiap pagi dan sore

Ibu keramas 3 kali seminggu

Ibu sikat gigi 3 kali sehari

Ibu selalu mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau basah

b) Selama hamil

Ibu mandi 2 kali setiap hari setiap pagi dan sore

Ibu keramas 3 kali seminggu

Ibu sikat gigi 3 kali sehari

Ibu selalu mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau basah

j. Riwayat Ekonomi, Psikologi dan Spiritual

1) Suami adalah tulang punggung dalam keluarga

2) Ibu merasa khawatir dengan keadaanya

- 3) Ibu merasa senang dengan kehamilannya
- 4) Keluarga dan suami senang dengan kehamilannya
- 5) Ibu yakin bahwa dia selalu dilindungi oleh Allah SWT
- 6) Ibu selalu melaksanakan sholat 5 waktu.

2. Data Objektif

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. TB : 154 cm
LILA : 24 cm
BB Sebelumnya : 50 kg
BB Sekarang : 63 kg
- d. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital
TD : 170/110 mmHg S : 36,8 °C
N : 82 x/menit P : 22x/i
- e. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*
 - 1) Kepala
 - a) Inspeksi : kulit kepala bersih, rambut lurus dan tidak ada ketombe
 - b) Palpasi : tidak rontok, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan
 - 2) Wajah
 - a) Inspeksi : simetris kiri dan kanan, ada cloasma gravidarum

- b) Palpasi : tidak ada odema dan tidak ada nyeri tekan
- 3) Mata
- a) Inspeksi : simetris kiri dan kanan
- b) Palpasi : konjungtiva merah mudah dan sklera putih.
- 4) Mulut dan gigi
- a) Inspeksi : Mulut dan gigi bersih, ada 2 gigi yang tanggal dan terdapat gigi caries 2 buah.
- 5) Telinga
- a) Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
- b) Palpasi : tidak ada nyeri tekan
- 6) Leher
- a) Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar tyroid dan vena jugularis
- 7) Payudara
- a) Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol keluar serta hiperpigmentasi pada areola mammae.
- b) Palpasi : tidak ada massa dan nyeri tekan.
- 8) Abdomen
- a) Inspeksi : tidak ada bekas operasi dan tampak linea nigra dan striae alba.
- b) Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong.

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 85 cm

TBJ : $85 \times 27 = 2295$ gr

c) Auskultasi :DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah

perut ibu dengan frekuensi 142x/menit

9) Ekstremitas

Ekstremitas Atas

a) Inspeksi : simetris kiri dan kanan dan terpasang infus RL pada

bagian tangan kiri

b) Palpasi : tidak ada oedema

Ekstermitas Bawah

a) Inspeksi : simetris kiri dan kanan

b) Palpasi : terdapat oedema dan tidak ada varices

c) Perkusi : refleks patella (+ / +) kiri dan kanan.

f. Pemeriksaan Penunjang

1) Pemeriksaan Hb : 11,4 gr%

2) Protein urinaria : +2

B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Diagnosa : GIIPIIA0, Gestasi 27Minggu 6 hari, Intrauterine,Tunggal ,Hidup,
Preeklampsia Berat

1. GIIPIIA0

a. Data Subjektif

Menurut ibu ini adalah kehamilan ketiga dan tidak pernah keguguran

b. Data Objektif

Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae alba, pembesaran perut sesuai usia kehamilan,terdapat hiperpigmentasi areola.

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

Keluarnya *Melanophore Stimulating Hormone* hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit di sekitar pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut (striae livide) pada primigravida dan (striae alba) pada multigravida (Manuaba, dkk, 2013: 107).

2. Gestasi 27 Minggu 6 Hari

a. Data Subjektif

Menurut ibu Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) nya adalah tanggal 14
Oktober 2016

b. Data Objektif

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan

TFU 3 jari di atas pusat

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

- 1). Dari HPHT tanggal 14 oktober 2016 sampai tanggal pengkajian 27 april 2017 maka usia kehamilan ibu 27 minggu 6 hari. Menurut rumus Neagle.
- 2). Pembesaran perut disebabkan oleh adanya pertumbuhan janin dan di bawah pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan hipertropi otot polos.

3. Intrauterine

a. Data Subjektif :

Ibu mengatakan sering merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut sebelah kanan.

b. Data Objektif :

- 1). Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong.
- 2). Leopold II : Puki
- 3). Leopold III : Kepala
- 4). Leopold IV : BAP

Analisa dan Interpretasi Data :

Bagian besar janin dapat diraba saat dilakukan palpasi secara Leopold dan ibu tidak merasa nyeri saat janin bergerak, teraba bagian-bagian janin dalam uterus.

Kehamilan intrauterine, perkembangan rahim sesuai dengan umur kehamilan.

4. Tunggal

a. Data Subjektif :

Ibu mengatakan merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut sebelah kanan.

b. Data Objektif :

- 1). Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong.
- 2). Leopold II : Puki
- 3). Pada auskultasi, dji terdengar jelas kuat dan teratur pada satu sisi yaitu pada sisi sebelah kiri perut ibu dengan frekuensi 142x/menit.

Analisa dan Interpretasi Data:

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, teraba dua bagian besar pada lokasi yang berbeda, bagian kepala pada kuadran perut bagian bawah, bokong berada pada kuadran fundus. Pada kehamilan tunggal hanya satu bunyi jantung.

5. Hidup

a. Data Subjektif :

ibu merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut atas sebelah kanan.

b. Data Objektif :

Pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada satu sisi yaitu pada sisi sebelah kiri dengan frekuensi 241x/menit.

Analisa dan Interpretasi Data :

Janin yang hidup ditandai dengan adanya pergerakan janin yang dapat dirasakan oleh ibunya, dan pada auskultasi terdengar DJJ yang jelas dan teratur.

6. Preeklamsia Berat

a. Data Subjektif :

ibu mengeluh nyeri kepala dan leher bagian belakang tegang

b. Data Objektif :

1). Tekanan Darah 170/110 mmHg

2). Potein Urinaria +2

Analisa dan Interpretasi Data :

a. pre eklamsia berat dengan *impending eclampsia* dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179).

b. Pre eklamsia berat ialah pre eklamsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Sarwono, 2014:544).

LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Diagnosa : Potensial terjadinya Eklamsia, HELLP Syndrom, Kematian janin

a. Data Subjektif :

Ibu mengeluh sakit kepala yang menetap

b. Data Objektif :

- 1). Tekanan Darah 170/110 mmHg
- 2). Edema (+/+) pada kedua tungkai bawah.

Analisa dan Interpretasi Data:

- a. Pencegahan dan pengobatan preeklamsia berat yang tidak tertangani secara baik maka akan mengarah ke eklamsia.
- b. Sindrom HELLP, digambarkan dengan pre eklamsia yang di karakteristikkan dengan hemolisis, peningkatan enzim hepar, dan jumlah platelet yang rendah. Sindrom HELLP terjadi sekitar 20% kehamilan, dan merupakan komplikasi dari pre eklamsia . keluhan sering terjadi pada kuadran kanan atas atau nyeri epigastrium , mual, dan muntah . beberapa pasien dengan tanda dan gejala pre eklamsia harus di evaluasi hitung darah lengkap , jumlah platelet , dan penentuan enzim hepar
- c. Kematian janin dalam Rahim (KJDR) merupakan kematian janin dalam uterus dengan usia kehamilan 20 minggu atau lebih dengan berat janin mencapai 500 gram atau lebih , ini merupakan salah satu komplikasi yang akan terjadi pada penderita pre eklamsia jika tidak di tangani secara baik dan cepat .
- d. Preeklamsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan atau edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Gejala dan tanda preeklamsia berat : tekanan darah sistolik >160 mmHg, tekanan darah sistolik >110

mmHg, peningkatan kadar enzim hati atau ikhterus, trombosit < 100.000/mm³, Oliguria < 400 ml/24 jam, proteinuria > 3 gr/liter, nyeri epigastrium, skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat, perdarahan retina dan odema pulmonum (Yulia Fauziah, 2012:26-27). Sedangkan Eklampsia adalah preeklampsia yang disertai kejang tonik klonik yang disusul dengan koma (Yulia Fauziah, 2012:17).

LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

- a. Memantau tekanan darah
- b. Kolaborasi dengan dokter SPOG
- c. Memasang infus RL 20 tpm
- d. Pemberian obat oral nifedipin 3×1 hari @10 mg
- e. Pemberian obat oral metildopa 3×1 hari @ 250 mg
- f. Pemberian MgSO₄ untuk mencegah kejang jika tidak terjadi penurunan tekanan darah
- g. Pasang kateter
- h. Melakukan pemeriksaan Lab. Untuk mengetahui proteinuraria

LANGKAH V RENCANA TINDAKAN / INTERVENSI

Diagnosa : GIIPIIA0 gestasi 27 minggu dengan PEB

Masalah actual : PEB

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya Eklampsia

1. Tujuan :

- a. Tidak terjadi eklampsia

2. Kriteria :

- a. Keadaan umum ibu baik dan kesadaran Komposmentis.
- b. Ibu tidak pusing
- c. Tanda-tanda vital

TD : 170/110 mmHg N : 84 x/menit

S : 36,8 °C P : 22 x/menit

3. Rencana Tindakan :

- a. Beritahu keadaan yang sedang dialami ibu.

Rasional : Dengan memberitahu keadaan yang sedang dialami ibu dapat mengerti dan bersedia untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

- b. Observasi keadaan umum, TTV

Rasional : Dengan mengetahui keadaan umum, dan TTV dapat membantu dalam mengambil tindakan segera.

- c. Pemberian cairan RL

Rasional : larutan RL digunakan untuk mengganti cairan yang hilang, dan merupakan larutan isotonik yang sering digunakan dalam pemberian infus intravena karena mempunyai konsentrasi yang sama dengan plasma darah sehingga mencegah perpindahan cairan dan elektrolit ke dalam intrasel.

- d. Pemasangan kateter tetap untuk membantu ibu buang air kecil serta mengetahui cairan input dan output ibu.

Rasional : Dengan melakukan pemasangan kateter akan membantu ibu untuk berkemih dan mempermudah petugas kesehatan untuk mengetahui cairan output dan input ibu.

- e. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat

Rasional : Pemberian terapi obat dapat mencegah kenaikan tekanan darah yang dapat menyebabkan kejang.

- f. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat oral nifedipin 3×1 hari @10 mg.

Rasional : Nifedipin merupakan obat antihipertensi yang menghambat kanal kalsium

- g. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat oral metildopa 3×1 hari @250 mg.

Rasional : Metildopa merupakan obat antihipertensi yang selektif untuk ibu hamil.

- h. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian MgSO₄ untuk mencegah kejang jika tekanan darah tidak turun.

Rasional : MgSO₄ merupakan obat anti kejang yang berfungsi menghambat dan menurunkan kadar asetilkolin pada rangsangan serabut saraf dengan menghambat transmisi neuromuskular.

- i. Kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteinuria

Rasional : dengan mengecek proteinuria dapat membantu untuk tindakan selanjutnya dan melaporkan hasilnya ke dokter .

- j. Pemberian dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a, bersabar dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu

Rasional : Sebagai hamba Allah SWT kita diwajibkan untuk berdo'a bersabar dan bertawakkal dalam segala cobaan yang kita hadapi.

- k. Melakukan pemeriksaan DJJ

Rasional : pemeriksaan DJJ di lakukan agar dapat memantau perkembangan janin

LANGKAH VI . IMPLEMENTASI ASUHANAN KEBIDANAN

Tanggal 26 april 2017

1. Memberitahu bahwa ibu mengalami pre eklampsia berat
2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV
3. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteiun urinaria
4. Memberitahu ibu harus di opname
5. Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat
6. Melakukan pemasangan kateter tetap
7. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL
8. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteiun urinaria
9. Memberikan dukungan moril pada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

LANGKAH VII. EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

1. Ibu sudah mengetahui jika ibu mengalami pre eklampsia berat
2. Sudah dilakukan observasi

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Komposmentis

TTV : TD : 170/ 110 mmHg

N: 84 x/i

S: 36,8 °C

P: 22x/i

3. Infus telah terpasang dengan cairan RL pada pukul 22.10
4. Kateter telah di pasang pukul 22.20
5. Ibu dan keluarga telah berdoa, bersabar dan berserah diri kepada Allah apapun yang terjadi untuk kesembuhan ibu.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY”S“ DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT
DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 26 APRIL 2017**

NO. Register : 468871

Tanggal. Kunjungan : 26 – 04 – 2017 Jam : 13:15 Wita

Tanggal. Pengkajian : 26 – 04 – 2017 Jam : 22 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “

Umur : 42 tahun / 42 tahun

Nikah : 1 X / ± 20 tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / B. Harian

Alamat : Borong Jati

1. Data Subjektif

1. Ibu hamil yang ketiga dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengeluh pusing sejak 2 hari yang lalu
3. Sifat keluhan menetap
4. Hari pertama haid terakhir tanggal 14 Oktober 2016

2. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik dan tampak pusing
2. Tanda-tanda vital :
 - a. Tekanan Darah : 170/110 mmHg
 - b. Nadi : 84x/i
 - c. Pernafasan : 22x/i
 - d. Suhu : 36,8 °C

3. Assesment

Diagnos : Ny "S" GIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 27 minggu 6 hari, intra uterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan pre eklampsia berat

Masalah aktual : Pre eklampsia berat

Masalah potensial : Eklampsia

D. Planning

Tanggal 26-04-2017

1. Memberitahu bahwa ibu mengalami pre eklampsia berat
 Hasil : Ibu sudah mengetahui kondisi yang dialaminya sekarang
2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan kesadaran composmentis

TD : 170/110 mmHg N:84x/i

S : 36,8 °C P: 22x/i

3. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142x/menit,

4. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL

Hasil: Infus telah terpasang dengan cairan RL di tangan kiri pada pukul 22.10

5. Melakukan pemasangan kateter tetap

Hasil : Kateter telah terpasang pada pukul 22.20

6. Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat

Hasil : Kolaborasi telah dilakukan

7. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteiun urinaria

Hasil : urine ibu sudah dibawa ke laboratorium untuk di periksa

8. Memberikan dukungan moril pada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

Hasil : Ibu tampak tenang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY”S“ DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT
DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 27 APRIL 2017**

NO. Register : 468871

Tanggal. Kunjungan : 26 – 04 – 2017 Jam : 13:15 Wita

Tanggal. Pengkajian : 27 – 04 – 2017 Jam : 07 : 42 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “

Umur : 42 tahun / 42 tahun

Nikah : 1 X / ± 20 tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / B. Harian

Alamat : Borong Jati

4. Data Subjektif

5. Ibu hamil yang ketiga dan tidak pernah keguguran
6. Ibu mengeluh pusing sejak 2 hari yang lalu
7. Sifat keluhan menetap
8. Hari pertama haid terakhir tanggal 14 Oktober 2016

5. Data Objektif

3. Keadaan umum ibu baik dan tampak pusing

4. Tanda-tanda vital :

e. Tekanan Darah : 170/110 mmHg

f. Nadi : 84x/i

g. Pernafasan : 22x/i

h. Suhu : 36,8 °C

6. Assesment

Diagnos : Ny "S" GIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 27 minggu 6 hari, intra uterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan pre eklampsia berat

Masalah aktual : Pre eklampsia berat

Masalah potensial : Eklampsia

E. Planning

Tanggal 27-04-2017 Jam 08:30 Wita

9. Memberitahu bahwa ibu mengalami pre eklampsia berat

Hasil : Ibu sudah mengetahui kondisi yang dialaminya sekarang

10. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan kesadaran composmentis

TD : 170/110 mmHg

N:84x/i

S :36,8 °C

P: 22x/i

11. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142×/menit, DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138×/menit.

12. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL

Hasil: Infus telah terpasang dengan cairan RL di tangan kiri

13. Melakukan pemasangan kateter tetap

Hasil : Kateter telah terpasang

14. Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat

Hasil : Kolaborasi telah dilakukan

15. Memberikan obat oral nifedipin 3×1 hari @ 10 mg

Hasil : Ibu sudah meminum obatnya

16. Memberikan obat oral metildopa 3×1 hari @250 mg

Hasil : Ibu sudah meminum obatnya

17. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteiun urinaria

Hasil : urine ibu sudah dibawa ke laboratorium untuk di periksa

18. Memberikan dukungan moril pada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

Hasil : Ibu tampak tenang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY”S“ DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT
DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 27 APRIL 2017**

NO. Register : 468871

Tanggal. Kunjungan : 26 – 04 – 2017 Jam : 13:15 Wita

Tanggal. Pengkajian : 27 – 04 – 2017 Jam : 17 : 20 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “

Umur : 42 tahun / 42 tahun

Nikah : 1 X / ± 20 tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / B. Harian

Alamat : Borong Jati

A. Data Subjektif

1. Ibu sudah tidak pusing
2. Ibu merasakan pergerakan bayinya aktif

B. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis

3. Tanda-tanda vital :

TD : 140/100 mmHg

N:80x/i

S :36 °C

P: 20x/i

C. Assesment

Diagnosa :Ny "S" GIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 27 minggu 6 hari, intra uterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan pre eklampsia berat

Masalah aktual : Pre eklampsia berat

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya eklampsia

D. Planning

Tanggal 27-04-2017 Jam 17:50 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum dan TTV.

Hasil : Keadaan umum ibu baik

kesadaran : Komposmentis

TTV : TD : 140/100 mmHg

N:80x/i

S :36 °C

P: 20x/i

2. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu

dengan frekuensi 152x/menit

3. Observasi cairan infus yang terpasang

Hasil : Masih terpasang cairan infus RL 28 tetes/ menit

4. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek protein urine

Hasil : Telah dilakukan dan proteinuria negatif

5. Melakukan observasi kateter

Hasil : Kateter masih terpasang

6. Melakukan pemberian terapi obat nifedipin 3×1 hari @10 mg

Hasil : Ibu sudah meminum obatnya

7. Melakukan pemberian terapi obat metildopa 3×1 hari @250 mg

Hasil : Ibu sudah meminum obatnya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY”S“ DENGAN PRE EKLAMPSIA BERAT
DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 28 APRIL 2017**

NO. Register : 468871

Tanggal. Kunjungan : 226 – 04 – 2017 Jam :13:15 Wita

Tanggal. Pengkajian : 28 – 04 – 2017 Jam :08 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “

Umur : 42 tahun / 42 tahun

Nikah : 1 X / ± 20 tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / B. Harian

Alamat : Borong Jati

A. Data Subjektif

1. Ibu sudah tidak pernah pusing
2. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan

B. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis

3. Protein urinaria negatif

4. Tanda-tanda vital :

TD : 130/80 mmHg

N: 78x/i

S :36,3 °C

P: 22x/i

C. Assesment

Diagnosa :Ny "S" GIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 27 minggu 6 hari, intra uterine, situs memanjang, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan pre eklampsia berat.

Masalah actual : Pre eklampsia berat

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya eklampsia

D. Planning

Tanggal 28-04-2017 Jam 08:30 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum dan TTV.

Hasil :Keadaan umum ibu baik

kesadaran : composmentis

TTV : TD : 130/80 mmHg

N: 78x/i

S :36,3 °C

P: 22x/i

2. Melakukan up infus

Hasil :Infus telah di aff

3. Melakukan up kateter

Hasil :Kateter telah di aff

4. Memberikan terapi obat nifedipin 3x1 hari @10 mg

Hasil : Ibu sudah meminum obatnya sesuai dengan yang dianjurkan.

5. Memberikan terapi obat metildopa 3×1 hari @250 mg

Hasil: Ibu sudah meminum obatnya sesuai dengan yang dianjurkan

6. Mengajarkan ibu untuk diet makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin dan rendah lemak saat pulang ke rumah.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Memberitahu ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu setelah 1 minggu.

Hasil: Ibu sudah diberitahu

**KUNJUNGAN RUMAH PADA NY”S“
DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT
TANGGAL 6 MEI 2017**

Tanggal. Pengkajian : 06 – 05 – 2017

Jam :14 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “
Umur : 42 tahun / 42 tahun
Nikah : 1 X / ± 20 tahun
Suku : Gowa / Gowa
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / B. Harian
Alamat : Borong Jati

A. Data Subjektif

- a. Ibu sudah tidak pernah pusing selama pulang dari rumah sakit
- b. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan
- c. Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif

B. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Tanda-tanda vital :

TD : 120/80 mmHg

N: 80x/i

S : 36 °C

P: 22x/i

4. Melakukan pemeriksaan fisik terfokus

Abdomen

- a. Leopold I : TFU pertengahan px, 31 cm teraba bokong
- b. Leopold II : Puki
- c. Leopold III : Kepala
- d. Leopold IV : BAP
- e. LP : 81 cm
- f. TBJ : $81 \times 31 = 2480$ gr
- g. Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit

Ekstremitas

Ekstremitas Atas

- a. Inspeksi : simetris kiri dan kanan
- b. Palpasi : tidak ada oedema

Ekstermitas Bawah

- a. Inspeksi : simetris kiri dan kanan
- b. Palpasi : terdapat oedema dan tidak ada varices

C. Assesment

Diagnos :Ny "S" GIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 28 minggu 6 hari, intra uterine, situs memanjang, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan riwayat pre eklampsia berat

Masalah aktual : Riwayat Pre eklampsia berat

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya pre eklampsia berat ulang dan eklampsia

D. Planning

Tanggal 06-05-2017 Jam 14:30 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum dan TTV.

Hasil :Keadaan umum ibu baik

kesadaran : composmentis

TTV : TD : 120/80 mmHg N: 80x/i

S :36 °C P: 22x/i

2. Memberitahu ibu bahwa tekanan darah ibu normal

Hasil : Ibu sudah diberitahu

3. Menganjurkan ibu meminum obat yang diberikan tepat waktu sesuai yang dianjurkan

Hasil : Ibu bersedia dan sudah meminum obatnya sesuai dengan yang dianjurkan.

4. Menganjurkan ibu mengomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan bayi ibu terpenuhi

Hasil : Ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan

5. Menganjurkan ibu untuk diet makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin dan rendah lemak saat pulang ke rumah.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan terdekat jika ada ataupun tidak ada keluhan

Hasil : Ibu bersedia datang ke pelayanan kesehatan jika mempunyai keluhan ataupun tidak.

7. Memberitahu ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu setelah 1 minggu.

Hasil: Ibu sudah diberitahu

**KUNJUNGAN RUMAH PADA NY”S“
DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT
TANGGAL 14 MEI 2017**

Tanggal. Pengkajian : 14 – 05 – 2017

Jam :16 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ S “ / Tn “ S “

Umur : 42 tahun / 42 tahun

Nikah : 1 X / ± 20 tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / B. Harian

Alamat : Borong Jati

A. Data Subjektif

- a. Ibu sudah tidak pernah pusing selama pulang
- b. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan dan sudah habis
- c. Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif
- d. Ibu belum pernah memeriksakan kehamilannya ke puskesmas selama keluar dari rumah sakit

B. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Tanda-tanda vital :

TD : 120/70 mmHg

N: 80x/i

S : 36,5 °C

P: 22x/i

4. Melakukan pemeriksaan fisik terfokus

Abdomen

- a. Leopold I : TFU 2 jari diatas pertengahan px, 33 cm teraba bokong
- b. Leopold II : Puki,
- c. Leopold III : Kepala
- d. Leopold IV : BAP
- e. LP : 84 cm
- f. TBJ : $84 \times 33 = 2772 \text{gr}$
- g. Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/menit

Ekstremitas

Ekstremitas Atas

- c. Inspeksi : simetris kiri dan kanan
- d. Palpasi : tidak ada oedema

Ekstermitas Bawah

- a. Inspeksi : simetris kiri dan kanan
- b. Palpasi : terdapat oedema dan tidak ada varices

C. Assesment

Diagnosa : Ny "S" GIIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 30 minggu, intra uterine, situs memanjang, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan riwayat pre eklampsia berat

Masalah actual : Riwayat Pre eklampsia berat

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya pre eklampsia berat ulang dan eklampsia

D. Planning

Tanggal 14-05-2017 Jam 16:20 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum dan TTV.

Hasil: Keadaan umum ibu baik

kesadaran: composmentis

TTV : TD : 120/70 mmHg N: 80x/i

S : 36,5°C P: 22x/i

2. Memberitahu ibu bahwa tekanan darah ibu normal

Hasil : Ibu sudah diberitahu

3. Menganjurkan ibu mengomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan bayi ibu terpenuhi, apalagi ibu sedang mengandung bayi kembar.

Hasil : Ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan

4. Mengajarkan ibu untuk diet makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin dan rendah lemak saat pulang ke rumah.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan terdekat jika ada ataupun tidak ada keluhan

Hasil : Ibu bersedia datang ke pelayanan kesehatan jika mempunyai keluhan ataupun tidak.

6. Memberitahu ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu setelah 1 minggu.

Hasil: Ibu sudah diberitahu

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di bahas tentang kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus pada pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada Ny “S” dengan pre eklampsia berat yang dirawat di RSUD Syech Yusuf Gowa selama 3 hari mulai tanggal 26-04-2017 sampai 28-04-2017.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I : Pengkajian Data Dasar dan Analisa Data

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Tahap pengkajian diawali dengan pengumpulan data melalui anamnesis yang meliputi ibu, data biologis atau fisiologis, riwayat kehamilan atau persalinan lalu dan sekarang, pemeriksaan fisik yang berpedoman pada format pengkajian yang tersedia.

Data yang dikumpulkan adalah data yang tepat yaitu data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau atau data yang memiliki berhubungan dengan situasi yang ditinjau. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi napas), penciuman (bau napas, bau luka) serta perabaan (suhu badan, nadi). Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis juga bisa dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nuurhayatidkk, 2013).

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis yang meliputi biodata bertujuan memperjelas identitas pasien, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sekarang dan riwayat psikososial untuk mendapatkan informasi tentang keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh ibu dan kekhawatiran khusus yang muncul akibat adanya perubahan psikologis maupun psikologi.

Dalam tahap pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat pengumpulan data pada Ny "S", maupun keluarga serta bidan dan dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka

sehingga dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi data pada tahap selanjutnya.

Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan urine. Pengkajian pada kasus ini maka dilanjutkan dengan perencanaan asuhan pada ibu dengan Preeklampsia berat. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Langkah pertama yakni identifikasi data dasar pada Ny "S" didapatkan dari tahap anamnesa yakni keluhan utama ibu adalah ibu merasa pusing sejak 2 hari yang lalu, riwayat kehamilan sekarang ibu didapatkan bahwa hari pertama haid terakhir ibu adalah tanggal 14 Oktober 2016, riwayat kesehatan yang lalu ibu yakni ibu tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi pada kehamilan sebelumnya, riwayat KB ibu didapatkan bahwa ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan.

Sedangkan pada tahap pemeriksaan fisik ibu atau data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah : 170/110 mmHg, suhu : 36,8 °C, nadi : 82 x/menit, pernapasan: 22x/i, pada palpasi ekstremitas

bawah didapatkan bahwa ibu mengalami oedema pada kedua tungkai. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan protein urine ibu adalah +2, dan hemoglobin ibu adalah 14,4 gr.

Pre eklampsia berat ialah pre eklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Sarwono, 2014:544). Pre eklampsia berat dibagi atas 2 kategori yaitu, pre eklampsia berat tanpa *impending eclampsia*, dan pre eklampsia berat dengan *impending eclampsia* dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179).

Pada kasus Ny "S" usia 36 tahun GIIPIIA0 merupakan pasien rujukan dari puskesmas dengan keluhan ibu merasa pusing, serta hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan 170/110 mmHg dan pada pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium) di peroleh protein urinari +2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan penerapan manajemen asuhan kebidanan.

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan interpretasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik. Kata masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis, tetapi sesungguhnya membutuhkan penanganan yang dituangkan kedalam

sejumlah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya, masalah ini sering menyertai diagnosis.

Dalam tinjauan teori mengatakan bahwa Pre eklampsia berat ialah pre eklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam. Kriteria diagnosis untuk pre eklampsia berat Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan atau edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Gejala dan tanda preeklampsia berat : tekanan darah sistolik >160 mmHg, tekanan darah diastolik >110 mmHg, peningkatan kadar enzim hati atau ikterus, trombosit $<100.000/mm^3$, Oliguria <400 ml/24 jam, proteinuria >3 gr/liter, nyeri epigastrium, skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat, perdarahan retina dan edema pulmonum.

Penyulit lain juga bisa terjadi, yaitu kerusakan organ-organ tubuh seperti gagal jantung, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan pembekuan darah, sindroma HELLP, bahkan dapat terjadi kematian pada janin, ibu, atau keduanya bila preeklampsia tak segera diatasi dengan baik dan benar. Ditinjau dari umur kehamilan dan perkembangan gejala-gejala preeklampsia berat selama perawatan maka perawatan dibagi menjadi perawatan aktif yaitu kehamilan segera diakhiri atau diterminasi ditambah pengobatan medicinal dan perawatan konservatif yaitu kehamilan tetap dipertahankan ditambah pengobatan medisinal.

Dari tinjauan kasus diperoleh data: pada klien Ny "S" ibu hamil dengan pre eklampsia berat dengan gejala yang dialami tampak pusing, tekanan darah 170/110 mmHg dan data penunjang pemeriksaan proteinuria +2, edema (+)

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari data pertama, maka diagnose atau masalah aktual pada Ny “S” adalah : GIIIPIIA0, Gestasi 27Minggu 6 hari, Intrauterine, Tunggal ,Hidup, Preeklampsia Berat

1. GIIIPIIA0 merupakan kehamilan ketiga, telah 3 kali melahirkan dan tidak pernah keguguran. Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae alba, pembesaran perut sesuai usia kehamilan, terdapat hiperpigmentasi areola. Keluarnya *Melanophore Stimulating Hormone* hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit di sekitar pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut (striae livide) pada primigravida dan (striae alba) pada multigravida (Manuaba, dkk, 2013: 107). Usia kehamilan Ny”S” yaitu 27 minggu 6 hari, maka hal ini sesuai dengan data yang ada yaitu dari hasil bila dihitung dari HPHT tanggal 14 Oktober 2016. Serta pembesaran perut sesuai usia kehamilan dan TFU 3 jari di atas pusat(sesuai dengan usia kehamilan).
2. Intrauterine, Bagian besar janin dapat diraba saat dilakukan palpasi secara Leopold dan ibu tidak merasa nyeri saat janin bergerak, teraba bagian-bagian janin dalam uterus. Kehamilan intrauterine, perkembangan rahim sesuai dengan umur kehamilan.
3. Tunggal, Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, teraba dua bagian besar pada lokasi yang berbeda, bagian kepala pada kuadran perut bagian bawah, bokong berada pada kuadran fundus. Pada kehamilan tunggal hanya satu bunyi jantung.
4. Hidup, Janin yang hidup ditandai dengan adanya pergerakan janin yang dapat dirasakan oleh ibunya, dan pada auskultasi terdengar DJJ yang jelas dan teratur.

5. Pre eklamsia Berat, dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179). Pre eklamsia berat ialah pre eklamsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Sarwono, 2014:544).

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan. Adapun diagnosa/ masalah aktual yang dapat diidentifikasi pada klien Ny "S" ibu hamil dengan pre eklamsia berat dengan gejala yang dialami tampak pusing, tekanan darah 170/110 mmHg dan data penunjang pemeriksaan proteins urinaria +2 sehingga dalam penentuan masalah aktual tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan dan tinjauan kasus. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus pada Ny "S" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yang ditegaskan sehingga memperlihatkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Pada tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial, melakukan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien diharapkan dapat pula bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi.

Dalam merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang

mungkin terjadi dan membahayakan klien. Diagnosa/ masalah potensial yang dapat diidentifikasi pada studi kasus Ny "S" ada kesamaan antara teori yaitu potensial terjadi eklampsia, HELLP Syndrom dan KJDR

Pada kasus Ny "S" yang dilakukan pengkajian penulis dapat mengidentifikasi masalah potensial yang akan terjadi pada kasus ini yaitu dapat terjadi eklampsia.

Antisipasi terjadinya eklampsia dilihat dari beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya preeklampsia dan eklampsia diantaranya adalah sebagai berikut: Risiko yang berhubungan dengan partner laki-laki berupa primigravida (resiko primigravida 2 kali lebih besar daripada multigravida), umur yang ekstrim terlalu muda atau terlalu tua untuk kehamilan, partner laki-laki yang pernah menikahi wanita yang kemudian hamil dan mengalami preeklampsia, inseminasi donor dan donor oocyte, resiko yang berhubungan dengan riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga berupa riwayat penyakit preeklampsia, hipertensi kronis, penyakit ginjal, obesitas, diabetes gestasional, dan resiko yang berhubungan dengan kehamilan berupa mola hidatidosa kehamilan multipel, hydrops fetals (Yulia Fauziah, 2012:18).

Sindrom HELLP, digambarkan dengan pre eklampsia yang di karakteristikkan dengan hemolisis, peningkatan enzim hepar, dan jumlah platelet yang rendah.

Sindrom HELLP terjadi sekitar 20% kehamilan, dan merupakan komplikasi dari pre eklampsia . keluhan sering terjadi pada kuadran kanan atas atau nyeri epigastrium , mual, dan muntah . beberapa pasien dengan tanda dan gejala pre eklampsia harus di evaluasi hitung darah lengkap , jumlah platelet , dan penentuan enzim hepar

Kematian janin dalam Rahim (KJDR) merupakan kematian janin dalam uterus dengan usia kehamilan 20 minggu atau lebih dengan berat janin mencapai 500 gram atau lebih, ini merupakan salah satu komplikasi yang akan terjadi pada penderita pre eklamsia jika tidak di tangani secara baik dan cepat .

D. Langkah IV.Tindakan Emergency / Kolaborasi

Bidan atau dokter harus melakukan tindakan segera dan/atau mengonsultasikan serta menangani bersama anggota tim keesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi, manajemen kebidanan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan perinatal saja, melainkan juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya ketika wanita tersebut dalam persalinan. Data baru dapat saja perlu dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data dapat mengindikasikan situasi yang gawat, yakni bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu dan anak

Adanya data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dan harus menyelamatkan jiwa ibu serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada ibu hamil dengan pre eklampsia berat tindakan segera yang dilakukan yaitu memasang infus RL, memantau tekanan darah ibu, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat untuk mencegah kejang, pada studi kasus Ny”S” telah dilakukan pemasangan infus dengan cairan RL, memantau tekanan darah dan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian

terapi obat. Pada kasus yang ditemukan bahwa Ny”S” tidak di berikan MgsO4 karena pada hasil pemeriksaan laboratorium di dapatkan hasil protein urine (-) .Dengan demikian ada sedikit perbedaan tindakan yang di lakukan antara tinjaun pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus di lahan praktek

E. Langkah V. Intervensi Asuhan Kebidanan

Proses penyusunan suatu rencana tindakan harus berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang serta antisipasi diagnosa dan masalah lain yang mungkin timbul namun lebih dahulu harus dirumuskan tujuan dan kriteria yang akan dicapai.

Perencanaan adalah proses penyusunan suatu rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang, serta identifikasi diagnose dan masalah lain yang mungkin terjadi. Namun terlebih dahulu harus dirumuskan tinjaun yang akan dicapai serta kriteria keberhasilan.

Pada tahap perencanaan diagnosa kebidanan disusun menurut tingkat bertanya masalah dan kebutuhan pasien. Masalah asfiksia berat merupakan prioritas utama penulis sebagai masalah yang mengancam keselamatan bayi dan perlu tindakan segera. Sedangkan masalah potensial yang penulis angkat yaitu potensial terjadinya eklamsia.

Pada manajemen kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif termasuk indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien serta hubungannya dengan masalah yang dialami klien, dan juga meliputi antisipasi dengan bimbingan terhadap klien, serta konseling. Rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan, diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Ibu hamil pada Ny'S' dengan pre eklampsia berat, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial sebagai berikut:

1. Memberitahu bahwa ibu mengalami pre eklampsia berat
2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV
3. Melakukan pemeriksaan DJJ
4. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL
5. Melakukan pemasangan kateter tetap
6. Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat
7. Memberikan obat oral nifedipin 3×1 hari @ 10 mg
8. Memberikan obat oral metildopa 3×1 hari @ 250 mg
9. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteiun urinaria

F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan meningkatkan mutu asuhan

Sesuai tinjauan manajemen kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjalin rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan

keseluruhan oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pada study kasus Ny”S” ibu hamil dengan pre eklampsia berat, semua tindakan telah direncanakan sudah dilaksanakan seluruhnya dengan baik, tanpa hambatan karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan yang ada di ruang nifas RSUD Syech Yusuf Gowa.

G. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada tinjauan kebidanan evaluasi merupakan tingkat akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan. Mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan tercapai atau belum tercapai.

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atas keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Pada tinjauan pustaka evaluasi yang berhasil dilakukan adalah pemantauan keadaan ibu yang meliputi:

- 1) Pre eklampsia berat sudah teratasi sehingga tidak terjadi eklampsia
- 2) Tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu badan dalam keadaan normal
- 3) Keadaan umum ibu sudah membaik dan kesadaran komposmentis

Berdasarkan study kasus Ny”S” ibu hamil dengan pre eklampsia berat, setelah 3 hari diobservasi di rumah sakit RSUD Syech Yusuf dan 2 kali kunjungan rumah tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu, pada tinjauan pustaka dan study kasus Ny”S” secara garis besar tidak ditemukan kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang asuhan kebidanan pada Ny "S" dengan Preeklamsia Berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

- a. Dalam melakukan pengkajian terhadap ibu hamil dengan pre eklampsia berat dilaksanakan dengan pengumpulan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dari pasien dengan keluhan pusing, bengkak pada kaki, dan data objektif di peroleh dari pemeriksaan tekanan darah 170/110 mmHg, odema pada ekstremitas dan pemeriksaan laboratorium protein urinaria +2.
- b. Interpretasi data dilakukan dengan pengumpulan data dengan teliti dan akurat sehingga didapatkan diagnosa Ny "S" GIIIPIIA0 umur 42 tahun, gestasi 27 minggu 6 hari, intra uterine, situs memanjang, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan pre eklampsia berat.
- c. Diagnosa potensial pada Ny S tidak muncul.
- d. Tindakan segera pada Ny S dengan pre eklampsia berat adalah memantau tekanan darah, memasang infus RL 20 tpm, melakukan kolaborasi dengan

dokter untuk pemberian obat yaitu nifedipin 3×1 hari @10 mg dan metildopa 3×1 hari @250 mg.

- e. Rencana tindakan pada Ny S dengan pre eklampsia berat memberikan konseling kepada ibu tentang keadaanya, pantau tekanan darah, melakukan pemasangan infus RL dengan 20 tpm, melakukan pemberian terapi obat nifedipin 3×1 hari @10 mg dan metildopa 3×1 hari @250 mg dan melakukan pemasangan kateter dan melakukan kolaborasi dengan petugas lab untuk mevakukan pemeriksaan protein urinaria.
- f. Pelaksanaan pada ibu hamil Ny S dengan pre eklampsia berat sudah dilaksanakan sesuai denga rencana tindakan.
- g. Evaluasi pada Ny S dengan pre eklampsia berat yaitu pre eklampsia berat dapat teratasi.
- h. Dalam penanganan kasus pre eklampsia berat pada Ny S tidak ada kesengajangan antara teori dan praktek.
- i. Pendokumentasian sangat penting dilakukan pada setiap tahap dalam manajemen kebidanan, karena merupakan bukti pertanggungjawaban bidan terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan terhadap pasien.

B. Saran

- a. Diperlukan keterlibatan keluarga untuk lebih memfokuskan perhatian pada pasien terhadap keluhan ibu, dan segera membawa ke rumah sakit terdekat.

- b. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan, diharapkan senantiasa berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
- c. Seorang bidan hendaknya menganggap semua ibu hamil mengalami resiko komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu. Jadi diharapkan bidan mampu mendeteksi dini adanya tanda bahaya dan menganjurkan ibu dan keluarga segera ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.
- d. Sebagai bidan diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas lain (dokter, perawat, dan sesama bidan) untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan yang lebih baik dan lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

AL Qur'an Word dan Terjemahan

- Ansariadi, 2014. *Epidemiologi Kematian Ibu di Sulawesi-Selatan 2008-2013*. Yogyakarta: Jurnal Departemen Epidemiologi <http://respository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 27, Maret 2017
- Abbas, AM, dkk, 2016. *Maternal Mortality a tertiary care hospital experience in Upper Egypt*. Egypt: Journal International Diakses pada tanggal 22 April, 2017
- Baston, Helen dan Jennifer Hall, *Midwifery Esesential ANTENATAL*, Jakarta: EGC, 2013
- Fauziyah, Yulia. *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Heryani, Reni. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Medika, 2011
- Jannah, Nurul, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan-Kehamilan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012
- Kantor Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi-Selatan. 2014. *Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi-Selatpan (Sul-Sel) tahun 2013*. Dinkes.sul-selprov.go.id Diakses pada tanggal 27 Maret 2017.
- Lalita, Elisabeth, M. F. *Asuhan Kebidanan Kehamilan* , Jakarta: In Media 2013
- Mandriwati, G.A. *Asuhan Kebidanan Antenatal*, Jakarta: EGC, 2012
- Mondal, Suresh Candra, dkk, 2014. *Earliest Use of Medical Prophylactic Dose of Magnesium Sulphate (MgSO₄) in Severe Pre-eclampsia ti Improve Maternal and Perinata Outcome in a Rural Medical Collage, WB India*: Journal International Diakses pada tanggal 22, April 2016
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, 2013
- Nadyah, *Kegawatdaruratan Neonatal Anak dan Maternal*. Makassar-Samata Gowa: UIN Press, 2013.
- Roboson, Elizabeth. S dan Jason Waugh, *Patologi pada Kehamilan Manjemen dan Asuhan Kebidanan*, Jakarta: EGC, 2013
- Prawihardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2014

- Purwoatui, Endang. TH dan Elisabeth. *Konsep Kebidanan*, Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2014
- Penuntun Penulisan KTI UIN: Makassar- Samata Gowa: UIN Press, 2013
- SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia). 2012. *Angka Kematian Ibu AKI Indonesia* www.Depkes.co.id Di akses pada tanggal 27 Maret 2017.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Satrianegara, Fais. M dan Sitti Saleha, *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika: 2012
- Susanti, Eri, 2012. *Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pre Eklampsia dan Eklampsia di BPS Suminten Mantingan Ngawi*. Diakses pada tanggal 22 April, 2017
- Suryani, Ringgi dan Rosmauli Tiurna, *Prinsip-Prinsip Praktik Kebidanan Panduan Praktis & Mudah dipahami*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan pemeriksaan Kehamilan*. Makassar-Samata Gowa: UIN Press, 2013
- WHO (World Health Organization). 2012. *Angka Kematian Ibu AKI di negara-negara Asia Tenggara*. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017
- Yulifah, Rita dan Surachmindari. *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penelitian

Nama : Nur Herbiyanti Rukmana
Nim : 70400114044
T.T.L : Ujung pandang 25 maret 1995
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok G9/12
Nama Orang Tua
a. Ayah : Muh. Yasir
b. Ibu : Herni Siamin

B. Riwayat Pendidikan

SD Inpres Bakung I : 2002-2007
SMP Negeri 14 Makassar : 2007-2010
SMA Negeri 7 Makassar : 2010-2013
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017