

**IDENTIFIKASI GOLONGAN SENYAWA ANTIBAKTERI FRAKSI  
POLAR DAN NON POLAR KULIT BATANG KEMIRI  
(*Aleurites moluccana* L. Willd) DENGAN METODE  
BIOAUTOGRAFI KONTAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
(S. Farm) Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**NURFITRA FADIYAH**

**NIM: 70100113102**

**ALAUDDIN**  
**M A K A S S A R**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt karena atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Identifikasi Golongan Senyawa Antibakteri Fraksi Polar dan Non Polar Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) Dengan Metode Bioautografi Kontak”. Penelitian dan penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana farmasi (S.Farm) di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak , karena penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari mereka sangatlah sulit bagi penulis pribadi untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, saran dan masukan, tenaga, bantuan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. Selaku pembimbing akademik.
8. Ibu Syamsuri Syakri, S. Farm., M.Si., Apt. Selaku pembimbing kedua yang rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran hingga tersemangati untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah sangat membantu atas segala saran, masukan, perhatian dan bantuan dalam perbaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H.Supardin M.HI. selaku penguji agama yang memberi masukan, arahan dan koreksi untuk kesempurnaan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, bantuan, bimbingan, semangat dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Muh. Tang Umar, S.E dan Ibunda Hj. Nursis Azis, A.Md. Yang tidak pernah bosan memberikan doa, kasih sayang

yang luar biasa, semangat, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil. iada apapun di dunia ini yang dapat membalas kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan, kalian semangat yang sungguh luar biasa.

13. Adik-adikku tersayang Mutiah Fadilah dan Muh. Lutfi Farhandyka yang selalu memberi semangat dan mendoakan agar segera sajana.
14. Teman-teman “FAR13ON” atas segala bantuan, semangat, kerjasama, dukungan, dan suka dukanya selama menempuh pendidikan bersama di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tidak akan pernah terlupakan.
15. Saudari-saudariku Ratna Dwi Pujiarti, Nurwasari, Mukhlisa Setiabudi, Afiyati Abdullah, Rezki Auliya, Zakiah Anugerah hamzah, Siti Nurjannah Indah Sari, Wahyu Lyana Ningsih, Iffah Kholifah, St. Rahmah Akbar, Fitriah Nur, Riska Zain, selaku sahabat yang selalu membantu, memberi semangat, motivasi, dan saran serta mendoakan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, pada kesempatan kali ini, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Harapannya semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 23 November 2017

Penulis,

**NURFITRA FADIYAH**

NIM : 70100113102

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurfitra Fadiyah  
NIM : 70100113102  
Tempat, Tgl. Lahir : Parepare, 07 Oktober 1995  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Griya Patri Abdullah Lorong 6  
Judul : Identifikasi Golongan Senyawa Antibakteri Fraksi Polar dan Non Polar Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) dengan Metode Bioautografi Kontak.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 November 2017

Penulis,

**NURFITRA FADIYAH**  
**NIM: 70100113102**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Identifikasi Golongan Senyawa Antibakteri Fraksi Polar dan Non Polar Kulit Batang Kemiri (Aleurites moluccana L. Willd) Dengan Metode Bioautografi Kontak** yang disusun oleh Nuriftra Fadiyah, NIM: 70100113102, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 23 November 2017 M yang bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 23 November 2017 M**  
**4 Rabiul Awal 1439 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)  
Sekretaris : Mukhriani, S. Si., Apt. (.....)  
Pembimbing I : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)  
Pembimbing II : Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)  
Penguji I : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. (.....)  
Penguji II : Dr. H. Supardin, M.Hi. (.....)

apekan, f



**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.**  
**NIP. 195502031983121001**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1. Definisi Operasional .....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	7
A. Uraian Tanaman .....	7
1. Klasifikasi .....	7
2. Nama Daerah .....	7
3. Morfologi Tanaman .....	8
4. Kandungan Kimia .....	8
5. Kegunaan .....	8
B. Uraian Bakteri Uji .....	9

1. <i>Escherichia coli</i> .....	9
2. <i>Staphylococcus aureus</i> .....	10
3. <i>Bacillus subtilis</i> .....	11
4. <i>Streptococcus mutans</i> .....	12
5. <i>Salmonella thypi</i> .....	13
6. <i>Vibrio colera</i> .....	14
C. Ekstraksi Simplisia .....	15
1. Pengertian .....	15
2. Tujuan Ekstraksi .....	16
D. Uraian Umum Antibakteri .....	17
1. Defenisi Antibakteri .....	17
2. Sifat Antibakteri .....	20
3. Pembagian Antimikroba .....	21
4. Mekanisme Aksi Antibakteri .....	21
5. Uji Efektivitas Antibakteri .....	22
6. Kekuatan Aktivitas Antibakteri .....	23
E. Fraksinasi .....	23
F. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis .....	25
1. Pelaksanaan KLT .....	26
2. Penggunaan KLT .....	29
G. KLT-Bioautografi .....	30
H. Metode Sterilisasi .....	32
1. Pengertian .....	32
2. Cara-cara Sterilisasi .....	32
3. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Menjadi Obat .....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	40
1. Jenis Penelitian .....	40
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel .....	40

D. Alat dan Bahan .....	41
1. Alat .....	41
2. Bahan .....	41
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
1. Penyiapan Sampel .....	42
2. Ekstraksi Sampel .....	42
3. Sterilisasi Alat .....	43
4. Peremajaan Bakteri Uji .....	43
5. Pembuatan Suspensi Bakteri Uji.....	44
6. Pembuatan Larutan Stok Ekstrak .....	44
7. Uji Aktivitas Ekstrak .....	44
8. Fraksinasi Sampel .....	44
9. Profil KLT Fraksi .....	45
10. Uji Aktivitas Fraksi Polar dan Nonpolar .....	46
11. Pengujian Antibakteri Secara KLT-Bioautografi .....	46
12. Identifikasi Senyawa Antibakteri .....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Hasil Ekstraksi Kulit Batang Kemiri .....	48
2. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Batang Kemiri .....	48
3. Pengujian Aktivitas Antibakteri .....	48
4. Hasil Fraksinasi Ekstrak Kulit Batang Kemiri ( <i>Aleurites moluccana</i> ) Dengan kromatografi Cair Vakum (KCV) .....	49
5. Pengujian Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi .....	51
6. Pengujian KLT Bioautografi dan Identifikasi Golongan Senyawa .....	52
B. Pembahasan .....	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian .....	59
KEPUSTAKAAN .....	60
LAMPIRAN .....	63

RIWAYAT HIDUP.....80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Hasil Ekstraksi Kulit Batang Kemiri.....	48
2. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Batang Kemiri .....	48
3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Kulit Batang Kemiri.....	49
4. Nilai Rf Noda Pada Profil KLT Fraksi Tidak Larut N-hexan Kulit Batang Kemiri.....	50
5. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi.....	51
6. Hasil Pengujian KLT Bioautografi.....	52
7. Beberapa ciri bakteri gram positif dan gram negatif .....	56



**DAFTAR GAMBAR****Gambar**

1. Pohon dan Kulit Batang Kemiri .....	71
2. Ekstrak Metanol, Partisi Larut N-hexan, dan Partisi Tidak Larut N-hexan Kulit Batang Kemiri .....	72
3. Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol, Partisi Larut Hexan, dan Partisi Tidak Larut Hexan Kulit Batang Kemiri .....	73
4. Hasil Identifikasi Profil KLT Partisi Tidak Larut Hexan .....	74
5. Hasil Fraksinasi Kulit Batang Kemiri .....	75
6. Hasil Uji Zona Hambat Fraksi Teraktif.....	76
7. Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi Teraktif .....	77
8. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Kulit Batang Kemiri .....	78

**DAFTAR LAMPIRAN****Lampiran**

1. Skema Kerja Ekstraksi .....	63
2. Skema Kerja Peremajaan Bakteri Uji.....	64
3. Pembuatan Suspensi Bakteri .....	64
4. Skema Kerja Uji Aktivitas Ekstrak .....	65
5. Skema Kerja Fraksinasi Sampel.....	66
6. Skema Uji Aktivitas Fraksi Teraktif .....	67
7. Skema Kerja KLT-Bioautografi.....	68
8. Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Kimia.....	69
9. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran.....	70



**ABSTRAK**

Nama : Nurfitra Fadiyah  
NIM : 70100113102  
Judul Penelitian : Identifikasi Golongan Senyawa Antibakteri Fraksi Polar dan Non Polar Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) Dengan Metode Bioautografi Kontak

---

Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi golongan senyawa antibakteri fraksi polar dan non polar kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) dengan metode bioautografi kontak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fraksi yang memiliki aktivitas antibakteri dan golongan senyawa dari kulit batang kemiri yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Ekstraksi dilakukan dengan maserasi menggunakan pelarut metanol kemudian dilakukan partisi dengan menggunakan pelarut n-hexan setelah itu ekstrak yang peroleh dilakukan skrining aktivitas antibakteri hingga diketahui jika partisi tidak larut n-hexan mempunyai aktivitas antibakteri tertinggi kemudian dilanjutkan ke fraksinasi. Fraksinasi dilakukan dengan menggunakan KCV (Kromatografi Cair Vakum). Hasil fraksinasi yang diperoleh adalah fraksi I, II, dan III yang diuji kembali aktivitas antibakterinya dengan menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 1000, 750, 500, dan 250 ppm. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa fraksi II merupakan fraksi teraktif yang memiliki aktivitas antibakteri paling baik pada konsentrasi 1000 ppm. Fraksi teraktif diuji kembali menggunakan KLT-Bioautografi dan diidentifikasi golongan senyawanya. Dari pengujian diperoleh fraksi dari partisi tidak larut n-hexan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella thypi*, dan *Vibrio colera* dimana senyawa flavonoid dari kulit batang kemiri yang berperan sebagai antibakteri.

Kata Kunci : *Aleurites moluccana*, Maserasi, Ekstrak, Fraksi, Identifikasi Golongan Senyawa, Antibakteri, Bioautografi Kontak

## ABSTRACT

Name : Nurfitra Fadiyah  
NIM : 70100113102  
Research Title : Identification of Antibacterial Compounds Group Polar and Non-Polar Fraction Bark of Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) With Bioautografi Contact Method

---

The identification of classes of antibacterial compounds polar and non-polar fraction of the bark of kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) with contact bioautografi method. This study aims to determine the fraction which has antibacterial activity and the compound from the bark of kemiri which have antibacterial activity. Extraction is done by maceration using methanol and then do the partition using n-hexan solvent extract obtained after the screening of antibacterial activity to be known if the partition is not soluble n-hexan has the highest antibacterial activity was continued to fractionation. Fractionation is done by using KCV (Vacuum Liquid Chromatography). The results obtained are fractionated fractions I, II, and III were tested again using the antibacterial activity of various concentrations of 1000, 750, 500, and 250 ppm. The results showed that the fraction II was the most active fractions had a most excellent antibacterial activity at a concentration of 1000 ppm. The most-active fraction tested again using KLT-Bioautografi and identified class of compounds. From the test were obtained from the partition insoluble fraction of n-hexan have antibacterial activity against *Escherichia coli*, *Salmonella thypi*, and *Vibrio cholera* which the flavonoid compound from the bark of kemiri that acts as an antibacterial.

Keywords: *Aleurites moluccana*, maceration, extract, fraction, Compound Identification Group, antibacterial, Bioautografi Contact

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Aleurites moluccana* (L.) Willd., atau lebih dikenal dengan nama kemiri, merupakan salah satu pohon serbaguna yang sudah dibudidayakan secara luas di dunia. Jenis ini merupakan jenis asli Indo-Malaysia dan sudah diintroduksi ke Kepulauan Pasifik sejak jaman dahulu. Di Indonesia, kemiri telah lama ditanam, baik untuk tujuan komersial maupun subsisten untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama bagi masyarakat Indonesia bagian timur. Jenis ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan; bijinya dapat digunakan sebagai bahan media penerangan, masakan dan obat-obatan, sedangkan batangnya dapat digunakan untuk kayu (Krisnawati. 2011: 1).

Hampir semua bagian dari pohon kemiri seperti daun, buah, kulit, kayu, akar, getah dan bunganya dapat dimanfaatkan, baik untuk obat-obatan tradisional, penerangan, bahan bangunan, bahan pewarna, bahan makanan, dekorasi maupun berbagai kegunaan lain. Di Pulau Jawa, kulit pohon kemiri dimanfaatkan sebagai obat diare (disentri). Di Jepang, bagian kulit pohon kemiri digunakan untuk obat tumor. Adapun di Sumatera, biji kemiri digunakan untuk obat sembelit dengan cara ditumbuk dan dibakar dengan menggunakan arang, kemudian dioleskan ke sekitar pusar (perut). Di Malaysia, daun kemiri direbus dan dimanfaatkan sebagai obat untuk sakit kepala, demam, bisul, bengkak pada persendian dan kencing nanah. (Krisnawati. 2011: 4).

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia. Infeksi adalah proses invasif oleh

mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit (Potter & Perry. 2005: 174). Infeksi dapat disebabkan oleh virus, jamur, parasit, dan bakteri. Bakteri patogen yang sering menyebabkan infeksi pada manusia diantaranya adalah *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Infeksi oleh *S. aureus* ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh *S. aureus* adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. *S. aureus* juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindrom syok toksik (Ryan dan Warsa, 1994: 42). Infeksi yang disebabkan oleh *E. coli* adalah infeksi saluran kemih, diare, sepsis, dan meningitis (Jawetz. 1996: 144).

Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Antibakteri termasuk ke dalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Entjang. 2001: 28).

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah terbesar dalam dunia kesehatan. Adanya resistensi antibiotik oleh bakteri penyebab infeksi tersebut menuntut penemuan dan pengembangan obat antibakteri baru. Penelitian tentang kimia bahan alam dewasa ini semakin banyak dieksploitasi sebagai obat-obatan, baik untuk kepentingan farmasi, pertanian, maupun peternakan. Pemilihan bahan

alam sebagai sumber bahan baku antibiotik merupakan alternatif yang menjanjikan, karena disamping keanekaragaman struktur yang dihasilkan, juga resiko efek samping lebih kecil dan mudah di dapat.

Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui senyawa apa yang terdapat pada kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang manfaat tumbuhan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Asy-syuara/ 26:7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”*(Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, 2002: 513).

Ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya. Kata “karim” antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2009: 187-188).

Dari ayat tersebut juga dapat dipahami adanya perintah kepada manusia untuk memperhatikan bumi, yang mana dapat diartikan sebagai perintah meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut. Tumbuhan

yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah Allah swt yang harus dipelajari dan dimanfaatkan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah fraksi polar dan nonpolar dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji?
2. Golongan senyawa apakah yang terkandung pada fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### 1. Definisi Operasional

##### a. Antibakteri

Merupakan senyawa yang terdapat pada ekstrak kulit batang kemiri yang memiliki aktivitas untuk menghambat atau mematikan bakteri.

##### b. Ekstraksi

Merupakan proses penarikan zat aktif dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) dengan menggunakan pelarut metanol.

##### c. Ekstrak

Merupakan suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd).

d. Partisi

Merupakan proses pemisahan ekstrak kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) dengan menggunakan pelarut n-hexan.

e. Fraksinasi

Merupakan proses pemisahan senyawa dari ekstrak metanol kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) dengan menggunakan pelarut n-heksan dan metanol.

f. Fraksi polar

Merupakan senyawa yang terdapat pada ekstrak kulit batang kemiri yang diperoleh dengan menggunakan pelarut metanol.

g. Fraksi nonpolar

Merupakan senyawa yang terdapat pada ekstrak kulit batang kemiri yang diperoleh dengan menggunakan pelarut n-heksan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ialah untuk mengetahui senyawa antibakteri yang terdapat pada fraksi polar dan non polar kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L) menggunakan metode bioautografi kontak.

**D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan pada jurnal Ibrahim (2011) yang berjudul aktivitas antibakteri tumbuhan prinjak (*Aleurites moluccana* (L.)) terhadap bakteri *Salmonella thyposa* dan *Vibrio cholera*, diketahui bahwa ekstrak metanol kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Salmonella thyposa* dan *Vibrio cholera*. Pada penelitian tersebut hanya menggunakan bakteri *Salmonella thyposa* dan *Vibrio cholera*, belum diujikan terhadap bakteri yang lain dan belum sampai pada golongan senyawa apa yang memiliki aktivitas antibakteri.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui fraksi apa sajakah dari ekstrak kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji.
2. Mengetahui golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah mengenai fraksi yang memiliki efek sebagai antibakteri dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kandungan senyawa antibakteri dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd).

#### **G. Kegunaan Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Masyarakat

Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd.) sebagai antibakteri terhadap beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Uraian Tanaman

##### 1. Klasifikasi (Tjitrosoepomo, 2010: 68)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Archichlamydae
Famili	: Euphorbiaceae
Genus	: Aleurites
Spesies	: <i>Aleurites moluccana</i> L. Willd

##### 2. Nama Daerah

buwa kare, kembiri, kemili, kemiling, kereh, matang ijo, tanoan (Sumatera); kamere, kemiri, komere, midi, miri, muncang, pidekan (Jawa); keminting, kemiri (Kalimantan); berau, bontalo dudulaa, boyau, lana, saketa, wiau (Sulawesi); kemiri, kemwiri, kumiri, mi, nena, nyenga (Maluku); tenu (Nusa Tenggara); anoi (Papua) (Martawijaya. 1989: 54).

### 3. Morfologi

Pohon, tinggi 25-30 m. Batang tegak, berkayu, permukaan banyak lentisel, percabangan simpodial, cokelat. Daun tunggal, berseling, lonjong, tepi rata, bergelombang, ujung runcing, pangkal tumpul, pertulangan menyirip, permukaan atas licin, bawah halus, panjang 18-25 cm, lebar 7-11 cm, tangkai silindris, hijau. Bunga majemuk, bentuk malai, berkelamin dua, di ujung cabang, putih. Buah bulat telur, beruas-ruas, masih muda hijau setelah tua cokelat, berkeriput. Biji bulat, berkulit keras, beralur, diameter  $\pm$  3,5 cm, berdaging, berminyak, putih kecokelatan. Akar tunggang, cokelat (Krisnawati. 2011: 2-3).

### 4. Kandungan Kimia

Daun kemiri mengandung senyawa senyawa flavonoid, tanin, saponin, sterol, asam amino, karbohidrat, dan polifenol (Junaid Niazi. 2010: 22). Kulit batang kemiri mengandung senyawa tanin, flavonoid, saponin, dan polifenol (Gani. 2001: 61). Batang kemiri mengandung selulosa, lignin, pentosan, dan abu (Muhlisah, 2009: 20).

### 5. Kegunaan

Hampir semua bagian dari tanaman kemiri dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, pohon kemiri juga memiliki sifat beracun sehingga perlu kewaspadaan bila ingin menggunakan bagian-bagian pohon lainnya untuk tujuan pengobatan atau konsumsi (Swanto. 2014: 8).

Kulit batang kemiri dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional untuk sakit kepala, diare, tumor, asma, penyakit kulit, dan hypocholesterolema. Bahkan di negeri Jepang produk kulit ini digunakan untuk penyembuhan penyakit tumor dan kanker (Swanto. 2014: 9).

Biji kemiri digunakan untuk obat sembelit. Sedangkan menurut penelitian menunjukkan bahwa daun kemiri mengandung antioksidan sterol, flavonoid, dan triterpen yang berguna sebagai anti inflamasi dan antipiretik (obat penurun panas) (Swanto. 2014: 9).

## **B. Uraian Bakteri Uji**

### **1. *Escherichia coli***

#### **a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 59)**

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Gammaproteobacteria
Bangsa	: Enterobacteriales
Suku	: Enterobacteriaceae
Marga	: <i>Escherichia</i>
Jenis	: <i>Escherichia coli</i>

#### **b. Sifat dan morfologi**

*Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5  $\mu\text{m}$  x 2,0-6,0  $\mu\text{m}$ , motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh

dengan mudah pada medium nutrient sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas, ada pula yang tidak memfermentasi glukosa dan maltose. Dapat ditemukan dalam usus mamalia dan tumbuh optimal pada suhu 37°C (Pelczar, 2008: 478).

## 2. *Staphylococcus aureus*

### a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 63)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Bacillales
Suku	: Staphylococcaceae
Marga	: Staphylococcus
Jenis	: <i>Staphylococcus aureus</i>

### b. Sifat dan morfologi

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu jenis peracunan makanan yang sering terjadi. Sel-sel *Staphylococcus aureus* berbentuk Gram positif tersusun dalam tandan khas. *Staphylococcus* dapat tumbuh baik pada kondisi aerobik tetapi umumnya tidak mampu bersaing dengan mikrobia lain yang ada dalam makanan. Strain tertentu dari *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu atau lebih dari lima tipe

antigenik yang berbeda dari enterotoksin tersebut. Umumnya penularan oleh *Staphylococcus aureus* tidak di dalam tubuh tetapi nampak dipermukaan tubuh, biasanya di dalam hidung dan bisul-bisul (Ali. 2005: 81).

### 3. *Bacillus subtilis*

#### a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 35)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Bacillales
Suku	: Bacillaceae
Marga	: Bacillus
Jenis	: <i>Bacillus subtilis</i>

#### b. Sifat dan morfologi

*Bacillus subtilis* merupakan bakteri Gram positif memiliki sel batang 0,3 - 2,2  $\mu\text{m}$  x 1,27-7,0  $\mu\text{m}$ . Sebagian besar motil, flagelum khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anerobik fakultatif (Pelczar, Michael. 2008: 459).

#### 4. *Streptococcus mutans*

##### a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 88)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Lactobacillales
Suku	: Streptococcaceae
Marga	: Streptococcus
Jenis	: Streptococcus mutans

##### b. Sifat dan morfologi

*Streptococcus mutans* termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5  $\mu\text{m}$ , koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45°C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipokoat (Pelczar. 2008: 652).

#### 5. *Salmonella typhi*

##### a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 76)

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria  
 Bangsa : Enterobacteriales  
 Suku : Enterobacteriaceae  
 Marga : Salmonella  
 Jenis : *Salmonella typhi*

**b. Sifat dan morfologi**

*Salmonella typhi* adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5  $\mu\text{m}$ , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37°C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar. 2008: 311).

**6. *Vibrio cholera***

**a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 36)**

Domain : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria  
 Kelas : Gammaproteobacteria  
 Bangsa : Vibrionales  
 Suku : Vibrionaceae

Marga : *Vibrio*

Jenis : *Vibrio colera*

#### b. Sifat dan morfologi

*Vibrio colera* adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, sumbuhnya melengkung atau lurus,  $0,5 \mu\text{m} \times 1,5-3,0 \mu\text{m}$ , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar, hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik fakultatif. Suhu optimum berkisar dari  $18-37^{\circ}\text{C}$  (Pelczar. 2008: 618).

### C. Ekstraksi Simplisia

#### 1. Pengertian

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari

bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Dirjen POM. 1979: 21).

Estrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstrasi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang telah ditetapkan (Dirjen POM. 1995: 25).

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif, yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik jika permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas (Mulyati. 2009: 73).

## **2. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi adalah untuk menyari semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Mulyati. 2009: 73).

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, serta secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Dirjen POM. 2000: 26). Berikut adalah metode yang umum digunakan menurut (Darwis. 2000: 29) adalah :

### 1. Maserasi

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan (29°C). Proses ini menguntungkan karena perendaman dalam waktu tertentu akan memecah dinding dan membran sel, sehingga senyawa metabolit dapat keluar. Maserasi merupakan cara yang sederhana, maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat-zat aktif sehingga zat aktif akan larut. Adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel, maka larutan yang pekat didesak keluar (Khunaifi, 2010: 38-39).

### 2. Perkolasi.

Merupakan proses melewati pelarut organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut.

### 3. Metode Soklet.

Menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan dapat dihemat karena terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Cocok untuk senyawa yang tidak terpengaruh panas.

### 4. Destilasi Uap.

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan.

Pelarut organik yang umum digunakan untuk memproduksi konsentrat, ekstrak, absolut atau minyak atsiri dari bunga, daun, biji, akar, dan bagian lain

dari tanaman adalah etil asetat, n-heksana, petroleum eter, benzen, toluen, etanol, isopropanol, aseton, dan air (Mukhopadhyay. 2002: 65-67).

#### ***D. Uraian Umum Antibakteri***

##### **1. Defenisi Antibakteri**

Antibakteri adalah zat yang membunuh bakteri atau menekan pertumbuhan dan reproduksi bakteri (Volk, dkk. 1993: 61). Berdasarkan jenis daya tahan kerjanya terhadap bakteri, zat antibakteri dibagi dalam dua kelompok yaitu bakteristatik dan bakterisidal. Zat bakterisidal adalah zat-zat yang dapat membunuh bakteri, sedangkan zat bakteristatik hanya menghambat pertumbuhan bakteri (Irianto. 2006: 26).

Berdasarkan atas pewarnaan gram, bakteri dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu:

1. Bakteri gram positif
2. Bakteri gram negatif

Kedua kelompok tersebut mempunyai susunan kimia yang berbeda yaitu:

1. Dinding sel bakteri gram negatif susunannya lebih rumit dibandingkan dengan bakteri positif
2. Dinding sel bakteri gram positif tersusun atas satu lapis saja yaitu lapisan peptidoglikan yang relatif lebih tebal. Sedangkan dinding sel bakteri gram negatif mempunyai dua lapisan dinding sel yaitu lapisan luar yang tersusun atas lipopolisakarida dan protein dan lapisan dalam

tersusun atas lapisan peptidoglikan yang lebih tipis daripada lapisan peptidoglikan pada bakteri gram positif.

3. Pada bakteri gram negatif diduga hanya tersusun atas satu lapisan molekul, sedang bakteri gram positif banyak lapisan polimer peptidoglikannya.
4. Disamping itu pada bakteri gram positif terdapat asam teikoat. Asam teikoat tersebut mengandung unit-unit gliserol atau ribitol yang terikat satu sama lain oleh ester-fosfat dan biasanya mengandung gula lain dan D-Alanin. Karena asam teikoat bermuatan negatif, maka lapisan tersebut juga akan mempengaruhi muatan negatif pada permukaan sel.

Ada beberapa perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif dinding selnya mengandung peptidoglikan dan juga asam teikoat dan asam teikuronat. Oleh sebab itu dinding sel bakteri gram positif sebagian adalah polisakarida. Pada beberapa bakteri asam teikoat merupakan antigen permukaan (antigen dinding sel), dan ada yang merupakan selaput pada selnya. Asam teikoat ini pada umumnya terdiri dari gula netral seperti galaktosa, manosa, ramnosa, arabinosa, dan glukosamin. Lapisan yang demikian itu akan menyelimuti seluruh sel bakteri sehingga menyerupai selubung yang kuat dan dinamakan murein (Klien, et. All. 1999: 42).

Sedangkan pada dinding sel bakteri gram negatif terdapat peptidoglikan yang sedikit sekali dan berada diantara selaput luar dan selaput dalam dinding sel. Dinding sel bakteri gram negatif sebelah luar merupakan komponen yang terdiri

dari fosfolipid dan beberapa protein yang sering disebut sebagai auto layer (Klien, et. All. 1999: 26).

Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa merusak dinding sel dengan cara menghambat pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan makanan dari dalam sel, pereubahan molekul protein, dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. Di bidang farmasi, bahan antibakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu suatu substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain. Senyawa antibakteri dapat bekerja secara bakteristatik, bakteriosidal, dan bakteriolitik (Pelczar dan Chan. 1998: 38).

## **2. Sifat Antibakteri**

Berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, senyawa antimikrobia mempunyai 3 macam efek terhadap pertumbuhan mikrobia yaitu:

a. Bakteristatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi tidak membunuh. Senyawa bakteristatik seringkali menghambat sintesis protein atau mengikat ribosom. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan antimikrobia pada kultur mikrobia yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikrobia pada fase logaritmik didapatkan jumlah sel total maupun jumlah sel hidup adalah tetap.

b. Bakteriosidal memberikan efek dengan cara membunuh sel tetapi tidak terjadi lisis sel atau pecah sel. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan antimikrobia pada kultur mikrobial yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikrobia pada fase logaritmik didapatkan jumlah sel total tetap sedangkan jumlah sel hidup menurun.

c. Bakteriolitik menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah sel sehingga jumlah sel berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikrobia. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan antimikrobia pada kultur mikrobial yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikrobia pada fase logaritmik, jumlah sel total maupun jumlah sel hidup menurun (Madigan, dkk. 2000: 40-42).

### 3. Pembagian Antimikroba

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi:

a. Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri dari gram negatif saja atau gram positif saja.

b. Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri baik gram negatif, maupun gram positif (Pratiwi, Sylvia T. 2008: 193).

#### 4. Mekanisme Aksi Antibakteri

Macam-macam mekanisme aksi antibakteri adalah (Pratiwi. 2008: 194):

a. Menghambat sintesis dinding sel

Penghambatan dilakukan dengan cara merusak lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel bakteri gram positif maupun gram negatif.

b. Merusak membran plasma

Antibakteri bekerja dengan mengubah permeabilitas membran plasma sel bakteri. Membran plasma semipermeabel dan mengendalikan transpor berbagai metabolit ke dalam dan ke luar sel. Adanya gangguan atau kerusakan pada membran plasma akan menghalangi proses osmosis dan proses biosintesis dalam membran.

c. Menghambat sintesis protein

Membunuh bakteri dengan cara menghambat sintesis protein sehingga bakteri tidak mampu mensintesis protein yang penting untuk pertumbuhannya.

d. Menghambat sintesis asam nukleat

Antibakteri bekerja dengan cara menghambat proses transkripsi dan replikasi bakteri.

e. Menghambat sintesis metabolit esensial

Sintesis metabolit bisa dihambat dengan antimetabolit yang merupakan kompetitor substrat normal dari enzim pemetabolisme.

## 5. Uji Efektivitas Antibakteri

Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode dilusi (pengenceran) dan dengan metode difusi (Jawetz et al. 1995: 31).

### a. Metode dilusi

Zat antibakteri dengan konsentrasi berbeda-beda dimasukkan pada media cair. Media tersebut langsung diinokulasi dengan bakteri dan diinkubasi. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan konsentrasi terkecil suatu zat antibakteri dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri uji. Metode dilusi agar membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya sehingga jarang digunakan.

### b. Metode difusi

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar dengan menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang. Prinsip metode ini adalah mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri didalam media padat melalui pencadangan. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri adalah daerah jernih disekitar cakram. Luas daerah berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri, semakin kuat daya aktivitas antibakteri maka semakin luas daerah hambatnya.

## 6. Kekuatan Aktivitas Antibakteri

Diameter adalah hambatan diukur setelah masa inkubasi berakhir. Kekuatan aktivitas antimikroba ditentukan berdasarkan standar yang dikemukakan oleh Conner dan Beuchat (1984) ; aktivitas kuat memiliki Diameter Daerah

Hambat (DDH) > 1,1 cm, aktivitas lemah memiliki DDH 0,6-1,1 cm dan ekstrak dengan DDH < 0,6 cm berarti tidak menghambat pertumbuhan mikroba.

### ***E. Fraksinasi***

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari. 2012: 25).

*Vacum Liquid Chromatography* atau kromatografi cair vakum adalah kromatografi kolom yang dipercepat dan bekerja pada kondisi vakum. Prinsip yang digunakan adalah adanya perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa yaitu kecenderungan dari molekul untuk melarut dalam cairan (kelarutan), menguap (keatsirian), dan melekat pada permukaan serbuk labus (adsorpsi, penyerapan). Modifikasi kromatografi cair yang dibantu dengan menggunakan vakum dapat diaplikasikan untuk memperoleh beberapa fraksi dalam waktu yang cepat dan tidak menggunakan fase diam serta fase gerak yang terlalu banyak (Pelletier. 1986: 147).

Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan penjerap mutu KLT 10-40  $\mu\text{m}$ ) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai. Cuplikan dilarutkan ke dalam pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada bagian atas kolom atau pada lapisan penjerap dan dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu, kromatografi vakum cair menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann. 1995: 184).

Metode yang umum digunakan untuk memisahkan komponen-komponen senyawa yaitu metode kromatografi. Untuk tujuan kualitatif dapat digunakan kromatografi lapis tipis (KLT) sedangkan untuk pemisahan senyawa dalam jumlah besar dapat digunakan kromatografi kolom (Mutiasari. 2012: 26).

Fraksi-fraksi yang dihasilkan dianalisis secara keseluruhan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan eluen tertentu. Fraksi-fraksi yang mempunyai kromatogram yang sama digabung hingga diperoleh beberapa fraksi.

#### ***F. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis***

Kromatografi merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk memisahkan dan memurnikan komponen-komponen dari campuran lainnya. Pemisahan komponen-komponen itu terjadi atas dasar distribusi 2 fase yaitu fase diam yang sering disebut adsorben dan fase gerak atau cairan pengelusi.

Kromatografi yang biasa digunakan adalah kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom, dan kromatografi gas (Sastrohamidjojo. 1996: 125).

Pemisahan secara kromatografi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung beberapa sifat fisika dari zat yang terlibat adalah :

- a. Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan
- b. Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus
- c. Kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap

Manfaat dilakukan kromatografi pada hakekatnya adalah dengan tujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang ada (kualitatif), berapa kadarnya (kuantitatif) dan bagaimana memperoleh yang murni (Gritter. 1991: 37).

## **1. Pelaksanaan KLT**

### **a. Fase Diam**

Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10-30  $\mu\text{m}$ . Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya. Penjerap yang paling sering digunakan adalah silika dan serbuk selulosa, sementara mekanisme sorpsi yang utama pada KLT adalah adsorpsi dan partisi (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 74).

### **b. Fase Gerak**

Fase gerak pada KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering dengan mencoba-coba karena waktu yang diperlukan hanya sebentar. Sistem yang paling sederhana ialah campuran 2 pelarut organik karena daya elusi campuran

kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Berikut adalah beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak :

1) Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT merupakan teknik yang sensitif.

2) Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga  $R_f$  terletak antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan.

3) Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silica gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solute yang berarti juga menentukan nilai  $R_f$ . Penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar seperti dietil eter ke dalam pelarut non polar seperti metil benzene akan meningkatkan harga  $R_f$  secara signifikan.

4) Solut-solut ionik dan solute-solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya, seperti campuran air dan methanol dengan perbandingan tertentu. Penambahan sedikit asam etanoat atau ammonia masing-masing akan meningkatkan solute-solut yang bersifat basa dan asam (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 76).

c. Aplikasi (penotolan) Sampel

Untuk memperoleh reproduibilitas, volume sampel yang ditotolkan paling sedikit 0,5  $\mu$ l. Jika volume sampel yang ditotolkan lebih besar dari 2-10  $\mu$ l, maka penotolan harus dilakukan secara bertahap dengan dilakukan pengeringan antar totolan (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 77).

#### d. Pengembangan

Bila sampel telah ditotolkan maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan sampel dalam bejana kromatografi yang sebelumnya telah dijenuhi dengan uap fase gerak. Tepi bagian bawah lempeng tipis yang telah ditotoli sampel dicelupkan kedalam fase gerak kurang lebih 0,5-1 cm. Tinggi fase gerak dalam bejana harus dibawah lempeng yang telah berisi totolan sampel.

Bejana kromatografi harus tertutup rapat dan sedapat mungkin volume fase gerak sedikit mungkin (akan tetapi harus mampu mengelusi lempeng sampai ketinggian lempeng yang telah ditentukan. Untuk melakukan penjenuhan fase gerak, biasanya bejana dilapisi dengan kertas saring . Jika fase gerak telah mencapai ujung dari kertas saring, maka dapat dikatakan bahwa fase gerak telah jenuh (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 79).

#### e. Deteksi Bercak

Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Cara kimia yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu pereaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Cara fisika yang dapat digunakan untuk menampakkan bercak adalah dengan denagan cara pencacahan radioaktif dan fluoresensi sinar ultraviolet. Fluorosensi sinar ultraviolet terutama untuk senyawa yang dapat berfluorosensi, membuat bercak akan terlihat jelas (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 80).

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah salah satu cara untuk memisahkan suatu komponen berdasarkan adsorpsi dan partisi. Adsorben yang digunakan berupa bubuk halus dari silika gel yang dibuat serba rata di atas lempeng kaca.

Ukuran partikel adsorben halus, agar lapisan adsorben pada lempeng kaca berbentuk rata dan homogen, sehingga rembesan dari cairan pengelusi cepat dan rata, dengan demikian komponen dapat terpisah baik. Perbandingan kecepatan Bergeraknya komponen terlarut dalam fase gerak adalah dasar untuk mengidentifikasi komponen yang dipisahkan, perbandingan kecepatan ini dinyatakan dalam Rf.

$$R_f = \frac{\text{Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk}}{\text{Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas}}$$

Nilai Rf nilai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Ukuran partikel dari adsorben
- b. Derajat keaktifan dari lapisan adsorben
- c. Kemurnian pelarut
- d. Konsentrasi pelarut
- e. Kejenuhan ruang elusi
- f. Temperatur
- g. Keterampilan bekerja

Kromatografi lapis tipis (KLT) memiliki beberapa kelebihan yaitu pemisahan senyawa yang amat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik, dan bahkan ion anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya tidak terlalu mahal. Selain itu pelarut dan cuplikan yang digunakan jumlahnya sedikit (Satroamidjojo. 1996 dan Gritter. 1991).

## 2. Penggunaan KLT

Penggunaan umum KLT adalah untuk menentukan banyaknya komponen dalam campuran, identifikasi senyawa, memantau berjalannya suatu reaksi, menentukan efektivitas pemurnian, menentukan kondisi yang sesuai untuk kromatografi kolom, serta memantau kromatografi kolom, melakukan screening sampel untuk obat (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 83).

Analisa kualitatif dengan KLT dapat dilakukan untuk uji identifikasi senyawa baku. Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai  $R_f$ . Analisis kuantitatif dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengukur bercak langsung pada lempeng dengan menggunakan ukuran luas atau dengan teknik densitometry dan cara berikutnya adalah dengan mengerok bercak lalu menetapkan kadar senyawa yang terdapat dalam bercak dengan metode analisis yang lain, misalnya dengan metode spektrofotometri. Dan untuk analisis preparatif, sampel yang ditotolkan dalam lempeng dengan lapisan yang besar lalu dikembangkan dan dideteksi dengan cara yang nondestruktif. Bercak yang mengandung analit yang dituju selanjutnya dikerok dan dilakukan analisis lanjutan (Gandjar, Ibnu Gholib. 2007: 84).

### G. *KLT-Bioautografi*

Bioautografi berasal dari kata bio = makhluk hidup, autografi = melakukan aktivitas sendiri. Menurut Betina (1972), bioautografi adalah suatu metode pendektasian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum

teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengertian kromatografi lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor dan lain-lain dari substansi yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap penumbuhan mikroorganisme uji. Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk mendeteksi komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula diisolasi langsung dari komponen yang aktif. KLT Bioautografi dapat di bagi 3 kelompok yaitu :

1. Bioautografi langsung, Metode ini dimana mikroorganismenya tumbuh secara langsung diatas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu.

2. Bioautografi kontak, Metode ini dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT). Lempeng kromatografi ini disemprotkan di atas permukaan medium nutrient agar yang telah diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisa. Setelah 15-30 menit lempeng kromatografi kemudian dipindahkan dari permukaan medium. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari kromatogram ke dalam medium agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan tempat temperatur yang tepat, hingga noda yang menghambat tampak pada permukaan.

3. Bioautografi pencelupan, Metode ini dimana medium agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri yang telah dituang di atas lempeng kromatografi lapis tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah lempeng kromatografi yang telah dielusi diletakkan dalam cawan petri sehingga permukaan tertutupi oleh medium agar yang berfungsi sebagai based layer. Setelah medium agar memadat, selanjutnya dituang medium agar yang telah diinokulasi pada suhu dan waktu yang sesuai (Djide. 2008: 132).

## H. Metode Sterilisasi

### 1. Pengertian

Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (protozoa, fungi, bakteri, mycoplasma, virus) yang terdapat di dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi biocidal agent atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme (Pratiwi. 2008: 124).

### 2. Cara-cara Sterilisasi

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara mekanik, fisik dan kimiawi.

a. Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil (0,22 mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang tahan panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik.

b. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran :

#### 1) Pemanasan

a) Pemijaran (dengan api langsung): membakar alat pada api secara langsung, contoh alat : jarum inokulum, pinset.

b) Panas kering: pada proses ini terjadi dehidrasi sel mikroorganisme, sterilisasi dengan oven kira-kira 160-180°C selama 1,5-2 jam

dengan sistem udara yang statis. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan petri.

c) Uap air panas : konsep ini mirip dengan mengukus. Air mendidih atau uap air pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganisme dan virus dalam waktu 5 menit. Masih banyak spora bakteri yang tahan terhadap pemanasan ini dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.

d) Uap air panas bertekanan : menggunakan autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit. Ini dilakukan untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Cara ini dilakukan untuk mensterikan alat-alat yang tidak tahan pemanasan seperti spuit.

## 2) Sterilisasi secara kimiawi

Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan desinfektan contohnya antara lain alkohol dan formalin (Anonim, 2008; Djide, 2008).

### ***I. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Menjadi Obat***

Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik dan alam surga, namun islam memiliki aturan dan tuntutan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas, dan logis. Salah satu kelebihan islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan individu maupun masyarakat.

Dalam Islam, kesehatan termasuk hal utama. Hal ini di dukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam QS An-Naba' / 78: 15-16

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

Terjemahnya:

“untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang rindang” (Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014: 865)

Imam Fakhruddin, dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir, membahas dua aspek dari kedua ayat yang disebut terakhir ini. Aspek pertama adalah persoalan jenis tumbuhan. Tumbuhan dimuka bumi ini ada yang tidak berdahan dan ada yang berdahan. Tumbuhan yang berdahan terbagi dua lagi: yang bermayang dan yang tak bermayang. Yang bermayang disebut *hasyisy* (rumput) yang dalam ayat ini disebut *nabatan*. Tumbuhan yang berdahan disebut *syajar* (pohon). Adapun sekumpulan pohon dalam jumlah banyak sekali disebut *jannat*. (Tim Tafsir Ilmiah Salman, 2014: 60).

Adapun penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah menurunkan dari awan air hujan yang banyak dan memberi manfaat, terutama untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan binatang. Hal itu bertujuan agar dapat menumbuhkan biji-bijian seperti gandum, sayur, padi dan tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanan manusia dan hewan ternak. Dalam ayat ini, Allah menyebut

bermacam-macam tanaman yang tumbuh di bumi, di antaranya ada yang mempunyai batang dan ada yang tidak. Ada yang menghasilkan buah-buahan dan ada pula yang menghasilkan biji-bijian seperti gandum, padi dan lain-lain untuk makanan manusia (Kementrian Agama RI. 2009: 872).

Dalam rangkaian ayat-ayat ini, Allah tampaknya begitu bangga terhadap semua ciptaan-Nya, sehingga manusia pun didorong untuk memerhatikan ciptaan-ciptaan tersebut secara cermat dan detail. Oleh karena itu, rangkaian ayat-ayat ini dapat dipandang sebagai motivasi bagi manusia agar menyelidiki alam semesta ini (Tim Tafsir Ilmiah Salman, 2014: 72).

Tanpa bertanya, manusia tidak akan bisa mengungkapkan kebesaran Allah lewat ayat-ayat-Nya. Tanpa meneliti ciptaan-Nya, manusia tidak akan mampu pula menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sebagai khalifah di muka bumi ini (Tim Tafsir Ilmiah Salman, 2014: 73).

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahwa rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ  
 بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

(HR. Bukhari).

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim.2009: 219).*

Hadist senada juga diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab shohihnya dari hadist Abu Zubair yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(HR. Ahmad dan Hakim)

Artinya:

*"Setiap penyakit ada obatnya. Jika obta yang tepat diberikan, dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh" (Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2009: 220).*

Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya untuk berobat di saat tertimpa penyakit sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya, seperti

hadist shohih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, dan Imam Al-Hakim dari Usamah bin Syarik At-Taghabi:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا:  
مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

(HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

Artinya:

Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2009: 251).

Berdasarkan hadist di atas, Rasulullah mensunnahkan kepada umatnya untuk senantiasa berikhtiar dengan cara berobat ketika ditimpa penyakit, dan agar tidak hanya sebatas tawakkal kepada Allah atas apa yang dideritanya. Pengobatan penyakit yang diderita makhlukNya merupakan jalan ikhtiar, sedangkan penyembuhan penyakitnya adalah takdir Allah semata, sejalan dengan pendapat ulama’ as-sholeh “manusia adalah sebatas berusaha dan Allah-lah yang menentukannya (Al- Hanafi. 2006: 480).

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui, penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, bukan berarti tumbuhan yang menyembuhkan tetapi atas seizin Allah. Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

Dari ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Agar manusia senantiasa mengisyaratkan atau bersyukur atas segala pemberian Allah melalui tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kebutuhan pengobatan manusia. Tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt dapat digunakan sebagai obat untuk kesembuhan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengandung suatu zat atau obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt di bumi menyembuhkan penyakit tertentu.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.

##### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

###### **a. Waktu**

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2017.

###### **b. Lokasi**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental laboratorium.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

Pada penelitian ini digunakan populasi yaitu tanaman kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) sedangkan sampelnya kulit batang kemiri (*Aleurites*

*moluccana* L. Willd) diambil dari Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

#### **D. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan adalah alat maserasi, autoklaf, cawan petri, chamber, gelas Erlenmeyer 100 ml, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 5 ml, 10 ml dan 50 ml, inkubator, kompor, lampu spiritus, lampu UV 254 nm dan 366 nm, Laminary Air Flow (LAF), lemari pendingin, mikropipet (*socorex*) 1-10, 10-100, 100-1000  $\mu$ l, ose bulat, ose lurus, oven, penangas air, *rotary evaporator*, spoit, tabung reaksi, timbangan analitik, water bath, vial, vortex mixer (*K*) dan wadah maserasi.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan adalah air suling, biakan murni bakteri *Escherchia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella thypi*, *Vibrio cholera*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, lempeng silica gel 60 GF<sub>254</sub>, medium Nutrient Agar (NA), ekstrak metanol, fraksi I, II, dan III kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd), pelarut metanol, pelarut n-heksan, Reagen AlCl<sub>3</sub> 5%, Reagen FeCl<sub>3</sub> 5%, Reagen Dragendorf, dan Reagen Liebermann-Burchard.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Penyiapan sampel**

#### **a. Pengambilan sampel**

Sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) sebanyak 2 kg diperoleh dari Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) diambil dengan memisahkan kulit dari batang pohon. Teknik pengambilan dengan cara berselang-seling dan sebelum mencapai jaringan kambiumnya.

#### **b. Pengolahan sampel**

Sebelum dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) di sortasi basah. Setelah proses pencucian, kemudian kulit batang kemiri di angin-anginkan di dalam ruangan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung. Setelah itu, sampel yang telah dikeringkan dihaluskan dan disimpan dalam toples kemudian sampel siap untuk diekstraksi.

### **2. Ekstraksi sampel**

Sampel diekstraksi dengan pelarut metanol. Sampel kulit batang kemiri yang telah kering ditimbang sebanyak 2000 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, lalu ditambahkan pelarut metanol sehingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3x24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan metanol

dan disimpan kembali selama 3 x 24 jam. Filtrat metanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotary evaporator* sampai diperoleh ekstrak metanol kental.

### **3. Sterilisasi alat**

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen hingga bersih, kemudian alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan aluminium foil. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Spoit dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

### **4. Peremajaan Bakteri Uji**

Bakteri yang digunakan berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bakteri diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C.

### **5. Pembuatan Suspensi Bakteri Uji**

Bakteri uji yang telah diremajakan dalam medium NA miring disuspensikan dalam 10 ml larutan NaCl 0,9% kemudian diukur serapannya 25% T pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm.

### **6. Pembuatan Larutan Stok Ekstrak**

Dibuat larutan stok dengan menimbang ekstrak metanol kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) sebanyak 40 mg, kemudian larutkan dengan DMSO dan cukupkan volumenya hingga 10 ml dengan air steril.

### **7. Uji Aktivitas Ekstrak**

Masing-masing sebanyak 20 µl bakteri uji ditambahkan 10 ml pada medium NA. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Larutan stok yang telah dibuat masing-masing konsentrasi ditetaskan diatas paper disk kemudian diletakkan di atas medium yang telah diinokulasi bakteri, selanjutnya diinkubasi bakteri pada suhu 37°C selama 1x24. Kemudian diamati zona hambat yang terbentuk hingga diketahui ekstrak yang aktif sebagai antimikroba.

### **8. Fraksinasi sampel**

Ekstrak metanol kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) kemudian difraksinasi dengan menggunakan kromatografi cair vakum. Ditimbang ekstrak metanol kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) sebanyak 3 g dan ditambahkan silika gel sebanyak 5 g. Dilarutkan ekstrak metanol dengan pelarut secukupnya, lalu ditambahkan sedikit demi sedikit silika gel sehingga ekstrak mengering seperti serbuk. Dimasukkan silika gel dan serbuk ekstrak ke dalam kromatografi cair vakum (KCV) dan dimampatkan dengan pompa vakum

kemudian dielusi dengan eluen yang pertama kali digunakan. Cairan pengelusi dibuat dengan gradient kepolaran yang meningkat berdasarkan profil KLT. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan kemudian dilihat profil KLT-nya. Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna bercak yang sama digabung menjadi satu untuk diuji aktivitas antibakteri dengan metode KLT-bioautografi.

### **9. Profil KLT Fraksi**

Diaktifkan lempeng KLT dengan pemanasan dalam oven pada suhu  $110^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit sebelum digunakan. Fraksi-fraksi tersebut kemudian ditotolkan pada lempeng kemudian dielusi di dalam chamber yang sudah jenuh dengan cairan pengelusi hingga batas 1 cm dari tepi atas lempeng. Lempeng dikeluarkan dari chamber dan diangin-anginkan hingga cairan pengelusi menguap. Selanjutnya diamati di bawah sinar UV 254 dan 366 dan dihitung nilai Rf nodanya. Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna bercak yang sama digabung menjadi satu.

### **10. Uji Aktivitas Fraksi Polar dan Nonpolar**

Pengujian Fraksi polar dan nonpolar dengan cara menggunakan sebanyak 20  $\mu\text{l}$  bakteri uji ditambahkan 10 ml medium NA. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Dibuat lagi larutan stok dari masing-masing fraksi dengan konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm dan 250 ppm. Penanaman bakteri dilakukan menggunakan paper disk yang telah ditetesi

larutan stok ke dalam medium yang sudah dibuat, kemudian diinkubasi bakteri pada suhu 37°C selama 1x24. Kemudian diukur zona hambat yang terbentuk dari beberapa fraksi hingga diketahui yang manakah yang memiliki aktivitas terbaik.

### **11. Pengujian Antibakteri Secara KLT-Bioautografi**

Sebanyak 20 µl bakteri uji ditambahkan dengan 10 ml medium NA. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat. Setelah 30 menit lempeng (kromatogram) diangkat dan dikeluarkan dari medium. Selanjutnya diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C.

### **12. Identifikasi Senyawa Antibakteri**

Fraksi ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan eluen yang sama sesuai dengan profil KLT yang telah diperoleh. Diamati kromatogramnya kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi penampakan noda

- c. Pereaksi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%, Kromatogram dipanaskan pada 105°C hingga nampak perubahan warna dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, hitam.
- d. Pereaksi Dragendorff, akan dihasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloida.

- e. Pereaksi  $\text{FeCl}_3$  5%, akan dihasilkan warna biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.
- f. Pereaksi Liebermann-Burchardat, Kromatogram terlebih dahulu dipanaskan, kemudian diamati dilampu UV 366 nm, munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.
- g. Pereaksi  $\text{AlCl}_3$  5%, diamati dilampu UV 366 nm akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavanoid.
- h. Pereaksi KOH (Kalium Hidrosida) etanolik, jika sampel positif mengandung senyawa khumarin maka akan dihasilkan warna merah terang.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Ekstraksi Kulit Batang Kemiri

Hasil ekstraksi simplisia kulit batang kemiri (*Aluerites moluccana*) sebanyak 2000 gram dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol sebanyak 20 liter.

**Tabel 1. Ekstrak yang diperoleh dari maserasi**

Pelarut	Berat Ekstrak
Metanol 20 liter	36 gram

##### 2. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Batang Kemiri

Hasil partisi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana*) sebanyak 25 gram dengan menggunakan pelarut n-hexan sebanyak 1 liter.

**Tabel 2. Hasil Partisi ekstrak kulit batang kemiri yang diperoleh**

Pelarut	Berat Partisi
Larut n-hexan	5,37 gram
Tidak larut n-hexan	16,25 gram

##### 3. Pengujian Aktivitas Antibakteri

Ekstrak kental metanol, partisi larut n-hexan dan partisi tidak larut n-hexan kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri. Pengujian dilakukan terhadap bakteri uji diantaranya *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella thypi*, dan *Vibrio colera*.

**Tabel 3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana*) dengan Metode Difusi**

No.	Pelarut	Pengukuran	Mikroba Uji (mm)					
			EC	SA	BS	SM	ST	VC
1.	Metanol	1	7	7	7	6	7	7
		2	7	7	7	6	7	7
		3	7	6	7	7	6	6
		Rata-rata	7	6.6	7	6.3	6.6	6.6
2.	Larut n-hexan	1	8	6	7	6	8	7
		2	7	7	7	6	7	7
		3	7	7	7	7	7	7
		Rata-rata	7.3	6.6	7	6.3	7.3	7
3	Tidak larut n-hexan	1	9	6	6	7	7	7
		2	10	6	6	7	7	7
		3	10	7	7	7	6	7
		Rata-rata	9.6	6.3	6.3	7	6.6	7

Keterangan :

EC = *Escherichia coli*

SM = *Streptococcus mutans*

SA = *Staphylococcus aureus*

ST = *Salmonella typhi*

BS = *Bacillus subtilis*

VC = *Vibrio colera*

#### 4. Hasil Fraksinasi Ekstrak Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana*) Dengan Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Partisi tidak larut n-hexan kulit batang kemiri difraksinasi dengan menggunakan metode kromatografi cair vakum (KCV). Fraksinasi dilakukan dengan fase gerak dari pelarut yang kurang polar ke pelarut yang lebih polar berdasarkan profil KLT yang telah diperoleh yaitu n-hexan:etil asetat (5:1) dimana bercak noda telah terpisah baik berdasarkan pengamatan pada lampu UV dan nilai R<sub>f</sub> yang didapatkan, sehingga dari proses fraksinasi diperoleh 7 fraksi. Fraksi yang diperoleh kemudian digabung berdasarkan profil KLT yang sama

dilihat dari nilai Rf noda yang nampak pada lampu UV 254 nm dan 366 nm yang dielusi dengan eluen n-hexan:etil asetat (5:1) hingga diperoleh 3 fraksi.

**Tabel 4. Nilai Rf Noda Pada Profil KLT Fraksi Tidak Larut N-hexan Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana*)**

Fraksi gabungan	Fraksi	Eluen	Bercak	Penampakan Bercak Noda				Bobot (gram)
				UV 254 nm		UV 366 nm		
				Rf	Warna	Rf	Warna	
I	A	H:E 6:1	1	0.4	Hitam	0.4	Hijau	1.1251
			2	0.7	Hitam	0.7	Biru	
II	B	H:E 5:1	1	0.08	Hitam	0.08	Orange	1.2232
			2	0.13	Hitam	0.13	Putih	
			3	0.25	Hitam	0.25	Orange	
			4	0.3	Hitam	0.3	Biru	
			5	0.4	Hitam	0.4	hijau	
	C	H:E 4:1	1	0.08	Hitam	0.08	Orange	1.4359
			2	0.16	Hitam	0.16	Putih	
			3	0.25	Hitam	0.25	Orange	
			4	0.3	Hitam	0.3	Biru	
			5	0.38	Hitam	0.38	hijau	
	D	H:E 3:1	1	0.08	Hitam	0.08	Orange	1.4498
			2	0.13	Hitam	0.13	Putih	
			3	0.23	Hitam	0.23	Orange	
			4	0.3	Hitam	0.3	Biru	
			5	0.36	Hitam	0.36	hijau	
	E	H:E 2:1	1	0.08	Hitam	0.08	Ungu	2.6341
			2	0.15	Hitam	0.15	Putih	
			3	0.25	Hitam	0.25	Orange	
4			0.31	Hitam	0.31	Biru		
5			0.38	Hitam	0.38	hijau		
F	H:E 1:1	1	0.1	Hitam	0.1	Ungu	2.7182	
		2	0.13	Hitam	0.13	Putih		
		3	0.23	Hitam	0.23	Orange		
		4	0.31	Hitam	0.31	Biru		
		5	0.38	Hitam	0.38	hijau		
III	G	M	1	0.05	Hitam	0.05	Biru	1.5396

Keterangan:

Fase Gerak : n-hexan:etil asetat (5:1)

Fase Diam : Silika Gel F<sub>254</sub>

Ukuran Lempeng : 6,5 cm x 7 cm

Penampakan Bercak : Lampu UV 254 nm

Lampu UV 366 nm

H : n-hexan

E : Etil asetat

M : Metanol

### 5. Pengujian Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi

Fraksi yang diperoleh kemudian diuji aktivitas antibakteri dengan konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm, dan 250 ppm. Dari hasil pengujian diketahui jika fraksi II yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi yang menghambat lima bakteri uji dibandingkan dengan fraksi yang lain yakni pada *Escherichia coli*, *Vibrio colera*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, dan *Streptococcus mutans*.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi**

Fraksi	Konsentrasi	Mikroba uji (mm)					
		EC	VC	BS	ST	SA	SM
Fraksi I	1000 ppm	-	-	-	-	-	-
	750 ppm	-	-	-	-	-	-
	500 ppm	-	-	-	-	-	-
	250 ppm	-	-	-	-	-	-
Fraksi II	1000 ppm	8	8.6	7	8	7.3	6.3
	750 ppm	7.3	7.3	7	7	7	6.3
	500 ppm	7	7.3	-	6.7	-	-
	250 ppm	7	6.3	-	6.3	-	-
Fraksi III	1000 ppm	6.7	7	6.3	7.3	-	6.3
	750 ppm	6.3	6.7	-	6.7	-	6.3
	500 ppm	-	6.3	-	-	-	-
	250 ppm	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

EC = *Escherichia coli*

SM = *Streptococcus mutans*

SA = *Staphylococcus aureus*

ST = *Salmonella typhi*

BS = *Bacillus subtilis*

VC = *Vibrio colera*

## 6. Pengujian KLT Bioautografi dan Identifikasi Golongan Senyawa

Fraksi II kemudian diuji dengan KLT-Bioautografi kontak pada bakteri uji, kemudian diamati zona bening yang terbentuk. Selanjutnya fraksi kemudian diidentifikasi komponen golongan senyawanya menggunakan beberapa pereaksi yaitu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dragendorf, Lieberman-burchard, FeCl<sub>3</sub>, dan AlCl<sub>3</sub>.

**Tabel 6. Hasil Pengujian KLT Bioautografi**

Bakteri	Rf	Golongan senyawa
<i>Escherichia coli</i>	0.2	(+) Flavonoid
<i>Salmonella thypi</i>	0.4	(+) Flavonoid
<i>Vibrio colera</i>	0.4	(+) Flavonoid

### B. Pembahasan

Dari penelitian ilmiah sebelumnya menunjukkan bahwa bagian kulit batang dari kemiri mengandung senyawa antibakteri dan memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian untuk membuktikan kebenaran khasiat kulit batang kemiri sebagai antibakteri

menggunakan metode KLT-Bioautografi yang kemudian diidentifikasi golongan senyawanya.

Pengolahan sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana*) yakni, kulit batang yang telah diambil kemudian dibersihkan lalu di potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk memperbesar luas permukaan sampel sehingga sampel mudah kering. Setelah di potong, sampel kemudian dikeringkan pada lemari pengering. Adapun tujuan dari pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air sampel sehingga menghindari terjadinya proses enzimatik agar pertumbuhan mikroba pada sampel tidak terjadi.

Pada tahap penelitian, digunakan metode maserasi. Maserasi ini merupakan proses penyarian simplisia dengan menggunakan satu jenis pelarut. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Larutan penyari yang digunakan adalah metanol, dimana saat proses ekstraksi dilakukan senyawa yang ditarik memiliki sifat polar. Maserasi dilakukan selama 3 x 24 jam agar komponen kimia pada kulit batang kemiri tertarik semua. Pada proses ini cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel dan masuk kedalam rongga yang mengandung zat aktif, kemudian zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan yang konsentrasinya tinggi akan mendesak untuk keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah (proses difusi). Setelah proses maserasi selesai, kemudian di saring menggunakan kertas saring. Selanjutnya ekstrak yang peroleh kemudian di partisi dengan menggunakan partisi cair padat karena ekstrak yang diperoleh berbentuk padat. Partisi dilakukan agar komponen kimia yang

tertarik dapat terpisah antara yang bersifat polar dan non polar. Pelarut yang digunakan pada proses ini adalah n-hexan karena memiliki sifat non polar dibandingkan dengan metanol.

Setelah proses maserasi, diperoleh ekstrak metanol 36 gram, lalu pada partisi didapatkan partisi larut n-hexan 5,37 gram dan partisi tidak larut n-hexan 16,25 gram.

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak metanol, partisi larut n-hexan, dan partisi tidak larut n-hexan terhadap bakteri uji *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Vibrio cholera*, *Salmonella thypi*, *Streptococcus mutans*, dan *Staphylococcus aureus*. Pengujian dilakukan untuk mengetahui ekstrak yang aktif sebagai antibakteri dengan cara mengamati zona hambat bening disekitar paper disk yang telah ditetesi 20 µl sampel. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui partisi tidak larut n-hexan memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri lebih baik dibanding ekstrak metanol dan partisi larut n-hexan karena zona bening yang terbentuk lebih besar.

Partisi tidak larut n-hexan selanjutnya di fraksinasi dengan menggunakan Kromatografi Cair Vakum (KCV). Proses fraksinasi ini bertujuan untuk memisahkan senyawa dalam partisi tidak larut n-hexan berdasarkan tingkat kepolarannya. Teknik KCV dilakukan pada kondisi vakum secara terus-menerus sehingga diperoleh kerapatan kemasan yang maksimum atau menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju alir fase gerak. Urutan eluen yang digunakan dalam kromatografi cair diawali dari eluen yang mempunyai tingkat

kepolaran rendah kemudian kepolarannya ditingkatkan secara perlahan-lahan (Hosstetmann, 1995).

Dalam proses ini, ekstrak akan terpisahkan oleh pelarut berdasarkan perbedaan kepolarannya. Fraksinasi dilakukan menggunakan eluen yang kepolarannya dari rendah ke tingkat kepolaran yang tinggi yakni dengan menggunakan pelarut n-hexan, etil asetat, dan metanol untuk memisahkan komponen senyawa yang terkandung pada partisi tidak larut n-hexan. Hasil fraksi yang diperoleh sebanyak 7 fraksi yang kemudian dielusi dengan eluen yang diperoleh sebagai profil KLT ekstrak yaitu Hexan:Etil asetat (5:1) kemudian diamati penampakan noda pada kromatogram di lampu UV 254 nm dan 366 nm. Kromatogram yang memiliki nilai  $r_f$  yang sama kemudian digabung hingga diperoleh 3 fraksi yaitu fraksi I, II, dan III.

Fraksi yang telah digabung kemudian di uji aktivitas antibakterinya untuk mengetahui fraksi teraktif dari partisi tidak larut n-hexan kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana*) pada ke 6 bakteri uji dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 1000, 750, 500, dan 250 ppm. Diketahui fraksi teraktif adalah fraksi II yang dimana mampu menghambat semua bakteri uji.

Fraksi teraktif selanjutnya dilanjutkan ke metode KLT-Bioautografi. KLT-Bioautografi dilakukan untuk menemukan suatu senyawa antibakteri yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antibakteri tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini didasarkan pada difusi agar dimana senyawa antibakterinya akan berdifusi dari lapisan lempeng kromatogram ke medium agar yang masing-masing telah diinokulasikan dengan bakteri uji yang digunakan.

Keuntungan dari metode ini adalah waktu pengerjaannya yang relatif singkat serta efisien dalam pengerjaannya. Saat pengerjaan, bagian ujung bawah lempeng kromatogram dibengkokkan hingga garis batas bawah, hal ini dilakukan untuk mempermudah saat menempelkan lempeng pada medium maupun saat mengeluarkan lempeng. Setelah didiamkan selama 30 menit, lempeng kromatogram diangkat dari permukaan medium kemudian medium diinkubasi selama 1×24 jam pada suhu 37°C. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari lempeng kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri uji dan membentuk zona bening pada medium agar. Berdasarkan hasil yang didapatkan fraksi II menghambat 3 bakteri uji yakni *Escherichia coli*, *Salmonella thypi*, dan *Vibrio colera*. Dimana fraksi II hanya menghambat pada bakteri gram negatif saja tetapi tidak pada bakteri gram positif.

**Tabel 7. Beberapa ciri bakteri gram positif dan gram negatif**

Ciri	Perbedaan Relatif	
	Gram Positif	Gram Negatif
Struktur dinding sel	Tebal (15-80 nm) berlapis tunggal (mono)	Tipis (10-15 nm) berlapis tiga (multi)
Komposisi dinding sel	Kandungan lipid rendah (1-4%) Peptidoglikan ada sebagai lapisan tunggal; komponen utama merupakan lebih dari 50% berat kering pada beberapa sel bakteri Asam tekoat	Kandungan lipid tinggi (11-22%) Peptidoglikan ada di dalam lapisan kaku sebelah dalam; jumlahnya sedikit, merupakan sekitar 10% berat kering Tidak ada asam tekoat
Pertumbuhan dihambat oleh zat-zat warna dasar, misalnya ungu kristal	Pertumbuhan dihambat dengan nyata	Pertumbuhan tidak begitu dihambat
Persyaratan nutrisi	Relatif rumit pada banyak spesies	Relatif sederhana
Resistensi terhadap	Lebih resistensi	Kurang resistensi

gangguan fisik		
----------------	--	--

(Pelczar, Michael J. 2010)

Dari tabel ini dapat diketahui mengapa fraksi II hanya dapat menghambat pada bakteri gram negatif saja sedangkan pada bakteri gram positif tidak terjadi penghambatan.

Setelah pengujian KLT-Bioautografi dilakukan identifikasi golongan senyawa dengan menggunakan profil KLT yang telah didapatkan yaitu Hexan:Etil asetat dengan perbandingan 5:1. Identifikasi golongan senyawa dilakukan dengan beberapa pereaksi diantaranya menggunakan pereaksi warna semprot  $H_2SO_4$  10% untuk senyawa organik dengan perlakuan dipanaskan kemudian diamati dengan ditandai adanya warna kuning/coklat/hitam, Aluminium Klorida untuk senyawa flavonoid dengan perlakuan dipanaskan dan diamati UV 366 ditandai warna noda berfluoresensi kuning, Besi (III) Klorida untuk senyawa fenolik dengan perlakuan diamati langsung ditandai hijau-biru kehijauan, dan Dragendorff untuk senyawa alkaloid dengan perlakuan amati langsung ditandai dengan jingga latar kuning. Hasil yang diperoleh yakni fraksi II positif mengandung senyawa flavonoid dengan nilai Rf pada bakteri *Escherichia coli* 0,2 dan untuk bakteri *Salmonella thypi* dan *Vibrio colera* memiliki nilai Rf 0,4. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler, selain berperan dalam inhibisi pada sintesis DNA-RNA dengan interkalasi atau ikatan hidrogen dengan penumpukan basa asam nukleat, flavonoid juga berperan dalam menghambat metabolisme energi. Senyawa ini akan mengganggu metabolisme

energi dengan cara yang mirip dengan menghambat sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul (Prajitno, Arif. 2007).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Fraksi dari partisi tidak larut n-hexan memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*, *Vibrio colera*, *Salmonella thypi*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans* dengan zona hambat paling besar pada konsentrasi 1000 ppm.
2. Komponen kimia dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) yang berperan sebagai antibakteri pada fraksi II adalah senyawa Flavanoid pada nilai Rf 0,2 dan 0,4.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penemuan-penemuan obat tradisional yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengobati suatu penyakit.

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dari tanaman Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) yaitu untuk mengisolasi senyawa antibakteri pada sampel Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek sebagai antibakteri.

## KEPUSTAKAAN

- Al Qur'annul Qarim.
- Ali, A. *Mikrobiologi Dasar Jilid I*. Jurusan Biologi UNM. Makassar. 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Praktek Kedokteran Nabi*. Hikam Pustaka. Yogyakarta. 2009.
- Al-Hanafi, Al-Husaini. Hamzah, Ibnu. *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul Jilid 2*. Kalam Mulia. Jakarta. 2006.
- Anonim. *Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Dasar*. Purwokerto: Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Biologi Universitas Jendral Soedirman, 2008.
- Darwis, D. *Teknik Dasar Laboratorium Dalam Penelitian Senyawa Bahan Alam Hayati*. Padang: Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Kimia Organik Bahan Alam Hayati. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Andalas, 2000.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1979.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1995.
- Dirjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.
- Djide, M., dan Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan UnHas, 2008.
- Djide, M., dkk. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan UnHas, 2008.
- Garrity.G. M., Bell. J.A. and Lilburn. T.G. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2th Edition*, United Stated of America, Springer, New York Hendelberg, 2004.
- Gritter, R.J. Bobbit, J.M. & Schawarting A. E. *Pengantar Kromatografi. Terjemahan dari Introduction to Chromatography*. Bandung: ITB Press. 1991.
- Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia Terjemahan dari De Nuttige Planten Van Indonesia 1950*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 1987.
- Hostettmann, K., Hostettman, M.,and Marston, A. *Cara Kromatografi Preparatif*. Bandung: Penerbit ITB Bandung. 1995.


- Ibrahim, Arsyik. *Aktivitas Antibakteri Tumbuhan Prinjak (Aleurites moluccana L) Terhadap Bakteri Salmonella thyosa & Vibrio cholera*. 2011.
- Jawertz, E. Melnick, dkk. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC, 1996.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : Pt. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Khunaifi, M. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa*. Malang : Skripsi.Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Krisnawati. *Aleurites moluccana (L.) Willd.: ekologi, silvikultur dan produktivitas*. Bogor: Center for International Forestry Research, 2011.
- Martawijaya, A. Kartasujana, I. Mandang, Y.I. Prawira, S.A. dan Kadir, K. *Atlas Kayu Indonesia Jilid II*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. 1989.
- Mukhopadhyay, M. *Natural Ekstracts Using Supercritical Carbon Dioxide*.CRC Press. London. New York: Woshington DC, 2002.
- Mulyati, Endah Sri. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) Terhadap Staphylococcus aureus Dan Escherechia coli Dan Bioautografinya*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Mutiasari, IR. *Identifikasi golongan senyawa kimia fraksi aktif*; Journal. Jakarta: FMIPA-UI, 2012.
- Pelczar, Michael J. and Chan. E.C.S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Potter, P.A, Perry, A.G. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4*. Jakarta: EGC. 2005.
- Prajitno, Arif. *Uji Sensitifitas Flavonid Rumput Laut (Eueucheuma cottoni) Sebagai Bioaktif Alami Terhadap Bakteri Vibrio harvei Skripsi*. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. 2007.
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Ryan, K.J., J.J. Champoux, S. Falkow, J.J. Plonde, W.L. Drew, F.C. Neidhardt, and C.G. Roy. *Medical Microbiology An Introduction to Infectious Diseases 3<sup>rd</sup> ed*. Connecticut: Appleton&Lange. 1994.
- Sastrohamidjojo, H. *Sintesis Bahan Alami*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 1996.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002.


Sunanto, H. *Budidaya Kemiri Komoditas Ekspor*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1994.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.




**Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Kulit Batang Kemiri**


### Lampiran 2. Peremajaan Bakteri Uji



### Lampiran 3. Pembuatan Suspensi Bakteri



#### Lampiran 4. Uji Aktivitas Ekstrak



Keterangan:

EC = *Escherichia coli*


SM = *Streptococcus mutans*


SA = *Staphylococcus aureus*

ST = *Salmonella typhi*


BS = *Bacillus subtilis*

VB = *Vibrio colera*

**Lampiran 5. Skema Kerja Fraksinasi Sampel**

**Lampiran 6. Uji Aktivitas Fraksi Teraktif**

### Lampiran 7. Skema Kerja KLT-Bioautografi



Keterangan:

EC = *Escherichia coli*

SM = *Streptococcus mutans*


SA = *Staphylococcus aureus*

ST = *Salmonella typhi*

BS = *Bacillus subtilis*

VB = *Vibrio colera*

### Lampiran 8. Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Kimia



### Lampiran 9. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran dari Fraksi I, Fraksi II, dan Fraksi III

Dik : 20 mg ( 20 x 1.000 ) = 20.000  $\mu$ g

10 ml (Fraksi I, Fraksi II, dan Fraksi III)

$$\text{ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} = \frac{20.000 \mu\text{g}}{10 \text{ ml}} = 2000 \text{ ppm}$$

Untuk 250 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 250 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{1250 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 0,6 \text{ mL}$

Untuk 500 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 500 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{2500 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 1,25 \text{ mL}$

Untuk 750 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 750 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{3750 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 1,87 \text{ mL}$

Untuk 1000 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 1000 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{5000 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 2,5 \text{ mL}$

**Lampiran 10. Gambar Pohon dan Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd)**



Pohon Kemiri



Kulit Batang Kemiri

**Lampiran 11. Gambar Ekstrak Metanol, Partisi Larut N-hexan, dan Partisi Tidak Larut N-hexan Kulit Batang Kemiri**



Ekstrak Metanol




Partisi Larut N-hexan



Partisi Tidak Larut N-hexan

Lampiran 12. Gambar hasil Uji Skrinning Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol, Partisi Larut Hexan dan Partisi Tidak Larut Hexan dari Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd)



**Lampiran 13. Hasil Identifikasi Profil KLT Partisi Tidak Larut Hexan Kulit****Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd)**


Keterangan:

A : Penampakan Noda Pada UV 366 nm

B : Penampakan Noda Pada UV 254 nm

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 14. Hasil Fraksinasi Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) dengan eluen hexan:etil (5:1) menggunakan Kromatografi Cair Vakum (KCV)**




Keterangan:

A : Penampakan Noda Pada UV 366 Hasil Fraksi Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd)

B : Penampakan Pada Noda UV 254 Hasil Fraksi Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd)


**Lampiran 15. Hasil Uji Zona Hambat Fraksi Teraktif Kulit Batang Kemiri  
(*Aleurites moluccana* L. Willd) Terhadap Bakteri Uji**



*Salmonella typhi*



*Vibrio cholera*



*Escherichia coli*



*Streptococcus mutans*




*Staphylococcus aureus*




*Bacillus subtilis*

**Lampiran 16. Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi Teraktif Kulit Batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) Terhadap Bakteri Uji**



**Lampiran 17. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Antibakteri Kulit Batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd)**



Keterangan:

A : Aluminium Klorida = (+) Flavonoid noda berflouresensi kuning



## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Nurfitri Fadiyah, dilahirkan di Parepare pada tanggal 7 Oktober 1995 anak pertama dari tiga bersaudara, yang merupakan buah kasih dari pasangan H. Muh. Tang Umar, S.E dan Hj. Nursis Azis, A.Md. Pada tahun 2001 mulai mengenyam pendidikan dasar pada SD Negeri 3 Parepare dan berhasil tamat pada tahun 2007.

Kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ummul mukminin Makassar dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama (2010) melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Parepare dan berhasil tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) pada Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R