

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY “R”
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar**

Oleh

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**NURMILA
NIM. 70400114030**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2017/2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmila
NIM : 70400114030
Tempat/Tgl.lahir : Sinjai, 03 September 1996
Jur/Prodi/Program : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Dato panggentungang
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan *Antenatal Care* pada Ny”R”
dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba
Opu Gowa Tahun 2017.

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Desember 2017

Penyusun,

Nurmila
70400114030


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurmila
NIM : 70400114030
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care pada Ny "R" dengan
Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Desember 2017

Pembimbing I



Firdavanti, S.Si, N., M.Keb
NIP: 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



dr. Nadyah, M.Kes
NIP: 19790417 200801 2 018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny "R" dengan *Kekurangan Energi Kronis* di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017", yang disusun oleh **Nurmila** NIM: 70400114030, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jum'at 29 Desember 2017 M, 10 Rabiul Akhir 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 2 Januari 2018 M

14 Rabiul Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Dr.Hj.Sitti Saleha,S.Si.T., S.KM, M.Keb.** (.....)

Pembimbing I : **Firdayanti S. Si.T., M.Keb.** (.....)

Pembimbing II : **dr. Nadyah, M.Kes.** (.....)

Penguji I : **dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Supardin, M.H.I.** (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “R ” dengan Kekurangan Energi kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017”. Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kebijakan- kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M. sc selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha S. Si.T, SKM, M.Keb, selaku Ketua Jurusan Kebidanan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Firdayanti S.Si.T, M.Keb, selaku pembimbing I yang senantiasa dengan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan support untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar bisa berkarya sebatas kemampuan dan menghasilkan yang terbaik.
5. dr. Nadyah, M.Kes, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

6. dr. Andi Sitti Rahmah , M.Kes, selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Dr. Supardin, M. Ag, sebagai penguji II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Aalauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan mendidik penulis semasa pendidikan.
9. Selaku Direktur Puskesmas Somba opu Gowa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
10. Yang tercinta orang tua saya serta saudara-saudaraku dan orang yang memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis.
11. Teman seangkatan tahun 2014 Kebidanan serta Meylinda, Esi, Desi, Hasrah, Nurjayanti dan Asma dien amaliah yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Amin.

Makassar, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Kehamilan	11
B. Tinjauan Tentang <i>Antenatal Care</i>	34

C. Tinjauan Tentang Kekurangan Energi Kronik	37
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	44
BAB III STUDI KASUS.....	50
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney	50
B. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 15 November 2017	74
C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 17 November 2017	79
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 21 November 2017	83
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 24 November 2017	87
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 27 November 2017	91
BAB IV PEMBAHASAN.....	105
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	105
B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	110
C. Langkah III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	113
D. Langkah IV Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi.....	116
E. Langkah V Rencana Asuhan Kebidanan.....	117
F. Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan	120
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan	124
H. Pendokumentasian.....	126
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Tumpeng makanan seimbang.....	23
Gambar 2.2: SOP konseling gizi.....	42
Gambar 2.3: SOP penyuluhan gizi.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Angka kecukupan gizi yang dianjurkan.....	24
Tabel 2 : Daftar kunjungan.....	98
Tabel 3 : Food Recall	102



DAFTAR LAMPIRAN

-
- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada kepala Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel
-
- Lampiran II : Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kepada Bupati Gowa
-
- Lampiran III : Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Gowa kepada Ka. Puskesmas Somba Opu Gowa
-
- Lampiran IV : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Somba Opu Gowa
-
- Lampiran V : Riwayat hidup
-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, DESEMBER 2017

NURMILA, 70400114030

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Nadyah

“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017”

Gizi berasal dari bahasa Arab ghidza, yang berarti makanan. Status gizi merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Gizi ibu hamil merupakan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk pemenuhan gizi ibu sendiri dan perkembangan janin yang di kandunginya.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil yang didapatkan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017. Penatalaksanaan kasus Kekurangan Energi Kronis yang dilakukan dengan penatalaksanaan pemberian konseling dan kunjungan rumah untuk pemantauan pola dan gizi makanan untuk mencegah terjadinya komplikasi baik pada ibu maupun janin, keadaan umum ibu baik, serta tidak terjadi komplikasi pada masa persalinan maupun pasca persalinan.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah Varney dan SOAP yakni dari kunjungan pertama sampai kunjungan keenam terjadi perubahan dan perbaikan pada pola makan ibu menjadi lebih teratur dengan makan 3 kali sehari dan makan makanan pendamping dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “R” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

Daftar Pustaka : 33 (2002-2017)

Kata Kunci : Kehamilan, Kekurangan Energi Kronis, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, DECEMBER 2017

NURMILA, 70400114030

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Nadyah

"Antenatal Midwifery Care Management on Mrs. "R" with Chronic Energy Deficiency at Somba Opu Gowa Public Health Center in 2017"

Nutrition comes from the Arabic *ghidza*, which means food. Nutritional status is a successful measurement in the fulfillment of nutrition for pregnant women. Maternal nutrition is a necessary nutrient in large quantities for the fulfillment of the mother's own nutrients and the development of the fetus in the birth.

This Scientific Paper is aimed at implementing the Antenatal Midwifery Care Management on Mrs. "R" with Chronic Energy Deficiency at Somba Opu Gowa Public Health Center in 2017 using a 7-step midwifery care approach according to Helen Varney and documentation in the form of SOAP.

The results obtained on Antenatal Midwifery Care Management on Mrs. "R" with Chronic Energy Deficiency at Somba Opu Gowa Public Health Center in 2017 are conducted with management of counseling and home visits for monitoring of dietary and nutrition patterns to prevent complications from occurring in both mother and fetus, the mother's general condition of good, and no complications during labor and post-delivery.

The conclusions from a case study with 7-step care management of Varney and SOAP are from the first until the sixth visit, there is change and improvement in the mother's diet become more regular with three meals a day and eat complementary foods, as well as has carried out documentation of all findings and actions that have been implemented on Mrs. "R" with the results of no gap between theory and case found.

References : 33 (2002-2017)

Keywords : Pregnancy, Chronic Energy Deficiency, 7 Step of Varney



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “gizi” berasal dari bahasa Arab *ghidza*, yang berarti makanan. Ilmu gizi bisa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia (Ibrahim, I, A.2012: 1). Status gizi merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Gizi ibu hamil merupakan nutrisi yang banyak diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk pemenuhan gizi ibu sendiri dan perkembangan janin yang di kandungnya (Goni, Anastasia, P, G.,dkk. 2013 Vol.1 No.1).

Menurut *Internasional Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO) kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari *spermatozoa* dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, di mana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27) dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga minggu ke-40) (Prawirohardjo, 2014: 213).

Pada kehamilan terjadi perubahan fisik dan mental yang bersifat alami. Para calon ibu harus sehat dan mempunyai gizi yang cukup sebelum hamil dan selama hamil. Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi yang baik. Banyak ibu

hamil mengalami masalah gizi khususnya gizi kurang seperti KEK/ Kekurangan Energi Kronis dan anemia gizi (Agria, dkk. 2012:103).

Salah satu masalah gizi yang dihadapi di Indonesia adalah masalah gizi dalam kehamilan. Kekurangan Energi Kronis merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi pada ibu hamil. Kekurangan Energi Kronis merupakan keadaan kekurangan asupan energi dan protein pada wanita usia subur (WUS) yang berlangsung secara terus menerus dan mengakibatkan gangguan kesehatan (Pertika, dkk, 2014 Vol.2, No.3).

Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam dunia kesehatan dibidang gizi adalah “Gizi 1000 hari”. Program ini bertujuan untuk penerapan menyadarkan masyarakat akan pentingnya penerapan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Kemenkes, 2016).

Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Situasi gizi masyarakat tidak hanya berperan dalam program penurunan prevalensi balita pendek, namun juga terkait erat dengan tiga program lainnya, mengingat status gizi berkaitan dengan kesehatan fisik maupun kognitif, mempengaruhi tinggi rendahnya risiko terhadap penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular dan berpengaruh sejak awal kehidupan hingga masa usia lanjut (Infodatin, 2016).

Asupan makanan sebagai sumber gizi merupakan hal yang penting dan merupakan penunjang kesehatan bagi seseorang untuk menentukan status gizi baik itu

ibu, bayi dan anak balita serta lanjut usia. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS al-Baqarah / 2. 57

وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىَ ۗ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَئِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya :

“ Dan Kami menanungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepada kamu ‘mann’ dan ‘as-salwa’. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi mereka berulang kali telah menganiaya diri mereka sendiri”

(Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, 2015 : Vol.1 : 244).

Allah swt pada ayat di atas berfirman: *Dan kami turunkan kepada kamu al-mann san as-salwa* sehingga kalian tidak perlu berpayah-payah mencari makan di daerah kering dan tandus itu. *Makanlah sebagian dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kamu* itu. Yang diperintahkan untuk dimakan hanya sebagian, bukan saja karena yang disediakan melimpah, tetapi juga demi menjaga kesehatan mereka (Tafsir Al-misbah, Kemenag. 2015, Vol.1:244).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt menciptakan al-mann dan as-salwa yang mana menurut Wahb ibnu Munabbih al-mann merupakan roti lembut seperti biji jagung atau seperti dedak, sedangkan as-salwa berarti burung sehingga apabila digabungkan sama halnya dengan pengabungan karbohidrat nabati dari al-mann dan protein hewani yang berasal dari as-salwa yang sangat penting untuk kesehatan tubuh maka merugilah bagi orang yang tidak memanfaatkan pemberian-Nya dengan sebaik-baiknya.

Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Wanita hamil beresiko mengalami

KEK jika memiliki LILA <23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). BBLR akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. KEK juga dapat menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu (Infodatin, 2016).

Kematian ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. Kematian ibu langsung yakni perdarahan sebanyak 28%, eklamsia 24% dan penyakit infeksi sebesar 11%, sedangkan penyebab kematian ibu tidak langsung yakni Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia (AKI, n.d).

Data hasil Risekdes 2013 mendapatkan proporsi ibu hamil umur 15-49 tahun dengan LILA <23,5cm atau beresiko KEK di Indonesia sebesar 24,2%. Proporsi terendah di Bali (10,1%) dan tertinggi di Nusa Tenggara Timur (45,5%) dan sedangkan Sulawesi selatan berada di urutan lima tertinggi (31,2%) (Kemenkes, 2016).

Data hasil yang didapatkan dari puskesmas Somba Opu Gowa bahwa pada tahun 2016 di bulan Januari-Desember terdapat 115 ibu hamil yang mengalami KEK dari 665 ibu hamil yang melakukan kunjungan sedangkan pada tahun 2017 dari bulan Januari-Agustus terdapat 125 ibu hamil yang mengalami KEK dari 444 Ibu hamil yang melakukan kunjungan (Data Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017).

Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu, antara lain anemia, perdarahan, berat badan ibu secara tidak langsung berpengaruh pada proses persalinan karena dapat mempersulit persalinan sehingga terjadi persalinan lama, prematuritas, perdarahan setelah persalinan dan bahkan kematian ibu meningkat. Sedangkan terhadap pertumbuhan janin, adanya kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, anemia pada bayi, cacat bawaan, asfiksia

intra partum, bayi dengan berat lahir rendah dan bahkan kematian bayi (Muliarini P, 2012: 82).

Tingginya masalah kurang gizi diberbagai daerah, terutama di kota-kota besar, merupakan salah satu beban masalah gizi di Indonesia. Keenggangan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan antenatal (K1 dan K4) meningkatkan secara signifikan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Badriah. 2011:02)

Berdasarkan data yang diperoleh tentang banyaknya ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK), maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada kasus Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan dapat memperoleh informasi dan pelayanan nyata tentang proses. Asuhan Kebidanan pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Gowa.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanann *Antenatal care* pada Ny “R” dengan kekurangan energi kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/ masalah aktual yang terjadi pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.

- c. Dirumuskannya diagnosa/ masalah pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.
- d. Dilakukannya tindakan segera/ kolaborasi pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.
- e. Ditetapkannya tindakan asuhan kebidanan pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang telah disusun pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.
- g. Diketuahuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Tahun 2017.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Puskesmas

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelola program kesehatan di Puskesmas Somba Opu Gowa dalam mencegah dan penanganan Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang Kekurangan Energi Kronis pada ibu Hamil.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Keputusan

Penulisan mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan Kekurangan Energi Kronis.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan asuhan dan melaksanakan tindakan asuhan, evaluasi hasil asuhan kebidanan serta pendokumentasian asuhan kebidanan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa/Wawancara

Penulisan menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara pemeriksaan:

- 1) Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata. Inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi jaringan atau organ pada tubuh.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada pemeriksaan fisik.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian dengan menggunakan pendengaran yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, bunyi usus serta mengatur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, lingkungannya/kehidupan bertetangga, dan keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat member kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan dokter dan bidan yang menangani langsung klien dan dosen pembimbing baik dilahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II tujuan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kehamilan, tinjauan umum *antenatal care*, tinjauan khusus tentang Kekurangan Energi Kronis, tinjauan kehamilan menurut padang islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di

Puskesmas Somba Opu dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis. Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kehamilan

1. Definisi

Kehamilan merupakan hasil pembuahan sel telur dari perempuan dan sperma dari laki-laki, sel telur akan bisa hidup selama maksimal 48 jam, *spermatozoa* sel yang sangat kecil dengan ekor panjang bergerak memungkinkan untuk dapat menembus sel telur (konsepsi), sel-sel benih ini akan dapat bertahan kemampuan fertilisasinya selama 2-4 hari, proses selanjutnya akan terjadi nidasi. Jika nidasi ini terjadi maka akan disebut kehamilan (Sunarti. 2013 : 31).

2. Diagnostik Kehamilan

a. Tanda-tanda tidak pasti hamil

- 1) *Amenorea* (tidak haid)
- 2) Mual dan muntah
- 3) Ngidam (menginginkan makanan atau minuman tertentu)
- 4) Payudara menjadi tegang dan besar
- 5) Tidak nafsu makan
- 6) Sering kencing
- 7) *Obstipasi* (penurunan kerja tonus otot karena pengaruh hormon steroid)
- 8) Pigmentasi kulit
- 9) *Epulis*
- 10) Varises (Nurul Jannah, 2012: 117)

b. Tanda-tanda kemungkinan hamil

- 1) Uterus membesar
- 2) Tanda *hegar*
- 3) Tanda *chadwick*
- 4) Tanda *piscaseck*
- 5) Tanda *Braxton hicks*
- 6) *Goodell sign*
- 7) Reaksi kehamilan positif (Nurul Jannah, 2012:120)

c. Tanda pasti hamil

- 1) Terasa gerakan janin
- 2) Teraba bagian-bagian janin
- 3) Terdapat denyut jantung janin
- 4) Terlihat kerangka janin pada saat pemeriksaan *rontgen*
- 5) Dengan menggunakan USG terlihat gambaran janin berupa kantong janin, panjang janin dan diameter biparetalis hingga dapat diperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan (Nurul Jannah, 2012 : 122)

3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi pada kehamilan

Perubahan anatomi dan fisiologi pada perempuan hamil biasanya sudah terjadi setelah fertilisasi dan terus berlanjut selama kehamilan. Kebanyakan perubahan itu merupakan respon terhadap janin. Hal yang paling menakjubkan adalah hampir semua yang mengalami perubahan akan kembali seperti semula setelah persalinan dan menyusui selesai.

Perubahan tubuh atau organ-organ sistem reproduksi wanita yang disebabkan oleh kehamilan yaitu

a. Uterus

Selama kehamilan, uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan bertambah besar selama kehamilan dan akan kembali seperti semula sampai beberapa minggu setelah persalinan. Pada perempuan biasa, uterus mempunyai berat 70 gram dan kapasitas 10 ml atau kurang. Selama kehamilan, uterus akan menampung janin, plasenta dan cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 5 liter bahkan mencapai 20 liter yang berat rata-rata 1100 gram.

Pada awal kehamilan, penebalan uterus distimulasi oleh hormon estrogen dan sedikit progesteron. Perubahan ini hampir sama dengan kehamilan ektopik. Tetapi, setelah kehamilan 12 minggu, uterus akan bertambah besar seiring dengan perkembangan janin di dalam uterus. Untuk itu, pembesaran uterus dapat digunakan untuk mengetahui usia kehamilan. Adapun tafsiran kasar besarnya uterus adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak hamil/Normal : sebesar telur ayam (± 30 gram)
- 2) Kehamilan 8 minggu : sebesar telur bebek
- 3) Kehamilan 12 minggu : sebesar telur angsa (± 3 jari di atas simfisis pubis)
- 4) Kehamilan 16 minggu : sebesar tinju orang dewasa/sekepala bayi ($\pm \frac{1}{2}$ pusat-simfisis/ pertengahan simfisis-pusat)
- 5) Kehamilan 20 minggu : \pm pinggir bawah pusat
- 6) Kehamilan 24 minggu : \pm pinggir atas pusat

- 7) Kehamilan 28 minggu : $\pm \frac{1}{2}$ *procesus xyphoideus*
- 8) Kehamilan 32 minggu : pertengahan pusat – *xyphoid*
- 9) Kehamilan 36-42 minggu: 3 sampai 1 jari di bawah *xyphoid* (Icesmi, Mergareth, 2013: 66).

b. Vagina/Vulva

Selama kehamilan, peningkatan vaskularisasi dan *hyperemia* terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva, sehingga pada vagina terlihat warna keunguan yang biasa disebut dengan tanda *Chadwick* (Dewi Setiawati, 2013)

c. Ovarium

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen. Selama kehamilan ovarium tenang. Tidak terjadi pembentukan dan pematangan folikel baru, tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi siklus hormonal menstruasi (Dewi Setiawati, 2013:54)

d. Payudara

Pada saat hamil payudara akan semakin lunak dan membesar. Pada awal kehamilan *aroela* akan berubah menjadi kehitaman dan cenderung menonjol keluar. Pada saat yang sama puting payudara akan semakin membesar dan mengeluarkan kolostrum namun belum dapat memproduksi ASI. Jadi jika payudara semakin membesar maka akan muncul *striae* seperti yang muncul pada perut. Besarnya payudara sebelum hamil tidak ada pengaruhnya dengan produksi ASI setelah melahirkan (Icesmi, Mergareth, 2013: 67).

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kehamilan

a. Faktor fisik

1) Status kesehatan

Ada dua klasifikasi dasar yang berkaitan dengan status kesehatan atau penyakit yang dialami oleh ibu hamil. Penyakit atau komplikasi berhubungan langsung dengan kehamilan seperti *hyperemesis gravidarum* (HEG), pre-eklamsi/eklamsia, serotinus, kelainan plasenta atau selaput janin, perdarahan antepartum dan *gemelli* (Nugroho, dkk. 2014:67).

2) Status gizi

Ibu yang memiliki status gizi yang kurang ditemukan banyak melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu yang memiliki kondisi status gizi yang baik (Suman, Shrivastava. 2016. Vol 3, No.4). Wanita hamil dengan status gizi kurang memiliki kategori risiko tinggi keguguran, kematian bayi dalam kandungan, kematian bayi baru lahir, cacat, dan berat badan lahir rendah. Selain itu umumnya pada ibu dengan status gizi kurang tersebut dapat terjadi 2 komplikasi yang cukup berat selama kehamilan yaitu anemia (kekurangan sel darah merah) dan pre eklampsia/eklampsia (Nugroho, dkk. 2014:68).

Untuk menilai status gizi pada ibu hamil umumnya dilakukan pada awal asuhan prenatal, diikuti tindak lanjut yang berkesinambungan selama masa kehamilan. Pengkajian yang dilakukan untuk menilai status ibu dapat dilakukan melalui wawancara meliputi kebiasaan atau pola makan, asupan makanan yang dikonsumsi, masalah yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi termasuk adanya pantangan terhadap makanan tertentu atau menginginkan makanan tertentu. Pengkajian status gizi ini dapat pula dilakukan melalui pemeriksaan fisik yaitu

penimbangan berat badan untuk mengetahui peningkatan berat badan selama hamil, uji laboratorium seperti menentukan hemoglobin dan hematokrit karena biasanya data laboratorium ini dapat memberikan informasi dasar yang vital untuk mengkaji status gizi ibu pada awal kehamilan dan memantau status gizinya selama kehamilan (Nugroho.,dkk. 2014:69).

a) Kebutuhan energi

Seorang ibu hamil akan bertambah BB samapai 12,5 kg sehingga kira-kira dibutuhkan sekitar 80.000 kalori, tergantung dari berat badan ibu sebelum hamil. Rata-rata ibu hamil memerlukan tambahan 300 kalori/ hari atau sekitar 15% lebih dari keadaan normal atau membutuhkan 2.800 – 3.000 kalori makanan sehari. Pada trimester I asupan gizi diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan plasenta yang berguna untuk menyalurkan makanan, pada janin diperlukan untuk pembentukan organ, pertumbuhan kepala dan badan janin. Pada trimester II asupan gizi diperlukan untuk pertumbuhan kepala, badan dan tulang janin. Pertambahan berat tubuh ibu terjadi pada trimester ini. Pertumbuhan janin, plasenta, dan cairan amnion akan berlangsung cepat selama trimester III (Badriah. 2011:11).

b) Sumber protein

Protein diperlukan ibu hamil untuk pembentukan jaringan-jaringan baru, plasenta, serta mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Kekurangan asupan protein selama kehamilan menyebabkan janin gagal untuk mencapai pertumbuhan optimal sesuai dengan fungsi genetiknya. Terjadinya kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) yaitu < 2500 gram, dan risiko kematian bayi yang terkait dengan kurangnya asupan energi dan protein (Istiany. 2013:53).

c) Sumber lemak

Lemak merupakan sumber energi terbesar dalam tubuh. Berfungsi sebagai cadangan energi tubuh bagi ibu saat melahirkan, pelarut vitamin A,D,E,K dan asam lemak. Asam lemak omega 3 dan 6 juga diperlukan untuk perkembangan sistem saraf, fungsi pengelihatatan dan pertumbuhan otak juga sebagai bantalan bagi organ tertentu seperti mata dan ginjal. Konsumsi lemak dianjurkan tidak melebihi 25 kalori dalam porsi makanan sehari-hari dari total kebutuhan energi. Sumber lemak antara lain daging, susu, telur, mentega dan minyak tumbuhan (Muliawati. 2013 Vol 3, No.3). Asam lemak juga berfungsi membantu proses pembentukan ASI dan lemak disimpan sebagai cadangan tenaga sampai persalinan dan postpartum (Nurul Jannah,2011).

d) Sumber karbohidrat

Karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi utama dalam susunan menu sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada umumnya kandungan karbohidrat ini berkisar 60-70 % dari total konsumsi energi. Kebutuhan energi bagi ibu hamil adalah 300 sampai 500 kalori lebih banyak dari masa sebelum hamil. Energi tambahan ini untuk memenuhi metabolisme basal yang meningkat, aktivitas fisik yang semakin boros energi dan penimbunan lemak untuk cadangan energi. Kebutuhan kurang lebih 1292 kalori atau sama dengan 323 gr karbohidrat setara 5 piring nasi. Kebutuhan energi pada trimester satu meningkat secara minimal.

Energi tambahan pada trimester dua diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Pada trimester tiga energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Karena banayak perbedaaan kabutuhan energi selama hamil. WHO

menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester 1 dan 350 kkal pada trimester II dan III (Muliawati, 2013 Vol 3, No.3).

e) Sumber vitamin

Vitamin dibutuhkan untuk memperlancar proses biologis dalam tubuh. Vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan yaitu vitamin A, vitamin B (B1, B6, B12) vitamin C dan vitamin D. Vitamin A diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan bayi lahir berat rendah. Oleh karena itu, bisa diberikan vitamin A dosis rendah pada ibu hamil (tidak lebih dari 2500 IU per hari) (Muliawati,2013 Vol 3, No.3).

Vitamin B1, B6 dan B12 sebagai penghasil energi, vitamin B6 sebagai pengatur pemakaian protein tubuh dan vitamin B12 membantu kelancaran pembentukan sel-sel darah merah. Vitamin B12 sangat penting bagi tumbuh kembang janin dan fungsi sel-sel sumsum tulang sistem pernapasan dan saluran cerna (Muliawati,2013 Vol.3,No.3).

Vitamin C merupakan antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan dan dibutuhkan untuk membentuk kolagen dan menghantarkan sinyal kimia di otak. Wanita hamil setiap harinya disarankan mengkonsumsi 85 mg vitamin C per hari. Sumber vitamin C dari makanan seperti tomat, jeruk, strawberry, jambu biji, dan brokoli. Makanan yang kaya vitamin C juga membantu penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga dapat mencegah anemia (Muliawati,2013 Vol 3, No.3).

Vitamin D menjaga struktur dan fungsi komponen-komponen sel tubuh ibu dan janin, membantu pembentukan sel darah merah, sebagai anti oksidan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan (Muliawati,2013 Vol 3, No.3).

f) Sumber mineral

Sumber mineral dalam tubuh terdiri dari kalsium, fosfor, dan zat besi. Jumlah kalsium janin sekitar 30 gram, terutama diperlukan pada 20 minggu terakhir kehamilan. Rata – rata setiap hari penggunaan Ca pada ibu hamil 0,08 gram dan sebagian besar untuk perkembangan tulang janin. Bila *intake* kalsium kurang, maka kebutuhan kalsium akan diambil dari gigi dan tulang ibu, sehingga tidak jarang bagi ibu hamil yang kurang asupan kalsium giginya menjadi *caries* ataupun keropos serta diikuti dengan nyeri pada tulang dan persendian. Konsumsi kalsium yang dianjurkan untuk ibu hamil sebanyak 900-1200 mg/ hari (Agria, dkk. 2012:109).

Fosfor berhubungan erat dengan kalsium. Fosfor berfungsi pada pembentukan rangka dan gigi janin serta kenaikan metabolisme kalsium ibu. Jika jumlah di dalam tubuh tidak seimbang sering mengakibatkan kram pada tungkai. Sedangkan Zat Besi (Fe) sangat esensial, berhubungan dengan meningkatnya jumlah eritrosit ibu (kenaikan sirkulasi darah ibu dan kenaikan kadar HB) diperlukan untuk mencegah terjadinya anemia. *Intake* yang tinggi dan berlebihan pada Fe juga tidak baik, karena dapat mengakibatkan konstipasi (sulit BAB) dan mual muntah (Agria, dkk. 2012:109).

b. Faktor psikologis

1) *Stressol internal*

Pemicu *stressol internal* adalah karena faktor dari ibu sendiri. Adanya beban psikologis yang ditanggung oleh ibu dapat menyebabkan gangguan perkembangan bayi yang nantinya akan terlihat ketika bayi lahir. *Stressol internal* meliputi kecemasan, ketegangan, ketakutan, penyakit, cacat, tidak percaya diri, perubahan

penampilan, perubahan peran sebagai orangtua, sikap ibu terhadap kehamilan, takut terhadap kehamilan, persalinan, kehilangan pekerjaan (Nurul Jannah. 2012:141).

2) *Stressol eksternal*

Pemicu *stressol eksternal* berasal dari luar diri ibu seperti status sosial, mal adaptasi, *relationship*, kasih sayang, *support* mental, *broken home*, respon negatif dari lingkungan dan masih banyak kasus yang lainnya (Nurul Jannah. 2012:141)

3) Dukungan keluarga

Setiap tahap kehamilan, ibu akan mengalami banyak perubahan baik fisik maupun psikologis. Ibu harus melakukan adaptasi pada setiap perubahan yang terjadi tersebut, dimana sumber stres terbesar terjadi karena dalam rangka melakukan adaptasi terhadap kondisi tertentu. Dalam menjalani proses tersebut, ibu hamil sangat membutuhkan dukungan yang intensif dari keluarga dengan cara menunjukkan perhatian dan kasih sayang (Nurul Jannah. 2012:141).

4) Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan adalah wanita yang telah bersuami. Setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan harus selalu diwaspadai oleh tenaga kesehatan jangan sampai kekerasan yang terjadi membahayakan ibu dan bayinya. Efek psikologis yang muncul adalah gangguan rasa nyaman pada ibu. Sewaktu –waktu ibu akan mengalami perasaan terancam yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janinnya (Nurul Jannah. 2012:142)

c. Faktor lingkungan, sosial budaya dan ekonomi

1) Kebiasaan , adat istiadat

Ada beberapa kebiasaan adat istiadat yang merugikan kesehatan ibu hamil. Tenaga kesehatan harus dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana, jangan sampai menyinggung “kearifan lokal” yang sudah berlaku di daerah tersebut. Penyampaian mengenai pengaruh adat dapat melalui berbagai teknik, missal melalui media massa, pendekatan tokoh masyarakat dan penyuluhan yang menggunakan media efektif. Jika kita menemukan adanya adat istiadat yang sama sekali tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan, tidak ada salahnya jika memberikan respon yang positif dalam rangka menjalin hubungan yang sinergis dengan masyarakat (Nurul Jannah. 2012: 142).

2) Fasilitas kesehatan

Adanya fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada ibu hamil. Deteksi dini terhadap kemungkinan adanya penyulit akan lebih tepat, sehingga langkah antisipatif akan cepat dipanggil. Fasilitas kesehatan ini sangat menentukan atau berpengaruh terhadap upaya penurunan angka kesehatan ibu dan anak (AKI dan AKB) (Nurul Jannah. 2012:142).

3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan ibu hamil sangat berperan dalam kualitas perawatan bayinya. Penguasaan pengetahuan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang (Nurul Jannah. 2012:143).

4) Ekonomi

Tingkat sosial ekonomi terbukti berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil. Ibu hamil yang lebih tinggi sosial ekonominya maka ibu

akan lebih fokus untuk mempersiapkan fisik dan mentalnya sebagai seorang ibu. Sementara ibu hamil yang lebih rendah ekonominya maka ia akan mendapat banyak kesulitan, terutama masalah pemenuhan kebutuhan primer (Nurul Jannah, 2012:143).

5) Pekerjaan

Pekerjaan seorang ibu akan menggambarkan aktivitas dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang akan didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bekerja mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja. Oleh karena itu, pada ibu yang bekerja akan lebih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga lebih mempunyai banyak peluang juga untuk mendapatkan informasi seputar keadaannya (Nurul Jannah, 2012:143)


5. Kebutuhan ibu hamil

a. Kebutuhan nutrisi

Pada masa kehamilan, ibu hamil harus menyediakan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan anak dan dirinya sendiri. Ini berarti dia perlu makan untuk 2 orang, sesuai dan seimbang. Kehamilan meningkatkan kebutuhan tubuh akan protein. Jika calon ibu tidak memperhatikan makanan yang menyediakan lebih banyak protein, dia mungkin tidak mendapatkan protein yang cukup. Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Kegunaan makan tersebut adalah untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri, dan guna mengadakan cadangan untuk persiapan laktasi.

Calon ibu sebaiknya makan diet yang seimbang, menyediakan perawatan yang mencukupi, memeriksakan kandungan hemoglobin dalam darah dan memperoleh

resep tablet mengandung gram besi. Karena ibu mengandung bayinya yang sama-sama memerlukan makanan yang cukup, ibu hamil harus makan dalam porsi yang cukup namun perlu diwaspadai adanya kenaikan berat badan yang berlebihan (Nurul Jannah, 2012:146).



Sumber : Pedoman Gizi, Kemenkes, 2014

Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan

Kelompok umur	BB* (kg)	TB* (cm)	Energi (kcal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (mL)
					Total	n-6	n-3			
Bayi/Anak										
0-6 bulan	6	61	550	12	34	4,4	0,5	58	0	-
7-11 bulan	9	71	725	18	36	4,4	0,5	82	10	800
1-3 tahun	13	91	1125	26	44	7,0	0,7	155	16	1200
4-6 tahun	19	112	1600	35	62	10,0	0,9	220	22	1500
7-9 tahun	27	130	1850	49	72	10,0	0,9	254	26	1900
Laki-laki										
10-12 tahun	34	142	2100	56	70	12,0	1,2	289	30	1800
13-15 tahun	46	158	2475	72	83	16,0	1,5	340	35	2000
16-18 tahun	56	165	2675	66	89	16,0	1,5	368	37	2200
19-29 tahun	60	168	2725	62	91	17,0	1,6	375	38	2500
30-49 tahun	62	168	2625	65	73	17,0	1,6	394	38	2600
50-64 tahun	62	168	2325	65	65	14,0	1,5	349	33	2600
65-80 tahun	60	168	1900	62	53	14,0	1,5	309	27	1900
80+ tahun	58	168	1525	60	42	14,0	1,5	248	22	1600
Pemempuan										
10-12 tahun	36	145	2000	60	67	10,0	1,0	275	28	1800
13-15 tahun	46	155	2125	69	71	11,0	1,1	292	30	2000
16-18 tahun	50	158	2125	59	71	11,0	1,1	292	30	2100
19-29 tahun	54	159	2250	56	75	12,0	1,1	309	32	2300
30-49 tahun	55	159	2150	57	60	12,0	1,1	313	30	2300
50-64 tahun	55	159	1900	57	51	11,0	1,1	285	28	2300
65-80 tahun	54	159	1550	56	43	11,0	1,1	252	22	1600
80+ tahun	53	159	1425	55	40	11,0	1,1	232	20	1500
Hamil (*hari)										
Trimester 1			+180	+20	+6	+2,0	+0,3	+25	+3	+300
Trimester 2			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Trimester 3			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Menyusui (*hari)										
6 bln pertama			+330	+20	+11	+2,0	+0,2	+45	+5	+800
6 bln kedua			+400	+20	+13	+2,0	+0,2	+55	+6	+650

Sumber : Pedoman Gizi Seimbang, Kemenkes.2014

Adapun pesan gizi seimbang untuk ibu hamil :

1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak

Ibu hamil perlu mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) karena digunakan untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin yang dalam kandungan serta cadangan selama masa menyusui. Zat gizi mikro yang penting dan diperlukan selama hamil adalah zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zink. Kebutuhan protein selama kehamilan meningkat. Peningkatan kebutuhan ini diperlukan untuk perkembangan janin dan untuk mempertahankan kesehatan ibu yang dapat didapatkan dari sumber protein hewani.

Kebutuhan zat besi selama hamil meningkat karena digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru. Selain itu zat besi merupakan unsur penting dalam hemoglobin pada sel darah merah. Kekurangan hemoglobin dapat menyebabkan anemia yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Kebutuhan asam folat selama kehamilan juga meningkat karena digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah.

Kebutuhan kalsium meningkat selama kehamilan karena digunakan untuk mengganti cadangan kalsium ibu yang digunakan untuk pembentukan janin. Zat iodium memegang peranan yang sangat besar bagi ibu dan janin. Kekurangan iodium akan menghambat perkembangan otak dan sistem saraf terutama menurunkan IQ dan meningkatkan risiko kematian bayi. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan fisik anak yang dilahirkan.

2. Batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi

Pembatasan konsumsi garam dapat mencegah terjadinya hipertensi selama kehamilan. Selama ibu hamil diusahakan agar tidak menderita hipertensi. Hal ini disebabkan karena hipertensi beresiko menyebabkan kematian janin. Terlepasnya plasenta dan gangguan pertumbuhan.

3. Minumlah air putih yang lebih banyak

Air merupakan sumber cairan yang paling baik dan berfungsi untuk membantu pencernaan, membuang racun, sebagai penyusun sel dan darah, mengatur keseimbangan asam dan basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Kebutuhan air selama kehamilan meningkat agar mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion dan meningkatkan volume darah ibu.

4. Batasi minum kopi

Kafein bila dikonsumsi ibu hamil akan mempunyai efek *diuretic* dan stimulan. Oleh karenanya bila ibu hamil minum kopi sebagai sumber utama kafein yang tidak terkontrol, akan mengalami peningkatan pada buang air kecil (BAK) yang dapat menyebabkan dehidrasi, tekanan darah meningkat dan detak jantung meningkat. Disamping kopi mengandung kafein juga terdapat inhibitor (zat yang mengganggu penyerapan zat besi). Konsumsi kafein pada ibu hamil juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin (Pedoman Gizi Seimbang, 2014).

b. Kebutuhan oksigen

Perubahan pernapasan mayor dalam kehamilan diakibatkan oleh tiga faktor yaitu efek mekanik dari pembesaran rahim, peningkatan keseluruhan konsumsi oksigen tubuh, dan efek perangsangan pernapasan dari progesteron. Sementara kehamilan berkembang, pembesaran rahim menaikkan posisi istirahat diafragma, ini

mengakibatkan tekanan intratoraks yang tidak begitu negatif dan penurunan volume paru istirahat yaitu suatu penurunan kapasitas sisa fungsional. Konsumsi keseluruhan oksigen tubuh meningkat sekitar 15-20% dalam kehamilan. Sekitar setengah dari peningkatan ini disebabkan oleh rahim dan isinya. Sisanya disebabkan terutama oleh peningkatan kerja ginjal dan jantung ibu, penambahan yang lebih kecil adalah akibat kerja otot pernapasan dan payudara.

Hampir 75% wanita hamil mengalami peningkatan kesulitan pernapasan. Pada awal kehamilan $\frac{1}{4}$ wanita hamil terserang, pada minggu ke-20 kira-kira separuh wanita mengalami kesulitan pernapasan, dan pada minggu ke-30 jumlah itu meningkat menjadi 75%. Kesulitan ini mungkin mengganggu, namun tidak disebabkan penyakit dan tidak membahayakan ibu atau bayi. Untuk menyeimbangkan kebutuhan oksigen ibu hamil, perlunya suasana lingkungan yang selalu mendukung ibu dapat bernapas dengan lega, lingkungan atau tempat yang pengap, sesak, dan tempat keramaian sangatlah perlu dihindari karena suplai oksigen ibu tidak efektif lagi (Nurul Jannah, 2012:149).

c. Kebutuhan personal *hygiene*

Perawatan kebersihan selama kehamilan sebenarnya tidak berbeda dari saat yang lain. Akan tetapi, saat kehamilan ibu hamil sangat rentan mengalami infeksi akibat penularan bakteri ataupun jamur. Tubuh ibu hamil sangatlah perlu dijaga kebersihannya secara keseluruhan mulai dari ujung kaki sampai rambut termasuk halnya pakaian ibu hamil senantiasa jaga kebersihannya. Mengganti pakaian dalam sesering mungkin sangatlah dianjurkan karena selama kehamilan keputihan pada vagina meningkat dan jumlah bertambah disebabkan kelenjar leher rahim bertambah jumlahnya. Sekitar 30% calon ibu menyadari keputihan yang meningkat ini. Di

mana keputihan ini disebabkan oleh jamur *candida albican* yang dapat menyebabkan gata-gatal atau disebabkan infeksi oleh parasit kecil seukuran ujung jarum yang disebut *trichomonas vaginalis* (Nurul Jannah, 2012:150).

d. Kebutuhan istirahat

Adanya aktivitas yang dilakukan setiap hari otomatis ibu hamil akan sering merasa lelah daripada sebelum waktu hamil. Ini salah satunya disebabkan oleh faktor beban dari berat janin yang semakin terasa oleh sang ibu. Oleh karena itu pengaturan aktivitas yang tidak terlalu berlebih sangatlah perlu diterapkan pada ibu hamil. Banyak wanita menjadi lebih mudah letih dan tertidur lebih lama dalam separuh masa kehamilannya. Rasa letih meningkat ketika mendekati akhir kehamilan. Setiap wanita hamil menemukan cara yang berbeda mengatasi kelelahannya. Salah satunya adalah dengan cara beristirahat atau tidur sebentar di siang hari.

Untuk memperoleh relaksasi sempurna, ada beberapa syarat yang harus dilakukan selama berada dalam posisi relaksasi yaitu tekuk semua persendian dan pejamkan mata, lemaskan seluruh otot-otot tubuh, termasuk otot-otot wajah, lakukan pernapasan secara teratur dan berirama, pusatkan pikiran pada irama pernapasan atau hal-hal yang menyenangkan, apabila saat itu menyilaukan atau gaduh, tutuplah mata dengan sapu tangan dan tutuplah telinga dengan bantal, pilih posisi relaksasi yang paling menyenangkan (Nurul Jannah, 2012:151).

e. Kebutuhan seks

Jika kehamilan calon ibu normal serta tidak mempunyai kecenderungan melahirkan *premature* dan aborsi ulang maka senggama dapat dilanjutkan dengan frekuensi yang normal untuk pasangan tersebut. Beberapa wanita lebih

menginginkan senggama yang sering selama hamil, sementara yang lain justru ingin mengurangi. Alasan berkurangnya minat seksual yang dialami banyak wanita hamil khususnya dalam minggu-minggu terakhir kehamilan, tidak jelas. Beberapa wanita merasa takut senggama akan merusak bayi atau menyebabkan kelahiran *premature* (Nurul Jannah, 2012:151).

f. Persiapan persalinan

Persiapan persalinan adalah rencana tindakan yang dibuat oleh ibu, anggota keluarga, dan bidan. Rencana ini tidak harus dalam bentuk tertulis dan biasanya memang tidak tertulis. Rencana ini lebih hanya sekedar diskusi untuk memastikan bahwa ibu menerima asuhan yang ia perlukan. Dengan adanya rencana persalinan akan mengurangi kebingungan dan kekacauan pada saat persalinan dan meningkatkan kemungkinan ibu akan menerima asuhan yang sesuai dan tepat waktu (Nurul Jannah, 2012:153)

6. Penilaian status gizi ibu hamil

Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian antropometri (KMS) ibu hamil terdiri dari:

a. Tinggi badan

Pada ibu hamil pengukuran status gizi dengan tinggi badan tidak dapat dilakukan kerana biasanya tinggi badan pada wanita hamil sudah tidak dapat lagi bertambah. Tinggi badan pada wanita hamil dapat digunakan untuk mengukur status gizi sebelum terjadi kehamilan. Tinggi badan ibu hamil minimal 145 cm yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat status gizi ibu hamil yang baik. Pengukuran tinggi badan dapat menggunakan pita ukur (Muliawati. 2013 Vol 3 (3)).

b. Berat Badan

Metode pemantauan status gizi yang umum dipakai ialah mencatat pertambahan berat badan secara teratur selama kehamilan dan membandingkannya dengan berat badan saat sebelum hamil, bila informasi tersebut tersedia. Status gizi ibu hamil yang baik selama proses kehamilan harus mengalami kenaikan berat badan sebanyak 10-12 kg yaitu pada trimester pertama kenaikannya kurang dari 1 kg, sedangkan pada trimester kedua kurang lebih 3kg dan trimester ketiga kurang lebih mencapai 6 kg.

Rekomendasi tentang pertambahan berat badan total selama kehamilan ditentukan oleh BMI prekehamilan. Pertambahan berat badan mingguan yang dianjurkan pada trimester 2 dan 3 adalah 0,75 kg/minggu (Muliawati. 2013 Vol 3,No.3).

Proporsi kenaikan berat badan selama hamil sebagai berikut,

- 1) Kenaikan berat badan pada trimester I lebih kurang 1 kg. Kenaikan berat badan ini hampir seluruhnya merupakan kenaikan berat badan ibu
- 2) Kenaikan berat badan pada trimester II adalah 3 kg atau 0,3 kg/ minggu. Sebesar 60% kenaikan berat badan ini kerana pertumbuhan jaringan pada ibu.
- 3) Kenaikan berat badan pada trimester III adalah 6 kg atau 0,3 – 0,5 kg/ minggu. Sekitar 60% kenaikan berat badan ini dikarenakan pertumbuhan janin. Timbunan lemak pada ibu lebih kurang 3 kg

c. Lingkar Lengan Atas

Pengukuran lingkar lengan atas adalah suatu cara untuk mengetahui risiko KEK wanita usia subur. Wanita usia subur adalah wanita dengan usia 15 sampai dengan 45 tahun yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur (PUS). Ambang batas Lingkar Lengan Atas (LILA) pada WUS dengan risiko

Kekurangan Energi Kronis adalah 23,5 cm yang diukur menggunakan pita ukur (*metlin*). Apabila Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm artinya wanita tersebut mempunyai risiko Kekurangan Energi Kronis dan sebaliknya apabila Lingkar Lengan Atas (LILA) lebih dari 23,5 cm berarti wanita tersebut tidak beresiko dan dianjurkan untuk mempertahankan keadaan tersebut (Muliawati. 2013 Vol 3,No.3).

d. Kadar hemoglobin (HB)

Penyebab anemia tersering adalah defisiensi zat-zat nutrisi meliputi asupan nutrisi yang tidak cukup, absorpsi yang tidak kuat, bertambahnya zat gizi yang hilang, kebutuhan yang berlebihan. Sekitar 75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi yang memperlihatkan gambaran *eritrosit mikrositik hipokrom* pada asupan darah tepi.

Berapa banyak berat badan yang ibu hamil peroleh selama hamil bukanlah jumlah yang baku. Idealnya berat badan yang diperoleh tergantung pada sejumlah variabel antara lain: bobot dan tinggi badan saat hamil, ukuran bayi dan plasenta, kualitas makanan sebelum dan selama hamil (Nurul Jannah. 2012:136).

7. Kehamilan dalam Pandangan Islam

Manusia diciptakan Allah berasal dari sel mani dari laki-laki dan sel ovum di dalam rahim wanita yang kemudian bergantung pada dinding rahim dan kemudian berkembang menjadi segumpal darah hingga menjadi janin. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Hajj / 22: 5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَتُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْتَبَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِج

Terjemahnya :

“...Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya....”(Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, 2015. Vol.8 : 153).

Pada ayat ini Allah s.w.t menerangkan proses kejadian manusia di dalam rahim ibunya dan kehidupan manusia setelah ia lahir sampai mati.

Allah telah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam a.s, adalah dari tanah. Kemudian dari Adam diciptakan istrinya Hawa, dari kedua jenis ini berkembang biak manusia dalam proses yang banyak. Dan dapat pula berarti bahwa manusia diciptakan Allah berasal dari sel mani, yaitu perkawinan sperma laki-laki dengan ovum di dalam rahim wanita. Kedua sel itu berasal dari darah, darah berasal dari makanan yang dimakan manusia. Makanan manusia ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan ada yang berasal dari binatang ternak atau hewan-hewan yang lain. Semuanya itu berasal dari tanah sekalipun telah melalui beberapa proses. Karena itu tidaklah salah jika dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu berasal dari “*nuthfah*”. Yang dimaksud dengan “*nuthfah*” ialah setetes mani. Setetes mani laki-laki itu mengandung beribu-ribu sperma yang tidak dapat dilihat dengan mata, tanpa menggunakan alat pembesar. Salah satu dari sperma ini bertemu dengan ovum dalam rahim wanita dengan perantaraan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua

jenis manusia itu. Pertemuan sperma dan ovum ini merupakan perkawinan yang sebenarnya dan pada waktu itulah terjadi proses pertama dari kejadian manusia yang serupa terjadi pula pada binatang.

Sperma dan ovum yang telah menjadi satu itu bergantung pada dinding rahim si ibu dan setelah beberapa lama berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Kemudian ada yang menjadi segumpal daging yang sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan pada permulaan kejadiannya, dan ada pula yang menjadi segumpal daging yang tidak sempurna, terdapat cacat dan kekurangan. Berdasarkan kejadian sempurna dan tidak sempurna inilah menimbulkan perbedaan bentuk kejadian bentuk manusia, perbedaan tinggi dan pendeknya manusia dan sebagainya.

Proses kejadian “*nuthfah*” menjadi “*’alaqah*” adalah empat puluh hari, dari “*’alaqah*” menjadi “*mudghah*” (segumpal daging) juga empat puluh hari. Kemudian setelah lewat empat puluh hari sesudah ini, Allah s.w.t meniupkan ruh, menetapkan rezeki, amal, bahagia dan sengsara, menetapkan ajal dan sebagainya, sebagaimana tersebut dalam hadits: “*Sesungguhnya awal kejadian seseorang kamu (yaitu sperma dan ovum) berkumpul dalam perut ibunya selama 40 malam, kemudian menjadi segumpal darah selama itu (pula) lalu menjadi segumpal daging selama itu (pula) kemudian Allah mengutus malaikat, setelah Allah meniupkan ruh ke dalamnya. maka malaikat itu diperintahkan-Nya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menuliskan rezekinya, ajalnya. amalnya, bahagia atau sengsara. (H.R. Bukhari dan Muslim).*”

Kemudian jika telah sampai waktunya, maka lahirlah bayi yang masih kecil itu dari dalam rahim ibunya. Masa kandungan yang sempurna ialah sembilan bulan,

tetapi jika Allah menghendaki masa kandungan itu dapat berkurang menjadi enam bulan atau lebih dan ada pula yang lebih dari sembilan bulan. Pada permulaan masa lahir itu manusia dalam keadaan lemah, baik jasmani maupun rohaninya, lalu Allah menganugerahkan kekuatan kepadanya sedikit demi sedikit, bertambah lama bertambah besar, hingga sampai masa kanak-kanak, kemudian sampai masa dewasa. Pada masa manusia sempurna jasmani dan rohaninya, badannya sedang kuat, pikirannya sedang berkembang, kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya sedang ada pula. Kemudian manusia menjadi tua, bertambah lama bertambah lemah, seakan-akan kembali lagi kepada masa kanak-kanak dan menjadi pikun, akhirnya iapun meninggalkan dunia yang fana ini; ada di antara manusia yang meninggal sebelum mencapai umur dewasa, ada pula yang meninggal di waktu dewasa dan ada yang diberi Allah umur yang lanjut, sampai tua bangka. Proses perkembangan manusia sejak lahir, menjadi dewasa dan menjadi tua ini dilukiskan dalam firman Allah swt (Tafsir Al-misbah, Kemenag. 2015).

B. Tinjauan Umum *Antenatal care*

1. Pengertian *Antenatal care*

Antenatal care merupakan usaha preventif program pelayanan kesehatan obstetrik untuk mengoptimalkan kelainan yang terjadi pada maternal dan neonatal melalui serangkaian pemeriksaan yang dapat dilakukan selama kehamilan (Prawirohardjo, 2014: 278)

2. Tujuan Pelayanan *Antenatal care*

Adapun tujuan pelayanan *Antenatal care* adalah sebagai berikut:

- a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi

- b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi
- c. Mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi selama hamil termasuk riwayat penyakit sebelum hamil dan setelah hamil dan atau pernah melakukan pembedahan.
- d. Mempersiapkan persalinan setelah kehamilan cukup bulan, melahirkan dengan selamat dan normal, serta melindungi ibu maupun bayi terkena trauma pada persalinan.
- e. Mempersiapkan agar masa nifas berjalan dengan normal dan memberikan ASI eksklusif.
- f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga terhadap penerimaan bayi agar dapat tumbuh dengan normal (Ratna Dewi Pudiastuti, 2012: 01).

3. Kunjungan Pelayanan *Antenatal care*

Kunjungan pelayanan *antenatal care* pada ibu hamil yang normal biasanya disingkat dengan huruf K pada buku pink yang di berikan pada saat pertama kali melakukan kunjungan. Bila kehamilan termasuk resiko tinggi maka jadwal kunjungan akan semakin diperketat. Biasanya jadwal kunjungan pada ibu hamil minimal 4 kali kunjungan. Pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah K1, K2, K3, K4. Hal ini berarti, minimal melakukan kunjungan sekali pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu (trimester 1), sekali kunjungan antenatal pada usia kehamilan 28-36 minggu (trimester II), dan minimal 2 kali kunjungan pada usia kehamilan 36 minggu (trimester III)

Selama melakukan kunjungan antenatal ibu akan mendapatkan serangkaian pemeriksaan yang terkait dengan upaya untuk memastikan ada tidaknya kehamilan

dan pengamatan berbagai kemungkinan ada tidaknya penyulit atau gangguan kesehatan selama kehamilan yang mungkin dapat mengganggu kualitas dan luaran kehamilan. Identifikasi kehamilan diperoleh melalui pengenalan perubahan anatomi dan fisiologis kehamilan. Jika kehamilan terdapat kelainan maka akan dilakukan uji hormonal kehamilan dengan menggunakan berbagai metode pemeriksaan yang tersedia (Sarwono Prawirohardjo, 2014: 279).

4. Standar Pelayanan *Antenatal care*

Standar pelayanan *antenatal care* TT yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penimbangan berat badan
- b. Melakukan pengukuran tekanan darah
- c. Melakukan pengukuran tinggi fundus uteri
- d. Pemberian imunisasi TT (*Tetanus toxoid*)
- e. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan
- f. Tes terhadap penyakit menular seksual
- g. Temu wicara untuk rencana tindakan rujukan (Nurul Jannah, 2012: 06).

5. Kebijakan Pelayanan *Antenatal care*

Kebijakan pelayanan *Antenatal care* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan *Antenatal care* pada trimester I (0-13 minggu) minimal 1 kali kunjungan
- b. Melakukan kunjungan *antenatal care* pada trimester II (14-27 minggu) minimal 1 kali kunjungan
- c. Melakukan kunjungan *antenatal care* pada trimester III (28-40 minggu) minimal 2 kali kunjungan

C. Tinjauan Umum Kekurangan Energi Kronis

1. Definisi

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Cara untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil dengan pengukuran LILA. Namun pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Ibu hamil dengan KEK pada batas 23,5 cm mempunyai resiko 2,0087 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai LILA lebih dari 23,5 cm (Yuliasuti E,2014.Vol.1,No.2)

2. Faktor penyebab Kekurangan Energi Kronis

a. Faktor pendapatan keluarga

Masyarakat makin lama makin tumbuh dan kompleks. Sedikit sekali diantara kita yang menanam makan kita sendiri. Banyak makanan yang harus dibeli dari pasar. Perilaku konsumsi makanan merupakan refleksi dari interaksi antara faktor ekonomi dengan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi keluarga berhubungan dengan tingkat pendapatan dan melahirkan daya beli seseorang atau sekelompok orang apabila tingkat pendapatan tersebut seimbang dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi bebannya (Muliawati,2013 Vol 3, No.3).

b. Faktor pendidikan ibu

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap terhadap makanan dan praktek-praktek pengetahuan tentang nutrisi melandasi pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi

makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan ibu meningkat maka pengetahuan nutrisi dan praktik nutrisi bertambah baik. Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai nutrisi makin meningkat. Ibu rumah tangga yang mempunyai pengetahuan nutrisi akan memilih makanan yang bergizi daripada yang kurang bergizi (Muliawati, 2013 Vol 3, No.3).

c. Faktor umur ibu

Umur ibu merupakan salah satu faktor penting dalam proses kehamilan hingga persalinan, karena kehamilan pada ibu yang berumur muda menyebabkan terjadinya kompetisi makanan antara janin dengan ibu yang masih dalam masa pertumbuhan (Mahirawati, V, K. 2014 Vol 17, No.2).

d. Faktor paritas

Paritas adalah berapa kali seorang ibu telah melahirkan. Dalam hal ini ibu dikatakan terlalu banyak melahirkan adalah lebih dari 3 kali. Manfaat riwayat obstetrik ialah membantu menentukan besaran kebutuhan akan zat gizi karena terlalu sering hamil dapat menguras cadangan zat gizi tubuh ibu. Untuk paritas yang paling baik adalah 2 kali jarak melahirkan yang terlalu dekat akan menyebabkan kulaitas janin/anak yang rendah dan juga akan merugikan kesehatan ibu, ibu tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya sendiri karena ibu memerlukan energi yang cukup untuk memulihkan keadaan setelah melahirkan anaknya. Dengan mengandung kembali maka akan menimbulkan masalah gizi bagi ibu dan janin/bayi berikut yang dikandung (Muliawati, 2013 Vol 3, No.3).

e. Faktor pola perilaku konsumsi makanan

Selama kehamilan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh baik pada ibu dan janin dalam kandungan meningkat. Oleh karena itu pada

masa kehamilan asupan gizi yang diperlukan juga meningkat, untuk pertumbuhan dan perkembangan janin juga penambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu dan janin. Ibu hamil yang mengalami kekurangan asupan gizi dan bersatus gizi buruk maka mempunyai peluang besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (Mahirawati,V, K. 2014 Vol 17, No.2).

f. Faktor Riwayat Penyakit Infeksi Sebelum Hamil

Riwayat penyakit sebelum hamil dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit seperti cacingan yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan. Kaitan penyakit dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik, yaitu sebab akibat. Penyakit dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah penyakit untuk timbul yang umumnya terkait dengan masalah gizi antara lain diare, tipes, lambung dan DM (Muliawati. 2013 Vol 3, No.3).

3. Tanda dan gejala kekurangan energi kronik

Adapun tanda dan gejala kekurangan energi kronik yaitu:

- a. Lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm
- b. Badan kurus
- c. Konjungtiva pucat
- d. Tensi kurang dari 100 mmHg
- e. Hb kurang dari normal (<11 gr%)
- f. Nafsu makan kurang

- g. Mual
- h. Badan lemas
- i. Mata berkunang-kunang.

4. Patofisiologi Kekurangan Energi Kronik

Patofisiologi penyakit gizi kurang terjadi melalui lima tahapan yaitu: pertama, ketidakcukupan zat gizi. Apabila ketidakcukupan zat gizi ini berlangsung lama maka persediaan / cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi ketidakcukupan itu. Kedua, apabila ini berlangsung lama, maka akan terjadi kemerosotan jaringan, yang ditandai dengan penurunan berat badan. Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Keempat, terjadi perubahan fungsi yang ditandai dengan tanda khas. Kelima, terjadi perubahan anatomi yang dapat dilihat dari munculnya tanda klasik

Proses terjadinya KEK merupakan akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia yang didukung oleh kekurangan asupan zat-zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan (Putri, 2017:9)

5. Pencegahan pada Ibu Hamil dengan Kekuranga Energi Kronis

Peningkatan variasi dan jumlah makanan juga dapat menjadi salah satu upaya pencegahan KEK. Kandungan zat gizi pada setiap jenis makanan berdeda-beda dan tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung zat gizi secara lengkap, maka untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar zat gizi diperlukan konsumsi makan yang beragam. Selain itu, karena kebutuhan energi dan zat gizi lainnya pada ibu hamil meningkat makan jumlah konsumsi makanan mereka harus ditambah.

Mengurangi beban kerja pada ibu hamil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang berat pada wanita hamil akan memberikan dampak yang kurang baik pada *outcome* kehamilannya.(Nurmadinisia R,2012:27)


Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dan terlaksananya program 1000 hari pertama kehidupan (Lakip Kemenkes, 2015) dan juga dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan gizi kepada ibu hamil (Azhara,dkk, 2015.Vol 17,No.1).

6. Penanganan Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil

Untuk mengatasi kekurangan gizi (KEK) yang terjadi pada ibu hamil, Pemerintah memberikan bantuan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Bentuk makanan berupa biskuit yang diberikan 1 bulan sekali dan dilakukan observasi sampai ibu hamil dengan KEK tersebut mengalami pemulihan. PMT adalah makanan bergizi yang diperuntukkan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi. Pemulihan hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama (Yuliasuti E,2014.Vol.1,No.2).


Faktor pendukung keberhasilan yakni distribusi tablet tambah darah, konseling gizi bagi ibu hamil, kampanye gizi seimbang, promosi keluarga sadar gizi, kegiatan kelas ibu hamil, dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan antenatal di puskesmas (Lakip kemenkes 2015).

SOP Konseling Gizi



Gambar 2.2

SOP Penyuluhan Gizi



Gambar 2.3

7. Dampak Kekurangan Energi Kronis

a. Pada ibu hamil

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan perkembangan janin. Tambahan makanan untuk ibu hamil dapat diberikan dengan cara meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas makanan ibu hamil sehari-hari, bisa juga dengan memberikan tambahan formula khusus untuk ibu

hamil. Apabila makanan selama hamil tidak tercukupi maka dapat mengakibatkan kekurangan gizi sehingga ibu hamil mengalami gangguan. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu hamil, antara lain anemia yang dapat berujung pada pendarahan pasca persalinan, berat badan tidak bertambah secara normal dan terkena infeksi. Pada saat persalinan gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (*premature*), serta operasi persalinan (Muliawati. 2013 Vol 3, No.3).

b. Pada janin

Untuk pertumbuhan janin yang baik diperlukan zat-zat makanan yang adekuat, dimana peranan plasenta besar artinya dalam transfer zat-zat makanan tersebut. Suplai zat-zat makanan kejanin yang sedang tumbuh tergantung pada jumlah darah ibu yang mengalir melalui plasenta dan zat-zat makanan yang diangkutnya. Gangguan suplai makanan dari ibu mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan terjadinya keguguran (*abortus*), bayi lahir mati (*kematian neonatal*), cacat bawaan, lahir dengan berat badan lahir rendah (*BBLR*) atau *PJT* (*pertumbuhan janin terhambat*) (Muliawati. 2013 Vol 3, No.3).

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Dengan adanya proses manajemen asuhan kebidanan ini

maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan Dalam manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien.

Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut Varnay.

Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah Varney adalah sebagai berikut:

a. Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Adapun pengumpulan data dasar yang lengkap untuk menilai yang menyangkut keadaan klien, data ini termasuk riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium serta laporan keterangan tambahan lain hubungan dengan kondisi klien yang didapat melalui wawancara pada klien ataupun keluarga.

Dari anamnesa didapatkan klien bahwa klien mengeluh mengalami mual, nafsu makan berkurang dan ibu juga merasa cepat lelah dan kadang-kadang ibu juga mengalami pusing.

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan adalah dari hasil pengukuran LILA <23,5 cm dan pada pemeriksaan tes darah laboratorium di temukan hasil HB kurang dari normal (<11 gr%) dan tekanan darah yang rendah dibawah 100 mmHg dan pada pemeriksaa fisik wajah dan conjungtiva pucat timbul salah satu atau lebih tanda dan gejala Kekurang Energi Kronis

b. Langkah II (Merumuskan diagnosa aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data yang dikumpulkan. Diagnosa adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan sebagai dasar atau arahan untuk mengambil tindakan.

Setelah melakukan pemeriksaan maka akan didapatkan kesimpulan bahwa masalah Kekurangan Energi Kronis ditetapkan berdasarkan interpretasi data yang dikumpulkan saat melakukan pemeriksaan bahwa hasil pengukuran LILA kurang dari 23,5 cm dan ditemukan wajah dan konjungtiva pucat saat dilakukan pemeriksaan fisik.

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Mengidentifikasi adanya diagnosis atau masalah potensial yang mungkin terjadi berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Masalah yang bisa timbul dari Kekurangan Energi Kronis adalah dapat menimbulkan terjadinya keguguran (abortus), dan akan melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR). Berat bayi lahir rendah mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak serta dapat mengalami komplikasi lain. Sedangkan pada ibu sendiri seperti anemia, berat badan tidak bertambah secara normal dan terkena infeksi. Pada saat persalinan gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (*premature*), perdarahan setelah persalinan, serta operasi persalinan.

- d. Langkah IV (Identifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera).

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau ada hal yang perlu dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi ibu. Pada kasus Kekuranga Energi Kronis tidak diperlukan adanya tindakan segera dan atau kolaborasi, jika dalam keadaan tertentu terjadi komplikasi lain maka perlu dilakukan tindakan segera tergantung keadaan yang dialami.

- e. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh)

Merencanakan asuhan menyeluruh yang rasional sesuai dengan temuan pada langkah sebelumnya. Adapun penatalaksanaan Kekurangan Energi Kronis adalah memberi penyuluhan ataupun konseling kepada ibu hamil dengan menjelaskan kepada ibu kandungan zat gizi pada setiap jenis makanan berdeda-beda, maka untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar zat gizi diperlukan konsumsi makan yang beragam dengan porsi yang benar untuk setiap harinya. Selain itu, karena kebutuhan energi dan zat gizi lainnya pada ibu hamil meningkat maka jumlah konsumsi makanan mereka harus ditambah dan mengurangi beban kerja pada ibu hamil. Selain itu pemberian tablet tambah darah (TTD), suplemen vitamin juga sangat penting dalam kasus ini, pendidikan gizi pada ibu hamil dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan antenatal di puskesmas.

- f. Langkah VI. Melaksanakan perencanaan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini biasa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lain

g. Langkah VII. Evaluasi

Mengevaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan hingga terjadi perubahan perilaku dari pola konsumsi selama hamil, mengulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tetapi belum efektif.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

1. Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnese dengan klien.

2. Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

3. *Assesment* (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

4. *Planning* (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan di mana *planning* ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien

SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis pada tahap berikutnya, dan atau kunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan bayi, kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.



BAB III
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”R” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA
TANGGAL 13 S/D 27 NOV 2017

No. register : 487xxxx
Tanggal Masuk : 13 November 2017 pukul 09.10 wita
Tanggal Pengkajian : 13 November 2017 pukul 09.15 wita
Nama Pengkaji : Nurmila

LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny”R” / Tn”A”
Umur : 24 tahun / 27 tahun
Nikah/ lamanya : 1x/ ± 1 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : D3 / SMK
Pekerjaan : IRT / Pelaut
Alamat : Jalan Dato Panggentungang

B. Riwayat Keluhan

1. Keluhan utama: Ibu datang ke Poli KIA Puskesmas Somba Opu Gowa untuk memeriksakan kehamilan karena mengalami keluhan kadang merasakan pusing serta nafsu makan yang berkurang.
2. Riwayat keluhan utama
Ibu mengatakan telah mengalami pusing sejak minggu lalu dan nafsu makan yang berkurang sejak \pm 8 bulan yang lalu.

C. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang pertama dan tidak pernah mengalami keguguran
2. HPHT tanggal 29 Maret 2017
3. Ibu mengatakan usia kehamilan \pm 8 bulan
4. Pergerakan janin mulai dirasakan sejak bulan juli 2017
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada kuadran kanan perut bawah ibu.
6. Ibu melakukan kunjungan ANC sebanyak 4 kali dan telah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali.
 - a. Kunjungan I tanggal 01 Agustus 2017 dengan keluhan ibu tidak ada, berat badan 40 kg dan tekanan darah 100/70 mmHg
 - b. Kunjungan II tanggal 11 September 2017 dengan keluhan kadang pusing dan kadang sakit kepala, berat badan 41 kg, tekanan darah 90/60 mmHg dan telah mendapat imunisasi TT I
 - c. Kunjungan III tanggal 14 oktober 2017 dengan keluhan sering pusing, sering mengalami sakit kepala dan pembengkakan pada kaki dengan

tekanan darah 100/70 mmHg dengan berat badan 42 kg dan telah mendapat imunisasi TT II.

d. Kunjungan IV tanggal 13 November 2017 dengan keluhan pusing dan bengkak pada kaki dengan tekanan darah 90/60 mmHg dan berat badan 44 kg.

7. Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet penambah darah, Fe (1x1), Vit.B com (3x1), Kalk (1x1).

D. Riwayat Menstruasi

Haid pertama ibu saat usia 14 tahun, siklus haid biasanya 28-30 hari, haid biasanya dialami 5-6 hari dan tidak pernah mengalami *disminorhea* pada saat haid.

E. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu pernah tidak pernah menjadi akseptor KB jenis apapun.

F. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya dan tekanan darah sebelum hamil dalam batas normal, tidak ada riwayat penyakit asma, DM serta jantung dan ibu juga tidak memiliki riwayat alergi terhadap makanan, minuman maupun obat-obatan.

G. Riwayat kesehatan keluarga

Tidak ada riwayat keturunan memiliki anak kembar dan tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarga.

H. Riwayat sosial budaya

Ini merupakan pernikahan yang pertama, keluarga sangat mendukung kehamilan ibu yang sekarang dan sangat diharapkan terutama suami. Pengambilan keputusan

dalam keluarga adalah suami. Ibu merasa cemas dengan keadaannya dan keadaan bayinya ketika melakukan pemeriksaan kehamilan.

I. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Nutrisi

Sebelum hamil ibu memiliki pola makan yang teratur atau cukup seperti makan 3 kali sehari dengan jenis makanan seperti nasi, sayur dan lauk bahkan sering diganti dengan mengkonsumsi makanan siap saji dengan frekuensi minum 6-8 gelas per hari dan tidak ada masalah, sedangkan selama hamil frekuensi makan ibu sebanyak 1-2 kali sehari dengan nasi, sayur dan lauk bahkan sesekali makan makanan siap saji seperti bakso, pangsit dan mie instan dengan frekuensi minum 6- 8 gelas perhari dengan nafsu makan yang kurang.

2. Eliminasi

Sebelum hamil ibu BAK 2-3 kali sehari dengan warna bening, bau amoniak dan BAB 1-2 kali sehari konsistensi padat dengan warna kuning tua, sedangkan selama hamil ibu BAK 2-3 kali dengan warna bening dan BAB 2-3 kali sehari konsistensi padat dengan warna kuning tua tidak ada masalah

3. Kebutuhan istirahat/tidur

Sebelum hamil tidur siang tidak teratur, tidur malam 6- 8 jam, sedangkan selama hamil tidur siang tidak teratur, tidur malam berkurang 5 – 6 jam

4. Aktivitas

Sebelum hamil ibu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, meyapu, mengepel, memasak dll. Sedangkan selama hamil melakukan

pekerjaan rumah rumah tangga seperti mencuci, meyapu, mengepel, memasak dll, tidak ada masalah.

5. Personal *hygiene*

Sebelum hamil ibu mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi, sikat gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu dengan *shampoo*, ganti pakaian 2 kali sehari sedangkan selama hamil mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi, sikat gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu dengan *shampoo* dan ganti pakaian 3 kali sehari.

J. Pemeriksaan fisik umum

1. Keadaan umum ibu baik

2. Kesadaran komposmentis

3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 90/60 mmHg

Nadi : 82 x/menit

Pernafasan : 20 x/menit

Suhu : 36,8°C

4. TB : 147 cm

5. LiLA : 20 cm

6. BB sebelum hamil 39 kg, BB sekarang 44 kg.

7. Pemeriksaan fisik *head to toe*

a. Wajah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*

Palpasi : tidak ada *oedema*

b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih

c. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries gigi.

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada areola mammae, puting susu menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : terdapat linea nigra, striae livide dan tidak terdapat luka bekas operasi

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x LP

: 24 x 78

: 1872 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur.

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak *oedema*

h. Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

i. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kiri positif, kanan positif

K. Pemeriksaan Laboratorium

1. Hb : 10,1 gr%
2. Albumin : Negatif
3. Reduksi : Negatif

LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

G1P0A0, gestasi 32-34 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis.

1. G1P0A0

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan hamil anak pertama dan tidak pernah keguguran dan ibu merasakan adanya pergerakan janin.

b. Data objektif

- 1) Terdapat linea nigra dan striae livide
- 2) Leopold I: 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 3) DJJ: terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/ menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data:

Pada saat pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae livide yang menandakan kehamilan pertama, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014: 179).

2. Umur Kehamilan 32-34 minggu

a. Data Subjektif

- 1) Ibu mengatakan HPHT tanggal 29 Maret 2017
- 2) Ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang \pm 8 bulan

b. Data Objektif

- 1) Tanggal pengkajian 13 November 2017
- 2) Pembesaran perut tidak sesuai masa kehamilan
- 3) TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 4) Tafsiran persalinan 05 Januari 2018

Analisa dan Interpretasi Data

Dari HPHT tanggal 29 Maret 2017 sampai tanggal pengkajian tanggal 13 November 2017 maka usia kehamilan ibu sekarang 32 minggu 5 hari atau gestasi 32-34 minggu (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Situs Memanjang

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat di kuadran kanan bawah perut ibu.

b. Data Objektif

- 1) Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 2) Leopold II : Puki
- 3) Leopold III : Kepala
- 4) Leopold IV : BAP
- 5) DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145× / menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong di fundus dan kepala pada bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah dan gerakan janin yang dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohardjo, 2014 : 205-206).

4. Intrauteri

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat terutama di sebelah kanan bawah perut ibu dan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

b. Data Objektif

- 1) Pembesaran perut tidak sesuai masa kehamilan
- 2) Pada saat dilakukan palpasi leopold ibu tidak merasakan nyeri

Analisa dan Interpretasi Data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intrauterin (Baety, 2012 : 9).

5. Tunggal

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan di sebelah kanan bawah perut ibu.

b. Data Objektif

- 1) Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 2) Leopold II : Puki
- 3) Leopold III : Kepala
- 4) Pada saat auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145 x /menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11).

6. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin aktif dan kuat pada usia kehamilan ± 5 bulan sampai sekarang dan merasakan pergerakan janin 11 x dalam sehari.

b. Data Objektif

Pada auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 x per menit dan pembesaran uterus menandakan janin tumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

7. Keadaan Janin Baik

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat terutama pada perut sebelah kiri

b. Data Objektif

Auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dan bunyi jantung janin teratur dengan frekuensi 145x/menit yang menandakan bahwa janin dalam kondisi baik.

8. Kekurangan energi kronis

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh kadang mengalami pusing dan nafsu makan yang berkurang.

b. Data Objektif

- 1) Tekanan darah 90/60 mmHg
- 2) Hb :10,1 gr%
- 3) LiLA : 20 cm

Analisa dan Interpretasi Data

Dari hasil pengukuran LiLA 20 cm, maka ibu mengalami kondisi Kekurangan energi kronis (KEK). Hal ini sesuai dengan teori (Yuliasuti, 2014) KEK adalah keadaan kekurangan gizi yang berlangsung lama atau menahun. Ditandai dengan pengukuran LiLA ibu hamil yang dibawah batas normal (Yuliasuti, 2014. Vol.1, No.2).

LANGKAH III: MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial kekurangan energi kronis pada masa kehamilan akan mengakibatkan terjadinya komplikasi pada ibu antara lain anemia, berat badan tidak bertambah, serta infeksi sedangkan pada janin akan dapat terjadi kelahiran prematur, resiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), pertumbuhan janin terhambat (PJT), cacat bawaan, *stunting* dan bahkan kematian janin atau KJDR (Muliawati, 2013. Vol 3. No 3).

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh kadang merasa pusing dan nafsu makan yang kurang

b. Data Objektif

1) Tekanan darah 90/60 mmHg

2) Hb : 10,1 gr%

3) LiLA : 20 cm

4) Pemeriksaan Abdomen

Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x LP

: 24 x 78

: 1872 gram

Analisa dan Interpretasi Data

Kadar Hemoglobin yang kurang atau dibawah batas normal pada bu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis hal ini di sebabkan oleh pola konsumsi yang tidak seimbang selama kehamilan hal ini beresiko mengalami gangguan gizi atau dapat terjadinya KEK yang dapat berujung pada terjadinya anemia, anemia ini yang dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan pada ibu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminin, Fidyah. dkk pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kekurangan Energi kronis terhadap kejadian anemia pada ibu hamil (Aminin, Fidyah. dkk. 2013. Vol V. No 2).

LiLA adalah antropometri yang dapat menggambarkan keadaan status gizi ibu hamil dan untuk mengetahui resiko (KEK) atau gizi kurang. Dengan LiLA yang kurang beresiko untuk melahirkan berat badan bayi lahir rendah, karena nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil sebagai ukurannya adalah Lingk

Lengan Atas sehingga ibu hamil yang memiliki LiLA yang kurang beresiko memiliki bayi BBLR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamariyah N, Musyrofah pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Lingkar Lengan Atas (LiLA) ibu hamil dengan kejadian Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) (Kamariyah N, Musyrofah, 2016, Vol.9, No. 1).

Berat lahir ditentukan oleh dua proses yaitu lama kehamilan dan laju pertumbuhan janin. Berat lahir juga menjadi indikator potensial untuk pertumbuhan bayi, respon terhadap rangsangan, lingkungan, dan untuk bayi bertahan hidup. Berat lahir memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan anak, perkembangan anak dan tinggi badan pada saat anak dewasa. Bayi lahir dengan berat lahir rendah akan beresiko tinggi terhadap penyakit infeksi dan *stunting*. Anak yang mengalami *stunting* disebabkan karena pada saat dalam kandungan janin mengalami retradasi pertumbuhan atau pertumbuhan yang terhambat selama dalam kandungan atau IUGR (*Intra Uteri Growth Retardation*). IUGR ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang baik selama kehamilan ibu, asupan yang tidak benar sejak awal kehamilan secara tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya *stunting* pada bayi hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swathma, Dandara, dkk pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa berat badan lahir rendah atau BBLR merupakan faktor resiko kejadian *stunting* pada balita (Swathma, Dandara, dkk. 2016. Vol 1. No 3).

Pada kasus Kekurangan Energi kronis berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Anemia atau kadar hemoglobin yang kurang merupakan

hal yang sangat patut untuk diperhatikan selama kehamilan karena selain beresiko pada ibu anemia juga beresiko pada pertumbuhan janin yang dikandung. Kurangnya kadar hemoglobin dalam darah selama masa kehamilan menyebabkan darah tidak dapat mengirim banyak oksigen ke seluruh jaringan, sehingga dapat menyebabkan proses metabolisme dan pertukaran zat gizi yang penting ikut terganggu salah satunya transfer gizi dari ibu ke janin. Pada kehamilan aterm arus darah uteroplasenta diperkirakan 500 – 750 ml/ menit, apabila kadar Hb menurun maka akan mempengaruhi arus darah uteroplasenta yang dapat menyebabkan terjadinya perkembangan janin terhambat (PJT)

Pada kelainan sirkulasi uteroplasenta akibat dari perkembangan plasenta yang abnormal, pasokan oksigen, masukan nutrisi, dan pengeluaran hasil metabolik menjadi abnormal. Janin menjadi kurang oksigen dan nutrisi pada trimester akhir sehingga timbul pertumbuhan janin terhambat yang asimetrik yaitu lingkaran perut menjadi jauh lebih kecil daripada lingkaran kepala. Pada keadaan yang parah mungkin akan terjadi tingkat seluler berupa kelainan nukleus dan mitokondria yang dapat berujung pada kelainan atau cacat bawaan (Prawirohardjo, 2014 : 697).

LANGKAH IV: PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Pada kasus kekurangan energi kronis tidak membutuhkan tindakan segera hanya saja memerlukan kolaborasi dengan dokter ahli gizi.

LANGKAH V: RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya asuhan atau tindakan kepada ibu agar kehamilan berlangsung normal dan keadaan ibu dan janin baik serta kekurangan energi kronis yang dialami ibu dapat teratasi.

2. Kriteria

- a. Kehamilan aterm dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu
- b. Keadaan ibu baik
- c. Tanda-tanda vital normal
 - 1) Tekanan darah : Sistolik 100-300 mmHg
: Diastolik 60-90 mmHg
 - 2) Nadi : 60-100x/menit
 - 3) Pernafasan : 16-24x/menit
 - 4) Suhu : 36,5-37,5°C
- d. DJJ dalam batas normal antara 120-160x/menit
- e. Tidak ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan
- f. Peningkatan berat badan dalam batas normal 0,45 g/minggu
- g. Hemoglobin dan ukuran LiLA
- h. Keluhan ibu yang dirasakan menghilang atau berkurang.

3. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

- a. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaann yang telah dilakukan

Rasional :

Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan antenatal yang berkualitas.

- b. Melakukan pemeriksaan TTV seperti Tekanan darah, Nadi, Suhu dan Pernapasan

Rasional :

Dilakukan pemeriksaan Tanda-tanda vital untuk memantau adanya perubahan pada sistem tubuh ibu dan untuk mempermudah melakukan tindakan.

- c. Melakukan pengukuran berat badan dan LiLA

Rasional :

Pengukuran berat badan pada ibu hamil bertujuan untuk mengetahui adanya perkembangan dan pertumbuhan pada janin dan pengukuran LiLA pada ibu hamil bertujuan untuk mengetahui tingkat status gizi ibu hamil.

- d. Melakukan pemeriksaan leopard dan DJJ

Rasional :

Pemeriksaan Leopold dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dan pemeriksaan DJJ dilakukan untuk memantau detak jantung janin.

- e. Melakukan pemeriksaan hemoglobin

Rasional :

Dilakukan pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui tingkat kadar hemoglobin dalam darah ibu hamil yang sangat penting dalam masa kehamilan.

- f. Memberikan HE pada Ibu tentang :

- 1) Istirahat yang cukup

Rasional :

Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung.

- 2) Pola makan yang teratur dalam kehamilan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang baik.

Rasional :

Ibu hamil dengan kekurangan energi kronis membutuhkan makanan yang bergizi, mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi, dan sumber makan beragam yang kaya akan vitamin dan mineral.

- 3) Menjaga personal *hygiene* dalam kehamilan

Rasional :

Menjaga personal *hygiene* sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

- g. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya.

Rasional :

Dengan mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janinnya ibu dapat memantau sendiri kondisi janinnya secara objektif sekaligus meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan.

- h. Jelaskan pada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan

Rasional :

Dengan memberitahu ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan, ibu akan mengerti dan melaksanakan anjuran bidan sehingga jika ibu mengalami salah satu dari 9 tanda bahaya pada kehamilan itu, ibu dapat segera ke tenaga kesehatan terdekat sehingga ibu bisa mendapatkan pertolongan pertama dan segala hal yang mengancam keselamatan ibu dan janinnya.

- i. Diskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya.

Rasional :

Dengan adanya diskusi antara ibu dan keluarga baik secara fisik maupun psikis dan finansial akan siap meghadapi persalinan dan kelahiran bayinya tanpa rasa cemas yang berlebihan

- j. Menjelaskan kepada ibu untuk memperhatikan pola makan selama hamil dan memperbaiki konsumsi makanan dengan mengkonsumsi makan yang bergizi dan beragam.

Rasional :

Dengan Kondisi ibu yang Kekurangan Energi Kronis maka sangat penting untuk memperhatikan pola makan agar lebih teratur dan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang beragam dan

lengkap yakni makan yang tinggi karbohidrat, protein, sayuran serta buah-buahan.

- k. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG

Rasional :

Ultrasonografi (USG) merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik, untuk mempelajari struktur jaringan berdasarkan gambaran ultrasonik yang dipantulkan oleh jaringan, yang manfaatnya untuk memantau keadaan janin.

- l. Pemberian obat Fe (1x1) Vit.B com (3x1), dan Kalk (1x1) dan PMT

Rasional :

Pemberian tablet tambah darah atau Fe bertujuan pembentukan sel darah merah dalam tubuh untuk mencegah terjadinya anemia. Vit.B com membantu produksi energi dalam tubuh, sedangkan Kalk bertujuan mendukung pertumbuhan janin serta pemberian makanan tambahan (PMT) berupa biskuit sebagai pendamping makanan.

- m. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur dan datang kembali untuk memeriksakan kehamilannya yaitu tanggal 29 Desember 2017, atau jika ada keluhan dan bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Rasional :

ANC yang teratur dapat mendeteksi adanya komplikasi yang memperburuk keadaan ibu hamil. Di samping itu dengan menganjurkan ibu datang minggu depan ibu dapat mengetahui keadaannya serta

keadaan janinnya sehingga bila ada hal-hal yang membahayakan ibu dan janinnya dapat segera diberi pertolongan.

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 13 November 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan kekurangan energi kronis
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.
3. Memberikan HE pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 7 jam.
 - b. Menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan agar teratur selama kehamilan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup.
 - c. *Hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam tiap kali lembab
4. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janin.
 - a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
 - b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam.
 - c. Ibu harus segera memberitahu bidan/dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

5. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan
 - a. Sakit kepala yang menetap
 - b. Gangguan penglihatan
 - c. *Oedema* pada wajah dan tungkai
 - d. Mual dan muntah yang berlebihan
 - e. Nyeri perut yang hebat
 - f. Penurunan gerakan janin
 - g. Pendarahan pervaginaam
 - h. Demam yang hebat
 - i. Kejang
6. Memberikan konseling gizi kepada ibu untuk memngksumsi makanan yang bergizi dan teratur serta mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan karbohidrat yang cukup seperti nasi dan umbi-umbian, protein hewani seperti daging, ikan dan protein nabati seperti tempe dan tahu, serta sayuran hijau dan buah.
7. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya
Pemilihan tempat persalinan, penolong persalinan, biaya persalinan, kendaraan saat menuju tempat persalinan dan pendamping pada saat persalinan dan pakaian ibu dan bayinya.
8. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG.
9. Memberikan obat tablet FE(1x1), Vitamin B complex (3x1) dan Kalk (1x1) dan PMT

10. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur serta menganjurkan ibu untuk datang memeriksakan kehamilannya tanggal 29 Desember 2017 dan bila ada tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 13 November 2017

1. Keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis belum teratasi dan keadaan janin baik ditandai dengan
 - a. Tekanan darah : 90/60 mmHg
 - b. Hb : 10,1 gr%
 - c. DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur.
2. Ibu telah merasa tenang dengan kehamilan yang dialaminya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. *Health Education* telah diberikan pada ibu
4. Ibu telah mengerti apa itu kekurangan energi kronis yang sedang dialaminya
5. Ibu telah mengerti cara menghitung pergerakan janinnya
6. Ibu telah mengerti tanda-tanda bahaya pada kehamilan
7. Ibu telah mempersiapkan semua peralatan untuk persalinan dan peralatan bayinya.
8. Ibu telah mendapat FE, Vitamin B complex dan Kalk dan PMT berupa biskuit.

9. Ibu mau melakukan kunjungan ANC secara teratur dan akan memeriksakan kehamilannya tanggal 29 Desember 2017.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN *ANTENATAL CARE* PADA
NY”R” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI RUMAH KLIEN TANGGAL 15 NOVEMBER 2017**

No. register : 487xxx

Tanggal Masuk : 15 November 2017 pukul 13.30 wita

Tanggal Pengkajian : 15 November 2017 pukul 13.35 wita

Nama Pengkaji : Nurmila

A. Data Subjektif

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan masih berkurang
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kanan.

B. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP 05 Januari 2018
4. Gestasi 33 minggu
5. Tinggi badan : 147 cm
6. Berat badan sebelum hamil : 39 kg
7. Berat badan sekarang : 44 kg
8. LiLA : 20 cm
9. Tanda-tanda vital
Tekanan darah : 90/60 mmHg

Nadi : 80x/menit
Pernafasan : 20x/menit
Suhu : 36,8°C

10. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*

Palpasi : tidak ada *oedema*

b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih

c. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*, puting susu menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi : terdapat *linea nigra*, *striae lipide* dan tidak terdapat luka bekas operasi

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x Lp

: 24 x 78

: 1872 gram

Auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/menit secara teratur.

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak *oedema*

h. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada *oedema* pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kiri positif, kanan positif.

C. Assessment

Diagnosa Aktual : G1P0A0, gestasi 32-34 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis.

D. *Planning*

Tanggal 15 November 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik

Hasil : Ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang

2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya

Hasil : ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya

3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mengingatkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan

Hasil : ibu mengerti

5. Menganjurkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya

Hasil : ibu mengerti

6. Menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makanan agar lebih teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, makanan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi-umbian, protein seperti daging, ikan dan telur dan vitamin serta mineral dari sayuran hijau dan buah.

Hasil : ibu bersedia memperbaiki pola makan agar lebih teratur dan bersedia mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi

7. Menganjurkan ibu untuk minum tablet FE, Vit.B com dan Kalk setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan dan tetap mengkonsumsi PMT yang diberikan.

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera ke fasilitas kesehatan terdekat.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN *ANTENATAL CARE* PADA
NY”R” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI RUMAH KLIEN TANGGAL 17 NOVEMBER 2017**

Tanggal Kunjungan : 17 November 2017 pukul 15.20 wita

Tanggal Pengkajian : 17 November 2017 pukul 15.20 wita

Nama Pengkaji : Nurmila

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan mulai membaik
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 33 minggu 2 hari
4. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 84x/ menit

Pernapasan : 20x/menit

Suhu : 36, 5°C

5. Berat badan : 44 kg

6. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Palpasi : tidak *oedema*

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah muda dan sklera putih

c. Abdomen

Inspeksi : terdapat line nigra dan striae lipide dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x LP

: 28 x 78

: 1872 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/ menit secara teratur

d. Eksremitas

Inspeksi : tidak ada varises

Palpasi : tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kanan positif, kiri positif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 32-34 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis.

Planning (P)

Tanggal 17 November 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik
Hasil : ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang
2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
Hasil : ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya
Hasil : ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menganjurkan ibu untuk lebih memperbaiki pola makan dan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral.
Hasil : ibu mengerti
5. Mengingatkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan
Hasil: ibu mengerti

6. Mengajarkan ibu untuk tetap mengkonsumsi Tablet Fe, Vitamin B *complex*, Kalk dan PMT yang diberikan
Hasil : ibu mengerti dan melakukannya.
7. Mengajarkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, atau nafsu makan semakin memburuk
Hasil: ibu mengerti dan mau melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN *ANTENATAL CARE* PADA
NY”R” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI RUMAH KLIEN TANGGAL 21 NOVEMBER 2017**

Tanggal Kunjungan : 21 November 2017 pukul 16.20 wita

Tanggal Pengkajian : 21 November 2017 pukul 16.28 wita

Nama Pengkaji : Nurmila

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan semakin membaik
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 33 minggu 6 hari
4. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/ 70 mmHg

Nadi : 84x/ menit

Pernapasan : 20x/menit

Suhu : 36, 6°C

5. Berat badan : 45 kg

6. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Palpasi : tidak *oedema*

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah muda dan sklera putih

c. Abdomen

Inspeksi : terdapat line nigra dan striae livide dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 25 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x LP

: 25 x 78

: 1950 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/ menit secara teratur

d. Eksremitas

Inspeksi : tidak ada varises

Palpasi : tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kanan positif, kiri positif

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 32-34 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis.

Planning (P)

Tanggal 21 November 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik
 Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan menerimianya atas kondisinya sekarang
2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
 Hasil : ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya
 Hasil : ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan agar lebih teratur dan makan makanan yang beragam dan bergizi seimbang
 Hasil : ibu mengerti
5. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi Tablet Fe, Vitamin b *compelx*, Kalk dan PMT yang diberikan


Hasil : ibu mengerti dan melakukannya.

6. Mengingatnkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan

Hasil : ibu mengerti

7. Menganjurkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, nafsu makan menurun dan apabila merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya di atas

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN *ANTENATAL CARE* PADA
NY”R” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI RUMAH KLIEN TANGGAL 24 NOVEMBER 2017**

Tanggal Kunjungan : 24 November 2017 pukul 17.20 wita

Tanggal Pengkajian : 24 November 2017 pukul 17.28 wita

Nama Pengkaji : Nurmila

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan mulai membaik
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 34 minggu 2 hari
4. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/ 70 mmHg

Nadi : 84x/ menit

Pernapasan : 20x/menit

Suhu : 36, 6°C

5. Berat badan : 45 kg

6. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Palpasi : tidak *oedema*

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah muda dan sklera putih

c. Abdomen

Inspeksi : terdapat line nigra dan striae lipide dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jari diatas pusat, 25 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x LP

: 25 x 78

: 1950 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/ menit secara teratur

d. Eksremitas

Inspeksi : tidak ada varises

Palpasi : tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kanan positif, kiri positif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual : G1P0A0, gestasi 34-36 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis.

Planning (P)

Tanggal 24 November 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik
Hasil : ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang
2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
Hasil : ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya
Hasil : ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan agar teratur dengan makan makanan yang kaya akan sumber karbohidrat yang tinggi dan protein serta vitamin dan mineral.
Hasil : ibu mengerti
5. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi Tablet Fe, Vitamin B complex, Kalk dan PMT yang diberikan


Hasil : ibu mengerti dan melakukannya.

6. Mengingatkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan

Hasil : ibu mengerti

7. Mengajukan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, nafsu makan kembali menurun dan apabila merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN *ANTENATAL CARE* PADA
NY”R” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS
DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017**

No. register : 487xxx

Tanggal Masuk : 27 November 2017 pukul 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 27 November 2017 pukul 10.00 wita

Nama Pengkaji : Nurmila

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny”R” / Tn”A”

Umur : 24 tahun / 27 tahun

Nikah/ lamanya : 1x/ ± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : D3 / SMK

Pekerjaan : IRT / Pelaut

Alamat : Jalan Dato Panggentungang

Data Subjektif

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan membaik
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing

3. Ibu mengatakan terdapat pengeluaran darah pervaginam

Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 34 minggu 5 hari

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/80 mmHg

Nadi : 82 x/menit

Pernapasan : 20 x/menit

Suhu : 36,8°C

5. TB : 147 cm

6. LiLA : 20 cm

7. BB sekarang 45 kg

8. Pemeriksaan fisik *head to toe*

a. Wajah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*

Palpasi : tidak ada *oedema*

b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih

c. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis.

e. payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*, puting susu menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : terdapat *linea nigra*, *striae livide* dan tidak terdapat luka bekas operasi

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 25 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 78 cm

TBJ : TFU x LP

: 25 x 78

: 1950 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak *oedema*

h. Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

i. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kiri positif, kanan positif.

9. Pemeriksaan Laboratorium

a. Hb : 10,8 gr%

b. Albumin : negatif

c. Reduksi : negatif

10. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 34-36 minggu, jenis kelamin: perempuan, TBJ: 2056 gram.

Assessment

Diagnosa Aktual: G1P3A0, gestasi 34-36 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronis.

Diagnosa Potensial: Antisipasi terjadinya perdarahan, BBLR , cacat bawaan dan kematian janin.

Planning

Tanggal 27 November 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga bahwa kehamilannya sekarang dengan Kekurangan Energi Kronis.

Hasil : ibu telah mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga

Hasil : ibu merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Memberikan HE pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan malam hari minimal 7 jam
 - b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, karbohidrat serta vitamin dan mineral
 - c. *Hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila lembab

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya
 - a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
 - b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam
 - c. Ibu harus memberitahu bidan/dokter apabila gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari.

5. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan seperti:

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Gangguan penglihatan
- c. *Oedema* pada wajah dan tungkai
- d. Mual dan muntah yang berlebihan
- e. Nyeri perut yang hebat
- f. Penurunan gerakan janin
- g. Pendarahan pervaginaam
- h. Demam yang hebat
- i. Kejang

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Mendiskusikan pada ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya

Hasil : ibu telah mempersiapkan semua perlengkapan persalinan dan perlengkapan bayinya.

8. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan agar teratur dengan makan makanan yang kaya akan sumber karbohidrat yang tinggi dan protein serta vitamin dan mineral

Hasil : ibu mengerti

9. Menganjurkan ibu untuk minum Tablet Fe, Vitamin b *complex* dan Kalk setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan.

10. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera ke fasilitas kesehatan terdekat.



TABEL KUNJUNGAN

Tanggal Kunjungan	BB	Tekanan darah	Usia kehamilan (HPHT)	Usia kehamilan (TFU)	Hb	Pola makan	Intervensi	Rasional
13 /11 /17	44 kg	90/60 mmHg	32 mg 5 hr	2 jrdpst	10,1 gr%	Tdk teratur	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan ibu untuk memperbaiki pola makan dengan makan yang lebih teratur seperti makan 3 x sehari ditambah dengan makan selingan atau makan sedikit tapi sering. • Mengajukan ibu untuk memperhatikan jenis dan kandungan makanan yang dikonsumsi seperti makan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein tinggi, serta vitamin dan mineral. • Meminta ibu untuk mengkonsumsi tablet Fe dan Vit. B com, Kalk yang sesuai dengan jadwal dan PMT berupa biskuit yang diberikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu mengerti dan bersedia memperbaiki pola makan agar lebih teratur • Ibu belum cukup mengerti dengan jenis makanan yang mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi. • Ibu bersedia mengkonsumsi tablet Fe, Vit.B com dan Kalk serta PMT yang diberikan

15 / 11 / 17	44 kg	90/60 mmHg	33 minggu	2 jrdpst	-	Tdk teratur	<ul style="list-style-type: none"> • Menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan lebih teratur. Makan 3-4 kali sehari dengan porsi yang cukup. • Menganjurkan ibu untuk memperhatikan jenis dan kandungan makanan yang dikonsumsi dengan memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi • Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet Fe ,Vitamin B com , Kalk dan PMT yang diberikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu mulai memperbaiki pola makan menjadi lebih teratur. • Ibu cukup mengerti dengan jenis makanan yang mengandung karbohidrat dan protein yang cukup. • Ibu tetap mengonsumsi tablet Fe, Vit. B com, dan Kalk dan PMT yang diberikan.
17 / 11 / 17	44 kg	100/70 mmHg	33 mg 2 hr	2 jrdpst	-	Teratur	<ul style="list-style-type: none"> • Menganjurkan ibu untuk mempertahankan pola makan yang mulai teratur dengan porsi yang cukup. • Menganjurkan ibu untuk tetap memperhatikan jenis dan kandungan makanan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu telah memperbaiki pola makan. • Ibu cukup mengerti dengan beberapa jenis makanan dan kandungan gizinya • Ibu tetap

							<ul style="list-style-type: none"> dikonsumsi Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet Fe, Vit. B com dan Kalk sesuai jadwal dan PMT yang diberikan. 	<ul style="list-style-type: none"> mengonsumsi tablet Fe, Vit. B com, Kalk dan PMT yang diberikan
21 / 11/ 17	45 kg	100/70 mmHg	33 mg 6 hr	2 jrdpst	-	Teratur	<ul style="list-style-type: none"> Menganjurkan ibu untuk tetap mempertahankan pola makan yang teratur dengan porsi yang cukup dan tetap memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet Fe, Vit.B com dan Kalk serta PMT yang diberikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu telah memperbaiki pola makan dan cukup mengerti dengan beberapa jenis makanan dan kandungan gizinya. Ibu tetap mengonsumsi tablet Fe, Vit. B com, Kalk dan PMT yang diberikan
24/11/17	45 kg	100/70 mmHg	34 mg 2 hr	2 jrdpst	-	Teratur	<ul style="list-style-type: none"> Menganjurkan ibu untuk tetap Mempertahankan pola makan dengan porsi cukup dengan mengonsumsi maknan yang bergizi seimbang. 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu telah memperbaiki pola makan dan ibu cukup mengerti dengan beberapa jenis makanan dan kandungan gizinya Ibu rajin

							<ul style="list-style-type: none"> Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet Fe, Vit.B com dan Kalk sesuai jadwal dan PMT yang diberikan 	mengonsumsi tablet Fe, Vit. B com, Kalk dan PMT yang diberikan
27/11/17	45 kg	100/80 mmHg	34 mg 5 hr	2 jrdpst	10,8 gr%	Teratur	<ul style="list-style-type: none"> Menganjurkan ibu untuk tetap mempertahankan pola makan yang teratur dan porsi yang cukup dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet Fe, Vit.b com dan Kalk sesuai jadwal dan PMT yang diberikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu telah memperbaiki pola makan dan mengerti dengan jenis makanan dan kandungan gizinya Ibu rajin mengonsumsi tablet Fe, Vit. B com, Kalk dan PMT yang diberikan

Recall makanan 24 jam

Tanggal : 12 November 2017

Bahan makanan & minuman	Ukuran rumah tangga	Ukuran gram
Pagi : <ul style="list-style-type: none"> • Susu ibu hamil • Madu Siang : <ul style="list-style-type: none"> • Pempek • Pisang goreng • Air putih Malam : -	1 gelas 1 sendok makan 4 potong sedang 1 potong 1 gelas	

Tanggal : 14 November 2017

Bahan makanan & minuman	Ukuran rumah tangga	Ukuran gram
Pagi : <ul style="list-style-type: none"> • Susu ibu hamil • Nasi goreng • Telur Siang : <ul style="list-style-type: none"> • Nasi goreng • Air putih Selingan : <ul style="list-style-type: none"> • Biskuit • Air putih Malam : <ul style="list-style-type: none"> • Mangga 	1 gelas 2 sendok nasi 1 butir 2 sendok nasi 1 gelas 1 potong 1 gelas ½ buah	

Tanggal : 16 November 2017

Bahan makanan & minuman	Ukuran rumah tangga	Ukuran gram
Pagi : <ul style="list-style-type: none"> • Susu ibu hamil • Madu Siang : <ul style="list-style-type: none"> • Nasi goreng 	1 gelas 1 sendok makan 2 sendok nasi 1 gelas	

<ul style="list-style-type: none"> • Air putih <p>Selingan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biskuit <p>Malam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Ikan • Tumis kangkung • Air putih 	<p>1 potong</p> <p>2 sendok nasi 1 ekor sedang 2 sendok makan 1 gelas</p>	
--	---	--

Tanggal : 20 November 2017

Bahan makanan & minuman	Ukuran rumah tangga	Ukuran gram
<p>Pagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Susu ibu hamil • Madu • Nasi goreng <p>Siang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Kripik Tempe • Prekedel Tahu • Pepaya • Air putih <p>Selingan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biskuit • kacang <p>Malam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Ikan balado • Sayur bening -jagung -bayam • Air putih 	<p>1 gelas 1 sendok makan 2 sendok makan</p> <p>2 sendok nasi 1 potong sedang 1 potong kecil 2 potong 1 gelas</p> <p>2 potong 5 biji</p> <p>2 sendok nasi 1 ekor sedang</p> <p>2 sendok makan</p> <p>1 gelas</p>	

M A K A S S A R

Tanggal : 23 November 2017

Bahan makanan & minuman	Ukuran rumah tangga	Ukuran gram
Pagi : <ul style="list-style-type: none"> • Susu ibu hamil • Madu • Nasi goreng • Air putih Siang : <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Oseng tempeh • Tahu • Air putih Selingan : <ul style="list-style-type: none"> • Biskuit • kacang Malam : <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Ikan goreng • Prekedel jagung • Sayur santan <ul style="list-style-type: none"> - labu kuning - kacang panjang • Air putih 	1 gelas 1 sendok makan 2 sendok makan ½ gelas 2 sendok nasi 1 potong sedang 1 potong kecil 1 gelas 2 potong 5 biji 2 sendok nasi 1 ekor sedang 2 sedang potong 2 sendok makan 1 gelas	

Tanggal : 26 November 2017

Bahan makanan & minuman	Ukuran rumah tangga	Ukuran gram
Pagi : <ul style="list-style-type: none"> • Susu ibu hamil • Madu • Nasi goreng Siang : <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Ayam bakar • Air putih Selingan : <ul style="list-style-type: none"> • Biskuit • Kacang • Es buah • Air putih Malam : <ul style="list-style-type: none"> • Nasi putih • Ikan masak • Tempe penyet • Sayur kangkung • Air putih 	1 gelas 1 sendok makan 2 sendok makan 2 sendok nasi 1 potong 1 gelas 1 potong 6 biji 1 gelas 1 gelas 3 sendok nasi 1 ekor sedang 1 potong sedang 3 sendok makan 1 gelas	

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis yang dilakukan di Puskesmas Somba Opu Gowa. Asuhan ini dilakukan selama 2 minggu yang dimulai saat pasien masuk di Puskesmas Somba Opu Gowa dan dilanjut dengan kunjungan rumah sebanyak 4 kali dan terakhir kunjungan di Puskesmas.

Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah Varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I. Identifikasi data dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Betty mangkuji dkk, 2014: 5).

Kegiatan pengumpulan data di mulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dapat di kumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang disebut dengan sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu, 1) observasi, 2) wawancara, 3) pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi napas), penciuman (bau napas, bau luka), perabaan (suhu badan, nadi). Wawancara, di mana pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting diperhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relefan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrumen/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter (Dwi Asri, 2012: 27-28).

Dalam tahapan pengakajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini dapat dilihat dari profesi ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Ny "R" usia 24 tahun, G1P0A0, datang ke Puskesmas Somba Opu Gowa pada tanggal 13 November 2017 dari hasil pemeriksaan TTV ibu di Puskesmas di

dapatkan TD: 140/110 mmHg, N: 86x/menit, S: 36,8°C, P: 22x/menit, ibu datang ke Puskesmas Somba Opu Gowa, dengan keluhan sedikit pusing dan nafsu makan yang kurang, pasien mengatakan selama hamil pergerakan janinnya kuat dan bergerak pada bagian sebelah kanan perut ibu, pasien mengatakan telah melakukan kunjungan *Antenatal care* sebanyak 4x, dan telah mendapatkan suntikan Tetanus Toksoit sebanyak 2x di puskesmas, pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 29 maret 2017, pasien mengatakan usia kehamilannya \pm 8 bulan, pasien mengatakan selama hamil ia tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.

Pasien tidak pernah memiliki riwayat penyakit seperti Hipertensi, Asma, Jantung, Diabetes Mellitus, dan penyakit menular lainnya, pasien juga tidak memiliki riwayat alergi pada makanan, minuman maupun obat-obatan. Pasien mengatakan tidak pernah menggunakan alat jenis apapun, pasien tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah di rawat di Rumah Sakit atau Puskesmas, sebelum hamil frekuensi makan ibu teratur, tetapi ibu sering mengkonsumsi makanan siap saji seperti bakso, pangsit ataupun mie instan, dan selama hamil pola makan ibu kurang baik, di mana pasien tidak makan dengan teratur bahkan hanya makanan 1-2 kali sehari dan masih sering mengkonsumsi makanan siap saji, istirahat pasien kurang baik dikarenakan pasien terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

Pada pemeriksaan fisik di dapatkan hasil, TD: 90/60 mmHg, N: 82x/menit, S: 36,8°C, P: 20x/menit, konjungtiva pucat, tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hiperpigmentasi *areola mammae*, pada pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu: TFU 2 jari di atas pusat, teraba bokong pada fundus dan tidak sesuai usia kehamilan 32 minggu 5 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP),

pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 145x/menit janin intrauterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hemoglobin: 10,1 gr%, Albumin: Negatif, Reduksi: Negatif.

Hasil usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagel, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 32 minggu 5 hari (Prawirohardjo, 2014: 279). Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae livide yang sering ditemukan pada kehamilan pertama, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat dipalpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo 2014: 179)

Pada pemeriksaan Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu berbaring setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentase janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dilakukan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus, atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Ai Nursiah, dkk, 2014: 75-76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas simfisis dan dapat diukur dengan lima jari tangan (per limaann), bagian diatas simfisis adalah proporsi yang belum

masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP) (Widia, 2015: 64).

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11). Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

Kekurangan Energi Kronis adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama dan menahun. Diagnosa Kekurangan Energi Kronis adalah apabila dilakukan pengukuran LiLA dibawah batas normal 23,5 cm (Yuliasuti, 2014, Vol.1, No. 2).

Faktor yang mempengaruhi Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan yaitu kebanyakan dipengaruhi oleh pola konsumsi makan yang kurang baik sebelum hamil diperburuk selama kehamilan dengan sering mengkonsumsi makanan siap saji tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan tersebut.

Pola konsumsi selama hamil sangat mempengaruhi kebutuhan zat gizi selama hamil. Oleh karena itu pada masa kehamilan asupan gizi yang diperlukan juga meningkat, untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil yang mengalami kekurangan asupan gizi atau berstatus gizi buruk sering dikaitkan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronis. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Rahmaniar A, dkk pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pola konsumsi makanan adalah salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronis.

Adapun tanda dan gejala Kekurangan Energi Kronis menurut teori LiLA kurang dari 23,5 cm, konjungtiva pucat, tekanan darah kurang dari 100 mmHg (sistol), nafsu makan berkurang dan pemeriksaan laboratorium, Hb kurang dari normal (<11 gr%).

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan kasus Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan didapatkan data subjektif ibu mengeluh masih merasakan sedikit pusing, dan nafsu makan berkurang serta pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg dan konjungtiva pucat, pada pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 10,1 gr%.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. Langkah II. Identifikasi diagnosa masalah aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Betty mangkuji dkk, 2014: 5).

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan di mana pasien datang pada tanggal 13 November 2017 pukul 09.10 wita, dengan keluhan pusing dan nafsu makan yang kurang baik. Kehamilan ibu adalah kehamilan yang pertama dan tidak

pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang sudah mencapai \pm 8 bulan.

Riwayat kesehatan yang lalu Ny “R” tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan dirawat di Rumah sakit ataupun di Puskesmas. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari di atas pusat 24 cm, tidak sesuai usia kehamilan 32 minggu 5 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang bergerak atas panggul (BAP), terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 145 x/menit, tunggal dan hidup. Pada pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, konjungtiva pucat, LiLA 20 cm dan pemeriksaan laboratorium, didapatkan Hb 10,1 gr%, albumin negatif, reduksi negatif.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan ditandai dengan tekanan darah dibawah 100 mmHg , konjungtiva pucat, LiLA dibawah normal 23,5 cm dan pada pemeriksaan Hb di bawah 11 gr%. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Nurmadanisia, R pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa LiLA di bawah normal merupakan salah satu indikator terjadinya Kekurangan energi Kronis pada ibu hamil (Nurmadanisia, R. 2013. Hal. 22-23). Hal ini juga dibenarkan oleh Aminin. dkk pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Kekurangan Energi Kronis (KEK) dengan kejadian anemia pada ibu hamil (Aminin, Fidyah. dkk. 2014. Vol V. No 2).

Pada pemeriksaan Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu berbaring setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk

menentukan presentase janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dilakukan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus, atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Ai Nursiah, dkk, 2014: 75-76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas simfisis dan dapat diukur dengan lima jari tangan (per lima), bagian diatas simfisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP) (Widia, 2015: 64).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11). Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

Berdasarkan uraian di atas maka diagnosis pada kasus Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan tersebut adalah G1P0A0, gestasi 32-34 minggu, presentase kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), intrauterin, tunggal, hidup, dengan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan. Demikian penerapan tinjauan pustaka pada kasus Ny "R" secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan

diagnosis aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan memberikan tindakan selanjutnya.

C. Langkah III. Antisipasi diagnosa/masalah potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap bila diagnosa/ masalah potensial ini benar-benar terjadi (Frisca Tresnawati, 2012: 3-4).

Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman. Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan yaitu perdarahan, kenaikan berat badan tidak normal, pertumbuhan janin terhambat yang mengakibatkan kelahiran prematur, BBLR, cacat bawaan dan bahkan kematian janin.

Kadar Hemoglobin yang kurang atau di bawah batas normal pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis hal ini di sebabkan oleh pola konsumsi yang tidak seimbang selama kehamilan hal ini beresiko mengalami gangguan gizi atau dapat

terjadinya KEK yang dapat berujung pada terjadinya anemia, anemia ini yang dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan pada ibu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminin, Fidyah. dkk pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kekurangan Energi kronis terhadap kejadian anemia pada ibu hamil (Aminin, Fidyah. dkk. 2013. Vol V. No 2).

LiLA adalah antropometri yang dapat menggambarkan keadaan status gizi ibu hamil dan untuk mengetahui resiko (KEK) atau gizi kurang. Dengan LiLA yang kurang beresiko untuk melahirkan berat badan bayi lahir rendah, karena nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil sebagai ukurannya adalah Lingkar Lengan Atas sehingga ibu hamil yang memiliki LiLA yang kurang beresiko memiliki bayi BBLR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamariyah N, Musyrofah pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Lingkar Lengan Atas (LiLA) ibu hamil dengan kejadian Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) (Kamariyah N, Musyrofah, 2016, Vol.9, No. 1).

Berat lahir ditentukan oleh dua proses yaitu lama kehamilan dan laju pertumbuhan janin. Berat lahir juga menjadi indikator potensial untuk pertumbuhan bayi, respon terhadap rangsangan, lingkungan, dan untuk bayi bertahan hidup. Berat lahir memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan anak, perkembangan anak dan tinggi badan pada saat anak dewasa. Bayi lahir dengan berat lahir rendah akan beresiko tinggi terhadap penyakit infeksi dan *stunting*. Anak yang mengalami *stunting* disebabkan karena pada saat dalam kandungan janin mengalami retradasi pertumbuhan atau pertumbuhan yang terhambat selama dalam kandungan atau IUGR (*Intra Uteri Growth Retardation*). IUGR ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang baik selama kehamilan ibu, asupan yang tidak benar sejak awal kehamilan

secara tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya *stunting* pada bayi hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swathma, Dandara, dkk pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa berat badan lahir rendah atau BBLR merupakan faktor resiko kejadian *stunting* pada balita (Swathma, Dandara, dkk. 2016. Vol 1. No 3).

Menilai berat badan ibu sebelum hamil sangatlah penting untuk kesehatan ibu dan bayinya. Ibu hamil memerlukan makanan yang sehat untuk memenuhi asupannya selama hamil dan untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya. Pola makan yang baik sangat berpengaruh baik terhadap kesehatan ibu hamil yang dapat dilihat dari kenaikan berat badan ibu selama hamil, sedangkan Kekurangan Energi Kronis dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah pola makan yang kurang baik, sehingga ibu hamil dengan KEK sering ditemukan pada ibu hamil yang tidak mengalami penambahan berat badan yang normal dalam kehamilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik, Marianita. Rindu pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pola makan terhadap kenaikan berat badan ibu hamil dengan Kekurangan Energi kronis (Manik, Marianita. Rindu . 2017, Vol.16, No.2)

Pada kasus Kekurangan Energi kronis berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Anemia atau kadar hemoglobin yang kurang merupakan hal yang sangat patut untuk diperhatikan selama kehamilan karena selain beresiko pada ibu anemia juga beresiko pada pertumbuhan janin yang dikandung. Kurangnya kadar hemoglobin dalam darah selama masa kehamilan menyebabkan darah tidak dapat mengirim banyak oksigen ke seluruh jaringan, sehingga dapat menyebabkan proses metabolisme dan pertukaran zat gizi yang penting ikut terganggu salah satunya

transfer gizi dari ibu ke janin. Pada kehamilan aterm arus darah uteroplasenta diperkirakan 500 – 750 ml/ menit, apabila kadar Hb menurun maka akan mempengaruhi arus darah uteroplasenta yang dapat menyebabkan terjadinya perkembangan janin terhambat (PJT)

Pada kelainan sirkulasi uteroplasenta akibat dari perkembangan plasenta yang abnormal, pasokan oksigen, masukan nutrisi, dan pengeluaran hasil metabolik menjadi abnormal. Janin menjadi kurang oksigen dan nutrisi pada trimester akhir sehingga timbul pertumbuhan janin terhambat yang asimetrik yaitu lingkaran perut menjadi jauh lebih kecil daripada lingkaran kepala. Pada keadaan yang parah mungkin akan terjadi tingkat seluler berupa kelainan nukleus dan mitokondria yang dapat berujung pada kelainan atau cacat bawaan (Prawirohardjo, 2014: 697).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis tidak ada kesenjangan antara masalah potensial dengan teori yang ditemukan pada kasus pada kasus Ny “R”.

D. Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Betty Mangkuji, 2014: 6).

Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan yang terjadi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dapat terjadi pada saat pengelolaan ibu hamil, ibu bersalia, nifas dan bayi baru lahir. Kondisi darurat merupakan kondisi yang membutuhkan tindakan dengan segera untuk menangani

diagnosis maupun masalah darurat yang terjadi apabila tidak segera dilakukan tindakan segera, selain di atas bisa juga berupa observasi/pemeriksaan.

Pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosis/masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan darurat /segera yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dalam rumusan ini, termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri atau bersifat rujukan (Rita Yulifah, 2013: 134).

Pada studi kasus Ny “R” tidak ada indikasi yang memerlukan tindakan segera dan cepat dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Akan tetapi pada kasus Ny “R” dilakukan tindakan kolaborasi dengan dokter ahli gizi.

E. Langkah V. Rencana Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi-kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial-ekonomi, *cultural* atau masalah psikologis (Th. Endang, dkk, 2014 :137).

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas pada ibu bersalin yang diakibatkan karena adanya Kekurangan energi Kronis dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2014: 531).

Bila diagnosis asuhan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan ditegakkan, rencana asuhan yang diberikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, melakukan pemantauan tanda-tanda vital untuk mengetahui keadaan tekanan darah pada ibu dan melakukan pengukuran LiLA untuk memantau status gizi ibu, melakukan pemeriksaan pada konjungtiva untuk menilai anemia pada ibu dan melakukan perencanaan pada untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan USG untuk memantau kadar Hb dalam darah dan untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam kandungan ibu dalam keadaan baik, memberikan dukungan psikologis pada ibu, menjaga privasi dan kebersihan ibu, serta menjelaskan pada ibu tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.

Penatalaksanaan pada kasus Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan yaitu dilakukan secara konsisten dan sistemik menggunakan praktik pencegahan dengan memberikan asuhan secara rutin selama 2 minggu sampai pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi ibu membaik, setiap tindakan yang dilakukan dapat berupa asuhan yang terfokus seperti dengan penerapan asuhan sayang ibu yang dilakukan secara rutin selama pemantauan, termasuk menjelaskan kepada ibu dan keluarganya mengenai segala tindakan dan tujuan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan.

Rencana asuhan pada kasus Ny”R” disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi dari kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pada pasien yaitu Ny”R” datang dengan keluhan pusing dan nafsu makan yang

kurang pada tanggal 13 November 2017 pada pukul 10.00 wita. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum ibu baik, TD: 90/60 mmHg, N: 82x/menit, S: 36,8°C, P: 20x/menit, ekspresi wajah ibu tampak cemas, kedua konjungtiva mata anemis dan tidak ikterik, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hiperpigmentasi *areola mammae*.

Pada pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu: TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm teraba bokong pada fundus dan tidak sesuai usia kehamilan 32 minggu 5 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), pada Auskultasi terdengar DJJ dengan frekuensi 145x/menit janin intrauterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hemoglobin: 10,1 gr%, Albumin: Negatif, Reduksi: negatif.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu : sapa ibu dan keluarga untuk meningkatkan rasa percaya sehingga ibu menjadi lebih kooperatif dengan petugas, beritahu hasil pemeriksaan, menganjurkan keluarga untuk memberikan *support* dan semangat kepada ibu, memberikan KIE tentang istirahat yang cukup, menganjurkan ibu memperbaiki pola makan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan menjaga personal *hygiene* dalam kehamilan, Minta persetujuan ibu dan keluarga untuk melakukan *informed consent*, laksanakan tindakan sesuai dengan penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Kekurangan Gizi yang ada di Puskesmas Somba Opu Gowa, dan memberikan terapi obat-obatan seperti Fe (1x1), Vit.B com (3x1) dan Kalk (1x1).

Rencana tindakan pada kasus Ny“R” adalah melakukan pemantauan pola konsumsi makanan ibu yang dilakukan selama 2 minggu yang dimulai pada tanggal

13 November sampai dengan tanggal 27 November 2017. Rencana asuhan yang diberikan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu untuk memastikan pertambahan/penurunan tekanan darah pada ibu, menjelaskan pada ibu penyebab terjadinya Kekurangan Energi Kronis, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dengan makan makanan yang bergizi, serta menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola tidur di mana ibu harus lebih banyak beristirahat dan menganjurkan ibu untuk mengonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sesuai dengan instruksi.

Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan penatalaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Dwi Asri, dkk. 2012: 31).

Pada studi kasus Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasien dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya apabila ada hal yang tidak ia mengerti, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan

penting dalam setiap tindakan yang akan dilakukan seperti dengan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan USG. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga mengerti dengan keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, memberikan pengetahuan kepada ibu tentang pentingnya *Health Education* selama kehamilan seperti pada pola istirahat yang cukup, pola makan yang bergizi seimbang dalam kehamilan terutama dengan menghindari makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, serta mengkonsumsi obat sesuai jadwal yang telah diberikan.

Pemantauan yang dilakukan dilakukan di Puskesmas Somba Opu Gowa pada tanggal 13 November 2017, yaitu ibu merasakan pusing dan nafsu makan yang kurang, keadaan umum ibu baik, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 82 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu 36,8°C dan berat badan 44 kg. Pada pemeriksaan TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong dengan usia kehamilan 32 minggu 5 hari, dengan presentasi kepala, punggung kiri dengan DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur dan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Hb 10,1 gr%, albumin negatif, dan reduksi negatif.

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan tanggal 13 November 2017 yaitu dengan menjelaskan penyebab rasa pusing pada ibu, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dan istirahat serta tidak terlalu banyak pikiran, menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya kehamilan, menganjurkan ibu untuk tetap rutin melakukan kunjungan *Antenatal care* agar kesehatan ibu dan janinnya dapat dipantau dengan baik, memberikan kepada ibu obat penambah darah (1x1) Vit. B com (3x1) dan Kalk (1x1) dan PMT berupa biskuit.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 15 November 2017, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu untuk memastikan tekanan darah ibu bertambah/berkurang dan pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah masih sama dengan kunjungan pada tanggal 13 November 2017 yaitu 90/60 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,8°C , berat badan 44 kg dengan pemeriksaan fisik konjungtiva pucat, dan pusing yang dirasakan mulai berkurang akan tetapi nafsu makan ibu masih berkurang. Setelah dilakukan pemeriksaan menganjurkan ibu untuk tetap mengatur pola makan dan pola istirahatnya agar tekanan darah ibu bisa normal, serta menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan intruksi dan tetap mengkonsumsi biskuit yang diberikan sebagai makanan tambahan.

Pemantauan selanjutnya yaitu memantauan yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 17 November 2017, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu dan pada hasil pemeriksaan di dapatkan hasil tekanan darah sudah naik yaitu 100/70 mmHg, nadi 84x/menit, pernapasan 20x/menit dan suhu 36,5°C , berat badan 44 kg, konjungtiva merah muda. Ibu dalam keadaan baik dan ibu mulai memperbaiki pola konsumsi makan ibu dengan tetap mengkonsumsi makanan tambahan yang diberikan dan tetap mengkonsumsi obat sesuai jadwal yang telah diberikan.

Pemantauan selanjutnya yaitu memantauan yang dilakukan di rumah klien pada tanggal 21 November 2017, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu dan pada hasil pemeriksaan di dapatkan hasil tekanan darah yaitu 100/70 mmHg, nadi 84x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,6°C ,

berat badan 45 kg, konjungtiva merah muda keadaan ibu dalam keadaan baik, ibu sudah tidak mengalami pusing dan nafsu makan ibu semakin membaik. Menganjurkan kembali ibu untuk mengkomsumsi makan yang mengandung karbohidrat dan protein tinggi, serta mengurangi makanan yang banyak mengandung pengawet dan makan dengan lebih teratur.

Pemantauan selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 November 2017 yang dilakukan di rumah ibu. Dalam pemantauan ini didapat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 84x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,6°C , berat badan 45 kg. menganjurkan ibu untuk terus memperbaiki pola makan dengan mengkonsumsi makan yang bergizi seimbang.

Pemantauan selanjutnya dilakukan pada tanggal 27 November 2017 yang dilakukan di Puskesmas Somba Opu Gowa. Dalam pemantauan ini didapat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 82x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,8°C , berat badan 45 kg. Pada pemeriksaan TFU 2 jari di atas pusat, 25 cm, teraba bokong dengan usia kehamilan 34 minggu 5 hari, dengan presentasi kepala, punggung kiri dengan DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur dan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Hb 10,8 gr%, albumin negatif, dan reduksi negatif . Hasil pemeriksaan USG : janin tunggal, hidup, presentasi kepala, gestasi 34-36 minggu, jenis kelamin : perempuan, dengan TBJ : 2056 gram. Menganjurkan ibu untuk terus memperbaiki pola makan dengan mengkonsumsi makan yang bergizi seimbang dan tetap mengkonsumsi makanan tambahan dan obat yang diberikan.

Setelah dilakukan pemantauan selama 2 minggu, meminta ibu untuk tetap mempertahankan pola makan dan pola istirahat yang sekarang, memberikan KIE pada ibu tentang persiapan dan rencana persalinan, menganjurkan pada ibu dan keluarga untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kehamilan sekarang dan persalinan ibu nantinya akan berlangsung dengan normal dan lancar tanpa ada komplikasi yang dapat terjadi.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

G. Langkah VII. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan USG, diagnosa yang ditegakkan pada Ny "R" adalah Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan. Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan asuhan.

Pola konsumsi dan jenis makanan yang bergizi seimbang dan istirahat yang cukup merupakan penanganan sederhana yang dilakukan dalam kasus Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan, dimana pola makan yang tidak teratur dan banyak

mengonsumsi makanan *junk food* atau makanan siap saji yang mengandung banyak pengawet, sehingga dapat membahayakan ibu maupun janinnya. Pemberian terapi obat-obatan yang berupa FE, Vit. B com dan Kalk yang diberikan sesuai dengan intruksi dan pemberian makanan tambahan berupa biskuit juga dapat membantu menaikkan tekanan darah dan berat badan ibu apabila dikonsumsi dengan teratur. Selain pemberian obat dan PMT ibu dan keluarga diberikan dukungan dengan menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap bersabar dan meyakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami adalah kehendak Allah swt.

Tindakan akhir untuk mencegah terjadinya perdarahan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kadar Hb dalam darah ibu meningkat. Serta dilakukan kolaborasi dengan dokter ahli kandungan dalam melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam keadaan baik dan sehat serta tidak ada kelainan. Selama pemantauan berlangsung, ibu telah diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu dan mendapatkan pendampingan oleh keluarga maupun bidan. Keadaan psikososial ibu baik, meskipun masih merasa cemas, akan tetapi ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan tanda-tanda vital yang sudah kembali normal dan meminta ibu untuk tetap berserah diri kepada Allah swt agar kehamilannya tetap dalam keadaan sehat sampai masa persalinannya tiba.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama sampai pemantauan terakhir, semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

H. Pendokumentasian

Pendokumentasian pada kasus Ny”R” ini dimulai pada kontak pertama pada kunjungan antenatal di POLI KIA Puskesmas Somba Opu Gowa pada tanggal 13 November 2017. Telah dilakukan pengumpulan data subjektif dan objektif dan berdasarkan data ditetapkan diagnosis. Berdasarkan diagnosa tersebut, ditentukan diagnosa potensial yang akan timbul. Pada kasus Ny”R” tidak didapatkan adanya daat untuk tindakan emergensi. Pada kasus Ny”R”, implementasi telah dilakukan berdasarkan semua intervensi yang telah ditetapkan. Intervensi dilakukan mulai dari kunjungan pertama dan dilanjutkan 5 kontak berikutnya. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada ibu dan pertumbuhan janin terhambat (PJT), cacat bawaan, BBLR dan kematian janin. Evaluasi dilakukan pada kontak keenam, keluhan yang sering dirasakan telah menghilang, pemeriksaan fisik normal, tekanan darah normal, dan Hb membaik .

Hasil dari kasus yang dialami Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan di atasi dengan membantu ibu untuk memperbaiki pola makan dan jenis makanan yang di konsumsi, pola istirahatnya dan menganjurkan ibu untuk tidak terlalu stress. Rasa pusing tertasi dan dan nafsu makan ibu mulai membaik tanda-tanda vital ibu kembali mambaik, serta ibu tampak sudah tenang.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama 2 hari di Puskesmas Somba Opu Gowa dan 4 hari di Rumah klien pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa melalui bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesa riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan USG dan keterangan tambahan yang menyangkut atau berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa/masalah aktual yang ditegakkan pada Ny“R” dengan Kekurangan energi Kronis di Puskesmas Somba Opu dengan pengumpulan data seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemerikssan USG maka ditetapkan diagnosa kebidanan pada Ny“R” dengan Kekurangan Energi Kronis pada masa kehamilan.
3. Perumusan masalah potensial pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis, berpotensi terjadi perdarahan pada ibu dan pertumbuhan janin terhambat (PJT), Cacat bawaan, BBLR dan kematian janin. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila penanganan lebih cepat.

4. Hasil identifikasi tidak didapatkan data perlunya tindakan segera/kolaborasi pada Ny "R" dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa dengan hasil bahwa kasus ini tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.
5. Hasil rencana tindakan asuhan kebidanan telah disusun pada Ny "R" dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa dengan hasil susunan asuhan berdasarkan diagnosa aktual atau masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Asuhan telah diberikan pada Ny "R" dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas somba Opu Gowa dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan ditandai dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Hasil valuasi tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny"R" dengan Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Somba Opu Gowa dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan nafsu makan, yang semula kurang menjadi membaik, pola makan lebih teratur, tekanan darah normal dan hemoglobin membaik.

B. Saran

1. Bagi ibu
 - a. Diharapkan agar ibu menjaga pola makan setia hari dan jenis makanan yang dikonsumsi.
 - b. Pentingnya ibu mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan jadwal.

2. Bagi bidan

- a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini Kekurangan Energi Kronis.
- b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan ibu kepada keluarga ibu kondisi yang dialami oleh ibu serta diharapkan memberikan dorongan moril pada keluarga.

3. Bagi instutusi pendidikan

- a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.
- b. Perlu adanya persamaan presepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan sebagai alat dalam pendekatan pemecahan masalah pada praktek sehari-hari sehingga meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agria, intan.,dkk. *Gizi reproduksi*. Yog yakarta. Penerbit Fitramaya. Cetakan II. 2012.
- Aminin, Fidyah. dkk. 2014. *Pengaruh Kekurangan Energi Kronis (KEK) dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil*. Jurnal Kesehatan, Vol. V, No. 2, 2014.
- Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI). n.d (http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/MenPAN/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=290&Itemid=111.pdf . Diakses pada tanggal 13 September 2017 jam 18.15 WITA).
- Asri, Dewi dan Cristine Clervo P. *Asuhan Persalinan Normal Plus Contoh Askeb dan Patologi Persalinan*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Azhara, Adinda, Pratyaharani, Muthoatun. Dkk. 2015. *Pengaruh Penyuluhan Tentang Gizi Masa Hamil terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Kekurangan Energi kronis (KEK) di Desa Sumpersari, Moyudan, Sleman*. Vol 17, No.1, 2015.
- Badriah,D,L. *Gizi dalam kesehatan reproduksi*. Bandung. PT Refika Aditama.Edisi pertama. 2011
- Baety, ApriliaNurul. *Kehamilanpersalinan*. Yogyakarta: GrahaIlmu, 2012.
- Goni, Anastasia, P, G. Dkk. 2013. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Status Gizi Selama Kehamilan di Puskesmas Bahu Kota Manado*. Vol.1 No.1. 2013.
- Ibrahim,I,A. *Gizi dalam daur kehidupan manusia*. Makassar: Alauddin University Press.Edisi pertama. 2012
- Infodatin. 2016. Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI. (online) <http://.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-gizi-2016.pdf>. diakses pada tanggal 31 mei 2017 pukul 12.49 wita


- Istiany, Ari., Ruslianti. 2013 *Gizi Terapan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset. Cetakan Pertama. 2013
- Jannah, Nurul. 2012 *Buku Ajar Asuhan Kebidanan: Kehamilan*. Yogyakarta. C.V ANDI OFFSET
- Kamariyah, Nurul. Musyarofah. 2016. *Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil akan Mempengaruhi Peningkatan Berat Badan Bayi Lahir Di BPS Artiningsih Surabaya*. Vol . 9, No. 1, 2016.
- Kementrian Agama RI. Alqur'an dan Terjemahannya Tahun 2015
- Laporan Kinerja. Kementrian Kesehatan tahun 2015
- Manik, Marianita. Rindu. 2017. *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil dengan KEK pada Trimester III*. Vol .16, No. 2, 2017.
- Mangkuji, Betty, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*. Jakarta : ECG : 2014
- Muliarini, Prita. *Pola makan dan gaya hidup sehat selama kehamilan*
- Muliawati, Siti. 2013 *Faktor Penyebab Ibu Hamil Kurang Energi Kronis Di Puskesmas Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2012*. Vol.3 No.3. 2013
- Nugroho, Taufan., dkk. 2014 *Buku Ajar Askeb Kehamilan*. Yogyakarta. Nuha Medika. Cetakan Pertama. 2014
- Nurmadinisia, Rahmi. 2013. *Efektifitas Program Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis di Kota Depok [skripsi]*. Depok. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Nursiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan. Bandung :PT. Refika Adiatama*. 2014

- Pertika, Yanuati., Dkk. 2014. *Tingkat Asupan Energi dan Ketersediaan Pangan Berhubungan dengan Risiko Kekurangn Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil. Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia. Vol.2, No.3. 2014.*
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan. Jakarta. Pt Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi keempat.*
- Putri, Merisa Cesia. 2017. *Hubungan Asupan Makan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) Pada Wanita Usia Subur (WUS) Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah [skripsi]. Bandar Lampung. Universitas Lampung.*
- Rahmaniar, Andi. dkk. 2013. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil Di Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Vol. 2, No. 2, 2013.*
- Setiawati Dewi. *Buku Saku Dasar-Dasar Obstetri. Makassar: Alauddin University Press. Edisi pertama. 2011*
- Shihab, M, Quraish. 2002. *Tafsir Al-misbah. Vol 2. Jakarta: Lentera Hati*
- Sukarni, Icesmi., Margaret. 2013. *Kehamilan, persalinan dan Nifas. Yogyakarta : Nuha Medika.*
- Sunarti. 2013. *Asuhan kehamilan. Jakarta. Edisi pertama. 2013*
- Syarifuddin Ausa, Erma, Dkk. 2013. *Hubungan Pola Makan Dan Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian KEK Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Gowa Tahun 2013. Skripsi. Gowa: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.*
- Swathma, Dandara, Dkk. 2016. *Analisis Faktor Risiko BBLR, Panjang Badan Bayi saat Lahir dan Riwayat Imunisasi Dasar terhadap kejadian STUNTING pada Balita Usia 12-36 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kandai Kota Kendari Tahun 2016.*

Tresnawati, Frisca. *Asuhan Kebidanan Panduan Lengkap Menjadi Bidan Profesional*. Jakarta : Pt. Prestasi Pustakaraya. 2012

Verma, Suman., Ranjani, Shrivastava. 2016. *Effects of Maternal Health and Nutrition on Birth Weight of Baby*. *International Journal of science and Research*. Vol.3, No. 4. 2016.

Yuliasuti Erni . 2014. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Bilu Banjarmasin*. Vol.2, No.3, 2014



RIWAYAT HIDUP



Nurmila, dilahirkan pada tanggal 03 September 1996 di Sinjai, Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Kelima dari pasangan Ayahanda H. M. Yusuf dan Hj. St Nuraeni. S.Pd

Jenjang pendidikan yang pernah dilalui penulis adalah:

Tamat SD Negeri 34 Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai tahun 2008, Tamat SMP Negeri 2 Sinjai Utara tahun 2011, Tamat SMA Negeri 2 Sinjai Utara tahun 2014.

Pada Tahun 2014, Penulis melanjutkan studinya pada Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pengalaman organisasi internal kampus:

1. Anggota Dana dan Usaha Himpunan Mahasiswa Diploma Kebidanan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2016-2017