

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR  
PADA BAYI NY 'S' DENGAN ASFIKZIA SEDANG  
DI RSUD SYEKH YUSUF KAB. GOWA  
TAHUN 2017**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan  
Pendidikan Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas  
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**RATIKA**  
NIM : 70400114064  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RATIKA  
Nim : 70400114064  
Tempat/Tgl. Lahir : Palleko, 10 April 1996  
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Pallangga  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir  
Dengan Asfiksia Sedang di RSUD Syekh Yusuf Kab.  
Gowa Tanggal 26 September – 28 September 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang di peroleh batal demi hukum.

Samata, 22 Januari 2018

Penyusun

**RATIKA**  
**Nim.70400114064**

## LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Ratika

Nim : 70400114064

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017

Karya Tulis Ilmiah ini Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing 1

Pembimbing II



Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT.,SKM.,M.Keb



dr. Darmawansyih., M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny ‘S’ Dengan Asfiksia Sedang di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2017”**, yang di susun oleh **RATIKA NIM: 70400114064**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan di pertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang di selenggarakan pada hari , 22 Januari 2018 di nyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, Januari 2018  
05 Jumadil Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT., M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT., SKM., M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Darmawansyih, M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Nadyah, M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Kasjim Salenda, M.Ag** (.....)



**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Proposal Penelitian dengan judul “Baru Lahir Dengan Asfiksia Sedang di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa”. Proposal Penelitian ini diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT.,S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku pembimbing 1 yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.

4. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibu dr. Nadyah, M.Kes selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Dr. Kasjim Salenda, M. Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan kebidanan.
8. Direktur RSUD Syekh Yusuf dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
9. Ucapan yang tak ternilai harganya untuk Ayahanda Mansyur dan Ibunda Mantasia tercinta atas doa, dukungan serta pengorbanannya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
10. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2014.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’malu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat),

kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, 22 Januari 2017

Penulis

**RATIKA**

**70400114064**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH .....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Khusus Tentang Asfiksia.....	9
B. Tinjauan Islam Tentang Asfiksia.....	33
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	37

<b>BAB III STUDI KASUS</b> .....	47
A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar .....	47
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual .....	53
C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/MasalahPotensial .....	55
D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi.....	56
E. Langkah V. Rencana Tindakan.....	56
F. Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan.....	59
G. Langkah VII. Evaluasia Asuhan Kebidanan.....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 posisi kepala yang benar dan salah pada resusitasi.....	40
Gambar 2.2 Grafik Penilaian dan Lubchencho.....	20



## DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Apgar Score.....	16
Tabel: 2.2 Penilaian Maturnitas Fisik Menurut Ballard Score.....	17
Tabel: 2.3 Penilaian Maturnitas Neuromuskular Menurut Ballard Score.....	18
Tabel: 2.4 Penilaian Maturitas.....	20
Tabel: 2.5 Kriteria Penilaian Apgar Score.....	34
Tabel: 2.6 Interpretasi Score.....	35
Tabel: 2.7 Bentuk Rangsangan Taktil yang Membahayakan.....	31
Tabel: 2.8 Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbagda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa.
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Gowa Atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Kepada Kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, 22 JANUARI 2018

**Ratika, 70400114064**

**Pembimbing I : Sitti Saleha**

**Pembimbing II : Darmawansyah**

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny “S” Dengan Asfiksia Sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**

---

Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi dimana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini disertai dengan hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan asidosis.

Karya Tulis Ilmiah ini memaparkan aplikasi Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny “S” dengan Asfiksia Sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Diagnosis Asfiksia Sedang ditegakkan dengan data subjektif keadaan bayi belum menangis dan bayi di rawat di inkubator, data objektif keadaan umum bayi masih lemah, pada pemeriksaan fisik terpasang oksigen. Asuhan yang dilakukan adalah pemberian oksigen, memberikan intake nutrisi dengan cara memberikan penjelasan kepada ibu tentang pentingnya pemberian ASI pada bayi baru lahir serta melakukan perawatan tali pusat.

Kesimpulan dari studi ini adalah, data subjektif dan objektif mendukung ditegakkannya diagnosis asfiksia sedang dan pada pemantauan lanjutan tidak ditemukannya komplikasi. Hal lainnya adalah bahwa dukungan keluarga dan peningkatan pemahaman ibu tentang panduan agama (islam) merupakan materi edukasi yang penting untuk disampaikan bidan pada ibu dalam masa perawatan bayi baru lahir terutama untuk proses pemulihan organ kesehatan terhadap bayi baru lahir dengan asfiksia sedang.

**Daftar Pustaka : 26 (2009-2016)**

**Kata kunci : Asuhan Kebidanan Dengan Asfiksia Sedang, Tujuh Langkah Varney**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, JANUARY 22, 2018

Ratika, 70400114064

Supervisor I : Sitti Saleha

Supervisor II : Darmawansyih

**"Midwifery Care Management of Newborn Baby on Mrs. "S"'s Baby with Moderate Asphyxia at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2017"**

Asphyxia neonatorum is a state of infancy in which the baby cannot spontaneously and regularly breathe immediately after birth. This condition is accompanied by hypoxia, hypercapnia and ends with acidosis.

This Scientific Paper describes the application of Midwifery Care Management of Newborn Baby on Mrs. "S"'s Baby with Moderate Asphyxia at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2017 based on 7 steps of Varney and SOAP.

The diagnosis of Moderate Asphyxia is presented with subjective data where the state of the baby has not yet cried and the baby is treated in the incubator, the objective data on the general condition of the infant is still weak, on physical examination attached to oxygen. The care is carried out by the provision of oxygen, providing the nutrition intake by giving explanations to the mother about the importance of breastfeeding in newborns and performing the umbilical cord care.

The conclusions of this study are the subjective and objective data support the establishment of a diagnosis of moderate asphyxia and on follow-up monitoring of no complications. Another thing is that the family support and improving mother's understanding on religious guidance (Islam) are the important educational materials to be delivered by the midwives to mothers in the nursing care of newborn particularly for the process of recovery of health organ to newborn with moderate asphyxia.

References : 26 (2009-2016)

Keywords : Midwifery Care with Moderate Asphyxia, Seven Steps of Varney



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Menurut *World Health Organization* (WHO) setiap tahunnya kira-kira 3% (3,6juta) dari 120 juta bayi baru lahir mengalami asfiksia, hampir 1 juta bayi ini meninggal. Di Indonesia, dari seluruh kematian bayi, sebanyak 57% meninggal. Penyebab kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah bayi berat lahir rendah (29%), asfiksia (27%), traumalahir, tetanus neonatorum, infeksi lain dan kelainan kongenital (Rahmawati dan Ningsih, 2016).

Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2012 menyebutkan bahwa, penyebab tersering kematian neonatus (0-28 hari) adalah gangguan pernafasan sebesar 37%, bayi lahir premature sebesar 34%, dan sepsis 12%, sedangkan dalam Profil Kesehatan Indonesia dijelaskan bahwa penyebab kematian bayi yang banyak adalah disebabkan karena pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran premature dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), sedangkan penyebab lainnya yang cukup banyak terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (hipoksia intrauterus) dan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2012).

Faktor resiko terjadinya asfiksia neonatorum adalah factor ibu, factor plasenta, faktor janin, dan faktor persalinan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa asfiksia neonatorum sebagai faktor resiko terjadinya gagal ginjal akut,

gangguan pendengaran, dan gangguan fungsi multi organ (Rahma dan Arma, 2013).

Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi baru lahir yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur dalam 1 menit setelah lahir. Biasanya terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu dengan kelahiran kurang bulan, dan kelahiran lewat waktu. Secara umum banyak faktor yang dapat menimbulkan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir, baik itu faktor dari ibu seperti (primi tua, riwayat obstetrik jelek, grande multipara, masa gestasi, anemia dan penyakit ibu, ketuban pecah dini, partus lama, panggul sempit, infeksi intrauterin, faktor dari janin yaitu gawat janin, kehamilan ganda, letak sungsang, letak lintang, berat lahir, dan faktor dari plasenta (Lisa Rahmawati, Hal: 31, 2016).

Asfiksia perinatal didefinisikan sebagai bahaya pada janin atau bayi baru lahir yang disebabkan oleh kekurangan oksigen (hipoksia) dan atau kekerangan perfusi (iskemia) dari berbagai organ dengan intensitas yang cukup untuk mendorong perubahan metabolisme aerob terhadap metabolisme anaerob. Memicu asidosis metabolik dan dekompensasi kardiovaskular (gagal jantung), seperti vasodilatasi perifer dan penurunan curah jantung, mengakibatkan hipotensi janin berat dan mengurangi aliran darah serebral dan akibatnya kerusakan otak dan disfungsi organ atau kematian janin/neonatal (Launa, dkk. 2016).

Ada beberapa faktor tertentu diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir, di antaranya adalah faktor ibu, tali pusat dan bayi berikut: 1). Faktor ibu: preeklampsia dan eklampsia. Perdarahan

abnormal (plasenta previa dan solusio plasenta), partus lama atau partus macet, demam selama persalinan, infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV) atau kehamilan lewat bulan, 2). Faktor tali pusat: lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul tali pusat atau prolapsus tali pusat, 3). Faktor bayi: bayi prematur, persalinan dengan tindakan kelainan bawaan, air ketuban bercampur mekonium (Nadyah, 2013).

Berbagai upaya yang aman dan efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebab utama pada kematian bayi baru lahir (BBL) adalah pelayanan antenatal yang berkualitas, asuhan persalinan normal atau dasar dan pelayanan kesehatan neonatal oleh tenaga profesional. Untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir karena asfiksia, persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen asfiksia pada bayi baru lahir. Kemampuan dan keterampilan ini digunakan setiap kali menolong persalinan.

Sehubungan dengan masih tingginya kejadian asfiksia yang ditentukan serta besarnya resiko yang ditimbulkan jika asfiksia tidak mendapat penanganan yang cepat dan tepat maka penulis termotivasi untuk membahas lebih lanjut melalui karya tulis ilmiah ini dengan judul Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Patologi Pada Bayi Ny<sup>”S”</sup> dengan Asfiksia Sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Dari data yang di dapatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tentang jumlah Asfiksia Sedang pada tahun 2014 sebanyak 100 kasus, tahun 2015 sebanyak 83 kasus, 2016 sebanyak 31 kasus dan pada tahun 2017

dari bulan Januari sampai bulan Maret tercatat sebanyak 7 kasus. Meskipun angka kejadian asfiksia yang ada di RSUD Syekh Yusuf Gowa menurun, namun kejadian asfiksia menjadi salah satu penyebab utama kematian neonatus.

Seperti yang diketahui, RSUD Syekh Yusuf adalah salah satu rumah sakit umum daerah yang memiliki berbagai macam pelayanan di dalamnya seperti, *IGD*, *Medical Check Up* dan berbagai macam Poliklinik. Sehingga bagi pasien yang mengalami diagnosa asfiksia pada puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Gowa biasa merujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut.

#### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir patologi pada bayi Ny "S" dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

#### **C. Tujuan Penulisan**

##### 1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny 'S' dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sesuai dengan wewenang bidan.

##### 2. Tujuan Khusus

a. Dapat melaksanakan identifikasi dan analisa data pada bayi Ny "S" dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

- b. Dapat mengidentifikasi diagnosa serta masalah aktual pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- c. Dapat mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- d. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- e. Dapat merencanakan tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- f. Dapat mengimplementasikan tindakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- g. Dapat mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- h. Dapat mendokumentasikan semua temuan dan tindakan dalam asuhan kebidanan yang telah diberikan pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## 2. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi tenaga bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya di RSUD Syekh Yusuf Gowakhususnya yang berkaitan dengan asfiksia.

## 3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan institusi dan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

## 4. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai bahan tambahan pengalaman berharga bagi penulis untuk memperluas dan menambah wawasan dalam asuhan kebidanan.

## **E. Metode Penulisan**

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam pemecahan masalah. Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku atau literatur, mengambil data-data internet membaca buku, ataupun materi kuliah yang berkaitan dengan asfiksia.

### 2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen kebidanan yang meliputi 7 langkah yaitu: identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial,

melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan asuhan kebidanan dan evaluasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Anamnesis/Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan orang tua atau keluarga pasien guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memberi asuhan kebidanan pada pasien tersebut.

b. Pemeriksaan Fisik

Melakukan pemeriksaan fisik secara otomatis kepada pasien meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan auskultasi serta pemeriksaan diagnostik lainnya sesuai dengan kebutuhan dan indikasi.

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan pasien yang bersumber dari catatan dokter/bidan maupun hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Mengadakan tanya jawab dengan dokter dan bidan yang menangani langsung pasien tersebut serta mengadakan diskusi dengan dosen pengasuh atau pembimbing karya tulis ilmiah ini.

**F. Sistematika Penulisan**

BAB I, bab ini berisi latar belakang pengambilan kasus asfiksia sedang, ruang lingkup, tujuan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul asfiksia

sedang, manfaat penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah.

BAB II, pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum asfiksia neonatorum (pengertian asfiksia, etiologi asfiksia, klasifikasi asfiksia, diagnosis asfiksia, patofisiologi asfiksia, tanda dan gejala asfiksia, persiapan resusitasi bayi baru lahir, penilaian segera, dan langkah-langkah resusitasi pada bayi baru lahir) dan yang terakhir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan (pengertian manajemen asuhan kebidanan, proses manajemen asuhan kebidanan dan pendokumentasian asuhan kebidanan).

BAB III, membahas tentang langkah I pengkajian dan analisa data dasar, langkah II merumuskan diagnosa /masalah aktual, langkah III antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan.

BAB IV, bab ini membahas tentang persamaan, perbedaan, atau kesenjangan yang terjadi antara kasus yang telah diteliti dengan teori yang telah dibahas sebelumnya dan juga menjawab tujuan penelitian.

BAB V, pada bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan yang dapat penulis simpulkan terkait keseluruhan pemberian asuhan kasus asfiksia sedang dan saran kepada para pembaca untuk memberikan kritik terhadap karya tulis ilmiah ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Khusus Tentang Asfiksia***

##### **1. Pengertian Asfiksia**

Asfiksia merupakan keadaan bayi yang tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, karena bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhnya dan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut yaitu meninggalnya bayi (Pangemanan dkk, 2016). Menurut referensi yang saya dapat dari buku dan jurnal, ada beberapa pendapat tentang pengertian asfiksia, yaitu:

- a. Asfiksia Neonatorum adalah keadaan bayi dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini di sertai dengan hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan asidosis (Marmi S,St 2012).
- b. Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur (Nadyah, 2013).
- c. Asfiksia Neonatorum adalah keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir (Nadyah, 2013).
- d. Asfiksia Neonatorum adalah kegagalan untuk memulai dan melanjutkan pernafasan secara spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah lahir (Sudarti dan Fauziah, 2013).

- e. Asfiksia Neonatorum adalah kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah saat lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis (Maryunani dan Puspita, 2013: 296).
- f. Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak segera bernapas secara spontan dan teratur setelah dilahirkan. Asfiksia dapat terjadi selama kehamilan dan persalinan (Mochtar dan Sofian, 2012: 291).
- g. Asfiksia neonatorum merupakan suatu kondisi dimana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O<sub>2</sub> dan makin meningkatkan CO<sub>2</sub> yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut (Rukiyah dan Yulianti, 2013: 249).
- h. Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhnya (Dewi, 2012: 102).

## 2. Etiologi Asfiksia

Janin sangat bergantung pada fungsi plasenta sebagai tempat pertukaran oksigen, nutrisi dan pembuangan produk sisa. Gangguan pada aliran darah umbilikal maupun plasenta dapat menyebabkan terjadinya asfiksia. Asfiksia dapat terjadi selama kehamilan, pada proses persalinan atau periode segera setelah lahir (Indrayani, 2013).

Selama kehamilan, beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah uteroplasenter sehingga pasokan oksigen ke bayi menjadi kurang. Hipoksia bayi di dalam uterus ditunjukkan dengan gawat janin yang berlanjut menjadi asfiksia pada sesaat bayi baru lahir. Beberapa faktor yang diketahui dapat menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir, di antaranya adalah faktor ibu, tali pusat bayi dan kondisi bayi.

a. Faktor Ibu

- 1) Preeklampsia dan eklampsia (sering terjadi)
- 2) Pendarahan abnormal (plasenta previa atau solusio plasenta)
- 3) Partus lama atau partus macet
- 4) Demam selama persalinan
- 5) Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV)
- 6) Kehamilan postmatur atau setelah usia kehamilan 42 minggu  
(Mario Tando, 2013).

b. Faktor Plasenta

- 1) Infark plasenta yaitu terjadinya pematangan plasenta, noduler dan keras sehingga tidak berfungsi dalam pertukaran nutrisi.
- 2) Solution plasenta yaitu terlepasnya plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir. Biasanya terjadi pada trimester III, walaupun dapat pula terjadi pada setiap saat dalam kehamilan.
- 3) Plasenta previa yaitu plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau

seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal plasenta terletak dibagian atas uterus (Dewi, 2014).

c. Faktor Keadaan Tali Pusat

- 1) *Inersio velamentosa* adalah insersi tali pusat pada selaput janin. Jenis insersi tali pusat ini sangat penting dari segi praktik, karena pembuluh-pembuluh umbikaligus, diselaput ketuban, terpisah jauh dari tepi plasenta, dan mencapai keliling tepi plasenta dengan hanya dilapisi oleh satu lapisan amnion.
- 2) *Prolapsus vunikuli* (*prolapsus tali pusat*) adalah ketika tali pusat keluar dari uterus mendahului bagian presentasi. Berikut pembagian prolapsus tali pusat.
- 3) Tali pusat menumbung disebut juga prolapsus funikuli adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada disamping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir, tali pusat dapat prolaps ke dalam vagina atau bahkan diluar vagina setelah ketuban pecah. Tali pusat menumbung secara langsung tidak mempengaruhi keadaan ibu sebaliknya sangat membahayakan janin karena tali pusat sangat tertekan antara bagian depan janin dan dinding panggul yang akhirnya menimbulkan asfiksia pada janin. Bahaya terbesar ada pada presentasi kepala, karena setiap saat tali pusat dapat terjepit antara bagian terendah janin dengan jalan lahir yang dapat mengakibatkan gangguan oksigenasi janin.

- 4) Tali pusat terdepan disebut juga tali pusat terkemuka yaitu jika tali pusat berada disamping bagian besar janin dapat teraba pada kanalis servikalis, atau lebih rendah dari bagian bawah janin sedang ketuban masih intak (utuh) atau belum pecah. Pada tali pusat terdepan, sebelum ketuban pecah, tetapi setelah ketuban pecah, bahaya kematian janin sangat besar.
- 5) Torsi tali pusat yaitu terjadi akibat gerakan janin, sehingga tali pusat terpilin.
- 6) Tali pusat pendek yaitu tali pusat yang sangat pendek membuat abdomen janin berhubungan dengan plasenta, keadaan ini selalu diikuti dengan hernia umbilikalis. Normalnya panjang tali pusat 50-55 cm. Tali pusat yang terlalu pendek dapat menimbulkan hernia umbilikalis, solusio plasenta, persalinan tidak maju karena tali pusat tertarik, mungkin bunyi jantung menjadi buruk, dan inversion uteri.
- 7) Lilitan tali pusat yang sering terjadi pada kasus asfiksia, biasanya terdapat pada leher bayi. Lilitan tali pusat menyebabkan tali pusat menjadi relatif pendek dan mungkin juga menyebabkan letak defleksi. Setelah kepala anak lahir, lilitan perlu segera dibebaskan melalui kepala atau digunting antara 2 Kocher (Dewi, 2014).

#### d. Faktor Janin

- 1) Kelainan genetika
- 2) Kelainan kromosom

- 3) Kelainan pertumbuhan
- 4) Mal nutrisi janin (sering terjadi)

Bila mal nutrisi janin terjadi diawal kehamilan, maka bayi bisa lahir mati, dapat juga terjadi pertumbuhan lambat, sehingga terjadi apa yang disebut SGA (*Small Gestational Age*) atau bayi lebih kecil yang seharusnya sesuai umur kehamilan (Dewi, 2014).

### 3. Patofisiologi Asfiksia

Oksigen merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan janin baik sebelum maupun sesudah persalinan.

Cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan setelah lahir:

#### a. Sebelum lahir

Seluruh oksigen yang dibutuhkan janin diberikan melalui mekanisme difusi melalui plasenta yang berasal dari ibu ke darah janin. Saat dalam uterus, hanya sebagian kecil darah janin di alirkan ke paru-paru janin. Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen atau jalan untuk mengeluarkan karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Oleh karena itu, aliran darah paru tidak penting untuk mempertahankan oksigenasi janin yang normal dan keseimbangan asam basah. Paru janin berkembang di dalam uterus, akan tetapi alveoli diparu janin masih terisi oleh cairan, bukan udara. Pembuluh arteriol di dalam paru janin dalam keadaan konstriksi sehingga tekanan oksigen (O<sub>2</sub>) parsial rendah. Hampir seluruh darah dari jantung kanan tidak dapat melalui paru karena konstriksi pembuluh darah janin, sehingga darah dialirkan melalui pembuluh yang

bertekanan lebih rendah yaitu duktus arteriosus kemudian masuk ke aorta (Indrayani dan Djami, 2014).

b. Setelah lahir

Bayi tidak lagi berhubungan dengan plasenta dan akan segera bergantung pada paru sebagai sumber utama oksigen, karena itu dalam beberapa saat cairan paru harus diserap dari alveoli, setelah itu paru harus terisi udara yang mengandung oksigen dan pembuluh darah di paru harus berelaksasi untuk meningkatkan aliran ke alveoli. Pengisian alveoli oleh udara akan memungkinkan oksigen mengalir kedalam pembuluh darah disekitar alveoli. Oksigen diserap untuk diedarkan keseluruh tubuh (Indrayani dan Djami, 2014).

Arteri dan vena umbilikal is akan menutup sehingga menurunkan tahanan pada sirkulasi plasenta dan meningkatkan tekanan darah sistemik. Akibat dari tekanan udara dan peningkatan kadar oksigen di alveoli, pembuluh darah paru akan mengalami relaksasi sehingga tahanan terhadap aliran darah berkurang. Keadaan relaksasi tersebut dan peningkatan tekanan darah sistemik menyebabkan tekanan pada arteri pulmonalis lebih rendah dibandingkan tekanan sistemik sehingga aliran darah paru meningkat sehingga aliran pada duktus arteriosus menurun. Oksigen yang diabsorpsi di alveoli oleh pembuluh darah di vena pulmonalis dan darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke bagian jantung kiri, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh bayi baru lahir. Pada kebanyakan keadaan, udara menyediakan oksigen

(21%) untuk menginisiasi relaksasi pembuluh darah paru. Pada saat kadar oksigen meningkat dan pembuluh darah paru mengalami relaksasi, duktus arteriosus mulai menyempit. Darah yang sebelumnya melalui duktus arteriosus sekarang melalui paru-paru, akan mengambil banyak oksigen untuk dialirkan keseluruh jaringan tubuh (Indrayani dan Djami, 2014).

Pada akhir masa transisi normal, bayi menghirup udara dan menggunakan paru-parunya untuk mendapatkan oksigen. Tangisan pertama dan terikan nafas yang dalam akan mendorong cairan dari dalam nafasnya. Oksigen dan pengembangan paru merupakan rangsangan utama relaksasi pembuluh darah paru. Pada saat oksigen masuk adekuat dalam pembuluh darah, warna kulit bayi akan berubah dari abu-abu/biru menjadi kemerahan (Indrayani dan Djami, S.ST, 2013).

#### 4. Klasifikasi Asfiksia

Berdasarkan nilai APGAR (*Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration*) asfiksia diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:

##### a. Asfiksia Berat

Skor apgar 0-3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan frekuensi jantung kurang dari 100 x/menit, tonus otot buruk, sianosis berat dan kadang-kadang pucat, reflek iritabilita, tidak ada.

b. Asfiksia Sedang

Skor apgar 4-6. Pada pemeriksaan fisik akan terlihat frekuensi jantung lebih dari 100 x/menit, tonus otot buruk, sianosis berat, dan kadang-kadang pucat, refleks iribilita tidak ada.

c. Bayi Normal

Skor apgar 7-10. Dalam hal ini bayi dianggap sehat dan tidak memerlukan tindakan istimewa (Marmi dan Rahardjo, 2012)

**5. Tanda dan Gejala Asfiksia**

Tanda-tanda dan gejala bayi yang mengalami asfiksia pada bayi baru lahir meliputi:

- a. Tidak bernafas atau bernafas megap-megap
- b. Warna kulit kebiruan
- c. Kejang
- d. Penurunan kesadaran
- e. Pernafasan cepat
- f. Nadi cepat
- g. Nilai apgar kurang dari 6

Untuk menentukan tingkat asfiksia, apakah bayi mengalami asfiksia berat, sedang atau ringan/normal dapat dipakai penilaian apgar (Arief dan Kristiyanasari, 2009).

**Tabel: 2.1 untuk menentukan tingkat/derajat asfiksia yang dialami bayi**

<b>Tanda</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Frekuensi jantung</b>	Tidak ada	Kurang dari 100/menit	Lebih dari 100/menit
<b>Usaha nafas</b>	Tidak ada	Lambat tidak teratur	Menagis kuat
<b>Tonus otot</b>	Lumpuh	Ekstremitas fleksi	Gerakan aktif
<b>Reflek</b>	Tidak ada	Gerakan sedikit	Gerakan kuat/melawan
<b>Warna</b>	Biru/pucat	Tubuh kemerahan ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan

Sumber: Neonatus Dan Asuhan Keperawatan Anak (Arief dan Kristiyanasari, 2009).

Apabila Nilai Apgar:

- 1) 7-10 : Bayi mengalami asfiksia ringan atau dikatakan bayi dalam keadaannormal.
- 2) 4-6 : Bayi mengalami asfiksia sedang.
- 3) 0-3 : Bayi mengalami asfiksia berat (Marmi, S,St 2013)

## 6. Diagnosis Asfiksia

Asfiksia yang terjadi pada bayi biasanya merupakan kelanjutan dari *anoksia/hipoksia* janin. Diagnosis *anoksia/hipoksia* janin dapat dibuat dalam persalinan dengan ditemukannya tanda-tanda gawat janin. Tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Denyut jantung janin: frekuensi normal ialah antara 120-160 denyutan permenit. Apabila frekuensi denyutan turun sampai di bawah 100 x/menit diluar his dan lebih-lebih jika tidak teratur itu merupakan tanda bahaya.
- b. Mekonium dalam air ketuban: adanya mekonium pada presentasi kepala mungkin menunjukkan gangguan oksigenasi dan gawat janin, karena terjadi rangsangan *nervus X*, sehingga *peristaltic usus* meningkat

dan sfingter ani membuka. Adanya mekonium dalam air ketuban pada presentasi kepala merupakan indikasi untuk mengakhiri persalinan bila hal itu dapat dilakukan dengan mudah.

- c. Pemeriksaan pH darah janin: adanya asidosis menyebabkan turunnya pH. Apabila pH itu turun sampai di bawah 7,2 hal itu dianggap sebagai tanda bahaya (Rukiyah dan Yuliyanti, 2013: 250).

Anamnesis diarahkan untuk mencari faktor risiko terhadap terjadinya asfiksia neonatorum.

Anamnesis

- a. Gangguan/kesulitan waktu lahir.
- b. Cara dilahirkan.
- c. Ada tidaknya bernafas dan menangis segera setelah dilahirkan.
- d. Bayi tidak bernafas atau menangis.

Pemeriksaan fisik

- a. Denyut jantung kurang dari 100x/menit.
- b. Tonus otot menurun.
- c. Bisa didapatkan cairan ketuban ibu bercampur mekonium, atau sisa mekonium.

## 7. Penatalaksanaan Asfiksia

### A. Penilaian Segera

Segera setelah bayi lahir, letakkan bayi dibawah ibu atau dekat perineum (harus bersih dan kering). Cegah kehilangan panas dengan

menutupi tubuh bayi dengan kain/handuk yang telah disiapkan sambil melakukan penilaian dengan menjawab 2 pertanyaan:

- 1) Apakah bayi menangis kuat, tidak bernafas atau megap-megap?
- 2) Apakah bayi lemas.

Setelah melakukan penilaian dan memutuskan bahwa bayi baru lahir perlu resusitasi, segera lakukan tindakan yang diperlukan. Penundaan pertolongan dapat membahayakan keselamatan bayi. Jepit dan potong tali pusat dan pindahkan bayi ketempat resusitasi yang telah disediakan. Lanjutkan dengan langkah awal resusitasi.

Penilaian pada bayi baru lahir:

- 1) Sebelum bayi lahir, sesudah ketuban pecah:

Apakah air ketuban bercampur mekonium (warna kehijauan) pada presentasi kepala.

- 2) Segera setelah bayi baru lahir:

Apakah bayi menangis, bernafas spontan atau teratur, bernafas megap-megap atau tidak bernafas.

Apakah bayi lemas atau lunglai.

Putuskan apakah bayi memerlukan tindakan resusitasi apabila:

- 1) Air ketuban bercampur mekonium.
- 2) Bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap.
- 3) Bayi lemas atau lunglai.

Segera lakukan tindakan resusitasi apabila bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap atau lemas.

## **B. Persiapan Resusitasi Pada Bayi Baru Lahir**

Di dalam setiap persalinan, penolong harus selalu siap untuk melakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir. Kesiapan untuk bertindak dapat menghindarkan kehilangan waktu yang sangat berharga bagi upaya penolong. Walaupun hanya beberapa menit tidak bernafas, bayi baru lahir dapat mengalami kerusakan otak yang berat atau meninggal (Indrayani dan Djami, 2014).

### **1) Persiapan keluarga**

Sebelum menolong persalinan, bicarakan kepada keluarga mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi terhadap ibu dan bayinya serta persiapan yang dilakukan oleh penolong untuk membantu kelancaran persalinan dan melakukan tindakan yang diperlukan (Indrayani dan Djami, 2014).

### **2) Persiapan Tempat Resusitasi**

Persiapan yang diperlukan meliputi tempat bersalin dan tempat resusitasi. Gunakan ruangan yang hangat dan terang. Tempat resusitasi hendaknya rata, keras, bersih dan kering, meja atau diatas lantai yang beralaskan tikar. Kondisi yang diperlukan untuk mengatur posisi kepala bayi. Tempat resusitasi sebaiknya didekat sumber pemanas (misalnya: lampu sorot) dan tidak banyak tiupan angin (jendela atau pintu terbuka). Biasanya digunakan lampu sorot atau bohlam berdaya 60 watt atau lampu

gas minyak bumi (*petromax*). Nyalakan lampu menjelang kelahiran bayi (Indrayani dan Djami, 2014).

### 3) **Persiapan Alat dan Bahan Resusitasi**

- a) Meja Resusitasi
- b) Handuk kecil (1 buah) dan handuk besar (3 buah)
- c) Alat penghisap lendir Dee Lee atau bola karet
- d) Tabung dan sungkup atau balon dan sungkup neonatal
- e) Stetoskop neonatal
- f) Jam atau pencatat waktu
- g) Bengkok (Hayati dan Novita, 2013)

### 4) **Langkah-langkah Resusitasi Bayi**

Resusitasi BBL bertujuan untuk memulihkan fungsi pernafasan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia dan menyelamatkan hidupnya tanpa gejala sisa dikemudian hari.

#### **Langkah Awal**

Sambil melakukan langkah awal:

- 1) Beritahu ibu dan keluarganya bahwa bayinya memerlukan bantuan untuk memulai bernafas.
- 2) Minta keluarga mendampingi ibu (memberikan dukungan moral, menjaga dan melaporkan kepada penolong apabila terjadi perdarahan).

Langkah awal ini perlu dilakukan secara tepat (dalam waktu 30 detik). Secara umum, 6 langkah awal dibawah ini cukup untuk merangsang bayi baru lahir untuk bernafas spontan dan teratur.


Langkah awal (dilakukan dalam waktu 30 detik):

a. Jaga bayi tetap hangat:

- 1) Letakkan bayi diatas kain yang ada di atas perut ibu atau dekat perineum.
- 2) Selimuti bayi dengan kain tersebut.
- 3) Pindahkan bayi keatas kain tempat resusitasi

b. Atur posisi bayi

- 1) Baringkan bayi terlentang dengan kepala didekat penolong.
- 2) Ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi



Sumber: *Asuhan Neonatus Resiko Tinggi dan Kegawatan (Sudarti dan Fauziah, 2013)*

Gambar 2.1 posisi kepala yang benar dan salah pada resusitasi

c. Isap lendir

Gunakan alat penghisap lendir Dee Lee atau bola karet.

- 1) Pertama, isap lendir didalam mulut kemudian baru hisap lendir dihidung.
- 2) Hisap lendir sambil menarik keluar penghisap (bukan pada saat memasukkan).

3) Bila menggunakan penghisap lendir Dee Lee, jangan memasukkan ujung penghisap terlalu dalam (lebih dari 5 cm kedalam mulut atau 3 cm kedalam hidung) karena dapat menyebabkan denyut jantung bayi melambat atau henti nafas bayi (Indrayani dan Djami, 2014).

d. Keringkan dan rangsang taktil

- 1) Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat memulai pernafasan bayi atau bernafas lebih baik.
- 2) Lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara di bawah ini
  - (a) Menepuk atau menyentil telapak kaki.
  - (b) Menggosok punggung, perut, dada atau tungkai dengan telapak tangan (Indrayani dan Djami, 2014).

Tabel: 2.2 Bentuk rangsangan taktil yang membahayakan

RANGSANGAN	BAHAYA/RESIKO
<b>Menepuk bokong</b>	Trauma dan luka
<b>Meremas rongga dada</b>	Fraktur Pneumotoraks Gawat nafas Kematian
<b>Menekan kedua paha bayi ke perutnya</b>	Rupture hati atau limfa Perdarahan didalam
<b>Mendilatasi sfingter ani</b>	Sfingter ani robek
<b>Menempelkan kompres hangat atau dingin</b>	Hipotermia Hipertermia Luka bakar
<b>Mengguncang bayi</b>	Kerusakan otak
<b>Meniupkan oksigen atau udara dingin ketubuh bayi</b>	Hipotermia

Sumber: Rachimhadhi, et.al 1997 dan American Academy of Pediatrics. 2000.

e. Reposisi

Atur kembali posisi kepala dan selimuti bayi.

- 1) Ganti kain yang telah basah dengan kain bersih dan kering yang baru (disiapkan).
- 2) Selimuti bayi dengan kain tersebut, jangan tutupi bagian muka dan dada agar pemantauan pernafasan bayi dapat diteruskan.
- 3) Atur kembali posisi terbaik kepala bayi (sedikit ekstensi).

f. Penilaian apakah bayi menangis atau bernafas spontan dan teratur?

- 1) Lakukan penilaian apakah bayi bernafas normal, megap-megap atau tidak bernafas.
  - a) Letakkan bayi di atas dada ibu dan selimuti keduanya untuk menjaga kehangatan tubuh bayi melalui persentuhan kulit ibu-bayi.
  - b) Anjurkan ibu untuk menyusukan bayi sambil membelainya, bila bayi tidak bernafas atau megap-megap, segera lakukan tindakan ventilasi

### **Ventilasi**

Ventilasi adalah bagian dari tindakan resusitasi untuk memasukkan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif yang memadai untuk membuka alveoli paru agar bayi bernafas spontan dan teratur.

Langkah-langkah ventilasi:

1) Pemasangan sungkup

Perhatikan perlengkapan sungkup, pasang dan pegang sungkup agar menutupi mulut dan hidung bayi.

2) Ventilasi percobaan (2 kali)

a) Lakukan tiupan udara dengan tekanan 30 cm air, tiupan awal ini sangat penting untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa mulai bernafas dan sekaligus menguji apakah jalan nafas terbuka atau bebas.

b) Amati gerakan dada bayi

(1) Bila tidak mengembang:

(a) periksa posisi kepala, pastikan posisinya sudah benar.

(b) periksa pemasangan sungkup dan pastikan tidak terjadi kebocoran.

(c) periksa ulang apakah jalan nafas tersumbat cairan atau lendir (hisap kembali) (Indrayani dan Djami,

2014)

(2) Bila dada mengembang, lakukan ketahap berikutnya:

3) Ventilasi defenisi (20 kali dalam 30 detik)

a) Lakukan tiupan dengan tekanan 20 cm air, sebanyak 20 kali dalam 30 detik

b) Pastikan udara masuk (dada, mengembang) dalam 30 detik tindakan

4) Lakukan penilaian

Lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernafas spontan dan teratur?

a) Bila bayi sudah bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap.

(1) lihat apakah ada retraksi dinding dada bawah.

(2) hitung frekuensi pernafasan, apabila pernafasan  $>40$  kali permenit dan tidak ada retraksi berat, maka:

(a) Jangan ventilasi lagi.

(b) Berikan oksigen aliran bebas 5-10 L/menit.

(c) Asuhan BBL rutin (bungkus tali pusat, beri salep mata, suntik vitamin K, letakkan bayi dengan kontak kulit dengan kulit pada dada ibu, 1 jam

kemudian suntik Hepatitis B.

(d) Pantau setiap 15 menit untuk pernafasan dan kehangatan dalam 2 jam pertama.

(e) Jelaskan pada keluarga bahwa bayinya kemungkinan besar akan membaik.

b) Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap, lanjutkan VTP.

c) Siapkan rujukan bila bayi belum bernafas spontan setelah 2 menit di ventilasi

- (1) Minta keluarga membantu persiapan rujukan.
- (2) Teruskan resusitasi untuk menghentikan tindakan resusitasi jika setelah 20 menit upaya ventilasi tidak berhasil (Indrayanidan Djami, 2014).

#### 5) Asuhan pascaresusitasi

Asuhan pascaresusitasi diberikan sesuai dengan keadaan bayi setelah menerima tindakan resusitasi. Asuhan pascaresusitasi dilakukan pada keadaan:

##### a. Resusitasi berhasil

Bayi menangis dan bernafas normal sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Perlu pemantauan dan dukungan. Resusitasi dinyatakan berhasil apabila pernafasan bayi teratur, warna kulitnya kembali normal yang kemudian diikuti dengan perbaikan tonus otot atau bergerak aktif.

Lanjutkan dengan asuhan berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

##### 1) Konseling

- a) Jelaskan pada ibu dan keluarganya tentang hasil resusitasi yang telah dilakukan. Jawab setiap pertanyaan yang diajukan.
- b) Ajarkan ibu cara menilai pernafasan dan menjaga kehangatan tubuh bayi. Bila ditemukan kelainan, segera hubungi penolong.

- c) Anjurkan ibu segera memberi ASI kepada bayi (asuhan dengan metode kangguru)
  - d) Jelaskan kepada ibu dan keluarganya untuk mengenali tanda-tanda bahaya baru lahir dan bagaimana memperoleh pertolongan segera bila terlihat tanda-tanda tersebut pada bayi.
- 2) Lakukan asuhan bayi baru lahir normal, meliputi:
- a) Anjurkan ibu menyusui sambil memperhatikan dan membelai bayinya.
  - b) Berikan vitamin K, antibiotik salep mata, imunisasi hepatitis B
- 3) Lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pascaresusitasi selama 2 jam pertama.
- a) Perhatikan tanda-tanda kesulitan bernafas pada bayi.
    - (1) Tarikan interkostal, nafas megap-megap frekuensi nafas <30 kali permenit atau >60 kali permenit.
    - (2) Bayi kebiruan atau pucat.
    - (3) Bayi lemas
  - b) Pantau juga bayi yang tampak pucat walaupun tampak bernafas dengan normal.
- 4) Jagalah agar bayi tetap hangat dan kering
- b. Resusitasi tidak/kurang hasil/bayi memerlukan rujukan.

Bayi perlu rujukan, yaitu sesudah ventilasi 2 menit sebelum bernafas atau bayi sudah bernafas tetapi masih megap-megap atau pada pemantauan ternyata kondisinya makin memburuk. Bila bayi pascaresusitasi kondisinya memburuk, segera rujuk kefasilitas rujukan.

Tanda-tanda bayi yang memerlukan rujukan sesudah resusitasi, antara lain:

- 1) Frekuensi pernafasan <30 kali permenit atau lebih dari >60 kali permenit.
- 2) Adanya retraksi (tarikan) intercostal.
- 3) Bayi merintih (bising nafas espirasi) atau megap-megap (bising nafas aspirasi).
- 4) Tubuh bayi pucat atau kebiruan

Apabila resusitasi tidak/kurang berhasil/bayi memerlukan rujukan, lakukan:

1) Konseling

- a) Jelaskan pada ibu dan keluarga bahwa bayinya perlu dirujuk. Bayi dirujuk bersama ibunya dan di dampingi oleh bidan. Jawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu dan keluarganya.
- b) Minta keluarga untuk menyiapkan sarana transportasi secepatnya. Suami atau salah seorang

anggota keluarga juga diminta untuk menemani selama perjalanan rujukan.

- c) Beritahukan (bila mungkin) ke tempat rujukan yang dituju tentang kondisi bayi dan perkiraan waktu tiba
- d) Bawa peralatan resusitasi dan perlengkapan lain yang diperlukan selama perjalanan ke tempat rujukan.

2) Asuhan bayi baru lahir yang dirujuk


- a) Periksa keadaan bayi selama perjalanan (pernafasan, warna kulit, suhu tubuh) dan catatan medik.
- b) Jaga bayi tetap hangat selama perjalanan, tutup kepala bayi dan bayi dalam posisi “Metode kangguru” dengan ibunya. Selimuti ibu bersama bayi dalam satu selimut.
- c) Lindungi bayi dari sinar matahari.
- d) Jelaskan kepada ibu bahwa sebaiknya memberi ASI segera kepada bayinya, kecuali pada keadaan gangguan nafas dan kontra indikasi lainnya.

3) Asuhan lanjutan

Merencanakan asuhan lanjutan sesudah bayi pulang dari tempat rujukan akan sangat membantu

pelaksanaan asuhan yang diperlukan oleh ibu dan bayinya sehingga apabila kemudian timbul masalah hal tersebut dapat dikenali sejak dini dan kesehatan bayi tetap terjaga.

### MANAJEMEN ASFIKZIA BAYI BARU LAHIR



## B. Tinjauan Islam Tentang Asfiksia

Al-Quran sebagai kitab suci umat islam tidak hanya berbicara mengenai petunjuk praktis dan prinsip kehidupan umat manusia, namun berbicara juga mengenai proses penciptaan manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hajj/22: 5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ  
ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ<sup>ج</sup> وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا  
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ<sup>ط</sup> وَمِنْكُمْ مَّن  
يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا<sup>ع</sup>  
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن  
كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia seandainya kamu dalam keraguan tentang kebangkitan maka: Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian ‘alaqah, kemudian mudghah yang sempurna kejadiannya agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian agar kamu mencapai masa terkuat kamu, dan diantara kamu ada yang di wafatkan dan diantara kamu ada yang di kembalikan sampai keumur yang rendah hingga akhirnya dia tidak mengetahui sesuatupun yang dahulu telah diketahuinya. Dan engkau melihat bumi kering kerontang, maka apabila telah Kami turunkan air di atasnya dia bergerak mengembang dan menumbuhkan berbagai jenis yang indah” (Depatemen Agama RI, 2015).

Ayat ini menjelaskan bahwa: Hai semua manusia, seandainya kamu dalam keraguan tentang keniscayaan hari kebangkitan dan Kekuasaan Kami

untuk menghidupkan manusia telah mereka meninggal dunia ini, maka camkanlah penjelasan Kami ini: Sesungguhnya kamu tadinya tidak pernah berada di pantas wujud ini, lalu Kami dengan Kuasa Kami telah menjadikan kamu, yakni orang tua kamu Adam dari tanah, kemudian kamu selaku anak cucunya Kami jadikan dari nutfah yakni setetes mani, kemudian setetes mani itu setelah bertemu dengan indung telur berubah menjadi ‘alaqah yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim kemudian ‘alaqah itu mengalami proses dalam rahim ibu sehingga menjadi mudghah yakni sesuatu yang berupa sekarat daging kecil, sebesar apa yang dikunyah, ada mudghah yang sempurna kejadiannya sehingga dapat berproses sampai lahir manusia sempurna, dan ada juga yang tidak sempurna kejadiannya. Proses ini Kami kemukakan agar Kami jelaskan kepada kamu Kuasa Kami menciptakan dari tiada menjadi ada, dan dari mati menjadi hidup, sekaligus menjadi bukti Kuasa Kami membangkitkan kamu setelah kematian. Bukankah perpindahan tanah yang mati ke nutfah sampai akhirnya menjadi bayi yang segar bugar adalah bukti yang tidak dapat diragukan tentang terjadinya peralihan yang mati menjadi hidup?

**Q.S. Al-Mu'minun/23: 12-14**

Dalam islam memiliki kitab suci al quran untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari hanya setitik air mani hingga berkembang secara kompleks. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Mu'minun/23:12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا  
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk (yang berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.

Kemudian dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda: “Telah bersabda Rasulullah SAW dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat (macam): rezekinya, ajal (umurnya), amalnya, dan buruk baik (nasibnya).” (HR. Bukhari-Muslim)

“Dan sesungguhnya telah Kami jadikan manusia dari air saringan dari tanah” (ayat 12).

Apalah yang akan di banggakan manusia di dunia ini, padahal asal kejadiannya hanya dari tanah. Dia makan dari sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung dan sebagainya, dan segala makanan itu tumbuh dan mengambil sari dari tanah. Datin hujan menyuburkan padi, menghijaukan daun-daunan, dan mekarlah bunga, bergayutlah buah.

Dan jika kemarau datang layu semua. Di dalam segala makanan itu ada segala macam saringan yang di takdirkan Tuhan atas alam. Disana ada zat besi, zat putih telur, vitamin, kalori, hormon dan sebagainya. Dengan makanan itu teraturlah jalan darahnya, dan tidak dapat hidup kalau bukan dari zat bumi tempat dia dilahirkan itu. Dalam tubuh yang sehat, mengalirlah darah, bepusat pada jantung dan dari jantung mengalirlah darah itu keseluruh tubuh. Dalam darah itu terdapat zat yang akan menjadi mani. Setetes mani terdapat beribu-ribu bahkan bermilliun “tampang” yang akan dijadikan manusia, yang tersimpan dalam shulbi laki-laki dan taraib perempuan.

“Kemudian itu, Kami jadikan dia (setitik mani itu) ditempat yang tetap terpelihara” (ayat 13).

Dengan kehendak Ilahi bertemulah zat tampang dari laki-laki yang rupanya sebagai cacing yang sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Perpaduan keduanya, itulah yang dinamakan nutfah. Semakin lama semakin besarlah nutfah itu, dalam empat puluh hari. Dan dalam masa 40 hari mani yang telah berpadu, beransur menjadi darah segumpal. Untuk melihat contoh peralihan beransur kejadian itu, dapatlah kita memecahkan telur itu ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya aman dan terjamin, panas seimbang dengan dingin, di dalam rahim bunda kandung, itulah “qaraarin makiin” tempat yang terjamin terpelihara.

“Kemudian Kami jadikan pula mani itu menjadi segumpal darah, kemudian Kami jadikan pula segumpal darah itu menjadi segumpal

daging, dan daging itu Kami jadikan tulang, lalu tulang-tulang itu Kami liputi dengan daging pula” (ayat 14).

Lepas 40 hari dalam bentuk segumpal air mani berpadu itu dia pun bertukar rupa menjadi segumpal darah. Ketika Ibu telah hamil dalam dua tengah tiga bulan. Penggiligaan itu sangat berpengaruh atas badan si Ibu, pendingin, pendarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang tak enak makan. Dan setelah 40 hari berubah darah, dia beransur kian membeku, membeku terus hingga jadi segumpal daging, membeku terus hingga berubah sifatnya menjadi tulang. Dikelilingi tulang itu masih ada persediaan air yang kelaknyanya menjadi daging untuk menyelimuti tulang-tulang itu. Mulanya hanya sekumpulan tulang tetapi kian sehari telah ada bentuk kepala, kaki dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama kian diselimuti oleh daging. “Kemudian itu Kami ciptakan satu bentuk yang lain”. Pada saat itu dianugerahkan kepadanya “roh”, maka bernafaslah dia. Dengan dihembuskan nafas pada sekumpulan tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menjadi manusia. “Maha Suci Allah, Tuhan sependai-pandai membentuk” (ayat 14).

### **C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan**

#### **1. Pengertian Manajemen Asuhan kebidanan**

Manajemen asuhan kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk menorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Varney, 2012).

## 2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

### a. Langkah I Pengumpulan Data Dasar

Pengkajian adalah pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi keadaan pasien, data ini termasuk riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Data yang dikumpulkan meliputi data subjektif dan data objektif serta data penunjang (Varney, 2012).

#### 1) Data Subjektif

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap situasi dan kejadian, informasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh tenaga kesehatan secara independen tetapi melalui suatu sistem interaksi atau komunikasi (Varney, 2012).

##### a) Biodata

Biodata adalah untuk mengetahui status klien secara lengkap sehingga sesuai dengan sasaran (Varney, 2012) meliputi:

(1) Identitas bayi : nama, jenis kelamin, tanggal lahir, anak  
keberapa.

(2) Nama ibu : untuk mengenal dan mengetahui pasien, nama harus jelas dan lengkap agar tidak keliru dalam memberikan pelayanan.

- (3) Umur : dicatat dalam tahun untuk mengetahui resiko, seperti alat-alat reproduksi belum matang dan pikirannya belum siap.
- (4) Suku : untuk mengetahui faktor bawaan atau ras serta pengaruh adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari.
- (5) Pendidikan : perlu dinyatakan karena tingkat pendidikan berpengaruh pada pengetahuan sehingga bidan dapat memberikan konseling sesuai dengan pendidikannya.
- (6) Pekerjaan : untuk mengetahui status ekonomi keluarga, karena dapat mempengaruhi status gizi pasien tersebut.
- (7) Alamat : untuk mengetahui tempat tinggal serta mempermudah pemantauan bila diperlukan.

b) Keluhan Utama

Keluhan utama yaitu keluhan atau gejala yang menyebabkan pasien dibawah berobat. Pada bayi dengan asfiksia dapat terlihat dari apgar scorenya yang menyebabkan asfiksia (Varney, 2012).

2) Data Objektif

Data objektif adalah data yang sesungguhnya dapat diobservasi dan dilihat oleh tenaga kesehatan. Data objektif meliputi:

a) Status Generalis

- (1) Keadaan umum : tingkat kesadaran baik gerakan yang ektrim dan ketergantungan otot (Ngastya, 2009).
- (2) Kesadaran : untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien (Varney, 2012).
- (3) Tanda-tanda vital: meliputi suhu, pernafasan, dan nadi (Ngastya, 2009).
- (4) Panjang badan : panjang badan relatif normal, sesuai dengan usia bayi (Ngastya, 2009).
- (5) Berat badan : pada umumnya pasien asfiksia sedang mengalami penurunan berat badan karena kurangnya refleks menghisap (Ngastyah, 2009).
- (6) Lingkar kepala : untuk mengetahui pertumbuhan otak (Ngastiah, 2009)

b) Pemeriksaan Sistematis

- (1) Kepala : bentuk kepala ada kelainan atau tidak (Maryunani, 2010).
- (2) Muka : tidak ada kelainan (Maryunani, 2010).

- (3) Telinga : bentuk simetris kiri dan kanan, tidak ada kelainan (Maryunani, 2010).
- (4) Mulut : refleks hisap baik (Maryunani, 2010).
- (5) Hidung : simetris kiri dan kanan, tidak ada cupping hidung (Maryunani, 2010).
- (6) Leher : tidak ada pembengkakan atau benjolan (Maryunani, 2010).
- (7) Dada : bentuk simetris tidak ada wheering atau runchi dan irama jantung regular (Maryunani, 2010).
- (8) Tali pusat : tidak ada kelainan, dan tidak ada tanda-tanda infeksi (Maryunani, 2010).
- (9) Punggung : posisi tulang belakang normal, tidak ada pembengkakan ataupun benjolan (Maryunani, 2010)
- (10) Anus : terdapat lubang anus, lubang vagina tidak ada kelainan (Maryunani, 2010).
- (11) Antropometri : lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran lengan atas, panjang badan, dan berat badan (Maryunani, 2010).

b. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atau data-data yang dikumpulkan, data dasar yang salah

dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Kata masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena seberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi sungguh mendapatkan penanganan yang dituangkan kedalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah yang sering berkaitan dengan wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan masalah ini disertai dengan diagnosis (Varney, 2012).

Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumus dan diagnosa tujuannya digunakan karena masalah dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan (Varney, 2012).

#### 1) Diagnosa

Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan (Varney, 2012). Diagnosa pada kasus ini ditegakkan bayi Ny 'S' dengan asfiksia sedang.

#### 2) Masalah

Masalah pada umumnya yang normal pada bayi asfiksia (Varney, 2012). Dalam kasus asfiksia adalah ibu klien merasa khawatir, sulit tidur dan cemas dengan keadaan bayinya.

#### 3) Kebutuhan

Kebutuhan merupakan hal-hal yang dibutuhkan pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah yang didapatkan dengan analisa data (Varney, 2012).

c. Langkah III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini mengklasifikasikan masalah atas diagnosa potensial berdasarkan diagnosa masalah yang salah diklasifikasi. Langkah ini memberikan antisipasi bila kemungkinan dilakukan pencegahan sambil mengamati. Ujian bidan dapat bersiap-siap bila diagnosa dan masalah potensial ini benar-benar terjadi (Varney,2012).

d. Langkah IV Pelaksanaan Tindakan Segera/Kolaborasi

Menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan baru sesuai dengan prioritas masalah akan kebutuhan terhadap kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dengan masalah potensial pada step sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan mengenai segera. Dalam rumusan ini termasuk tindakan segera yang dilakukan secara mandiri, secara kolaborasi atau bersifat rujukan (Varney, 2012).

e. Langkah V Perumusan Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini direncanakan yang untuk dilakukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kebijakan terhadap diagnosa atas masalah yang telah diidentifikasi serta antisipasi (Varney,2012). Adapun rencana asuhan yang diberikan yaitu:

- 1) Anjurkan mempertahankan bayi di bawah infant warmer

Rasional: untuk menghangatkan bayi dan mengatur suhu bayi agar tetap normal.

- 2) Anjurkan mengatur posisi bayi sedikit ekstensi

Rasional: untuk memudahkan oksigen masuk ke paru-paru dan untuk membebaskan jalan nafas.

- 3) Lakukan pembersihan jalan nafas atau menghisap lendir menggunakan deele.

Rasional: untuk memudahkan oksigen masuk ke paru-paru

- 4) Mengeringkan bayi dan kain kering dan bersih sambil member rangsangantaktil.

Rasional: agar bayi merasa nyaman

- 5) Lakukan pemberian vitamin K dan salep mata

Rasional: untuk mencegah virus yang masuk kedalam tubuh

- 6) Lakukan observasi ttv

Rasional: untuk mengetahui tanda-tanda vital pasien berada dalam batas normal.

f. Langkah VI Pelaksanaan Tindakan

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh seperti yang telah dilakukan pada langkah V, dilaksanakan secara efisien. Perencanaan ini dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri mereka tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan agar langkah-langkah tersebut betul-betul dilaksanakan (Varney, 2012).

g. Langkah VII Evaluasi

Pada langkah ini dilaksanakan evaluasi dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan, apakah benar-benar terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya (Varney, 2012). Evaluasi asuhan kebidanan pada bayi asfiksia yaitu antara lain keadaan umum sudah baik, tanda-tanda vital dalam batas normal.

#### **D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)**

Menurut Varney (2012), pendokumentasian data perkembangan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan menggunakan SOAP yaitu:

##### **1. Subjektif**

Menggambarkan pendokumentasian hanya pengumpulan data klien. Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari keluarga pasien (identitas, umum, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, dan lain-lain). Apa yang dikatakan oleh klien merupakan hasil dari langkah atau dalam proses manajemen asuhan kebidanan.

##### **a. Objektif**

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien. Hasil laboratorium dan atau diagnosa lain yang dilaksanakan dalam data khusus untuk mendukung assessment.

b. Assessment

Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subjektif maupun objektif dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah maka proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik.

c. Planning

Apa yang dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan yang diambil dalam mengatasi masalah klien/memenuhi kebutuhan klien.

## **BAB III**

### **STUDI KASUS**

#### **ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PATOLOGI**

#### **PADA BAYI NY 'S' DENGAN ASFIKZIA SEDANG**

#### **DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA**

**TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017**

No. Register : 483xxx  
Tanggal Partus : 26 September 2017, Pukul 10.25 wita  
Tanggal Pengkajian : 26 September 2017, Pukul 10.30 wita  
Nama Pengkaji : Ratika

#### **LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR**

##### **A. IDENTITAS**

##### **1. Identitas Bayi**

Nama : Bayi "S"

Lahir : 26 September 2017, Pukul 10.25 WITA

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Tetebatu

## 2. Identitas Orang Tua

Nama : Ny”S”/Tn”P”

Umur : 22 tahun/23 tahun

Nikah : 1x/ ±10 bulan

Suku : Makassar/Jawa

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMK

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Buruh Harian

Alamat : Tetebatu

## B. DATA BIOLOGIS

1. Keluhan utama: keadaan bayi tidak langsung menangis, banyak tidur, belum bisa menghisap puting susu, bayi dibersihkan kemudian diletakkan di infant warmer, dan berat badan 3100 gram (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2017)
2. Riwayat selama kehamilan

Anak pertama dan tidak pernah keguguran, Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) tanggal 16 Desember 2016, Taksiran Persalinan (TP)

tanggal 23 September 2017, umur kehamilan  $\pm$  9 bulan, pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali di Puskesmas terdekat.

Imunisasi TT sebanyak 2 kali. TT I pada umur kehamilan  $\pm$ 5 bulan tanggal 6 April 2017, dan TT 2 pada umur kehamilan 6 bulan tanggal 10 Mei 2017. Selama hamil ibu pernah mengkonsumsi tablet Fe (zat besi), dan mengkonsumsi tablet kalsium 7 biji (10 biji dalam 1 tablet) setiap hari selama hamil.

### 3. Riwayat Kesehatan

Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes melitus. Ibu mempunyai alergi makanan yaitu udang, telur, dan mie. Tidak ada penyakit keluarga menurun, dan tidak ada ketergantungan obat.

### 4. Riwayat Kelahiran

Umur kehamilan 40 Minggu 4 hari, tanggal lahir 26 September 2017, pukul 10.25 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa, penolong persalinan adalah dokter berkolaborasi dengan bidan dan perawat, jenis persalinannya yaitu seksio sesar, dan lahir cukup bulan. Tidak segera manangis dengan apgar score 6/9, Berat Badan Lahir (BBL) 3100 gram, Panjang Badan Lahir (PBL) 48 cm, dan Jenis Kelamin (JK) laki-laki (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2017)

## 5. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bayi

### a. Nutrisi/Cairan

Refleks menghisap dan menelan lemah, pemberian cairan baik, bayi diberi Air Susu Ibu Perah (ASIP) yaitu 10 cc/3 Jam dengan menggunakan spoit melalui selang *Oral Gastric Tube* (OGT).

### b. Eliminasi

Belum pernah buang air kecil, buang air besar tampak mekonium dilubang anus.

### c. Tidur

Bayi belum pernah tidur.

### d. Personal Hyiegene

Bayi belum pernah mandi, dibersihkan dengan menggunakan kain basah atau tisu basah, dan pakaian bayi diganti setiap kali basah atau lembab dan kotor.

## 6. Apgar Score

Tabel 2.1 Penilaian Apgar Score

Tanda	0	1	2	Nilai	
<b>Frekuensi Jantung</b>	-	<100x/i	>100x/i	2	2
<b>Usaha Bernafas</b>	Tidak ada	Lemah, tidak teratur	Menangis dengan keras	1	2
<b>Tonus Otot</b>	Lemah	Fleksi pada ekstremitas	Bergerak dengan aktif	1	1
<b>Refleks</b>	Tidak ada	Meringis	Menangis dengan sangat keras	1	2
<b>Warna Kulit</b>	Pucat	Badan merah, ekstremitas kebiruan	Seluruh tubuh kemerahan	1	2
				6	9

Sumber: Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2017

#### 7. Pemeriksaan umum

Jenis kelamin laki-laki, berat badan sekarang 3100 gram, panjang badan 48 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu suhu 37,2°C, pernapasan 42 x/menit, denyut jantung 150 x/menit, dan pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, dan auskultasi yaitu:

##### a. Wajah

Simetris kiri dan kanan, bentuk bulat, tidak pucat, dan tidak ada tanda lahir.

b. Mata

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus, dan tidak ada sekret.

c. Mulut

Bibir tampak agak kering dan pucat, refleks menghisap lemah, pallatum tidak ada kelainan, lidah bersih, merah mudah, gusi tidak ada kelainan, dan terpasang selang *Oral Gastric Tube* (OGT).

d. Leher

Tonus otot leher lemah, tidak ada pembesaran atau pembengkakan, dan tidak ada nyeri tekan.

e. Dada dan perut

Simetris kiri dan kanan, gerakan dada ikut dengan gerakan nafas, puting susu ada, belum menonjol dan tampak tipis, keadaan tali pusat masih basah dan dijepit, tidak bengkak, tidak ada infeksi dan perdarahan, perut tidak kembung.

f. Genitalia dan Anus

Uretra berlubang, tampak testis membungkus skrotum, dan terdapat lubang anus.

g. Ekstremitas

a) Tangan: pergerakan lemah, jari tangan kiri dan kanan lengkap, dan refleks menggenggam kuat.

b) Kaki: pergerakan lemah, jari kaki kiri dan kanan lengkap, refleks babinsky dan refleks moro lemah.

h. Kulit

Integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan pada ekstremitas atas dan tampak kebiruan pada ekstremitas bawah, dan tidak ada lanugo.

8. Data Psikologis, Spritual, dan Ekonomi

Orang tua sangat senang dengan kelahiran bayinya, orang tua dapat bekerja sama dengan bidan dan dokter dalam perawatan bayinya terutama pemberian ASI, orang tua rajin shalat dan rajin berdoa agar anaknya segera sehat dan dapat berkumpul dengan keluarganya, hubungan ibu suami dan lingkungan sekitarnya baik, dan kedua orang tua berharap agar nutrisi bayinya dapat terpenuhi dengan ASI saja.

**LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL**

Diagnosa aktual: BCB/SMK/SC dengan Asfiksia Sedang

a. BCB/SMK/SC (Bayi Cukup Bulan/Sesuai Masa Kehamilan/Seksio Sesar)

1) Data subjektif

Ibu melahirkan cukup bulan (9 bulan), HPHT tanggal 16 Desember 2016, dan bayi lahir dengan seksio sesar dengan indikasi kala 1 fase laten, dan dengan berat badan lahir 3100 gram (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2017)

2) Data objektif

Masa gestasi 40 minggu 4 hari dan taksiran persalinan tanggal 23 September 2017, berat badan 3100 gram.

3) Analisa dan interpretasi data

Dilihat dari taksiran persalinan tanggal 23 September 2017 dan bayi lahir secara seksio sesar tanggal 26 September 2017 dengan berat badan sekarang 3100 gram, artinya bayi lahir secara seksio sesar dengan indikasi kala 1 fase laten masa gestasi/usia kehamilan 40 minggu 4 hari dan mempunyai berat badan dalam batas normal yaitu 3100 (normal: 2500 gram-4000 gram) dari seharusnya untuk masa kehamilan biasa disebut neonatus cukup bulan (Amiruddin, R, & Hasmi, 2014:138).

b. Bayi Berat Lahir Normal (BBLN)

1) Data subjektif

Ibu melahirkan tanggal 26 September 2017 dengan berat badan lahir 3100 gram dan HPHT tanggal 16 Desember 2016.

2) Data objektif

Taksiran persalinan tanggal 23 September 2017, berat badan sekarang 3100 gram, dan panjang badan 48 cm.

3) Analisa dan interpretasi data

Dilihat dari berat badan, berat badan bayi sekarang 3100 gram artinya bayi berat badan lahir normal yaitu bayi dengan berat badan 2500-

400 gram yang disebut bayi berat badan lahir normal (BBLN) (Marmi & Kukuh, R, 2015:3).

### **LANGKAH III. MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Diagnosa potensial:

#### 1. Antisipasi Terjadinya Asfiksia Berat

##### a. Data Subjektif

Anak pertama dan tidak pernah keguguran, selama hamil ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali di Puskesmas dan telah mendapatkan suntik TT sebanyak 2 kali serta mengkonsumsi tambel Fe (zat besi), ibu melahirkan cukup bulan dengan HPHT tanggal 16 Desember 2016, dan melahirkan tanggal 26 September 2017 dengan seksio sesar dengan indikasi kala 1 fase laten dan memiliki riwayat alergi makanan.

##### b. Data Objektif

Bayi lahir tanggal 26 September 2017, pukul 10.25 wita dengan berat badan 3100 gram, masa gestasi 40 minggu 4 hari, denyut jantung 140x/menit, pernapasan 42x/menit, suhu 37,2 °C, apgar score 6/9 dan bayi terbungkus kain dan dirawat di infant warmer.

##### c. Analisa dan interpretasi data

Bayi baru lahir tidak segera menangis disebabkan karena adanya gangguan serta transport O<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub> dari ibu kejanin, apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka akan mengakibatkan asfiksia berat dan akan mengakibatkan kematian.

#### **LANGKAH IV. TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI**

Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera/kolaborasi.

#### **LANGKAH V. MERENCANAKAN ASUHAN YANG MENYELURUH**

##### **A. Tujuan:**

1. Kebutuhan bayi akan nutrisi terpenuhi/teratasi.
2. Tidak terjadi asfiksia berat
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal.
4. Apgar score berubah

##### **B. Kriteria:**

1. Berat badan bayi bertambah.
2. Bayi dapat minum sesuai dengan kebutuhan.
3. Bayi tidak dirawat di inkubator.
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu denyut jantung (120x/menit-160x/menit), pernapasan (40x/menit-60x/menit), dan suhu (36,5°C-37,5°C).

##### **C. Rencana Tindakan**

Tanggal 26 September 2017, pukul 10.26 wita.

1. Keringkan tubuh bayi, ganti kain basah dengan kain yang kering dan bersih kemudian membungkus tubuh bayi.

Rasional:pada bayi baru lahir suhu diluar kandungan sangat diperlukan pengawasan sehingga tidak terjadi kehilangan panas.

2. Atur posisi bayi sedikit ekstensi dan lakukan pengisapan lendir pada mulut dan hidung bayi.

Rasional: agar cairan tidak teraspirasi kedalam paru-paru

3. Nilai usaha napas, denyut jantung dan warna kulit

Rasional: untuk mengetahui apakah bayi dapat bernapas spontan dan keadaan bayi dapat diketahui

4. Lakukan rangsangan taktil

Rasional: dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh rangsangan taktil dapat merangsang bayi untuk menangis

5. Anjurkan pada ibu sering menyusui bayinya.

Rasional:ASI merupakan nutrisi yang vital merupakan pertumbuhan sel saraf otak dan pemberian kalori untuk kerja sel-sel saraf, memudahkan penyerapan kalsium, dan mempercepat pengeluaran kalsium sebagai pemberian ASI.

6. Beri penjelasan tentang pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dan cara menyusui yang benar.

Rasional:rangsangan oleh isapan bayi merangsang hipofisis posterior mengeluarkan hormon oksitosin untuk sekresi ASI dan hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin untuk produksi ASI.

7. Bidan Jannah melakukan pemasangan selang *Oral Gastric Tube* (OGT)

Rasional: refleks menghisap dan refleks menelan bayi masih lemah sehingga selangnya digunakan untuk memasukkan ASI atau obat dengan menggunakan spoit.

8. Memberikan intake ASIP sebanyak 10 cc dengan menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Rasional: intake yang adekuat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi khususnya glukosa sehingga tidak terjadi hipoglikemia.

9. Observasi tanda-tanda vital

Rasional: untuk mengetahui keadaan umum bayi dan menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

10. Melakukan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Rasional: mengurangi resiko infeksi dan mencegah terjadinya infeksi silang.

11. Setiap kali bayi BAB/BAK ganti kain yang kering

Rasional: pakaian bayi yang basah menyebabkan bayi kehilangan panas secara konduksi.

12. Memberikan bayi obat injeksi, yaitu:

a. Vitamin K secara IM (*Intramuscular*)

b. Vitamin Hepatitis secara IM (*Intramuscular*)

Rasional: Vitamin K adalah meningkatkan pengumpulan dan pembekuan darah dalam tubuh. Vaksin Hepatitis adalah vaksin untuk mencegah hepatitis B

13. Memberikan saleb mata *oxytetracyclin* pada bayi baru lahir.

Rasional: *Oxytetracyclin* adalah obat dengan fungsi untuk secara aktif melawan berbagai organisme gram positif dan gram negatif.

14. Selimuti bayi dan meletakkan kedalam infant warmer

Rasional: menyelimuti dan menempatkan di tempat yang hangat mencegah kehilangan suhu tubuh bayi yang normal dan menjaga selalu kehangatan bayi.

## **LANGKAH VI. PENATALAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 26 September 2017 pukul 10.30 wita

1. Menganjurkan ibu memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi.

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya apabila ibu sudah bisa bergerak

2. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya perawatan payudara dan tentang cara pemberian ASIP yang benar.

Hasil: unuk persiapan mental ibu untuk menyusui, mencegah sumbatan ASI di saluran dan kelenjar susu sehingga ASI menjadi lancar.

3. Melakukan pemasangan selang *Oral Gastric Tube* (OGT)

Hasil: Bidan Jannah telah melakukan pemasangan OGT pada bayi

4. Memberikan intake ASIP sebanyak 10 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil: intake yang adekuat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi khususnya glukosa sehingga tidak terjadi hipoglikemia.

5. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil: a. Denyut jantung : 150 x/i

b. Pernapasan : 42 x/i

c. Suhu : 37,2 °C

6. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Hasil: telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.

7. Mengganti pakaian basah dengan pakaian yang kering jika BAB/BAK

Hasil: ibu telah melaksnakannya

8. Memberikan bayi obat injeksi, yaitu:

a. Vitamin K

b. Imunisasi Hepatitis

Hasil: telah diberi vitamin K, dan Imunisasi Hepatitis pada bayi.

9. Memberikan tetes mata *Oxytetracyclin* pada bayi baru lahir

Hasil: telah diberi obat tetes mata pada bayi

10. Menyelimuti bayi dan meletakkan ke dalam inkubator.

Hasil: bayi telah di dalam inkubator.

**LANGKAH VII. EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 26 September 2017, pukul 10.30 wita

A. Berat Badan: 3100 gram, Panjang Badan 48 cm.

B. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu :

- a. Denyut Jantung : 150 x/ i
- b. Pernapasan : 42x/ i
- c. Suhu : 37,2 °C

C. Kebutuhan bayi akan nutrisi belum terpenuhi, ditandai dengan minum menggunakan spoit lewat OGT dengan refleks menelan dan menghisap bayi masih lemah dan bayi tidak dapat menyusui pada ibunya dengan baik.

D. Tidak terjadi hipotermi, ditandai dengan suhu tubuh 37,2°C dan suhu tubuh teraba hangat serta dirawat di inkubator.

E. Tidak terjadi hipoglikemia ditandai dengan bantuan infus cairan glukosa dan ASIP untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.

F. Tidak terjadi hiperbilirubinemia dan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral karena diberi obat vitamin k, imunisasi hepatitis dan tetes mata *oxytetracyclin* untuk pengobatan infeksi yang akan terjadi pada bayi.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU

LAHIR PADA BAYI NY 'S' DENGAN ASFIKZIA SEDANG

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017 (Hari I)

No. Register : 483xxx  
Tanggal Partus : 26 September 2017, pukul 10.25 wita  
Tanggal Pengkajian : 26 September 2017, pukul 10.30wita  
Nama Pengkaji : Ratika

**IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**A. IDENTITAS**

1. Identitas Bayi

Nama : Bayi 'S'  
Lahir : 26 September 2017, pukul 10.25 wita  
Jenis Kelamin: Laki-Laki  
Alamat : Tete batu

2. Identitas Orang Tua

Nama : Ny 'S'/Tn 'P'  
Umur : 22 tahun/23 tahun  
Nikah : 1x/±10 bulan

Suku : Makassar/Jawa  
Agama : Islam/Islam  
Pendidikan : SMA/SMK  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Buruh Harian  
Alamat : Tetebatu

### **SUBJEKTIF (S)**

1. Keadaan bayi belum menangis, belum bisa menghisap puting susu, bayi di dalam inkubator dan berat badan 3100 gram,
2. Anak pertama dan tidak pernah keguguran
3. HPHT tanggal 16 Desember 2017
4. Selama hamil telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali di Puskesmas terdekat.
5. Selama hamil telah mendapatkan suntik TT sebanyak 2 kali. TT 1 pada usia kehamilan  $\pm$  5 bulan tanggal 6 April 2017, TT 2 pada usia kehamilan 6 bulan pada tanggal 10 Mei 2017 dan mengkonsumsi tablet kalk 10 biji (1 tablet), dan pernah mengkonsumsi tablet Fe (zat besi)
6. Ibu melahirkan cukup bulan (9 bulan) dengan HPHT tanggal 16 Desember 2016 dan melahirkan tanggal 26 September 2017 pukul 10.25 wita dengan seksio sesar dengan indikasi kala 1 fase laten, ditolong oleh dokter berkolaborasi dengan bidan dan perawat dengan BBL: 3100 gram, PBL: 48 cm dan lingkar kepala 33 cm, dan jenis kelamin laki-laki.

7. Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, dan diabetes melitus.
8. Tidak ada penyakit keluarga yang menurun
9. Ada riwayat alergi makanan yaitu udang, mie dan telur
10. Orang tua dapat bekerja sama dengan bidan dan dokter dalam perawatan bayinya terutama pemberian ASI.

### **OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi lemah
2. Kesadaran composmentis
3. TP tanggal 26 September 2017
4. Berat badan: 3100gram, PB: 48 cm, Jenis Kelamin: laki-laki
5. Tanda-tanda vital:
  - a. Suhu : 37,2 °C
  - b. denyut jantung : 150 x/menit
  - c. Pernapasan : 42 x/menit
6. Pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi dan auskultasi yaitu:
  - a. Wajah  
Simetris kiri dan kanan, bentuk bulat, tidak pucat, dan tidak ada tanda lahir.
  - b. Mata  
Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus, dan tidak ada sekret.

c. Mulut

Bibir tampak agak kering dan pucat, refleks menghisap lemah, pallatum tidak ada kelainan, lidah bersih, merah mudah, gusi tidak ada kelainan dan terpasang selang *Oral Gastric Tube* (OGT).

d. Leher

Tonus otot leher lemah, tidak ada pembesaran atau pembengkakan, dan tidak ada nyeri tekan ditandai dengan bayi tidak menangis.

e. Dada dan perut

Simetris kiri dan kanan, gerakan dada ikut dengan gerakan nafas, puting susu ada, belum menonjol dan tampak tipis, keadaan tali pusat masih basah dan dijepit, tidak bengkak, tidak ada infeksi dan perdarahan, perut tidak kembung.

f. Genitalia dan Anus

Uretra berlubang, tampak testis membungkus scrotum, dan terdapat lubang anus.

g. Ekstremitas

a) Tangan: pergerakan lemah, jari tangan kiri dan kanan lengkap, dan refleks menggenggam kuat.

b) Kaki: pergerakan lemah, jari kaki kiri dan kanan lengkap, refleks babinsky dan refleks moro lemah..

h. Kulit

Integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan pada ekstremitas atas, dan tampak kebiruan pada ekstremitas bawah, dan tidak ada lanugo.

**ASSESMENT (A)**

BCB/SMK/SC dengan Asfiksia Sedang umur I hari

**PLANNING (P)**

Tanggal 26 September 2017 pukul 10.30 wita

1. Menganjurkan ibu memberikan ASIP sesuai kebutuhan bayi.

Hasil: ibu bersedia memberikan ASIP pada bayinya.

2. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya perawatan payudara dan cara pemberian ASIP yang benar.

Hasil: untuk persiapan mental ibu untuk menyusui, mencegah sumbatan ASI di saluran dan kelenjar susu sehingga ASI menjadi lancar.

3. Melakukan pemasangan selang *Oral Gastric Tube* (OGT)

Hasil: Bidan Jannah telah melakukan pemasangan OGT pada bayi

4. Memberikan intake ASIP sebanyak 10 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil: intake yang adekuat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi khususnya glukosa sehingga tidak terjadi hipoglikemia.

5. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil: a. Denyut jantung : 150 x/i

- d. Pernapasan : 42 x/i
- e. Suhu : 37,2 °C

11. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Hasil: telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.

12. Mengganti pakaian basah dengan pakaian yang kering jika BAB/BAK

Hasil: ibu telah melakukannya

13. Memberikan bayi obat injeksi, yaitu:

- a. Vitamin K
- b. Imunisasi Hepatitis

Hasil: telah diberi vitamin K, dan Imunisasi Hepatitis pada bayi.

14. Memberikan obat tetes mata *Oxytetracyclin* pada bayi

Hasil: telah diberi obat tetes mata pada bayi

15. Menyelimuti bayi dan meletakkan ke dalam inkubator.

Hasil: bayi telah di dalam inkubator.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU

LAHIR PADA BAYI NY 'S' DENGAN ASFIKZIA SEDANG

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2017 (Hari II)

No. Register : 483xxx  
Tanggal Partus : 26 September 2017, pukul 10.25 wita  
Tanggal Pengkajian : 27 September 2017, pukul 11.20 wita  
Nama Pengkaji : Ratika

**SUBJEKTIF (S)**

1. Keadaan bayi masih lemah, belum bisa menghisap puting susu dan berat badan belum meningkat.
2. Bayi di dalam infant warmer
3. Masih terpasang selang OGT

**OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum masih lemah.
2. Berat badan : 3100 gram, panjang badan : 48 cm
3. Bayi dirawat di infant warmer
4. Bayi dibantu dengan pemberian ASIP dari ibunya
5. Tanda-tanda vital:
  - a. Suhu : 37,2 °C

- b. Denyut jantung : 150x/menit
  - c. Pernapasan : 42 x/menit
6. Konjungtiva tampak merah mudah
  7. Kulit tampak kemerahan, tipis, dan sedikit lemak
  8. Refleks menghisap dan menelan masih lemah
  9. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi
  10. Tali pusat dijepit, tampak bersih, tidak ada perdarahan dan infeksi.
  11. Gerakan tangan dan kaki masih lemah.

#### **ASSESSMENT (A)**

BCB/SMK/SC dengan Asfiksia Sedang umur II hari

#### **PLANNING (P)**

Tanggal 27 September 2017, pukul 11.20 wita

1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya perawatan payudara dan cara pemberian ASI yang benar.

Hasil: ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pentingnya perawatan payudara dan cara pemberian ASI yang benar.

2. Memberikan intake ASI perah sebanyak 10 cc dengan cara menggunakan spuit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil: bayi telah diberi minum

3. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil: denyut jantung 150 x/i, pernapasan 42 x/i, dan suhu 37,2 °C

4. Menimbang berat badan bayi setiap hari.

Hasil: berat badan bayi 3100 gram.

5. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Hasil: telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.

6. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah

Hasil: ibu telah melaksanakannya.

7. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

Hasil: ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

8. Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan meletakkan kedalam inkubator.

Hasil: bayi telah didalam inkubator

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU

LAHIR PADA BAYI NY 'S' DENGAN ASFIKZIA SEDANG

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017 (Hari III)

No. Register : 483xxx  
Tanggal Partus : 26 September 2017, pukul 10.25 wita  
Tanggal Pengkajian : 28 September 2017, pukul 10.10 wita  
Nama Pengkaji : Ratika

**SUBJEKTIF (S)**

1. Keadaan bayi baik, banyak tidur, sudah bisa menghisap puting susu dan berat badan sudah meningkat
2. Bayi dirawat gabung dengan ibunya
3. ASI sudah banyak keluar.

**OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi baik.
2. Berat badan: 3150 gram
3. Bayi dirawat gabung dengan ibunya
4. Bayi diberi ASI oleh ibunya secara on demend
5. Tanda-tanda vital:
  - a. Suhu : 36,8 °C

- b. Denyut jantung : 140 x/menit
- c. Pernapasan : 42 x/menit
- 6. Konjungtiva tampak merah mudah
- 7. kulit tampak kemerahan, tipis, dan sedikit lemak
- 8. Refleks menghisap dan menelan baik
- 9. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi
- 10. Abdomen tampak bersih.
- 11. Gerakan tangan dan kaki masih lemah

#### **ASSESSMENT (A)**

BCB/SMK/SC dengan Asfiksia Sedang hari ke III

#### **PLANNING (P)**

Tanggal 28 September 2017, pukul 08.30 wita

1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara *on demand* dan cara menyusui yang benar.

Hasil: ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pemberian ASI yang baik dan benar.

2. Mengobservasi tanda – tanda vital.

Hasil: denyut jantung 142 x/i, pernapasan 48 x/i, dan suhu 36,8 °C

3. Menimbang berat badan bayi setiap hari.

Hasil: berat badan bayi sekarang 3150 gram.

4. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah.

Hasil: ibu telah melaksanakannya

5. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

Hasil: ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

6. Mengajarkan ibu merawat bayi dengan metode kanguru.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan



Dari hasil pemantauan di RSUD Syekh Yusuf pada kasus Bayi Ny “S” dapat di simpulkan melalui table sebagai berikut:

No	Tanggal kunjungan	Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu	Keluhan	Tempat Kunjungan	Intervensi	Rasional
1	<b>Kunjungan I</b> Tanggal 26 September 2017 Pukul 10.26 Wita	S: 37,2 <sup>o</sup> C DJB:150x/menit P: 42x/menit	Keadaan bayi belum menagis, bayi di rawat di inkubator dan keadaan umum bayi masih lemah, pada pemeriksaan fisik terpasang oksigen	RSUD Syekh Yusuf Gowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganjurkan ibu memberikan ASIP sesuai kebutuhan bayi.</li> <li>2. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya perawatan payudara dan cara pemberian ASIP yang benar.</li> <li>3. Melakukan pemasangan selang <i>Oral Gastric Tube</i> (OGT)</li> <li>4. Memberikan intake ASIP sebanyak 10 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.</li> <li>5. Mengobservasi tanda – tanda vital</li> <li>6. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.</li> <li>7. Mengganti pakaian basah dengan pakaian yang kering jika BAB/BAK</li> <li>8. Memberikan bayi obat injeksi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Vitamin K</li> <li>b. Imunisasi Hepatitis</li> </ol> </li> <li>9. Memberikan obat tetes mata <i>Oxytetracyclin</i> pada bayi</li> <li>10. Menyelimuti bayi dan meletakkan ke dalam inkubator.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu bersedia memberikan ASIP pada bayinya.</li> <li>2. Untuk pers,pan mental ibu untuk menyusui, mencegah sumbatan ASI di saluran dan kelenjar susu sehingga ASI menjadi lancar.</li> <li>3. telah dilakukan pemasangan OGT pada bayi</li> <li>4. intake yang adekuat memenuhi</li> </ol>

				 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>kebutuhan nutrisi bayi khususnya glukosa sehingga tidak terjadi hipoglikemia.</p> <p>5. Denyut jantung : 150 x/i</p> <p>Pernapasan: 42x/i</p> <p>Suhu: 37,2 °C</p> <p>6. telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.</p> <p>7. Telah dilakukan</p> <p>8. telah diberi vitamin K, dan Imunisasi Hepatitis pada bayi</p> <p>9. telah diberi obat tetes mata pada bayi.</p> <p>10. bayi telah di dalam inkubator.</p>
--	--	--	--	---	--

2	<b>Kunjungan II</b> Tanggal 27 September 2017 Pukul 11.20 wita	S: 37,2 <sup>o</sup> C DJB:150x/menit P: 42x/menit	Keadaan bayi masih lemah, bayi masih dirawat di inkubator dan belum bisa menghisap puting susu	RSUD Syekh Yusuf Gowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya perawatan payudara dan cara pemberian ASIP yang benar.</li> <li>2. Memberikan intake ASI perah sebanyak 10 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.</li> <li>3. Mengobservasi tanda – tanda vital</li> <li>4. Menimbang berat badan bayi setiap hari.</li> <li>5. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.</li> <li>6. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah</li> <li>7. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.</li> <li>8. Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan meletakkan ke dalam inkubator.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pentingnya perawatan payudara dan cara pemberian ASIP yang benar.</li> <li>2. Bayi telah diberi minum.</li> <li>3. denyut jantung 150 x/i, pernapasan 42 x/i, dan suhu 37,2 °C.</li> <li>4. berat badan bayi 3100 gram.</li> <li>5. Telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.</li> <li>6. ibu telah melaksanakannya.</li> <li>7. ibu biasa mencuci tangan</li> </ol>
---	--	--	--	-----------------------	--	--

						sebelum dan sesudah tindakan. 8. bayi telah di dalam inkubator
3	<b>Kunjungan III</b> Tanggal 28 September 2017 Pukul: 10.10 wita	S: 36,8°C DJB:140x/menit P: 42x/menit	Keadaan bayi baik, banyak tidur, sudah bisa menghisap puting susu dan bayi dirawat gabung dengan ibunya.	RSUD Syekh Yusuf Gowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara <i>on demand</i> dan cara menyusui yang benar.</li> <li>2. Mengobservasi tanda – tanda vital</li> <li>3. Menimbang berat badan bayi setiap hari.</li> <li>4. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah</li> <li>5. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.</li> <li>6. Mengajarkan ibu merawat bayi dengan metode kanguru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pemberian ASI yang baik dan benar.</li> <li>2. denyut jantung 142 x/i, pernapasan 48 x/i, dan suhu 36,8 °C</li> <li>3. berat badan bayi sekarang 3150 gram.</li> <li>4. ibu telah melaksanakannya</li> <li>5. ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan</li> <li>6. ibu mengerti dan bersedia melakukan</li> </ol>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Dari hasil pemantauan di rumah pasien pada kasus Bayi Ny “S” dapat di simpulkan melalui table sebagai berikut:

No	Tanggal Kunjungan	Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernapasan dan Suhu	Keadaan Bayi	Tempat Kunjungan	Intervensi	Rasional
1	<b>Kunjungan I Tanggal 06 Oktober 2017</b>	S: 36,6°C DJB:145x/menit P: 40x/menit	Bayi tidak menagis, BAB dan BAK baik, aktif bergerak, reflex meghisap baik	Rumah pasien di Tetebatu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pada ibu pentingnya melakukan perawatan payudara.</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian bayi bila sudah lembab.</li> <li>3. Menjelaskan ibu pentingnya personal hygiene</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI secara <i>on demend</i></li> <li>5. Memberitahu ibu pentingnya membersihkan payudara sebelum menyusui bayinya</li> <li>6. Mengobservasi tanda-tanda vital</li> <li>7. Menimbang berat badan</li> <li>8. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>2. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>3. ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan</li> <li>4. ibu mau dan bersedia memberikan ASI kepada bayinya</li> <li>5. ibu bersedia dan mau melakukannya hipoglikemia.</li> <li>6. Denyut jantung : 145 x/i Pernapasan: 40x/i</li> </ol>

						Suhu: 36,6 °C 7. BB : 3250 gram 8. Ibu bersedia
2	<b>Kunjungan II</b> Tanggal 07 Oktober 2017	S: 36,6°C DJB: 150x/menit P: 42x/menit	Bayi tidak menagis, BAB dan BAK baik, aktif bergerak, reflex meghisap baik	Rumah pasien di Tetebatu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pada ibu pentingnya melakukan perawatan payudara.</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian bayi bila sudah lembab.</li> <li>3. Menjelaskan ibu pentingnya personal hygiene</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI secara <i>on demend</i></li> <li>5. Memberitahu ibu pentingnya membersihkan payudara sebelum menyusui bayinya</li> <li>6. Mengobservasi tanda-tanda vital</li> <li>7. Menimbang berat badan</li> <li>8. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>2. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>3. ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan</li> <li>4. ibu mau dan bersedia memberikan ASI kepada bayinya</li> <li>5. ibu bersedia dan mau melakukannya hipoglikemia.</li> <li>6. Denyut jantung : 150 x/i Pernapasan: 42x/i</li> </ol>

3	<b>Kunjungan III</b> Tanggal 08 Oktober 2017	S: 36,8 <sup>o</sup> C DJB:140x/menit P: 42x/menit	Bayi tidak menagis, BAB dan BAK baik, aktif bergerak, reflex meghisap baik	Rumah pasien di Tetebatu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pada ibu pentingnya melakukan perawatan payudara.</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian bayi bila sudah lembab.</li> <li>3. Menjelaskan ibu pentingnya personal hygiene</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI secara <i>on demend</i></li> <li>5. Memberitahu ibu pentingnya membersihkan payudara sebelum menyusui bayinya</li> <li>6. Mengobservasi tanda-tanda vital</li> <li>7. Menimbang berat badan</li> <li>8. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>2. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>3. ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan</li> <li>4. ibu mau dan bersedia memberikan ASI kepada bayinya</li> <li>5. ibu bersedia dan mau melakukannya hipoglikemia.</li> <li>6. Denyut jantung : 145 x/i Pernapasan: 40x/i Suhu: 36,6 °C</li> <li>7. BB : 3250 gram</li> <li>8. Ibu bersedia</li> </ol>
---	---	--	--	--------------------------	--	--

<p><b>Kunjungan IV</b> Tanggal 09 Oktober 2017</p>	<p>S: 36,8<sup>o</sup>C DJB:140x/menit P: 42x/menit</p>	<p>Bayi tidak menagis, BAB dan BAK baik, aktif bergerak, reflex meghisap baik</p>	<p>Rumah pasien di Tetebatu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pada ibu pentingnya melakukan perawatan payudara.</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian bayi bila sudah lembab.</li> <li>3. Menjelaskan ibu pentingnya personal hygiene</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI secara <i>on demend</i></li> <li>5. Memberitahu ibu pentingnya membersihkan payudara sebelum menyusui bayinya</li> <li>6. Mengobservasi tanda-tanda vital</li> <li>7. Menimbang berat badan</li> <li>8. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>2. ibu mengerti dan mau melakukannya</li> <li>3. ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan</li> <li>4. ibu mau dan bersedia memberikan ASI kepada bayinya</li> <li>5. ibu bersedia dan mau melakukannya hipoglikemia.</li> <li>6. Denyut jantung : 145 x/i</li> <li>7. Pernapasan: 40x/i Suhu: 36,6 °C BB : 3300 gram</li> <li>8. Ibu bersedia</li> </ol>
--	---	---	---------------------------------	--	--

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny ''S'' dengan asfiksia sedang, kasus ini diambil di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Gowa dan asuhan dilakukan selama 3 hari mulai dari tanggal 26 September- 28 September 2017 dan dilanjutkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan kunjungan rumah sebanyak 4 kali di Tetebatu Kab. Gowa.

Kunjungan pertama dan kedua tanggal 26 September 2017 dan 27 September 2017 serta kunjungan ketiga tanggal 28 September 2017. Di ruang perinatologi asuhan dilakukan dengan bantuan bidan atau tenaga kesehatan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang tersedia dan sesuai standar rumah sakit, sedangkan asuhan dirumah dilakukan oleh saya sendiri dengan peralatan saya sendiri.

Pembahasan ini akan membahas tentang perbandingan studi kasus pada bayi Ny''S'' dengan asfiksia sedang dengan tinjauan teoritis. Pembahasan akan diuraikan secara narasi dengan 7 langkah varney dan soap sebagai berikut.

#### **Langkah I Pengumpulan Data Dasar (Pengkajian)**

Tahap identifikasi data dasar (pengkajian) merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai bayi Ny ''S'',

baik orang tua maupun bidan dan dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang diambil dari studi kasus bayi Ny ‘‘S’’ dengan Asfiksia Sedang selama bayi dirawat di Rumah Sakit sampai dilakukan kunjungan rumah klien meliputi:

Pengkajian anamnesa yaitu HPHT tanggal 16 Desember 2016, taksiran persalinan tanggal 23 September 2017, anak pertama dan tidak pernah keguguran selama hamil pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali, imunisasi TT 2 kali, selama hamil ibu pernah mengonsumsi tablet Fe per hari, tidak ada keluarga menderita riwayat penyakit asma, hipertensi, diabetes melitus dan penyakit menular lainnya. Ibu mempunyai alergi makanan yaitu udang, telur dan mie. Bayi lahir secara seksio sesar, umur kehamilan 40 minggu 4 hari, dengan berat badan 3100 gram dan panjang badan 48 cm, jenis kelamin laki-laki pada tanggal 26 September 2017, pukul 10.25 wita.

Berdasarkan teori, kunjungan *Antenatal Care* (ANC) atau pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan yaitu trimester I 1 kali sebelum umur kehamilan 14 minggu, trimester II 1 kali umur kehamilan 14-28 minggu, dan trimester III 2 kali umur kehamilan 28-36 minggu dan setelah 36 minggu (Lalita, EMF, 2013:104). Pada kasus asfiksia sangat berhubungan dengan kelahiran dengan cara seksio sesar hal ini karena indikasi yang paling utama yang menyebabkan asfiksia yaitu kegagalan kemajuan

pembukaan jalan lahir, gawat janin, disproporsi sefalovelfik, letak janin abnormal, prematur dan juga riwayat seksio sesar sebelumnya (JAP, 2014).

Pengkajian pertama diumur 0 hari dirawat di infant warmer, keadaan umum bayi lemah, berat badan 3100 gram, refleks menghisap dan menelan lemah dan bayi belum bisa menghisap puting susu ibu, terpasang selang OGT pada bayi, tanda-tanda vital: suhu 37,2 °C, denyut jantung 150 x/menit, pernapasan 40 x/menit, dada ikut dengan gerakan nafas, keadaan tali pusat masih basah dan dijepit, tidak bengkak, tidak ada infeksi dan perdarahan, gerakan tangan dan kaki lemah, dan integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan pada ekstremitas atas dan tambak kebiruan pada ekstremitas bawah, dan tidak ada lanugo dan bayi diberi ASIP dengan menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Menurut teori, asfiksia perinatal didefinisikan sebagai bahaya pada janin atau bayi baru lahir yang disebabkan oleh kekurangan oksigen (hipoksia) dan atau kekerangan perfusi (iskemia) dari berbagai organ dengan intensitas yang cukup untuk mendorong perubahan metabolisme aerob terhadap metabolisme anaerob. Memicu asidosis metabolik dan dekompensasi kardiovaskular (gagal jantung), seperti vasodilatasi perifer dan penurunan curah jantung, mengakibatkan hipotensi janin berat dan mengurangi aliran darah serebral dan akibatnya kerusakan otak dan disfungsi organ atau kematian janin/neonatal (Launa, dkk. 2016).

Oksigen merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan janin baik sebelum maupun sesudah persalinan.

Cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan setelah lahir:

a. Sebelum lahir

Seluruh oksigen yang dibutuhkan janin diberikan melalui mekanisme difusi melalui plasenta yang berasal dari ibu ke darah janin. Saat dalam uterus, hanya sebagian kecil darah janin di alirkan ke paru-paru janin. Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen atau jalan untuk mengeluarkan karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ). Oleh karena itu, aliran darah paru tidak penting untuk mempertahankan oksigenasi janin yang normal dan keseimbangan asam basah. Paru janin berkembang di dalam uterus, akan tetapi alveoli di paru janin masih terisi oleh cairan, bukan udara. Pembuluh arteriol di dalam paru janin dalam keadaan kontriksi sehingga tekanan oksigen ( $\text{O}_2$ ) parsial rendah. Hampir seluruh darah dari jantung kanan tidak dapat melalui paru karena konstriksi pembuluh darah janin, sehingga darah dialirkan melalui pembuluh yang bertekanan lebih rendah yaitu duktus arteriosus kemudian masuk ke aorta (Indrayani dan Djami, 2014).

b. Setelah lahir

Bayi tidak lagi berhubungan dengan plasenta dan akan segera bergantung pada paru sebagai sumber utama oksigen, karena itu dalam beberapa saat cairan paru harus diserap dari alveoli, setelah itu paru harus terisi udara yang mengandung oksigen dan pembuluh darah di paru harus berelaksasi untuk meningkatkan aliran ke alveoli. Pengisian alveoli oleh udara akan memungkinkan oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah di sekitar

alveoli. Oksigen diserap untuk diedarkan keseluruh tubuh (Indrayani dan Djami, 2014).

Arteri dan vena umbilikalis akan menutup sehingga menurunkan tahanan pada sirkulasi plasenta dan meningkatkan tekanan darah sistemik. Akibat dari tekanan udara dan peningkatan kadar oksigen di alveoli, pembuluh darah paru akan mengalami relaksasi sehingga tahanan terhadap aliran darah berkurang. Keadaan relaksasi tersebut dan peningkatan tekanan darah sistemik, menyebabkan tekanan pada arteri pulmonalis lebih rendah dibandingkan tekanan sistemik sehingga aliran darah paru meningkat sehingga aliran pada duktus arteriosus menurun. Oksigen yang diabsorpsi di alveoli oleh pembuluh darah di vena pulmonalis dan darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke bagian jantung kiri, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh bayi baru lahir. Pada kebanyakan keadaan, udara menyediakan oksigen (21%) untuk menginisiasi relaksasi pembuluh darah paru. Pada saat kadar oksigen meningkat dan pembuluh darah paru mengalami relaksasi, duktus arteriosus mulai menyempit. Darah yang sebelumnya melalui duktus arteriosus sekarang melalui paru-paru, akan mengambil banyak oksigen untuk dialirkan keseluruh jaringan tubuh (Indrayani dan Djami, 2014).

Pada akhir masa transisi normal, bayi menghirup udara dan menggunakan paru-parunya untuk mendapatkan oksigen. Tangisan pertama dan terikan nafas yang dalam akan mendorong cairan dari dalam nafasnya. Oksigen dan pengembangan paru merupakan rangsangan utama relaksasi pembuluh darah paru.

Pada saat oksigen masuk adekuat dalam pembuluh darah, warna kulit bayi akan berubah dari abu-abu/biru menjadi kemerahan (Indrayani dan Djami, S.ST, 2013).

Faktor yang menyebabkan asfiksia neonatorum antara lain faktor keadaan ibu (usia ibu, hipertensi pada kehamilan, pendarahan antepartum, demam selama persalinan infeksi berat, kehamilan postdate, amnionitis, anemia dan paritas), faktor keadaan bayi (bayi prematur, berat bayi lahir, kelainan bawaan dan air ketuban bercampur mekonium), faktor plasenta (lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul tali pusat dan prolapsus tali pusat) dan faktor neonatus (pemakaian obat analgesi/anastesi yang berlebihan dan trauma persalinan) dan faktor persalinan. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan fetus. Tekanan darah tinggi dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan janin dalam kandungan atau *Intrauterine Growth Restriction (IUGR)* dan kelahiran mati, hal ini disebabkan karena preeklampsia dan eklampsi pada ibu akan menyebabkan pengapuran di daerah plasenta. Sedangkan bayi memperoleh makanan dan oksigen dari plasenta, dengan adanya pengapuran di daerah plasenta, suplai makanan dan oksigen yang masuk kejanin berkurang (Gilang,2012).

Menurut Winkjosastro, vasokonstriksi pembuluh darah mengakibatkan kurangnya suplai darah ke plasenta sehingga terjadi hipoksia janin. Akibat lanjut dari hipoksia janin adalah gangguan pertukaran gas antara oksigen dan karbondioksida sehingga terjadi asfiksia neonatorum. Pengembangan paru bayi baru lahir terjadi pada menit-menit pertama kemudian disusul dengan pernapasan teratur dan tangisan bayi. Proses perangsangan pernapasan ini dimulai dari tekanan

mekanik dada pada persalinan, disusul dengan keadaan penurunan tekanan oksigen arterial dan peningkatan tekanan karbondioksida arterial, sehingga sinus karotikus terangsang terjadinya proses bernapas. Bila mengalami hipoksia akibat suplai oksigen ke plasenta menurun karena efek hipertensi dan proteinuria sejak intrauterin, maka saat persalinan maupun pasca persalinan beresiko asfiksia (Gilang, 2012)

Pengkajian umur 1 hari masih di inkubator, berat badan 3100 gram, panjang badan 48 cm, refleks menghisap dan menelan lemah dan bayi belum bisa menghisap puting susu ibu, terpasang selang OGT pada bayi, tanda-tanda vital : suhu 36,8 °C, denyut jantung 140 x/menit, pernapasan 42 x/menit, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, gerakan tangan dan kaki lemah, dan integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang atau sedikit, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo, dan bayi diberi ASIP dengan menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Bila janin kekurangan O<sub>2</sub> dan kadar CO<sub>2</sub> bertambah, timbul rangsangan terhadap *N.vagus* sehingga bunyi jantung janin menjadi lambat. Bila kekurangan O<sub>2</sub> ini terus berlangsung, maka *N.vagus* tidak dapat dipengaruhi lagi. Timbullah kini rangsang dari *N. Simpatikus* DJJ menjadi cepat akhirnya irreguler dan menghilang. Secara klinis tanda-tanda asfiksia adalah denyut jantung janin yang lebih cepat dari 160 x/menit atau kurang dari 100 x/menit, halus dan irreguler, serta adanya pengeluaran mekonium. Kekurangan O<sub>2</sub> juga merangsang usus, sehingga mekonium keluar sebagai tanda janin dalam asfiksia.

- a. Jika DJJ normal dan ada mekonium : janin mulai asfiksia
- b. Jika DJJ lebih dari 160 x/menit dan ada mekonium : janin sedang asfiksia
- c. Jika DJJ kurang dari 100 x/menit dan ada mekonium : janin dalam keadaan gawat

Janin akan mengadakan pernapasan intrauterin, dan bila kita periksa kemudian, terdapat banyak air ketuban dan mekonium dalam paru. Bronkus tersumbat dan terjadi atelektasis, bila janin lahir alveoli tidak berkembang (Mochtar,2011)

Bayi dapat mengalami apnu atau menunjukkan upaya pernapasan yang tidak cukup untuk kebutuhan ventilasi paru-paru, kondisi ini menyebabkan kurangnya pengambilan O<sub>2</sub> dan pengeluaran CO<sub>2</sub>. Pada kelahiran, peredaran darah di paru-paru harus meningkat untuk memungkinkan proses oksigenisasi yang cukup. Keadaan ini akan dicapai dengan terbukanya arterioli dan diisi darah yang sebelumnya dialirkan dari paru-paru melalui duktus arteriosus. Bayi dengan asfiksia, hipoksia, asidosis akan mempertahankan pola sirkulasi janin dengan menurunkan peredaran darah paru-paru. Pada awal asfiksia darah lebih banyak dialirkan ke otak dan jantung. Dengan adanya hipoksia dan asidosis maka fungsi miokardium menurun, curah jantung menurun dan aliran darah ke alat-alat vital juga berkurang (Saifuddin,2009).

Pengkajian umur 2 hari masih di inkubator, keadaan umum bayi sedang, berat badan 3100 gram, refleks menghisap dan menelan lemah dan bayi belum

bisa menghisap puting susu ibu, terpasang selang *OGT* pada bayi, tanda-tanda vital : suhu 36,8 °C, denyut jantung : 142 x/menit, pernapasan 46 x/menit, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, dan integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo, tali pusat sudah mulai kering, tampak bersih, tidak ada perdarahan dan infeksi, gerakan tangan dan kaki masih lemah dan dibagian tangan masih terpasang infus, dan bayi diberi ASI Perah dengan menggunakan spoit lewat *OGT* tiap 3 jam.

Pengkajian umur 3 hari sudah dirawat gabung dengan ibunya, keadaan umum bayi baik, berat badan 3150 gram, refleks menghisap dan menelan baik, bayi sudah bisa menghisap puting susu ibu, tidak terpasang selang pada mulut bayi, tanda-tanda vital: suhu 36,6 °C, denyut jantung: 146 x/menit, pernapasan 42 x/menit, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang atau sedikit, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo, abdomen tampak bersih, gerakan tangan dan kaki baik dan sudah tidak terpasang infus dibagian tangan, dan bayi diberi ASI secara on demand oleh ibunya.

Pengkajian dirumah umur bayi 10 hari keadaan bayi telah membaik dan sudah bisa menghisap puting susu dan menelan dengan baik, bayi banyak tidur dan ASI banyak, bayi sudah BAB dan kencing, bayi diberi ASI saat bayi bangun atau lapar dan menangis, keadaan umum bayi baik, berat badan 3200 gram, panjang badan 52 cm, tanda-tanda vital: suhu 36,7 °C, denyut jantung: 149 x/menit, pernapasan 50 x/menit, konjungtiva tampak merah mudah, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, kulit tampak kemerahan dan lemak sudah ada, refleks

menghisap dan menelan cukup baik, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, testis membungkus scrotum, dan gerakan tangan dan kaki aktif. Keadaan bayi telah membaik, berat badan naik, sudah bisa menghisap puting susu dan menelan dengan baik.

Berdasarkan teoritis, etiologi asfiksia yaitu janin sangat bergantung pada fungsi plasenta sebagai tempat pertukaran oksigen, nutrisi dan pembuangan produk sisa. Gangguan pada aliran darah umbilikal maupun plasenta dapat menyebabkan terjadinya asfiksia. Asfiksia dapat terjadi selama kehamilan, pada proses persalinan atau periode segera setelah lahir (Indrayani, 2013).

Selama kehamilan, beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah *uteroplasenter* sehingga pasokan oksigen ke bayi menjadi kurang. Hipoksia bayi di dalam uterus ditunjukkan dengan gawat janin yang berlanjut menjadi asfiksia pada sesaat bayi baru lahir. Beberapa faktor yang diketahui dapat menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir, di antaranya adalah faktor ibu, tali pusat bayi dan kondisi bayi.

a. Faktor Ibu

- 1) Preeklampsia dan eklampsia (sering terjadi)
- 2) Pendarahan abnormal (plasenta previa atau solusio plasenta)
- 3) Partus lama atau partus macet
- 4) Demam selama persalinan
- 5) Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV)

- 6) Kehamilan postmatur atau setelah usia kehamilan 42 minggu (Mario Tando, 2013).

b. Faktor Plasenta

- 1) Infark plasenta yaitu terjadinya pematangan plasenta, noduler dan keras sehingga tidak berfungsi dalam pertukaran nutrisi.
- 2) Solution plasenta yaitu terlepasnya plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir. Biasanya terjadi pada trimester III, walaupun dapat pula terjadi pada setiap saat dalam kehamilan.
- 3) Plasenta previa yaitu plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen bawa uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal plasenta terletak dibagian atas uterus (Dewi, 2014).

c. Faktor Keadaan Tali Pusat

- 1) Inersio velamentosa adalah insersi tali pusat pada selaput janin. Jenis insersi tali pusat ini sangat penting dari segi praktik, karena pembuluh-pembuluh umbikaligus, diselaput ketuban, terpisah jauh dari tepi plasenta, dan mencapai keliling tepi plasenta dengan hanya dilapisi oleh satu lapisan amnion.
- 2) Prolapsus vunikuli (prolapsus tali pusat) adalah ketika tali pusat keluar dari uterus mendahului bagian presentasi. Berikut pembagian prolapsus tali pusat.

- 3) Tali pusat menumbung disebut juga prolapsus funikuli adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada disamping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir, tali pusat dapat prolaps ke dalam vagina atau bahkan diluar vagina setelah ketuban pecah. Tali pusat menumbung secara langsung tidak mempengaruhi keadaan ibu sebaliknya sangat membahayakan janin karena tali pusat sangat tertekan antara bagian depan janin dan dinding panggul yang akhirnya menimbulkan asfiksia pada janin. Bahaya terbesar ada pada presentasi kepala, karena setiap saat tali pusat dapat terjepit antara bagian terendah janin dengan jalan lahir yang dapat mengakibatkan gangguan oksigenasi janin.
- 4) Tali pusat terdepan disebut juga tali pusat terkemuka yaitu jika tali pusat berada disamping bagian besar janin dapat teraba pada kanalis servikalis, atau lebih rendah dari bagian bawah janin sedang ketuban masih intak (utuh) atau belum pecah. Pada tali pusat terdepan, sebelum ketuban pecah, tetapi setelah ketuban pecah, bahaya kematian janin sangat besar.
- 5) Torsi tali pusat yaitu terjadi akibat gerakan janin, sehingga tali pusat terpilin.
- 6) Tali pusat pendek yaitu tali pusat yang sangat pendek membuat abdomen janin berhubungan dengan plasenta, keadaan ini selalu diikuti dengan hernia umbilikalis. Normalnya panjang tali pusat 50-55

cm. Tali pusat yang terlalu pendek dapat menimbulkan hernia umbilikalisis, solusio plasenta, persalinan tidak maju karena tali pusat tertarik, mungkin bunyi jantung menjadi buruk, dan inversion uteri.

- 7) Lilitan tali pusat yang sering terjadi pada kasus asfiksia, biasanya terdapat pada leher bayi. Lilitan tali pusat menyebabkan tali pusat menjadi relatif pendek dan mungkin juga menyebabkan letak defleksi. Setelah kepala anak lahir, lilitan perlu segera dibebaskan melalui kepala atau digunting antara 2 Kocher (Dewi, 2014).

#### d. Faktor Janin

- 1) Kelainan genetika
- 2) Kelainan kromosom
- 3) Kelainan pertumbuhan
- 4) Mal nutrisi janin (sering terjadi)

Bila mal nutrisi janin terjadi diawal kehamilan, maka bayi bisa lahir mati, dapat juga terjadi pertumbuhan lambat, sehingga terjadi apayang disebut SGA (*Small Gestational Age*) atau bayi lebih kecil yang seharusnya sesuai umur kehamilan (Dewi, 2014).

Tanda-tanda dan gejala bayi yang mengalami asfiksia pada bayi baru lahir meliputi:

- a. Tidak bernafas atau bernafas megap-megap
- b. Warna kulit kebiruan
- c. Kejang

- d. Penurunan kesadaran
- e. Pernafasan cepat
- f. Nadi cepat
- g. Nilai apgar kurang dari 6

Untuk menentukan tingkat asfiksia, apakah bayi mengalami asfiksia berat, sedang atau ringan/normal dapat dipakai penilaian apgar (Arief dan Kristiyanasari, 2009).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan presentase belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500 – 4000 gram, nilai Apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan (Rukiah, dkk, 2013: 2). Bayi kurang bulan ialah bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu (259 hari) (Amiruddin, R, & Hasmi, 2014:138).

Asfiksia neonatorum adalah suatu kondisi bayi dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O<sub>2</sub> dan makin dan dapat meningkatkan CO<sub>2</sub> yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut (Rukiyah dan Yulianti, 2013:249). Selama kehamilan, beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah *uteroplasenter* sehingga pasokan oksigen ke bayi menjadi kurang. Hipoksia bayi di dalam uterus ditunjukkan dengan gawat janin yang berlanjut menjadi asfiksia pada sesaat bayi baru lahir, diantaranya adalah faktor ibu, faktor plasenta, faktor tali pusat, faktor janin (Dewi, 2014).

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi kasus pada bayi Ny 'S' dengan Asfiksia Sedang ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan bayi Ny 'S' dengan bayi asfiksia sedang.

### **Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual**

Berdasarkan data yang diperoleh diagnosa atau masalah aktual pada bayi Ny 'S' adalah BCB/SMK/SC dengan Asfiksia Sedang. Bayi dengan berat badan 3100 gram umur 0 hari dengan konsep teori bahwa bayi berat lahir adalah bayi yang lahir dengan berat badan 2500 gram sampai 4000 gram, maka hal ini sesuai dengan data yang ada yang menandakan bayi tersebut adalah bayi berat lahir normal (Kementrian Republik Indonesia, 2010). Bayi baru lahir normal memiliki panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-38, lingkar lengan 11-12 cm, frekuensi denyut jantung 120-160x/menit, pernafasan 40-60x/menit, lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai apgar >7, refleks-refleks sudah terbentuk dengan baik, organ genitalia pada bayi laki-laki testis sudah berada pada skrotum dan penis berlubang. Mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan (Dewi, 2010).

Bayi lahir secara normal atau dengan seksio sesar, masa gestasi 40 minggu 4 hari yaitu BCB/SMK/SC dengan konsep teori bahwa neonatus cukup bulan. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir. Neonatus dini berusia 0-7 hari dan Neonatus lanjut berusia 7-28 hari. Bayi baru

lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram (Muslihatun,2010). Ciri-ciri bayi baru lahir (neonatus) normal adalah berat badan 2500-4000 gram, panjang badan lahir 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar kepala 33-35 cm, frekuensi jantung 180 denyut/menit, kemudian menurun sampai 120-140 denyut/menit, pernapasan pada beberapa menit pertama cepat kira-kira 80 kali/menit, kemudian menurun setelah tenang kira-kira 40 kali/menit, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk dan diliputi verniks kaseosa, rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna, kuku agak panjang dan lemas, genetalia: labia mayora sudah menutupi labia minora (pada perempuan), testis sudah turun (pada anak laki-laki) (Dahlia et al,2012).

### **Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial**

Adapun masalah potensial yang dapat ditegakkan pada studi kasus ini adalah gangguan pernapasan dan gangguan imunologi ini berpotensi terjadi asfiksia berat. Asfiksia berarti hipoksia yang progresif, penimbunan CO<sub>2</sub> dan asidosis. Bila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat mengakibatkan kerusakan otak atau kematian. Asfiksia juga dapat mempengaruhi fungsi organ vital lainnya. Pada bayi yang mengalami kekurangan oksigen akan terjadi pernapasan yang cepat dalam periode yang singkat. Apabila asfiksia berlanjut, gerakan pernafasan akan berhenti, denyut jantung juga mulai menurun, sedangkan tonus neuromuscular berkurang

secara berangsur-angsur dan bayi memasuki periode apnea yang dikenal sebagai apnea primer. Perlu diketahui bahwa kondisi pernafasan megap-megap dan tonus otot yang turun juga dapat terjadi akibat obat-obat yang diberikan kepada ibunya. Biasanya pemberian perangsangan dan oksigen selama periode apnea primer dapat merangsang terjadinya pernafasan spontan. Apabila asfiksia berlanjut, bayi akan menunjukkan pernafasan megap-megap yang dalam, denyut jantung terus menurun, tekanan darah bayi juga mulai menurun dan bayi akan terlihat lemas (*flaccid*). Pernafasan makin lama makin lemah sampai bayi memasuki periode apneayang disebut apnea sekunder (Saifuddin,2009).

Menurut Mochtar tahun 2011:293 Asfiksia di klasifikasikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

1. Asfiksia berat (nilai apgar 0-3)

Memerlukan resusitasi segera secara aktif, dan pemberian oksigen terkendali. Karena selalu disertai asidosis maka perlu diberikan natrikus bikarbonas 7,5% dengan dosis 2,4 ml per kg berat badan, dan cairan glukosa 40% 1-2 ml pr kg berat badan, diberikan via vena umbilikus.

2. Asfiksia ringan – sedang (nilai apgar 4-6)

Memerlukan resusitasi dan pemberian oksigen sampai bayi dapat bernapas kembali.

3. Bayi normal atau sedikit asfiksia (nilai apgar 7-9)

4. Bayi normal dengan nilai apgar 10.

#### **Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi**

Menurut teori tindakan segera/kolaborasi, di Rumah Sakit jika dalam keadaan tertentu terjadi kejadian hipotermi, gangguan pernafasan. Bayi Ny 'S' tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut sehingga dapat terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dengan yang seharusnya menurut teori yang ada.

Di Rumah juga, bayi Ny 'S' tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut sehingga dapat terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dengan yang seharusnya menurut teori yang ada

#### **Langkah V Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh**

Tinjauan asuhan kebidanan pada bayi Ny 'S' yang dilakukan di lahan praktik meliputi di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa selama 3 hari mulai dari tanggal 26 s/d 28 September 2017 dan di Rumah klien di Tetebatu dengan 4 kali kunjungan di mulai pada tanggal 6 Oktober 2017.

Saat di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa meliputi menganjurkan ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI dan cara menyusui yang benar, pemasangan selang *Oral Gastric Tube (OGT)*, menimbang berat badan bayi setiap hari, mempertahankan suhu tubuh bayi dengan perawatan inkubator dan

tetap terbungkus, mengobservasi tanda-tanda vital seperti suhu badan, pernapasan, dan frekuensi jantung, mengganti popok/pakaian bayi setiap kali basah, memberikan ASIP dengan menggunakan spoit melalui OGT setiap 3 jam sebanyak 10 cc, perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Menurut teori, penatalaksanaan Asfiksia yaitu:

#### A. Penilaian Segera

Segera setelah bayi lahir, letakkan bayi di bawah ibu atau dekat perineum (harus bersih dan kering). Cegah kehilangan panas dengan menutupi tubuh bayi dengan kain/handuk yang telah disiapkan sambil melakukan penilaian dengan menjawab 2 pertanyaan:

- 1) Apakah bayi menangis kuat, tidak bernafas atau megap-megap?
- 2) Apakah bayi lemas.

Setelah melakukan penilaian dan memutuskan bahwa bayi baru lahir perlu resusitasi, segera lakukan tindakan yang diperlukan. Penundaan pertolongan dapat membahayakan keselamatan bayi. Jepit dan potong tali pusat dan pindahkan bayi ketempat resusitasi yang telah disediakan. Lanjutkan dengan langkah awal resusitasi.

Penilaian pada bayi baru lahir:

- 1) Sebelum bayi lahir, sesudah ketuban pecah:

Apakah air ketuban bercampur mekonium (warna kehijauan) pada presentasi kepala.

2) Segera setelah bayi baru lahir:

Apakah bayi menangis, bernafas spontan atau teratur, bernafas megap-megap atau tidak bernafas.

Apakah bayi lemas atau lunglai.

Putuskan apakah bayi memerlukan tindakan resusitasi apabila:

- 1) Air ketuban bercampur mekonium.
- 2) Bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap.
- 3) Bayi lemas atau lunglai.

Segera lakukan tindakan resusitasi apabila bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap atau lemas.

#### B. Persiapan Resusitasi Pada Bayi Baru Lahir

Di dalam setiap persalinan, penolong harus selalu siap untuk melakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir. Kesiapan untuk bertindak dapat menghindarkan kehilangan waktu yang sangat berharga bagi upaya penolong. Walaupun hanya beberapa menit tidak bernafas, bayi baru lahir dapat mengalami kerusakan otak yang berat atau meninggal (Indrayani dan Djami, 2014).

##### 1) Persiapan keluarga

Sebelum menolong persalinan, bicarakan kepada keluarga mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi terhadap ibu dan bayinya serta

persiapan yang dilakukan oleh penolong untuk membantu kelancaran persalinan dan melakukan tindakan yang diperlukan (Indrayani dan Djami, 2014).

## **2) Persiapan Tempat Resusitasi**

Persiapan yang diperlukan meliputi tempat bersalin dan tempat resusitasi. Gunakan ruangan yang hangat dan terang. Tempat resusitasi hendaknya rata, keras, bersih dan kering, meja atau diatas lantai yang beralaskan tikar. Kondisi yang di perlukan untuk mengatur posisi kepala bayi. Tempat resusitasi sebaiknya didekat sumber pemanas (misalnya: lampu sorot) dan tidak banyak tiupan angin (jendela atau pintu terbuka). Biasanya di gunakan lampu sorot atau bohlam berdaya 60 watt atau lampu gas minyak bumi (*petromax*). Nyalakan lampu menjelang kelahiran bayi (Indrayani dan Djami, 2014).

## **3) Persiapan Alat dan Bahan Resusitasi**

- a) Meja Resusitasi
- b) Handuk kecil (1 buah) dan handuk besar (3 buah)
- c) Alat penghisap lendir Dee Lee atau bola karet
- d) Tabung dan sungkup atau balon dan sungkup neonatal
- e) Stetoskop neonatal
- f) Jam atau pencatat waktu
- g) Bengkok (Hayati dan Novita, 2013)

#### 4) Langkah-langkah Resusitasi Bayi

Resusitasi BBL bertujuan untuk memulihkan fungsi pernafasan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia dan terselamatkan hidupnya tanpa gejala sisa dikemudian hari.

##### Langkah Awal


Sambil melakukan langkah awal:

- 1) Beritahu ibu dan keluarganya bahwa bayinya memerlukan bantuan untuk memulai bernafas.
- 2) Minta keluarga mendampingi ibu (memberikan dukungan moral, menjaga dan melaporkan kepada penolong apabila terjadi perdarahan).

Langkah awal ini perlu dilakukan secara tepat (dalam waktu 30 detik). Secara umum, 6 langkah awal dibawah ini cukup untuk merangsang bayi baru lahir untuk bernafas spontan dan teratur.

Langkah awal (dilakukan dalam waktu 30 detik):

- a. Jaga bayi tetap hangat:
  - 1) Letakkan bayi diatas kain yang ada diatas perut ibu atau dekat perineum.
  - 2) Selimuti bayi dengan kain tersebut.
  - 3) Pindahkan bayi keatas kain tempat resusitasi
- b. Atur posisi bayi
  - 1) Baringkan bayi terlentang dengan kepala didekat penolong.
  - 2) Ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi



Sumber: *Asuhan Neonatus Resiko Tinggi dan Kegawatan (Sudarti dan Fauziah, 2013)*

Gambar posisi kepala yang benar dan salah pada resusitasi

#### c. Isap lendir

Gunakan alat penghisap lendir Dee Lee atau bola karet.

- 1) Pertama, isap lendir di dalam mulut kemudian baru hisap lendir di hidung.
- 2) Hisap lendir sambil menarik keluar penghisap (bukan pada saat memasukkan).
- 3) Bila menggunakan penghisap lendir Dee Lee, jangan memasukkan ujung penghisap terlalu dalam (lebih dari 5 cm kedalam mulut atau 3 cm kedalam hidung) karena dapat menyebabkan denyut jantung bayi melambat atau henti nafas bayi (Indrayani dan Djami, 2014).

#### d. Keringkan dan rangsang taktil

- 1) Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat memulai pernafasan bayi atau bernafas lebih baik.

- 2) Lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara di bawah ini
  - (a) Menepuk atau menyentil telapak kaki.
  - (b) Menggosok punggung, perut, dada atau tungkai dengan telapak tangan  
(Indrayani dan Djami, 2014).

e. Reposisi

Atur kembali posisi kepala dan selimuti bayi.

- 1) Ganti kain yang telah basah dengan kain bersih dan kering yang baru (disiapkan).
- 2) Selimuti bayi dengan kain tersebut, jangan tutupi bagian muka dan dada agar pemantauan pernafasan bayi dapat diteruskan.
- 3) Atur kembali posisi terbaik kepala bayi (sedikit ekstensi).

f. Penilaian apakah bayi menangis atau bernafas spontan dan teratur?

- 1) Lakukan penilaian apakah bayi bernafas normal, megap-megap atau tidakbernafas.
  - a) Letakkan bayi di atas dada ibu dan selimuti keduanya untuk menjaga kehangatan tubuh bayi melalui persentuhan kulit ibu-bayi.
  - b) Anjurkan ibu untuk menyusukan bayi sambil membelainya, bila bayi tidak bernafas atau megap-megap, segera lakukan tindakan ventilasi.

**Ventilasi**

Ventilasi adalah bagian dari tindakan resusitasi untuk memasukkan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif yang memadai untuk membuka alveoli paru agar bayi bernafas spontan dan teratur.

Langkah-langkah ventilasi.

1) Pemasangan sungkup

Perhatikan perlengkapan sungkup, pasang dan pegang sungkup agar menutupi mulut dan hidung bayi.

2) Ventilasi percobaan (2 kali)

a) Lakukan tiupan udara dengan tekanan 30 cm air, tiupan awal ini sangat penting untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa mulai bernafas dan sekaligus menguji apakah jalan nafas terbuka atau bebas.

b) Amati gerakan dada bayi

(1) Bila tidak mengembang:

(a) periksa posisi kepala, pastikan posisinya sudah benar.

(b) periksa pemasangan sungkup dan pastikan tidak terjadi kebocoran.

(c) periksa ulang apakah jalan nafas tersumbat cairan atau lendir (hisap kembali) (Indrayani dan Djami, 2014)

(2) Bila dada mengembang, lakukan ketahap berikutnya:

3) Ventilasi defenisi (20 kali dalam 30 detik)

a) Lakukan tiupan dengan tekanan 20 cm air, sebanyak 20 kali dalam 30 detik

b) Pastikan udara masuk (dada, mengembang) dalam 30 detik tindakan

4) Lakukan penilaian

Lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernafas spontan dan teratur?

a) Bila bayi sudah bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap.

(1) lihat apakah ada retraksi dinding dada bawah.

(2) hitung frekuensi pernafasan, apabila pernafasan >40 kali permenit dan tidak ada retraksi berat, maka:

- (a) Jangan ventilasi lagi.
  - (b) Berikan oksigen aliran bebas 5-10 L/menit.
  - (c) Asuhan BBL rutin (bungkus tali pusat, beri salep mata, suntik vitamin K, letakkan bayi dengan kontak kulit dengan kulit pada dada ibu, 1 jam kemudian suntik Hepatitis B.
  - (d) Pantau setiap 15 menit untuk pernafasan dan kehangatan dalam 2 jam pertama.
  - (e) Jelaskan pada keluarga bahwa bayinya kemungkinan besar akan membaik.
- b) Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap, lanjutkan VTP.
- c) Siapkan rujukan bila bayi belum bernafas spontan setelah 2 menit di ventilasi
- (1) Minta keluarga membantu persiapan rujukan.
  - (2) Teruskan resusitasi untuk menghentikan tindakan resusitasi jika setelah 20 menit upaya ventilasi tidak berhasil (Indrayanidan Djami, 2014).

### **Asuhan pascaresusitasi**

Asuhan pascaresusitasi diberikan sesuai dengan keadaan bayi setelah menerima tindakan resusitasi. Asuhan pascaresusitasi dilakukan pada keadaan:

a. Resusitasi berhasil

Bayi menangis dan bernafas normal sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Perlu pemantauan dan dukungan. Resusitasi dinyatakan berhasil apabila pernafasan bayi teratur, warna kulitnya kembali normal yang kemudian diikuti dengan perbaikan tonus otot atau bergerak aktif. Lanjutkan dengan asuhan berikutnya.

1) Konseling

- a) Jelaskan pada ibu dan keluarganya tentang hasil resusitasi yang telah dilakukan. Jawab setiap pertanyaan yang diajukan.
- b) Ajarkan ibu cara menilai pernafasan dan menjaga kehangatan tubuh bayi. Bila ditemukan kelainan, segera hubungi penolong.
- c) Anjurkan ibu segera memberi ASI kepada bayi (asuhan dengan metode kangguru)
- d) Jelaskan kepada ibu dan keluarganya untuk mengenali tanda-tanda bahaya baru lahir dan bagaimana memperoleh pertolongan segera bila terlihat tanda-tanda tersebut pada bayi.

2) Lakukan asuhan bayi baru lahir normal, meliputi:

- a) Anjurkan ibu menyusui sambil memperhatikan dan membelai bayinya.
- b) Berikan vitamin K, antibiotik salep mata, imunisasi hepatitis B

3) Lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pascaresusitasi selama 2 jam pertama.

a) Perhatikan tanda-tanda kesulitan bernafas pada bayi.

(1) Tarikan interkostal, nafas megap-megap frekuensi nafas <30 kali permenit atau >60 kali permenit.

(2) Bayi kebiruan atau pucat.

(3) Bayi lemas

b) Pantau juga bayi yang tampak pucat walaupun tampak bernafas dengan normal.

4) Jagalah agar bayi tetap hangat dan kering

b. Resusitasi tidak/kurang hasil/bayi memerlukan rujukan.

Bayi perlu rujukan, yaitu sesudah ventilasi 2 menit sebelum bernafas atau bayi sudah bernafas tetapi masih megap-megap atau pada pemantauan ternyata kondisinya makin memburuk. Bila bayi pascaresusitasi kondisinya memburuk, segera rujuk kefasilitas rujukan.

Tanda-tanda bayi yang memerlukan rujukan sesudah resusitasi, antara lain:

1) Frekuensi pernafasan <30 kali permenit atau lebih dari >60 kali permenit.

2) Adanya retraksi (tarikan) intercostal.

3) Bayi merintih (bising nafas espirasi) atau megap-megap (bising nafas aspirasi).

4) Tubuh bayi pucat atau kebiruan

Apabila resusitasi tidak/kurang berhasil/bayi memerlukan rujukan, lakukan:

1) Konseling

- a) Jelaskan pada ibu dan keluarga bahwa bayinya perlu dirujuk. Bayi dirujuk bersama ibunya dan di dampingi oleh bidan. Jawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu dan keluarganya.
- b) Minta keluarga untuk menyiapkan sarana transportasi secepatnya. Suami atau salah seorang anggota keluarga juga diminta untuk menemani selama perjalanan rujukan.
- c) Beritahukan (bila mungkin) ketempat rujukan yang dituju tentang kondisi bayi dan perkiraan waktu tiba
- d) Bawa peralatan resusitasi dan perlengkapan lain yang diperlukan selama perjalanan ketempat rujukan.

2) Asuhan bayi baru lahir yang dirujuk

- a) Periksa keadaan bayi selama perjalanan (pernafasan, warna kulit, suhu tubuh) dan catatan medik.
- b) Jaga bayi tetap hangat selama perjalanan, tutup kepala bayi dan bayi dalam posisi “Metode kangguru” dengan ibunya. Selimuti ibu bersama bayi dalam satu selimut.
- c) Lindungi bayi dari sinar matahari.
- d) Jelaskan kepada ibu bahwa sebaiknya memberi ASI segera kepada bayinya, kecuali pada keadaan gangguan nafas dan kontra indikasi lainnya.

### 3) Asuhan lanjutan

Merencanakan asuhan lanjutan sesudah bayi pulang dari tempat rujukan akan sangat membantu pelaksanaan asuhan yang diperlukan oleh ibu dan bayinya sehingga apabila kemudian timbul masalah hal tersebut dapat dikenali sejak dini dan kesehatan bayi tetap terjaga.

Pengkajian di rumah klien meliputi memberikan penjelasan pada ibu tentang cara menyusui yang benar dan pentingnya pemberian ASI eksklusif yaitu bayi diberi ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan apapun kecuali obat dari dokter, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara *on demand* pada bayi, menganjurkan ibu memberi bayi MP ASI setelah 6 bulan, mengobservasi tanda – tanda vital, menimbang berat badan bayi setiap hari, menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah, mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, menganjurkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayi dengan membedong bayi, menganjurkan ibu untuk kontrol tumbuh kembang bayi dan imunisasi sesuai jadwal.

Berdasarkan tinjauan teoritis, asuhan yang diberikan bayi dengan Asfiksia adalah tindakan umum dan khusus pada Asfiksia. Adapun secara khusus yaitu inkubator. Cara pemakaian inkubator adalah pastikan inkubator berfungsi dengan baik, nyalakan alat sebelum di pakai agar matras, linen hangat dan atur suhu inkubator yang dikehendaki (dilakukan bertahap) sesuai umur dan berat bayi, lalu

gunakan satu inkubator untuk satu bayi. Periksa suhu inkubator dengan termometer ruang, minimalakan membuka pintu inkubator, jaga lubang selalu tertutup agar suhu inkubator tetap hangat, lalu bersihkan inkubator dengan desinfektan dan ganti air *reservoir* setiap hari.

Secara umum yaitu mempertahankan suhu tubuh dengan ketat karena bayi mudah mengalami hipotermi, maka itu suhu tubuhnya harus di pertahankan dengan ketat, mencegah infeksi dengan ketat karena bayi sangat rentan akan infeksi. Adapun prinsip-prinsip pencegahan infeksi adalah termasuk cuci tangan sebelum memegang bayi, pengawasan nutrisi (ASI) refleks menelan bayi masih lemah, sehingga pemberian nutrisi harus dilakukan dengan cermat. Sebagai langkah awal jika bayi bisa menelan adalah tetesi ASI dan jika bayi belum bisa menelan segera rujuk.

Dalam konsep dasar dan asuhan kebidanan pada bayi Ny 'S' berdasarkan dengan intervensi yang dilakukan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara apa yang ada dalam konsep dasar dengan yang dilakukan di lahan praktik.

#### **Langkah VI Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan**

Tahap asuhan kebidanan pada bayi Ny 'S' dalam pelaksanaan tindakannya didasarkan atas perencanaan yang telah ditetapkan. Penulis tidak menemukan permasalahan yang berarti, hal itu dikarenakan tindakan yang dilaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada dalam rencana disamping adanya kerjasama yang

baik dengan petugas kesehatan, ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara konsep dasar dan studi kasus bayi Ny 'S'.

### **Langkah VII Evaluasi**

Evaluasi merupakan tahapan dalam asuhan kebidanan yang penting guna mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana setelah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Evaluasi, berdasarkan dilahan praktik meliputi selama 3 hari dirumah sakit pada tanggal 26 s/d 28 September 2017 dan 4 kali kunjungan dirumah klien yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2017 pada asuhan kebidanan bayi Ny 'S' yang telah dilakukan untuk Asfiksia diperoleh hasil, yaitu:

Selama asuhan 3 hari di RSUD Syekh Yusuf Gowa, kebutuhan bayi akan nutrisi belum terpenuhi karena terjadinya gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan refleks menghisap dan menelan masih lemah. Selama 3 hari berat badan bayi naik dan hanya mengalami kenaikan 150 ons yaitu dari 3100 menjadi 3150 gram, bayi lemah menghisap dan menelan serta produksi ASI lancar dan ibu meninggalkan rumah sakit karena pertimbangan ekonomi. Tidak terjadi hipotermi, ditandai dengan selama asuhan di Rumah Sakit tanda-tanda vital dalam batas normal dan dirawat di inkubator. Tidak terjadi hipoglikemia ditandai dengan

pemberian infus cairan glukosa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi yang refleks menghisap dan menelannya masih lemah.

Tidak terjadi sindrom gangguan pernapasan idiopatik (penyakit *membran hialin*), hiperbilirubinemia, dan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral karena diberi obat *ampicillin* dan *gentamicine* untuk pengobatan infeksi yang akan terjadi pada bayi. Selama 3 hari asuhan berat badan bayi naik.

Pemantauan berat badan di rumah dilakukan 4 kali, kunjungann pertama berat badan bayi sudah naik yaitu 3200 gram berarti ibu mampu merawat bayinya dengan baik selama di rumah karena dibuktikan berat badan bayi naik setiap kali kunjungan.

Dari hasil evaluasi melalui tinjauan teoritis dengan asuhan kebidanan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara tinjauan teoritis dengan studi kasus bayi Ny 'S' tetapi masih perlu adanya perhatian dalam memberikan asuhan selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari tinjauan teoritis dan pengalaman langsung dari lahan praktik melalui studi kasus serta membandingkan antara tinjauan teoritis dan praktik tentang kasus Asfiksia Sedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuhan kebidanan pada bayi Ny 'S' dengan Asfiksia Sedang dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesis riwayat kesehatan, laporan singkat, dan keterangan tambahan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa/masalah actual yang ditegakkan pada bayi Ny 'S' dengan Asfiksia Sedang dimana bayi tidak segera menangis, ekstremitas atas kemerahan dan ekstremitas bawah kebiruan, dengan apgar score 6/9.
3. Diagnosa/masalah potensial yang ditegakkan pada bayi Ny 'S' dengan Asfiksia sedang rentang terjadi asfiksia berat dan hipotermi

4. Tindakan segera (*Emergency*)/Kolaborasi yang dilaksanakan pada bayi Ny 'S' dengan Asfiksia Sedang maka diperlukan tindakan segera, tetapi tidak ditemukan adanya indikasi untuk dilakukannya kolaborasi dengan tingkat kesehatan yang lebih tinggi.
5. Intervensi/rencana asuhan kebidanan pada kasus bayi Ny 'S' dengan Asfiksia Sedang direncanakan seluruh kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani bayi dengan bayi asfiksia serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, termasuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya komplikasi dan merencanakan penanganan segera.
6. Penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan pada kasus bayi Ny ''S'' dengan asfiksia sedang diagnosis BCB/SMK/SC/ masa gestasi 40 minggu 4 hari umur 0 hari dengan gangguan pemenuhan nutrisi dan potensial terjadi asfiksia berat maka penanganan yang dilakukan yaitu dengan pemberian nutrisi yang adekuat, mencegah terjadinya hipotermi.
7. Tindakan evaluasi pada bayi Ny 'S' dengan Asfiksia Sedang telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
8. Pendokumentasian dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2017-6 Desember 2017. Pengkajian pertama sampai ketiga tanggal 26 s/d 29 September dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan dilanjutkan kunjungan rumah 4 kali, pada tanggal 6 Desember 2017.

## B. Saran

Adapun saran untuk mencapai asuhan kebidanan yang baik, yaitu:

1. Untuk klien
  - a. Menyarankan kepada ibu untuk sebisa mungkin memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan makanan pendamping ASI sampai berumur 2 tahun.
  - b. Memantau setiap hari pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan menimbang berat badan dan memberi ASI secara *on demand* pada bayi.
2. Untuk bidan
  - a. Diharapkan petugas kesehatan dapat melakukan pengawasan dan penanganan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku pada ibu hamil secara ketat, pemeriksaan yang akurat, dan penanganan serta perawatan yang tepat pada setiap asuhan terutama pada bayi dengan asfiksia.
  - b. Mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan sebagai pembuktian pertanggung jawaban petugas kesehatan terhadap asuhan yang diberikan.
3. Untuk institusi

Diharapkan peningkatan mutu pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang professional yang mempunyai dedikasi yang tinggi.

4. Untuk pemerintah

Untuk mencapai hasil yang memuaskan terutama dalam pelayanan kesehatan khususnya kebidanan diharapkan kebijakan pemerintah dalam penempatan bidan-bidan yang berkompetensi/professional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, dan Weni Kristiyanasari. *Neonatus & Asuhan Keperawatan Anak*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Q.s Al-Hajj ayat 5, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Q.s Al-Mu'minun ayat 12-14, 2015.
- Dinkes. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. 2015.
- Dinkes. *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa 2014*. Pusat Data dan Informasi Dinkes. Gowa. 2015.
- Grande do Norte/UFRN, Natal, Brazil, Departemen of Nursing, Health Science Center, Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Center Campus, Natal, Brazil: Copyright by Authors and Scientific Research Publishing Inc (2016).
- Hayati, Ning dan Lia Novita. *Penuntun Praktik Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2013.
- Indrayani, dan Unaria Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013.
- Kemenkes RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, 2016.
- Lia, Dewi. *Resusitasi Neonatus*. Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2014.
- Luana Analia, dkk. "Risk Factor for Perinatal Asphyxia in Newborns Delivered at Term". Federal University of Rio
- Lalita, EMF. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: In Media. 2013.
- Marmi, dan Kukuh Rahardjo. *Asuhan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*. Cet: 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Maryunani, Anik dan Nurhayati. *Asuhan Kegawatdaruratan dan Penyulit Pada Neonatus*. Jakarta: CV. Trans Info Medika, 2009.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*. Gowa-Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Pangemanan, Eunike A., dkk, Karakteristik Kehamilan Dengan Luar Asfiksia Saat Lahir di RSUP Prof Dr R. D. Kandou Manado Periode Januari-Desember 2014: Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2016. Manado, 2014.
- Purwoastuti, Endang dan Siwi Walyani. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Rahmawati, Lisa, Prihatin Ningsih. "Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di Ruang Medikal Records RSUD Pariaman". Prodi DIII Kebidanan Padang Poltekkes Kemenkes (2016).
- Rahma, AS dan Mahdinah Armah. "Analisis Faktor Resiko Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar". Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, (2014).
- Rokhmah, Islamiyatur, dkk. "Pemetaan Kesehatan Reproduksi Dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan di Kota Tegal Jawa Tengah". Stikes Aisyiah Yogyakarta, (2013).
- Rukiyah, dan Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Saifuddin, AB, dkk. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawiroharjdo*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjdo. ED.4, Cet, 4. 2014.
- Sudarti, dan Fauziah Afroh. *Asuhan Neonatus Resiko Tinggi dan Kegawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Tando, Marie. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Penerbit in Medika, 2013.
- Varney, dkk. *Buku Saku Bidan*, Cet; 1. Jakarta: EGC, 2002.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penelitian

Nama : Ratika  
Nim : 70400114064  
T.T.L : Palekko, 10 April 1996  
Suku : Makassar  
Asal Daerah : Takalar  
Agama : Islam  
Alamat : Bulukunyi, Kec. Pologbangkeng Selatan  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Mansyur  
b. Ibu : Mantasia

### B. Riwayat Pendidikan

Tamat SD : SD Negeri Bulukunyi tahun 2008  
Tamat SMP : MTs. Negeri Bulukunyi tahun 2011  
Tamat SMA : SMA Negeri 3 Takalar tahun 2014  
Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan.