

**MANAJEMEN ASUHAN ANTENATAL PADA NY “R” DENGAN
ANEMIA DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA
TANGGAL 22 APRIL-31 MEI TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH:
RATNA AYU DINAR
NIM : 70400114041

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RATNA AYU DINAR
Nim : 70400114041
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 14 Agustus 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Monumen Emmysaeland III
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny
"R" Dengan Anemia Di Puskesmas Somba Opu Gowa
Tanggal 22 April-31 Mei 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, Oktober 2017

Penyusun

RATNA AYU DINAR
NIM.70400114041

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Ratna Ayu Dinar

Nim : 70400114041

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "R" Gestasi 32-34 Minggu dengan Anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, November 2017

Pembimbing I



Firdayanti, S.SiT, M.Keb

Pembimbing II



dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY "R" DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA TAHUN 2017", yang disusun oleh RATNA AYU DINAR, NIM : 70400114041, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 15 November 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 November 2017 M
1 RABI'UL 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)


Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha, S. SiT., SKM., M.Keb (.....)

Pembimbing I : Firdayanti, S. SiT., M.Keb (.....)

Pembimbing II : dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Rini Fitriani., M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. Sohra, M. Ag (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 195502031983121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”R” Dengan Anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya akhir zaman, amiin.

Penulisan karya tulis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli madya Kebidanan pada program studi Kebidanan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berbagai hambatan penulis dapatkan dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, namun berkat bimbingan, arahan dan bantuan moril maupun materil yang tulus dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Terima kasih yang sangat spesial dan tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Jamaluddin T dan ibunda Harni yang tak henti-hentinya mendoakan , memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang dengan penuh keikhlasan sehingga Allah SWT selalu memberi keberkahan hidup serta kemudahan-kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Kepada kedua adik saya Windi Yulianti Dinar dan

Wanda Septi Dinar terimah kasih atas segala dukungan dan semangat selama ini yang mengajarkan saya secara tidak langsung menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan yang menuntut saya memperbaiki diri agar layak menjadi panutan bagi kalian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. beserta seluruh dosen dan staff Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibunda DR. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku ketua prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibunda Firdayanti, S. SiT., M.Keb selaku sekretaris jurusan prodi kebidanan sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing, dan memberi saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Ibunda dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes sebagai pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing dan mengarahkan saya tanpa rasa lelah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

6. Ibunda dr. Rini Fitriani, M.kes sebagai penguji satu yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
7. Ibunda Dr. Sohra, M.Ag sebagai penguji dua yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberi saran dan kritik yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
8. Segenap Dosen terkhususnya di lingkup Prodi Kebidanan, staf Akademi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas kontribusinya dalam penyelesaian penyusunan KTI ini.
9. Bidang Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan atas pemberian izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. Direktur Puskesmas Somba Opu Gowa dan jajarannya atas bantuannya dan perizinannya sehingga KTI ini dapat diselesaikan.
11. Teman-teman seangkatan kebidanan 2014 yang telah sama-sama melewati suka duka dalam proses pendidikan ini.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan karya tulis ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada

dalam penulisan karya tulis ini. Semoga penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, November 2017

Penyusun,

RATNA AYU DINAR
NIM: 70400114041



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Metode Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care (ANC).....	27
C. Tinjauan Umum Anemia.....	32
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	53
 BAB III STUDI KASUS	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada tanggal 22 April 2017.....	62
B. Pendokumentasia Asuhan Kebidanan Pada tanggal 22 April 2017	82
C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada tanggal 29 April 2017	88

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada tanggal 07 Mei 2017	91
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada tanggal 17 Mei 2017	94
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada tanggal 31 Mei 2017.....	97

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I: Pengkajian Data Dasar dan Analisa Data.....	100
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	105
C. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	109
D. Langkah IV: Tindakan Emergency Dan Kolaborasi	110
E. Langkah V: Intervensi Asuhan Kebidanan.....	111
F. Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan.....	117
G. Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan	122
H. Pendokumentasian	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbagda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Gowa Atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa Kepada Kepala Puskesmas Somba Opu.
- Lampiran 3 : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Somba Opu Kab. Gowa.
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, NOVEMBER 2017

Nama : Ratna Ayu Dinar
NIM : 70400114041
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny “R” Dengan Anemia Di Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017

Anemia pada kehamilan ialah kondisi ibu dengan kadar Hb < 11,00 gr. Pada trimester I dan III atau kadar Hb < 10,5 gr% pada trimester II, karna ada perbedaan dengan kondisi wanita tidak hamil karna hemodilusi terutama terjadi pada trimester II.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. “R” dengan Anemia pada masa kehamilan gestasi 32 – 34 Minggu di Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang didapatkan ibu mengeluh sering pusing, sakit kepala yang tidak menetap, cepat merasa lelah, tampak konjungtiva ibu pucat dan pemeriksaan laboratorium Hb 8,6 gram%. Asuhan yang dilakukan dengan pemberian suplementasi besi dan asam folat yang berisi 60 mg besi elemental dan 250 µg asam folat. Pada ibu hamil dengan anemia, tablet tersebut diberikan dalam 90 hari bila muncul perbaikan, lanjutkan pemberian tablet sampai 42 hari pasca persalinan.

Berdasarkan hasil dari studi kasus 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan dapat disimpulkan bahwa pada Ny “R” dengan hasil asuhan kehamilan berlangsung normal ditandai dengan pembesaran perut sesuai usia kehamilan, keadaan janin baik, keadaan dan kesadaran ibu baik, keluhan yang dirasakan ibu berkurang dan kadar Hb menjadi 10 gram%.

Kata kunci : Ibu Hamil, Anemia, Tujuh Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, NOVEMBER 2017

Name : Ratna Ayu Dinar
Student Reg. No. : 70400114041
Title : Midwifery Care Management on Mrs. "R" with Anemia at Somba
Opu Gowa Public Health Center in 2017

Anemia in pregnancy is the condition of the mother with Hb < 11.00 gr. At the first and third trimester or Hb levels < 10.5 gr% in the second trimester, there is a difference of non-pregnant women condition as hemodilution mainly occurs at the second trimester.

This scientific paper is aimed at implementing the Midwifery Care Management on Mrs. "R" with Anemia at 32 to 34 weeks' gestation at Somba Opu Gowa Public Health Center 2017 in accordance with 7 steps of Varney and SOAP.

The results of anamnesis, physical and supporting examination reveal that the mother complained she often dizzy, unsettle headache, feel tired quickly, the mother's conjunctiva was pale, and laboratory examination of Hb 8.6 gram%. The cares performed were by supplementation of iron and folic acid containing 60 mg of elemental iron and 250 µg of folic acid. In pregnant women with anemia, the tablets are given in 90 days when healing occurs, then continued by taking the tablet till 42 days postpartum.

Based on the case study results of the 7 steps of Varney and SOAP implemented for the obstetric problem-solving process, it can be concluded that Mrs. "R" with normal pregnancy care is characterized by the stomach enlargement based on gestational age, good fetal condition, mother's good state and awareness, complaints which the mother feels reduced, and Hb levels becomes 10 grams%.

Keywords: Pregnant Mother, Anemia, Seven Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anemia merupakan masalah yang masih terjadi pada wanita khususnya ibu hamil. Prevalensi anemia secara umum terjadi pada 56 juta ibu hamil yang tersebar di seluruh dunia dengan pembagian sekitar 7 juta di Eropa dan Amerika dan sisanya yaitu 49 juta terjadi di negara maju, berkembang dan negara miskin di Asia dan Afrika (Fatimah dan Susi, 2015 :135).

Anemia pada ibu hamil diketahui berdampak buruk, baik bagi kesehatan ibu maupun bayinya. menyebutkan bahwa anemia merupakan penyebab penting yang melatarbelakangi kejadian morbiditas dan mortalitas, yaitu kematian ibu pada waktu hamil dan pada waktu melahirkan atau nifas sebagai akibat komplikasi kehamilan. Selain itu ibu hamil yang menderita anemia juga menunjukkan keadaan yang tragis, yaitu terjadinya perdarahan pada saat melahirkan. Di samping pengaruhnya kepada kematian dan perdarahan, anemia pada saat hamil akan memberikan dampak abortus, partus prematus, inersia uteri dan menyebabkan perdarahan, syok, infeksi intrapartum dan dalam nifas serta mempengaruhi pertumbuhan janin, berat bayi lahir rendah dan peningkatan kematian perinatal (Ibnu Pranoto Dkk, 2013:87).

Konsentrasi hemoglobin pada saat ibu hamil terlihat menurun walaupun sebenarnya lebih besar dari pada orang yang tidak hamil. Jumlah sel darah merah meningkat pada kehamilan sebesar 18-25% , tetapi volume plasma meningkat lebih besar sebesar 40-50%. Ini menyebabkan penurunan hematokrit dan penurunan hemoglobin akibat pengenceran. Hal ini mulai terjadi pada usia gestasi 10 minggu, maksimal pada 32-34 minggu dan pulih 5-7 hari pasca persalinan. Pertambahan

volume darah memenuhi kebutuhan unit uteroplasma dan melindungi terhadap gangguan aliran balik vena dan juga hilangnya darah saat persalinan (Sullivan, dkk., 2012 :80).

Anemia dalam kehamilan ialah kondisi ibu dengan kadar Hb < 11,00 gr%. Pada trimester I dan III atau kadar Hb < 10,50 gr% pada trimester II. Karena ada perbedaan dengan kondisi wanita tidak hamil karena hemodilusi terutama terjadi pada trimester II (Sarwono P, 2014:775).

Untuk menegakan diagnosa anemia dapat dilakukan dengan anamnesa. Hasil anamnesa didapatkan keluhan kepala pusing, mata berkunang – kunang, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan system neuromuskular, lesu, lemah , lelah, mual muntah dan pembesaran kelenjar limfa. Bila kadar Hb kurang dari 7gr% maka gejala dan tanda anemia akan jelas. Pada pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat sachli, dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan yaitu trimester I dan III. Hasil pemeriksaan sahli dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Hb 11gr % dikatakan tidak anemia, 9-10 gr % anemia ringan, 7-8gr % anemia sedang, <7gr% anemia berat (Rukyah, dkk.,2013:160).

Di dunia pada tahun 2011, 29 % (496 juta jiwa) wanita usia subur mengalami anemia, dan wanita hamil 38 % (32,4 juta jiwa) mengalami anemia pada usia saat hamil 15 – 49 tahun (WHO, 2011).

Angka anemia kehamilan di Indonesia menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Hoo Swie Tjiong dalam Manuaba menemukan angka anemia kehamilan 3,8% pada trimester I, 13,6% trimester II, dan 24,8% pada trimester III, sedangkan menurut

Saifudin menyebutkan angka anemia secara nasional untuk ibu hamil mencapai angka 63,5%(2) (Fatimah dan susi, 2015:135).

Data dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan, prevalensi anemia pada ibu hamil di kota Makassar pada tahun 2011 sebesar 12,5%(Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2012).

Data dari puskesmas Somba Opu Gowa di dapatkan pada tahun 2016 dari 669 ibu hamil 325 ibu hamil menderita anemia dan pada triwulan pertama 2017 didapatkan 85 orang ibu hamil menderita anemia dari 136 orang ibu hamil yang melakukan kunjungan.

Sebagian besar penyebab anemia di Indonesia adalah kekurangan zat besi yang berasal dari makanan yang dimakan setiap hari dan diperlukan untuk pembentukan hemoglobin sehingga disebut anemia kekurangan besi. Anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dapat menyebabkan risiko bayi berat lahir rendah, prematuritas, cacat bawaan dan perdarahan pada waktu melahirkan. Prevalensi terjadinya anemia pada wanita hamil di Indonesia cukup tinggi yaitu berkisar 20%- 80%, tetapi pada umumnya banyak penelitian yang menunjukkan prevalensi anemia pada wanita hamil yang lebih besar dari 50%. Sehingga dapat dikatakan 5 dari 10 wanita hamil di Indonesia menderita Anemia. (Fatimah dan Susi, 2015 :135).

Penanggulangan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan strategi, keluarga dan anggota keluarga yang resiko menderita anemia harus mendapat makanan yang cukup bergisi dengan biovallabilita yang cukup, pengobatan penyakit

infeksi yang memperbesar resiko anemia, penyediaan pelayanan yang mudah dijangkau oleh keluarga yang memerlukan dan tersedianya tablet tambah darah dalam jumlah yang sesuai (Intan Parulian, 2016: 1).

Penanganan anemia dengan pemberian suplemen tablet zat besi (Fe) yang merupakan suatu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kadar zat besi (Fe) dalam jangka waktu yang pendek pada ibu hamil. Dalam hasil penelitian didapatkan pelayanan antenatal care sebanyak 33(75%) dalam kategori baik, sebanyak 32(72,7%) responden tidak mengalami anemia, dan ada hubungannya yang signifikan antara pelayanan antenatal care dengan anemia pada kehamilan trimester III dengan $p\text{-value}=0,004$. Hubungan antara pelayanan antenatal care oleh bidan dengan anemia pada pelayanan bidan dalam mencegah terjadinya anemia melalui pemeriksaan antenatal care (ANC) kepada setiap ibu hamil.

Peran bidan mendukung peningkatan konsumsi tablet zat besi. Tetapi, kenyataannya pemberian tablet besi belum efektif menurunkan prevalensi anemia. Alasan utama kurang efektif adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi. Sehingga peran bidan mendapatkan tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi, bidan mampu memberikan dukungan dan mengurangi efek samping yang dapat terjadi pada ibu hamil jika mengkonsumsi zat besi (Fatimah dan Susi, 2015: 1).

Puskesmas Somba Opu Gowa adalah salah satu puskesmas yang melayani pelayanan antenatal care dimana puskesmas ini mendapat banyak kunjungan ibu hamil setiap harinya, letak wilayah puskesmas yang merupakan perkotaan cenderung

mempengaruhi kondisi gizi ibu hamil dimana terdapat banyaknya pasien ibu hamil dengan anemia yang disebabkan kurangnya asupan gizi ibu hamil yang hanya memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui makanan-makanan instan atau cepat saji sehingga mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kurangnya kesadaran ibu mengenai nutrisi ibu hamil juga merupakan salah satu penyebab banyaknya ibu hamil yang menderita anemia, sehingga terjadi tingginya angka ibu hamil yang menderita anemia yaitu pada tahun 2016 terdapat 325 ibu hamil yang menderita anemia dari 669 ibu hamil dan pada triwulan pertama 2017 sebanyak 85 orang dari 136 ibu hamil.

Intervensi yang ditargetkan untuk nutrisi yang memadai terutama wanita sebelum dan selama kehamilan merupakan tantangan besar bagi negara-negara berkembang seperti kita. Menarik juga bahwa ibu hamil menjalani tes laboratorium untuk mendeteksi anemia pada kunjungan prenatal pertama dan mereka menerima saran tentang bagaimana memastikan asupan zat besi dan meningkatkan ketersediaan bioavailabilitas zat besi. Studi dari kami juga menunjukkan perlunya menerapkan program pendidikan untuk memperbaiki Gizi dan sensualitas wanita (Nadia Hasswane dkk, 2015:96).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji, mendalami dan mencoba menerapkan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil ruang lingkup sebagai berikut ”Bagaimana memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia di puskesmas Somba Opu Gowa”.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan Asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia di puskesmas Somba Opu dengan pendekatan Manajemen asuhan kebidanan kehamilan menurut Helen Varney dan mendokumentasikannya dalam bentuk SOAP.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengakajian dan analisis data pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.
- d. Di identifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.

- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan pada pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ny “R” dengan Anemia, di Puskesmas Somba Opu Gowa 2017.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dari kasus tersebut adalah :

1. Manfaat bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin

Di harapkan Asuhan kebidanan kehamilan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi belajar terhadap materi yang telah diberikan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta acuan bagi mahasiswi kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan.

2. Manfaat bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi bidan dalam mempertahankan kualitas pelayanan dan pelaksanaan asuhankebidanan kehamilan.

3. Manfaat bagi Penulis

Diharapkan Asuhan kebidanan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk selalu belajar dari teori dan kasus yang terjadi.

4. Manfaat bagi Ibu dan Keluarga

Diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi ibu hamil, sehingga dapat mengetahui berbagai hal yang mungkin terjadi pada masa tersebut.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan ibu hamil khususnya dengan pre eklampsia berat.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan emergency/ kolaborasi.

Rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.

- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah sedangkan lenec digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter dan bidan.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I pendahuluan yang membahas tentang latar belakang

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II penulis membahas mengenai tinjauan umum kehamilan, tinjauan umum antenatal dan anemia pada kehamilan, serta proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III penulis membahas tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV pembahasan, akan membahas perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di puskesmas Somba Opu Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia.

Pada bab V penutup, penulis memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian kehamilan

Kehamilan merupakan hasil pembuahan sel telur dari perempuan dan sperma dari laki-laki, sel telur akan bisa hidup selama maksimal 48 jam, spermatozoa sel yang sangat kecil dengan ekor yang panjang bergerak memungkinkan untuk dapat menembus sel telur (konsepsi), sel-sel benih ini akan dapat bertahan kemampuan fertilitasnya selama 2-4 hari, proses selanjutnya akan terjadi nidasi, jika nidasi ini terjadi, barulah disebut adanya kehamilan (Sunarti, 2013:31).

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari, dan tidak lebih 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur (Nurul Jannah, 2012:37).

Sebagaimana dalam Q.S Al-Mukminun 12-14 tentang perkembangan kejadian manusia yakni:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (Q.S Al-Mukminun 12-14)

Ungkapan ilmiah dari ayat tersebut 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ- organ jasad manusia. Dimana al-Quran mengungkapakan bahwa manusia pada awalnya berasal dari saripati yang berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia, seperti protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah pembaruan antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) didalam rahim. Kemudian menjadi membesar sedikit demi sedikit hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna.

Sedangkan dalam ilmu kesehatan proses kejadian manusia yaitu mulai dari ovulasi sampai dengan partus. Hal ini membuktikan bahwa ada keterkaitan antara proses kejadian manusia menurut agama dan menurut ilmu kesehatan.

Dalam Q.S Luqman ayat 14 tentang keadaan ibu yang mengandung yakni:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهَنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahnya :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun^[1180]. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (Q.S Al-Luqman 14)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya perubahan-perubahan yang dialami ibu hamil membuat nya semakin lemah dan bahkan ibu yang hamil bisa mengalami komplikasi dalam masa kehamilannya.

Dalam masa kehamilan terjadi banyak perubahan-perubahan fisik maupun psikologis yang dapat mengganggu proses kehamilan. Dalam proses kehamilan ini membuat kondisi ibu kadang mengalami gangguan dan mudah terkena penyakit yang menyertai kehamilannya.

Peran bidan dalam kelancaran kehamilan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil yang dapat dilakukan dengan memperhatikan pola nutrisi ibu hamil. Pola nutrisi yang baik dapat membantu ibu mencukupi segala kebutuhan asupan gizi untuk perkembangan janinnya. Asupan gizi ibu hamil dapat dipenuhi

dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin terkhusus pada ibu anemia di anjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C untuk membantu memenuhi kebutuhan besi yang digunakan dalam proses pembentukan hemoglobin.

2. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda hamil adalah perubahan fisiologis yang timbul selama hamil. Ada tiga tanda kehamilan, yaitu tanda dugaan hamil, tanda kemungkinan hamil dan tanda pasti.

a. Tanda dugaan hamil

1) *Amenorea* (terhentinya menstruasi)

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel de graaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. Lamanya *amenorea* dapat di informasikan dengan memastikan hari pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan. tapi hal ini tidak dianggap tanda pasti kehamilan, karena *amenorea* juga dapat terjadi pada beberapa penyakit kronik, tumor hipofise, perubahan faktor-faktor lingkungan, malnutrisi dan yang paling sering gangguan emosional (Walyani, 2015:70).

2) Kelelahan

Selama periode kehamilan minggu kelima sampai keempat belas, diperiode ini ibu akan merasakan keletihan yang tidak biasa dan membutuhkan tidur lebih banyak karena adanya tuntutan baru terhadap pasokan energi pada ibu, dan karena terjadinya pergeseran pada kecepatan metabolisme tubuh ibu (Walyani, 2015:70)

3) Perubahan payudara Pada kehamilan

Perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena dibawah kulit akan lebih terlihat. Puting payudara akan lebih besar, kehitaman, dan tegak. Setelah bulan pertama satu cairan kekuningan yang disebut kolostrum dapat keluar. Kolostrum ini berasal dari kelenjar kelenjar asinus yang mulai bersekresi. Meskipun dapat dikeluarkan, air susu belum dapat diproduksi karena hormone prolaktin ditekan oleh prolaktin inhibiting hormone (Walyani, 2015:71).

4) *Morning sicknes* (mual muntah dipagi hari)

Kehamilan sering ditandai oleh gangguan system pencernaan, yang terutama bermanifestasi sebagai mual dan muntah, morning sicknes biasanya timbul pada pagi hari dan hilang pada beberapa jam, walaupun kadang-kadang keluhan ini lebih lama dan dapat timbul pada waktu yang berbeda. Gejala yang mengganggu ini biasanya dimulai dari 6 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, dan biasanya menghilang spontan 6 sampai 12 minggu kemudian. (Walyani, 2015:70).

5) Sering miksi

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang sering, terjadi pada triwulan pertama akibat desakan uterus kekandung kemih. (Walyani, 2015:71).

b. Tanda kemungkinan hamil (Probability sign)

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada wanita hamil (Walyani, 2015:72).

Tanda kemungkinan ini terdiri atas hal-hal berikut ini :

- 1) Pembesaran perut: Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan keempat kehamilan.
- 2) Tanda hegar: Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthimus uteri.
- 3) Tanda goodel: Adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak seperti bibir.
- 4) Tanda chadwick: Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa vagina termasuk juga porsio dan serviks.
- 5) Tanda piscaseck: Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu.
- 6) Teraba ballotement: Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa. Hal ini harus ada pada pemeriksaan kehamilan karena perabaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena dapat saja merupakan myoma uteri.

7) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif: Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya human Chorionic Gonadotropin (hCG) yang diproduksi oleh sinsiotropblastik sel selama kehamilan. Hormon direksi ini peredaran darah ibu (pada plasma darah), dan di eksresi pada urine ibu (Walyani, 2015:73).

c. Tanda pasti kehamilan

- 1) Adanya gerakan janin sejak usia kehamilan 16 minggu.
- 2) Terdengar denyut jantung janin pada kehamilan 12 minggu dengan menggunakan alat fetal *electrocardiograph* dan pada kehamilan 18-20 minggu dengan stethoscope leanec
- 3) Teraba bagian-bagian janin
- 4) Terlihat kerangka janin bila dilakukan pemeriksaan rongent.
- 5) Terlihat kantong janin pada pemeriksaan USG (Maritalia dkk, 2012:15)

3. Perubahan anatomi dan fisiologi pada kehamilan

Perubahan anatomi dan fisiologi pada perempuan hamil sebagian besar sudah terjadi segera setelah fertilisasi dan terus berlanjut selama kehamilan. Kebanyakan perubahan ini merupakan respons terhadap janin. Satu hal yang menakjubkan adalah bahwa hampir semua perubahan ini akan kembali seperti keadaan sebelum hamil setelah proses persalinan dan menyusui selesai. (Sarwono, 2014 :174)

a. Sistem Reproduksi

1) Uterus

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai persalinan. Pada perempuan tidak hamil uterus mempunyai berat 70g dan kapasitas 10 ml atau kurang. Selama kehamilan, uterus akan berubah menjadi suatu organ yang mampu menampung janin, plasenta, dan cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 5 l bahkan dapat mencapai 20 l atau lebih dengan berat rata-rata 1100 g (Sarwono, 2014:175).

Pembesaran uterus meliputi peregangan dan penebalan sel-sel otot, sementara produksi miosit yang baru sangat terbatas. Bersamaan dengan hal itu terjadi akumulasi jaringan ikat dan elastik, terutama pada lapisan otot luar. Kerja sama tersebut akan meningkatkan kekuatan dinding uterus. Daerah korpus pada bulan-bulan pertama akan menebal, tetapi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akan menipis. Pada akhir kehamilan ketebalannya hanya berkisar 1,5 cm bahkan kurang.

Pada minggu-minggu pertama kehamilan uterus masih seperti bentuk aslinya seperti buah avokad. Seiring dengan perkembangan kehamilannya daerah fundus dan korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk sferis pada usia kehamilan 12 minggu. Panjang uterus akan bertambah lebih cepat dibandingkan lebarnya sehingga akan berbentuk oval. Ismus uteri pada minggu pertama mengadakan hipertrofi seperti korpus uteri yang mengakibatkan ismus menjadi lebih panjang dan lunak yang dikenal dengan tanda Hegar.

Pada akhir kehamilan 12 minggu uterus akan terlalu besar dalam rongga pelvis dan seiring perkembangannya uterus akan menyentuh dinding abdominal, mendorong usus ke samping dan ke atas, uterus tumbuh hingga hampir menyentuh hati. Pada saat pertumbuhan uterus akan berotasi ke arah kanan, dekstrorotasi ini disebabkan oleh adanya rektosigmoid di daerah kiri pelvis. Pada triwulan akhir ismus akan berkembang menjadi segmen bawah uterus. Pada akhir kehamilan otot-otot uterus bagian atas akan berkontraksi sehingga segmen bawah uterus akan melebar dan menipis. Batas antara segmen atas yang tebal dan segmen bawah yang tipis disebut lingkaran retraksi fisiologis (Sarwono, 2014:175).

Pembesaran uterus meliputi :

Tidak hamil/normal : sebesar telur ayam (30gr)

Kehamilan 8 minggu: sebesar telur bebek

Kehamilan 12 minggu: sebesar telur angsa

Kehamilan 16 minggu: sebesar kepala bayi

Kehamilan 20 minggu: pinggir bawah pusat

Kehamilan 24 minggu: pinggir atas pusat

Kehamilan 28 minggu: sepertiga pusat-xypoid

Kehamilan 32 minggu: setengah pusat-xypoid

Kehamilan 36-42 minggu : 3 sampai 1 jari dibawah xypoid.

2) Serviks

Serviks manusia merupakan organ yang kompleks dan heterogen yang mengalami perubahan yang luar biasa selama kehamilan dan persalinan. bersifat seperti katup yang bertanggungjawab menjaga janin didalam uterus sampai akhir kehamilan dan selama persalinan, serviks didominasi jaringan ikat fibrosa. Komposisinya berupa jaringan matriks ekstraselular terutama mengandung kolagen dengan elastin dan proteoglikan dan bagian sel yang mengandung otot dan fibroblas, epitel, serta pembuluh darah. Rasio relatif jaringan ikat terhadap otot tidak sama sepanjang serviks yang semakin ke distal rasio ini semakin besar (Sarwono, 2014:177-178).

3) Ovarium

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu. Korpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesterone yang fungsinya akan diambil alih oleh plasenta (Nurul Jannah, 2012:90)

4) Vagina dan perineum

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keungu-unguan yang dikenal dengan tanda Chadwick. Perubahan ini meliputi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dari sel-sel otot polos. (Sarwono, 2014:178-179)

b. Payudara

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perkembangan payudara tidak dapat di lepaskan dari pengaruh hormon saat kehamilan, yaitu estrogen yang berfungsi menimbulkan hipertrofi sistem saluran payudara, menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam sehingga payudara tampak makin membesar dan menyebabkan rasa sakit pada payudara, progesterone berfungsi mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi dan meningkatkan jumlah sel asinus, sematotrofin berfungsi memengaruhi sel asinus untuk membuat kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin, penimbunan lemak di sekitar alveolus payudara dan merangsang pengeluaran kolostrum pada kehamilan(Ida Ayu, 2010:92).

c. Sistem Metabolisme

1) Rongga mulut

Salivasi mungkin akan meningkat sehubungan dengan kesukaran menelan akibat nausea. Gusi dapat menjadi hiperemis dan melunak kadang berdarah kalau terkena cedera ringan saja. Contohnya pada saat gogok gigi. Pembengkakan gusi sangat vaskuler yang disebut epulis kehamilan kadang kala timbul tetapi secara khas mengecil secara spontan setelah kelahiran. Keadaan tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen yang meningkat atau kadang terjadi pada pengguna kontrasepsi oral dan ibu yang mengalami defisiensi vitamin C(Nurul Jannah, 2012:90-91).

2) Usus kecil, besar dan appendix

Karena kehamilannya berkembang terus lambung dan usus digeser oleh uterus yang membesar ke arah atas dan ke arah lateral. Sebagai akibatnya appendix sebagai contoh biasanya bergeser ke arah atas dan ke arah vateral dan seringkali mencapai pinggang kanan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya tonus otot dan motilitas dari lambung dan usus berkurang selama kehamilan (Nurul Jannah, 2012 :92).

Hormon progesteron menimbulkan gerakan usus makin berkurang (relaksasi otot-otot polos), makanan lebih lama berada di dalam lambung, dan apa yang telah dicernakan lebih lama di dalam usus. Hal ini mungkin baik untuk reabsorpsi akan tetapi menimbulkan pula konstipasi yang merupakan keluhan dari ibu hamil. Konstipasi bisa juga terjadi karena kurangnya aktivitas/ senam dan penurunan intake cairan (Nurul Jannah, 2012 : 92).

d. Sistem Muskuloskeletal

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang arah dua tungkai. Sendi sakroiliaka, sakrokokgigis dan pubis akan meningkat mobilitasnya, yang diperkirakan karena pengaruh hormonal. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu dan pada akhirnya menyebabkan perasaan tidak enak pada bagian bawah punggung terutama pada akhir kehamilan (Sarwono,2014:186).

e. Sistem kardiovaskular

1) Tekanan darah

Penurunan tahanan vascular perifer selama kehamilan terutama disebabkan karena relaksasi otot polos sebagai akibat pengaruh hormon progesteron. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan tekanan darah selama usia kehamilan pertama. Ada sedikit penurunan pada sistolik 5-10 mmHg dan diastolik 10-15 mmHg. Tekanan darah sedikit demi sedikit akan naik ke level sebelum hamil pada saat usia kehamilan lanjut. Perasaan lelah dan menurunnya semangat/ lesu merupakan hal yang biasa terjadi selama kehamilan. Peningkatan hormon darah bersamaan dengan distensi dari vena dan penambahan tekanan mekanik dari pembesaran uterus dapat menyebabkan odema pada kaki, vulva, dan anal, varises pada vena, dan haemoroid adalah hal yang umum ditemukan pada trimester III (Nurul Jannah, 2012:99).

2) Distribusi aliran darah

Proporsi terbesar aliran darah diarahkan ke uterus 500 ml/ menit dengan tujuan untuk memberikan nutrisi yang baik pada uterus yang sedang berkembang dan janin di dalamnya. Terdapat aliran dalam jumlah yang besar pula pada paru-paru, kulit 200ml/menit, membran mukosa dan pada ginjal 400 ml/ menit. Pada kulit ditujukan untuk menghilangkan kelebihan panas yang ditimbulkan oleh meningkatnya metabolisme yang dialami pada kehamilan (Nurul Jannah, 2012:101).

3) Volume darah

Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran darah (*hemodilusi*), dengan

puncaknya pada usia kehamilan 32 minggu. Volume darah bertambah sebesar sampai 30% sedangkan sel darah bertambah sekitar 20%. Curah jantung akan bertambah sekitar 30%. Bertambahnya hemodilusi darah mulai tampak sekitar usia kehamilan 16 minggu, sehingga penderita penyakit penyakit jantung harus berhati-hati untuk hamil beberapa kali. Kehamilan selalu memberatkan kerja jantung sehingga wanita hamil dengan sakit jantung dapat jatuh dalam dekompensasi kordis. Pada post partum terjadi hemokonsentrasi dengan puncak hari ke tiga samapi kelima (Ida Ayu, 2010:93).

4) Sel darah

Sel darah merah makin meningkat jumlahnya untuk dapat mengimbangi pertumbuhan janin janin dalam rahim, tetapi pertambahan sel darah tidak seimbang dengan peningkatan volume darah sehingga terjadi hemodilusi yang disertai anemia fisiologis. Jumlah sel darah putih meningkat hingga mencapai 10.000/ml. Dengan hemodilusi dan anemia fisiologis maka laju endap darah semakin tinggi dan dapat mencapai 4 kali lipat dari angka normal (Ida Ayu, 2010:93).

f. Sistem Integumen

Sehubungan dengan tingginya kadar hormonal, terjadi peningkatan pigmentasi selama kehamilan. Keadaan ini sangat jelas terlihat pada kelompok wanita dengan warna kulit gelap atau hitam dan dapat dikenali pada payudara, abdomen, vulva dan wajah. Ketika terjadi pada kulit muka dikenal sebagai cloasma atau topeng kehamilan. Bila terjadi pada muka biasanya pada daerah pipi dan dahi dan dapat mengubah penampilan wanita tersebut.

Linea alba garis putih tipis yang membentang dari simphisis pubis sampai umbilicus, dapat menjadi gelap yang biasa disebut linea nigra. Peningkatan pigmentasi ini akan berkurang sedikit demi sedikit setelah masa kehamilan. Tingginya kadar hormon yang tersirkulasi dalam darah dan peningkatan regangan pada kulit abdomen, paha, dan payudara bertanggung jawab pada timbulnya garis-garis yang berwarna merah muda atau kecoklatan pada daerah tersebut. Tanda tersebut biasa dikenal dengan nama striae gravidarum dan bisa menjadi lebih gelap warnanya pada multipara dengan warna kulit gelap atau hitam. Striae gravidarum ini akan berkurang setelah masa kehamilan dan biasanya nampak seperti garis-garis yang berwarna keperakan pada wanita kulit putih atau wana gelap/ hitam akan mengkilat (Nurul Jannah, 2012:101-103).

g. Sistem urinaria

Pada trimester kedua aliran darah ginjal meningkat dan tetap terjadi hingga usia kehamilan 30 minggu, setelah itu menurun secara perlahan. Ginjal meengalami pembesaran dan filtrasi glomerular. Perubahan dalam filtrasi glomerulus adalah penyebab peningkatan klirens kreatinin, urea, dan asam urat yang sangat direabsorpsi pada awal kehamilan. Protein dan asam amino sangat sedikit direabsorpsi, sementara asam amino dan vitamin ditemukan dalam jumlah yang banyak dalam urin wanita hamil hanya protein yang tidak bisa ditemukan pada urin wanita hamil.

Ekskresi glukosa meningkat sebagai hasil peningkatan filtrasi glomerulus terhadap glukosa dibandingkan dengan pengurangan reabsorpsi. Glikosuria merupakan hal yang umum dalam kehamilan dan biasanya berhubungan dengan

kadar gula tinggi dalam darah. Dalam hal ini, keadaan wanita hamil harus dipantau untuk menghindari diabetes melitus. Glukosuria dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Walaupun ada 100 liter cairan ekstra yang dapat melalui tubuler ginjal setiap harinya, saluran urine mengalami pengurangan karena peningkatan reabsorpsi (Ida Ayu, 2010:94).

h. Sistem Endokrin

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar $\pm 135\%$. Akan tetapi, kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti penting dalam kehamilan. Pada perempuan yang mengalami hipofisektomi persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon prolaktin akan meningkat 10 x lipat pada saat kehamilan aterm. Sebaliknya, setelah persalinan konsentrasinya pada plasma akan menurun. Hal ini juga ditemukan pada ibu-ibu yang menyusui.

Kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 15,0 ml pada saat persalinan akibat dari hiperplasia kelenjar dan peningkatan vaskularisasi. Pengaturan konsentrasi kalsium sangat sangat berhubungan dengan erat dengan magnesium, fosfat, hormon paratiroid, vitamin D, dan kalsitonin. Adanya gangguan pada salah satu faktor itu akan menyebabkan perubahan pada yang lainnya. Konsentrasi plasma hormon paratiroid akan menurun pada trimester pertama dan kemudian akan meningkat secara progresif. Aksi yang penting dari hormon paratiroid ini adalah untuk memasok janin dengan kalsium yang adekuat. Selain itu juga diketahui mempunyai peran dalam produksi peptida pada janin, plasenta dan ibu. Pada

saat hamil dan menyusui dianjurkan untuk mendapat asupan vitamin D 10 mg atau 400 IU.

Kelenjar adrenal pada kehamilan normal akan mengecil, sedangkan hormon androstenedion, testosteron, dioksikortikosteron, aldosteron, dan kortisol akan meningkat, sementara itu dehidroepiandrosteron sulfat akan menurun (Sarwono, 2014:186).

i. Sistem pernapasan

Pada kehamilan, terjadi juga perubahan sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan Oksigen. Disamping itu, terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada usia kehamilan 32 minggu. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernapas lebih dalam sekitar 20 sampai 25% daripada biasanya (Ida Ayu, 2010:93).

B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care (ANC)

1. Pengertian Antenatal Care

Asuhan antenatal care adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persiapan persalinan yang aman dan memuaskan (Walyani, 2015:78).

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (G.A.Mandriwati, 2012:3).

2. Tujuan Pelayanan Antenatal Care

Tujuan utama ANC adalah menurunkan atau mencegah kasakitan dan kematian maternal dan perinatal (Elisabeth, 2016 :11). Selain itu tujuan umum ANC menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama kehamilan, persalinan dan nifas, sehingga didapatkan ibu dan anak sehat (Setiawati, 2013:14).

Adapun tujuan khusus adalah:

- a. Memonitor kemajuan kehamilan guna memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayi normal.
- b. Mengenali secara dini penyimpangan dari normal dan memberikan penatalaksanaan yang diperlukan.
- c. Membina hubungan saling percaya antara ibu dan bidan dalam rangka mempersiapkan ibu dan keluarga secara fisik, emosional, dan logis untuk menghadapi kelahiran serta memungkinkan adanya komplikasi (Elisabeth, 2016:11).
- d. Mengenali dan menangani penyakit-penyakit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan dan nifas misalnya pada kehamilan.
- e. adanya hiperemesis gravidarum yaitu muntah yang berlebihan yang dapat membahayakan ibu hamil karena keluarnya cairan dan berkurangnya masukan nutrisi karena mual muntah.
- f. Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita sedini mungkin, misalnya adanya penyakit hipertensi yang menyertai kehamilan.
- g. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak.

- h. Memberikan nasehat-nasehat tentang cara hidup sehari-hari berkaitan dengan kehamilan, nifas, laktasi dan keluarga berencana (Setiawati, 2013:14).

3. Kunjungan Pelayanan Antenatal Care

Frekuensi pelayanan antenatal oleh WHO ditetapkan 4 kali kunjungan ibu hamil dalam pelayanan antenatal, selama kehamilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-13 minggu)
- b. 1 kali pada trimester dua (usia kehamilan 14-27 minggu)
- c. dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 28-40 minggu)

pemeriksaan meliputi :

anamnesa dan pemantauan ibu dan janin, mengenal kehamilan risiko tinggi, imunisasi, nasihat dan penyuluhan, mencatat data yang tetap setiap kunjungan, tindakan tepat untuk merujuk (Nurul Jannah, 2012:6).

4. Standar pelayanan Antenatal

Dalam standar pelayanan antenatal untuk pengelolaan anemia pada kehamilan terdapat pada standar enam dengan tujuan untuk menemukan anemia pada kehamilan secara dini, dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Pada standar ini dilakukan pernyataan bahwa, bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prasyarat dalam standar ini yaitu, adanya pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan, bidan mampu mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan, memberikan penyuluhan gizi

untuk mencegah anemia, alat untuk mengukur kadar Hb yang berfungsi baik, tersedia tablet zat besi dan asam folat, menggunakan KMS Ibu hamil/ buku KIA, Kartu ibu. Adapun proses yang harus dilakukan untuk pengelolaan anemia pada kehamilan diantaranya bidan harus:

1. Memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama, dan pada minggu ke-28. Hb dibawah 11 gr% pada kehamilan termasuk anemia dibawah 7 gr% adalah anemia berat. Bila alat pemeriksaan tidak tersedia, periksa kelopak mata dan perkirakan ada/tidaknya anemia.
2. tablet zat besi pada semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut-turut. Bila Hb kurang dari 11 gr% teruskan pemberian tablet zat besi.
3. Beri penyuluhan gizi pada setiap kunjungan antenatal, tentang perlunya meminum tablet zat besi, makanan yang mengandung zat besi sebelum/sesudah makan (teh/ kopi atau susu mengganggu penyerapan zat besi).
4. Jika prevalensi malaria tinggi, selalu ingatkan ibu untuk berhati-hati agar tidak tertular penyakit malaria. Beri tablet klorokuin 10 mg/kg BB per oral, sehari satu kali selama 2 hari. Kemudian anjurkan dengan 5 mg/kg BB pada hari ke-3. Klorokuin aman dalam 3 trimester kehamilan).
5. Jika ditemukan/diduga anemia (bagian dalam kelopak mata pucat), berikan 2-3 kali 1 tablet zat besi perhari.

6. Rujuk ibu hamil dengan anemia untuk pemeriksaan terhadap penyakit cacing/ parasit atau penyakit lainnya, dan sekaligus untuk pengobatannya.
7. Jika diduga ada anemia berat (misalnya: wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat), segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya. Ibu hamil dengan anemia pada trimester ketiga perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM.
8. Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin di rumah sakit.
9. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan (Purwoastuti 2015: 15-20).

5. Kebijakan Pelayanan Asuhan Antenatal Care

Kebijakan pelayanan asuhan antenatal bertujuan memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan melakukan deteksi dini terhadap komplikasi sedini mungkin. Proses pelaksanaannya selama kehamilan yaitu bidan mengupayakan memberi asuhan antenatal paling sedikit 4 kali selama kehamilan.

Pelayanan asuhan antenatal yang harus diberikan bidan setiap kehadiran ibu di unit pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi:

- a. Anamnesa untuk mengumpulkan data subjektif yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan janin.
- b. Pemantauan pertumbuhan janin, termasuk penimbangan berat badan pada ibu hamil, pemantauan pertambahan tinggi fundus uteri, dan pemantauan denyut jantung janin melalui pemeriksaan fisik dengan inspeksi, palpasi, dan auskultasi.

- c. Pemantauan kesehatan ibu, meliputi pemantauan status gizi melalui pengukuran lingkaran lengan atas dan pemantauan tanda vital termasuk tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan, serta refleks patela.

Untuk mendeteksi dini adanya kelainan atau komplikasi kehamilan dilakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Inspeksi mata untuk melihat adanya tanda anemia pada konjungtiva dan ikterus pada sklera mata.
 - 2) Inspeksi daerah leher untuk mengetahui pelebaran vena jugularis dan palpasi untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid.
 - 3) Palpasi payudara untuk mengetahui kelainan.
 - 4) Inspeksi alat kelamin luar untuk mengidentifikasi tanda infeksi atau penyakit menular seksual.
- d. Interpretasi dan analisis data sampai memperoleh rumusan diagnosis. Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan, dibuat perumusan rencana asuhan, seperti pemberian informasi dan pendidikan kesehatan tentang kehamilan dan persiapan persalinan, pemberian suplemen gizi, imunisasi tetanus toksoid, melakukan konseling pada masalah-masalah kehamilan, serta senam hamil (G.A. Mandriwati, 2011:5).

C. Tinjauan Umum khusus Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit dibawah nilai normal. Pada penderita anemia, lebih sering disebut kurang darah, kadar sel darah merah (Hemoglobin/HB) dibawah nilai

normal. Penyebabnya bisa karena kurangnya zat gizi untuk pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat dan vitamin B12. Tetapi yang sering terjadi adalah anemia karena kekurangan zat besi (Proverawati, 2011:1).

Anemia secara praktis didefinisikan sebagai kadar Ht, konsentrasi Hb, atau hitung eritrosit di bawah batas “normal”. Namun, nilai normal yang akurat untuk ibu hamil sulit dipastikan karena ketiga parameter laboratorium tersebut bervariasi selama periode kehamilan. Umumnya ibu hamil dianggap anemia jika kadar hemoglobin di bawah 11g%. Dalam praktik rutin, konsentrasi Hb kurang dari 11g% pada akhir trimester pertama dan <10g% pada trimester kedua dan ketiga diusulkan menjadi batas bawah untuk mencari penyebab anemia dalam kehamilan. Pada ibu hamil yang mendapat suplementasi besi, yaitu 11g% pada trimester pertama dan 10,05g/pada trimester kedua dan ketiga (Sarwono, 2014:775-776).

2. Klasifikasi anemia

a. Klasifikasi berdasarkan penyebabnya

1) Anemia defisiensi besi

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat kosongnya cadangan besi tubuh (*depleted iron store*) sehingga penyediaan besi untuk eritropoiesis berkurang, yang pada akhirnya pembentukan hemoglobin berkurang (Made Bakta, 2006:26).

Pada kehamilan kehilangan zat besi terjadi akibat pengalihan besi maternal ke janin untuk eritropoiesis, kehilangan darah pada saat persalinan, dan laktasi. Kurangnya besi berpengaruh dalam pembentukan hemoglobin sehingga

konsentrasinya dalam sel darah merah berkurang, hal ini akan mengakibatkan tidak adekuatnya pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh.

Kebutuhan zat besi meningkat secara linier sesuai dengan umur kehamilan. Walaupun penambahan masa eritrosit berhenti pada 5-10 minggu terakhir dari kehamilan, akan tetapi pada trimester ketiga eritropoiesis janin meningkat dan terjadi akumulasi besi plasenta. Jumlah rata-rata kehamilan sebanyak 840 mg. Sekitar 350 mg besi ditransfer ke janin dan plasenta, 250 mg hilang dalam darah selama pengiriman dan 250 mg hilang melalui sel basal. Diperlukan tambahan zat besi sekitar 450 mg yang digunakan untuk ekspansi massa eritrosit maternal dan berkontribusi penurunan besi cadangan dari penyimpanan besi selama gestasi (Tarwoto dan Wasnidar, 2016:65-66).

2) Anemia Akibat Perdarahan Akut

Sering terjadi pada masa nifas. Solusio plasenta dan plasenta previa dapat menjadi sumber perdarahan serius. Pada awal kehamilan, anemia akibat perdarahan sering terjadi pada kasus-kasus abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa (Sarwono:2005).

Perdarahan yang masih memerlukan penggantian yang segera dengan darah lengkap dalam jumlah yang cukup untuk memulihkan dan mempertahankan perfusi organ-organ penting secara memadai, setelah hipovolemia teratasi dan tindakan hemostasis sudah tercapai, maka anemia yang masih tersisa harus diobati dengan pemberian zat besi (Taufan Nugroho, 2012:16).

3) Anemia pada penyakit kronik

Penyakit kronik seringkali disertai dengan anemia, namun tidak semua anemia pada penyakit kronik dapat digolongkan sebagai anemia akibat penyakit kronik. Anemia akibat penyakit kronik adalah anemia yang dijumpai pada penyakit kronik tertentu yang khas ditandai oleh gangguan metabolisme besi, yaitu adanya hipoferemia sehingga menyebabkan berkurangnya penyediaan besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin tetapi cadangan besi sumsum tulang masih cukup (Made Bakta, 2006:39).

Selama kehamilan, sejumlah penyakit kronik dapat menyebabkan anemia beberapa diantaranya adalah penyakit ginjal kronik, supurasi, penyakit peradangan usus, infeksi tuberculosis, endokarditis dan infeksi virus immunodefisiensi manusia (HIV).

4) Anemia Megaloblastik

Anemia megaloblastik adalah anemia yang khas ditandai oleh adanya sel megaloblast dalam sumsum tulang. Anemia megaloblast disebabkan oleh gangguan pembentukan DNA pada inti eritroblast, terutama akibat defisiensi Vitamin B12 dan asam folat. Sel megaloblast ini fungsinya tidak normal, dihancurkan semasa dalam sum-sum tulang sehingga terjadinya eritropoeisis tidak efektif dan masa hidup eritrosit lebih pendek, keadaan ini mengakibatkan leukopenia, trombositopenia dan gangguan pada oral, gastrointestinal dan neurologi (Tarwoto dan Wasnidar, 2013:48).

Anemia megaloblastik disebabkan oleh terjadinya defisiensi vitamin B12 dan asam folat, dimana vitamin B12 dan asam folat berfungsi dalam pembentukan DNA

inti sel dan khusus vitamin B12 penting dalam pembentukan myelin. Penyebab dari kekurangan kedua bahan ini pada wanita hamil karena faktor nutrisi, karena cadangan asam folat tubuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan cadangan Vitamin B12(Made Bakta, 2006:45-46).

5) Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan penghancuran/pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari proses pembuatannya. Ini dapat disebabkan oleh faktor intrakorpuskuler yang dijumpai pada anemia hemolitik heriditer, talasemia, anemia sel sickle(sabit), hemoglobinopati C, D, G, H, I dan paraksismal nokturnal hemoglobinuria serta faktor ekstrakorpuskuler disebabkan malaria, sepsis, keracunan zat logam, dan dapat beserta obat-obatan.

Gejala utama adalah anemia dengan kelainan-kelainan gambaran darah, kelelahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Pengobatan bergantung pada jenis anemia hemolitik serta penyebabnya. Bila disebabkan oleh infeksi maka infeksiya diberantas dan diberikan obat-obat penambah darah. Namun, pada beberapa jenis obat-obatan, hal ini tidak memberi hasil. Maka tranfusi darah yang berulang dapat membantu penderita ini.

b. Klasifikasi berdasarkan kadar hemoglobin darah

1) Kriteria anemia menurut WHO

Laki-laki dewasa : Hemoglobin 13g%

Wanita dewasa tidak hamil : Hemoglobin 12g%

Wanita hamil : Hemoglobin 11g%

Anak umur 6-14 tahun : Hemoglobin 12g%

Anak umur 6 bulan -6 tahun : Hemoglobin 11g%

2) Derajat anemia berdasarkan kadar Hemoglobin menurut WHO

Ringan sekali : Hb 10g%-batas normal

Ringan : Hb 8g%-9,9g%

Sedang : Hb 6g%-7,9g%

Berat : Hb <6g%

3) Derajat anemia menurut manubaba

Tidak anemia : Hb 11g%

Anemia ringan : Hb 9-10g%

Anemia sedang : Hb 7-8g%

Anemia berat : Hb <7g5

3. Tanda dan Gejala Anemia

- a. Merasa lelah dan sering mengantuk oleh karena rendahnya Hb dan kurangnya oksigen, sehingga kurang transport untuk metabolisme dalam tubuh.
- b. Merasa pusing dan lemah (*dizziness dan weakness*) oleh kurangnya oksigen dan energi menyebabkan ibu meras lemah dan capek
- c. Mengeluh sakit kepala
- d. Merasa tidak enak badan (malaise) dan nafas pendek karema menurunnya suplay darah
- e. Perubahan mood dan kebiasaan tidur
- f. Mengeluh lidah mudah luka (lecet)

- g. Pucat pada membrane mukosa dan konjungtiva
- h. Kulit pucat
- i. Pucat pada kuku jari
- j. Muka ikterik
- k. *Takipnea, dispnea* saat beraktivitas.
- l. nafsu makan kurang perubahan dalam kesukaan makanan
- m. kebiasaan akan makanan yang aneh-aneh atau mengidam (pica) (Proverawti, 2011:135).

4. Etiologi Anemia

Penyebab utama anemia pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan sumber Fe, meningkatnya kebutuhan Fe saat hamil dan menyusui (kebutuhan fisiologis), dan kehilangan banyak darah saat menstruasi.

a) Asupan Fe yang tidak memadai

Kecukupan intake Fe tidak hanya dipenuhi oleh konsumsi makanan sumber Fe (daging sapi, ayam, ikan, telur, dll), tetapi dipengaruhi oleh variasi penyerapan Fe. Yang membentuk 90% Fe dari makanan non daging (termasuk biji-bijian, sayuran, buah, telur) tidak mudah diserap tubuh.

b) Peningkatan kebutuhan fisiologi

Kebutuhan Fe meningkat selama hamil untuk memenuhi kebutuhan Fe akibat peningkatan volume darah, untuk menyediakan Fe bagi janin dan plasenta, dan untuk menggantikan kehilangan darah saat persalinan.

c) Kehilangan banyak darah

Kehilangan darah terjadi melalui operasi, penyakit dan donor darah. Pada wanita kehilangan darah terjadi melalui menstruasi dan wanita hamil mengalami perdarahan saat dan setelah melahirkan.

Perdarahan patologi akibat penyakit/infeksi parasit seperti cacingan dan saluran pencernaan berhubungan positif terhadap anemia. Perdarahan *gastrointestinal* oleh adanya luka di saluran gastrointestinal (gastritis, tukak lambung, kanker kolon dan polip pada kolon). Ibu hamil yang mengalami anemia dengan perdarahan gastrointestinal umumnya akan mengalami anemia sedang namun cukup besar proporsi untuk mengalami anemia berat. Direkomendasikan wanita hamil yang terinfeksi parasit usus dan cacingan untuk melakukan skrining rutin (Kefiyaew, 2014: 7).

5. Patofisiologi Anemia

a. Patofisiologi anemia dalam kehamilan

Anemia lebih sering ditemukan dalam kehamilan karena keperluan akan zat-zat makanan makin bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Volume darah bertambah banyak dalam kehamilan, yang lazim disebut hidremia atau hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding sebagai berikut : plasma 30%. Sel darah 18%, dan hemoglobin 19%.

Hemodilusi dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologi dalam kehamilan dan bermanfaat bagi ibu yaitu dapat meringankan beban kerja jantung yang harus bekerja lebih berat dalam masa hamil, yang disebabkan oleh peningkatan *cardiac output* akibat hipervolemia. Kerja jantung lebih ringan apabila viskositas darah rendah. Resistensi perifer berkurang pula, sehingga tekanan darah tidak naik. Kedua, pada perdarahan waktu persalinan, banyaknya unsur besi yang hilang lebih sedikit dibandingkan dengan apabila darah itu tetap kental. Bertambahnya darah dalam kehamilan sudah mulai sejak kehamilan umur 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan antara 32 dan 36 minggu (Tarwoto dan Wasnidar, 2013:37)

b. Patofisiologi anemia defisiensi besi

Zat besi masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Pada jaringan tubuh besi berupa senyawa fungsional seperti hemoglobin, mioglobin, dan enzim, senyawa besi transportasi yaitu dalam bentuk transferrin dan senyawa besi cadangan seperti ferritin dan hemosiderrin.

Besi ferri dari makanan menjadi ferro jika dalam keadaan asam dan bersifat mereduksi sehingga mudah diabsorpsi oleh mukosa usus. Dalam tubuh besi tidak terdapat bebas tetapi berikatan dengan molekul protein membentuk ferritin, komponen proteinnya disebut apoferritin, sedangkan dalam bentuk transport zat besi dalam bentuk ferro berikatan dengan protein membentuk transferin, dalam plasma darah disebut serotransferin.

Zat besi yang berasal dari makanan seperti daging, hati, telur, sayuran hijau dan buah-buahan diabsorpsi di usus halus. Rata-rata dari makanan yang masuk

mengandung 10-15 mg zat besi tetapi hanya 5-10% yang dapat diabsorpsi. Penyerapan zat besi ini di pengaruhi oleh faktor adanya protein hewani dan vitamin C. sedangkan yang menghambat serapan adalah kopi, teh, garam kalsium dan magnesium karena bersifat mengikat zat besi. Menurunnya asupan zat besi yang merupakan unsur utama pembentukan hemoglobin maka kadar/produksi hemoglobin juga akan menurun(Tarwoto dan Wasnidar, 2013:44).

c. Patofisiologi anemia akibat perdarahan akut

Kehilangan darah melalui perdarahan yang terjadi mengakibatkan anemia karena konsentrasi hemoglobin yang menurun yang menyebabkan hipovolemia yang merata, sehingga terjadi kolaps kardiovaskuler yang mempengaruhi kadar hemoglobin dalam tubuh(Taufan Nugroho, 2012:14).

d. Patofisiologi anemia pada penyakit kronik

Patogenesis anemia akibat penyakit kronik belum diketahui dengan pasti, tetapi beberapa teori yang diajukan yaitu gangguan pelepasan besi dari RES (sel makrofag) ke plasma, pemendekan masa hidup eritrosit, pembentukan eritropoetin tak adekuat, respons sumsum tulang terhadap eritropetin tak adekuat. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh sitokin proinflamasi terhadap eritropoesis yang menyebabkan gangguan pelepasan besi ke plasma sehingga berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoesis yang berakibat pada pembentukan hemoglobin sehingga terjadi anemia(Made Bakta, 2006:39).

e. Patofisiologi anemia megaloblastik

Defisiensi Vit B12 dan asam folat diyakini akan menghambat sintesis DNA untuk replikasi sel termasuk SDM sehingga bentuk, jumlah dan fungsinya tidak sempurna. Intrinsic Faktor (IF) berasal dari sel-sel lambung yang dipengaruhi oleh pencernaan protein (glukoprotein), IF akan mengalir ke ilium untuk membantu mengabsorpsi Vit B12. Vit B12 juga berperan dalam pembentukan myelin pada sel saraf sehingga terjadinya defisiensi akan menimbulkan gangguan neurologi (Tarwoto dan Wasnidar, 2013:50).

Akibat gangguan sintesis DNA pada inti eritroblast maka maturitas inti lebih lambat sehingga kromatin lebih longgar, sel menjadi lebih besar karena pembelahan sel lambat yang disebut sebagai sel megaloblast. Sel megaloblast ini fungsinya tidak normal, dihancurkan semasih dalam sumsum tulang sehingga terjadi eritropoiesis tidak efektif dan masa hidup eritrosit lebih pendek yang berujung pada terjadinya anemia (Made Bakta, 2006:45).

f. Patofisiologi anemia hemolitik

Proses hemolisis akan menimbulkan penurunan kadar hemoglobin yang akan mengakibatkan anemia. Hemolisis dapat terjadi perlahan-lahan sehingga dapat diatasi oleh mekanisme kompensasi tubuh, tetapi dapat juga terjadi tiba-tiba sehingga segera menurunkan kadar hemoglobin. Jika derajat hemolisis ringan sampai sedang maka sumsum tulang masih dapat melakukan kompensasi 6-8 kali normal sehingga tidak terjadi anemia. Akan tetapi, apabila derajat hemolisis berat maka mekanisme kompensasi tidak dapat mengatasi hal tersebut sehingga terjadi anemia hemolitik (Made Bakta, 2006:52).

6. Diagnosis Anemia pada Kehamilan

untuk menegakkan diagnosis anemia kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa. Pada anamnesa akan dipatikan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda.

Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat *sahli*. Hasil pemeriksaan Hb dengan *sahli* dapat digolongkan sebagai berikut:

Hb 11 g%	: tidak anemia
Hb 9-10g%	: anemia ringan
Hb 7-8gr%	: anemia sedang
Hb <7g%	: anemia berat

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, maka dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 tablet pada ibu-ibu hamil di puskesmas (Manuaba, 2011:239).

a) Anemia ringan

Anemia ringan dengan kadar Hb 9-10gr%, ibu hamil dengan anemia ringan produktifitas kerjanya akan menurun tapi ibu hamil dengan kondisi ini bisa melewati kehamilan dan persalinan tanpa akibat atau komplikasi apapun.

b) Anemia sedang

Anemia sedang dengan kadar Hb 7-8gr%, Ibu hamil dengan anemia sedang memiliki pengurangan substansi dalam kapasitas kerja. Ibu hamil dengan anemia

sedang akan mengalami lebih rentan terhadap infeksi dan pemulihan dari infeksi akan berkepanjangan, kelahiran premature, bayi lahir dengan berat lahir rendah, kematian ibu akibat antepartum dan perdarahan post partum.

c) Anemia berat

Anemia berat dengan kadar Hb $<7\text{gr\%}$ Tiga stadium anemia berat yang berbeda Telah diakui - kompensasi, Dekompensasi, dan yang terkait dengan Kegagalan peredaran darah Jantung Dekompensasi biasanya terjadi ketika Hb Jatuh di bawah $5,0\text{ g / dl}$. Curah jantung dibesarkan bahkan saat istirahat, volume stroke menjadi lebih besar dan detak jantung meningkat. Palpitasi dan sesak bahkan saat istirahat merupakan gejala dari perubahan ini. Ini Mekanisme kompensasi tidak memadai untuk mengatasi penurunan Hblevels. Oksigen kurang berakibat anaerob metabolisme dan akumulasi asam laktat yang akhirnya terjadi peredaran darah membatasi hasil kerja. Jika tidak diobati, Ini menyebabkan edema paru dan kematian.

Bila Hb $<5\text{ g / dl}$ dan sel yang dikemas Volume (PCV) di bawah 14 [12]. Kehilangan darah Bahkan 200 ml di tahap ketiga menghasilkan Shock dan kematian pada wanita ini. Bahkan hari ini perempuan di daerah pedesaan terpencil di Indonesia India sampai di rumah sakit hanya pada saat ini Dekompensasi panggung Data yang tersedia dari India menunjukkan bahwa angka morbiditas ibu lebih tinggi pada wanita dengan Hb di bawah 8.0 g / dl . tingkat kematian ibu menunjukkan kenaikan tajam saat tingkat hb ibu Jatuh di bawah $5,0\text{ g / dl}$. Anemia langsung menyebabkan 20 persen kematian ibu di India dan Secara tidak langsung menyumbang 20 lainnya Persen kematian ibu (Shaikh sabina dkk, 2015: 146).

7. Pengaruh Anemia pada kehamilan dan janin

a. Bahaya selama kehamilan

Tumbuh kembang janin terlambat dengan berbagai manifestasi kliniknya, dapat terjadi abortus, persalinan prematuritas, mudah terjadi infeksi, mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini (KPD).

b. Bahaya terhadap persalinan

Gangguan His, kala satu dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar, kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering melakukan tindakan operasi kebidanan, kala tiga dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan postpartum karena atonia uteri, kala empat dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri.

c. Pada post partum

Terjadi subinvolisio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang, terjadi dekomposisi kordis mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas.

d. Bahaya terhadap janin

Akibat anemia dapat terjadi gangguan dalam bentuk abortus terjadi kematian intra uterine, persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal, Intelegensia rendah (Manuaba, 2011:240).

8. pencegahan dan penanganan Anemia

a. pencegahan anemia

Nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil atau mencoba hamil. Makan-makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran berdaun hijau, daging merah, sereal, telur, dan kacang tanah) dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Pemberian vitamin untuk memastikan bahwa tubuh memiliki cukup asam besi dan folat. Pastikan tubuh mendapatkan setidaknya 27mg zat besi setiap hari. Selama kehamilan ibu hamil juga mengkonsumsi suplemen zat besi.

Biasanya anemia bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya seperti buncis, daging, dan ubi rambat, kuning telur, ikan segar dan sayuran yang berwarna hijau dan makanan yang tinggi vitamin C-nya, seperti buah-buahan yang mengandung zat besi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S.An-Nahl/16: 10-11 tentang pentingnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾
 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya(menyuburkan)tumbuh-tumbuhan,yang pada(tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan manusia dengan berbagai jenis, warna, rasa dan bentuknya. Begitu juga buah-buahan karena dapat dijadikan sebagai penghasilan dan makanan yang bernutrisi demi kelanjutan kehidupan di dunia ini (Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir, 1418 h.,jilid XIV, hal 98).

Pada ayat yang lain, Allah SWT menjelaskan juga tentang pentingnya daging, daging yang masih segar seperti dalam QS: an-Nahl/16:14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“dan Dia-lah, Allah yang menudukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar(ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai: dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan daging yang masih segar seperti ikan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan badan seseorang. Hal ini menjadi bukti bahwa daging yang segar merupakan salah satu unsur yang mengandung zat besi nonhem yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan jasmani.

b. Penanganan anemia

NICE guidelines merekomendasikan agar wanita diskriming terhadap anemia saat melakukan pemeriksaan pada usia kehamilan 28 minggu. Semua wanita harus diberi nasehat mengenai pola makan di kehamilan dengan rincian makanan kaya zat besi. Ini harus didukung dengan informasi tertulis karena perubahan diet saja tidak cukup untuk memperbaiki defisiensi besi yang keluar pada kehamilan dan suplemen zat besi sangat diperlukan pada kehamilan (shaikh sabina, 2015: 150-151)

1) Anemia Ringan

Dengan kadar Hemoglobin 9-10 gr% masih dianggap ringan sehingga hanya perlu diberikan kombinasi 60 mg/hari, zat besi dan 400 mg asam folat peroral sekali sehari

2) Anemia Sedang

Pengobatannya dengan kombinasi 120 mg zat besi dan 500 mg asam folat peroral sekali sehari.

3) Anemia Berat

Pemberian preparat parenteral yaitu dengan *fero dextrin* sebanyak 1000 mg (20 ml) intravena atau 2x10 ml intramuskuler. Transfusi darah kehamilan lanjut dapat diberikan walaupun sangat jarang diberikan mengingat resiko transfusi bagi ibu dan janin (Proverawati, 2011:136)

c. Penatalaksanaan pada anemia

1) Tatalaksana Umum

Apabila diagnosis anemia telah ditegakkan, lakukan pemeriksaan apusan darah tepi untuk melihat morfologi sel darah merah. Bila pemeriksaan apusan darah tepi tidak tersedia, berikan suplementasi besi dan asam folat. Tablet yang saat ini banyak tersedia di Puskesmas adalah tablet tambah darah yang berisi 60 mg besi elemental dan 250 µg asam folat. Pada ibu hamil dengan anemia, tablet tersebut dapat diberikan 3 kali sehari. Bila dalam 90 hari muncul perbaikan, lanjutkan pemberian tablet sampai 42 hari pascasalin. Apabila setelah 90 hari pemberian tablet besi dan asam folat kadar hemoglobin tidak meningkat, rujuk pasien ke pusat pelayanan yang lebih tinggi untuk mencari penyebab anemia (buku saku pelayanan kesehatan ibu, 2013:160).

2) Tatalaksana khusus

Bila tersedia fasilitas pemeriksaan penunjang, tentukan penyebab anemia berdasarkan hasil pemeriksaan darah perifer lengkap dan apus darah tepi.

- a) Anemia mikrositik hipokrom dapat ditemukan pada keadaan defisiensi besi lakukan pemeriksaan ferritin. Apabila ditemukan kadar ferritin < 15 ng/ml, berikan terapi besi dengan dosis setara 180 mg besi elemental per hari. Apabila kadar ferritin normal, lakukan pemeriksaan SI dan TIBC. Pada Pasien dengan kecurigaan thalassemia perlu dilakukan tatalaksana bersama dokter spesialis penyakit dalam untuk perawatan yang lebih spesifik.
- b) Anemia normositik normokrom dapat ditemukan pada keadaan Perdarahan segera tanyakan riwayat dan cari tanda dan gejala aborsi, mola, kehamilan ektopik, atau perdarahan pasca persalinan dan Infeksi kronik.

- c) Anemia makrositik hiperkrom dapat ditemukan pada keadaan defisiensi asam folat dan vitamin B12 berikan asam folat 1 x 2 mg dan vitamin B12 1 x 250 – 1000 µg.
- d) Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi berikut: Kadar Hb 7 g/dl dengan gejala klinis: pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100x per menit).
- e) Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi Kadar Hb 7 g/dl dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100x per menit).
- f) Lakukan penilaian pertumbuhan dan kesejahteraan janin dengan memantau pertambahan tinggi fundus, melakukan pemeriksaan USG, dan memeriksa denyut jantung janin secara berkala (buku saku pelayanan kesehatan ibu, 2013:161).
- d. SOP pemberian Tablet Zat Besi pada Ibu Hamil
- 1) Nama Pekerjaan
Pemberian Tablet Zat besi pada ibu hamil
 - 2) Tujuan
Sebagai acuan dalam melakukan pemberian tablet zat besi pada ibu hamil dan anemia pada kehamilan untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung.
 - 3) Ruang Lingkup
Semua ibu hamil yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan Puskesmas Somba Opu Gowa meliputi pasien baru, ibu hamil dengan anemia.
 - 4) Keterampilan petugas
Bidan terlatih

5) Uraian umum

Tidak ada

6) Alat dan bahan

Alat tulis dan lembar pemeriksaan laboratorium dan tablet Zat besi

7) Instruksi kerja

- a) Periksa konjungtiva pasien, menentukan pasien anemia atau tidak.
- b) Catat hasil pemeriksaan dalam kartu status dan KMS ibu hamil.
- c) Jelaskan pada pasien tujuan dari pemeriksaan
- d) Mengarahkan pasien ke laboratorium dan membawa hasil pemeriksaan kembali ke pelayanan antenatal.
- e) Beri tablet zat besi pada semua ibu hamil , sedikitnya 1 tablet/hari, selama 30 hari berturut-turut untuk pasien hamil trimester I sedangkan untuk ibu hamil dengan anemia diberikan tablet besi dan vitamin C tiga kali satu tablet perhari.
- f) Beri penyuluhan gizi pada semua ibu hamil di setiap kunjungan tentang perlunya minum tablet zat besi dan vitamin C serta menghindari minum teh, kopi, susu dalam 1 jam sebelum dan sesudah makan, karena dapat mengganggu penyerapan zat besi.

8) Indikator kerja

Ibu hamil tidak anemia saat kehamilan

e. Diet pola makan ibu dengan anemia

Pada saat hamil, ibu harus makan makanan yang mengandung nilai gizi yang bermutu tinggi, dan tidak harus mahal. Gizi pada ibu hamil harus ditingkatkan hingga

300 kalori perhari, ibu hamil harusnya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi dan minum cukup cairan (menu seimbang)

kebutuhan kalori, protein dan mineral adalah sebagai berikut:

1) Kalori

Kebutuhan kalori untuk ibu hamil setiap harinya adalah 2500 kalori. Jumlah kalori yang berlebih menyebabkan obesitas, dan ini merupakan faktor predisposisi yang menyebabkan preeklamsi.

2) Protein

Protein sangat dibutuhkan untuk perkembangan buah kehamilan yaitu pertumbuhan janin, uterus dan plasenta. Selain itu protein untuk ibu berguna untuk pertumbuhan payudara dan kenaikan sirkulasi darah ibu (protein plasma, hemoglobin dll). Bila wanita tidak hamil mengkonsumsi protein 55gr/kg bb/hari, sedangkan untuk wanita hamil diperlukan 65gr/kg bb/hari.

3) Mineral

Kebutuhan akan besi pada pertengahan kehamilan kira-kira 17 mg/hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan suplemen besi 30 mg sebagai ferrosus, ferofumarat dan feroglukonat perhari (Tarwoto dan Wasnidar, 2013:60-61).

Setiap ibu hamil perlu mengatur *intake* makanan sesuai program diet ibu hamil yang bertujuan dengan memberikan makanan yang dapat mencegah dan memperbaiki keadaan anemia. Meningkatkan konsumsi makanan sumber pembentukan sel darah merah, serta bentuk makanan dan porsi disesuaikan dengan keadaan kesehatan ibu hamil.

Cara meningkatkan asupan Fe dan Asam folat yaitu dengan cara mengkonsumsi :

1. Protein hewani yaitu daging, unggas, seafood, telur, susu dan hasil olahannya.
2. Makanan sumber asam folat antara lain Asparagus, bayam, buncis, hati sapi, kapri, kacang tanah, orange juice, almond, beras merah/tumbuk, kembang kol, telur, selada, dan sereal instan.
3. Buah berwarna jingga dan merah segar lebih yaitu jeruk, pisang, kiwi, semangka atau nanas.
4. Makanan fortifikasi seperti susu, keju, es krim, dan makanan berbasis tepung.
5. Vitamin C untuk meningkatkan absorpsi Fe.
6. Makanan sumber vitamin B12 seperti daging, ikan, hati, makanan fermentasi, yoghurt, udang dan susu (Intan parulian, 2016: 7).

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (kepmenkes 369; 2007,5).

Menurut helen varney (2007) Manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, dan keterampilan dalam tahapan yang

logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Surachmandari, 2013:126).

2. Tujuan Utama Asuhan Kebidanan

Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan kebidanan berfokus pada : pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat holistik diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor, dan pendidikan berpusat pada perempuan, asuhan yang berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter, serta menghormati pilihan perempuan (Kepmenkes 369,2007).

3. Tahapan Dalam manajemen Asuhan Kebidanan

Varney mengatakan bahwa seorang bidan perlu lebih kritis melakukan analisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis dan masalah potensial.

Adapun tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varneys adalah:

a. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesis yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: riwayat kesehatan, riwayat reproduksi: riwayat haid, riwayat obstetri, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat

ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Pada anamnesa ibu hamil dengan anemia akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda.

Sesuai dari hasil pemeriksaan laboratorium akan ditemukan penurunan hematokrit, konsentrasi hemoglobin dan hitung eritrosit yang akan tampak pada minggu ke 7 sampai ke 8 kehamilan dan terus menurun sampai minggu ke-16 sampai ke-22 ketika titik keseimbangan tercapai. Pada trimester pertama, konsentrasi Hb tampak menurun, konsentrasi paling rendah didapatkan pada trimester kedua, dan pada trimester ketiga terjadi sedikit peningkatan Hb.

Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi) dan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan catatan terbaru serta catatan sebelumnya).

Pada ibu hamil dengan anemia dari anamnesis akan ditemukan ibu merasa lelah, sering mengantuk, merasa pusing dan lemah, mengeluh sakit kepala, merasa tidak enak badan, perubahan mood dan kebiasaan tidur, dan mengeluh lidah mudah luka (lecet).

Dari pemeriksaan fisik akan ditemukan pucat pada membrane mukosa dan konjungtiva, kulit pucat, pucat pada kuku jari, muka ikterik dan data penunjang pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan Hb.

b. Langkah II Interpretasi Data Dasar, Diagnosa dan Masalah

Pada langkah kedua ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang dialami wanita diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis.

Diagnosis pada ibu hamil dengan anemia dapat ditetapkan berdasarkan data objektif conjungtiva pucat serta data penunjang Hb <11 gr%.

c. Langkah III (Diagnosis / Masalah Potensial)

Langkah ketiga merupakan langkah ketika bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis / masalah yang sudah diidentifikasi.

Masalah potensial yang bisa timbul Pada kasus ibu hamil dengan anemia adalah terjadi anemia ringan menjadi anemia sedang, anemia sedang menjadi anemia berat.

Masalah yang bisa timbul dari anemia selama kehamilan yaitu tumbuh kembang janin terlambat dengan berbagai manifestasi kliniknya, dapat terjadi abortus, persalinan prematuritas, mudah terjadi infeksi, mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, Ketuban Pecah Dini (KPD).

Pada persalinan ibu dengan anemia dapat terjadi gangguan his, kala satu dapat berlangsung lama, kala dua berlangsung lama sehingga dapat meleahkan dan sering melakukan tindakan operasi, kala uri dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri.

Pada post partum dapat terjadi sub involusio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran Asi berkurang, terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas.

Akibat anemia pada janin dapat terjadi gangguan dalam bentuk abortus, terjadi kematian intra uterine, persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal.

d. Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera)

Merupakan tindakan segera terhadap kondisi yang diperkirakan akan membahayakan klien. Tindakan ini dilaksanakan secara kolaborasi dan rujukan sesuai dengan kondisi klien.

Pada penderita dengan anemia tidak memerlukan tindakan emergency kecuali jika kondisi anemia berat yang disebabkan oleh perdarahan dan membutuhkan transfusi darah.

Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi kadar Hb $<7\text{gr\%}$ atau kadar hematokrit $<20\%$ atau Kadar Hb $>7\text{gr\%}$ dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi $>100\text{xpermenit}$).

e. Langkah V (Penyusunan Rencana Asuhan Menyeluruh)

Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan dengan semua aspek asuhan kebidanan.

Rencana dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta evidence terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Pada penderita dengan anemia dilakukan penatalaksanaan umum yaitu apabila diagnosis anemia telah ditegakkan, lakukan pemeriksaa asupan darah tepi, untuk melihat morfologi sel darah merah. Bila asupan pemeriksaan asupan darah tepi tidak tersedia, berikan suplementasi besi dan asam folat. Pemberian tablet tambah darah yang berisi 60mg besi elemental dan 250 mg asam folat. Pada ibu hamil dengan anemia tablet tersebut diberikan 3 kali sehari. Bila dalam 90 hari muncul perbaikan, lanjutkan pemberian tablet sampai 42 pasca bersalin. Apabila 90 hari pemberian tablet besi dan asam folat kadar hemoglobin tidak meningkat, rujuk pasien ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi untuk mengetahui penyebab anemia.

Penatalaksanaan khusus pada penderita anemia dapat dilakukan pemeriksaan penunjang bila tersedia fasilitas lengkap, tentukan penyebab anemia berdasarkan hasil pemeriksaan darah perifer lengkap dan apus darah tepi. Untuk Anemia mikrositik hipokrom dapat ditemukan pada keadaan dengan defisiensi besi lakukan pemeriksaan ferritin. Apabila ditemukan kadar ferritin < 15 ng/ml, berikan terapi besi

dengan dosis setara 180 mg besi elemental per hari. Apabila kadar ferritin normal, lakukan pemeriksaan SI dan TIBC.

Apabila Pasien dengan kecurigaan thalassemia perlu dilakukan tatalaksana bersama dokter spesialis penyakit dalam untuk perawatan yang lebih spesifik sedangkan anemia normositik normokrom dapat ditemukan pada keadaan Perdarahan dilaksanakan tanyakan riwayat dan cari tanda dan gejala aborsi, mola, kehamilan ektopik, atau perdarahan pasca persalinan dan infeksi kronik.

Anemia makrositik hiperkrom dapat ditemukan pada keadaan defisiensi asam folat dan vitamin B12 pentalaksanaan dilakukan dengan berikan asam folat 1 x 2 mg dan vitamin B12 1 x 250 – 1000 µg . pentalaksanaan dengan transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi kadar Hb 7 g/dl dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100x per menit). Kemudian akukan penilaian pertumbuhan dan kesejahteraan janin dengan memantau pertambahan tinggi fundus, melakukan pemeriksaan USG, dan memeriksa denyut jantung janin secara berkala.

f. Langkah VI Pelaksanaan (implementasi)

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efisien terhadap waktu, biaya dan kualitas pelayanan.

Pada penderita anemia semua tindakan dapat dikukan secara umum sesuai dengan rencana asuhan.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Evaluasi ini dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan. Pada langkah ini meliputi evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Hasil yang diharapkan dari asuhan kebidana ibu hamil dengan anemia diharapkan keadaan umum dan tanda-tanda vital ibu baik, ibu bersedia minum tablet fe dan tata caranya, ibu bersedia makan-makanan yang banyak mengandung sayur, hemoglobin naik, dan tidak terjadi anemia berat (Ellisabeth M.F. Lalita, 2013:125-130).

4. Pendokumentasian Asuhan kebidanan SOAP

untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

- a. **S(subjektif)**: menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I varney)
- b. **O(objektif)**: menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah I varney).
- c. **A(assessment)**: menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatuidentifikasi.

1. Diagnosis/masalah
2. Antisipasi diagnosis/masalah potensial
3. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan (langkah II,III, dan IV Varney)

d. P(plan): menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment (langkah V, VI dan VII Verney).

Pendokumentasian dalam bentuk soap dibuat dari minggu kedua kunjungan kedua dalam pemberian asuhan sampai asuhan selesai atau sampai masalah dapat teratasi.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY “R”
DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA
TANGGAL 22 APRIL-31 MEI 2017

No. Registrasi : 063xxx
Tanggal Masuk : 22 April 2017 Jam 09.47 Wita
Tanggal Pengkajian : 22 April 2017 jam 09.53 Wita
Nama Mahasiswa : Ratna Ayu Dinar

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “R” / Tn. “B”
Umur : 32Tahun / 36 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ±10 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / DIII
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. A. Tonro

B. Data Biologis

1. Keluhan utama

Ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing dan mata berkunang-kunang.

2. Riwayat keluhan utama

Ibu merasakan keluhan sejak 4 hari yang lalu dengan sifat keluhan hilang timbul.

C. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit hipertensi, jantung, asma, dan diabetes mellitus. Ibu juga tidak pernah menderita penyakit menular dan tidak pernah menjalani operasi. Ibu tidak pernah minum alkohol, merokok dan tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil.

D. Riwayat reproduksi

Menarche umur 12 tahun, siklus 28-30 hari, lama 5-7 hari, serta tidak ada nyeri saat haid.

E. Riwayat kehamilan sekarang

1. GIII PII A0
2. HPHT tanggal 3 september 2016
3. HTP tanggal 10 juni 2017
4. Ibu mengatakan usia kehamilannya sudah 8 bulan
5. Ibu mengatakan pergerakan janinnya pertama kali dirasakan pada usia kehamilan \pm 5 bulan.
6. Ibu mengatakan pergerakan janinnya aktif di sebelah kiri
7. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama kehamilan

8. Ibu telah melakukan kunjungan ANC sebanyak 8 kali dan mendapatkan suntik TT sebanyak 2 kali yaitu suntik TT 1 pada tanggal 23 januari 2017 dan TT 2 pada tanggal 23 februari 2017.

F. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas

1. Anak pertama lahir pada tahun 2008 di RSUD Syekh Yusuf dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir 3200gram dengan persalinan normal, keadaan anak sekarang hidup.
2. Anak kedua lahir pada tahun 2010 di RSUD Syekh Yusuf dengan jenis kelamin perempuan dengan berat badan lahir 3800gram dengan persalinan normal, keadaan anak sekarang hidup.

G. Riwayat keluarga berencana

Ibu menggunakan alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan selama 4 tahun setelah melahirkan anak keduanya.

H. Pemenuhan kebiasaan sehari-hari

1. Nutrisi

Sebelum hamil :

ibu mengatakan makan 3 kali sehari dengan porsi sedang seperti nasi, sayur, lauk dan kadang buah, minum 6-7 gelas air putih sehari dan kadang teh pada pagi hari.

Selama hamil :

Ibu mengatakan makan 3-4 kali sehari dengan porsi sedikit seperti nasi, sayur, lauk dan kadang buah, minum susu 2-3 gelas/hari, kadang teh pada pagi hari dan air putih 6-7 gelas/hari.

2. Eliminasi

Sebelum hamil :

Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari, konsistensi lunak, bau dan warnakhas feses, BAK 5-6 kali sehari.

Selama hamil :

Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari, konsistensi keras, bau dan warna khas feses, BAK \pm 8 kali sehari warna kuning.

3. Aktifitas

Sebelum hamil :

Ibu mengatakan sebelum hamil hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Selama hamil :

Ibu mengatakan tetap hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga

4. Istirahat.tidur

Sebelum hamil :

Ibu mengatakan tidur siang \pm 2 jam dan tidur malam \pm 8jam .

Selama hamil :

Ibu mengatakan tidur siang \pm 2 jam tidur malam \pm 6-7 jam.

5. Seksualitas

Sebelum hamil :

ibu mengatakan melakukan hubungan seksual 1 minggu 3 kali dan tidak ada keluhan.

Selama hamil :

Ibu mengatakan melakukan hubungan seksual 1 minggu 1 kali dan tidak ada keluhan.

6. Psikososial budaya

a. Perasaan tentang kehamilan ini

Ibu mengatakan sangat senang dengan kehamilannya, tetapi juga merasa cemas dengan kehamilannya karena kondisi saat ini.

b. Kehamilan ini direncanakan/tidak

Ibu mengatakan kehamilan ini direncanakan.

c. Jenis kelamin yang diharapkan

Ibu mengatakan laki-laki atau perempuan tidak menjadi masalah.

d. Dukungan terhadap kehamilan ini

Ibu mengatakan suami dan keluarga sangat senang dan mendukung kehamilan ini.

e. Keluarga lain yang tinggal serumah

Ibu mengatakan hanya tinggal dengan suami dan kedua anaknya.

f. Pantangan makanan

Ibu mengatakan tidak ada pantangan makanan.

g. Kebiasaan adat istiadat dalam kehamilan

Tidak ada kebiasaan adat khusus dalam proses kehamilan.

7. Penggunaan obat-obatan/rokok

Ibu mengatakan hanya mengkonsumsi obat dari bidan tapi tidak meminumnya secara teratur dan tidak mengkonsumsi rokok atau obat-obatan selain dari bidan.

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan umum : baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Tinggi badan : 156 cm
4. Berat badan sebelum hamil : 50 kg
5. Berat badan sekarang : 65 kg
6. Lila : 26 cm
7. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/ menit
 - c. Suhu badan : 36,5 C
 - d. Pernapasan : 22x/ menit
8. Pemeriksaan khusus
 - a. Muka

Tampak ibu lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada edema pada wajah, tidak ada nyeri tekan.
 - b. Mata

Konjungtiva tampak sedikit pucat, sklera putih

c. Mulut/ gigi

Mulut dan gigi tampak bersih, mukosa bibir tampak lembab, tidak ada karies.

d. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jungularis

e. Payudara

Puting susu tampak menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan sekitar payudara, tidak ada nyeri tekan pada payudara

f. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

1) Leopold I : Pertengahan pusar-Px, 31cm, teraba bokong

2) Leopold II : punggung kanan

3) Leopold III : Presentase kepala

4) Leopold IV : BAP (Bergerak Atas Panggul)

5) Auskultasi Detak Jantung Janin(DJJ) terdengar jelas kuat dan teratur dikuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/ menit.

6) Lingkar perut : 82 cm

7) Taksiran berat janin(TBJ) : 2542 gram

g. Ekstremitas

Tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada varises, reflex patella kiri dan kanan positif

h. Pemeriksaan laboratorium

- 1) Hemoglobin (Hb) : 8,6 gram% dengan menggunakan alat untuk memeriksa kadar hemoglobin klien.
- 2) Albumin dan reduksi negatif.

LANGKAH II INTERPRETASI DATA DASAR

a. Diagnosa kebidanan

Ny R GIII PII A0, umur 32 tahun, gestasi 32-34 minggu, janin tunggal, hidup, intra uterine, letak memanjang dengan anemia.

1. GIII PII AO

Data subyektif

Ibu mengatakan sekarang kehamilan yang ketiga dan tidak pernah keguguran.

Data obyektif

1) Tampak striae alba

2) Tonus otot tampak kendur

Analisa dan interpretasi data

Ibu mengatakan hamil ketiga, pada pemeriksaan fisik tonus otot perut kendur akibat pecahnya pembuluh darah perifer pada kehamilan sebelumnya dimana perut seolah-olah retak dan warnanya berubah dan tampak pada seorang multigravida.

2. Gestasi 32- 34 minggu

a. Data subjektif

1) Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 3 september 2016

2) Menurut ibu umur kehamilannya sudah 7 bulan

b. Data objektif

1) Tinggi Fundus Uteri (TFU) pertengahan Pusat-Px 31cm

2) Taksiran Persalinan (TP) Tanggal 10 juni 2017.

c. Analisa dan interpretasi data

1) Membesarnya uterus disebabkan oleh hormon progesterone dan estrogen yang menyebabkan hipertropi, hiperpalasia sel uterus dan hipervaskularisasi pembuluh darah

2) Menurut rumus Neagle dari HPHT tanggal 3 september 2016 sampai dengan tanggal 22 april 2017, masa gestasi adalah 33 minggu (32-34 minggu).

3. Tunggal

a. Data subjektif

Ibu merasakan janinnya bergerak kuat pada perut sebelah kanan.

b. Data objektif

Detak Jantung Janin (DJJ) terdengar jelas kuat dan teratur pada perut sebelah kanan kuadran bawah dengan frekuensi 130x/ menit.

c. Analisa dan interpretasi data

1) Pada palpasi hanya teraba 2 bagian besar janin yaitu kepala pada bagian bawah abdomen dan bokong pada bagian fundus uteri, ini menandakan bahwa kehamilan tunggal.

2) Auskultasi DJJ pada kehamilan tunggal akan terdengar pada satu sisi, sedangkan pada kehamilan yang ganda, terdengar DJJ pada dua lokasi dengan perbedaan kurang lebih 10 denyutan.

4. Intra uterin

a. Data subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat dan tidak ada nyeri perut

b. Data objektif

Leopold II : Punggung kanan, detak jantung janin kuat di kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/menit

c. Analisa data dan interpretasi data

Salah satu tanda kehamilan intra uteri adalah terasa gerakan janin dalam rahim, tidak ada rasa nyeri saat dilakukan palpasi dan perkembangan janin sesuai dengan tuanya usia kehamilan.

5. Keadaan janin baik

a. Data subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat di kuadran kanan bawah perut ibu

b. Data objektif

1). Detak Jantung Janin (DJJ) 130X/ menit

2). Taksiran Berat Janin (TBJ) gram

c. Analisa dan interpretasi data

Janin bergerak kuat, bunyi detak jantung janin kuat dan teratur, serta TBJ diatas 500 gram menandakan janin dalam keadaan baik.

6. Ibu dengan anemia

a. Data subjektif

Ibu mengeluh pusing, terkadang merasa sakit kepala, sering mengantuk, dan mudah lelah.

b. Data objektif

- 1) Ibu tampak lemas
- 2) Konjungtiva ibu tampak pucat
- 3) Pada pemeriksaan darah HB 8,6 gram%.

c. Analisa data interpretasi data

Anemia merupakan suatu kondisi dimana berkurangnya sel darah merah dalam sirkulasi darah sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen keseluruh jaringan. Adapun tanda dan gejala anemia yaitu merasa lelah dan sering mengantuk, pusing dan lemah, tidak enak badan, mengeluh sakit kepala dan konjungtiva pucat. Diagnosis anemia dapat di tentukan apabila kadarHb < 11 g/dl (pada trimester I dan III) atau < 10,5 g/dl (pada trimester II) (Kemenkes RI 2013: 160).

Langkah III. Merumuskan diagnosa/ masalah potensial

Masalah potensial anemia dimasa kehamilan dapat menyebabkan persalinan prematuritas, mudah terjadi infeksi, perdarahan antepartum dan Ketuban Pecah Dini. Pada masa persalinan mengakibatkan gangguan his, kala dua berlangsung lama, kala uri dapat di ikuti retensio plasenta dan perdarahan antepartum. Pada masa

nifas terjadi subinvolisio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) berkurang dan anemia masa nifas.

a. Data subjektif

Ibu mengeluh sering pusing, kadang sakit kepala, mudah lelah, merasa lemah dan terkadang sesak nafas

b. Data objektif

1. Wajah tampak pucat
2. Konjungtiva pucat
3. Hb 8,6 gram%

c. Analisa dan interpretasi data

Anemia dalam kehamilan yang tidak diatasi dapat mengakibatkan beberapa masalah. Melihat dari usia kehamilan yang hampir aterm dapat menyebabkan perdarahan post partum karna kurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan termasuk uterus tidak dapat berkontraksi secara adekuat.

LANGKAH IV. Identifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi

Pada kasus anemia tidak diperlukan tindakan segera kepada klien selama keadaan atau kondisi pada ibu yang mengalami anemia ini tidak pingsan, syok atau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Adapun tindakan yang dilakukan pada ibu yang mengalami anemia yaitu dengan pemberian tablet tambah darah sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia yang merupakan cara yang efektif karena dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat

kekurangan zat besi dan atau asam folat. untuk ibu hamil diberikan setiap hari selama masa kehamilannya atau minimal 90 (sembilan puluh) tablet.

LANGKAH V. Rencana Tindakan

Tanggal 22 April 2017 jam 10.00 wita

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya rencana asuhan atau tindakan kepada ibu yaitu agar kehamilan dapat berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, dan anemia yang dialami ibu dapat teratasi.

2. Kriteria keberhasilan

a. TFU (tinggi fundus uteri) sesuai dengan umur kehamilan

b. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1) Tekanan darah : sistol 100- 130 mmHg
Diastol 70- 90 mmHg

2) Nadi : 80- 90x/ menit

3) Suhu : 36- 37°C

4) Pernapasan : 16- 20x/ menit

c. keadaan janin sehat dengan kriteria

1). DJJ dalam batas normal antara 120-160x/ menit

2). TBJ > 2500 gram

d. Hb > 11 gram%

e. Konjungtiva tidak pucat

f. Keluhan ibu berkurang hilang mengenai rasa pusing dan tidak mudah lelah, sakit kepala juga dapat berkurang

3. Rencana tindakan asuhan kebidanan

a. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya

Rasional : dengan menjelaskan mengenai keadaan yang dialaminya maka ibu akan mengerti sehingga ibu akan bersifat kooperatif terhadap tindakan dan anjuran petugas kesehatan.

b. Memberikan HE (*Health Education*) tentang:

1. Hygiene yang cukup

Rasional : personal hygiene sangat penting untuk memberikan rasa nyaman pada ibu untuk mencegah terjadinya infeksi.

2. Istirahat yang cukup

Rasional : dengan istirahat yang cukup dapat meringankan beban kerja jantung yang mengalami peningkatan dengan masa kehamilan dan dapat menghemat energi.

3. Gizi pada ibu hamil tentang kebutuhan kalori, protein, zat besi, asam folat (vitamin B) dan vitamin C

Rasional: kebutuhan gizi pada ibu hamil penting dan lebih dari biasanya karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta persiapan untuk laktasi.

4. Tablet fe yang berisi 60 mg besi dan 250 mg asam folat.

Rasional : tablet fe penting dalam pemenuhan zat besi dalam kehamilan, cara mengkonsumsi yang benar juga akan mempengaruhi proses penyerapan zat besi.

- c. Hal tentang tanda bahaya dalam kehamilan

Rasional: dengan memberitahukan atau menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya dalam kehamilan maka ibu dapat mengerti dan melaksanakan anjuran bidan jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan tersebut, sehingga dapat terhindar dari 3T (Terlambat dideteksi, Terlambat dirujuk, Terlambat diberikan pertolongan).

- d. Diskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan

Rasional : agar ibu lebih hati-hati dalam menghadapi anemia yang sedang dialaminya dan lebih memperhatikan apa yang dianjurkan dan segera datang ke tempat pelayanan jika mengalami kelainan yang dirasakan selama hamil.

- e. Diskusikan tentang persiapan kelahiran dan persalinan

Rasional : dengan mendiskusikan hal tersebut dapat membantu ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinan terutama biaya persalinan, tempat bersalin, penolong persalinan serta keluarga yang akan ditinggalkan selama ditempat bersalin.

f. Penatalaksanaan pemberian vitamin

1) SF 3 x 1 tablet/ hari

Rasional : suplemen zat besi direkomendasikan sebagai dasar yang rutin karena banyak ibu yang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi terlebih lagi ibu yang sedang mengalami anemia.

2) Vitamin B kompleks

Rasional : vitamin B kompleks merangsang relaksasi otot-otot polos dan memperlancar aliran darah sehingga membantu metabolisme termasuk pencernaan.

3) Vitamin C

Rasional : Dapat membantu penyerapan zat besi, memperkuat pembuluh darah untuk mencegah perdarahan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.

LANGKAH VI. Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Tanggal 22 april 2017 jam 10.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya yaitu: letak janin baik, kepala berada di bawah, DJJ terdengar jelas kuat dan teratur dengan frekuensi 130x/menit, keadaan ibu pusing, merasa lemas, cepat lelah, terkadang sakit kepala dan sesak napas merupakan akibat dari penurunan Hb dalam darah yang jumlahnya 8,6 gram%. Hal ini diatasi dengan konsumsi makanan yang bergizi dan Fe seperti ikan, daging, tahu, tempe, telur, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau dan buah-buahan.

2. Memberikan HE(*Health Rducation*) tentang

a. Gizi pada ibu hamil

- 1) Kebutuhan kalori selama kehamilan meningkat yang diperoleh misalnya dari kacang-kacangan, buah segar, beras merah, sayur-sayuran.
- 2) Kebutuhan protein dapat diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan dan susu.
- 3) Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan kedelai.
- 4) Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh dari misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.
- 5) Personal hygiene dalam kehamilan
Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor. Ibu mengerti dan mau melaukan anjuran yang disampaikan.
- 6) Istirahat yang cukup
Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan. Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.
- 7) Memberi KIE tentang tablet Fe. Yaitu tentang cara mengkonsumsi suplemen zat besi pada malam hari diminum dengan air putih atau air jeruk dan jangan diminum dengan susu, teh atau air soda. Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

3. Mendiskusikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
 - b. Demam
 - c. Bengkak pada wajah dan kaki
 - d. Penglihatan kabur
 - e. Mual muntah berlebihan
 - f. Nyeri perut yang hebat
 - g. Pergerakan janin berkurang
 - h. Ketuban pecah sebelum waktunya
 - i. Keluar darah dari jalan lahir
 - j. Kejang
4. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan keadaan ibu yang sedang mengalami anemia. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah abortus, persalinan prematur, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim terganggu. Sedangkan pada masa persalinan dapat terjadi gangguan his sehingga kala satu dan dua dapat berlangsung lama. Pada masa nifas terjadi subinvolisio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran ASI berkurang. Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan tentang komplikasi anemia yang akan terjadi nantinya.
5. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan
- a. Pemilihan tempat bersalin
 - b. Penentuan penolong persalinan

- c. Persiapan biaya persalinan
- d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan ditempat bersalin. Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada adiknya apabila kelahiran sudah hampir tiba.

6. Penatalaksanaan pemberian vitamin

- a. Fe 3 x1 tabler/ hari
- b. B com 3x 1/ hari
- c. Vitamin C 3x 1/ hari

Ibu mengerti dan akan mengkomsumsi obat-obat yang telah diberikan sesuai dengan dosis dan aturan minum yang telah dianjurkan.

7. Menganjurkan ibu untuk kembali memeriksakan kehamilannya tanggal 31 mei 2017, tetapi bila ada keluhan ibu boleh datang kapan saja. Ibu bersedia dengan apa yang telah disampaikan.

LANGKAH VII. Evaluasi hasil asuhan kebidanan

Tanggal 22 April 2017 jam 10.00 wita

- 1. kehamilan berlangsung normal
 - a. TFU setinggi prosessus xifoideus, 28cm, teraba bokong
 - b. Tanda-tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 110/ 70 mmHg
 - 2) Nadi : 80x/ menit
 - 3) Suhu : 36,5 C

- 4) Pernapasan : 22 x/ menit
2. Bayi dalam kondisi yang baik dan DJJ terdengar jelas kuat, dan teratur dikuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/ menit.
3. Keadaan ibu dengan anemia dengan kadar Hb 8,6 gram% dengan menggunakan alat untuk mengukur kadar sel darah merah
4. Ibu bersedia datang kembali tanggal 31 mei 2017.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “R” DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS SOMBA OPU
TANGGAL 22 APRIL 2017**

No. Register : 063xxx

Tanggal Kunjungan : 22 april 2017 jam 09.47 wita

Tanggal pengkajian : 22 april 2017 jam 09.53 wita

Langakh I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny”R”/ Tn. “B”

Umur : 32 Tahun/ 36 Tahun

Nikah : 1 kali/ ±10 tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : SMA/D3

Pekerjaan : IRT/ wiraswasta

Alamat : Jl. A. Tonro

Data Subjektif

1. GIII PII A0
2. HPHT tanggal 3 september 2016
3. Ibu mengatakan usia kehamilannya sudah 7 bulan

4. Ibu mengatakan pergerakan janinnya pertama kali dirasakan pada usia kehamilan ± 5 bulan.
5. Ibu mengatakan pergerakan janinnya aktif di sebelah kiri
6. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama kehamilan
7. Ibu telah melakukan kunjungan ANC sebanyak 8 kali dan mendapatkan suntik TT sebanyak 2 kali yaitu suntik TT 1 pada tanggal 23 januari 2017 dan TT 2 pada tanggal 23 february 2017.

Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Taksiran persalinan tanggal 10 juni 2017
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/ menit
 - c. Suhu : 36,5 C
 - d. Pernapasan : 22x/ menit
5. Berat badan : 65 kg
6. Lila : 26 cm
7. Tinggi badan : 156 cm
8. Usia kehamilan : 33 minggu (32- 34 minggu)
9. Tidak ada edema pada wajah, tidak ada benjolan, tidak cloasma gravidarum

10. Konjungtiva tampak pucat, sklera tidak ikterus

11. Tampak striae alba dan tonus otot sudah regang

12. Palpasi abdomen

a. Leopold I : TFU pertengahan Pusat-Px, 31cm, teraba bokong

b. Leopold II : punggung kanan

c. Leopold III : presentasi kepala

d. Leopold IV : BAP

13. Djj : 130x/ menit

14. Lingkar perut : 82 cm. TBJ: 2542 gram

15. Tidak ada edema pada dan varises pada kedua tungkai, reflex patella kiri dan kanan positif

16. Pemeriksaan laboratorium tanggal 22 april 2017

a. Hb : 8,6 gram% dengan menggunakan alat untuk memeriksa kadar hemoglobin klien

b. Albumin dan reduksi negatif.

Assesment

GIII PII A0, umur 32 tahun, gestasi 32-34 minggu, janin tunggal, hidup, intra uterine, letak memanjang, punggung kanan, presentase kepala, bagian terbawah janin belum masuk panggul dengan anemia.

Planning

Tanggal 22 april 2017 jam 10.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal, ibu dalam keadaan anemia, dan ibu sudah mengerti keadaan kehamilannya.

2. Memberi HE (*Health Education*) tentang

a. Gizi pada ibu hamil

- 1) Kebutuhan kalori selama kehamilan dapat diperoleh misalnya dari kacang-kacangan, buah segar, beras merah, sayur-sayuran dan kentang.
- 2) Kebutuhan protein dapat diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan dan susu.
- 3) Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan kedelai.
- 4) Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh dari misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.

Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan dan bersedia mengonsumsi makanan yang bergizi.

b. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor. Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang disampaikan.

c. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan. Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

3. Mendiskusikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

4. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan keadaan ibu yang sedang mengalami anemia. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah abortus, persalinan prematur, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim terganggu. Sedangkan pada masa persalinan dapat terjadi gangguan his sehingga kala satu dan dua dapat berlangsung lama. Pada masa nifas terjadi subinvolisio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran ASI berkurang. Ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan tentang komplikasi yang akan terjadi nantinya.


5. Penatalaksanaan pemberian vitamin

- a. Fe 1 x1 tablet/ hari
- b. B com 3x 1/ hari

c. Vitamin C 3x 1/ hari

Ibu mengerti dan akan mengkomsumsi obat-obat yang telah diberikan sesuai dengan dosis dan aturan minum yang telah dianjurkan.

6. Menganjurkan ibu untuk kembali memeriksakan kehamilannya tanggal 31 mei 2017, tetapi bila ada keluhan ibu boleh datang kapan saja. Ibu bersedia dengan apa yang telah disampaikan.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “R” DENGAN ANEMIA DI RUMAH KLIEN JI. A. TONRO
TANGGAL 29 APRIL 2017**

Tanggal Kunjungan : 29 April 2017 jam 03.30 wita

Tanggal pengkajian : 29 April 2017 jam 03.40 wita

Data subjektif

1. Ibu masih merasa pusing seperti yang sering dirasakan sebelumnya.
2. Tidur ibu masih terganggu dimalam hari
3. Ibu masih sering sakit kepala
4. Ibu masih merasa sering merasa lemas

Data objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 34 minggu (32- 34 minggu)
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah: 110/ 80 mmHg
 - b. Nadi : 82x/menit
 - c. Suhu : 36,7 C
 - d. Pernapasan : 22x/ menit
5. Berat badan 65 kg
6. Lingkar lengan atas 26 cm

7. Konjungtiva sedikit terlihat pucat, sklera tidak icterus
8. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
9. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
10. Payudara tidak ada peradangan, tidak ada benjolan sekitar payudara

11. Palpasi abdomen

- a. Leopold I : 3jrbpx, 32 cm, teraba bokong
- b. Leopold II : puka
- c. Leopold III : kepala
- d. Leopold IV : BAP
- e. Djj terdengar jelas kuat dan teratur dibagian kuadaran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit dengan menggunakan lenek.
- f. LP : 83, TBJ : 2656 gram

Asessment

GIII PII A0, Gestasi 32- 34 minggu, punggung kanan, presentase kepala, BAP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

Planning

Tanggal 15 Mei 2017 pukul 11.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal, keadaan janin dalam baik-baik saja serta pemeriksaan tanda- tanda vital dalam batas normal. Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan.
2. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan HE(*Health Educaton*) yaitu:

- a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C. Ibu mengerti dan mau konsumsi makanan bergizi.

- b. Hygiene dalam kehamilan

Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genetalia pakaian, serta kebersihan payudara dan ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

- c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih, dan ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

3. Mengingatn tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan dan ibu sudah mengerti.

4. Mengingatn kembali kepada ibu untuk rajin mengkonsumsi obat dan aturan minum obat yang telah diberikan. Ibu dengan senang hati akan rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan demi kesehatan dan keselamatan bayinya.

5. Menganjurkan ibu untuk kepusat pelayanan kesehatan terdekat jika merasakan kelainan selama kehamilannya. Ibu bersedia melakukannya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “R” DENGAN ANEMIA
DI RUMAH KLIEN Jl. A. TONRO
TANGGAL 07 MEI 2017**

Tanggal Kunjungan : 07 Mei 2017 jam 11.00 wita

Tanggal pengkajian : 07 Mei 2017 jam 11.00 wita

Data subjektif

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasa cemas lagi dengan keadaannya dan mengatakan badannya masih sedikit terasa lemas dan pusing.
2. Ibu mengatakan sudah mengkonsumsi suplemen zat besi sesuai anjuran.
3. Ibu mengatakan sudah makan-makanan yang bergizi dan yang mengandung zat besi.

Data objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 35 minggu 1 hari (34- 36 minggu)
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah: 110/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/menit
 - c. Suhu : 37 C
 - d. Pernapasan : 24x/ menit

5. Berat badan 65 kg
6. Lingkar lengan atas 26 cm
7. Konjungtiva ibu tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
8. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
9. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
10. Payudara tidak ada peradangan, tidak ada benjolan sekitar payudara
11. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : 2jrdBpx, 32 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : puka
 - c. Leopold III : kepala
 - d. Leopold IV : BAP
 - e. Djj terdengar jelas kuat dan teratur dibagian kuadaran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit dengan menggunakan lenek.

Assessment

GIII PII A0, Gestasi 34- 36 minggu, punggung kanan, presentase kepala, BAP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

Planning

Tanggal 07 Mei 2017 pukul 11.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal, keadaan janin dalam baik-baik saja serta pemeriksaan tanda- tanda vital dalam batas normal. Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan.

2. Melakukan follow up pada ibu tentang pelaksanaan HE (*Health Educaton*)

tentang:

- a. Pentingnya gizi pada ibu hamil untuk kebutuhan nutrisi pada bayi. Ibu makan makanan yang bergizi seperti tempe, tahu, daun kelor dan rajin mengkomsumsi susu.
 - b. Hygiene dalam kehamilan. Ibu rajin mengganti pakaian dalam ketika setiap kali merasa lembab, serta kebersihan payudaranya untuk persiapan menyusui nanti.
 - c. Istirahat. Ibu istirahat sesuai apa yang dianjurkan, lebih sering tidur siang, serta mengurangi pekerjaanya yang seperti biasa.
3. Mengingatkan kepada ibu untuk rajin mengkomsumsi obat dan aturan minum obat yang telah diberikan. Ibu rajin mengkomsumsi obat yang telah diberikan demi kesehatan dan keselamatan bayinya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “R” DENGAN ANEMIADI RUMAH KLIEN JI. A. TONRO
TANGGAL 17 MEI 2017**

Tanggal Kunjungan : 17 Mei 2017 jam 16.00 wita

Tanggal pengkajian : 17 Mei 2017 jam 16.10 wita

Data Subjektif

1. Ibu merasakan sudah tidak sering sakit kepala
2. Ibu mengatakan masih lemas tapi sudah berkurang dari sebelumnya
3. Ibu mengatakan lebih rajin memakan sayur seperti kelor dan bayam
4. Ibu tetap memperhatikan jadwal mengkonsumsi tablet Fe
5. Ibu mengurangi pekerjaan dan sudah tidak terlalu lelah ketika sudah beraktifitas

Data objektif

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 66 kg
4. Gestasi 36 minggu 2 hari (36-38minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 80X/menit
 - c. Suhu : 36.7 C

- d. Pernapasan : 24 X/menit
6. Konjungtiva tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
 7. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
 8. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
 9. Palpasi abdomen
- a. Leopold I : 2jrbpx, 33 cm, teraba bokong
- b. Leopold II : puka
- c. Leopold III : kepala
- d. Leopold IV : BAP

Assesment

GIII PII A0, Gestasi 36 -38 minggu, punggung kanan, presentase kepala, BAP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

Planning

Tanggal 17 Mei 2017 pukul 16.10 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal, keadaan janin dalam baik-baik saja serta pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan.
2. Melakukan follow up pada ibu tentang pelaksanaan HE(*Health Educaton*) tentang:

- a. Pentingnya gizi pada ibu hamil untuk kebutuhan nutrisi pada bayi. Ibu makan makanan yang bergizi seperti tempe, tahu, daun kelor dan rajin mengkonsumsi susu.
 - b. Hygiene dalam kehamilan. Ibu rajin mengganti pakaian dalam ketika setiap kali merasa lembab, serta kebersihan payudaranya untuk persiapan menyusui nanti.
 - c. Istirahat. Ibu istirahat sesuai apa yang dianjurkan, lebih sering tidur siang, serta mengurangi pekerjaannya yang seperti biasa.
4. Mengingatkan kepada ibu untuk rajin mengkonsumsi obat dan aturan minum obat yang telah diberikan. Ibu rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan .
 5. Mengingatkan ibu tentang jadwal pemeriksaan kehamilannya di puskesmas pada tanggal 31 mei 2017. Ibu bersedia untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “R” DENGAN ANEMIADI PUSKESMAS SOMBA OPU
TANGGAL 31 MEI 2017**

Tanggal Kunjungan : 31 Mei 2017 jam 10.30 wita

Tanggal pengkajian : 31 Mei 2017 jam 10.30 wita

Data Subjektif

1. Ibu merasakan sudah tidak sering sakit kepala
2. Perasaan pusing ibu sudah berkurang
3. Ibu mengurangi pekerjaan dan sudah tidak terlalu lelah ketika sudah beraktifitas

Data objektif

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 67 kg
4. Gestasi 38 minggu 4hari (38-40 minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 82X/menit
 - c. Suhu : 36.7 C
 - d. Pernapasan : 22 X/menit
6. Konjungtiva tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus

7. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
8. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
9. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : setinggi Px, 32 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : puka
 - c. Leopold III : kepala
 - d. Leopold IV : BDP
10. Tanggal 31 mei 2017 Hb : 10 gram% dilakukan dengan menggunakan alat untuk memeriksa kadar hemoglobin klien.

Assesment

GIII PII A0, Gestasi 38-40 minggu, punggung kanan, presentase kepala, BAP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

Planning

Tanggal 31Mei 2017 pukul 10.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaaan kepada ibu bahwa kehamilan normal dan anemia atau kadar Hb ibu sudah berubah yaitu 9,8 gram%
2. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan He yaitu:
 - a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C
 - b. hygiene dalam kehamilan

Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genetalia pakaian, serta kebersihan payudara dan ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih, dan ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

3. Mengingatkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan dan ibu sudah mengerti.

4. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan

a. Pemilihan tempat bersalin

b. Penentuan penolong persalinan

c. Persiapan biaya persalinan

d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan ditempat bersalin. Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada adiknya apabila kelahiran sudah hampir tiba.

5. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan diantaranya:

a. Pemberian obat zat besi

b. Pemberian obat vitamin

6. Menganjurkan ibu periksa kembali sesuai tanggal yang ditentukan, dan ibu bersedia dan mengerti.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara konsep dan teori dasar dengan penerapan asuhan kebidanan antenatal pada Ny “R” gestasi 33 minggu dengan anemia di puskesmas Somba Opu Gowa tanggal 22 April sampai 31 Mei 2017.

Untuk memudahkan dalam menguraikan kesenjangan antara teori dan studi kasus, maka penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah varney dan soap sebagai berikut.

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini penulis melakukan pengkajian data dasar yang meliputi identitas pasien, data biologis berupa keluhan utama dan riwayat keluhan utama, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat reproduksi, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu serta pemenuhan kebiasaan sehari-hari. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari wajah sampai ke kaki yang meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium.

Berdasarkan data obyektif dan subyektif yang penulis temukan pada kasus Ny“R” umur 32 tahun, GIII PII A0 yang melakukan pemeriksaan antenatal pada tanggal 22 april 2017 di puskesmas Somba Opu, ibu mengatakan cepat lelah setelah

melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, sering pusing dan mata berkunang-kunang yang dirasakan sejak 4 hari yang lalu dari hari kunjungan.

Usia kehamilan ibu 33 minggu didapatkan dari perhitungan dengan rumus neegle dimana pasien mengalami hari pertama haid terakhir (HPHT) pada tanggal 3 September 2016 dengan taksiran persalinan pada tanggal 10 Juni 2017. Ibu tidak pernah mengalami trauma selama hamil, tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma jantung dan diabetes, dan tidak ada riwayat mengonsumsi obat-obatan. Selama hamil, nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-harinya.

Menurut Cuningham (2007) terjadinya proses hemodilusi pada kehamilan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 24 minggu dan dapat terus meningkat sampai usia kehamilan 37 minggu. Hal ini mengakibatkan pada ibu hamil yang usia kehamilannya ≥ 24 minggu rentan terhadap kejadian anemia. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan tersebut bahwa ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian anemia (Yana Luthfiyati :5).

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil menunjukkan bahwa ibu hamil yang usia kehamilan ≥ 24 minggu berpeluang lebih tinggi mengalami anemia 29,4% dibandingkan dengan ibu berada pada usia kehamilan ≤ 24 minggu 8,4%. Usia kehamilan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil (Yana Luthfiyati :6).

Dalam kehamilan terjadi peningkatan volume plasma darah sehingga terjadi hipervolemia. Akan tetapi bertambahnya sel-sel darah merah lebih sedikit

dibandingkan dengan peningkatan volume plasma, sehingga terjadi pengenceran darah (hemodilusi). Keadaan tersebut disebut sebagai anemia fisiologis. Peningkatan aliran darah dan volume darah terjadi selama kehamilan mulai 10-12 minggu umur kehamilan dan secara progresif sampai dengan umur kehamilan 30-34 minggu(Intan Parulian:5).

Pada pemeriksaan pertama di Puskesmas Somba Opu Gowa di dapatkan hasil pemeriksaan dengan berat badan ibu 65 kg, Lila 26 cm dan pemeriksaan fisik dengan keadaan umum ibu baik TD = 110/70 mmHg, N = 80x/menit, S = 36, 5 C, P = 22x/menit, dengan ekspresi muka lemas tidak ada cloasma gravidarum, conjungtiva pucat tidak ikterus, mukosa bibir tampak lembab, tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid, lomfe dan vena jugularis, tampak hiperpigmentasi pada areola, dengan pemeriksaan abdomen didapatkan Tinggi Fundus Uteri (TFU) pertengahan pusat-px, 32 cm sesuai usia kehamilan 33 minggu (32-34 minggu), situs memanjang, presentasi kepala, punggung kanan, terdengar denyut jantung janin jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi 130x/ menit, janin intrauterine,tunggal, hidup, keadaan janin baik dan ibu dengan anemi, pemeriksaan laboratorium kadar Hb = 8,6 gram%.

Pada kunjungan kedua di rumah pasien dengan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ibu masih merasa pusing seperti yang sering dirasakannya, sakit kepala yang masih sering dirasakan dan ibu merasa lemas dengan keadaanya. Saat dilakukan pemeriksaan tanda- tanda vital pada ibu dan diapatkan hasil dengan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82X/ menit, suhu 36,7 C, dan pernapasan 22x/ menit, berat badan ibu 65 kg, dengan pemeriksaan fisik terfokus

pada konjungtiva ibu tampak masih terlihat sedikit pucat, dan skelera tidak ikterus. Pada pemeriksaan abdomen, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan TFU 3jrd bpx 32 cm sesuai dengan usia kehamilan sekarang (32- 34 minggu) dengan presentasi kepala, punggung kanan dan denyut jantung janin masih terdengar jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi 140x/ menit.

Pada kunjungan ketiga dengan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik, kesadaran komposmentis, sakit kepala yang dirasakan sudah berkurang, pusing yang sering dirasakan berkurang, dan ibu mengatakan sudah mulai memperhatikan asupan makanan yang mengandung zat besi dan mengkonsumsi tablet zat besi sesuai dengan anjuran. Saat dilakukan pemeriksaan tanda- tanda vital didapatkan hasil dengan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/ menit, suhu 37 C, dan pernapasan 24x/ menit. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terfokus tampak pada konjungtiva ibu pucat sudah berkurang, tidak icterus dan pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan didapatkan hasil TFU 3jrd bpx 32 cm dengan usia kehamilan 34-36 minggu, teraba bokong pada bagian fundus, presentasi kepala dengan posisi janin punggung kanan. Denyut jantung janin terdengar kuat dan jelas dengan menggunakan lenek dibagian kuadran kanan bawah perut ibu frekuensi 140x/ menit.

Pada kunjungan keempat yang masih dilakukan di rumah Ny "R" dengan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik, kesadaran komposmentis, sakit kepala yang dirasakan sudah berkurang, pusing yang sering dirasakan berkurang, Saat dilakukan pemeriksaan tanda- tanda vital didapatkan hasil dengan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80x/ menit, suhu 36,7 C, dan pernapasan 24x/ menit. Pada saat dilakukan

pemeriksaan fisik terfokus tampak pada konjungtiva ibu pucat sudah berkurang, tidak icterus dan pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan didapatkan hasil TFU 2jrdpx 33cm dengan usia kehamilan ibu 36-38 minggu, teraba bokong pada bagian fundus, presentasi kepala dengan posisi janin punggung kanan.

Kunjungan kelima di Puskesmas Somba Opu gowa pada tanggal 31 mei 2017 dengan hasil keluhan yang dirasakan ibu pusing dan sakit kepala sudah berkurang, ibu mengurangi pekerjaan sehingga tidak mudah lelah lagi setelah beraktifitas. Didapatkan hasil keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, berat badan 67kg, pemeriksaan tanda- tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 2/ menit, suhu 36,7C, dan pernapasan 22x/ menit. Pada pemeriksaan fisik tampak konjungtiva ibu tampak masih sedikit pucat, sklera tidak ikterus, pemebesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan TFU setinggi Px 35 cm, dengan gestasi 38-40 minggu dengan teraba bokong pada bagian fundus, presentasi kepala, punggung kanan, tidak ada edema pada tungkai dan nyeri tekan. Telah dilakukan (pemeriksaan laboratorium pada tanggal 31 mei 2017 dengan hasil kadar Hemoglobin 10 gram%.

Berdasarkan teori tanda dan gejala anemia yaitu, merasa lelah dan sering mengantuk oleh karena rendahnya Hb dan kurangnya oksigen, sehingga kurang transport untuk metabolisme dalam tubuh, merasa pusing dan lemah (*dizness dan weaknes*) oleh kurangnya oksigen dan energi menyebabkan ibu merasa lemas dan capek, mengeluh sakit kepala, merasa tidak enak badan (*malaise*) dan nafas pendek karena menurunnya suplay darah serta tampak pucat pada membran dan konjungtiva.

(Taufan Nugroho, 2012). Klasifikasi Anemia Menurut Manuaba (2010) : Tidak anemia : Hb 11 gr%, Anemia ringan : Hb 9-10 gr%, Anemia sedang : 8 gr%, Anemia berat : Hb <7 gr%.

Berdasarkan uraian diatas ada persamaan gejala dan dan keluhan antara teori dan kasus sehingga penulis tidak menemukan hambatan karena pada saat pengumpulan data, pasien dan bidan di puskesmas bersedia memberikan informasi atau data yang ada hubungannya dengan penyakit dan perawatan ibu sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Dengan demikian apa yang dijelaskan pada konsep dasar dan yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

Langkah II. Interpretasi Data Dasar Merumuskan Diagnosa / Masalah Aktual

Berdasarkan dalam konsep dasar bahwa dalam menegakkan suatu diagnosa/masalah kebidanan harus berdasarkan pada pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif dan objektif.

Adapun diagnosa masalah aktual yang di identifikasi pada ny "R" adalah GIII PII A0, gestasi 32-34 minggu, janin tunggal, hidup, intra uterin, letak memanjang dengan anemia.

Berdasarkan data diatas masalah aktual adalah ibu dengan keadaan anemia dimana penegakan diagnosa ini di dapat dari data subjektif ibu yang mengeluh cepat lelah ketika melakukan aktivitas, sering pusing dan mata berkunang-kunang yang merupakan tanda dan gejala seseorang menderita anemia, hal ini juga didukung dari data objektif dari hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan konjungtiva ibu yang

tampak pucat dan didukung oleh data penunjang hasil pemeriksaan laboratorium yang di dapatkan HB 8,6 gram%.

Dari hasil anamnesis tanya jawab dari pasien di dapatkan bahwa ibu tidak mengkonsumsi obat yang diberikan secara teratur, dimana hal ini di dapatkan dari pengumpulan data dasar yang di lakukan secara wawancara mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. pernyataan ibu dalam kebutuhan eliminasi yang mengatakan frekuensi BAB lancar sama seperti sebelum hamil dan warna khas pada feses yang tidak berubah, ini menunjukkan ibu tidak mengalami efek samping ketika meminum tablet Fe secara teratur.

Berdasarkan teori yang mengatakan suplemen besi akan mengganggu saluran pencernaan pada sebagian orang. Efek samping misalnya mual-mual, rasa panas pada perut, diare atau sembelit dan warna feses yang berubah menjadi coklat (Intan Parulian :8).

Dari hasil anamnesis pada pemenuhan nutrisi ibu juga mengatakan tetap mengkonsumsi teh pada pagi hari dimana teh mengandung tanin yang dapat mengurangi penyerapan zat besi.

Tubuh tampaknya tidak mudah untuk menyerap zat besi pada makanan nabati, tapi vitamin C yang ditemukan pada buah jeruk dan sayuran hijau menambah penyerapan zat besi. Sebaliknya, tanin yang ditemukan di teh dapat mengurangi penyerapan zat besi. Jadi mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi dan mengandung vitamin C (misalnya segelas jus jeruk dan semangkok sereal) lebih baik dari pada secangkir teh (Waryono :2010).

Pada kasus Ny “R” dari data diatas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya anemia yang dialami ibu dimana pola nutrisi dan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet fe merupakan faktor penyebab terjadinya anemia pada kehamilan selain usia kehamilan pada trimester II.

Pada kehamilan relatif terjadi anemia karena darah ibu hamil mengalami hemodilusi (pengenceran) dengan peningkatan volume 30% sampai 40% yang puncaknya pada kehamilan 32 sampai 34 minggu. Jumlah peningkatan sel darah 18 sampai 30% dan hemoglobin sekitar 19%. Bila hemoglobin ibu sebelum hamil sekitar 11 gr% dengan terjadinya hemodilusi akan mengakibatkan anemia hamil fisiologis dan Hb ibu akan menjadi 9,5 sampai 10 gr%(Ida Ayu :238).

Adaptasi fisiologi sistem kardiovaskuler pada ibu hamil yaitu terjadinya perubahan berupa peningkatan curah jantung, meningkatnya stroke volume, aliran darah dan volume darah. Akibat kerja jantung yang meningkat untuk memenuhi sirkulasi darah ibu dan janin, jantung mengalami hipertropi. Keadaan ini kembali normal setelah bayi lahir. Peningkatan curah jantung diarah dimana volume darah yang dipompakan oleh ventrikel selama satu menit. Peningkatan curah jantung terjadi bulan ke 3 kehamilan. Perubahan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan darah baik untuk ibu maupun janinnya(Intan Parulian :5).

Pengenceran darah yang terjadi pada wanita hamil dianggap sebagai penyesuaian fisiologis bermanfaat karena hemodilusi meringankan beban kerja jantung yang harus bekerja lebih berat dalam kehamilan dan hemodilusi juga

mengurangi hilangnya zat besi pada waktu terjadinya kehilangan darah paska persalinan (Intan Parulian :5).

Pada ibu hamil dengan anemia dari anamnesis akan ditemukan gejala klinis ibu merasa lelah, sering mengantuk, merasa pusing dan lemah, mengeluh sakit kepala, merasa tidak enak badan, perubahan mood dan kebiasaan tidur, dan mengeluh lidah mudah luka (Rukiah :2013).

Dari pemeriksaan fisik akan ditemukan pucat pada membrane mukosa dan konjungtiva, kulit pucat, pucat pada kuku jari, muka ikterik dan data penunjang pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan Hb. Penentuan derajat anemia berdasarkan kadar Hemoglobin menurut WHO, Ringan sekali = Hb 10g% batas normal, Ringan = Hb 8g%-9,9g%, Sedang = Hb 6g%-7,9g%, Berat, Hb <6g, sedangkan derajat anemia menurut manuaba yaitu, tidak anemia = Hb 11g%, Anemia ringan = Hb 9-10g%, Anemia sedang = Hb 7-8g%, Anemia berat = Hb <7g% (Tarwoto dan Wasnidar :38).

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengkajian tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu ibu mengalami anemia dengan kadar Hb pada Ny "R" yaitu 8,6 gram%. Dengan demikian secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dan tidak ada kesenjangan dengan diagnosis aktual yang ditegaskan sehingga memudahkan memberikan tindakan selanjutnya.

Langkah III. Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah ketiga merupakan langkah ketika bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini penulis mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis / masalah yang sudah diidentifikasi.

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Manguji dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Dalam konsep dasar hemoglobin yang normal pada ibu hamil 11 gr% atau lebih dan dikatakan anemia bila kadar Hb kurang dari 11gr% sehingga digolongkan menjadi anemia ringan Hb = 9-10g%, Anemia sedang = Hb 7-8g%, Anemia berat = Hb <7g%.

Masalah potensial yang bisa timbul pada kasus ibu hamil dengan anemia adalah terjadi anemia ringan menjadi anemia sedang, anemia sedang menjadi anemia berat.

Bila anemia tidak ditangani secara dini akan mengarah pada kasus potensial yang bisa timbul selama kehamilan yaitu tumbuh kembang janin terlambat dengan

berbagai manifestasi kliniknya, persalinan prematuritas, mudah terjadi infeksi, perdarahan antepartum, Ketuban Pecah Dini (KPD).

Pada persalinan ibu dengan anemia dapat terjadi gangguan his, kala satu dapat berlangsung lama, kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering melakukan tindakan operasi, kala uri dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri.

Pada post partum dapat terjadi sub involusio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran Asi berkurang, terjadi dekomposisi kordis mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas.

Akibat anemia pada janin dapat terjadi gangguan dalam bentuk, terjadi kematian intra uterine, persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian Ny "R" tidak ada kesenjangan masalah potensial antara teori dengan yang ditemukan pada kasus Ny" R".

Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera dan kolaborasi

Berdasarkan tinjauan teori yang dijelaskan menurut (Kemenkes RI 2013: 161) bahwa pada seseorang yang mengalami anemia apabila kadar Hb < 11 gram% dilakukan tindakan atau tatalaksana secara umum yaitu pemberian tablet penambah darah, dan apabila kadar Hb < 7 gram% maka dapat dilakukan tatalaksana khusus seperti melakukan transfusi darah.

Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi kadar Hb <7gr% atau kadar hematokrit <20% atau Kadar Hb >7gr% dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100xpermenit).

Pada kasus Ny "R" dimana dari hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik dengan kesadaran composmentis dengan TD =110/70 mmHg, N = 80x/menit, S = 36,5 C, P = 22x/menit dengan kadar hemoglobin 8,6 tidak di perlukan tindakan segera kepada klien karena keadaan atau kondisi ibu tidak pingsan, syok atau dalam keaaadan tidak sadarkan diri.

Tindakan yang dilakukan pada Ny"R" yaitu pemberian tablet tambah darah sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia akibat kekurangan zat besi dan asam folat. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek dalam menetapkan tindakan segera.

Langkah V Rencana Asuhan

Perencanaan disusun berdasarkan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan dengan langkah-langkah sebelumnya. Keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh harus rasional dan benar-benar tepat berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date dan setiap rencana harus disetujui oleh pihak bidan dan pasien.

Penatalaksanaan anemia secara umum yaitu apabila diagnosis anemia telah ditegaskan, lakukan pemeriksaan apusan darah tepi untuk melihat morfologi sel darah merah. Bila pemeriksaan apusan darah tepi tidak tersedia, berikan suplementasi besi

dan asam folat. Tablet yang saat ini banyak tersedia di Puskesmas adalah tablet tambah darah yang berisi 60 mg besi elemental dan 250 µg asam folat. Pada ibu hamil dengan anemia, tablet tersebut dapat diberikan 3 kali sehari. Bila dalam 90 hari muncul perbaikan, lanjutkan pemberian tablet sampai 42 hari pascasalin. Apabila setelah 90 hari pemberian tablet besi dan asam folat kadar hemoglobin tidak meningkat, rujuk pasien ke pusat pelayanan yang lebih tinggi untuk mencari penyebab anemia (Kemenkes RI 2013: 161).

Rencana asuhan yang diberikan pada Ny "R" pada kunjungan pertama di Puskesmas Somba Opu yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan yang meliputi pengetahuan anemia, asupan zat besi, pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin C dan mineral lainnya. Menganjurkan ibu untuk datang kembali sesuai jadwal yang ditetapkan ataupun bila ada keluhan lain yang dirasakan. Nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil atau mencoba menjadi hamil. Makan makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran berdaun hijau, daging merah, sereal, telur, dan kacang tanah) dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Pemberian vitamin untuk memastikan bahwa tubuh memiliki cukup asam besi dan folat.

Pada Ny "R" dilakukan penatalaksanaan pemberian vitamin yaitu tablet Fe sebagai dasar asupan zat besi bagi ibu yang mengalami anemia, vitamin B kompleks yang berguna merangsang relaksasi otot-otot polos dan memperlancar aliran darah sehingga membantu metabolisme termasuk pencernaan, vitamin C yang dapat

membantu penyerapan zat besi, memperkuat pembuluh darah untuk mencegah perdarahan, meingkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.

Pemberian zat besi secara oral dapat menimbulkan efek samping pada saluran gastrointestinal pada sebagian orang. Seperti rasa tidak enak di ulu hati, mual, muntah dan diare. Frekuensi efek samping ini berkaitan langsung dengan dosis zat besi. Zat besi yang dimakan bersama dengan makanan akan ditolerir lebih baik meskipun jumlah zat besi yang diserap berkurang tetapi dapat mengurangi efek samping terkhusus mual yang dirasakan. Pemberian tablet Fe pada sebagian wanita juga menyebabkan sembelit, penyulit ini dapat diredakan dengan cara memperbanyak minum, menambah konsumsi makanan yang kaya akan serat seperti roti, sereal dan agar-agar.

Pemberian tablet besi pada malam hari juga dilakukan para partisipan dalam upaya mencegah mual setelah minum tablet Fe, meminum tablet Fe sebelum makan juga dianjurkan agar proses penyerapan zat besi lebih optimal. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses penyerapan besi, oleh karena itu sangat dianjurkan ibu hamil yang menderita anemia memakan makanan yang mengandung sumber vitamin C. Vitamin C dalam jumlah cukup dapat melawan sebagian faktor yang berpengaruh menghambat proses penyerapan besi. Tanin yang merupakan polifenol dan terdapat didalam teh, kopi, dan beberapa jenis sayuran dan buah juga menghambat absorpsi besi dengan cara mengikatnya. Sebaiknya ibu hamil dengan kandungan besi kurang

tidak minum teh atau kopi sehingga asupan penyerapan Fe bisa lebih optimal dilakukan oleh tubuh.

Berdasarkan penelitian suplementasi tablet besi menjadi suatu pilihan yang tepat untuk mencukupi kebutuhan besi ibu selama hamil. Akan tetapi, pada penelitian ini diantara 188 ibu hamil yang mengkonsumsi tablet besi, masih terdapat 40,4% yang mengalami anemia, dan ibu hamil yang mengalami anemia rata-rata hanya mengkonsumsi tablet besi sebanyak 30 biji. Masih tingginya angka anemia pada ibu hamil sekalipun telah disuplementasi tablet besi dalam penelitian ini karena jumlah tablet besi yang dikonsumsi ibu hamil rata-rata hanya kurang dari 30 biji, belum dapat memenuhi kebutuhan zat besi ibu, apalagi asupan makanan yang kaya akan zat besi jumlahnya juga sangat rendah. Di Vietnam telah membuktikan bahwa ibu hamil yang memperoleh suplemen zat besi 60 mg dan asam folat 400 mg dapat menaikkan kadar Hb secara signifikan diantara ibu yang mempunyai usia kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga masing-masing 0,4 dan 0,7 g/dl (St.Fatimah dkk :35).

Terdapat beberapa jenis sediaan zat besi antara lain ferro sulfat, ferro fumarat dan ferro gluconat. Jenis sediaan tersebut memiliki kandungan zat besi murni yang berbeda-beda. Ferro sulfat 300mg mengandung zat besi murni 60mg, ferro fumarat mengandung zat besi murni 100mg dan ferro gluconat 300mg mengandung zat besi murni 35mg. Ferro sulfat di indikasikan untuk membantu mencegah dan mengobati anemia defisiensi zat besi. Jika dalam pemberiannya

memberikan efek samping misalkan terjadi mual, nyeri perut, konstipasi maupun diare maka sebaiknya diberikan setelah makan/bersamaan dengan makanan lain.

Analisis multivariat menunjukkan lama sekolah, status gizi lingkaran lengan atas LILA, konsumsi tablet besi, asupan vitamin C dan B6 berhubungan bermakna dengan kadar hemoglobin ibu hamil. Disimpulkan bahwa kadar hemoglobin ibu hamil berhubungan dengan pendidikan, status gizi, konsumsi tablet besi dan pola konsumsi (St.Fatimah dkk :31).

Berdasarkan hasil penelitian lainnya menunjukkan dari 40 ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Bahu Manado, didapatkan 13 (32,5%) ibu hamil mengalami anemia. Dari 13 ibu hamil yang anemia, didapatkan 8 (61,5%) ibu hamil mengalami penurunan kadar SI. Hasil analisis mendapatkan hubungan antara usia, usia kehamilan, paritas, pendidikan dan pekerjaan dengan anemia dan penurunan kadar SI pada ibu hamil. Disarankan kepada ibu hamil untuk memenuhi asupan zat besi saat hamil dan melakukan kontrol pemeriksaan serta mendapatkan pengobatan bila kadar zat besi (Fe) tidak berada pada nilai optimal (Florenzia, dkk :369).

Upaya-upaya dalam penanggulangan anemia gizi terutama pada wanita hamil telah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu caranya adalah melalui suplementasi tablet besi. Suplementasi tablet besi dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan besinya padat dan dilengkapi dengan asam folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan asam folat (Intan Parulian :8).

Departemen Kesehatan telah melaksanakan program penanggulangan Anemia Gizi Besi dengan membagikan tablet besi atau tablet tambah darah kepada ibu hamil sebanyak 1 tablet setiap hari berturut-turut selama 90 hari selama masa kehamilan, agar penyerapan besi dapat maksimal dianjurkan minum tablet zat besi dengan air, dengan minum tablet Fe maka tanda-tanda kurang darah akan menghilang bila tidak menghilang berarti yang bersangkutan bukan menderita AGB, tetapi menderita anemia jenis lain (Depkes: 2013).

Menurut *dietary Reference Intake* kebutuhan zat besi pada ibu hamil meningkat dari 18mg/hari pada wanita dewasa menjadi 27mg/hari pada wanita hamil. WHO merekomendasikan agar setiap ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe 60mg per hari selama 6 bulan. Memberikan suplemen Fe yaitu pemberian preparat 60mg/hari dapat menaikkan kadar hemoglobin sebanyak 1gr%/bulan(Rini Hariani, 2017)

Pemantauan lanjutan juga harus dilakukan kepada Ny "R" untuk memastikan konseling dan terapi obat yang di berikan di laksanakan sesuai dengan anjuran petugas kesehatan dimana dalam kasus ini dilakukan 4 kali pemantauan yang terdiri dari 3 kali kunjungan ke rumah pasien dan pemantauan terakhir pada waktu pemeriksaan ulang di puskesmas.

Pada kunjungan kedua di rumah pasien dilakukan rencana asuhan pemeriksaan fisik terfokus, pemberian health education mengenai hygiene yang cukup, istirahat yang cukup, gizi pada ibu hamil, tablet fe, mendiskusikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.

Pada kunjungan ketiga dilakukan pemeriksaan fisik terfokus yang dapat menentukan kondisi ibu, melakukan follow up tentang pelaksanaan HE(health education) dalam kehamilan serta mengingatkan pasien untuk mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

Pada kunjungan keempat yang dilakukan di rumah pasien dilakukan pemeriksaan fisik terfokus, memeberikan follow up tentang pelaksanaan health education, memberi peringatan kepada pasien untuk mengkonsusmsi obat yang telah diberikan dan mengingatkan tentang jadwal pemeriksaan kehamilannya di puskesmas.

Berdasarkan uraian di atas, rencana tindakan yang disusun berdasarkan tujuan yang sesuai kebutuhan pasien pada Ny “R” dengan kasus anemia pada masa kehamilan yaitu, dilakukan kunjungan untuk evaluasi setelah diberikan terapi pemberian tablet penambah darah, memberitahu hasil pemeriksaan, pendidikan kesehatan tentang hygiene yang cukup, mendiskusikan hal tentang tanda bahaya dalam kehamilan, mendiskusikan tentang komplikasi yang dapat terjadi dalam masa kehamilan, mendiskusikan tentang persiapan persalinan. Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

Langkah VI Implementasi

Pada langkah pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan asuhan menyeluruh (Varney, 2004).

Pada langkah pelaksanaan ini telah dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan rencana asuhan yang telah dibuat.

Berdasarkan anamnesis yang telah dilakukan pada Ny”R” didapatkan hasil pada kunjungan pertama dengan keluhan sakit kepala, sering pusing, mudah lelah dan pada pemeriksaan fisik terfokus yang dilakukan didapatkan hasil tampak konjungtiva ibu tampak pucat dan tidak ikterus, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan TFU pertengahan pusat-Px 31 cm, teraba bokong, presentasi kepala, punggung kanan, intrauteri, tunggal ditandai dengan denyut jantung janin terdengar kuat dan teratur disatu sisi bagian kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/ menit, dengan keadaan janin baik dan ibu dengan keadaan anemia berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan kadar Hemoglobin 8,6 gram%.

Dari rencana asuhan di berikan HE (*Health Education*) tentang gizi pada ibu hamil, personal hygiene dalam kehamilan, istirahat yang cukup dan KIE tentang tablet Fe dan pemberian vitamin Fe, B kompleks dan vitamin C. Untuk melanjutkan berhasilnya rencana asuhan maka di lakukan evaluasi dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien.

Pada kunjungan kedua di rumah pasien dari hasil anamnesa di dapatkan, ibu masih merasa pusing seperti yang sering dirasakannya, sakit kepala yang masih sering dirasakan dan ibu merasa lemas dengan keadaanya. Saat dilakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis tanda- tanda vital pada ibu dan didapatkan hasil dengan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82X/ menit, suhu 36,7 C, dan pernapasan 22x/ menit, berat badan ibu 65 kg,

dengan pemeriksaan fisik terfokus pada konjungtiva ibu tampak masih terlihat sedikit pucat, dan sklera tidak ikterus. Pada pemeriksaan abdomen, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan Tinggi Fundus Uteri (TFU) 3jrd bpx 32 cm sesuai dengan usia kehamilan sekarang (32- 34 minggu) dengan presentasi kepala, punggung kanan dan denyut jantung janin masih terdengar jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi 140x/ menit.

Dengan keadaan ibu yang masih sama saat di lakukan kunjungan kedua di rumah pasien, masih di berikan asuhan tentang pentingnya melaksanakan *health Education* mengenai gizi pada ibu hamil, hygiene dalam kehamilan, istirahat dan cara mengkonsumsi tablet Fe yaitu mengkonsumsi suplemen zat besi pada malam hari dan diminum dengan air putih atau air jeruk dan jangan di minum dengan susu, teh atau air soda.

Pada kunjungan ketiga dengan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik, kesadaran komposmentis, sakit kepala yang dirasakan sudah berkurang, pusing yang sering dirasakan berkurang, dan ibu mengatakan sudah mulai memperhatikan asupan makanan yang mengandung zat besi dan mengkonsumsi tablet zat besi sesuai dengan anjuran. Saat dilakukan pemeriksaan tanda- tanda vital didapatkan hasil dengan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/ menit, suhu 37 C, dan pernapasan 24x/ menit. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terfokus tampak pada konjungtiva ibu pucat sudah berkurang, tidak icterus dan pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan didapatkan hasil TFU 3jr bpx 32 cm dengan usia kehamilan 34-36 minggu, teraba bokong pada bagian fundus, presentasi kepala dengan posisi janin

punggung kanan. Denyut jantung janin terdengar kuat dan jelas dengan menggunakan lenek dibagian kuadran kanan bawah perut ibu frekuensi 140x/ menit.

Pada kunjungan ketiga di rumah klien dilakukan follow up pada ibu tentang pelaksanaan HE mengenai pentingnya gizi pada ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya, hygiene dalam kehamilan, istirahat yang cukup dengan mengurangi pekerjaan rumah seperti biasa dan mengingatkan kepada ibu untuk tetap rajin mengkonsumsi obat dan tetap memperhatikan aturan minum yang telah dianjurkan.

Pada kunjungan keempat yang masih dilakukan di rumah Ny "R" dengan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik, kesadaran komposmentis, sakit kepala yang dirasakan sudah berkurang, pusing yang sering dirasakan berkurang, Saat dilakukan pemeriksaan tanda- tanda vital didapatkan hasil dengan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80x/ menit, suhu 36,7 C, dan pernapasan 24x/ menit. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terfokus tampak pada konjungtiva ibu pucat sudah berkurang, tidak icterus dan pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan didapatkan hasil TFU 2jrbpx 33cm dengan usia kehamilan ibu 36-38 minggu, teraba bokong pada bagian fundus, presentasi kepala dengan posisi janin punggung kanan.

Pada kunjungan ke empat di rumah klien ini tetap dilakukan follow up mengenai pelaksanaan HE tentang gizi pada ibu hamil, hygiene dalam kehamilan, istirahat dan pengkonsumsian vitamin serta mengingatkan ibu jadwal pemeriksaanya pada tanggal 31 mei 2017 di puskesmas.

Kunjungan kelima di Puskesmas dengan hasil keluhan yang dirasakan ibu pusing dan sakit kepala sudah berkurang, ibu mengurangi pekerjaan sehingga tidak mudah lelah lagi setelah beraktifitas. Didapatkan hasil keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, berat badan 67kg, pemeriksaan tanda- tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 2/ menit, suhu 36,7C, dan pernapasan 22x/ menit. Pada pemeriksaan fisik tampak konjungtiva ibu tampak masih sedikit pucat , sklera tidak ikterus, pemebesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dengan TFU setinggi Px 34 cm, dengan gestasi 38-40 minggu dengan teraba bokong pada bagian fundus, presentasi kepala, punggung kanan, tidak ada edema pada tungkai dan nyeri tekan. Telah dilakukan (pemeriksaan laboratorium pada tanggal 31 mei 2017 dengan hasil kadar Hemoglobin 10 gram%.

Pada kasus ini Ny “R” 32 tahun dengan diagnosa anemia pada masa kehamilan. Pada kasus ini, diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan asuhan pada studi kasus Ny” R” dengan anemia, semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik dan tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga yang kooperatif serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tindakan dipuskesmas Somba Opu Gowa. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Mangkuji, 2013).

Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan adalah sebagai berikut, Pada pelaksanaan evaluasi tanggal 22 April - 31 Mei 2017 pada Ny "R" yaitu kehamilan berlangsung normal ditandai dengan pusing, sakit kepala, terkadang cepat merasakan lelah yang sering dirasakan ibu sudah teratasi, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda- tanda vital dalam batas normal, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dan detak jantung janin dalam batas normal, Hb meningkat dari 8,6 gram% menjadi 10 gram% ibu menghabiskan obat yang diberikan, serta mengurangi aktifitasnya. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny "R" berhasil dengan melihat perubahan yang telah dirasakan ibu baik dari keluhan, kadar Hb ibu dan kehamilan berlangsung normal.

Pada kasus Ny "R" dari hasil evaluasi yang dilakukan dari tanggal 22 April 2017 - 31 Mei 2017 memang terjadi peningkatan kadar Hb dari 8,6gr% menjadi 10gr% tapi keadaan ini belum dikatakan aman bagi pasien karena kadar hemoglobin normal pada wanita hamil adalah 11gr%.

Pada Ny "R" usia kehamilan sudah memasuki 38 minggu atau dekat dengan proses persalinan dengan keadaan kadar Hb 10gr% ini di khawatirkan akan terjadi masalah dalam proses persalinan. Pada persalinan ibu dengan anemia dapat terjadi gangguan his, kala dua berlangsung lama sehingga dapat membuat kelelahan dalam proses persalinan, kala uri dapat di ikuti retensio plasenta dan perdarahan postpartum sekunder dan atonio uteri.

Dengan demikian walaupun penulis telah selesai melakukan asuhan pada Ny"R" tapi keadaan Ny"R" ini masih membutuhkan perhatian dari tenaga kesehatan di puskesmas sampai dalam proses persalinannya.

PENDOKUMENTASIAN

Pendokumentasian pada kasus Ny"R" ini dimulai pada kontak pertama pada kunjungan antenatal di Puskesmas Somba Opu Gowa pada tanggal 22 april 2017. Telah dilakukan pengumpulan data subjektif dan objektif dan berdasarkan data yang didapat ditetapkan diagnosa. Berdasarkan diagnosa tersebut ditentukan diagnosa potensial yang aka timbul. pada Ny "R" tidak didapatkan adanya data untuk tindakan emergency. Pada kasus Ny"R", implementasi telah dilakukan berdasarkan semua intervensi yang telah ditetapkan.

Intervensi dilakukan mulai dari kunjungan pertama dan dilanjutkan 4 kunjugan berikutnya. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia berat dan mengatasi anemia yang dialami. Evaluasi dilakukan pada kunjungan kelima di puskesmas, keluhan yang dirasakan ibu sudah berkurang, wajah ibu tampak tidak begitu pucat, kadar Hb naik dari 8,6 gram% menjadi 10gram%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan Asuhan Kebidanan pada ibu hamil pada Ny R, GIII PII A0 dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa yang menggunakan 7 langkah varney mulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pengkajian telah dilaksanakan dengan mengumpulkan semua data yang tersedia melalui teknik wawancara dan pemeriksaan fisik maupun penunjang. Data subjektif khususnya pada keluhan utama yaitu ibu mengatakan badannya lemas, pusing dan cepat lelah. Data obyektif yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, dengan kadar Hb 8,6gram%.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/ masalah aktual pada Ny”R” di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017 dengan pengumpulan baik dari data subjektif, data obyektif dan pemeriksaan penunjang/ laboratorium sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “R” dengan anemia pada masa kehamilan.
3. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/ masalah potensial pada Ny”R” dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017 dengan hasil tidak ada masalah potensial yang terjadi pada ibu karna diberikannya penanganan yang tepat.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”R” dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017 dengan hasil

bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny”R” dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017, dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada Ny”R” dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny”R” dengan anemia di Puskesmas Somba Opu Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan kadar Hb ibu yang awalnya 8,6 gram% menjadi 10 gram%.

B. Saran

1. Untuk bidan

Bidan dapat lebih mengidentifikasi tanda-tanda anemia secara dini sehingga dapat dilakukan antisipasi dan penanganan tindakan segera, merencanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia secara cepat sebelum menjadi anemia yang memnayakan bagi pasien.

2. Untuk puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia secara optimal dan tidak mennyepelekan keadaan ibu hamil dengan anemia.

3. Untuk institusi

Menambah referensi buku tentang anemia dalam kehamilan supaya dapat menambah atau meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa mengenai anemia dan mempermudah dalam mempelajari anemia di kampus.

4. Untuk pasien

Pasien diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan bagi penderita anemia dengan rajin mengikuti penyuluhan dan meningkatkan asupan gizi untuk memperbaiki keadaan anemia yang dideritanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bakta, I Made, *Hematologi Klinik Ringkas*, Jakarta: EGC, 2006.
- Baston, Helen dan Jennifer Hall, *Midwifery Esesential ANTENATAL*, Jakarta: EGC, 2013
- Departemen Agama RI. *AL-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta : Toha putra. 2011
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar: SIK, 2014
- Fatimah, Ernawati, Susi, *Pelaksanaan Antenatal Care Berhubungan dengan Anemia Pada Kehamilan Trisemester III*, Yogyakarta, 2015
- Hasswane Nadia, dkk. Prevalance and Factors Associated with Anemia Pregnancy in a Group Of Moroccan Pregnant Women. *journal of Biosciences and Medicine*, No. 3, 88-97, 11 august 2011.
- Intan Parulian, “Strategi Dalam Penanggulangan Pencegahan Anemia pada Kehamilan.” *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 3 No. 3, januari-juli 2016.
- Jannah, Nurul, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan-Kehamilan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012
- Kefiyaew Fiagot, dkk. Anemia Among regnant Women in Southeast Ethioia: revaance, saverity and Associated Risk Factors. *BMC Research Notes 2014*, 7: 771
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*, edisi pertama, 2013.
- Lalita, Elisabeth, M. F. *Asuhan Kebidanan Kehamilan* , Jakarta: In Media, 2013.
- Luthfiyati, Yana. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta tahun 2012*. *Jurnal Medika Respati*, Vol.X No. 2, April 2015.
- Mandriwati, G.A. *Asuhan Kebidanan Antenatal*, Jakarta: EGC, 2012.


- Manguji Betty. *Asuhan Kebidanan Tujuh Langkah Varney*. Jakarta. Penerbit buku kedokteran EGC. 2013.
- Manuaba, Ida Ayu, dkk. *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan kb*. Edisi 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011.
- Nugroho, Taufan. *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Paendong, Florencia T. dkk. *Profil zat besi (Fe) pada ibu hamil dengan anemia di Puskesmas Bahu Manado*. Jurnal e-Clinic(eCI), Vol 4, No. 1, Januari-juni 2016.
- Pranoto, Ibnu, dkk. *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya, 2013.
- Prawihardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2014.
- Purwoatui, Endang. TH dan Elisabeth. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Proverawati, Atikah. *Anemia Dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Roboson, Elizabeth. S dan Jason Waugh, *Patologi pada Kehamilan Manajemen dan Asuhan Kebidanan*, Jakarta: EGC, 2013.
- Ratih, Rini Hariani. *Pengaruh Pemberian Zat Besi (Fe) terhadap Peningkatan Hemoglobin Ibu Hamil Anemia*. Pekanbaru: Jomis (journal of Midwifery Science), Vol 1. No.2, Juli 2017.
- Rukiyah, Ai Yeyeh. *Asuhan Kebidanan I Kehamilan* Jakarta: CV Trans Info Medika. 2013.
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan pemeriksaan kehamilan*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Shaikh Sabina, "An Overview Of Anemia In Pregnancy." *Journal of innovations in pharmaceuticals and Biological Sciences*, Vol. 2 No.2. 144-151, 2015.
- Sunarti. *Asuhan Kehamilan*. Jakarta: In Media, 2013.

Fatimah, St. dkk. *pola konsumsi dan kadar hemoglobin pada ibu hamil di kabupaten Maros, Sulawesi Selatan*. Makassar: bagian gizi fakultas kesehatan masyarakat Universitas Hasanuddin. 2011.

Tartwoto dan Wasnidar. *Buku Saku Anemia Pada Ibu Hamil Konsep Dan Pentalaksanaan*. Jakarta: Trans Info Media, 2013.

Walyani, Elisabeth. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Waryono. *Gizi Reproduksi*. Pustaka Rihama. Yogyakarta. 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Ratna Ayu Dinar
Nim : 70400114041
T.T.L : Bulukumba 14 Agustus 1996
Suku : Konjo
Agama : Islam
Alamat : Jl.Monumen Emmysaeland III

Nama Orang Tua

a. Ayah : Jamaluddin T
b. Ibu : Harni

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 130 BontoBeang : 2003-2008
SMP Negeri 25 Bulukumba : 2008-2011
SMA Negeri 6 Bulukumba : 2011-2014.
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017