

**UJI AKTIVITAS GEL EKSTRAK ETANOL DAUN CEMPEDAK
(*Arthocarpus champeden*) TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:
REZKY MAULIYANTI
NIM. 70100113058

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rezky Mauliyanti
NIM : 70100113058
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 21 Agustus 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Perum. Teknik Unhas Gowa Blok A No. 40
Judul : Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Cempedak
(*Arthocarpus champeden*) Terhadap Bakteri
Penyebab Jerawat

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata-Gowa, 24 November 2017

ALAUDDIN
M A K A S S A R I
Penyusun


Rezky Mauliyanti

70100113058

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Cempedak (*Arthocarpus champeden*) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat” yang disusun oleh **Rezky Mauliyanti**, NIM : 70100113058, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jum’at, 24 November 2017 M** yang bertepatan dengan **5 Rabiul Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 24 November 2017 M
5 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt (.....)

Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Alifia Putri F, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. (.....)

Penguji I : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt (.....)

Penguji II : Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad saw., keluarga, para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam dan Ummat yang mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Cempedak (*Arthocarpus champeden*) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak.

Ucapan terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tua saya tercinta ibunda Marwa dan ayahanda M. Yusuf A., yang telah banyak memberikan doa, motivasi serta pengorbanan baik moril maupun materil yang tidak terhingga kepada penyusun yang tidak akan mampu terbalaskan sampai akhir hayat dan saudara-saudaraku Fachrul Razzaq dan Fitri Ananda Asmarani serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya

Penyusun menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah skripsi ini, yaitu

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes, Wakil Dekan I. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes, Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Ibu Mukhriani, S.Si, M.Si., Apt., sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, S.Si, M.Si., Apt. pembimbing pertama atas segala arahan dan bimbingannya yang tidak bisa dinilai dengan materi dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penyusun sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. pembimbing kedua yang telah banyak berkontribusi besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Mukhriani, S.Si, M.Si., Apt, penguji kompetensi atas saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A penguji agama atas saran-saran konstruktif tentang keagamaan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penyusun sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.

10. Teman-teman angkatan saya, Farbion yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan kebersamaan kalian selama ini.
11. Kakanda-Kakanda di kampus yang selalu senantiasa membantu memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon perjuangan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini dapat menjadi amal saleh. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kebaikan Ummat. Semoga Allah swt., selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal A'lamin.

Samata-Gowa, 24 November 2017

Penyusun,


Rezky Maulivanti
NIM. 70100113058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-37
A. Uraian Tumbuhan.....	8
B. Tinjauan Tentang Penyakit.....	11
C. Uraian Umum Mikroba Uji.....	16
D. Simplisia.....	20
E. Ekstraksi.....	20
F. Bakteri.....	24

G. Metode Uji Mikroba.....	24
H. Uraian Gel.....	26
I. Tinjauan Islam Tumbuhan dalam Bidang Kesehatan	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel.....	38
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Prosedur Kerja.....	39
E. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45-55
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
KEPUSTAKAAN.....	57-59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60-77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Formulasi sediaan	40
2. Hasil ekstraksi daun cempedak	45
3. Hasil uji daya hambat.....	45
4. Evaluasi organoleptik	46
5. Evaluasi Ph.....	46
6. Evaluasi daya sebar.....	46
7. Evaluasi homogenitas.....	47
8. Evaluasi viskositas.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Daun Cempedak	8
2. Bakteri <i>Propionibacterium acnes</i>	16
3. Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	18
4. Bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema alur penelitian	60
2. Ekstraksi	61
3. Pembuatan sediaan gel	62
4. Pembuatan medium.....	63
5. Pengujian Bakteri	65
6. Evaluasi	68
7. Perhitungan.....	69
8. Gambar hasil penelitian	71



ABSTRAK

Nama : Rezky Mauliyanti

NIM : 70100113068

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Cempedak (*Arthocarpus champeden*) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Cempedak (*Arthocarpus champeden*) Terhadap Bakteri penyebab Jerawat. Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%, ekstrak diformulasikan menggunakan HPMC 8% dengan kadar ekstrak yang digunakan yaitu 1%, 5%, 10%. Uji mikrobiologi dengan mengukur diameter zona hambat gel ekstrak etanol 96% daun Cempedak terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*, setelah itu viskositas sediaan diukur menggunakan viskometer Brookfield, dilakukan uji daya sebar, dan diukur pH sediaan. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik fisik sediaan memenuhi karakteristik gel secara umum dengan viskositas gel konsentrasi 1%, 5%, 10% berturut-turut yaitu 3.752 cP, 4.904 cP, 5.232 cP dengan pH masing-masing yaitu 4.7, 5.5, 5.8. Gel dengan konsentrasi 10% memiliki aktivitas antibakteri yang paling baik dibandingkan 1% dan 5% dengan zona hambat berturut-turut pada bakteri *Propionibacterium acnes* yaitu 33.3 mm, 32.3 mm, 35.6 mm, sementara pada bakteri *Staphylococcus aureus* tidak menunjukkan zona hambat dan pada bakteri *Staphylococcus epidermidis* juga tidak menunjukkan zona hambat.

Kata kunci : Jerawat, ekstrak etanol 96%, daun cempedak, gel, zona hambat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Rezky Mauliyanti

NIM : 70100113068

Script Title : Activity test of Gel Ethanol Extract of Cempedak Leaves
(*Arthocarpus champeden*) to Acne-Causing Bacteria

There has been conducted about research of Activity Test of *Cempedak* leaves (*Arthocarpus champeden*) to the acne-causing bacteria. Extraction was done by using maceration method with 96 % ethanol as solvent, and then the extract was formulated into gel using 8 % HPMC as base with percent extract was 1 %, 5 %, and 10 %. Microbiology test was done by measuring diameter of inhibition zone of 96 % ethanol extract gels *cempedak* leaves against *Propionibacterium acnes* bacteria, *Staphylococcus aureus* bacteria, and *Staphylococcus epidermidis* bacteria. After that, the viscosity of the preparation was measuring using Brookfield viscometer, spreading test was done, and pH of preparation was measured. The results showed physical characteristic of preparation in accordance with the characteristics of the gel in general with the concentration of the gel at concentration 1 %, 5 %, 10 % in a row was 3.752 cP, 4.904 cP, 5.232 cP with pH of each preparation was 4.7, 5.5, 5.8. 10% Gel concentration has most antibacterial activity than 1 % and 5 % with inhibition in a row in *Propionibacterium acnes* bacteria was 33.3 mm, 32.3 mm, 35.6 mm, and *Staphylococcus aureus* dont was inhibition in a row and do to in *Staphylococcus epidermidis*.

Keyword : Acne, 96 % ethanol extract, *cempedak* leaves, gels, inhibition zone

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jerawat merupakan penyakit kulit yang dikenal dengan *acne vulgaris*, hampir semua orang pernah mengalaminya. Jerawat sering dianggap sebagai kelainan kulit yang timbul secara fisiologis. Hal ini umumnya terjadi pada umur sekitar 14-17 tahun pada wanita, 16-19 tahun pada pria dan akan menghilang dengan sendirinya pada usia sekitar 20-30 tahun. Namun, kadang-kadang terutama pada wanita, jerawat menetap sampai dekade umur 30 tahun lebih (Djuanda, *et al.*, 2014).

Bakteri yang umum meninfeksi jerawat adalah *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, dan *Propionibacterium acnes*. Pengobatan jerawat di klinik kulit biasanya menggunakan antibiotik yang dapat menghambat infamasi dan membunuh bakteri, contohnya tetrasiklin, eritromisin, doksisisiklin, dan klindamisin. Selain itu, sering juga digunakan benzoal peroksida, asam azelat, dan retinoid, namun obat-obat ini memiliki efek samping dalam penggunaannya sebagai anti jerawat antara lain iritasi, sementara penggunaan antibiotik jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi juga dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensitivitas (Djajadisastra, 2013).

Pengobatan jerawat bisa diberikan dengan antibiotik seperti tetrasiklin, eritromisin, doksisisiklin dan klindamisin. Selain dari itu pengobatan jerawat juga digunakan benzoil peroksida, asam azelat dan retinoid (Oprica, 2004), namun obat ini memiliki efek samping dalam penggunaannya sebagai anti jerawat antara lain iritasi, sementara penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi (Wasitaatmadja, 2015).

Bentuk sediaan gel lebih sering digunakan pada pengobatan jerawat dari pada bentuk sediaan krim karena sediaan gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan keparahan jerawat (Sasanti *et al.*, 2012). Gel dipilih karena tidak mengandung minyak sehingga tidak akan memperburuk jerawat, bening, mudah mengering membentuk lapisan film yang mudah dicuci, juga bentuk sediaan gel cocok untuk terapi topikal pada jerawat terutama penderita dengan tipe kulit berminyak (Voigt, 1994)

Peran obat tradisional dewasa ini semakin nyata seiring dengan meningkatnya pengetahuan akan khasiat berbagai tanaman yang merupakan warisan budaya bangsa. Selain aspek kesehatan yang menjadi pemicu utama berbagai penelitian obat bersumberkan herbal, aspek ekonomi menjadi pendorong penting dalam menggali potensi yang ada di negara kita. Indonesia merupakan negara kedua terkaya didunia setelah Brazil untuk keanekaragaman hayati. Berbagai tanaman obat, baik tunggal maupun ramuan telah dimanfaatkan dan upaya pengembangan telah banyak dilakukan. Selain untuk memaksimalkan pemanfaatan tanaman obat yang ada di Indonesia kegiatan semacam ini juga untuk mencari alternatif obat baru oleh karena mulai adanya resistensi beberapa agent penyebab penyakit terhadap obat yang telah ditemukan terlebih dahulu.

Pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia akhir-akhir ini meningkat, bahkan beberapa bahan alam telah diproduksi secara pabrikasi dalam skala besar. Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia, di samping itu harganya lebih terjangkau. Selain itu, keuntungan lain penggunaan obat tradisional adalah bahan bakunya mudah diperoleh dan harganya yang relatif murah (Putri, 2010).

Cempedak adalah salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis. Cempedak cukup terkenal di Indonesia dan daerah pedesaan. Tanaman ini berasal dari India bagian selatan yang kemudian menyebar ke daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Daun cempedak yang mengandung berbagai metabolit sekunder seperti; triterpenoid, steroid, senyawa fenol, flavonoid dan tannin.. Tumbuhan cempedak merupakan satu jenis yang dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Daun cempedak sering dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan di Indonesia sebagai bedak dingin dan penghilang flek hitam pada wajah. Ekstrak kasar dan fraksi etil asetat daun cempedak memiliki aktivitas antioksidan dan mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid (Rahmawati, 2013).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun cempedak mengandung senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antibakteri. Dimana pada proses maserasi sampel dilakukan dengan menggunakan etanol 96% karena merupakan penyari yang paling optimal dengan parameter kadar fenolik dan flavonoid (Agustiningsih *et al.*, 2010)

Sejauh ini informasi mengenai pemanfaatan tumbuhan cempedak belum banyak tersedia untuk kebutuhan ilmiah dan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam ini, sehingga penelitian ini perlu dilakukan (Nauw, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk membuat formulasi gel antijerawat ekstrak etanol daun cempedak dan melakukan uji antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri dan dapat diketahui bahwa cempedak memiliki manfaat yang cukup besar dalam dunia farmasi dan kedokteran.

Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol daun cempedak dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*)?
2. Apakah gel ekstrak etanol daun cempedak dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*)?
3. Berapakah konsentrasi gel ekstrak etanol daun cempedak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*)?

B. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Cempedak merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis. Yang akan digunakan sebagai simplisia.
- b. Ekstrak etanol daun cempedak adalah sediaan pekat yang diperoleh dari zat aktif simplisia menggunakan pelarut etanol 96% secukupnya, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan.
- c. Pelarut etanol 96% merupakan pelarut yang digunakan untuk maserasi karena paling optimal dengan parameter kadar fenolik dan flavonoid.
- d. Maserasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan sediaan pekat dari simplisia (ekstrak) dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan pelarut etanol 96%

- e. Gel ekstrak etanol daun cempedak merupakan sediaan semipadat yang mengandung ekstrak etanol daun cempedak yang digunakan secara topikal untuk digunakan sebagai antibakteri.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun cempedak terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*.

C. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Mody Lempang dan Suhartati “Potensi Pengembangan Cempedak (*Artocarpus Champedan*) Pada Hutan Tanaman Rakyat di Tinjau Dari Sifat Kayu dan Kegunaannya” (2013), balai penelitian kehutanan Makassar. Pengelolohannya bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Cempedak adalah jenis pohon serbaguna. Upaya budidaya, promosi pemanfaatan dan pemasaran buah dan kayu cempedak perlu ditingkatkan, sehingga sumber daya hutan tersebut dapat bermanfaat bagi kelestarian dan lingkungan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek yang digunakan berupa daun cempedak dan menggunakan metode penelitian observasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuziah Halimatussa’diah, dkk “Aktivitas Antioksidan Kombinasi Daun Cempedak (*Artocarpus Champedan*) dan Daun Bandotan (*Ageratum conyzoides L.*)” (2014), laboratorium penelitian dan pengembangan kefarmasian farmaka tropis fakultas farmasi, universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Daun cempedak yang mengandung berbagai metabolit sekunder seperti; triterpenoid, steroid, senyawa fenol, flavonoid dan tannin, memiliki efek sebagai antioksidan. Begitu pula dengan daun bandotan yang mengandung flavanoid, alkaloid, minyak atsiri, fenol dan

kumarin. Efek antioksidan ini terutama disebabkan oleh adanya kandungan senyawa fenol. Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan bakteri uji.

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Anggraini, ddk, sekolah tinggi ilmu farmasi Riau, Pekanbaru pada tahun 2013 tentang “ Formulasi Gel Antijerawat dari Ekstrak Gambir” mengatakan bahwa pengobatan jerawat bisa diberikan dengan antibiotik seperti tetrasiklin, eritromisin, doksisisiklin dan klindamisin, namun obat ini memiliki efek samping dalam penggunaannya sebagai antijerawat antara lain iritasi, sementara penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi. Bentuk sediaan yang baik digunakan pada pengobatan jerawat adalah sediaan gel karena tidak mengandung minyak yang dapat memperarah jerawat. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan ekstrak cempedak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariance Juli Ross Nauw, ddk pada tahun 2016 tentang “ Pemanfaatan Tumbuhan Cempedak (*Artocarpus Champedan*) Oleh Masyarakat Kampung Sabun Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, Papua Barat”, fakultas kehutanan universitas Papua (2016). Tumbuhan cempedak diklasifikasikan dalam Family Moraceae dan Genus *Artocarpus* yang mempunyai banyak kegunaan antara lain memproduksi banyak kegunaan antara lain memproduksi buah-buahan yang berukuran cukup besar dan dapat dimakan mencakup nangka, sukun dan cempedak. Tumbuhan cempedak merupakan satu jenis yang dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu memformulasikan ekstrak etanol daun cempedak sebagai gel antibakteri.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun cempedak terhadap bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*).
- b. Mengetahui aktivitas antibakteri dari gel ekstrak etanol daun cempedak terhadap bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*).
- c. Mengetahui konsentrasi dari gel ekstrak etanol daun cempedak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*).

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang khasiat penggunaan ekstrak daun cempedak (*Arthocarpus champeden*) untuk mengobati penyakit jerawat.
- b. Menjadi rujukan pengembangan obat baru dari tumbuhan (obat herbal).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman



Gambar 1. Daun cempedak

1. Klasifikasi Tanaman

- Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas : Dilleniidae
Ordo : Urticales
Famili : Moraceae (suku cempedak-cempedakan)
Genus : Artocarpus
Spesies : *Artocarpus champeden* (Tjitrosoepomo, 2013)

2. Nama Daerah

Sedangkan nama lokal di beberapa pulau Nusantara adalah nangka beurit, nongko cino, comedak (Jawa); tiwadak, tuadak, mangkahai (Kalimantan); cimpedak (Bali), tembedak, kakan, bikara, cubadak (Sumatra); campada, nangka balanda, tabodoko, nanakan, cidu, campedak (Sulawesi); tambadak (Papua); naka

wara (Flores); nakane, tawedak (Seram); tuada (Ternate dan Tidore) (Heyne, 1987; Verheij dan Coronel, 1997; Lempang *et al.* 2013).

3. Deskripsi Tanaman

a. Batang

Cempedak berupa pohon yang selalu hijau, batangnya lurus dan silindris tetapi kadang-kadang persegi. Tingginya mencapai ± 15 m dan diameter batang ± 40 cm (Heyne, 1987). Pada pangkal batang terdapat benjolan-benjolan, di batang utama tumbuh ranting, daun dan buah. Kulit kayunya berwarna abu-abu dan kadang-kadang coklat keabuabuan, tebalnya 2 - 3,5 cm, jika batang dipotong atau dilukai akan mengeluarkan getah yang berwarna putih (Lempangan, 2013).

b. Daun

Bentuk daun eliptik sampai bulat telur sungsang, susunan berselang, panjang daun 5 - 25 cm dan lebar daun 2,5 - 12 cm, pangkal daun berbentuk pasak (sampai bundar, pinggir daun rata, tulang daun 6 - 10 pasang yang letaknya lateral dan agak melengkung ke depan, tangkai daun 1 - 3 cm, ranting muda dan permukaan bawah daun berbulu halus yang panjangnya ± 3 mm (Lempangan, 2013).

c. Bunga

Bunga bentuk tunggal biasanya muncul di ketiak daun, batang cabang, batang utama hingga pangkal batang. Karangan bunga berbentuk lonjong seperti gada memanjang dan berumah satu. Karangan bunga jantan berbentuk bongkol seperti gelendong (selinder) berukuran $1 \times 3 - 5,5$ cm, berwarna hijau pucat atau kekuningan, bertangkai 3 - 6 cm. Bongkol jantan berbentuk silinder berwarna kuning keputih-putihan, gagang bunga panjangnya 3 - 6 cm, bongkol betina memiliki tangkai putik yang berbentuk benang (Lempangan, 2013).

d. Buah

Buah cempedak bersifat semu majemuk (*syncarp*) berbentuk silinder sampai bulat dengan ukuran panjang 10 - 15 × 20 - 35 cm dan diameter 10-15 cm. Buah cempedak termasuk unik, daging buahnya mudah di lepas dari kulit buahnya dan tangkai buahnya meskipun masih dikelilingi oleh dami buah. Daging buah adalah perhiasan bunga yang membesar dan menebal, berwarna putih kekuningan sampai jingga, rasanya manis dan aromanya harum, bertekstur lembut, licin berlendir dan agak berserat (Lempangan, 2013).

e. Biji

Setiap buah mengandung biji ± 98 butir, biji berbentuk lonjong berukuran 27 x 17,2 x 13,7 cm (panjang x lebar x tebal) tetapi kadang-kadang ada yang bulat pipih sampai bulat, warna putih keabu-abuan. Kadar air biji segar 51,7 %, berat biji rata-rata 3,9 g atau ± 256 biji/kg, setelah kering udara berat biji rata-rata 2,7 g atau ± 370 biji/kg. Komposisi biji terdiri atas proptein 10 - 13%, lemak 0,5 - 1,5%, karbohidrat 77,0 - 81,0%, serat 4,0 - 6,0% dan abu 2,0 - 4,0 % (Lempangan, 2013).

f. Kandungan Tanaman

Daun cempedak yang mengandung berbagai metabolit sekunder seperti; triterpenoid, steroid, senyawa fenol, flavonoid dan tannin, memiliki efek sebagai antioksidan. Efek antioksidan ini terutama disebabkan oleh adanya kandungan senyawa fenol. Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan. Senyawa fenol dapat meredam radikal bebas dengan menyumbangkan elektronnya melalui atom hidrogen gugus hidroksil (Diah, 2014).

g. Khasiat Tanaman

Tumbuhan cempedak memiliki khasiat sebagai bedak dingin dan penghilang flek hitam pada wajah.

B. Tinjauan Tentang Penyakit (Jerawat)

1. Definisi

Acne vulgaris merupakan gangguan dari unit pilosebacea yang sering dijumpai, dikarakteristikan dengan adanya papul folikular non inflamasi (komedo) dan adanya papul inflamasi, pustul, nodul dan kista pada bentuk yang berat. *Acne vulgaris* mengenai daerah kulit dengan populasi kelenjar sebacea yang paling padat; antara lain pada daerah wajah, dada bagian atas, dan punggung. *Acne vulgaris* yang berat dapat memberikan dampak psikologis dan fisik berupa stres emosional, depresi dan skar yang permanen (Siregar, 1991).

2. Etiologi dan Patogenesis

Patogenesis *acne vulgaris* bersifat multifaktorial. Ada 4 faktor penting yang dianggap berperan dalam perkembangan suatu lesi *acne vulgaris*. Faktor-faktor tersebut antara lain hiperproliferasi folikuler epidermal, peningkatan produksi sebum, peningkatan aktivitas *P. acnes*, dan inflamasi. Hiperproliferasi epidermal folikular adalah kejadian yang pertama sekali dikenal dalam perkembangan *acne vulgaris*. Penyebab pasti yang mendasari hiperproliferasi ini tidak diketahui. Saat ini, ada 3 buah hipotesis yang telah diajukan untuk menjelaskan mengapa epitelium folikular bersifat hiperproliferatif pada individu dengan *acne vulgaris*. Pertama, hormon androgen, yang telah dikenal sebagai pencetus awal. Komedo, klinis yang menyebabkan pembentukan sumbatan pada muara folikular, mulai timbul disekitar usia pubertas pada orang-orang dengan *acne vulgaris*. Derajat *acne vulgaris* komedonal pada usia prapubertas berhubungan dengan kadar hormon androgen adrenal yaitu *dehydroepiandro-*

sterone sulphate (DHEA-S). Apalagi, reseptor hormon androgen ditemukan pada folikel-folikel dimana komedo berasal. Selain itu individu dengan malfungsi reseptor androgen ternyata tidak akan mengalami akne vulgaris. Kedua, perubahan komposisi lipid, yang telah diketahui berperan dalam perkembangan akne. Pada pasien acne biasanya mempunyai produksi sebum yang berlebihan dan kulit yang berminyak. Produksi sebum yang berlebihan ini dapat melarutkan lipid epidermal normal dan menyebabkan suatu perubahan dalam konsentrasi relatif dari berbagai lipid. Berkurangnya konsentrasi asam linoleat ditemukan pada individu dengan lesi acne vulgaris, dan menariknya, keadaan ini akan normal kembali setelah pengobatan yang berhasil dengan menggunakan isotretinoin. Penurunan relatif asam linoleat dapat mengaktifkan pembentukan komedo. Inflamasi adalah faktor hipotesis ketiga yang terlibat dalam pembentukan komedo. *Interleukin-1* adalah suatu sitokin proinflamasi yang telah digunakan pada suatu model jaringan untuk menginduksi hiperproliferasi epidermal folikular dan pembentukan acne vulgaris. Walaupun inflamasi tidak terlihat baik secara klinis maupun mikroskopis pada awal acne vulgaris, ia tetap memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan acne vulgaris dan komedo. Peningkatan produksi sebum adalah faktor kunci yang berperan dalam pembentukan acne vulgaris. Produksi dan ekskresi sebum diatur oleh sejumlah hormon dan mediator yang berbeda. Hormon androgen khususnya, meningkatkan pembentukan dan pelepasan sebum. Kebanyakan pria dan wanita dengan acne vulgaris memiliki kadar hormon androgen yang bersirkulasi dalam jumlah yang normal. *P. acnes* merupakan suatu organisme mikroaerofilik yang ditemukan pada banyak acne vulgaris. Walaupun tidak ditemukan pada lesi yang paling awal dari acne vulgaris, *P. acnes* ini hampir pasti dapat ditemukan. Adanya *P. acnes* akan meningkatkan proses inflamasi melalui sejumlah mekanisme. *P. acnes* menstimulasi inflamasi

melalui produksi mediator-mediator proinflamasi yang berdifusi melalui dinding folikel. Penelitian terkini menunjukkan bahwa *P. acnes* mengaktifkan *toll-like receptor-2* pada monosit dan neutrofil. Aktivasi *toll-like receptor-2* ini kemudian akan memicu produksi sitokin proinflamasi yang multipel, seperti IL-12, IL-8, dan TNF. Hipersensitivitas terhadap *P. acnes* dapat juga menjelaskan mengapa beberapa individu mengalami acne vulgaris inflamasi sedangkan yang lain tidak. Inflamasi mungkin merupakan suatu fenomena primer atau sekunder. Kebanyakan bukti sampai saat ini menyatakan bahwa acne vulgaris merupakan suatu respons inflamasi sekunder terhadap *P. acnes*. Meskipun demikian, ekspresi IL-1 telah diidentifikasi dalam mikrokomedo dan dapat berperan dalam pembentukan acne vulgaris. Faktor-faktor lain yang berperan pada patogenesis acne adalah usia, ras, familial, makanan, cuaca / musim, stres psikologis yang dapat secara tidak langsung memicu peningkatan proses patogenesis tersebut (Siregar, 1991)

3. Klasifikasi jerawat

Jerawat terbagi menjadi menjadi empat tingkatan yaitu ringan, sedang, agak berat dan berat. Tingkatan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah jerawat yang ada pada wajah, dada dan punggung, serta ukuran besar kecil jerawat atau kondisi peradangan jerawat. Selain itu, di bawah ini juga termasuk dalam perbedaan jenis jerawat:

- a. Jerawat pada bayi yang baru lahir (*newborn acne*): Jerawat jenis ini menyerang sekitar 20 persen bayi yang baru lahir dan tergolong jerawat ringan.
- b. Jerawat pada bayi (*infantile acne*): Bayi berumur 3–6 bulan juga ditumbuhi jerawat, dan akan tumbuh kembali pada saat ia beranjak remaja.

- c. Jerawat vulgaris (*Acne vulgaris*): Jerawat jenis ini adalah yang paling umum terjadi pada remaja dan kaum muda yang beranjak dewasa, sekitar 12 – 24 tahun.
- d. Jerawat konglobata (*cystic acne*): Jerawat jenis ini terjadi pada kaum pria muda, tergolong serius namun jarang terjadi (Siregar, 1991)

4. Faktor Resiko

Faktor resiko dan penyebab acne sangat banyak yaitu multifaktorial antara lain :

- a. Sebum merupakan faktor utama penyebab timbulnya acne.
- b. Genetik faktor herediter yang sangat berpengaruh pada besar dan aktivitas kelenjar glandula sebacea. Apabila kedua orang tua mempunyai parut bekas akne, kemungkinan besar anaknya akan menderita acne.
- c. Usia umumnya insiden terjadi pada sekitar umur 14 – 17 tahun pada wanita, 16 – 19 tahun pada pria dan pada masa itu yang predominan adalah komeda dan papul dan jarang terlihat lesi beradang penderita
- d. Jenis kelamin tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan Acne vulgaris.
- e. Kebersihan wajah meningkatkan perilaku kebersihan diri dapat mengurangi kejadian acne vulgaris pada remaja
- f. Psikis pada beberapa penderita, stres dan gangguan emosi dapat menyebabkan eksaserbasi acne. Kecemasan menyebabkan penderita memanipulasi acnena secara mekanis, sehingga terjadi kerusakan pada dinding folikel dan timbul yang beradang yang baru.

g. Hormon endokrin:

1. Androgen : Konsentrasi testosteron dalam plasma penderita akne pria tidak berbeda dengan yang tidak menderita acne. Berbeda dengan wanita, pada testosteron plasma sangat meningkat pada penderita acne
 2. Estrogen : Pada keadaan fisiologi, estrogen tidak berpengaruh terhadap produksi sebum. Estrogen dapat menurunkan kadar gonadotropin yang berasal dari kelenjar hipofisis. Hormon gonadotropin mempunyai efek menurunkan produksi sebum.
 3. Progesteron : Progesteron, dalam jumlah fisiologis tidak mempunyai efek terhadap efektivitas terhadap kelenjar lemak. Produksi sebum tetap selama siklus menstruasi, akan tetapi kadang-kadang progesteron dapat menyebabkan acne premenstrual.
- h. Diet pada penderita yang makan banyak karbohidrat dan zat lemak, tidak dapat dipastikan akan terjadi perubahan pada pengeluaran sebum atau komposisinya karena kelenjar lemak bukan alat pengeluaran lemak yang kita makan.
- i. Iklim di daerah yang mempunyai empat musim, biasanya acne bertambah hebat pada musim dingin, sebaliknya kebanyakan membaik pada musim panas. Bertambah hebatnya acne pada musim panas tidak disebabkan oleh sinar UV melainkan oleh banyaknya keringat pada keadaan yang sangat lembab dan panas tersebut.
- j. Bakteria mikroba yang terlibat pada terbentuknya acne adalah *corynebacterium acnes*, *Stafilococcus epidermidis*, dan *pityrosporum ovale*.
- k. Kosmetika pemakaian bahan-bahan kosmetika tertentu seperti, bedak dasar (*foundation*), pelembab (*moisturiser*), krem penahan sinar matahari (*sunscreen*), dan krem malam secara terus menerus dalam waktu lama dapat


menyebabkan suatu bentuk acne ringan yang terutama terdiri dari komedo tertutup dan beberapa papulopustular pada pipi dan dagu (Siregar, 1991)

5. Terapi

Terapi acne vulgaris bervariasi. Beberapa penelitian secara klinis telah dilakukan untuk mencari penatalaksanaan yang sesuai. Penatalaksanaan acne vulgaris terbagi menjadi 2 yaitu penatalaksanaan secara umum dan secara medikamentosa. Secara umum yaitu dengan menghindari pemencetan dengan non higienis, memilih kosmetik yang non komedogenik, dan lakukan perawatan kulit wajah. Sedangkan secara medikamentosa dibagi menurut derajat keparahan dari acne vulgaris itu sendiri. Secara teori manajemen acne vulgaris yang efektif adalah menurunkan atau mengeliminasi lesi primer secara klinik yaitu mikrokomedo yang merupakan prekursor untuk semua lesi acne vulgaris (Siregar, 1991)

C. Uraian Umum Mikroba Uji

1. *Propionibacterium acnes*



Gambar 2. Bakteri *Propionibacterium acnes*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Actinobacteria

Kelas : Actinobacteridae

Bangsa : Actinomycetales
Famili : Propionibacteriaceae
Genus : Propionibacterium
Spesies : *Propionibacterium acnes* (Jawetz *et. al*, 2005)

b. Sifat dan Morfologi

Propionibacterium acnes termasuk bakteri gram positif yang paling umum tidak berspora, tangkai anaerob, ditemukan dalam spesimen-spesimen klinis *Propionibacterium acnes* pada umumnya tumbuh sebagai anaerob obligat, berbentuk gada atau lancip dengan pewarnaan yang tidak rata dan bermanik-manik dan kadang-kadang berbentuk *coccus* atau bulat (Galuh, 2009).

Spesies *Propionibacterium acnes* adalah anggota flora normal yang terdapat pada kulit dan menyebabkan penyakit kulit ketika mereka menginfeksi kulit. Hasil metabolinya termasuk asam propionat, dimana genusnya diturunkan. Pada metode pewarnaan gram, mereka sangat pleomorfik, berbentuk kurva batang atau titik dan terkadang berbentuk bulat. *Acne vulgaris* turut berperan dalam terbentuknya jerawat. Karena bagian dari flora normal pada kulit, terkadang mengkon *Propionibacterium acnes* taminasi darah ataupun kultur cairan *cerebrospinal* yang didapat dengan menembus kulit. Oleh karena itu, penting untuk membedakan kultur yang terkontaminasi dari yang positif dan mengindikasikan adanya infeksi (Jawetz *et. al*, 2001). Dibandingkan dengan penggunaan bahan sintetik.

2. *Staphylococcus aureus*



Gambar 3. Bakteri *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi

- Domain : Bacteria
- Filum : Firmicutes
- Kelas : Bacilli
- Bangsa : Bacillales
- Suku : Staphylococcaceae
- Marga : Staphylococcus
- Spesies : *Staphylococcus aureus* (Syahrurachman, 1994)

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif anggota famili *Micrococcaceae* berbentuk bulat, bergerombol, seperti susunan buah anggur koloni berwarna abu-abu hingga kuning tua, koagulase positif dan sifatnya sebagai bakteri komensal dalam tubuh manusia yang jumlahnya berimbang dengan flora normal lain. *Staphylococcus aureus* pada manusia di antaranya ditemukan pada hidung, kulit, tenggorokan, dan lain-lain (Syahrurachman, 1994). Bakteri ini dapat menyebabkan bermacam-macam infeksi, seperti pneumonia, meningitis, empiema, endokarditis, jerawat, pioderma, atau impetigo (Brook, 2005).

3. *Staphylococcus epidermidis*



Gambar 4. Bakteri *Staphylococcus epidermidis*

a. Klasifikasi

- Domain : Bacteria
- Filum : Firmicutes
- Kelas : Bacilli
- Bangsa : Bacillales
- Suku : Staphylococcaceae
- Marga : Staphylococcus
- Spesies : *Staphylococcus epidermidis* (Syahrurachman, 1994)

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri yang sering ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia. *Staphylococcus epidermidis* merupakan salah satu bakteri gram positif berbentuk bulat, biasanya tersusun dalam rangkaian tidak beraturan, seperti anggur dan bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini merupakan penyebab infeksi kulit ringan yang disertai abses (Syahrurachman, 1994). Bakteri ini juga berperan dalam pelepasan asam oleat, hasil hidrolisisnya oleh lipase yang diduga berpengaruh terhadap perkembangan jerawat (Saising *et al.*, 2008).

D. *Simplisia*

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia pelikan atau mineral. Pada umumnya pembuatan simplisia meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan bahan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan (Ritiasa, 2000).

E. *Ekstraksi*

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditentukan. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan menggunakan tekanan (Dirjen POM, 2014).

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Harbone, 1987).

1. Ekstraksi secara Dingin

Proses ekstraksi secara dingin pada prinsipnya tidak memerlukan pemanasan. Hal ini diperuntukkan untuk bahan alam yang mengandung komponen kimia yang tidak tahan pemanasan dan bahan alam yang mempunyai tekstur yang lunak. Yang termasuk ekstraksi secara dingin adalah sebagai berikut.

a. Metode Maserasi

Metode maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya (Dirjen POM, 2014).

Metode ini digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang, seperti benzoin, stiraks, dan lilin. Penggunaan metode ini misalnya pada sampel yang berupa daun, contohnya pada penggunaan pelarut eter atau aseton untuk melarutkan lemak/lipid (Dirjen POM, 2014).

b. Metode Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip ekstraksi dengan perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplisia yang dilalui sampel dalam keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan tekanan penyari dari cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan gerakan ke bawah (Dirjen POM, 2014).

Kelebihan dari metode perkolasi adalah (Sulaiman, 2011):

- 1) Tidak terjadi kejenuhan.
- 2) Pengaliran meningkatkan difusi (dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel).

Kekurangan dari metode perkolasi adalah (Sulaiman, 2011)

- 1) Cairan penyari lebih banyak.

- 2) Resiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka.

2. Ekstraksi secara Panas

Ekstraksi secara panas dilakukan untuk mengekstraksi komponen kimia yang tahan terhadap pemanasan, seperti glikosida, saponin, dan minyak-minyak menguap yang mempunyai titik didih yang tinggi, selain itu pemanasan juga diperuntukkan untuk membuka pori-pori sel simplisia sehingga pelarut organik mudah masuk ke dalam sel untuk melarutkan komponen kimia. Metode ekstraksi yang termasuk cara panas yaitu (Tobo, 2011):

a. Metode Sokhletasi

Sokhletasi merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam klongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Proses ini berlangsung hingga penyarian zat aktif sempurna yang ditandai dengan beningnya cairan penyari yang melalui pipa sifon atau jika diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis tidak memberikan noda lagi. (Dirjen POM, 2014).

Metode sokhletasi memiliki kelebihan dan kekurangan pada proses ekstraksi. Adapun kelebihanannya, yaitu (Harbone, 1987):

- 1) Dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung.
- 2) Digunakan pelarut yang lebih sedikit.
- 3) Pemanasannya dapat diatur.

Kekurangannya yaitu (Harbone, 1987):

- 1) Karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah disebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas.
- 2) Jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya.
- 3) Bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi.

b. Metode Refluks

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, demikian seterusnya. Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam (Tobo, 2011).

3. Ekstraksi secara Penyulingan

Penyulingan dapat dipertimbangkan untuk menyari serbuk simplisia yang mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih yang tinggi pada tekanan udara normal, yang pada pemanasan biasanya terjadi kerusakan zat aktifnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka penyari dilakukan dengan penyulingan (Harbone, 1987).

F. Bakteri

Pada buku manual Bergey edisi kedua yang berisi referensi untuk standar taksonomi bakteri, organisme prokariotik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu *Eubacteri* yang merupakan bakteri sejati dan *Archae*. *Archae* secara morfologi serupa dengan *Eubacteri*, namun memiliki perbedaan dalam hal ciri-ciri fisiologis. Kelompok bakteri terdiri atas semua organisme prokariotik patogen dan nonpatogen yang terdapat di daratan dan perairan, serta organisme prokariotik yang bersifat fotoautotrof. Kelompok *Archae* meliputi organisme prokariotik yang tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya, dan umumnya hidup pada lingkungan yang bersifat ekstrim (Pratiwi, 2008).

Spesies bakteri dapat dibedakan berdasarkan morfologi (bentuk), komposisi kimia (umumnya dideteksi dengan reaksi biokimia), kebutuhan nutrisi, aktivitas biokimia, dan sumber energi (sinar matahari atau bahan kimia) (Pratiwi, 2008).

G. Metode Uji Antimikroba

1. Metode Difusi

a. Metode *Disc Diffusion*

Metode *disc diffusion* (tes Kirby dan Bauer) untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar (Pratiwi, 2008).

b. *E-Test*

Metode *E-test* digunakan untuk mengestimasi MIC (*minimum inhibitory concentration*) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal

suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Pratiwi, 2008).

c. *Ditch-Plate Technique*

Pada uji ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba (Pratiwi, 2008).

d. *Cup-Plate Technique*

Metode ini serupa dengan metode *disc diffusion*, dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 2008).

e. *Gradient-Plate Technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media agar dicairkan dengan larutan uji ditambahkan. Campuran kemudian dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya di atasnya (Pratiwi, 2008).

2. Metode Dilusi

a. Metode Dilusi Cair

Metode dilusi cair/*broth dilution test (serial dilution)* mengukur MIC (*minimum inhibitory concentration* atau kadar bunuh minimum, KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun

agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi diteapkan sebagai KBM (Pratiwi, 2008).

b. Metode Dilusi Padat

Metode dilusi padat/*solid dilution test* serupa dengan metode dilusi cair, namun menggunakan media padat (*solid*). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008).

H. Uraian Gel

Jerawat merupakan penyakit kulit yang terjadi akibat peradangan menahun kelenjar polisebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, nodus dan kista pada tempat predileksi. Menurut Wasitaatmadja, (1997) salah satu pengobatan jerawat adalah dengan pengobatan topikal.

Bentuk sediaan gel lebih baik digunakan pada pengobatan jerawat daripada bentuk sediaan krim karena sediaan gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan keparahan jerawat (Sasanti *et al.*, 2012).

Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling menganyam dari fase yang mengurung dan saling memegang medium pendispersi. Perubahan temperatur dapat menyebabkan gel mendapatkan kembali bentuk sol atau bentuk cairnya. Juga beberapa gel menjadi encer setelah pengocakan dan segera menjadi setengah padat atau padat kembali setelah dibiarkan tidak terganggu untuk beberapa waktu, peristiwa ini dikenal sebagai tiksotropi (Ansel, 1989).

Gel, kadang-kadang disebut Jeli, merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Kemenkes, 2014).

Gel merupakan suatu sistem semi padat dimana fase cair dibatasi oleh jaringan tiga dimensi, antara matriks yang saling terkait dan bersilangan (Niazi, 2004).

Sifat dan Karakteristik gel antara lain (Lachman, 2007):

- a. Zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain.
- b. Pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan tube, atau selama penggunaan topikal.
- c. Karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan.
- d. Penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau BM besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan atau digunakan.
- e. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Contoh polimer seperti MC, HPMC dapat terlarut hanya pada air yang dingin yang akan membentuk larutan yang kental dan pada peningkatan suhu larutan tersebut akan membentuk gel.

Idealnya pemilihan *gelling agent* dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan *gelling agent* dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topikal. Beberapa gel terutama polisakarida alami

peka terhadap derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial (Lachman, 2007).

Idealnya pemilihan *gelling agent* dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan *gelling agent* dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topikal. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka terhadap derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial (Lachman, 2007).

1. Komposisi Gel

a. Basis gel

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan basis gel hidrofilik (Ansel, 2008).

1) Basis gel hidrofobik

Basis gel hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus. Menurut Allen (2002) Basis gel hidrofobik antara lain petrolatum, *mineral oil*/gel polyethilen, plastibase, alumunium stearat, dan carbowax (Hardiyanti, 2010)

2) Basis gel hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik

pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 2008). Basis gel hidrofilik antara lain bentonit, tragakan, derivat selulosa, karbomer, polivinil alkohol, alginat (Voight, 1995).

Karbomer adalah polimer *carboxyvinyl* yang memiliki berat molekul yang besar. Secara relative karbomer dapat membentuk gel dengan konsentrasi yang rendah. Karbomer digunakan sebagian dalam formulasi sediaan cair atau semisolid sebagai pensuspensi atau peningkat viskositas. Karbomer biasanya digunakan dalam cream, gel, salep untuk preparat mata, rektal, dan sediaan topikal (Rowe, 2009).

Bentonit adalah alumunium silikat hidrat yang digunakan terutama pada formulasi suspensi, gel, dan untuk sediaan topical. Bentonit juga digunakan sebagai serbuk suspensi dalam sediaan cair dan sebagai pengemulsi minyak dalam air (O/W). (Rowe, 2009).

Derivat selulosa digunakan sebagai *gelling agent* baik yang sintetik maupun semisintetik. Kelarutan derivat selulosa dalam air berbeda-beda. Contoh dari derivat selulosa adalah metilselulosa, natrium karboksimetilselulosa, hidroksiopropil metilselulosa (*hypromellose*), hidroksietilselulosa, dan mikro-kristalin selulosa (Lund, 1994).

Hidroksiopropil metilselulosa (HPMC) merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai basis gel. HPMC merupakan serbuk putih atau putih kekuningan, tidak berbau, dan tidak berasa, larut dalam air dingin, membentuk cairan yang kental, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol (95%), dan eter. HPMC mempunyai pH 5,5-8,0 biasanya digunakan sebagai emulgator,

suspending agent, dan stabilizing agent dalam sediaan salep dan gel topikal (Rowe, 2009).

HPMC digunakan sebagai pembentuk gel pada produk farmasi dengan konsentrasi 2-10% (Ofner, 2007).

Hasil penelitian Madan dan Singh (2010) menyebutkan bahwa basis HPMC memiliki kemampuan daya sebar yang lebih baik dari karbopol, metilselulosa dan sodium alginat, sehingga mudah diaplikasikan ke kulit. gel yang baik mempunyai waktu penyebaran yang singkat.

Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voigt, 1995).

Keuntungan gel hidrofilik antara lain: daya sebar pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya *respiratio sensibilis* oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1995).

b. Humektan (Penahan lembab)

Humektan digunakan untuk mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid. Pemilihan humektan tidak didasarkan hanya pada pengaruhnya terhadap disposisi air tetapi juga memberikan efek terhadap viskositas dan konsistensi dari produk akhir. Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilen glikol dan propilen glikol dalam konsentrasi 10-20% (Voight, 1995).

Gliserin digunakan dalam sediaan oral, ophthalmic, topical, dan parenteral. Juga digunakan dalam kosmetik dan tambahan makanan. Pada sediaan farmasi biasanya digunakan sebagai humektan dan pelembut. Konsentrasi yang digunakan sampai 30% (Rowe, 2009).

c. Pengawet (*Preservatives*)

Disebabkan oleh tingginya kandungan air pada gel, sediaan ini dapat mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan bahan pengawet (Voigt, 1995).

Pengawet seharusnya tidak toksik dan tidak memberikan reaksi alergi, dan memiliki kemampuan sebagai bakterisid daripada bakteriostatik. Berikut adalah pengawet yang secara luas digunakan pada krim, gel, dan salep yaitu kloroform: asam organik, contohnya, asam benzoate, dan asam sorbat: senyawa ammonium kuartener, contohnya cetrimide, dan ester hidroksibenzoat seperti metal paraben, etil paraben, propil paraben dan butyl paraben (Lund, 1994).

Metil paraben digunakan sebagai pengawet pada kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetik. Memiliki pemerian, serbuk putih, berbau, higroskopik, dan mudah larut dalam air. Dapat digunakan sendiri, kombinasi dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Konsentrasi sebagai pengawet 0,02-0,3% (Rowe, 2009).

Metil paraben, rumus molekulnya adalah $C_8H_{10}O_3$, berat molekulnya 76,09. Pemerian serbuk hablur, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton p, mudah larut dalam eter p dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol p panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih. Range metil paraben sebagai

pengawet antiseptik dan sediaan farmasi lainnya adalah 0,02-0,3%. Metil paraben disimpan dalam wadah, larut berair pada pH 3, dapat disterilkan pada suhu 120°C selama 20 menit mengubah posisinya (Rowe, 2009).

I. Tinjauan Agama Tentang Islam dan Kesehatan

Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohania belaka tanpa mengindahkan aspek jasmania. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam. Sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan ukhrawi.

Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan mengenai potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Thaahaa / 20: 53.

الَّذِي
فَأَخْرَجْنَا بِهٖٓ أَرْوَاجًا مِّن تُّبَاتٍ شَتَّىٰ
الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَك لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
Terjemahnya

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjdikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Departemen Agama RI, 2005: 316).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, bahwa Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis

tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam yang dimana merupakan bagian dari hidayahnya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan untuk tumbuh-tumbuhan dapat dipahami dalam arti jenis-jenis tumbuhan, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nanas, palem, dan lain-lain (Quraish Shihab, 2006: 317-318).

Dalam buku Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, menjelaskan bahwa “Dan yang menurunkan air dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan” Maksudnya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan, ada yang asam, manis, pahit, dan yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan (Tim Ahli Tafsir, 2011: 733).

Dari ayat di atas ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt memberi hidayah kepada manusia dengan menurunkan air dari langit berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup yang dijadikan sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan obat-obatan dan lain-lain. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup, sedangkan tumbuhan merupakan makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain.

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dari variatif yang telah diciptakan Allah swt dengan hikmah dan takdirnya. Semua

yang diciptakan Allah swt memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satu contohnya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Allah swt menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia karena banyak jenis tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman termasuk tanaman majapahit ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan Islam.

Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan obat merupakan tumbuhan yang diletakkan atas tumbuhan lainnya oleh Allah, karena tumbuhan tersebut memiliki khasiat khusus yang dapat dimanfaatkan, namun untuk mengetahui khasiat atau kegunaannya perlu dilakukan penelitian tentang tanaman tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 4 yang berbunyi:

الأَرْضِ قِطْعَ مُتَجَوِّرَاتٍ وَجَبَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَّرَعٍ وَنَخِيلٍ صَيَوَانٍ
وغيرُ صَيَوَانٍ يُسَقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (Kementerian Agama RI, 2009).

Dari Mujahid bahwa yang dimaksud dengan *Jannaat* ialah kebun-kebun dan apa yang ada di dalamnya, kebun-kebun yang banyak buah-buahan di dalamnya, di dalamnya terdapat kebun-kebun berupa pohon anggur, *wazar'un* berarti dari

setiap jenis dari berbagai jenis benih atau biji-bijian atau tanaman-tanaman dari berbagai jenis berupa benih yang bermacam-macam yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. *Sinwaanun* yang berarti menjadikan beberapa cabang, Dari Khushaif bahwa yang dimaksud dengan *shinwaan* ialah cabang yang merupakan bagian dari pohon yang pada dasarnya berkumpul menjadi satu kemudian menjadi banyak (Al Maragi, 1365 H. Arabiah Assuudiyah, 1419 H. Wahbah al-Zuhaili, 1418 H.)

Dalam ilmu pengetahuan modern disebutkan bahwa Al-Qur'an memiliki beberapa tumbuhan yang dapat mencegah sampai menyembuhkan penyakit. Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keragaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaanNya yang menakjubkan. Rasulullah saw. bersabda, dalam hadits Abu Hurairah RA :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» (رواه البخاري)

Artinya :

Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al-Zubairiy menceritakan kepada kami, 'Umar bin Sa'id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula" (H.R. Al-Bukhari: 5678).

Ungkapan “setiap penyakit pasti ada obatnya”, artinya bisa bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya.

Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditampakkan Allah untuk menggapainya. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah swt. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati. Karena setiap ciptaan Allah swt. Itu pasti ada penawarnya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Tumbuhan cempedak merupakan ciptaan Allah swt berupa tumbuhan yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, namun untuk mengetahui atau membuktikan manfaat dari cempedak maka perlu untuk diteliti lebih lanjut, hal ini bertujuan untuk menambah data ilmiah tentang tumbuhan tersebut, selain itu dari beberapa hasil penelitian telah membuktikan manfaat dari tumbuhan ini sebagai obat demam, hal ini dapat menambah keyakinan kita kepada Allah swt, tidaklah Allah swt menurunkan penyakit jika Allah tidak menurunkan obatnya.

أَمَّنَ السَّمَوَاتِ الْأَرْضَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَعْلَىٰ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

Terjemahnya:

Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang ber pemandangan indah ?. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain) ?. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran) (Kementerian Agama RI, 2009).

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi maksudnya Tuhan kalianlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit yaitu berupa air hujan lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah ,pemandangan yang baik bagi siapa saja yang melihatnya yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-

pohonnya karena kamu tidak ada kemampuan untuk hal itu ,*apakah disamping Allah ada tuhan yang lain?*, Sebuah pertanyaan pengingkaran, apakah ada Tuhan selain Allah ?, *bahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir Makkah yang menyimpang* mereka menyekutukan Allah (Al-Bagawi, 1471 H.).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium, pendekatan kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan penelitian ekstrak daun cempedak (*Arthocarpus champeden*). Penelitian dilanjutkan pada Laboratorium Farmasetika Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk melakukan pembuatan gel dari ekstrak etanol daun cempedak. Kemudian penelitian dilanjutkan pada Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk melakukan uji aktivitas antibakteri.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium, yang dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun cempedak (*Arthocarpus champedan*) terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* dan pembuatan gel.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah daun cempedak di kecamatan Masamba, Sulawesi selatan.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah daun cempedak (*Arthocarpus champeden*).

C. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu autoklaf (*Hirayama*[®]), cawan petri (*Iwake Pyrex*[®]), cawan porselin, corong, ose bulat dan lurus, gelas ukur (*Iwake Pyrex*[®]), tabung reaksi (*Iwake Pyrex*[®]), erlenmeyer (*Iwake Pyrex*[®]), oven (*Memmert*[®]), batang pengaduk, toples maserasi, pembakar spiritus, *laminar air flow* (*Esco*[®]), pipet tetes, pinset, penangas air, spoit (*One Med*[®]), timbangan analitik (*AND*[®]), pengayak, vial, inkubator, dan rotavapor.

2. Bahan

Adapun bahan digunakan dalam penelitian ini, yaitu serbuk simplisia daun cempedak (*Arthocarpus champedan*), air suling, aluminium foil, etanol 96%, DMSO (dimetil sulfoksida) 100%, medium NA (*Nutrient Agar*), NB (*Nutrient Broth*), paper disk, kain, mikroba uji (*Acne vulgaris*), Gliserin, HPMC, Metil Paraben, Propilen glikol.

D. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Sampel daun cempedak diperoleh dari Masamba, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pukul sembilan pagi, daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak dan berjamur.

2. Pembuatan Serbuk Simplisia

Daun yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan tanpa terkena sinar matahari dengan cara diangin-anginkan dalam rumah. Kemudian disortasi kering sampel daun cempedak yang sudah kering. Selanjutnya sampel dijadikan serbuk.

3. Ekstraksi Sampel

Ditimbang 500 gram serbuk simplisia. Simplisia daun cempedak dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan etanol 96% hingga simplisia terendam secara merata. Wadah maserasi ditutup dan disimpan 2 x 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya, disaring dan dipisahkan antara filtrat dan residunya.

Ampas diekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening (3 kali). Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipekatkan dengan etanol 96% dalam rotavapor 40°C. Ekstrak sampel selanjutnya dibebasetanolkan.

4. Pembuatan Sediaan Gel

a. Rancangan formula gel

Tabel 1. Rancangan formula gel ekstrak etanol daun cempedak (*Arthocarpus champeden*)

Bahan	Kegunaan	Formulasi/Konsentrasi (% b/b)			
		I	II	III	IV
Ekstrak daun cempeda	Bahan Aktif	-	1	5	10
HPMC	Gelling Agent	8	8	8	8
Propilen glikol	Penstabil, Peningkat penetrasi	15	15	15	15
Gliserin	Humektan	15	15	15	15
Metil Paraben	Pengawet	0,2	0,2	0,2	0,2
Air Suling	Pembawa	Ad 20	Ad 20	Ad 20	Ad 20

b. Pembuatan formula

Formula dibuat masing-masing sebanyak 20 gram. Diawali dengan terlebih dahulu HPMC didispersikan dalam aquades yang sudah dipanaskan hingga suhu 80-90°C, lalu digerus hingga terbentuk dispersi yang homogen di dalam lumpang. Metil paraben dilarutkan dalam propilenglikol, kemudian

ditambahkan ekstrak etanol daun cempedak (Campuran 1). Campuran 1 ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam HPMC yang telah dikembangkan disertai dengan pengadukan hingga homogen. Lalu ditambahkan gliserin. Sisa air ditambahkan sambil terus diaduk. Gel dihomogenkan, kemudian diisikan ke dalam pot-pot plastik.

5. Pembuatan Medium

a. Medium *Nutrient Agar* (NA) (Djide, 2007)

Ekstrak daging	3 gram
Agar	15 gram
Pepton	5 gram
Glukosa	10 gram
Air suling	1000 ml

Adapun cara pembuatannya, yaitu semua bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer, lalu dipanaskan sampai larut. Dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Medium *Nutrient Broth* (NB) (Djide, 2007)

Pepton	3 gram
Ekstrak daging	5 gram
Air suling	1000 ml

Adapun cara pembuatannya, yaitu semua bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer dilarutkan dengan air suling 800 ml, kemudian dipanaskan sampai larut, lalu dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml. Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

6. Peremajaan Biakan Murni Bakteri Uji

Bakteri uji yang berasal dari biakan murni, diambil 1 ose kemudian diinokulasikan pada medium *Nutrient Agar* (NA), selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

7. Pembuatan Suspensi Bakteri

Kultur bakteri yang berumur 1 x 24 jam yang telah diremajakan dalam medium NA miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur pada spektrofotometer UV-Vis dengan keseragaman bakteri 25 transmittan.

8. Pengujian Antibakteri

a. Pengujian KHM (Konsentrasi Hambat Minimum)

Pengujian KHM dilakukan dengan membuat 5 seri pengenceran terhadap gel ekstrak etanol daun cempedak (*Arthocarpus campedan*) 1%; 5%; 10% dan kemudian dilarutkan dengan 0,2 ml DMSO, kemudian ditambahkan medium NB hingga 10 ml. Volume dari masing-masing tabung pengenceran diambil dan dicukupkan dengan medium NB, kemudian ditambahkan 1 ose bakteri, lalu diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C. Diamati kekeruhannya.

b. Pengujian KBM (Konsentrasi Bunuh Minimum)

Hasil inkubasi pada uji KHM masing-masing digoreskan pada medium NA sebanyak 10 ml di dalam cawan petri yang telah memadat dan diinkubasi kembali selama 1x24 jam pada suhu 37°C. Nilai KBM ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan mikroba pada konsentrasi sampel.

c. Uji Daya Hambat

Uji aktivitas antibakteri gel ekstrak etanol daun campeda dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan konsentrasi 1%; 5%; 10% dan kemudian diambil 10 ml NA dituang ke dalam cawan petri hingga memadat. Di buat sumur

pada media agar kemudian pada sumur diberi bakteri uji. Diinkubasi 1x24 jam pada suhu 37°C, lalu diukur diameter hambatnya.

Setiap bakteri diberi perlakuan yang sama:

Kelompok I : Diberikan Gel Isopropyl Methyl Phenol (+)

Kelompok II : Diberikan Gel tanpa Ekstrak etanol sebagai kontrol (-)

Kelompok III : Diberikan Gel Ekstrak Etanol 1%

Kelompok IV : Diberikan Gel Ekstrak Etanol 5 %

Kelompok V : Diberikan Gel Ekstrak Etanol 10%

9. Pengujian Sediaan Gel

a. Pengujian Organoleptik

Pengamatan dilihat secara langsung bentuk, warna, dan bau dari gel yang dibuat. Gel biasanya jernih dengan konsistensi setengah padat.

b. Pengujian pH

Penentuan Ph sediaan dilakukan dengan menggunakan alat pH meter yang sebelumnya dikalibrasi menggunakan pendapar lalu di celupkan pada sediaan gel. Setelah tercelup lihat perubahan angka pada alat pH meter. Sediaan gel harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-6,5.

c. Pengujian Daya Sebar

Sebanyak 0,5 gram sampel gel diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakkan diatasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar gel diukur. Setelahnya ditambahkan 150 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5-7 cm menunjukkan konsistensi semisolid yang sangat nyaman dalam penggunaan.

d. Pengujian Homogenitas

Pengujian homogenitas dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, caranya gel dioleskan di mana saja diambil 3 bagian yaitu atas, tengah dan bawah. sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.

e. Pengujian Viskositas

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui mudah tidaknya obat diolesi pada kulit, semakin rendah nilai viskositas maka semakin mudah obat dioleskan pada permukaan kulit. Nilai viskositas yang baik untuk sediaan gel yaitu 2.000-6.000 cP.

E. Analisis Data

Pengamatan aktivitas antibakteri pada ekstrak etanol daun cempedak (*Arthocarpus champedan*) pada beberapa konsentrasi, serta pada Isopropyl Methyl Phenol dengan melakukan pengukuran terhadap daya hambatnya, setelah diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Daun Cempedak

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 500 gram sampel daun cempedak yang di maserasi menggunakan pelarut etanol 96% . data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Ekstraksi daun cempedak

Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	Volume Pelarut Etanol 96%	Lama Perendaman
Daun cempedak	500 gram	4, 8 gram	4 L	2x 24 jam

2. Hasil Pengujian Bakteri

Pengujian ekstrak etanol daun cempedak terhadap bakteri uji *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidi* hasil uji ekstrak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Daya Hambat

a. Ekstrak

No.	Sampel	Bakteri Uji	Zona Hambat (mm)
1.	Ekstrak Etanol daun cempedak	<i>Propionibacterium acnes</i>	16
2.	Ekstrak Etanol daun cempedak	<i>Staphylococcus aureus</i>	Tidak menunjukkan aktivitas
3.	Ekstrak Etanol daun cempedak	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Tidak menunjukkan aktivitas

Pengujian lanjutan yaitu uji gel ekstrak etanol daun cempedak menggunakan bakteri *Propionibacterium acnes* dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Formulasi Sediaan Gel

Propionibacterium acnes

No	Formulasi Gel	Zona Hambat (mm)			
		1	2	3	Rata-rata
1	F. I (Kontrol Positif (+))	15	10	11	12
2	F. II (Kontrol Negatif (-))	Tidak spesifik	Tidak spesifik	Tidak spesifik	Tidak spesifik
3	F. III	35	32	33	33,3
4	F. IV	33	31	33	32,3
5	F. V	35	35	37	35,6

c. Evaluasi Sediaan

Tabel 6. Pengujian Organoleptik

No.	Formulasi	Bau	Warna	Bentuk
1.	F. III	Khas ekstrak	Coklat bening	Setengah padat kental
2.	F. IV	Khas ekstrak	Coklat Bening	Setengah padat kental
3	F. V	Khas ekstrak	Coklat bening	Setengah padat kental

Tabel 7. Pengujian Ph

No	Formulasi Sediaan	pH
1.	F. III	4,7
2.	F. IV	5,5
3.	F. V	5,8

Tabel 8. Pengujian Daya sebar

No	Formulasi Sediaan	Sebelum + Beban (cm)	Sesudah + Beban (cm)
1.	F. III	3,6	4,5
2.	F. IV	3,2	3,9
3.	F. V	3,5	3,9

Tabel 9. Pengujian homogenitas

No	Formulasi sediaan	Homogenitas
1.	F. III	Homogen, tidak ada butiran kasar
2.	F. IV	Homogen, tidak ada butiran kasar
3.	F. V	Homogen, tidak ada butiran kasar

Tabel 10. Pengujian Viskositas

No.	Formulasi sediaan	Viskositas (cP)
1.	F. III	3.752
2.	F. IV	4.904
3.	F. V	5.232

B. Pembahasan

Jerawat merupakan penyakit kulit yang dikenal dengan *acne vulgaris*, hampir semua orang pernah mengalaminya. Jerawat sering dianggap sebagai kelainan kulit yang timbul secara fisiologis. Hal ini umumnya terjadi pada umur sekitar 14-17 tahun pada wanita, 16-19 tahun pada pria dan akan menghilang dengan sendirinya pada usia sekitar 20-30 tahun. Namun, kadang-kadang terutama pada wanita, jerawat menetap sampai dekade umur 30 tahun lebih.

Bakteri yang umum meninfeksi jerawat adalah *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, dan *Propionibacterium acnes*. Pengobatan jerawat di klinik kulit biasanya menggunakan antibiotik yang dapat menghambat infamasi dan membunuh bakteri, contohnya tetrasiklin, eritromisin, doksisisiklin, dan klindamisin. Selain itu, sering juga digunakan benzoal peroksida, asam azelat, dan retinoid, namun obat-obat ini memiliki efek samping dalam penggunaannya sebagai anti jerawat antara lain iritasi, sementara penggunaan antibiotik jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi juga dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensitivitas.

Pengobatan jerawat bisa diberikan dengan antibiotik seperti tetrasiklin, eritromisin, doksisisiklin dan klindamisin. Selain dari itu pengobatan jerawat juga digunakan benzoil peroksida, asam azelat dan retinoid, namun obat ini memiliki efek samping dalam penggunaannya sebagai antijerawat antara lain iritasi, sementara penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi.

Bentuk sediaan gel lebih sering digunakan pada pengobatan jerawat dari pada bentuk sediaan krim karena sediaan gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan keparahan jerawat. Gel dipilih karena tidak mengandung minyak sehingga tidak akan memperburuk jerawat, bening, mudah mengering membentuk lapisan film yang mudah dicuci, juga bentuk sediaan gel cocok untuk terapi topikal pada jerawat terutama penderita dengan tipe kulit berminyak.

Cempedak adalah salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis. Cempedak cukup terkenal di Indonesia dan daerah pedesaan. Tanaman ini berasal dari India bagian selatan yang kemudian menyebar ke daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Daun cempedak yang mengandung berbagai metabolit sekunder seperti; triterpenoid, steroid, senyawa fenol, flavonoid dan tannin.. Tumbuhan cempedak merupakan satu jenis yang dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Daun cempedak sering dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan di Indonesia sebagai bedak dingin dan penghilang flek hitam pada wajah. Ekstrak kasar dan fraksi etil asetat daun cempedak memiliki aktivitas antioksidan dan mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun cempedak mengandung senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antibakteri. Senyawa flavonoid mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Dimana pada proses maserasi sampel dilakukan dengan menggunakan etanol 96% karena merupakan penyari yang paling optimal dengan parameter kadar fenolik dan flavonoid. Maka perlu dilakukan penelitian untuk membuat formulasi gel antijerawat ekstrak etanol daun cempedak dan melakukan uji antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri.

Pengambilan daun cempedak dilakukan pada pagi hari sebab pada saat itu terjadi proses fotosintesis yang maksimum, yaitu pembentukan metabolit sekunder tanaman secara maksimal. Sebelum sampel dikelola menjadi ekstrak mula-mula sampel disortasi basah, dimana pada proses ini sampel dipisahkan dari kotoran-kotoran pada sampel. Kemudian sampel dibersihkan menggunakan air bersih yang mengalir tujuannya agar menghilangkan kotoran yang melekat pada sampel. Pencucian dilakukan dalam waktu yang singkat sebab dikhawatirkan kandungan kimia yang ada pada sampel akan ikut larut dalam air jika proses pencuciannya memakan waktu yang lama. Setelah sampel dibersihkan dengan air mengalir kemudian sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dengan tidak terkena sinar matahari langsung karena dikhawatirkan senyawa yang terkandung akan rusak jika terkena proses pemanasan. Pencucian ini juga bertujuan agar mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Setelah itu, dilakukan sortasi kering pada sampel. Dimana sampel yang telah berkurang kadar airnya

dipilah-pilah lagi yang mana layak untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah itu sampel daun tadi dibuat menjadi serbuk tujuannya agar memperluas permukaan, sehingga pada proses ekstraksi nanti kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat terekstraksi dengan optimal. Sampel yang telah diserbukkan kemudian diekstraksi. Ekstraksi sampel daun cempedak dilakukan dengan metode maserasi, metode ini sesuai dengan sampel yang bertekstur lunak dan tidak memerlukan pemanasan yang dapat merusak senyawa kimia yang terdapat pada sampel. Sampel dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96%, dimana diketahui etanol 96% merupakan penyari yang paling optimal dengan parameter kadar fenolik dan flavonoid. Pada proses maserasi wadah yang digunakan yaitu wadah kaca yang ditutup rapat untuk mencegah reaksi kimia dan disimpan ditempat yang terlindung dari cahaya matahari agar terhindar dari proses teroksidasi. Selanjutnya hasil maserasi selama 2 X 24 jam dirotavapor, tujuannya untuk mempekatkan sampel agar menghasilkan ekstrak kental yang mempermudah proses pengeringan ekstrak. Setelah mendapatkan ekstrak kental kemudian ekstrak dibebaskan etanol tujuannya agar menghindari adanya aktivitas antibakteri ketika akan dilakukan pengujian pada ekstrak.

Mikroorganisme seperti organisme yang lain memerlukan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan media (medium) untuk kultivasi mikroorganisme. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi untuk menumbuhkan mikroorganisme. Selain untuk menumbuhkan mikroorganisme, media dapat digunakan untuk isolasi, pengujian sifat-sifat

fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroorganisme. Medium dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan konsistensinya yaitu medium cair, semi padat, dan padat. Medium cair (liquid, broth) hanya mengandung nutrisi-nutrisi yang dilarutkan dalam aquades. Contoh medium cair adalah Nutrient Broth (NB), digunakan untuk memperbanyak (propagasi) mikroorganisme, uji fermentasi, dan berbagai uji lain. Medium padat (solid) mengandung nutrisi-nutrisi yang dilarutkan dalam aquades ditambah bahan pematat (solidifying agent) yaitu agar. Kriteria bahan pematat yang baik yaitu tidak digunakan oleh mikroorganisme, tidak menghambat pertumbuhan bakteri, dan tidak mencair pada temperatur kamar. Medium padat sering digunakan untuk isolasi mikroorganisme, uji aktivitas biokimia, perhitungan jumlah mikroorganisme, dan lain-lain. Medium semi padat (semisolid) sama dengan medium padat tetapi konsentrasi bahan pematat lebih sedikit sehingga konsistensinya seperti jeli. Medium semi solid terutama digunakan untuk eksperimen motilitas mikroorganisme ataupun hidrolisis gelatin. Pada penelitian ini menggunakan medium cair (NB) untuk memperbanyak mikroorganisme dan medium padat (NA) untuk uji aktivitas mikroorganisme.

Sebelum dilakukan pengujian ekstrak mula-mula cawan petri, spoit, sendok besi, botol coklat, dan medium Na disterilkan terlebih dahulu. Setelah disterilkan pengerjaan uji antibakteri dilakukan didalam LAF (Laminar Air Flow) ini bertujuan agar bakteri tidak menyebar ke tempat lain dan semua alat dalam keadaan steril. Setelah itu ekstrak etanol daun cempedak di uji daya hambatnya pada medium NA menggunakan bakteri *Propionibacterium acnes*,

Staphylococcus aureus dan *Staphylococcus epidermidis*. Ekstrak etanol daun cempedak pada uji daya hambat diberikan perlakuan yang sama menggunakan bakteri uji. Diambil medium NA sebanyak 10 ml lalu dipindahkan kedalam botol coklat steril, kemudian ditambahkan suspensi bakteri *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis* sebanyak 20 µl pada masing-masing botol coklat yang berisi medium NA. Setelah itu di goyang-goyangkan hingga homogen dan ditungakan kedalam cawan petri. Setelah memadat mediaum dibuat sumuran untuk mengujikan ekstrak. Pada ekstrak etanol daun cempedak menggunakan bakteri *Propionibacterium acnes* memiliki zona bening disekitarnya ± 16 mm, *Staphylococcus aureus* tidak memiliki zona bening di sekitarnya, *Staphylococcus epidermidis* juga tidak memiliki zona bening disekitarnya.

Pada uji KHM (konsentrasi hambat minimum) yang dimana hasil akhirnya akan diamati kekeruhan untuk dipakai sebagai standar kekeruhan suspensi bakteri uji dan juga di akan dilanjutkan ke penguajin KBM. Pada pengujian KBM (konsentrasi bunuh minium) yang dimana hasil akhirnya akan diamati pertumbuhan bakteri ada atau tidaknya. Untuk hasil KBM menunjukan masih ada bakteri yang tumbuh. Hal ini menunjukkan jika ekstrak etanol daun cempedak bersifat bakteriostatik bukan bakteriosida.

Setelah diamati pengujian bakteri pada ekstrak, selanjutnya ekstrak etanol daun cempedak dibuat menjadi sediaan gel agar penggunaanya untuk bakteri *Propionibacterium acnes* lebih mudah digunakan. Bentuk sediaan gel lebih baik digunakan pada pengobatan jerawat dari pada bentuk sediaan krim karena sediaan

gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan keparahan jerawat. Basis yang digunakan dalam formulasi gel yaitu HPMC dimana Hasil penelitian Madan dan Singh (2010) menyebutkan bahwa basis HPMC memiliki kemampuan daya sebar yang lebih baik dari karbopol, metilselulosa dan sodium alginat, sehingga mudah diaplikasikan ke kulit. gel yang baik mempunyai waktu penyebaran yang singkat. Metode yang digunakan untuk menguji daya hambat bakteri yaitu metode *Cup-Plate Technique*, metode ini serupa dengan metode *disc diffusion*, dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan bakteri *Propionibacterium acnes*, kemudian pada sumur tersebut diberi berbagai macam konsentrasi formulasi gel yang akan diuji.

Pada pengujian digunakan zat aktif Isopropyl Methyl Phenol sebagai kontrol positif (F.I) yang dimana bahan yang digunakan ini dari bahan sintetik dan tanpa ekstrak sebagai kontrol negatif (F.II) sebagai pembanding.

Dari hasil pengujian yang menggunakan medium NA yang diberi perlakuan yang sama seperti pengujian daya hambat menggunakan ekstrak etanol daun cempedak dan juga cara yang sama yaitu dibuat sumuran pada medium di dapat untuk bakteri *Propionibacterium acnes* zona hambat rata-rata untuk F. I sebesar 14,3 mm, F. II daya hambat tidak spesifik, F. III daya hambat rata-rata sebesar 33,3 mm, kemudian F. IV rata-rata sebesar 32,3 mm dan F. V rata-rata sebesar 33,5 mm. Disini pengujian gel hanya dilanjutkan dengan bakteri *Propiopinibacterium acnes* sebab *Propiopinibacterium acnes* yang hanya memiliki zona hambat pada pengujian ekstrak. Pada African Journal of Biotechnologi

menjelaskan bahwa tidak menunjukkan zona hambat 4 tidak menunjukkan aktivitas, 5-10 mm dikatakan sedang, 10-16 mm masuk kategori sedang, dan kuat diatas 17 mm.

Pada pengujian evaluasi organoleptik dimana masing-masing pengujian meliputi bau, warna, dan bentuk. Pada evaluasi ini F.III, F.IV dan F.V tidak jauh berbeda. Untuk uji pH menggunakan pH meter, mula-mula alat pH meter dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer pH 4 agar pH-nya seimbang kemudian mencelupkan elektroda pH meter kedalam setiap sediaan gel. Setelah elektroda tercelup, kemudian dидiamkan hingga layar pH meter menunjukkan angka yang stabil. dimana pada F.III memiliki pH 4,7, pada F.IV memiliki pH 5,5 dan pada F.V memiliki pH 5,8 ini menunjukkan bahwa gel ekstrak etanol daun cempedak mempunyai pH sesuai dengan persyaratan pH untuk sediaan topikal kulit yaitu 4,5-6,5 sehingga dapat digunakan untuk kulit. Pada pengujian daya sebar sebanyak 0,5 gram sampel gel diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakkan diatasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar gel diukur. Setelahnya ditambahkan 150 gram beban tambahan dan dидiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5-7 cm menunjukkan konsistensi semisolid yang sangat nyaman dalam penggunaan. sampel formulasi sediaan gel ekstrak etanol daun cempedak dengan berbagai konsentrasi ekstrak (F.III,F.IV,F.V) memenuhi parameter yaitu 5-7 cm. Untuk uji homogenitas dilakukan tujuannya agar melihat apakah sediaan yang telah dibuat homogen atau tidak. Caranya gel dioleskan pada kaca transparan dimana sediaan diambil 3 bagian yaitu atas, tengah dan bawah semua formulasi gel F.III, F.IV,

dan F.V memenuhi standar parameter yaitu ditunjukkan dengan tidak adanya butiran kasar. Begitu pula pada uji evaluasi viskositas adalah suatu tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, makin tinggi viskositasnya, akan makin besar tahanannya. Nilai viskositas dipengaruhi oleh zat pengental, sifat mudah menyebar sediaan gel memiliki komponen yang banyak mengandung gugus OH seperti HPMC dan propilen glikol. Peningkatan kemampuan menyebar seiring dengan penurunan viskositas sediaan gel. Semakin besar nilai viskositas maka tahanan yang dibutuhkan oleh suatu sediaan untuk menyebar semakin besar. Bila tekanan yang diberikan sama pada setiap pengukuran formula gel maka semakin kental sediaannya akan menyebabkan kemampuan menyebarnya semakin kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsentrasi HPMC dapat menurunkan daya sebar gel. Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui mudah tidaknya obat diolesi pada kulit, semakin rendah nilai viskositas maka semakin mudah obat dioleskan pada permukaan kulit. Nilai viskositas yang baik untuk sediaan gel yaitu 2.000-6.000 cP. Pengukuran viskositas sediaan gel menggunakan alat viskometer Brookfield dengan menggunakan spindel 5, dimana menunjukkan F.III memiliki nilai cP 3.752, F.IV memiliki nilai cP 4.904, F.V memiliki nilai cP 5.232 yang berarti menyatakan bahwa bahwa semua formulasi sediaan memenuhi standar parameter uji.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol daun cempedak (*Arthocarpus champeden*) dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat yaitu pada bakteri *Propionibacterium acnes*.
2. Gel ekstrak etanol daun cempedak dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acnes*.
3. Konsentrasi gel ekstrak etanol daun cempedak yang paling memberikan efek menghambat bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acnes* yaitu F.V, dengan zona hambat untuk *Propionibacterium acnes* sebesar 35,6 mm.

B. Saran

1. Sebaiknya pada penelitian ini pada saat uji aktivitas daya hambat untuk pengujian ekstrak lebih hati-hati karena ekstrak pada suhu 37° mudah melebur.
2. Pada saat melakukan penelitian untuk membuat metode sumur sebaiknya menggunakan alat pencadangan agar pengujian lebih mudah

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim.

Allen, L.V., Popovich, N. G & Ansel, H. C. 2002, *Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms And Drug Delivery Systems*, 282, Philadelphia, Lippincott William & Wilkins

Anonim. 2013. *Nuclear Precise News Letter edisi 81*. Jakarta: PT Nucleus Precise.

Ansel, C. Howard. 2008. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Jakarta: UI Press

Ansel, C. Howard. 1989. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Jakarta: UI Press

Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. *Fiqh Pengobatan Islami*. Solo: Darul Wathon lin Nasyr.

Ariance Juli Ross Nauw, dkk. 2016. *Pemanfaatan Tumbuhan Cempedak (Artocarpus champede) Oleh Masyarakat Kampung Sabun Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, Papua Barat*. Papua Barat: Fakultas Kehutanan Universitas Papua

Atun, Sri. 2010. *Pemanfaatan Bahan Alam Bumi Indonesia Menuju Riset Yang Berkualitas Internasional*. Jogjakarta; FMIPA Uiniversitas Negeri Yogyakarta.

Brook, G.F., Butel, J.S., dan Morse, S.A. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika.

Dirjen POM. 2009. *Farmakope Herbal*. Jakarta: Depkes RI

Dirjen POM. 2014. *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Depkes RI

Fauziah Halimatussuda'diah, dkk. 2014. *Aktivitas Antioksidan Kombinasi Daun Cempedak (Artocarpus champden) dan Daun Bandotan (Ageratum conyzoides L.) Kalimantan Timur*: Fakuktas Farmasi Universitas Mulawarman.

Galuh, Putri. 2009. *Formulasi Gel Jerawat Minyak Atsiri Daun Jeruk Nipis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Gembong Tjitrosoepomo. 2013. *Taksonomi Tumbuhan*, UGM. Press

Harborne, J.B. 1984. *Phytochemical Method*. London: Chaman and Hall Ltd.

Harborne, J.B. 1987. *Metode Fitokimia: Cara Modern Menganalisa Tumbuhan Edisi I*. Terjemahan oleh K. Padmawinata dan I. Soediro. Bandung: ITB.

Haley, S., 2009, Methylparaben, In: Rowe, R. C., Sheckey, P. J., & Quinn, M. E (eds.), *Handbook of Pharmaceutical Excipients*, Sixth Edition, 441-442, London Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association.

Haley, S., 2009, Methylparaben, In: Rowe, R. C., Sheckey, P. J., & Quinn, M. E (eds.), *Handbook of Pharmaceutical Excipients*, Sixth Edition, 441-442, London Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association.


Hedrich HJ. 2006. *Taxonomy and stock and strains*. J Lab Rat.

Hendri Wasito Wasito, Hendri. *Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Obat Tradisional*. Jurusan Farmasi FMIPA, Universitas


- Islam Bandung (Unisba). MIMBAR, Vol. XXIV, No. 2 (Juli - Desember 2008).
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia, jilid III*. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya
- Jawetz, M, dan Adelberg's. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Penerjemah: N. Widorini Jakarta: Penerbit Salemba Medika
- Katzung, G. Betram. 2006. *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi II*. Jakarta: EGC.
- Kementerian Agama. 2013. *Kitab Al-Quran Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*.
- Kementerian Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kemenkes RI, 2014.
- Lachman L., Liberman HA & Kaning JL. 2017. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ketiga*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lempang, M. Mangopang, A.D., Palalunan dan Hajar, 2012. *Sifat dasar dan kegunaan kayu sulawesi*. Balai penelitian kehutanan Makassar
- Lund, Walter. 1994. *The Pharmaceutical Codex, 12t Edition*. Lomdon: The Pharmaceutical Press.
- Madan, J., & Singh, R., 2010, *Formulation and Evaluation of Aloe vera Topical Gels, Int.J.Ph.Sci., 2 (2), 551-555*.
- Masood, Ehsan. 2009. *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat Di Bidang Sains Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mody lempang dan Suhartati. 2013. *Potensi Pengembangan Cempedak (Artocarpus champedan) Pada Hutan Tanaman Rakyat ditinjau Dsari Sifat Kayu dan Kegunaannya*, Makassar: Balai Penelitian Makassar
- Ngatidjan. 2006. *Metode Laboratorium dalam Toksikologi. Cetakan -1*. Yogyakarta :Bagian Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Kedokteran UGM.
- Nilsson, Lars. 1998. *A Fibrinogen-Binding Protein of Staphylococcus epidermidis, Infection and Imunity*
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ofner dan Klech-Gelotte. 2007 *Encyclopedia of Pharmaceutical Technology*. USA: Informa Healthcare Inc.
- Olson, James. 2004. *Belajar Mudah Farmakologi*. Jakarta:EGC.
- Phan,Thang T.,et.al. 2004 *Extracts from Leaves of Chromolaena odorata(A.Potential Agent for wound Healing)*, Herbal Traditional Medicine, New York: Marcel Dekker.
- Prawiradiputra, Bambang R. 2006 *Ki Rinyuh (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak.
- Putri, Z.F . 2010. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sirih (Piper bettle L.) terhadap Propionibacterium acne dan Staphylococcus aureus Multiresisten*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah.

- Pratiwi, Silvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga
- Rahman, Hardianti. 2010. *Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Luka Bakar dari Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin. Makassar.
- Ritiasa, K., 2000, *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*, Cetakan Pertama, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Jakarta
- Robinson, T. 1995. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Edisi ke-4 Terjemahan* Kosasih Padmawinata. ITB Press. Bandung.
- Rowe, Raymond C, Paul JS, Marian EQ. 2009. *Handbook of Pharmaceutical Exipients Sixth Edition*. The Pharmaceutical Press. USA.
- Sasanti, T.J., Wibowo, MS., Fidrianny, I. dan Caroline, S. 2012. *Formulasi gel ekstrak air teh hijau dan penentuan aktivitas antibakterinya terhadap propionibacterium acnes*. School of Pharmacy ITB, Gedung LabTek VII, Bandung ([http:// www.doc88.com/p-074807880615.html](http://www.doc88.com/p-074807880615.html), diakses 17 Maret 2012).
- Siregar. 1991. *Atlas Berwarna Sariapati Penyakit Kulit*. Jakarta: EGC
- Syahrurahman. 1994. *Buku Ajar Mikrobiologi Edisi Revisi*. Jakarta: Binarupan Aksara
- Shihab, Quraish. 2010. *Tafsir Al- Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Cetakan III. Jakarta: Lentera hati.
- Singh V dan Nimbkar N. Safflower (*Carthamus tinctorius* L.). In: Singh RJ, editor. *Genetic resources, chromosome engineering, and crop improvement*. Taylor & Francis Group CRC Press. Florida. 2007. Hal. 167-185.
- Sulaiman, T., 2011, *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*, diterjemahkan Padmawinata, K., Edisi IV, ITB, Bandung
- Tobo, F., Mufidah, Taebe, B., Mahmud, A.I. 2011. *Buku Pegangan Laboratorium Fitokimia 1*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Wasitaatmadja, S.M. 2015. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Voight, Rudolf. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Verheij, E.W.M dan R.E. Coronel. 1997. *Sumber Daya Nabati Asia Tenggara: Buah-buahan yang dapat dimakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Lampiran 1. Skema Alur Penelitian




Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan Ekstrak Daun Campedak


Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Sediaan Gel

Lampiran 4. Skema Medium

a. Natrium Agar




b. Nutrien Borth




Lampiran 5. Skema Pengujian Antibakteri

a. Pengujian HKM (konsentrasi Hambat Minimum)




b. Pengujian KBM (konsentrasi bunuh minimum)



c. Uji Daya Hambat



Lampiran 6. Skema Evaluasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Cempedak

Lampiran 7. Perhitungan Pembuatan Gel

a. Perhitungan bahan F.II

➤ HPMC $= \frac{8}{1} \times 20 = 1,6 \text{ gram}$

➤ Propilen glikol $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$

➤ Gliserin $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$

➤ Metil paraben $= \frac{0,2}{1} \times 20 = 0,4 \text{ gram}$

b. Perhitungan bahan F.III

➤ Ekstrak $= \frac{1}{1} \times 20 = 0,1 \text{ gram}$

➤ HPMC $= \frac{8}{1} \times 20 = 1,6 \text{ gram}$

➤ Propilen glikol $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$

➤ Gliserin $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$

➤ Metil paraben $= \frac{0,2}{1} \times 20 = 0,4 \text{ gram}$

c. Perhitungan bahan F.IV

➤ Ekstrak $= \frac{5}{1} \times 20 = 1 \text{ gram}$

➤ HPMC $= \frac{8}{1} \times 20 = 1,6 \text{ gram}$


➤ Propilen glikol $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$

➤ Gliserin $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$

➤ Metil paraben $= \frac{0,2}{1} \times 20 = 0,4 \text{ gram}$



d. Perhitungan bahan F.V





- Ekstrak $= \frac{1}{1} \times 20 = 2 \text{ gram}$
- HPMC $= \frac{8}{1} \times 20 = 1,6 \text{ gram}$
- Propilen glikol $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$
- Gliserin $= \frac{1}{1} \times 20 = 3 \text{ gram}$
- Metil paraben $= \frac{0,2}{1} \times 20 = 0,4 \text{ gram}$




Lampiran 7. Gambar Hasil Penelitian

No	Gambar Penelitian	Keterangan
1.		<p>Formulasi sediaan Gel (F.I, F.II, F.III, F.IV, F. V)</p>
2.		<p>Pembuatan media sumur</p>
3.		<p>Pengujian Ekstrak pada medium NA</p>
4.		<p>Zona hambat ekstrak pada bakteri <i>Propionibacterium acnes</i></p>

5.		<p>Zona hambat ekstrak pada bakteri <i>Staphylococcus aureus</i></p>
6.		<p>Zona hambat ekstrak pada bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i></p>
7.		<p>Zona hambat F.I dan F.II terhadap bakteri <i>Propionibacterium acnes</i></p>
8.		<p>Zona hambat F.III = konsentrasi ekstrak 1% F. IV = konsentrasi ekstrak 5% F. V = konsentrasi ekstrak 10%</p>


9.		<p>Zona hambat terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>. F.I = Kontrol Positif F.II= Kontrol Negatif</p>
10.		<p>Zona hambat F.III = konsentrasi ekstrak 1% F. IV = konsentrasi ekstrak 5% F. V = konsentrasi ekstrak 10%</p>
11.		<p>Zona hambat terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>. F.I = Kontrol Positif F.II= Kontrol Negatif</p>
12.		<p>Zona hambat F.III = konsntrasi ekstrak 1% F. IV = konsentrasi ekstrak 5% F. V = konsentrasi ekstrak 10%</p>

13.		<p>Pengujian KBM pada bakteri <i>Propionibacterium acnes</i> menggunakan F.I dan F.II</p>
14.		<p>Pengujian KBM pada bakteri <i>Propionibacterium acnes</i> menggunakan F.III, F.IV, dan F.V</p>
15.		<p>Pengujian KBM pada bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> menggunakan F.I dan F.II</p>
16.		<p>Pengujian KBM pada bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> menggunakan F.III, F.IV, dan F.V</p>

17.		<p>Pengujian KBM pada bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> menggunakan F.I dan F.II</p>
18.		<p>Pengujian KBM pada bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> menggunakan F.III, F.IV, dan F.V</p>
19.		<p>Pengujian viskositas pada sediaan gel F.III</p>
20.		<p>Pengujian viskositas pada sediaan gel F.IV</p>

21.		Pengujian viskositas pada sediaan gel F.III
22.		Pengujian daya sebar sediaan gel F.III
23.		Pengujian daya sebar sediaan gel F.IV

24.		Pengujian daya sebar sediaan gel F.V
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



BIOGRAFI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Rezky Mauliyanti di lahirkan di Merauke, Papua Selatan pada tanggal 21 Agustus 1995. Kiky panggilan akrabnya adalah anak pertama dari 3 bersaudara pasangan dari bapak M. Yusuf Achmad dan ibu Marwa. Pendidikan TK yang ditempuh di TK Tunas Melati, dan melanjutkan pendidikan dasar yang ditempuh di SDN. Inpres Polder Merauke, Kec.Merauke Kab.Merauke (2001-2007).

Kemudian pendidikan tingkat lanjut ditempuh di SMP Negeri 1 Merauke (2007-2010). Pendidikan tingkat menengah (sederajat) ditempuhnya di SMA Negeri 3 Merauke (2010-2013). Lalu dilanjutkan menempuh program sarjana Farmasi (S.Farm) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013 sampai sekarang).

Setelah lulus dari SMA dia berambisi untuk melanjutkan kuliah di jurusan Farmasi. Dan atas kehendak Allah SWT dan melalui jalur SNMPTN 2013 akhirnya ia berkesempatan melanjutkan studynya di Universitas Islam Negeri Makassar. Dan sampai sekarang menjalani proses perkuliahan di kampus PERADABAN tersebut.