

PENENTUAN INDEKS GLIKEMIK BONGGOL PISANG AMBON (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), KEPOK (*Musa paradisiaca* var. *formatypica*) DAN RAJA (*Musa paradisiaca* var. *raja*) TERHADAP HEWAN COBA TIKUS PUTIH (*Rattus norvegicus*)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh :

RISKA ZAIN
NIM: 70100113043

JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Zain

NIM : 70100113043

Tempat/Tanggal Lahir : Benteng/ 19 Juni 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi


Alamat : Jl. H. Yasin Limpo. Perum. Villa Samata Sejahtera Blok
B1/15

Judul : Penentuan Indeks Glikemik Bonggol Pisang Ambon, Kepok
dan Raja Terhadap Hewan Coba Tikus Putih (*Rattus
norvegicus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, 24 November 2017

Penyusun,



RISKA ZAIN
NIM. 701001130


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penentuan Indeks Glikemik Bonggol Pisang Ambon, Kepok dan Raja Terhadap Hewan Coba Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)” yang disusun oleh Riska Zain, NIM: 70100113043, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 24 November 2017 M yang bertepatan dengan 5 Rabi’ul Awwal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 24 November 2017 M
5 Rabi’ul Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si.
Pembimbing I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt
Pembimbing II : Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt
Penguji I : Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm., Apt
Penguji II : Dr. Muh. Shuhufi, S.Ag., M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


Dekan:


Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Penentuan Indeks Glikemik Bonggol Pisang Ambon, Kepok dan Raja Terhadap Hewan Coba Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)”. Penelitian dan penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana farmasi (S.Farm) di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak , karena penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari mereka sangatlah sulit bagi penulis pribadi untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Zairuddin dan Ibunda Hamriani yang tidak pernah bosan memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan baik moril dan materil. Tiada apapun di dunia ini yang dapat membalas kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan, kalian semangat yang sungguh luar biasa. Penulis juga ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing pertama yang membantu, memberi dukungan, membimbing serta memberi saran kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
9. Ibu Syamsuri Syakri S.Farm.,M.Si.,Apt. selaku pembimbing kedua yang rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran sehingga tersemangati untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Muh. Fitrah S.Si.,M.Si.,Apt. selaku penguji kompetensi yang telah sangat membantu atas segala saran, masukan, perhatian dan bantuan dalam perbaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Muh. Shuhufi, S.Ag.,M.Ag., selaku penguji agama yang memberi masukan, arahan dan koreksi untuk kesempurnaan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, bantuan, bimbingan, semangat dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

13. Seluruh Keluarga Besar, Nenek, Kakek, Oma, Opa, Adik, Om, Tante, Sepupu tersayang yang juga menjadi penyemangatu untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seangkatan farmasi “FAR13ION” atas segala bantuan, semangat, kerjasama, dukungan, dan suka dukanya selama menempuh pendidikan bersama di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tidak akan pernah terlupakan.
15. Saudari Zahрати Adawiah dan Fitriah Nur, Rahmah Akbar, Iffah Kholifah dan Nurfitriah Fadiyah selaku teman seperjuangan yang senantiasa mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman seperjuang sarjana gelombang kedua yang senantiasa memberi dukungan serta semangat dikala *down* melihat teman seperjuangan lain yang telah menyelesaikan pendidikan lebih dulu, kalian hebat.

Akhir kata, pada kesempatan kali ini, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Harapannya semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, Oktober 2017

Penyusun



RISKA ZAIN

NIM : 70100113043

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman	7
1. Tanaman Pisang	7
2. Bonggol Pisang.....	12

B. Uraian Hewan Coba	15
1. Klasifikasi Tikus Putih.....	15
2. Biologi Tikus Putih	16
C. Karbohidrat	18
1. Definisi.....	18
2. Klasifikasi Karbohidrat	19
3. Pencernaan dan Metabolisme Karbohidrat	20
D. Indeks Glikemik.....	22
E. Perhitungan Nilai Indeks Glikemik.....	32
F. Glukosa Darah.....	33
G. Diabetes Mellitus	34
1. Klasifikasi	36
2. Perubahan Metabolisme.....	38
H. Tinjauan Islam.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi Penelitian.....	44
2. Sampel penelitian.....	45
D. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data	45

1. Alat yang digunakan	45
2. Bahan yang digunakan	45
3. Hewan Coba yang digunakan.....	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
1. Penyiapan Sampel	45
2. Perlakuan Pada Hewan Uji	45
3. Pengukuran Kadar Glukosa Darah.....	47
4. Penentuan Indeks Glikemik	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
1. Hasil Pembuatan Tepung Bonggol Pisang	49
2. Hasil Pengukuran Kadar Glukosa	49
3. Hasil Perhitungan Nilai AUC Sampel.....	50
4. Hasil Indeks Glikemik Sampel Bonggol Pisang	51
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja.....	64
Lampiran 2	Hasil Perhitungan.....	66
Lampiran 3	Hasil Pembuatan Tepung Bonggol Pisang.....	71
Lampiran 4	Pengolahan Sampel.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kandungan Gizi Bonggol Pisang.....	14
Tabel 2 Karakteristik Tepung Bonggol Pisang.....	14
Tabel 3 Data Biologis Tikus.....	16
Tabel 4 Hasil Berat Tepung Bonggol Pisang.....	49
Tabel 5 Kadar Glukosa Tikus Setelah Pemberian Sampel.....	50
Tabel 6 Hasil Perhitungan Nilai AUC Sampel	51
Tabel 7 Indeks Glikemik dan Kategori IG Sampel Bonggol Pisang.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bonggol Pisang (<i>Musa paradisiaca</i>).....	13
Gambar 2	Pencernaan Karbohidrat	20
Gambar 3	Kurva Fluktuasi Glukosa Darah.....	25



ABSTRAK

Nama : Riska Zain

NIMI : 70100113043

Judul Penelitian : Penentuan Indeks Glikemik Bonggol Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), Kepok (*Musa paradisiaca* var. *formatypica*) dan Raja (*Musa paradisiaca* var. *raja*) Terhadap Hewan Coba Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)

Pemanfaatan limbah bonggol pisang yang masih kurang perlu diperhatikan lagi mengingat cukup tingginya kandungan gizi pada bagian tanaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks glikemik (IG) varietas bonggol pisang yang diberikan secara oral pada tikus. Bonggol pisang yang diteliti antara lain, bonggol pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), Kepok (*Musa paradisiaca* var. *formatypica*) dan Raja (*Musa paradisiaca* var. *raja*). Tikus dikelompokkan menjadi 5 kelompok masing-masing terdiri dari 3 ekor. Bonggol pisang diberikan dalam bentuk tepung yang disuspensikan ke dalam NaCMC 0,1% dengan dosis 2,5g/kg berat badan (BB), kontrol positif berupa glukosa pemberian oral dosis 2,5 g/kgBB. Dilakukan pengambilan sampel darah hewan uji pada jam ke 0 (sebelum pemberian senyawa uji atau kontrol); 0,5; 1 dan jam ke-2 setelah pemberian senyawa uji. Serum darah selanjutnya ditetapkan kadar glukosanya menggunakan glukometer. Data berupa kadar glukosa darah hewan uji versus waktu dianalisis menjadi *Area Under Curve* (AUC) kadar glukosa versus AUC (0-2 jam). Perhitungan IG dilakukan dengan membandingkan AUC (0-2 jam) senyawa uji terhadap AUC (0-2 jam) glukosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga varietas bonggol pisang tersebut memiliki nilai IG rendah, dimana tepung bonggol pisang ambon memiliki nilai indeks glikemik sebesar 32,5; tepung bonggol pisang kepok sebesar 25,5; dan tepung bonggol pisang raja sebesar 45,6. Bonggol pisang tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber pangan yang sehat.

Kata Kunci: Tepung bonggol pisang, Indeks Glikemik

ABSTRACT

Name : Riska Zain

NIM : 70100113043

Title of Research : Determination Glycemic Index of Banana's Tuber of Ambon

(*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), Kepok (*Musa paradisiaca*

var. *formatypica*) and Raja (*Musa paradisiaca* var. *raja*)

Which Were Given to Rat (*Rattus norvegicus*)

The utilization of banana's tuber waste is still lacking considering the nutritional content of banana's tuber is quite high. This study aims to determine that glycemic index (GI) varieties of banana tuber given orally in rat. Banana tubers examined, among others, parasites banana ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), kepok (*Musa paradisiaca* var. *formatypica*) and raja (*Musa paradisiaca* var. *raja*). Rats are grouped into 5 groups and each grup had 3 rats. The banana's tuber is given in the form of flour suspended into 0,1% NaCMC with a dose of 2,5g/kgBW, a positive control of glucose oral dose 2,5 g/kgBW. Blood sampling of test animals at hour 0 (before administration of test or control compounds); 0,5;1 and 2 hours after administration of the test compounds. The blood serum is then determined glucose level using glucometer. The data in the blood glucose leve; of the test versus time animal were analyzed into Area Under Curve (AUC) glucose versus AUC (0-2 hours). The calculation of GI is done by comparing AUC (0-2 hours) of test compound to AUC (0-2 hours) glucose. The results showed that the three varieties of banana tuber had low GI values, were Ambon's banana's tuber had a glycemic index amount 32,5; Kepok's banana tuber had GI amount 25,5 and Raja's banana tuber had GI amount 45,6. The banana tuber that can be developed as a functional food.

Keywords : *Banana tuber flour, glycemyc index*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit degeneratif di Indonesia saat ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan pola konsumsi pangan dan gaya hidup masyarakat yang kurang baik. Penyakit degeneratif tersebut antara lain penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker, dan diabetes melitus. Penelitian epidemiologi di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus mencapai 1,5-2,3% dari jumlah penduduk (Astawan dan Widowati, 2006). Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang timbul karena kadar glukosa darah yang terlalu tinggi.

Salah satu cara pencegahan penyakit diabetes melitus dan obesitas adalah dengan pemilihan konsumsi pangan yang tepat. Beberapa produk pangan memiliki komponen aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan tersebut tergolong pangan fungsional. Pangan fungsional yang sesuai untuk diaplikasikan pada penderita diabetes melitus dan obesitas adalah yang memiliki indeks glikemik (IG) yang rendah (Margareth, 2006).

Indeks glikemik (IG) adalah tingkatan pangan menurut efeknya terhadap kadar gula darah (Rimbawan dan Siagian, 2004). IG merupakan standar respon glikemik terhadap adanya karbohidrat (utamanya gula dan pati) dan makanan yang kaya akan karbohidrat, seperti beras, buah-buahan, sayuran seperti beras, buah-buahan, sayuran dan produk coklat (Jenkins dkk. 1984 *dalam* Puspita, Ika. 2013).

Saat ini penggunaan IG tidak hanya terbatas pada penderita diabetes, akan tetapi juga digunakan dalam pemilihan pola makan yang sehat, proses pengurangan berat badan, dan dalam proses lain untuk mengelola penyakit degeneratif. Pangan

yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat, memiliki nilai IG tinggi (>70). Karbohidrat dengan kandungan IG tinggi menunjukkan bahwa karbohidrat tersebut mengalami pencernaan secara cepat dan diabsorpsi dalam saluran pencernaan dalam jumlah banyak sehingga tercermin dari kenaikan glukosa darah secara mendadak yang diikuti oleh kenaikan insulin secara cepat (Campbell, 2010 dalam Puspita, Ika, 2013). Pada penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang ber-IG rendah. Salah satu bahan pangan yang berpotensi memiliki IG rendah adalah bonggol pisang.

Bonggol pisang merupakan limbah tanaman pisang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan bonggol pisang selama ini adalah untuk pembuatan pupuk dan sabun dengan cara dibakar sampai menjadi abu. Air bonggol pisang dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti disentri, pendarahan usus, amandel serta menghitamkan rambut. Namun dibalik penggunaannya sebagai limbah, bonggol pisang ternyata mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi yang lengkap (Badan Litbang Pertanian, 2013). Dalam 100 gram bonggol pisang mengandung protein 0,36 gram, karbohidrat 11,60 gram, mineral kalsium 15 mg, fosfor 60 mg, zat besi 0,50 mg, vitamin C 12 mg, dan air 86 gram (Rukmana, R, 2005).

Pemanfaatan bonggol pisang dikarenakan bonggol pisang kaya akan serat pangan. Menurut Astawan dan Wresdiyati (2004) serat kasar terbukti mampu mencegah berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit gigi, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, obesitas, serta meningkatkan kesehatan mikroflora usus. Rudito, dkk (2010) menunjukkan karakteristik kimia pati bonggol pisang yaitu

kadar air sebesar 6,69%, kadar abu 0,11% dan kadar HCN 2,6 mg/kg. Bonggol pisang merupakan bagian bawah batang pisang yang menggebul berbentuk umbi. Menurut Rosdiana (2009) bonggol pisang memiliki komposisi yang terdiri dari 76% pati dan 20% air. Pati ini menyerupai pati tepung sagu dan tepung tapioka. Kandungan gizi bonggol pisang yang cukup tinggi memungkinkan bonggol pisang untuk dijadikan sebagai alternatif bahan pangan yang cukup potensial.

Bonggol pisang berpotensi memiliki indeks glikemik karena kaya akan serat pangan dimana serat pangan yang tinggi berperan dalam erat kaitannya dengan rendahnya indeks glikemik. Selain itu juga, kemungkinan besar bonggol pisang memiliki indeks glikemik karena menurut penelitian Hoeruddin 2012, buah pisang memiliki indeks glikemik yang rendah pula.

Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang nilai indeks glikemik bonggol pisang ambon, bonggol pisang kepok dan bonggol pisang raja yang diharapkan mempunyai nilai IG rendah sehingga bisa dijadikan pangan alternatif untuk penderita DM (Diabetes Mellitus) tipe 2.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka,

1. Berapakah nilai indeks glikemik bonggol pisang ambon, bonggol pisang kepok dan bonggol pisang raja?
2. Termasuk dalam kategori/golongan indeks glikemik manakah ketiga jenis bonggol pisang tersebut?

C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup*

1. Indeks glikemik adalah respon glikemik ketika memakan sejumlah karbohidrat dalam pangan contohnya bonggol pisang ambon, kepok dan raja dan merupakan indikator tidak langsung dari respon insulin tubuh.
2. Bonggol pisang adalah batang tanaman pisang yang berupa umbi batang pisang ambon, kepok dan raja.
3. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang disebabkan oleh defek sekresi insulin dan atau dengan peningkatan resistensi selular terhadap insulin sehingga mengakibatkan hiperglikemia atau suatu keadaan yang menyebabkan gula dalam darah meningkat sangat signifikan (ADA, 2015).
4. Diabetes mellitus tipe 2 adalah merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi dalam konteks resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif (Kumar, dkk. 2005)
5. AUC (*Area Under Curve*) adalah permukaan di bawah kurva (grafik) yang menggambarkan naik turunnya kadar plasma sebagai fungsi dari waktu. AUC dapat dihitung secara matematis dan merupakan ukuran untuk bioavailabilitas suatu obat. AUC dapat digunakan untuk membandingkan kadar masing-masing plasma obat bila penentuan kecepatan eliminasinya tidak mengalami perubahan. Selain itu antara kadar plasma puncak dan bioavailabilitas terdapat hubungan langsung (Waldon, 2008).

D. *Kajian Pustaka*

1. Pada penelitian Ika Puspita Sari dkk, tentang “*Indeks Glikemik Uwi, Gadung, dan Talas Yang Diberikan Pada Tikus*” pada tahun 2013 bertujuan untuk mengetahui indeks glikemik (IG) umbi-umbian yang diberikan secara oral pada tikus. Umbi yang diteliti antara lain, Uwi (*Dioscorea alata*), Gadung (*Dioscorea hispida*) dan Talas (*Colocasia esculenta*). Tikus dikelompokkan menjadi 9 kelompok masing-masing terdiri dari 4 ekor. Umbi diberikan dalam bentuk serbuk yang disuspensikan ke dalam NaCMC 0,1% dengan dosis 2,5 g/kgBB, kontrol positif berupa glukosa pemberian oral dosis 2,5 g/kgBB. Dilakukan pengambilan sampel darah hewan uji pada jam ke 0 (sebelum pemberian senyawa uji atau kontrol), 0,5;1 dan jam ke-2 setelah pemberian senyawa uji. Serum darah selanjutnya ditetapkan kadar glukosanya menggunakan GOD-PAP kit. Data berupa kadar glukosa hewan uji versus waktu dianalisis menjadi *Area Under Curve* (AUC) kadar glukosa versus waktu (0-2 jam). Perhitungan IG dilakukan dengan membandingkan AUC (0-2jam) senyawa uji terhadap AUC (0-2jam) glukosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga umbi yang diteliti memiliki nilai IG rendah (14-22). Umbi lokal dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat yang sehat.
2. Pada penelitian Saragih tentang “*Analisis Mutu Tepung Bonggol Pisang Dari Berbagai Varietas Dan Umur Panen Yang Berbeda*” pada tahun 2013 bertujuan untuk menganalisis sifat fisiko-kimia tepung dari berbagai varietas dan umur panen yang berbeda serta uji deskripsi mutu organoleptik *cookies*

bonggol pisang. Penelitian ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan tepung bonggol pisang dari berbagai varietas (varietas kepok, raja, mahuli, susu dan ambon). Tahap selanjutnya varietas yang terbaik dilakukan pembuatan tepung bonggol pisang pada umur bonggol tanaman pisang yang berbeda serta pembuatan *cookies*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung bonggol pisang dari berbagai varietas memiliki karakteristik kadar air antara 0,99-1,41%; kadar abu 0,48-0,67%; rendamen 9,56-12,30%; daya serap air 166-260%, serat kasar 23,9-39,4%, memiliki bentuk granula bulat telur dan memiliki kandungan pati.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui indeks glikemik bonggol pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), bonggol pisang kepok (*Musa paradisiaca* var. *formatipyca*) dan bonggol pisang raja (*Musa paradisiaca* var. *raja*).
- b. Untuk mengetahui golongan indeks glikemik dari masing-masing varietas bonggol pisang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah kepada masyarakat terkait manfaat bonggol pisang sebagai bahan pangan alternatif terhadap penderita DM (Diabetes Mellitus) tipe 2 sehingga bonggol pisang tidak dibuang sia-sia dan menjadi limbah yang bermanfaat bagi masyarakat.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. *Uraian Tanaman*

1. **Tanaman Pisang**

a. Pengertian Tanaman Pisang

Pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikembangkan diseluruh wilayah Indonesia. Tanaman pisang dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut (Satuhu dan Supriyadi, 1992).

Kingdom : Plantae
Devisi : Spermatophyta
Sub. Divisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledonae
Bangsa : Musales
Suku : Musaceae
Marga : Musa
Jenis : *Musa paradisiaca* L.

b. Manfaat dan Nilai Gizi Tanaman Pisang

1) Manfaat Buah

Buah pisang banyak digunakan sebagai makanan seperti tepung, sale, sari buah, pisang goreng, pisang rebus, keripik pisang, kolak pisang, getuk pisang, dan sayur buah pisang muda. Selain itu, buah pisang hijau

dapat dapat untuk guruh (membersihkan dahak dan agar suara nyaring) (Satuhu dan Supriyadi, 1992).

2) Manfaat Daun

Oleh masyarakat, daun pisang banyak dimanfaatkan untuk membungkus (Satuhu dan Supriyadi, 1992). Biasanya daun pisang digunakan untuk membungkus tempe, ikan yang dipepes atau di panggang.

3) Manfaat Bunga

Bunga pisang atau yang sering disebut dengan jantung pisang biasanya dimanfaatkan untuk dibuat sayur, karena kandungan protein, vitamin, lemak dan karbohidratnya tinggi. Selain dibuat sayur, bunga pisang ini dapat pula dibuat manisan, acar, maupun lalapan (Satuhu dan Supriyadi, 1992).

4) Manfaat Batang

Batang pisang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, untuk membuat lubang pada bangunan, alas untuk memandikan mayat, untuk menutup saluran air bila ingin mengalirkan air atau membagi air, dan baik pula untuk kompos. Selain itu, air dari batang pisang dapat dimanfaatkan sebagai penawar racun dan pengobatan tradisional (Satuhu dan Supriyadi, 1992).

5) Manfaat Bonggol

Pengertian bonggol pisang ini adalah batang tanaman pisang yang berupa umbi batang (batang aslinya). Biasanya bonggol pisang muda dimanfaatkan untuk sayur (Satuhu dan Supriyadi, 1992).

c. Jenis-Jenis Tanaman Pisang

Tanaman pisang memiliki beberapa varietas yang lumayan banyak, contohnya pisang ambon, pisang raja dan pisang kepok yang akan diteliti oleh peneliti.

1) Pisang Ambon

Pisang ambon merupakan buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung senyawa yang disebut asam lemak rantai pendek, yang memelihara lapisan sel jaringan dari usus kecil dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi (Elly dan Sarinah, 1985).

Klasifikasi tanaman pisang ambon yang diterima secara luas saat ini adalah sebagai berikut (Satuhu, dkk. 2008) :

Kingdom : Plantae

Devisi : Spermatophyta

Sub. Divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Bangsa : Musales

Suku : Musaceae

Marga : Musa

Jenis : *Musa paradisiaca* var. *Sapientum*

2) Pisang Kepok

Pisang kepok merupakan salah satu buah pisang yang enak dimakan setelah diolah terlebih dahulu. Pisang kepok memiliki buah yang sedikit pipih dan kulit yang tebal, jika sudah matang warna kulit buahnya akan menjadi kuning. Pisang kepok memiliki banyak jenis, namun yang lebih dikenal adalah pisang kepok putih dan pisang kepok kuning (Prabawati dkk. 2008).

Dalam taksonomi tumbuhan, kedudukan tanaman pisang kepok dapat diklasifikasika sebagai berikut (Satuhu, dkk. 2008) :

Kingdom : Plantae

Devisi : Spermatophyta

Sub. Divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Bangsa : Musales

Suku : Musaceae

Marga : Musa

Jenis : *Musa paradisiaca* var. *formatypica*

3) Pisang Raja

Pisang raja termasuk jenis pisang buah. Menurut ahli sejarah dan botani secara umum pisang raja berasal dari kawasan Asia Tenggara dan pulau-pulau pasifik barat. Selanjutnya menyebar ke berbagai negara baik

negara tropis maupu negara subtropis. Akhirnya buah pisang dikenal di seluruh dunia (Zudaini. 1997).

Adapun klasifikasi tanaman pisang raja adalah sebagai berikut (Tjitrosoepomo. 2001).

Kingdom : Plantae
Devisi : Spermatophyta
Sub. Divisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledonae
Bangsa : Musales
Suku : Musaceae
Marga : Musa
Jenis : *Musa paradisiaca* var. *raja*.

2. Bonggol Pisang (*Musa paradisiaca* Linn)

Bonggol merupakan sifat khas *rhizoma* dari tanaman *monocotyedonael* yang dapat menumbuhkan anakan baru. Bila *rhizoma* dibelah dari atas kebawah terlihat bagian paling tengah yang disebut *central cylinder*, sedangkan lapisan luarnya disebut *cortex*. Bagian di atasnya merupakan tempat tumbuh batang yang terdiri dari pelepah-pelepah (Munadjim, 2006 *didalam* Nofalina, 2013).



Gambar 1. Bonggol Pisang

Pada saat panen bonggol pisang dari pohon pisang terdapat penanganan khusus, agar hasil bonggol pisang yang dipanen tidak mempengaruhi kualitas dari bonggol pisang tersebut. Penanganan pasca panen merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat setelah panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen dan atau diolah lebih lanjut oleh industri. Pada saat panen terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas bonggol pisang yaitu pada saat penebangan pohon pisang lebih baik bonggol pisangnya juga ditebang kemudian langsung diambil untuk diolah jangan dibiarkan di tanah karena tanpa penanganan yang cepat, umbi-umbian tersebut akan memburuk keadaannya apabila dibiarkan selama 3 hari, hal tersebut akan menjadikan perubahan warna pada bonggol pisang yang disebut dengan sistem respirasi pada umbi tersebut (Nofalina, 2013).

Respirasi menyebabkan berkurangnya cadangan makanan (dalam bentuk pati, gula, dan lain-lain) dalam komoditas, mengurangi rasa dari komoditas (terasa hambar) dan memacu pembusukkan (Kartasapoetra, 2001 *didalam* Nofalina,

2013). Oleh karena itu penyimpanan setelah panen dapat mempengaruhi kualitas dari bonggol pisang tersebut (Nofalina, 2013).

a. Kandungan Zat Gizi Bonggol Pisang

Berikut beberapa kandungan zat gizi yang terkandung dalam 100 gram bonggol pisang basah dan bonggol pisang kering.

Tabel 1. Kandungan Gizi Bonggol Pisang

Kandungan Gizi	Bonggol	Bonggol
	Basah	Kering
Kalori (kal)	43.00	245.00
Protein (g)	0.36	3.40
Lemak (g)	0.00	0.00
Karbohidrat (g)	11.60	66.20
Kalsium (mg)	15.00	60,00
Fosfor (mg)	60.00	150.00
Zat Besi (mg)	0.50	2.00
Vitamin A (SI)	0.00	0.00
Vitamin B1 (mg)	0.01	0.04
Vitamin C (mg)	12.00	4.00
Air (g)	86.00	20.00
Bagian yang dapat dimakan (%)	100.00	100.00

Sumber : Direktorat Gizi , Depkes RI (1996) didalam Nofalina, (2013)

Tabel 2. Karakteristik Tepung Bonggol Pisang dari Berbagai Varietas

Karakteristik	Varietas Bonggol Pisang		
	Kepok	Ambon	Raja
Kadar Serat (%)	29,62	24,06	19,11
Kadar Air (%)	1,09	1,41	1,41
Kadar Abu (%)	0,67	0,48	0,44

Rendamen (%)	12,56	11,63	12,30
Daya Serap Air (%)	260,0	166,0	173,0

b. Pemanfaatan Bonggol Pisang

Bonggol pisang (umbi batang pisang) merupakan bahan makanan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan mungkin belum dimanfaatkan sama sekali, karena ketidaktahuan masyarakat terhadap manfaat dan kandungan di dalam bonggol pisang. Kebanyakan bagian bonggol tersebut tidak terpakai dan dibuang begitu saja. Tetapi dalam kemajuannya, banyak terdapat produk yang berasal dari bonggol pisang, misalnya keripik bonggol pisang, sayur lodeh bonggol pisang, dan lain sebagainya (Nofalina, 2013).

Pengembangan produk baru dan diversifikasi olahan dari berbagai tepung dalam menunjang ketahanan pangan selama ini masih terfokus pada sumber daya tepung yang ada seperti tepung terigu, beras, jagung, dan tapioka. Potensi pengembangan tepung yang selama ini merupakan limbah dan belum digunakan maksimal, seperti bonggol pisang yang biasanya setelah dipanen pisanganya, bonggol dibiarkan membusuk di lahan pertanian (Saragih, 2013).

B. *Uraian Hewan Coba*

1. **Klasifikasi Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)**

Menurut Krinke (2000) klasifikasi tikus putih (*Rattus norvegicus*) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum	: Chordata
Kelas	: Mammalia
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Rattus
Spesies	: <i>Rattus norvegicus</i>

2. Biologi Tikus Putih

Hewan laboratorium atau hewan percobaan adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model guna mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorium. Tikus termasuk hewan mamalia, oleh sebab itu dampaknya terhadap suatu perlakuan mungkin tidak jauh berbeda dibanding dengan mamalia lainnya. Selain itu, penggunaan tikus sebagai hewan percobaan juga didasarkan atas pertimbangan ekonomis dan kemampuan hidup tikus hanya 2-3 tahun dengan lama reproduksi 1 tahun.

Kelompok tikus laboratorium pertama-tama dikembangkan di Amerika Serikat antara tahun 1877 dan 1893. Keunggulan tikus putih dibandingkan tikus liar antara lain lebih cepat dewasa, tidak memperlihatkan perkawinan musiman, dan umumnya lebih cepat berkembang biak. Kelebihan lainnya sebagai hewan laboratorium adalah sangat mudah ditangani, dapat ditinggal sendirian dalam kandang asal dapat mendengar suara tikus lain dan berukuran cukup besar sehingga memudahkan pengamatan. Secara umum, berat badan tikus

laboratorium lebih ringan dibandingkan berat tikus liar. Biasanya pada umur empat minggu beratnya 35-40 g dan berat dewasa rata-rata 200-250 g.

Tabel 3. Data biologis tikus (Smith dan Mangkoewidjojo. 1988)

Lama hidup	2-3 tahun, dapat sampai 4 tahun
Lama produksi ekonomis	1 tahun
Lama bunting	20-22 hari
Umur dewasa	40-60 hari
Umur dikawinkan	8-10 minggu (jantan dan betina)
Siklus kelamin	Poliestrus
Siklus estrus	4-5 hari
Lama estrus	9-20 jam
Perkawinan	Pada waktu estrus
Ovulasi	8-11 jam sesudah timbul estrus, spontan
Fertilisasi	7-10 jam sesudah kawin
Implantasi	5-6 hari sesudah fertilisasi
Berat dewasa	300-400 g jantan; 250-300 g betina
Suhu (rektal)	36-39°C (rata-rata 37,5°C)
Pernapasan	65-115/menit, turun menjadi 50 dengan anastesi, naik sampai 150 dalam stress
Denyut jantung	330-480/menit, turun menjadi 250 dengan anastesi, naik sampai 150 dalam stress
Tekanan darah	90-180 sistol, 60-145 diastol, turun menjadi 80 sistol, 55 diastol dengan anastesi
GDP	70 – 100 mg/dl
Konsumsi oksigen	1,29-2,68 ml/g/jam

Sel darah merah	7,2-9,6 x 10 ⁶ /mm ³
Sel darah putih	5,0-13,0 x 10 ³ /mm ³
SGPT	17,5-30,2 IU/liter
SGOT	45,7-80,8 IU/liter
Kromosom	2n=42
Aktivitas	Nokturnal (malam)
Konsumsi makanan	15-30 g/hari (dewasa)
Konsumsi minuman	20-45 ml/hari (dewasa)

C. *Karbohidrat*

1. **Definisi**

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terbentuk dari 3 unsur yaitu Karbon (C), Oksigen (O) dan Hidrogen (H). Oksidasi karbohidrat menjadi CO₂ dan H₂O di dalam tubuh menghasilkan energi sekitar 4kcal/kg. Di dalam tubuh karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa protein dan lemak. Akan tetapi, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (Mark DB dkk. 2012; Murray RK dkk. 2014).

Bentuk molekul karbohidrat yang paling sederhana tersusun dari satu molekul yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa dan fruktosa. Karbohidrat dalam makanan umumnya merupakan polimer yang tersusun dari beberapa molekul gula yang terangkai menjadi rantau yang panjang serta kadang bercabang-cabang, yang disebut polisakarida. Fungsi karbohidrat antara lain

sebagai sumber energi utama yang diperlukan untuk bergerak, memberi rasa kenyang, dan sebagai pembentukan cadangan sumber energi. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan (Mark DB dkk. 2012; Murray RK dkk. 2014).


2. Klasifikasi Karbohidrat

Klasifikasi karbohidrat pada umumnya didasarkan atas kompleksitas struktur kimianya. Berdasarkan kompleksitasnya, karbohidrat dibedakan atas karbohidrat sederhana, yang lebih dikenal sebagai monosakarida, dan karbohidrat kompleks yang meliputi disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida misalnya glukosa, galaktosa dan fruktosa adalah karbohidrat paling sederhana. Monosakarida dapat disatukan bersama-sama oleh ikatan glikosidat untuk membentuk karbohidrat lain yang lebih kompleks. Disakarida misalnya: sukrosa, maltosa dan laktosa, masing-masing tersusun dari 2 monosakarida yang disatukan oleh sebuah ikatan glikosidat. Oligosakarida misalnya komponen karbohidrat dalam glikoprotein dan glikolipid mengandung 3 sampai sekitar 12 unit monosakarida. Polisakarida, misalnya pati dan glikogen mengandung puluhan ribu unit monosakarida. Walaupun fungsi utama karbohidrat adalah sumber bahan bakar bagi tubuh, karbohidrat juga berlaku sebagai prekursor untuk sintesis lemak, asam amino, glikolipid, glikoprotein dan proteoglikan (Mark DB dkk. 2012; Sumardjo. 2009).

3. Pencernaan dan Metabolisme Karbohidrat

Untuk diserap di saluran cerna, segala jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan harus diubah menjadi karbohidrat sederhana yaitu glukosa, melalui proses pencernaan dan metabolisme di hati. Proses pencernaan mengubah karbohidrat makanan menjadi monosakarida melalui hidrolisis ikatan glikosidat antara beberapa glukosa. Enzim utama yang berperan adalah amilase- α , amylase di saliva dan kompleks disakarida semispesifik di membran *brushborder* pada sel mukosa usus ((Mark DB dkk. 2012; Sumardjo. 2009).

Glukosa, galaktosa dan fruktosa hasil hidrolisis oleh enzim pencernaan dipindahkan ke dalam sel epitel absortip pada usus halus melalui transpor aktid *dependent Na⁺⁺* dan difusi fasilitasi. Transpor fasilitasi monosakarida tersebut diperantarai oleh sekelompok protein transport glukosa (*Glucose Transport Protein, GLUT*). Monosakarida masuk ke dalam kapiler jaringan pembuluh darah, mengalir ke hati dan jaringan perifer dan dipindahkan masuk ke dalam sel melalui salah satu dari berbagai transporter glukosa spesifik jaringan. Jenis transporter yang ditemukan di masing-masing jaringan mencerminkan peran metabolisme glukosa pada jaringan yang bersangkutan. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat penjelasan mengenai pencernaan karbohidrat :



Gambar 2. Pencernaan Karbohidrat (Sumardjo. 2009)

Terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat antara lain : glikolisis oksidasi piruvat, siklus asam sitrat, glikogenesis, glikogenolisis serta glukoneogenesis (Mark DB dkk. 2012; Murray RK dkk. 2014; Sarath. 2015).

- a. Glukosa sebagai bahan bakar utama metabolisme akan mengalami glikolisis (dipecah) menjadi 2 piruvat jika tersedia oksigen.
- b. Selanjutnya masing-masing piruvat dioksidasi menjadi asetil KoA
- c. Asetil KoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat
- d. Jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa tidak dipecah dan dirangkai menjadi polimer glukosa (glikogen). Glikogen disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat dikonversi menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang.

- e. Jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa mengalami glikolisis, diikuti dengan oksidasi piruvat sampai dengan siklus asam sitrat.
- f. Jika glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen habis, maka sumber energi non karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan glukoneogenesis (pembentukan glukosa baru) karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi.

D. Indeks Glikemik

Indeks glikemik (IG) merupakan respon kadar gula darah setelah makan (postprandial). Skala indeks glikemik (IG) dikembangkan untuk membantu mengatur kadar glukosa penderita diabetes. IG merupakan respon glikemik ketika memakan sejumlah karbohidrat dalam pangan dan dengan demikian merupakan indikator tidak langsung dari respon insulin tubuh. Peningkatan kadar glukosa darah setelah makan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu struktur kimia karbohidrat, derajat kematangan, metode pengolahan pangan, serta jumlah dan tipe serat yang terkandung dalam pangan.

Indeks glikemik adalah tingkat pangan menurut efeknya terhadap kadar gula darah (Rimbawan dan Siagian. 2004). Indeks glikemik pangan berarti bagaimana kecepatan suatu makanan yang dikonsumsi tubuh memengaruhi kadar gula darah tubuh.

Nilai glikemik suatu makanan dilihat dengan kurva respon gula darah terhadap kandungan karbohidrat dalam makanan yang diuji dibandingkan dengan kurva respon glukosa darah terhadap karbohidrat (dalam jumlah yang sama) dari pangan standar acuan atau “*standar food*” yaitu glukosa murni (Jenkins.2002). IG glukosa murni yang dijadikan pangan acuan memiliki nilai indeks glikemik 100.

Berdasarkan penggunaan glukosa sebagai pembanding (IG = 100), pangan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu pangan IG rendah dengan rentang nilai IG ≤ 55 , pangan IG sedang dengan rentang nilai IG 55-69, dan pangan IG tinggi dengan rentang nilai IG ≥ 70 (CDA. 2013). Menurut Rimbawan dan Siagian (2004) karbohidrat dalam pangan yang dipecah dengan cepat selama pencernaan memiliki IG tinggi, sebaliknya pangan yang ber-IG rendah karbohidratnya akan dipecah dengan lambat sehingga melepaskan glukosa ke dalam darah dengan lambat. Pangan yang memiliki IG rendah, karbohidratnya akan dipecah dan diabsorpsi dengan lambat, sehingga menghasilkan peningkatan glukosa darah dan insulin secara lambat dan bertahap. Pangan yang memiliki IG rendah dihubungkan dengan penurunan kejadian penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker (Wolever dan Mehling 2002).

Perbedaan hasil penentuan nilai IG bahan pangan yang sama biasa terjadi. Foster-Powell dan Miller (2002) menyatakan bahwa tidak ada nilai IG yang pasti untuk sebuah bahan pangan. Perbedaan metode dan proses pemasakan, karakter molekuler dan fisik granula pati dalam produk akhir berpengaruh terhadap nilai IG pangan. Rendahnya indeks glikemik umbi garut disebabkan umbi garut mengandung serat pangan, pati resisten, amilosa yang cukup tinggi, serta kemungkinan adanya


komponen antinutrisi seperti komponen fenolik yang dapat menghambat daya cerna pati (Utami, 2008). WHO merekomendasikan peningkatan asupan pangan yang memiliki IG rendah terutama bagi penderita diabetes dan orang yang tidak toleran terhadap glukosa. Berdasarkan laporan WHO, hubungan diet pangan yang memiliki IG rendah dalam mencegah obesitas dan diabetes sangatlah mungkin. Studi klinis banyak membuktikan hubungan positif antara asupan pangan yang memiliki IG rendah dengan resistensi insulin dan prevalensi sindrom metabolit.

Pengaruh konsumsi pangan terhadap kadar glukosa darah selama periode tertentu disebut respons glikemik. Pemahaman yang baik terhadap respons glikemik sangat diperlukan, baik bagi orang sehat untuk menghindari DM, maupun penderita DM. Hal tersebut diperlukan untuk memilih jenis, bentuk asupan, dan jumlah karbohidrat/bahan pangan yang dikonsumsi.

Jenkins et al. (1981) pertama kali memperkenalkan konsep indeks glikemik (IG) dengan mengelompokkan bahan pangan berdasarkan efek fisiologisnya terhadap kadar glukosa darah setelah pangan dikonsumsi. Bahan pangan dicerna dengan kecepatan berbeda-beda, sehingga respons kadar glukosa darah juga berbeda. IG dapat memberikan petunjuk kepada efek faali makanan terhadap kadar glukosa darah dan respons insulin serta cara yang mudah dan efektif untuk mengendalikan fluktuasi glukosa darah. Secara umum, pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi, sedangkan pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan lambat memiliki IG rendah (Rimbawan dan Siagian 2004).

Respons glikemik merupakan kondisi fisiologis kadar glukosa darah selama periode tertentu setelah seseorang mengonsumsi pangan. Menurut Frei et al. (2003), karbohidrat yang berasal dari tanaman yang berbeda mempunyai respons glikemik yang berbeda pula. Perbedaan respons glikemik juga mungkin terjadi pada karbohidrat yang berasal dari tanaman yang sama namun berbeda varietas. Seperti dijelaskan sebelumnya, pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi, sebaliknya pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan lambat memiliki IG rendah (Rimbawan dan Siagian. 2004). Nilai IG dihitung berdasarkan perbandingan antara luas kurva kenaikan glukosa darah setelah mengonsumsi pangan yang diuji dengan kenaikan glukosa darah setelah mengonsumsi pangan rujukan terstandar, seperti glukosa atau roti tawar (Marsono dkk. 2002).

Respons glikemik ditunjukkan oleh kurva fluktuasi dari penyerapan glukosa dalam darah. Kurva fluktuasi dan area di bawah kurva tersebut dijadikan acuan dalam perhitungan nilai IG suatu produk pangan (Gambar 3).



Gambar 3. Kurva fluktuasi glukosa darah. Area di bawah kurva respons glukosa darah merupakan jumlah A, B, C, D, E, F. Area di bawah garis dasar tidak diperhitungkan (FAO/WHO 1998, Arvidsson Lenneret al. 2004, Brouns et al. 2005, Hoerudin 2012).

Menurut Hoerudin (2012), pangan ber-IG rendah dan tinggi dapat dibedakan berdasarkan kecepatan pencernaan dan penyerapan glukosa serta fluktuasi kadarnya dalam darah. Pangan ber-IG rendah mengalami proses pencernaan lambat, sehingga laju pengosongan perut pun berlangsung lambat. Hal ini menyebabkan suspensi pangan (chyme) lebih lambat mencapai usus kecil, sehingga penyerapan glukosa pada usus kecil menjadi lambat. Akhirnya, fluktuasi kadar glukosa darah pun relatif kecil yang ditunjukkan dengan kurva respons glikemik yang landai. Sebaliknya, pangan ber-IG tinggi mencirikan laju pengosongan perut, pencernaan karbohidrat, dan penyerapan glukosa yang berlangsung cepat, sehingga fluktuasi kadar glukosa darah juga relatif tinggi. Hal tersebut karena penyerapan glukosa sebagian besar hanya terjadi pada usus kecil bagian atas.

Faktor-faktor yang memengaruhi IG pada pangan antara lain adalah kadar serat, perbandingan amilosa dan amilopektin (Rimbawan dan Siagian 2004), daya cerna pati, kadar lemak dan protein, dan cara pengolahan. Masing-masing komponen bahan pangan memberikan kontribusi dan saling berpengaruh hingga menghasilkan respons glikemik tertentu (Widowati 2007).

1. Serat Pangan

Serat pangan merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman seperti pada buah-buahan, sayuran, sereal, dan aneka umbi. Komponen serat pangan meliputi polisakarida yang tidak dapat dicerna, seperti selulosa, hemiselulosa, oligosakarida, pektin, gum, dan *waxes* (Englyst dan Cummings 1985; Sardesai 2003; Astawan dan Wresdiyati 2004; Marsono 2004).

Keberadaan serat pangan dapat memengaruhi kadar glukosa darah (Fernandes *et al.* foster). Secara umum, kandungan serat pangan yang tinggi berkontribusi pada nilai IG yang rendah (Trinidad *et al.* 2010). Dalam bentuk utuh, serat dapat bertindak sebagai penghambat fisik pada pencernaan. Serat dapat memperlambat laju makanan pada saluran pencernaan dan menghambat aktivitas enzim sehingga proses pencernaan khususnya pati menjadi lambat dan respons glukosa darah pun akan lebih rendah. Dengan demikian IG-nya cenderung lebih rendah.

Peran serat pangan dalam membantu menurunkan nilai IG diduga berkaitan dengan fungsi fisiologis dari komponen-komponennya. Komponen serat pangan dapat dikelompokkan menjadi serat larut dan tidak larut, atau terfermentasi dan tidak terfermentasi. Serat pangan tidak larut diartikan sebagai serat pangan yang tidak dapat larut dalam air panas maupun air dingin (Muchtadi 2001). Fungsi utama serat pangan tidak larut yaitu mencegah penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan.

Fungsi serat pangan larut terutama adalah memperlambat pencernaan di dalam usus, memberikan rasa kenyang lebih lama, dan memperlambat laju peningkatan glukosa darah sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer glukosa ke dalam sel-sel tubuh dan mengubahnya menjadi energi semakin sedikit. Pektin merupakan salah satu contoh serat pangan yang larut dalam air dan menentukan viskositas serat pangan. Oleh karena itu, fungsi serat pangan yang larut tersebut sangat dibutuhkan oleh penderita DM karena dapat mereduksi absorpsi glukosa pada usus kecil (Sardesai 2003).

2. Kadar Amilosa dan Amilopektin

Granula pati terdiri atas dua fraksi, yakni amilosa dan amilopektin yang keduanya dapat dipisahkan dengan air panas. Amilosa disebut sebagai fraksi terlarut, sedangkan amilopektin sebagai fraksi tidak larut. Amilosa merupakan polimer rantai lurus glukosa yang dihubungkan oleh ikatan β -(1,4)-glikosidik. Amilopektin merupakan polimer gula sederhana, bercabang, dan struktur terbuka. Amilopektin pada dasarnya mirip amilosa, namun memiliki ikatan α -(1,6)-glikosidik pada titik percabangannya. Amilopektin bersifat lebih rapuh (*amorphous*) dibanding amilosa yang struktur kristalnya cukup dominan. Kandungan amilosa yang lebih tinggi menyebabkan pencernaan menjadi lebih lambat karena amilosa merupakan polimer glukosa yang memiliki struktur tidak bercabang (struktur lebih kristal dengan ikatan hidrogen yang lebih ekstensif). Amilosa juga mempunyai ikatan hidrogen yang lebih kuat dibandingkan dengan amilopektin, sehingga lebih sukar dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Struktur yang tidak bercabang ini membuat amilosa terikat lebih kuat sehingga sulit tergelatinisasi dan akibatnya sulit dicerna (Rimbawan dan Siagian 2004). Selain itu, amilosa mudah bergabung dan mengkristal sehingga mudah mengalami retrogradasi yang bersifat sulit untuk dicerna (Meyer 1973).

Amilosa sangat berperan pada proses gelatinisasi dan lebih menentukan karakteristik pasta pati. Kadar amilosa yang tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan kekuatan ikatan hidrogen sehingga pati membutuhkan energi yang lebih besar untuk gelatinisasi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan

bahwa pangan yang memiliki proporsi amilosa lebih tinggi dibanding amilopektin memiliki nilai IG yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya.

3. Daya Cerna Pati

Proses pencernaan pati dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik menyebabkan pati dicerna pada usus halus. Faktor intrinsik berkaitan erat dengan sifat alami pati, seperti ukuran granula, keberadaannya pada matrik pangan, serta jumlah dan ukuran pori pada permukaan pati.

Ukuran granula pati berkaitan dengan luas penampang permukaan totalnya. Semakin kecil ukuran granula pati, semakin besar luas permukaan total granula pati tersebut. Dengan luas permukaan yang lebih besar, enzim pemecah pati memiliki area yang lebih luas untuk menghidrolisis pati menjadi glukosa. Semakin mudah enzim bekerja, semakin cepat pencernaan dan penyerapan karbohidrat pati. Dhital *et al.* (2010) melaporkan terdapat korelasi negatif antara ukuran granula pati dengan koefisien laju pencernaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses hidrolisis pati terjadi melalui mekanisme difusi terkendali (*diffusion-controlled*) atau permukaan terkendali (*surface-controlled*). Dengan kata lain, luas permukaan granula pati berperan dalam mengendalikan laju pencernaan. Oleh karena itu, jika ukuran granula pati kecil, maka pati tersebut diduga akan memberikan nilai IG tinggi.

Sebagai faktor intrinsik, struktur matrik bahan pangan dapat mengganggu akses enzim amilase. Granula pati yang terperangkap di dalam matriks pangan lebih sulit diakses sehingga lebih lambat dicerna. Jumlah dan ukuran pori merupakan faktor intrinsik lain yang dapat memengaruhi daya cerna pati.

Faktor ekstrinsik yang memengaruhi pencernaan pati antara lain adalah lamanya waktu pencernaan dalam lambung (*transit time*), aktivitas amilase pada usus, jumlah pati, dan keberadaan komponen pangan lainnya seperti zat antigizi. Faktor-faktor ekstrinsik tersebut saling berinteraksi sangat kompleks/rumit.

Daya cerna pati yang rendah berarti hanya sedikit jumlah pati yang dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan dalam waktu tertentu. Dengan demikian, kadar glukosa dalam darah tidak mengalami kenaikan secara drastis sesaat setelah makanan tersebut dicerna dan dimetabolisme oleh tubuh. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Argasmita (2008) dan Hasan *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa pangan dengan daya cerna pati tinggi menghasilkan nilai IG yang tinggi pula. Lebih jauh, Chung *et al.* (2006) melaporkan bahwa pati bahan pangan yang tergelatinisasi sebagian memiliki daya cerna pati yang rendah. Dengan demikian, pati yang tergelatinisasi sebagian relatif lebih tahan terhadap hidrolisis enzim sehingga nilai IG-nya cenderung lebih rendah.

4. Kadar Lemak dan Protein

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh yang lebih efektif daripada karbohidrat dan protein. Satu gram lemak menghasilkan 9 kkal energi, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan energi 4 kkal. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Fungsi utama protein adalah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein juga berfungsi sebagai zat pengatur proses metabolisme tubuh.

Pangan dengan kadar lemak yang tinggi cenderung memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga laju pencernaan makanan pada usus halus juga lambat. Sementara itu, kadar protein yang tinggi diduga merangsang sekresi insulin (Jenkins *et al.* 1981) sehingga glukosa dalam darah tidak berlebih dan terkendali. Oleh karena itu, pangan dengan kandungan lemak dan protein tinggi cenderung memiliki IG lebih rendah dibandingkan dengan pangan sejenis yang berkadar lemak dan protein rendah (Jenkins *et al.* 1981; Rimbawan dan Siagian 2004). Hubungan nilai kadar protein, lemak, dan IG beberapa menyatakan bahwa pangan dengan IG rendah dapat menghasilkan banyak energi jika mengandung banyak lemak dan protein. Namun, pangan berlemak harus dikonsumsi secara bijaksana. Total konsumsi lemak tidak boleh melebihi 30% dari total energi dan total konsumsi lemak jenuh tidak melebihi 10% dari total energi (Nisviaty 2006).

5. Cara Pengolahan

Salah satu faktor yang memengaruhi nilai IG suatu produk pangan adalah cara pengolahan, seperti pemanasan (pengukusan, perebusan, penggorengan) dan penggilingan (penepungan) untuk memperkecil ukuran partikel. Cara pengolahan dapat mengubah sifat fisikokimia suatu bahan pangan seperti kadar lemak dan protein, daya cerna, serta ukuran pati maupun zat gizi lainnya.

Pemanasan pati dengan air berlebihan mengakibatkan pati mengalami gelatinisasi dan perubahan struktur. Pemanasan kembali dan pendinginan pati yang telah mengalami gelatinisasi juga mengubah struktur pati lebih lanjut yang mengarah

pada terbentuknya kristal baru yang tidak larut, berupa pati teretrogradasi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nilai IG (Haliza *et al.* 2006).

Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu yang mempengaruhi nilai indeks glikemik bahan pangan adalah cara pengolahannya, seperti pemanasan (pengukusan, perebusan, penggorengan) dan penggilingan (penepungan) untuk memperkecil ukuran partikel. Cara pengolahan dapat mengubah sifat fisikokimia suatu bahan pangan seperti kadar lemak dan protein, daya cerna, serta ukuran pati maupun zat gizi lainnya, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap indeks glikemik bonggol pisang dalam bentuk tepungnya.

E. Perhitungan Nilai Indeks Glikemik

Metode pengambilan sampel darah, pemilihan dan pengulangan makanan acuan, verifikasi kandungan karbohidrat yang tersedia dari makanan, jumlah dan jenis subyek, dan perhitungan IAUC merupakan beberapa metodologi harus dilakukan dalam pengukuran IG.

Pangan acuan yang digunakan untuk mengukur indeks glikemik pangan adalah roti putih atau glukosa murni. Pemberian pangan acuan dan pangan uji dalam pengukuran IG dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan subyek yang sama untuk mengurangi efek keragaman respon glukosa darah dari hari ke hari. Untuk mendapatkan respon rata-rata yang representatif untuk pangan acuan, dianjurkan untuk melakukan pengukuran IG pangan acuan secara berulang untuk setiap subyek. Porsi makanan yang diuji dalam pengukuran indeks glikemik harus mengandung 50 g karbohidrat. Untuk mendapatkan nilai yang setara dengan 50 g karbohidrat dalam

pangan acuan ataupun pangan uji perlu dilakukan pengujian karbohidrat untuk memverifikasi kandungan karbohidrat yang terdapat dalam pangan tersebut (FAO, 1998).

Perhitungan IAUC merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pengukuran nilai indeks glikemik pangan. Sejumlah metode yang berbeda telah digunakan untuk menghitung daerah di bawah kurva. Untuk sebagian besar data indeks glikemik, area di bawah kurva telah dihitung sebagai daerah tambahan di bawah kurva respon glukosa darah (IAUC), dengan mengabaikan daerah di bawah konsentrasi puasa. Hal ini dapat dihitung secara geometris dengan menerapkan aturan trapesium (FAO, 1998). Menurut Rimbawan & Siagian (2004), luas daerah di bawah kurva dianggap menggambarkan jumlah total respon glikemik, tidak hanya satu titik yang diberikan oleh puncak respon glukosa darah. Para ahli statistik menganjurkan penggunaan luas area di bawah kurva sebagai angka yang menggambarkan respon glukosa darah secara benar.

Menurut (Minro dan Shaw. 2008 *di dalam* Sundari. 2014), pengukuran nilai indeks glikemik pangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IG = \frac{AUC \text{ makanan}}{AUC \text{ glukosa}} \times 100$$

Keterangan :

IG : Indeks Glikemik

AUC makanan: Luas area di bawah kurva respon glukosa setelah 2 jam terhadap pangan uji

AUC glukosa : Luas area di bawah kurva respon glukosa darah setelah 2 jam terhadap glukosa murni (pangan acuan)

F. Glukosa Darah

Glukosa Darah dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi atau kalori. Glukosa dalam darah berasal dari penyerapan usus dari makanan yang mengandung zat tepung/ karbohidrat dari nasi, ubi, jagung, kentang dan lain-lain. Dan sebagian dari pemecahan simpanan energi dalam jaringan (glikogen). Menurut kriteria International Diabetes Federation (IDF), American Diabetes Association (ADA), dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni), apabila gula darah pada saat puasa di atas 126 mg/dl atau dua jam sesudah makan di atas 200 mg/dl, berarti orang tersebut menderita DM. Komplikasi DM bisa timbul pada semua organ dan semua sistem tubuh, dari kepala sampai kaki. Ini tergantung cara menjaga gula darah agar selalu normal. Semakin buruk kontrol gula darah, semakin mudah terkena komplikasi. Sebaliknya, kontrol gula yang baik dapat mencegah/menghambat terjadinya komplikasi. Pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan di laboratorium dengan uji strip glukosa darah baik yang menggunakan glucometer (Soegondo, 2011).

Gula darah tinggi menyebabkan kerusakan bermacam-macam sistem dan organ tubuh. Bisa merusak mata, otak, rongga mulut, paru-paru, jantung, lambung, usus, hati, empedu, ginjal, kandung kemih, sistem saraf, serta anggota gerak. Termasuk menimbulkan impotensi dan luka yang tidak kunjung sembuh. Bagaimana terjadinya komplikasi seperti ini, semua berawal dari kerusakan pembuluh darah. Gula darah tinggi merusak dinding pembuluh darah, baik pembuluh darah berukuran besar (arteri)

maupun paling kecil (kapiler). Statistik menunjukkan, ketika berobat ke dokter, dua sampai tiga dari lima pasien menderita satu atau beberapa komplikasi lantaran penyakit DM. Namun, dengan kontrol gula darah yang baik, komplikasi-komplikasi tersebut bisa dikalahkan, atau setidaknya dikurangi. Bahkan bila disiplin dan bersungguh-sungguh, komplikasi lain yang belum tibul bisa dicegah.

G. *Diabetes Mellitus*

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu penyakit metabolik yang disebabkan oleh defek sekresi insulin dan atau dengan peningkatan resistensi selular terhadap insulin sehingga mengakibatkan hiperglikemia atau suatu keadaan yang menyebabkan gula dalm darah meningkat sangat signifikan. Dalam jangka waktu yang lama, DM dapat menyebabkan kematian akibat komplikasi di berbagai organ tubuh. Organ yang sering terkena dampak dari meningkatnya gula darah yang tak terkontrol ini adalah mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah (ADA. 2015).

Diabetes mellitus termasuk dalam golongan penyakit tidak menular, sehingga sebagian besar etiologi ppenyakit ini didapatkan dari pola hidup dan pemilihan makanan yang tidak seimbang. Tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan pola hidup urban semakin menjamur dan faktor risiko DM pun menjadi meningkat (Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dkk. 2008).

Data WHO terbaru mencatat penyakit kronik yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia antara lain : defisiensi nutrisi (29%), penyakit kardiovaskular (28%), kanker (12%), kecelakaan (10%), diabetes (3%), dan penyakit kronik lainnya

(11%). Walaupun dalam data tersebut peringkat DM tidak terlalu tinggi, namun peran DM terhadap penyakit dimana kadar glukosa darah sangat meningkat (*hyperglycemia*) sehingga meningkatkan resiko komplikasi penyakit mikrovaskular (WHO and IDF. 2006).

Menurut *American Diabetes Association* (ADA), DM merupakan penyakit yang kompleks dan kronik yang membutuhkan perawatan medis secara berkelanjutan dan dengan strategi multifaktorial untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh.

Menurut WHO, DM merupakan penyakit kronik yang disebabkan oleh produksi insulin yang tak mencukupi atau ketika tubuh tidak bisa mengefektifkan penggunaan insulin yang telah diproduksi (WHO and IDF. 2006).

Insulin merupakan hormon polipeptida yang diproduksi oleh sel β pankreas sebagai respon atas stimulus masukan makanan. Di aliran darah, insulin mengontrol homeostasis glukosa darah dengan cara menstimulasi ambilan glukosa ke dalam otot skelet, hati, dan jaringan adiposa serta sel-sel yang membutuhkan glukosa untuk melakukan metabolisme. Keeradaan insulin lebih dominan dalam keadaan pasca makan, tingginya kadar glukosa dalam darah memicu produksi insulin agar kadar gula dalam darah tetap stabil. Insulin bersifat anabolik, yang akan menyebabkan peningkatan oksidasi glukosa, glikogenesis, sintesis protein dan sintesis lemak (Jongsoon and Paul. 1994).

1. Klasifikasi

Badan Kesehatan Dunia (WHO), melalui laporan kedua *Expert Committee on Diabetes Mellitus* mengelompokkan diabetes menjadi dua kelompok utama, yaitu

Insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) dan *Non-insulin dependent diabetes mellitus* (NIDDM). Pada IDDM, pankreas tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, sedangkan NIDDM disebabkan insulin yang tidak bekerja secara baik. Pada tahun 1997, *Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus* (ECDCDM) menyetujui klasifikasi baru diabetes melitus, menjadi DM tipe 1 (yang sebelumnya disebut IDDM), tipe 2 (sebelumnya disebut NIDDM) dan *gestasional diabetes* (Foste, Powel dkk, 2002; Rimbawan dan Siagian. 2004).

Diabetes melitus tipe 1, ditandai dengan rusaknya sel β pankreas yang disebabkan oleh proses autoimun. Jumlah penderita DM tipe 1 sebelum usia 25 tahun ialah 95% dari populasi, dengan prevalensi kejadian yang sama pada pria dan wanita. Individu yang mengalami DM tipe 1 mempunyai ciri-ciri: *polyuria* (sering kencing), *polydipsia* (rasa haus yang terus-menerus), dan *polyphagia* (perasaan lapar yang berlebih).

DM tipe 2 dicirikan oleh resistensi insulin pada jaringan perifer dan gangguan sekresi insulin dari sel- β pankreas. DM tipe 2 adalah jenis penyakit diabet yang paling lazim dan berkaitan dengan riwayat diabet keluarga, usia lanjut, obesitas, perubahan pola makan dan aktivitas fisik yang kurang (Willet *et al.*, 2002). Resistensi insulin dan hiperinsulinemia akan menyebabkan kerusakan toleransi glukosa. Sel- β yang rusak akhirnya menjadi lemah, selanjutnya mendorong intoleransi glukosa dan hiperglikemia (Mayfield 1998). Penyebab terjadinya DM ini belum diketahui dengan pasti, namun individu yang menderita diabetes, secara metabolik mengalami penurunan sensitivitas insulin akibat disfungsi sel- β pankreas dan insulin resisten.

Gestational diabetes merupakan klasifikasi operasional, bukan klasifikasi berdasarkan kondisi fisiologis. Diabetes yang diderita oleh wanita sebelum hamil disebut *pregestational diabetes*. Wanita yang mengalami DM tipe 1 pada saat hamil dan wanita dengan asimtomatik DM tipe 2 yang tidak terdiagnosis dikelompokkan menjadi *gestational diabetes*. Namun, pada umumnya wanita penderita *gestational diabetes* memiliki homeostatis glukosa yang normal selama paruh pertama (sampai bulan kelima) masa hamil. Pada paruh kedua masa hamil (antara bulan keempat dan kelima) mengalami defisiensi insulin relatif. Pada umumnya kadar gula darah kembali normal setelah melahirkan. *Gestational diabetes* dapat meningkatkan resiko DM tipe 2 pada usia lanjut.

Karakteristik utama DM adalah munculnya gejala klasik seperti poliuri, polidipsi, polifagi dan kehilangan berat badan. Gejala lain yang dapat menjurus kepada diagnosis DM adalah dampak dari hiperglikemia yaitu pandangan buram, parestesia ekstremitas bawah, dan infeksi jamur yang menyebabkan balanitis pada laki-laki.

2. Perubahan Metabolisme

Konsentrasi glukosa darah yang tinggi (hiperglikemia) disebabkan oleh peningkatan produksi glukosa hati yang diiringi dengan penurunan pemanfaatan glukosa oleh jaringan perifer. Di samping gangguan metabolisme karbohidrat, DM juga mempengaruhi metabolisme protein dan lemak. Asam amino terpaksa dikonversi menjadi glukosa. Ketosis merupakan salah satu gangguan metabolisme asam lemak. Ketosis terjadi dengan meningkatnya metabolisme trigliserida yang diikuti oleh kelebihan produksi keton bodies dan kolesterol (Brody, 1999).

Hal-hal di atas ditandai oleh *polyurea*, *polydipsia*, *polyphagia* dan penurunan berat badan. Bila kadar glukosa darah naik di atas 180 mg/dl, ginjal tidak dapat menahan lagi, sebagian glukosa dibuang ke urin sehingga kadar gula urin menjadi tinggi dan menarik air banyak (osmolitas gula). Akibat penarikan air yang banyak, volume urin berlebih, oleh sebab itu penderita DM sering kencing (*polyurea*). Keadaan tersebut akan mengganggu neraca air di dalam tubuh, dimanifestasikan oleh rasa haus terus-menerus (*polydipsia*). Pada waktu yang bersamaan, meskipun kadar gula darah berlebih, tetapi tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi sel (*glucosetorred state*) sehingga terjadi perasaan lapar yang berlebih (*polyphagia*). Oleh karena tubuh harus memecah protein atau lemak untuk memenuhi kebutuhannya, maka DM selalu berakibat pada terjadinya penurunan berat badan.

Dalam jaman urban seperti sekarang, terdapat peningkatan jumlah penderita penyakit DM. Tidak dipungkiri, asupan nutrisi menjadi faktor resiko utama gaya hidup yang dapat mencetuskan *non-communicable disease* ini. Diet yang tidak baik, dibarengi dengan aktivitas fisik yang minim merupakan faktor resiko terbesar dari penyakit kardiovaskular DM tipe 2 dan beberapa tipe kanker yang saat ini merupakan isu hangat global akibat tingginya angka kematian dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit ini (Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dkk. 2008).

Diet yang patut dipantau dalam pencegahan dan pengendalian DM adalah diet yang mengandung karbohidrat. Diet tinggi karbohidrat yang tinggi juga akan meningkatkan kadar glukosa darah. Diet tinggi karbohidrat yang tinggi juga akan meningkatkan kadar glukosa darah. Karbohidrat merupakan komponen utama yang

dapat mempengaruhi sekresi insulin dan postprandial glikemik, sehingga dapat diimplikasikan sekresi insulin dan postprandial glikemik, sehingga dapat diimplikasikan bahwa terdapat hubungan antara jumlah dan tipe karbohidrat yang dikonsumsi dengan penyakit DM.

H. Tinjauan Islam

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang ahl di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini tidak serta merta tanpa adanya maksud dan tujuannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 191 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (QS. Ali Imran (3) : 191 ” (Departemen Agama RI. 2010).

Menurut tafsiran dari Quraish Shihab tentang QS. Ali Imran ayat 191 mengatakan bahwa telah menjadi ciri Ulu Al-Albab bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah SWT dalam hati dimanapun mereka

berada dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Mereka selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi dan keunikan yang terkandung di dalamnya sambil berkata “Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan dibalik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptakan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu. Hindarkanlah kami dari siksa neraka, dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintah-Mu (Shihab, Quraish. 2009).

Berdasarkan tafsiran di atas dapat saya hubungkan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak ada yang sia-sia, seperti halnya bonggol pisang. Allah SWT menciptakan bonggol pisang ini pasti ada manfaatnya untuk manusia. Bonggol pisang yang selama ini dijadikan limbah oleh masyarakat ternyata memiliki berbagai macam keuntungan bagi manusia contohnya dalam pengembangan pangan terhadap penderita diabetes melitus tipe 2. Selain itu, pemanfaatan bonggol pisang yang lain adalah pengembangan bioetanol yang berguna bagi peneliti bahkan masyarakat. Maka dari itu, peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang indeks glikemik bonggol pisang yang nantinya bisa bermanfaat bagi para penderita DM di Indonesia yang kian marak saat ini.

Selain itu, Allah berfirman pada Surah Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرْدُهُ مُصْفًرًا ثُمَّ جَعَلَهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Artinya :


“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal (Q.S az-Zumar : 21)” (Departemen Agama RI. 2010).

Menurut tafsiran dari Quraish Shihab tentang QS. Az-Zumar ayat 21 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu, wahai orang yang menerima seruan agama, bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu mengalirkannya dalam bentuk mata air di dalam perut bumi. Dia kemudian menumbuhkan tanaman pertanian yang bentuknya sangat beragam lalu menjadi kering dan kuning setelah sebelumnya hijau. Setelah itu, Dia menjadikannya terpecah berkeping-keping. Sungguh, dalam proses perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu, terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal yang cemerlang (Shihab, Quraish. 2009).

Sesuai dengan arti dan tafsiran dari Quraish Shihab, hendaknya manusia mengambil manfaat dari tanaman-tanaman yang telah diciptakan-Nya baik yang termasuk buah berbuah atau tidak. Karena, manusia adalah khalifah di bumi yang seharusnya belajar dan berfikir tentang kandungan yang sudah ada pada tanaman dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Sehingga, segala yang diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini bisa bermanfaat baik bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Selain itu, sekarang masyarakat terpaku pada makanan pokok yaitu beras, namun pada penderita diabetes pengonsumsi beras perlu dibatasi. Maka dari ayat tersebut menjelaskan pula bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh terpaku pada

satu makanan pokok saja karena terdapat berbagai macam-macam tanaman yang ada di muka bumi ini yang dapat bermanfaat bagi manusia dan setiap fase dari pertumbuhan tanaman tersebut mempunyai manfaat tersendiri. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan bonggol pisang yang notaben sampah/limbah karena sering dibuang diharapkan dapat bermanfaat bagi para penderita diabetes mellitus dan penderita obesitas yang tengah menjalani proses diet.

Selain itu, Allah juga berfirman pada surah Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi:



Artinya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Q.S Asy-Syu'ara : 7)” (Departemen Agama RI. 2010).

Menurut tafsiran dari Quraish Shihab tentang QS. Asy-Syu'ara ayat 7 mengatakan bahwa adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahaesa dan Mahakuasa.

Berdasarkan dari arti dan tafsiran Quraish Shihab dapat kita ambil pelajaran dari ayat tersebut bahwa segala tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan di muka bumi ini mempunyai manfaat yang besar bagi umat manusia. Seperti halnya bonggol pisang yang hanya dijadikan limbah ternyata mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan diharapkan dapat menjadi bahan pangan alternatif yang sehat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (Sugiyono. 2013).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni - Agustus 2017 di Laboratorium Farmaseutika, Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmaseutika Fakultas Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar .

B. *Pendekatan Penelitian*

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mendekati ke arah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pohon pisang ambon, raja, dan kepok yang diperoleh di Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari pohon pisang yaitu bonggol pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), bonggol pisang kepok (*Musa paradisiaca* var. *formatipyca*) dan bonggol pisang (*Musa paradisiaca* var. *raja*) berusia 3 bulan masing-masing 10 kg.

D. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data

1. Alat yang digunakan

Peralatan yang digunakan yaitu ayakan mesh 60, baskom, batang pengaduk, blender, cawan porselin, dot tikus, gelas kimia, gelas ukur, glukometer, kandang tikus, lumpang alu, neraca analitik, oven, pinset, pisau, rang tikus, dan spoit 1 dan 5 ml.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah bonggol pisang ambon 10 kg, bonggol pisang kepok 10 kg, bonggol pisang raja 10 kg, kertas perkamen, strip glukometer, dan *tissue*.

3. Hewan Coba yang digunakan

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih (*Rattus norvegicus*) berkelamin jantan berumur 2-3 bulan dengan berat 200 – 250 g.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Penyiapan Sampel

Sampel penelitian diambil di Soppeng, Sulawesi Selatan sebanyak 10 kg basah, kemudian dibersihkan dari kotoran dan dicuci dengan air mengalir,

setelah itu di potong tipis-tipis dengan ketebalan $\pm 0,5$ cm dengan pisau, lalu dicuci kembali sampai benar-benar bersih, kemudian direndam dengan larutan natrium bisulfit 1000 ppm selama 30 menit, setelah itu ditiriskan. Kemudian ditimbang masing-masing 1 kg bonggol pisang basah (ambon, kepok dan raja), lalu bonggol pisang dididihkan dalam oven selama 17 jam pada suhu 70°C hingga kering. Setelah itu diblender dan diayak pada mesh 60 hingga didapatkan tepung bonggol pisang.

2. Perlakuan Pada Hewan Uji

- a. Tikus diadaptasi terlebih dahulu selama seminggu serta diberi makan dan minum secara *ad libitum*.
- b. Tikus dipuasakan dari makanan selama 10 jam (kecuali air).
- c. Diukur kadar gula puasa tikus
- d. Tikus dikelompokkan menjadi 5 kelompok dipilih secara acak masing-masing terdiri dari 3 ekor. Perlakuan masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :

Kelompok I : Pemberian NaCMC 0,1% 0,5 ml

Kelompok II : Pemberian glukosa murni dosis 2,5 g/kgBB

Kelompok III : Pemberian bonggol pisang ambon dosis 2,5 g/kgBB

Kelompok IV : Pemberian bonggol pisang kepok dosis 2,5 g/kgBB

Kelompok V : Pemberian bonggol pisang raja dosis 2,5 g/kgBB

- e. Semua sampel diberikan secara oral satu kali dalam Na CMC 0,1% (disuspensikan).
- f. Diberikan sampel uji kepada masing-masing kelompok hewan uji sesuai dengan perlakuan masing-masing kelompok.
- g. Setelah pemberian sampel uji, diukur kadar glukosa pada menit ke 30, 60 dan 120.

3. Pengukuran Kadar Glukosa Darah

Darah diambil dari bagian ujung ekor tikus dengan cara dipotong sedikit ujung ekor tikus dengan gunting yang telah dibersihkan dengan alkohol 70%. Tetesan darah yang keluar kemudian ditempelkan pada strip glukometer. Kadar glukosa darah akan terukur dan nampak pada layar glukometer setelah 10 detik, dinyatakan dalam mg/dl (Prakoso, dkk. 2016).

4. Penentuan Indeks Glikemik

Kadar glukosa darah setelah pemberian bonggol pisang dan glukosa pada menit ke-0, 30, 60 dan 120 digambarkan pada grafik kadar glukosa darah lawan waktu menggunakan Ms. Excel. Kadar glukosa darah sampel bonggol pisang yang terhitung adalah kadar glukosa darah bonggol pisang dikurangi kadar glukosa pemberian NaCMC 0,1%. Setelah itu lakukan perhitungan nilai AUC masing-masing sampel dengan metode *Trapezoid Method*.

$$\text{Luas AUC}_{(t1-t0)} = \Sigma \left(\frac{a+b}{2} \times t \right)$$

$$\text{Luas AUC}_{(t2-t1)} = \Sigma \left(\frac{b+c}{2} \times t \right), \text{ dst}$$

$$\text{AUC Total} = \text{Luas AUC}_{(t1-t0)} + \text{Luas AUC}_{(t2-t1)} + \text{dst} \dots$$

Keterangan :

a dan b = dua sisi sejajar, yaitu kadar glukosa darah antar dua periode pengukuran (mg/dL)

t = tinggi, yaitu jarak periode pengukuran kadar glukosa darah (jam)

Untuk memperoleh nilai indeks glikemik bonggol pisang adalah dengan cara membandingkan luas *Area Under Curve* (AUC)0-2 bonggol pisang dengan (AUC)0-2 glukosa.

$$IG = \frac{\text{AUC Bonggol pisang}}{\text{AUC glukosa}} \times 100$$

Keterangan :

IG : indeks glikemik

AUC : *Area Under Curve*

Setelah mendapat nilai indeks glikemiknya, selanjutnya ditentukan kategori indeks glikemiknya dimana IG rendah yaitu <55, IG sedang berkisar antara 55-69 dan IG tinggi ≥ 70 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Pembuatan Tepung Bonggol Pisang

Hasil pembuatan tepung bonggol pisang ambon, kepok dan raja sebanyak 1 kg basah yang dioven dengan suhu 70°C kemudian diblender dan diayak dengan menggunakan mesh 60 sehingga ukuran partikel masing-masing bonggol pisang sama. Berat tepung masing-masing bonggol pisang yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Berat tepung bonggol pisang yang diperoleh

Sampel	Berat Awal	Berat Kering	Berat Tepung
Ambon	1 kg	60.8 g	57.5 g
Kepok	1 kg	61.2 g	58.6 g
Raja	1 kg	60.5 g	57.3 g

2. Hasil Pengukuran Kadar Glukosa

Tepung bonggol pisang ambon, kepok dan raja dibuat suspensi dengan menggunakan pensuspensi NaCMC 0,1% kemudian diinduksikan kepada tikus putih (*Rattus novergicus*) lalu dihitung kadar glukosanya. Sampel yang digunakan yaitu glukosa sebagai kontrol positif, NaCMC sebagai kontrol negatif, dan bonggol pisang sebagai sampel. Adapun hasil pengukuran kadar glukosa tikus dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Kadar glukosa tikus pada menit 0, 30, 60 dan 120

Sampel		Kadar Glukosa (mg/dl)			
		0' menit	30' menit	60' menit	120' menit
Glukosa	1	82.9	118.9	115.3	99.1
	2	77.5	138.7	124.9	100.9
	3	88.3	99.1	102.7	82.9
	Rata-rata	82.9	118.9	114.3	94.3
NaCMC	1	70.3	93.7	75.7	61.7
	2	68.5	106.3	75.7	81.1
	3	64.7	82.9	73.9	68.5
	Rata-rata	67.8	94.3	75.1	70.4
Ambon	1	77.5	104.5	82.9	86.5
	2	81.1	99.1	81.1	61.3
	3	61.3	95.5	91.1	106.3
	Rata-rata	73.3	99.7	85.03	84.7
Kepok	1	90.1	99.1	79.3	61.3
	2	63.1	90.1	75.7	68.5
	3	84.7	111.7	100.9	88.3
	Rata-rata	79.3	100.3	85.3	72.7
Raja	1	90.1	95.5	75.7	66.6
	2	95.5	110.7	91.9	75.7
	3	84.7	111.7	109.9	79.3
	Rata-rata	90.1	105.9	92.5	73.9

3. Hasil Perhitungan Nilai AUC Sampel

Nilai AUC masing-masing sampel didapatkan dengan menggunakan metode *Trapezoid Method*. Hasil perhitungan nilai AUC masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Nilai AUC Sampel dengan *Trapezoid method*

Sampel	Nilai AUC
Glukosa	57.41

Ambon	18.66
Kepok	14.66
Raja	26.18

4. Hasil Indeks Glikemik Sampel Bonggol Pisang

Nilai indeks glikemik sampel ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu dengan membandingkan nilai AUC sampel yang telah didapatkan sebelumnya dengan nilai AUC glukosa kemudian dikalikan 100. Berdasarkan nilai indeks glikemik yang didapatkan kemudian ditentukan kategori masing-masing bonggol pisang dimana nilai indeks glikemik ≤ 55 merupakan indeks glikemik rendah, nilai IG 55-69 merupakan IG sedang, dan nilai IG ≥ 70 merupakan IG tinggi. Adapun hasil indeks glikemik masing-masing bonggol pisang dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Kategori indeks glikemik masing-masing bonggol pisang

Sampel	Nilai Indeks Glikemik	Kategori
Glukosa	100	Tinggi
Ambon	32.5	Rendah
Kepok	25.5	Rendah
Raja	45.6	Rendah

B. Pembahasan

Bonggol pisang merupakan limbah tanaman pisang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan bonggol pisang selama ini adalah untuk pembuatan pupuk dan sabun dengan cara dibakar sampai menjadi abu. Air bonggol pisang dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti

disentri, pendarahan usus, amandel serta menghitamkan rambut. Namun dibalik penggunaannya sebagai limbah, bonggol pisang ternyata mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi yang lengkap (Badan Litbang Pertanian, 2013).

Bonggol pisang mempunyai kadar serat yang cukup tinggi, dimana serat yang tinggi erat kaitannya dengan rendahnya indeks glikemik. Dimana serat dapat memperlambat laju makanan pada saluran pencernaan dan menghambat enzim pencernaan sehingga proses pencernaan menjadi lambat dan respon glukosa darahpun akan lebih rendah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti indeks glikemik dari bonggol pisang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bonggol pisang yang banyak dijumpai oleh masyarakat yaitu bonggol pisang ambon, kepok dan raja yang diambil di daerah Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Bonggol pisang yang diambil merupakan bonggol pisang pasca panen yaitu setelah panen, bonggolnya langsung diambil. Langkah awal pembuatan tepung bonggol pisang adalah dibersihkan terlebih dahulu bonggol pisang dengan air mengalir kemudian dipotong menjadi bagian kecil-kecil sehingga luas permukaan sampel menjadi besar dan proses pengeringan lebih cepat. Setelah dipotong menjadi kecil-kecil, bonggol pisang sebanyak 1 kg tersebut direndam dengan menggunakan natrium bisulfit 1000 ppm selama 30 menit untuk menghilangkan getah bonggol pisang. Bonggol pisang kemudian dioven pada suhu 70°C selama 17 jam untuk mengurangi kadar air pada sampel agar hasil kualitas tepung yang dihasilkan bagus. Setelah bonggol pisang menjadi kering, bobot kering bonggol pisang yang tersisa yaitu sebanyak 60,8 g untuk bonggol pisang ambon, 61,2 g untuk bonggol pisang kepok dan 60,5 g untuk

pisang raja. Bonggol pisang yang sudah kering tersebut kemudian diblender menjadi halus, setelah itu diayak menggunakan ayakan mesh 60 untuk menyamakan ukuran partikel ketiga bonggol pisang. Setelah itu, ditimbang bobot akhir tepung bonggol pisang dimana untuk bonggol pisang ambon yaitu sebanyak 57,5 g; bonggol pisang kepok sebanyak 58,6 g; dan pisang raja sebanyak 57,3 g.

Tepung bonggol yang dihasilkan pada tahap penyiapan sampel, kemudian ditimbang masing-masing 2,5 g. Pada penelitian ini digunakan glukosa sebagai kontrol positif dan NaCMC sebagai kontrol negatif dan sebagai pensuspensi sampel yang akan diujikan. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran kadar glukosa dimana menggunakan hewan coba tikus putih (*Rattus norvegicus*) berkelamin jantan karena kondisi biologis tikus jantan lebih stabil dibandingkan betina. Tikus yang akan digunakan diadaptasikan selama 7 hari agar menghindari efek stress karena berada di lingkungan yang baru. Sebelum penginduksian dilakukan, tikus dipuaskan terlebih dahulu selama 10 jam agar kondisi tikus sama dan mengurangi pengaruh makanan yang dikonsumsi terhadap absorpsi sampel yang diberikan. Sesudah dipuaskan, bobot tikus terlebih dahulu ditimbang untuk menghitung dosis pemberian serta volume pemberiannya. Setelah itu, dihitung kadar glukosa puasa pada tikus, kemudian diinduksikan sampel kepada masing-masing kelompok tikus. Selanjutnya dihitung kadar glukosa tikus pada menit 30, 60 dan 120 setelah pemberian sampel. Pengukuran dilakukan selama 2 jam dikarenakan proses metabolisme glukosa terjadi pada 2 jam pertama. Hasil yang diperoleh pada pengukuran glukosa 0-2 jam setiap sampel adalah untuk kontrol positif (glukosa), pada menit ke-0 (GDP)-nya 82,9 mg/dl, pada menit ke-30 terjadi peningkatan kadar

glukosa dimana diperoleh 118,9 mg/dl, pada menit ke-60 kadar glukosa yang diperoleh menurun menjadi 114,3 mg/dl dan pada menit ke-120 juga kadar glukosanya turun menjadi 94,3 mg/dl. Untuk kontrol negatif (NaCMC) hasil yang diperoleh adalah pada menit ke-0 diperoleh 67,8 mg/dl, pada menit ke-30 terjadi peningkatan menjadi 94,3 mg/dl, pada menit ke-60 terjadi penurunan menjadi 75,1 mg/dl, dan pada menit ke-120 kembali mengalami penurunan menjadi 70,4 mg/dl. Selanjutnya untuk sampel bonggol pisang ambon, hasil yang diperoleh adalah pada menit ke-0 diperoleh 73,3 mg/dl lalu pada menit ke-30 terjadi peningkatan menjadi 99,7 mg/dl, terus pada menit ke-60 terjadi penurunan menjadi 85,03 mg/dl dan pada menit ke-120 juga terjadi penurunan menjadi 84,7 mg/dl. Untuk sampel bonggol pisang kepok, pada menit ke-0 yaitu 79,3 mg/dl lalu pada menit ke-30 terjadi peningkatan menjadi 100,3 mg/dl, pada menit ke-60 terjadi penurunan menjadi 85,3 mg/dl, dan pada menit ke-120 terjadi penurunan lagi menjadi 72,7 mg/dl. Untuk sampel bonggol pisang raja, pada menit ke-0 diperoleh 90,1 mg/dl, pada menit ke-30 terjadi peningkatan menjadi 105,9 mg/dl, pada menit ke-60 terjadi penurunan menjadi 92,5 mg/dl dan pada menit ke-120 terjadi penurunan menjadi 73,9 mg/dl.

Tahap selanjutnya setelah diketahui respon glukosa masing-masing sampel, langkah selanjutnya adalah perhitungan nilai *Area Under Curve* (AUC) untuk merefleksikan total kenaikan level glukosa darah setelah pemberian sampel. Perhitungan nilai AUC menggunakan metode *Trapezoid method* dengan rumus :

$$\text{Luas AUC}_{(t_1-t_0)} = \Sigma \left(\frac{a+b}{2} \times t \right)$$

$$\text{Luas AUC}_{(t_2-t_1)} = \Sigma \left(\frac{b+c}{2} \times t \right), \text{ dst}$$

$$\text{AUC Total} = \text{Luas AUC}_{(t_1-t_0)} + \text{Luas AUC}_{(t_2-t_1)} + \text{dst...}$$

Keterangan :

- a = kadar glukosa sampel menit ke-0 (mg/dl)
- b = kadar glukosa sampel menit ke-30(mg/dl)
- c = kadar glukosa sampel menit ke-60(mg/dl), dst
- t = interval waktu (jam)

AUC = *Area Under Curve*

Sebelum menghitung nilai AUC sampel, kadar glukosa bonggol pisang dikurangi dengan kadar glukosa NaCMC untuk mengetahui kadar glukosa darah tepung bonggol pisang dan glukosa yang terhitung. Hasil yang diperoleh untuk perhitungan AUC adalah untuk sampel glukosa diperoleh nilai AUC total 57,41; untuk sampel bonggol pisang ambon diperoleh nilai AUC total 18,66; untuk sampel bonggol pisang kepok diperoleh nilai AUC total yaitu 14,66 dan untuk sampel bonggol pisang raja diperoleh nilai AUC total yaitu 26,18.

Setelah diperoleh nilai AUCnya, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks glikemik sampel dengan membandingkan nilai AUC sampel dengan nilai AUC glukosa. Indeks glikemik berguna dalam menentukan jumlah dan jenis pangan sumber karbohidrat dalam upaya mengendalikan glukosa darah. Karbohidrat dicerna dan diabsorpsi dengan kecepatan yang berbeda sehingga memberikan efek yang berbeda pula terhadap kenaikan kadar glukosa darah. Kategori indeks glikemik yang diperoleh terbagi dalam 3 jenis yaitu indeks glikemik rendah dengan nilai <55 , indeks glikemik sedang rentangnya 55-69, dan indeks glikemik tinggi dengan nilai $IG \geq 70$. Adapun hasil yang diperoleh yaitu pada sampel glukosa diperoleh nilai indeks glikemik sebesar 100 dimana termasuk dalam

indeks glikemik tinggi. Untuk sampel tepung bonggol pisang ambon diperoleh nilai indeks glikemik 32,5; sampel tepung bonggol pisang kepok IG 25,5 dan sampel bonggol pisang raja IG 45,6; dimana dapat disimpulkan bahwa semua sampel merupakan sampel dengan nilai indeks glikemik rendah. Hal ini disebabkan karena bonggol pisang mempunyai kadar serat pangan yang cukup tinggi (Saragih, 2013) dimana serat pangan yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya indeks glikemik suatu bahan pangan. Berdasarkan penelitian (saragih,2013), kepok memiliki kadar serat tertinggi (29,62%) dibandingkan dengan bonggol pisang varietas yang lain yaitu Ambon (24,06%) dan Raja (19,11%), hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini dimana nilai indeks glikemik terendah adalah bonggol pisang kepok. Pangan yang memiliki nilai IG rendah optimal dalam mengendalikan glukosa darah pada penderita DM tipe 2 karena tidak mengakibatkan pelonjakan kadar glukosa darah sehingga dapat menekan terjadinya resistensi insulin. Selain DM tipe 2, berdasarkan penelitian (Pediatris,2009) bahwa mengkonsumsi pangan dengan indeks glikemik rendah dapat menurunkan kadar fruktosamin metabolik pasien diabetes mellitus tipe 1, dimana tes fruktosamin merupakan tes yang mengindikasikan kadar gula darah pada selang waktu 2-3 minggu. Selain itu, pangan yang memiliki nilai indeks glikemik yang rendah juga bermanfaat bagi orang yang melakukan diet karena dapat menekan rasa lapar sehingga efektif untuk seseorang yang menjalani diet.

Hubungan konsep indeks glikemik yang diteliti dengan ayat Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 191 membuktikan bahwa memang benar Allah menciptakan sesuatu pasti tidak sia-sia dan memiliki maksud dan tujuan tertentu, tidak semerta-

merta begitu saja melainkan pasti mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Dimana, bonggol pisang yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, ternyata memiliki manfaat yang besar khususnya bagi penderita diabetes mellitus maupun masyarakat yang sedang melakukan diet guna untuk kesehatan. Maka dari itu, sebagai manusia kita patut bersyukur atas semua penciptaan Allah SWT, maha benar Allah atas segala firman-Nya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai indeks glikemik tepung bonggol pisang ambon sebesar 32,5; untuk tepung bonggol pisang kepok sebesar 25,5; dan tepung bonggol pisang raja sebesar 45,6.
2. Ketiga tepung bonggol pisang tersebut termasuk dalam kategori pangan berindeks glikemik rendah (IG rendah <55)

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang indeks glikemik dengan membuat produk yang bahan dasarnya menggunakan tepung bonggol pisang sebagai pangan fungsional.



KEPUSTAKAAN

- American Diabetes Association. 2015. *Standards Of Medical Care In Diabetes 2015*. The Journal of Clinical and Applied Research and Education.
- Argasasmita, T.U. 2008. *Karakterisasi Sifat Fisikokimia Dan Indeks Glikemik Varietas Beras Beramilosa Rendah Dan Tinggi*. Bogor : Fakultas Teknologi Pertanian IPB.
- Astawan, M. dan T. Wresdiyati. 2004. *Diet sehat dengan makanan berserat. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo*.
- Astawan, M. dan S. Widowati. 2006. *Evaluasi Mutu Gizi dan Indeks Glikemik Ubi Jalar sebagai Dasar Pengembangan Pangan Fungsional*. Laporan Penelitian RUSNAS, Bogor.
- Badan Litbang Pertanian. 2013. *Jajar Legowo*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Campbell, B. 2010. *Glycemic Load Vs Glycemic Index*, Pape of National Strength & Conditioning Association 1-5.
- Canadian Diabetes Association. 2013. *The Glycemic Index Clinical Practice Guideline*. Canada.
- Chung, H.J., H.S. Lim, and S.T. Lim. 2006. *Effect Of Partial Gelatinization And Retrogradation On The Enzymatic Digestion Of Waxy Rice Starch*. J. Cereal Sci. 43: 353-359.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta : Lentera Hati
- Dhital, S., A.K. Shrestha, and M.J. Gidley. 2010. *Relationship between granule size and in vitro digestibility of maize and potato starches*. Carbohydrate Polymers 82(2): 480-488.
- Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2008. *Pedoman Pengendalian Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Elly dan Sarinah Amirullah. 1985. *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*. Jakarta : PT Pradyna Paramita.

- Englyst, H.N and J.H, Cummings. 1985. *Digestion of the Polysacharides of Some Cereal Foods in The Human Small Intestine*. Am. J. Clin.Nutr 34: 211-217
- FAO/WHO. 1998. *Carbohydrates in human nutrition: the role of the glycemic index in food choice*. FAO Food and Nutrition. Rome : Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation.
- Fernandes, G.A. Velangi, and T.M.S. Wolever. 2005. *Glycemic Index Of Potatoes Commonly Consumed*. North America : J. Am. Diet. Assoc. 105: 557-562.
- Frei, M., P. Siddhuraju, and K. Becker. 2003. *Studies On Thein Vitro Starch Digestibility And The Glycemic Index Of Six Different Indigenous Rice Cultivars From The Philippines*. Food Chem. 83(2003): 395-402.
- Haliza, W., E.Y. Purwani, dan S. Yuliani. 2006. *Evaluasi Kadar Pati Tahan Cerna Dan Nilai Indeks Glikemik Mi Sagu*. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan XVII(2): 149-152.
- Hasan, V., S. Astuti, dan Susilawati. 2011. *Indeks Glikemik Dalam Pengendalian Kadar Glukosa Darah*. Jurnal Teknologi Industri dan Pertanian.
- Hoerudin. 2012. *Indeks Glikemik Buah dan Implikasinya Dalam Pengendalian Kadar Glukosa Darah*. Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian 8(2): 80-98.
- Jenkins, D.J.A., C.W.C, Kendall, L.S.A, Augustin, S. 2002. *Glycemic Indx : Overview of Implication in Health and Disease*. Am. J. Clin. Nutr. 76(Suppl.): 266S-273S
- Jenkins, D.J.A., T.M.S. Wolever, R.H. Taylor, H. Barker, H. Fielden, J.M. Baldwin, A.C. Bowling, H.C. Newman, A.L. Jenkins, and D.V. Goff. 1981. *Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange*. Am. J. Clin. Nutr. 34: 362-366 .
- Jenkins, D.J.A, Wolefer, T.M.S & Jenkins, A.L., 1984. *The Glycemic Response to carbohidrat Foods, Lancet, 2 : 388-391*
- Jongsoon Lee, Paul. F. Pilch. 1994. *The Insulin Receptor: Structure, Function and Signaling*. Departemen of Biochemistry Boston University School of Medicine.
- Krinke, G. J. 2000. *The Laboratory Rat*. San Diego, CA: Academic Press. Hal : 150-152


- Kumar, E.k., Ramesh, A., Kasisviwanath, R. 2005. *Hypoglycemic and Antihyperglycemic Effect of Gmelina asiatica Linn. In Normal and in Alloxan Induced Diabetic Rats*. USA : Department of Pharmaceutical Sciences
- Margareth, Julia. 2006. *Evaluasi Mutu Gizi dan Indeks Glikemik Produk Olahan Goreng Berbahan Dasar Tepung Ubi Jalar (Ipomea batatas L.) Klon BB00102.10*. Bogor : FTP IPB
- Marks DB, Marks AD, Smith CM. 2012. *Biokimia Kedokteran Dasar : Sebuah Pendekatan Klinis*. Jakarta : EGC
- Marsono, Y., P. Wiyono, dan Z. Noor. 2002. *Indeks Glikemik Kacang-Kacangan*. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan 13(3): 13-20.
- Marsono, Y. 2004. *Serat Pangan Dalam Perspektif Ilmu Gizi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Meyer, L.H. 1973. *Food Chemistry*. New Delhi : Affiliated East West PVT Ltd.
- Muchtadi, D. 2001. *Sayuran Sebagai Sumber Serat Untuk Mencegah Timbulnya Penyakit Degeneratif*. Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian 21: 61-71.
- Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW. 2014. *Biokimia Harper Edisi 29*. Jakarta : EGC
- Nisviaty, A. 2006. *Pemanfaatan Tepung Ubi Jalar Klon bb00105.10 Sebagai Bahan Dasar Produk Olahan Kukus Serta Evaluasi Mutu Gizi dan Indeks Glikemiknya*. Bogor : Fakultas Teknologi Pertanian IPB
- Nofalina, Y. 2013. *Pengaruh Penambahan Tepung Terigu Terhadap Daya Terima, Kadar Karbohidrat Dan Kadar Serat Kasar Kue Prol Bonggol Pisang (Musa paradisiaca)*
- Prabawati, S., Suyanti dan Setyabudi. 2008. *Teknologi Pascapanen dan Teknik Pengolahan Buah Pisang*. Wisnu Broto Balai Besar Penerbitan dan Pengembangan Pertanian.
- Prakoso, L., Mambo, Mambo C., Wowor, M. 2016. *Uji Efek Ekstrak Buah Okra (Abelmoschus esculentus) Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Aloksan*. Manado : UNISRAT
- Puspita, Ika Sari dkk. 2013. *Indeks Glikemik Uwi, Gadung, dan Talas Yang Diberikan Pada Tikus*. Jurnal Pengobatan Tradisional. Yogyakarta : UGMrudito

- Rimbawan dan A. Siagian. 2004. *Indeks Glikemik Pangan, Cara Mudah Memilih Pangan yang Menyehatkan*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rosdiana, R. 2009. *Pemanfaatan Limbah dari Tanaman Pisang*. Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Rudito, A., Syauqi, E., Obeth, W., Yuli. 2010. *Karakteristik Pati Bonggol Pisang Termodifikasi Secara Kimia Sebagai Food Ingredient Alternatif*. Prosiding Seminar Nasional Industrialisasi dan Komersial Produk Pangan Lokal Dalam Menunjang Penganekaragaman dan Ketahanan Pangan Fakultas Pertanian. Universitas Mulawarman.
- Rukmana, R. 2005. *Bertanam Sayuran di Pekarangan*. Yogyakarta : Kanisius
- Saragih, B., 2013. *Analisis Mutu Tepung Bonggol Pisang dari Berbagai Varietas dan Umur Panen yang Berbeda* vol. 9. Samarinda : Universitas Mulawarman
- Sarath, E. 2015. *Metabolism : Carbohydrate*. [Internet]. [Manchester University] diakses pada 11 Oktober 2017. Tersedia pada : <http://www.fastbleep.com/>
- Sardesai, V.M. 2003. *Introduction to Clinical Nutrition*. Marcel Dekker Inc., New York. pp. 339-354.
- Satuhu, Suyanti, dkk. 2008. *Pisang : Budidaya, Pengolahan dan Prospek Pasar*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Satuhu, S. & Supriyadi, A., 1992, *Pisang Budi Daya Pengolahan dan Prospek Pasar*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati
- Smith, Mangkoewijoyo, S. 1998. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis Edisi 1*. J. Clin Cell Immunol 2:105
- Soegondo, S. 2011. *Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Melitus Terkini dalam : Soegondo, Subekti, Editor. Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu bagi Dokter Maupun Edukator Diabetes*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Sumardjo, D. 2009. *Pengantar Kimia : Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioekstra*. Jakarta : EGC
- Sundari, Fifit. 2014. *Pengukuran Nilai Indeks Glikemik Cookies Tepung Talas Belitung (Xanthosoma sagittifolium)*. Medan : USU


- Tjitrosoepomo, Gembong. 2001. *Morfologi Tumbuhan Cetakan 13*. Yogyakarta : UGM Press
- Trinidad, T.P., A.C. Mallillin, R.S. Sagum, and R.R. Encabo. 2010. *Glycemic Index Of Commonly Consumed Carbohydrate Foods Philippines* : J. Functional Foods 2: 271-274.
- Utami, P. 2008. *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta : Agromedia Pustaka
- Waldon, D.J. 2008. *Pharmacokinetics and Drug Metabolism*. Cambridge : Amgen, Inc , One Kendall Square, Building 1000, USA.
- Widowati, S. 2007. *Pemanfaatan Ekstrak Teh Hijau (Camellia Sinensis O. Kuntze) Dalam Pengembangan Beras Fungsional Untuk Penderita Diabetes Melitus*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Willet, W., J. Manson, and S. Liu. 2002. *Glycemic Index, Glycemic Load and Risk of type 2 Diabetes*. Am. J. Clin. Nutr. 76(1): 274S-280S
- Wolever, TMS dan Mehling C. 2002. *High Carbohydrate Low Glycemic Index Dietary Advice Improves Glucose Disposition Index in Subject With Impaired Glucose Tolerance*. British Journal of Nutrition.
- World Health Organization and International Diabetes Federation. 2006. *Definition And Diagnosis Of Diabetes Mellitus And Intermediate Hyperglycemia*. Switzerland : WHO and International Diabetes Federation
- Zudaini, E. 1997. *Budidaya Pisang Raja*. Surabaya : Trubus Agrisarana

Lampiran 1. Skema Kerja

1. *Penyiapan Sampel*



2. Perlakuan Pada Hewan Uji



Lampiran 2. Hasil Perhitungan

1. Perhitungan Dosis dan Volume Pemberian Tikus

a. Bonggol Pisang Ambon

Dosis tepung bonggol pisang untuk tikus adalah 2,5 g/kgBB untuk berat 200 gram. Berat tikus dalam kelompok sampel bonggol pisang ambon adalah 200 g (2 ekor) dan 220 g (1 ekor). Tepung bonggol pisang 2,5 g disuspensikan dengan 20 ml NaCMC 0,1% .

$$\text{Dosis tikus} : \frac{\text{dosis bonggol pisang}}{1000 \text{ gram}} \times \text{berat tikus}$$

$$\text{Volume pemberian} : \frac{\text{dosis tikus}}{2,5 \text{ g/ 20ml}}$$

1) Berat Tikus 200 g

$$\text{Dosis tikus yang diberikan} : \frac{2,5 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 200 \text{ g} = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,5 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4 \text{ ml}$$

2) Berat Tikus 220 g

$$\text{Dosis tikus} : \frac{220 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 2,5 \text{ g/kgBB} = 2,75 \text{ g/kgBB}$$

$$\text{Dosis tikus yang diberikan} : \frac{2,75 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 220 \text{ g} = 0,605 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,605 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4,8 \text{ ml}$$

b. Bonggol Pisang Kepok

Dosis tepung bonggol pisang untuk tikus adalah 2,5 g/kgBB untuk berat 200 gram. Berat tikus dalam kelompok sampel bonggol pisang kepok adalah 210 g (2 ekor)

dan 220 g (1 ekor). Tepung bonggol pisang 2,5 g disuspensikan dengan 20 ml NaCMC 0,1% .

$$\text{Dosis tikus yang diberikan} : \frac{\text{dosis bonggol pisang}}{1000 \text{ gram}} \times \text{berat tikus}$$

$$\text{Volume pemberian} : \frac{\text{dosis tikus}}{2,5 \text{ g/ 20ml}}$$

1) Berat Tikus 210 g

$$\text{Dosis tikus} : \frac{210 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 2,5 \text{ g/kgBB} = 2,625 \text{ g/kgBB}$$

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,625 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 220 \text{ g} = 0,55 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,55 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4,4 \text{ ml}$$

2) Berat Tikus 220 g

$$\text{Dosis tikus} : \frac{220 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 2,5 \text{ g/kgBB} = 2,75 \text{ g/kgBB}$$

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,75 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 220 \text{ g} = 0,605 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,605 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4,8 \text{ ml}$$

c. Bonggol Pisang Raja

Dosis tepung bonggol pisang untuk tikus adalah 2,5 g/kgBB untuk berat 200 gram. Berat tikus dalam kelompok sampel bonggol pisang kepok adalah 200 g (1 ekor), 210 g (1 ekor) dan 220 g (1 ekor). Tepung bonggol pisang 2,5 g disuspensikan dengan 20 ml NaCMC 0,1% .

$$\text{Dosis tikus yang diberikan} : \frac{\text{dosis bonggol pisang}}{1000 \text{ gram}} \times \text{berat tikus}$$

$$\text{Volume pemberian} : \frac{\text{dosis tikus}}{2,5 \text{ g/ 20ml}}$$

1) Berat Tikus 200 g

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,5 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 200 \text{ g} = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,5 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4 \text{ ml}$$

2) Berat Tikus 210 g

$$\text{Dosis tikus} : \frac{210 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 2,5 \text{ g/kgBB} = 2,625 \text{ g/kgBB}$$

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,625 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 220 \text{ g} = 0,55 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,55 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4,4 \text{ ml}$$

3) Berat Tikus 220 g

$$\text{Dosis tikus} : \frac{220 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 2,5 \text{ g/kgBB} = 2,75 \text{ g/kgBB}$$

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,75 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 220 \text{ g} = 0,605 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} : \frac{0,605 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 4,8 \text{ ml}$$

d. Glukosa

Dosis glukosa untuk tikus adalah 2,5 g/kgBB untuk berat 200 gram. Berat tikus dalam kelompok sampel bonggol pisang kepok adalah 200 g (2 ekor) dan 230 g (1 ekor). Glukosa 2,5 g disuspensikan dengan 5 ml NaCMC 0,1% .

$$\text{Dosis tikus yang diberikan} : \frac{\text{dosis bonggol pisang}}{1000 \text{ gram}} \times \text{berat tikus}$$

$$\text{Volume pemberian} : \frac{\text{dosis tikus}}{2,5 \text{ g/ 5ml}}$$

1) Berat Tikus 200 g

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,5 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 200 \text{ g} = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} \quad : \frac{0,5 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 5ml}} = 1 \text{ ml}$$

2) Berat Tikus 230 g

$$\text{Dosis tikus} \quad : \frac{230 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 2,5 \text{ g/kgBB} = 2,875 \text{ g/kgBB}$$

$$\text{Dosis tikus yang diberikan: } \frac{2,875 \text{ g}}{1000 \text{ gram}} \times 230 \text{ g} = 0,66 \text{ g}$$

$$\text{Vol. pemberian} \quad : \frac{0,66 \text{ g}}{2,5 \text{ g/ 20ml}} = 1,3 \text{ ml}$$

2. Perhitungan Nilai AUC

a. Kepok

$$\text{AUC}_{(t1-t0)} = \left(\frac{11,5+6}{2} \times 0,5 \right) = \frac{17,5}{2} \times 0,5 = 4,375$$

$$\text{AUC}_{(t2-t1)} = \left(\frac{10,2+6}{2} \times 0,5 \right) = \frac{16,2}{2} \times 0,5 = 4,05$$

$$\text{AUC}_{(t3-t2)} = \left(\frac{2,27+10,2}{2} \times 1 \right) = \frac{12,47}{2} \times 1 = 6,235$$

$$\text{Jadi, AUC Total} = 4,375 + 4,05 + 6,235 = 14,66$$

b. Raja

$$\text{AUC}_{(t1-t0)} = \left(\frac{22,3+11,6}{2} \times 0,5 \right) = \frac{33,9}{2} \times 0,5 = 8,475$$

$$\text{AUC}_{(t2-t1)} = \left(\frac{17,4+11,6}{2} \times 0,5 \right) = \frac{29}{2} \times 0,5 = 7,25$$

$$\text{AUC}_{(t3-t2)} = \left(\frac{17,4+3,5}{2} \times 1 \right) = \frac{20,9}{2} \times 1 = 10,45$$

$$\text{Jadi, AUC Total} = 8,475 + 7,25 + 10,45 = 26,18$$

c. Ambon

$$AUC_{(t1-t0)} = \left(\frac{5.5+5.4}{2} \times 0.5 \right) = \frac{10.9}{2} \times 0.5 = 2.725$$

$$AUC_{(t2-t1)} = \left(\frac{5.4+9.93}{2} \times 0.5 \right) = \frac{(15.33)}{2} \times 0.5 = 3.8325$$

$$AUC_{(t3-t2)} = \left(\frac{14.27+9.93}{2} \times 1 \right) = \frac{(24.2)}{2} \times 1 = 12.1$$

$$\text{Jadi, AUC Total} = 2.725 + 3.8325 + 12.1 = 18.6575$$

d. Glukosa

$$AUC_{(t1-t0)} = \left(\frac{15.1+24.6}{2} \times 0.5 \right) = \frac{39.7}{2} \times 0.5 = 9.925$$

$$AUC_{(t2-t1)} = \left(\frac{39.2+24.6}{2} \times 0.5 \right) = \frac{(52.8)}{2} \times 0.5 = 15.95$$

$$AUC_{(t3-t2)} = \left(\frac{39.2+23.87}{2} \times 1 \right) = \frac{(63.07)}{2} \times 1 = 31.535$$

$$\text{Jadi, AUC Total} = 9.925 + 15.95 + 31.535 = 57.41$$

3. Perhitungan Nilai Indeks Glikemik

a. Ambon

$$IG = \frac{\text{AUC Bonggol pisang}}{\text{AUC glukosa}} \times 100 = \frac{18.66}{57.41} \times 100 = 32.5 \text{ (rendah)}$$

b. Kepok

$$IG = \frac{\text{AUC Bonggol pisang}}{\text{AUC glukosa}} \times 100 = \frac{14.66}{57.41} \times 100 = 25,5 \text{ (rendah)}$$

c. Raja

$$IG = \frac{\text{AUC Bonggol pisang}}{\text{AUC glukosa}} \times 100 = \frac{26,18}{57.41} \times 100 = 45.6 \text{ (rendah)}$$

Lampiran 3. Hasil Pembuatan Tepung Bonggol Pisang



(a)

(b)

(c)

Keterangan :

- a. Hasil pembuatan tepung bonggol pisang ambon
- b. Hasil pembuatan tepung bonggol pisang kepok
- c. Hasil pembuatan tepung bonggol pisang raja

Lampiran 4. Pengolahan Sampel

Pohon Pisang



Bonggol Pisang



Pemotongan Sampel



Perendaman dengan Natrium bisulfit

Penimbangan Bonggol
Pisang AmbonPenimbangan Bonggol
Pisang KepokPenimbangan Bonggol
Pisang Raja



Sampel Dimasukkan ke Oven



Sampel dikeringkan



Hasil Pengeringan Sampel



Sampel diblender



Sampel diayak



Hasil Ayakan



Berat Tepung Bonggol Pisang Ambon



Berat Tepung Bonggol Pisang Kepok



Berat Tepung Bonggol Pisang Raja

BIOGRAFI



RISKA ZAIN, lahir di Benteng pada tanggal 19 Juni 1996. Anak pertama dari pasangan Zairuddin dan Hamriani. Wanita yang gemar mendengarkan music ini mengenyam pendidikan bangku sekolah dasar di SDN Benteng 1 Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng dan telah lulus pada tahun 2007. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah pendidikan di SMP Negeri 1 Benteng dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu, melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Benteng dan lulus pada tahun 2013. Gadis yang dikenal sebagai pendiam oleh teman-temannya ini sebenarnya tidak begitu pendiam, malah sebaliknya. Tetapi sikap cerewetnya ini hanya ditunjukkan pada saat ia bersama dengan teman yang benar-benar akrab dan keluarga saja. Gadis yang mempunyai cita-cita sebagai seorang pengusaha dan penyanyi ini berhasil masuk ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi.

Anak pertama dari 8 bersaudara ini mempunyai angan yang sangat besar yaitu bersekolah setinggi-tingginya agar bisa membahagiakan orang tua serta bisa membantu perekonomian keluarga. Gadis yang sangat menyukai dunia kpop ini merupakan seorang *fangirl* dari sebuah boygrup besutan BigHit Ent. yaitu BTS yang mempunyai motto hidup “*love myself, love yourself and be yourself, do what you want not what they want*”.