

**SKRINING PARTISI-PARTISI DAN FRAKSI-FRAKSI LARUT ETIL ASETAT
DARI EKSTRAK METANOL DAUN BOTTO-BOTTO (*Chromolaena odorata* L.)
SEBAGAI *INHIBITOR* PERTUMBUHAN *Mycobacterium
tuberculosis***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi Jurusan
Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

St. Rahmah Akbar

70100113060

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Rahmah Akbar
NIM : 70100113060
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 21 September 1995
Jur./Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Barru
Judul : Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-fraksi Larut Etil Asetat dari Ekstrak Metanol Daun Betto-betto (*Chromolaena odorata* L.) sebagai *Inhibitor* Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gowa, Agustus 2017

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Pemulis,



St. Rahmah Akbar

NIM. 70100113060

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Skriming Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Larut Etil Asetat Dari Ekstrak Metanol Daun Batta-Batta (*Chromolaena odorata* L.) Sebagai *Inhibitor* Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*", yang disusun oleh St. Rahmah Akhar, NIM 70100113060, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanyakan dalam Ujian Sadang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M, yang bertempat di ruang 21 Daulqa'idah 14.38 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 Agustus 2017 M
21 Daulqa'idah 14.38 H

DIWAN PENGUJI

Ketua	Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	Dr. Nur Hubayah, S.Kep., Ns, M.Kes.	(.....)
Pembimbing I	Nursalim Ramadhani S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	Ismaty Jamali, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	Dr. Rosmida Ag., M.Th.	(.....)

ALAUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAKASSAR

Dep. Kes.
Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tiada terhingga kepadaNya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan.

Salam dan shalawat senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan utusan Allah, nabi besar Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang telah memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Semoga kita menjadi umatnya yang taat.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ‘sarjana’ di bidang pendidikan Sarjana. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai penunjang ilmu pengetahuan kedepannya dan bermanfaat bagi banyak orang. Banyak terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga rampungnya skripsi ini.

Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis yaitu **H.Akbar (Alm)** dan **Hj. Wahidah** yang telah melahirkan dan membesarkan saya, dan do’a ibu saya serta kesabaran, kegigihan, serta pengorbanan yang telah diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis sampai sekarang. Kepada Saudara Saya **Mahdi Mubarak Akbar S.S**, **St. Ruqaiyah Akbar S.E**, dan **Nur. Ridha Akbar** dan Sepupu saya **St. Zaenab Mukhtar S.Pd**, **Syihabuddin S.E** dan **Muhlisa** yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dan telah menjadi inspirasi dalam hidup penulis hingga selalu termotivasi untuk terus belajar hingga ke jenjang yang lebih tinggiserta seluruh keluarga besar yang selalu memberi motivasi, Kalian

adalah orang-orang di balik kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan di jenjang (S1). Kepada semua keluarga besar, teman-teman penulis yaitu tim botto-botto (Dilla dan dhiba), teman peneliti tuberkulosis (Nurhidayah Wahid) dan saudaraku FARBION yang selalu memberi semangat dan dorongan kalian sehingga penulis dapat dengan gigih menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih pula kepada Bapak/ Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan I (bidang akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan II (bidang keuangan), Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) FKIK UIN Alauddin Makassar.
4. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar.
5. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar.
6. Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing I bagi penulis yang senantiasa dengan sabar memberi arahan dan bimbingannya kepada penulis.
7. Syamsuri Syakri, S. Farm., M.Si., Apt. selaku pembimbing II penelitian bagi penulis yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian.
8. Isriany Ismail S.Si.,M.Si.,Apt selaku penguji kompetensi dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.

9. Dr. Rosmini, S.Ag M.Th.I selaku pembimbing agama dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
10. Dosen dan seluruh staf jurusan Farmasi beserta laboran atas bantuan dan kerjasamanya yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.
11. Keluarga besar Mahasiswa Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, rekan-rekan angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas segala bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
12. Sahabat-sahabat saya dari Madrasah Tsanawiah DDI Takkalasi, Rafiah Jamaluddin, Rezky Amelia, Rahmatan, Fadlia Mubakkirah, Winda sari, dan Sri Ismayanti, dan Usman.
13. Sahabat SMA saya dan SMAN 1 Soppeng Riaja, Arfiana Arif dan Artika Ramadhani yang setia mendengar cerita-cerita saya.
14. Kepada Fitriah Nur, Iffah Kholifah U, Riska Zain, Nur Fitrah Fadiyah, Yajudani, dan teman-teman yang lain yang telah membantu dan menemani saya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu di bidang Farmasi pada umumnya dan semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah didalamnya. *Aamiin ya Rabbal Aalamin..*

Samata-Gowa,

Penulis,

St. Rahmah Akbar
NIM. 70100113060

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Tanaman	10
B. Uraian Mikroba Uji.....	21
C. Uraian Metode Ekstraksi.....	22
D. Uraian Tentang Tuberkulosis.....	25
E. Uraian Metode Pengujian Tuberkulosis.....	37
F. Tinjauan Islam.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Waktu dan Tempat Penelitian	47
C. Pendekatan penelitian.....	47
D. Alat dan Bahan.....	47
E. Prosedur Kerja.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	57
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kandungan Senyawa Kimia dan Aktivitasnya.....	13
Tabel 2 Aktifitas ekstrak botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	18
Tabel 3 Kegunaan <i>Chromolaena odorata</i> di Asia dan Afrika Selatan :	20
Tabel 4 Perbandingan Eluen KCV	50
Tabel 5 Hasil partisi sampel daun botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i> L.).....	54
Tabel 6 Hasil penggabungan fraksi.....	55
Tabel 7 Hasil Identifikasi Senyawa.....	55
Tabel 8 Hasil uji Antituberkulosis	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman botto-botto	10
Gambar 2. Isoniazid	26
Gambar 3. Rifampicin.....	27
Gambar 4. Etambutol	28
Gambar 5. Pirazinamid.....	29
Gambar 6. Perubahan pirazinamid menjadi bentuk aktifnya	30
Gambar 7. Ekstrak Daun Botto-botto.....	79
Gambar 8. Partisi.....	80
Gambar 9. Profil KLT	81
Gambar 10. Fraksinasi	82
Gambar 11. Profil KLT fraksi.....	83
Gambar 12. Hasil Penggabungan Fraksi.....	84
Gambar 13. Identifikasi Senyawa	85
Gambar 14. Proses pengujian antituberkulosis	86
Gambar 15. Hasil Pengujian Antituberkulosis strain H ₃₇ RV hari ke-7	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian	75
Lampiran 2. Uji Antituberkulosis	76
Lampiran 3. Perhitungan	77
Lampiran 4. Gambar Penelitian	79



ABSTRAK

Nama Penulis : St. Rahmah Akbar
NIM : 70100113060
Judul Skripsi : **Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-fraksi Larut Etil Asetat dari Ekstrak Metanol Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) sebagai *Inhibitor Mycobacterium tuberculosis***

Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan dunia, yang bertanggungjawab atas kematian jutaan orang tiap tahunnya. Untuk itu perlu dilakukan penanganan pada penyakit ini untuk mengurangi penyebab kematian tiap tahunnya. Daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) adalah salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fraksi yang paling aktif menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. Sampel yang digunakan daun botto-botto yang di ekstraksi dengan metanol yang selanjutnya di partisi dengan n-heksan dan etil asetat. Partisi larut etil asetat kemudian difraksinasi. Pengujian antituberkulosis dilakukan dengan metode MODS (*Microscopy observation drug susceptibility*) dengan sampel ekstrak, partisi, dan fraksi, kontrol (-) berupa DMSO dan kontrol (+) berupa obat Isoniazid yang kemudian diujikan dengan *mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV dan di amati pada hari ke-7 dengan menggunakan mikroskop. Sampel ekstrak, partisi larut etil, partisi tidak larut etil, partisi larut heksan, dan fraksi A B C D E F G di peroleh hasil penelitian, partisi larut heksan, fraksi B C D E G dapat menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* pada hari ke-7 sedangkan sampel ekstrak, partisi larut etil, partisi tidak larut etil tidak dapat diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa partisi larut heksan, dan beberapa fraksi memiliki aktifitas sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang ditandai tumbuhnya sedikit *Mycobacterium tuberculosis* dibandingkan kontrol negatif. Sedangkan untuk sampel yang lain, tidak dapat diambil kesimpulan karena hasil yang diperoleh tidak dapat diamati.

Kata kunci : *Chromolaena odorata*, Metode MODS, *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇ RV

ABSTRACT

Nama Penulis : St. Rahmah Akbar
NIM : 70100113060
Judul Skripsi : **Screening of Partitions and Fractions Soluble Ethyl Acetate of Methanol Extract of Botto-Botto Leaves (*Chromolaena Odorata* L.) as Inhibitor *Mycobacterium tuberculosis***

Tuberculosis is the health problem of the world that causes the deaths of millions people each year and it needs to be handled for reducing it. Botto-Botto leaves (*Chromolaena Odorata*) are one of the plants that have antimicrobial activity. This study aims to find out the most active fraction inhibiting the growth of *Mycobacterium tuberculosis*. It is used Botto-Botto which is extracted with methanol and partitioned with n-hexane and Ethyl Acetate. The Ethyl Acetate soluble particles are then fractionated. Antituberculosis testing was conducted by using MODS with samples is extract, partitions, and fractions, control(-) form is DMSO and control(+) form is Isoniazid drug which is tested with *Mycobacterium tuberculosis* strains H₃₇RV and observed on the 7th day by using a microscope. Sample extracts, partition soluble ethyl, partition insoluble ethyl, partition soluble hexane, and ABCDEFG fractions obtained research results is partition soluble hexane, BCDEG Fraction can inhibit the growth of *Mycobacterium tuberculosis* on the 7th day, while the other sample cannot be observed. Based on the observations, it can be concluded that partition soluble hexane and some fraction having activity as a inhibit the growth that characterized by a little growth of *Mycobacterium tuberculosis* that compared to the negative control.

Key words: *Chromolaena Odorata*, *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV, MODS (*Microscopically Observed Drug Susceptibility*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang paling mematikan di dunia. Tuberkulosis masih menjadi masalah utama kesehatan di dunia, yang bertanggung jawab untuk penyakit di antara jutaan orang tiap tahunnya (World Health Organization, 2014, hal. 1).

WHO dalam *Global Tuberculosis Report* pada tahun 2016, diperkirakan adanya 10,4 juta kasus baru (kejadian) tuberkulosis di seluruh dunia, dimana 5,9 juta (56%) adalah laki-laki, 3,5 juta (34%) perempuan dan 1,0 juta (10%) anak-anak. Adapun kasus tuberkulosis yang komplikasi dengan HIV terhitung 1,2 juta (11%) dari semua kasus TB baru. (World Health Organization, 2016, hal. 1).

WHO dalam *Global Tuberculosis Report* pada tahun 2016, Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular peringkat kedua setelah HIV (*Human immunodeficiency virus*) yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Perkiraan jumlah kematian akibat penyakit tuberkulosis di dunia yaitu 1,4 juta (kisaran 1,2-1,6 juta). Hal ini menyebabkan kematian lebih banyak dari pada HIV/AIDS di dunia pada tahun 2015. Untuk perkiraan jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2015 yaitu terjadi di Asia (60%), Afrika (26%), Mediterania Timur (6%), Eropa (3%), Amerika (3%). Untuk insidennya yaitu Afrika 76,300 (20300-168000), Amerika (218-1770), Mediterania Timur 7490 (1883-16900), Eropa 1290 (350-2840), Asia 47400 (11300-109000), dan Barat pasifik 15900 (4920-34900). Sedangkan

untuk kematian akibat tuberkulosis, yaitu Afrika 10.000 (2570-22.500), Amerika 46 (12-98), Mediterania Timur 639 (113-1610), Eropa 103 (28-225), Asia 2280 (602-5050), dan Barat pasifik 286 (77-630). Dan penyakit tuberkulosis tetap menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia pada tahun 2015 dengan peringkat pertama penyakit jantung iskemik (World Health Organization, 2016).

WHO melaporkan pada tahun 2014, Indonesia merupakan negara penyumbang tuberkulosis kelima dari enam negara yang memiliki jumlah terbesar kasus insiden tuberkulosis pada tahun 2013. Hal ini didasarkan pada data populasi tiap negara dengan insiden penyakit tuberkulosis, yaitu India (2,0 juta – 2,3 juta), China (900.000– 1.100.000), Nigeria (340.000 – 880.000), Pakistan (370.000 - 650.000), Indonesia (410.000 – 520.000), dan Afrika selatan (410.000 520.000) (World Health Organization, 2014, hal. 8).

WHO melaporkan pada tahun 2015, adapun data kematian akibat tuberkulosis di Indonesia yaitu 100 (67-150). Hal ini telah mengalami penurunan jumlah kematian dari tahun sebelumnya. Meskipun sebagian besar kematian akibat tuberkulosis dapat dicegah, tapi insiden penyakit ini masih tinggi. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi penyakit ini (World Health Organization, 2016, hal. 25).

Kementrian kesehatan dalam laporan Riset Kesehatan Dasar, pada tahun 2013 gambaran penyakit tuberkulosis yang terjadi di Indonesia yaitu , untuk prevalensi tuberkulosis berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 400 orang yang didiagnosis

kasus tuberkulosis oleh tenaga kesehatan. Untuk insidennya yaitu untuk karakteristik usia, di usia >45 tahun dengan nilai prevalensi yang lebih tinggi diantara yang lain. Pada karakteristik pendidikan, prevelensi semakin rendah sejalan dengan tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan untuk penyebarannya di Indonesia, yaitu Sulut sebanyak 234, DKI Jakarta sebanyak 220, Maluku, Papua sebanyak 213, dan yang paling rendah ialah Bali sebanyak 63 kasus (Kemenkes, 2016, hal. 3).

Multi drug resistant TB (MDR-TB) merupakan masalah yang muncul dari penyakit ini. MDR-TB didefinisikan sebagai resistensi terhadap dua agen obat tuberkulosis lini pertama yang paling poten yaitu isoniazid (INH) dan rifampisin. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah MDR-TB, seperti strategi DOTS (*Direct Observed Treatment Strategy*) yaitu pengawasan langsung pasien menelan obat, vaksin *M.vaccae* untuk imunoterapi penderita TB, penerapan surveilans global MDR-TB (Yun Astuti. N, 2010, hal. 502).

Kementrian kesehatan dalam laporan Riset Kesehatan Dasar, pada tahun 2013 untuk kasus MDR TB (resisten rifampicin dan isoniazid) hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2015 yang menjadi 14% dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2014 sebanyak 10% (Kemenkes, 2016, hal. 8).

Karena tingginya insidensi penyakit tuberkulosis di dunia maupun di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya untuk mengendalikan penyakit tuberkulosis. Untuk itu, sangat diperlukan untuk menemukan obat antituberkulosis baru, dengan mengatasi timbulnya MDR-TB dan *Extremely Drug Resistant* (XDR). Dengan itu,

peneliti ingin melakukan skrining partisi dan fraksi-fraksi dari tanaman botto-botto untuk menemukan obat baru penyakit tuberkulosis.

Tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) merupakan salah satu tanaman endemik di Indonesia yang dianggap sebagai tanaman liar, dan bahkan telah dikategorikan sebagai gulma nomor satu yang menjadi prioritas untuk dikendalikan.

Penggunaan tradisional *Chromolaena odorata* L. sebagai sumber obat telah banyak digunakan di negara Afrika Barat dan negara-negara Asia. Tanaman ini digunakan sebagai tujuan terapeutik atau sebagai prekursor untuk sintesis obat yang berguna.

Beberapa aktifitas yang ditunjukkan oleh ekstrak daun botto-botto ialah potensi aktivitas penyembuhan luka, antibakteri, antimalaria, antiinflamasi, antioksidan, analgesik dan antiimunopresif, *sitotoxic*, antifungi, efektif untuk kanker payudara, dan aktifitas lainnya. Golongan Senyawa yang mungkin memberikan aktifitas farmakologi ialah, flavanoid, terpen, steroid, yang diisolasi dari tanaman tersebut (Finnie, 2015, hal. 8).

Kandungan kimia dari tanaman botto-botto yaitu, flavanoid (yaitu, rhamnetin, tamarixetin, ombuin, kaempferid, isosakuranetin, odoratin, rhamnositrin, laciniatin, acacetin, luteolin), fenolik (seperti p-cumaric, ferulic, asam vanilic), alkaloid, dan kaya akan esensial oil seperti α -pinene, β -pinene, germacrene D, β -copaen-4-alpha-ol, β -caryophyllene, geigerene, pregeijerene, cadinene, camphor, limonene (Finnie, 2015, hal. 4).

Untuk itu, Penelitian ini bermaksud ntuk mengetahui aktivitas fraksi ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, sebagai salah satu obat baru dalam pengobatan penyakit tuberkulosis. (Suksamrarn A. C., 2004) di India, pada tahun 2004 pernah dilakukan penelitian terhadap ekstrak bunga botto-botto yang terbukti bahwa ekstrak menunjukkan aktivitas sedang terhadap *Mycobacterium tuberculosis*. Golongan senyawa yang memberikan aktifitas antimikroba yaitu flavanoid, dengan senyawa Isosakuranetin, 5,6,7,4'-Tetramethoxyflavanone, 4'-Hydroxy-5,6,7-trimethoxyflavanone, dan Luteolin.

B. Rumusan Masalah

Apakah partisi dan fraksi yang aktif terhadap *inhibitor* pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

- a. Antituberkulosis adalah pengujian untuk melihat aktivitas inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* dalam hal ini diamati dengan tidak adanya pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* pada sumuran.
- b. *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV merupakan bakteri yang diambil dari koleksi laboratorium HUM-RC Universitas Hasanuddin

- c. Skrining adalah metode yang digunakan untuk mengetahui fraksi yang aktif sebagai antituberkulosis berdasarkan pengamatan penghambatan terhadap pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.
- d. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat dengan menggunakan pelarut metanol.
- e. Tumbuhan botto-botto (*Chromolaena odorata*) adalah tumbuhan liar yang diperoleh di daerah Samata-Gowa yang bagian dari tumbuhan digunakan adalah daun.

2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini menggunakan partisi dan fraksi-fraksi dari ekstrak metanol daun botto-botto sebagai sampel yang akan dilihat aktivitas inhibisinya terhadap pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

D. Kajian Pustaka

1. (Suksamrarn A. C., 2004) “Antimycobacterial Activity and Cytotoxicity of Flavonoids from the Flowers of *Chromolaena odorata*”. Apichart dkk mengisolasi kandungan kimia dari bunga *Chromolaena odorata* (*Eupatorium odoratum*) yaitu empat flavanon, isosakuranetin (5,7-dihidroksi-4'-methoxyflavanone) (1), persicogenin (5,3'-dihidroksi-7,4'-dimethoxyflavanone) (2), 5,6,7,4'-tetramethoxyflavanone (3), 4'-hidroksi-5,6,7-trimethoxyflavanone (4), 2'-hidroksi-4,4',5',6'-tetramethoxychalcone (5), 4,2'-dihydroxy-4',5',6'-trimethoxychalcone (6), acacetin (5,7-dihidroksi-4'-methoxyflavone) (7), luteolin (5,7,3',4'-

tetrahydroxyflavone) (8), yang diisolasi dan diidentifikasi. Komponen 1 menunjukkan aktivitas *antimycobacterial* moderat terhadap *Mycobacterium tuberculosis* dengan nilai MIC dari 174,8 I μM , sedangkan senyawa 4, 7, dan 8 masing-masing menunjukkan aktivitas yang lemah dengan nilai MIC 606,0, 704,2 dan 699,3 μM .

Jurnal penelitian ini melakukan isolasi senyawa flavonoid dari bunga botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang kemudian diujikan dengan *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Ra dengan metode *microplate alamar blue assay* (MABA). Sedangkan pada penulis, melakukan uji antituberkulosis dari sampel partisi dan fraksi-fraksi larut etil asetat dari ekstrak metanol daun botto-botto yang kemudian diujikan dengan *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV dengan metode *microscopy observation drug susceptibility* (MODS).

2. (Thoung L.H, 2015) “Antimicrobial Activity of *Senna alata* (L.), *Rhinacanthus nasutus* and *Chromolaena odorata* (L.) Collected in Southern Vietnam”. Thuong dkk mengevaluasi aktivitas antimikroba *Senna alata* (L.), *Rhinacanthus nasutus* and *Chromolaena odorata* sebagai agen antibiotik resisten terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* secara in vitro. Diinduksikan *Staphylococcus aureus* strain ATCC 25.213 dan *Pseudomonas aeruginosa* strain ATCC 9027. Sampel tanaman diekstraksi dengan pelarut yang berbeda yaitu etanol, etil asetat dan n-heksana secara berturut-turut. Metode cakram difusi digunakan untuk mengevaluasi aktivitas ekstrak sebagai antimikroba. Secara umum, sebagian besar ekstrak menunjukkan aktivitas antimikroba yang baik terhadap

kedua antibiotik resisten dan sensitif *Staphylococcus aureus* tetapi tidak ada aktivitas terhadap *Pseudomonas aeruginosa*. Untuk strain *Staphylococcus aureus*, *Chromolaena odorata* dan ekstrak *Rhinacanthus nasutus* dengan pelarut etil asetat menunjukkan zona yang lebih baik dengan zona hambat ($17,17 \pm 0,29$ mm; $16,67 \pm 0,58$ mm) dari pada ekstrak yang menggunakan etanol ($14,17 \pm 0,58$ mm, $11,67 \pm 1,53$ mm) dan heksana ($12,17 \pm 0,58$ mm; $13,67 \pm 0,58$ mm). Untuk jenis lainnya *Staphylococcus aureus*, *Senna alata* (L.) ekstrak etanol menunjukkan zona inhibisi terbesar ($22,33 \pm 0,58$ mm). Hasil ini menunjukkan bahwa obat tradisional harus diteliti lebih lanjut untuk melayani pengobatan sebagai alternatif untuk infeksi *multi drug resisten Staphylococcus aureus* dan mungkin juga untuk yang lainnya bakteri patogen gram positif.

Jurnal penelitian ini menguji daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* secara in vitro. Sedangkan pada penulis, menguji daun botto-botto pada bakteri *Mycobacterium tuberculosis* secara in vitro.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menentukan partisi dan fraksi yang aktif menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

2. *Manfaat Penelitian*

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah kepada masyarakat tentang khasiat dari daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) sebagai obat baru tuberkulosis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan ilmu pengetahuan masyarakat tentang khasiat dari botto-botto (*Chromolaena odorata*), serta dapat dimanfaatkan sebagai tanaman potensi daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi (Tjitrosoepomo G. , 2010).

Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Asterales

Famili : Asteraceae

Genus : Chromolaena

Spesies : *Chromolaena odorata* (L.)



Gambar 1 Tanaman botto-botto

(Sumber : (Chakraborty, Rambhade, & Patil, 2011)) & koleksi pribadi

2. Nama Daerah

Chromolaena odorata (L.) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Di Makassar khususnya, spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti botto - botto, laruna, dan gondrong-gondrong. Beberapa daerah lain misalnya, memiliki nama tersendiri, Kopasanda di Maros, Ki Rinyuh di Sunda, Tekelan di Jawa, *Siam Weed* atau *Jack in the Bush* di Inggris. (Prawiradiputra, 2006).

3. Morfologi

Botto'-botto' termasuk keluarga *Asteraceae* atau *Compositae*. Daunnya oval, bagian bawah lebar, makin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6–10 cm dan lebar 3–6 cm. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun berhadap-hadapan. Karangan bunga terletak di ujung cabang. Setiap karangan terdiri atas 20 – 35 bunga dengan warna bunga putih.

Botto-botto berbunga pada musim kemarau, perbungaannya serentak selama 3–4 minggu. Pada saat biji masak, tumbuhan mengering. Pada saat itu biji pecah dan terbang terbawa angin. Kira-kira satu bulan setelah awal penghujan, potongan batang, cabang dan pangkal batang bertunas kembali. Biji-biji yang jatuh ke tanah mulai berkecambah sehingga dalam waktu dua bulan kecambah dan tunas-tunas telah mendominasi area.

Tanaman ini membentuk semak, tinggi tumbuhan dewasa berkisar 3-7 meter tingginya ketika tumbuh di tempat terbuka. Batang muda berwarna hijau dan agak lunak yang kelak akan berubah menjadi coklat dan keras (berkayu) apabila sudah tua. Letak cabang biasanya berhadap-hadapan (oposit) dan jumlahnya sangat banyak.






Percabangannya yang rapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, sehingga menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya. Dengan demikian gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan mampu mendominasi area dengan cepat pula. Kemampuannya mendominasi area dengan cepat ini juga disebabkan oleh produksi bijinya yang sangat banyak (Phan, 2004).




Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepat perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gulma ini cepat membentuk komunitas sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Botto-botto dapat tumbuh pada ketinggian 1000–2800 m dpl, tetapi di Indonesia banyak ditemukan di dataran rendah (0–500 m dpl) seperti di kebun karet dan kelapa serta di padang penggembalaan. (Prawiradiputra, 2006).





4. Kandungan Kimia






Tumbuhan ini banyak mengandung tannin, polifenol, kuinon, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan monoterpen (Sudarmo, 2014). *Chromolaena odorata* diketahui mengandung senyawa fitokimia antara lain: quinon, steroid, terpenoid, glikosida jantung, saponin, alkaloid, tannin, flavonoid, flavonon, flavon, flavonoid glukosid, pirolizidin alkaloid, dan essensial oil (Julian, 2015).






Tabel 1. Kandungan Senyawa Kimia dan Aktifitasnya



No.	Senyawa	Aktifitas	Bagian	Referensi
1.	 <p>2'-hydroxy-4,4',5',6-tetramethoxychalcone</p>	Antikanker	Daun	(Kouamé, et al., 2012).
2.	 <p>6-methylenebis(5,7-dihydroxy-4-methoxyflavanone)</p>	Memiliki efek transaktivasi terhadap PPAR γ	Daun	(Manli, 2015).
3.	 <p>Arsetin</p>	Antikanker (Melawan NCI-H187) Dan Antimikroba (Menghambat pertumbuhan <i>Mycobacterium tuberculosis</i>)	Bunga	(Suksamrarn A. C., 2004).
4.	 <p>Isokuarsetin</p>	Antimikroba (Menghambat pertumbuhan <i>Mycobacterium tuberculosis</i>)	Bunga	(Suksamrarn A. C., 2004).
5.		Antikanker (Memiliki kemampuan melawan NCI-H187 dan MCF7) dan Antimikroba (Menghambat pertumbuhan <i>Mycobacterium</i>)	Bunga	(Suksamrarn A. C., 2004).

	Luteolin	<i>tuberculosis)</i>		
6.	 <p>Quercetin-4'-methyl ether</p>	Antimalaria	Daun	(Emeje, 2014).
7.	 <p>4'-Hydroxy-5,6,7-trimethoxyflavanone</p>	Antimikroba (Menghambat pertumbuhan <i>Mycobacterium tuberculosis)</i>	Bunga	(Suksamrarn A. C., 2004).
8.	 <p>Sinensetin</p>	Antimikroba	Daun	(Atindehou, 2013).

9.	 <p>Linoleamide</p>	Antiinflamasi	Daun	(Hang, 2011).
10.	 <p>Coriolid Acid</p>	Antiinflamasi	Daun	(Hang, 2011).
11.	 <p>Intermedine</p>	-	Daun	(Biller, Michael, witte, Hartmann, & Thomas, 1993).
12.	 <p>(S)-coriolic acid</p>	-	Daun	(Dat, Lee, Hong, Kim, Minh, & Lee, 2009).

13.	 <p>(S)-15,16-didehydrocoriolic Acid</p>	-	Daun	(Dat, Lee, Hong, Kim, Minh, & Lee, 2009).
14.	 <p>4,6-dihydroxy-2,3,4-trimethoxychalcone</p>	-	Daun	(Dat, Lee, Hong, Kim, Minh, & Lee, 2009).
15.	 <p>2'-hydroxy-4,4',5',6'-tetramethoxychalcone</p>	Antikanker	Daun	(Kouamé, et al., 2012).
16.	 <p>Germacrene D</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).
17.	 <p>Beta-caryophyllene</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).

18.	 <p>Limonene</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).
19.	 <p>Alpha pinene</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).
20.	 <p>Aromadendrin 4' methyl ether</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).
21	 <p>5,7-dihydroxy-6,4'- dimethoxyflavanone</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).
22	 <p>Kaempferol 3-O-rutinoside</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).

23	 <p>Quercetin 3-O-rutinoside</p>	-	Daun	(Jasnie, 2009).
24	 <p>5 hydroxy-4',7-dimethoxyflavanone (Naringenin)</p>	-	Daun	(Kouamé, et al., 2012).

Tabel 2 Aktifitas ekstrak botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Ekstrak/Fraksi	Aktifitas	Referensi
1.	Ekstrak Kloroform	Malaria	(Rungnapa, 2003).
2.	Ekstrak Etanol	Analgesik	(Chakraborty et al., 2010).
		Antioksidan	(Phan, Toan Thang et al, 2000).
		Antikunvulsan	(Amazu, 2013).
		Antifungi (<i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus glaucus</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> and <i>Tricho phytonrubrum</i>)	(Naidoo, K.K, 2011).
3.	Ekstrak Metanol	Antiinflamasi, antipiretik, antispasmodic	(Oludare, 2000).
		Antioksidan	Melinda Krishanti P (2010).
		Antimikroba (<i>S. aureus</i> and <i>Escherichia coli</i>)	(Raman, 2012).

4.	Ekstrak etanol dan kloroform	<i>Anthelmintic</i>	(Debidani Mishra et al., 2010)
5.	Ekstrak air	Pengobatan luka jaringan lunak	(Raina, R.,, 2008).
6.	Ekstrak etanol, metanol, kloroform	Antimikroba (<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Coryne bacterium glutamicin</i> , <i>E.coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Proteusvulgaris</i> , <i>Salmonella typhi</i> , <i>S.aureus</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> dan <i>Vibro parahaemolyticus</i>)	(Raman, 2012).
7.	Ekstrak Butanol	Antimikroba (<i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Shigella sonnei</i> dan <i>Vibro cholerae</i>)	(Irobi, 1992). (Atindehou, M., 2013). (Caceres, A., 1995).

5. Kegunaan

Pengobatan tradisional botto'-botto' digunakan sebagai bahan alam yang berkhasiat antispasmodik, antiprotozoa, antibakteria, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, astringen, antitripanosoma, diuretik dan bahan hepatotropik. (Ngozi, , 2009).

Dalam laporan lainnya, Ngozi, Vital (2009) juga turut menyebutkan khasiat terapeutik dari botto-botto seperti antidiare, antispasmodik, astringen, antihipertensi, antiinflamasi, dan diuretik. Penggunaan daunnya yang dibuat dalam dekokta dimanfaatkan sebagai obat batuk atau bila dicampurkan rumput lemon dan daun jambu biji berkhasiat mengobati penyakit malaria.

Botto-botto memberikan keuntungan bagi pertanian, khususnya tanaman pangan. Di India, gulma ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil berbagai jenis

tanaman pangan, seperti kedelai, *cluster bean*, *radish*, palak dan ragi yang tumbuh di sana. (Prawiradiputra, , 2006).

Tabel 3 Kegunaan *Chromolaena odorata* di Asia dan Afrika Selatan :

No.	Aktifitas Farmakologi	Penggunaan Tradisional	Referensi
1	Sakit Kepala	Daun	(Gill, 1992).
2	Malaria	Daun	(Ayensu, 1978). (Gill, 1992). (Idu, M.,, 2007).
		Ekstrak kloroform daun efektif terhadap strain plasmodium falciparum in <i>in vitro</i>	(Rungnapa, 2003).
3	Antiseptik	Daun	(Gill, 1992).
4	Diare	Daun	(Amatya,S., 2011). (Bhargava,D.,, 2011).
5	Infeksi fungi	Daun	(Ngono, 2006).
6	Infeksi kulit	Daun	(Owoyele,V.B.,, 2005).
7	Disentri	Daun	(Gill, 1992).
8	Sakit Gigi	Daun	(Gill, 1992).
9	Analgesik	Ekstrak etanol daun	(Chakraborty et al.,, 2010).
10	Diuretik	Infusa daun	(Rejitha, 2009).
11	Antimikroba	Daun bunga <i>Chromolaena odorata</i>	(Mullika , 2005). (Suksamrarn a. e., 2004).
12	Antiinflamasi, dan antipiretik	Ekstrak metanol daun	(Oludare, 2000).
13	Antihipertensi	Daun	(Vaisakh,M.N. , 2012).
14	Aktivitas koagulasi darah	Daun	(Triratana T.,, 1991).
15	Antioksidant	Daun	(Phan, Toan Thang et al, 2000).
16	Aktifitas penyembuhan luka	Ekstrak air daun <i>Chromolaena odorata</i>	(Biswal PR et al, 1997).
17	Aktifitas <i>anthelmintic</i>	Ekstrak etanol dan kloroform daun <i>Chromolaena odorata</i> menunjukkan aktifitas lebih baik dari pada obat albendazole	(Debidani Mishra et, 2010).

B. Uraian Mikroba Uji

1. Klasifikasi (Jawetz, ed al., 2010).

Kingdom : Bacteria

Phylum : Actinobacteria

Ordo : Actinomycetales

Subordo : Corynebacterineae

Family : Mycobacteriaceae

Genus : Mycobacterium

Spesies : *Mycobacterium tuberculosis*

2. Morfologi

a. Bentuk

Bentuk bakteri *Mycobacterium tuberculosis* ini adalah basil tuberkel yang merupakan batang ramping dan kurus, dapat berbentuk lurus ataupun bengkok yang panjangnya sekitar 2-4 mm dan lebar 0,2 – 0,5 mm yang bergabung membentuk rantai (Jawetz, ed al., 2010).

Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri aerob obligat, dan memiliki ciri khusus yakni adanya lapisan lilin di dinding selnya. Sebagai bakteri aerob yang membutuhkan oksigen, *Mycobacterium tuberculosis* tersimpan di paru-paru mamalia karena kandungan oksigennya sangat tinggi. Pembelahan diri bakteri *Mycobacterium tuberculosis* terjadi sangata lambat, yaitu sekitar 15 jam setelah infeksi terjadi (Jawetz, ed al., 2010).

b. Sifat dan daya tahan

Bakteri *Mycobacterium* memiliki sifat tidak tahan panas serta akan mati pada 6° C selama 15-20 menit. Biakan bakteri ini dapat mati jika terkena sinar matahari langsung selama 2 jam. Dalam dahak, bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dapat bertahan selama 20-30 jam. Basil yang berada dalam percikan bahan dapat bertahan hidup 8 -10 hari (Brooks GF, , 2010).

C. Uraian Metode Ekstraksi

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Sebelum ekstraksi dilakukan biasanya bahan-bahan dikeringkan terlebih dahulu kemudian dihaluskan pada derajat kehalusan tertentu (Harbone JB.,, 1973).

Hasil dari ekstraksi disebut dengan ekstrak yaitu sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

2. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan

penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak, dan lain-lain (Dirjen POM, 1986).

Maserasi dapat diklasifikasikan berdasarkan (Dirjen POM, 1986).

- a. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu antara 40-50°C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.
- b. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.
- c. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah dienaptuangkan dan diproses, ampas dimaserasi bagi dengan cairan penyari yang kedua.
- d. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.
- e. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarian yang menggunakan peralatan yang hampir sama dengan maserasi melingkar, tetapi dengan jumlah bejana penambang yang disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak).

3. Partisi

a. Partisi Cair-cair

Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut didalam 2 macam zat pelarut yang tidak saling bercampur atau dengan kata lain perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik dan pelarut air. Ekstraksi cair-cair biasa juga disebut sebagai metode corong pisah. Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak dapat bercampur dengan yang pertama, akan terbentuk dua lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan biasanya dipersingkat oleh pencampuran keduanya dalam corong pisah (Dirjen POM, 1986).

Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan cara pemisahan komponen kimia diantara 2 fase pelarut yang tidak saling bercampur. Dimana sebagian komponen larut pada fase pertama, dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi dikocok, dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan. Yakni fase cair dan komponen kimia yang terpisah. (Sudjadi, 1988).

b. Partisi Cair-padat

Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak bercampur dengan yang utama akan terbentuk 2 lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut

(biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu mencapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Kelarutan senyawa tidak bermuatan dalam satu fase pada suhu tertentu tergantung pada kemiripan kepolarannya dengan fase cair, menggunakan prinsip "*like dissolve like*". (Lubis, A. H., 1994).

4. Fraksinasi

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), kromatografi kolom (KK), *size-exclusion chromatography* (SEC), *solid-phase extraction* (SPE) (Mukhriani, 2014).

D. Uraian Tentang Tuberculosis

1. Pengertian Tuberculosis

Tuberculosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis complex* dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia. *M.tuberculosis* berbentuk batang, berukuran panjang 5 μ dan lebar 3 μ , tidak membentuk spora dan termasuk bakteri aerob. *Mycobacteria* dapat diberi pewarnaan seperti bakteri lainnya misalnya dengan pewarnaan gram. Namun sekali diberi warna oleh pewarnaan gram, maka warna tersebut tidak dapat dihilangkan dengan asam. Oleh karena itu, maka *Mycobacteria* disebut sebagai Basil Tahan Asam


(BTA). Pada dinding sel *Mycobacteria*, lemak berhubungan dengan arabinogalaktan dan peptidoglikan di bawahnya. Struktur ini menurunkan permeabilitas dinding sel sehingga mengurangi efektivitas terhadap antibiotik. Lipoarabinomannan suatu molekul lain dalam dinding sel *Mycobacteria* berperan dalam interaksi antara inang dan patogen menjadikan *M. tuberculosis* dapat bertahan hidup di dalam makrofag. (PDPI, 2011).

Diagnosis pasti tuberkulosis seperti lazimnya penyakit menular yang lain adalah dengan menemukan kuman penyebab TB yaitu kuman *Mycobacterium tuberculosis* pada pemeriksaan sputum, bilas lambung, cairan serebrospinal, cairan pleura ataupun biopsi jaringan. Diagnosis tuberkulosis ditegakkan dengan mengumpulkan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, rontgen dada, usap BTA, kultur sputum, dan tes kulit tuberkulin (Smeltzer, S, Bare BG., 2002).

2. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

a. Mekanisme kerja obat anti tuberkulosis

Isoniazid




Gambar 2 Isoniazid

Isoniazid mudah menembus sel inang dan berdifusi melintasi membran *M.tuberculosis*. Isoniazid adalah *pro-drug*, yang membutuhkan aktivasi oksidatif oleh

katalase-peroksidase enzim *katG* pada *M. tuberculosis*. Meskipun metabolit aktif dari isoniazid telah dilaporkan menghambat beberapa jalur seluler penting, termasuk sintesis asam nukleat, fosfolipid, dan metabolisme NAD, jalur utama yang bertanggung jawab untuk kegiatan pembunuhan pada obat ini adalah jalur sintesis asam mikolat. (Anastasia S, 2012).

Kerja utama isoniazid adalah menghambat biosintesis asam mikolat, yaitu unsur-unsur penting pada dinding sel mikobakteri. Mekanisme kerja isoniazid bersifat kompleks, disertai pemetaan resistensi terhadap mutasi pada sedikitnya lima gen yang berbeda (*katG*, *inhA*, *ahpC*, *kasA*, dan *ndh*). Sebagian besar bukti menunjuk *inhA* sebagai target utama obat. Gen *inhA* mengkodekan *enoil-ACP reduktase* pada asam lemak sintase II yang mengubah asam-asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh pada jalur untuk biosintesis asam mikolat. Karena asam mikolat merupakan kekhasan mikobakteri, kerja ini menjelaskan tingginya tingkat selektivitas aktivitas antimikroba isoniazid. Pajanan isoniazid mengakibatkan hilangnya sifat tahan asam dan penurunan jumlah lipid yang dapat terekstraksi-metanol pada mikroorganisme tersebut (Takayama, 1975).

Rifampicin




Gambar 3 Rifampicin

Rifampicin mengandung inti aromatik di kedua sisi yang terkait oleh jembatan alifatik. Sehingga rifampicin mudah berdifusi melintasi membran sel *M. tuberculosis* karena sifat lipofiliknya. Aktivitas bakterisidal rifampicin telah dikaitkan dengan kemampuannya untuk menghambat transkripsi dengan mengikat dengan afinitas tinggi untuk *DNA-dependent bakteri RNA polimerase*.

DNA-dependent RNA polymerase (RNAP) adalah enzim penting dalam proses transkripsi. RNAP membaca urutan DNA target dan mengkatalisis polimerisasi RNA komplementer dengan monomer *trifonot ribonukleotida*. 400 kDa RNAP inti enzim terdiri dari subunit yang berbeda yaitu, Subunit α -dimer (α_2), β , β' dan ω . Kode gen dari subunit α , β , β' dan ω masing-masing telah ditetapkan sebagai *rpoA*, *rpoB*, *rpoC* dan *rpoD*. RIF mengikat subunit β RNAP, dekat dengan saluran RNA / DNA dan menghambat β -Subunit RNAP bakteri, sehingga secara fisik menghalangi perpanjangan rantai RNA yang tumbuh Setelah penambahan 2 - 3 nukleotida. Namun, mekanisme yang tepat dari RIF-terkait transkripsi yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel, belum dipahami dengan baik (Unissa A. D., 2016, hal. 5).

Etambutol




Gambar 4 Etambutol

Jalur utama dipengaruhi oleh etambutol ialah biosintesis arabinogalaktan melalui penghambatan polimerisasi dinding sel arabinan. Etambutol juga telah dilaporkan menghambat beberapa jalur seluler lainnya, termasuk metabolisme RNA. Transfer asam mikolat ke dalam dinding sel (Takayama, 1975). Sintesis fosfolipid, dan biosintesis spermidine (Anastasia S, 2012, hal. 214).

Etambutol menghambat *polymerase* dinding sel arabinan dari arabinogalaktan dan lipoarabinomannan dan menyebabkan akumulasi *D-arabinofuranosyl-P-decaprenol*, perantara dalam biosintesa arabinan (Zhang, 2009).


Pirazinamid



Gambar 5 Pirazinamid

Pirazinamid adalah amida derivat pyrazine-2-asam karboksilat dan analog nikotinamide. Pirazinamid telah dihipotesiskan untuk bertindak terhadap basil yang berada di kompartemen diasamkan paru-paru yang hadir selama tahap inflamasi awal infeksi, karena aktivitas sterilisasi obat tampaknya terbatas pada 2 bulan pertama terapi. Pirazinamid memasuki basil tuberkulosis pasif dan melalui sistem transportasi *ATP-dependent*. Pirazinamid sama seperti isoniazid yang merupakan pro-drug, membutuhkan aktivasi ke bentuk aktifnya, memerlukan konversi asam *pyrazinoic (POA)* oleh enzim *pyrazinamidase (PZase)* yang dikode dalam *M. tuberculosis* oleh

gen *pncA*. Serapan dan akumulasi basil dari POA meningkat ketika pH ekstraseluler adalah asam (Anastasia S, 2012, hal. 214).



Gambar 6. Perubahan pirazinamid menjadi bentuk aktifnya

Streptomisin

Seperti dalam bakteri lain, aksinya terhadap spesies mikobakteri adalah dengan mengikat 30s subunit ribosom, yang mempengaruhi polipeptida sintesis, akhirnya menghasilkan penghambatan terjemahan (Anastasia S, 2012).

b. Mekanisme resistensi obat anti tuberkulosis

Isoniazid

Isoniazid merupakan obat anti tuberkulosis yang paling umum digunakan, sehingga resistensi terhadap Isoniazid lebih sering dari pada agen yang lain (Karakousis 2009). Mutasi pada isolat klinis INH-resisten yang paling sering terdeteksi pada gen *katG*, terjadi pada 50-80% kasus, sehingga mengurangi kemampuan *katalase-peroksidase* untuk mengaktifkan INH pro-drug. Gen *katG* terletak di daerah yang bervariasi dan tidak stabil dari *M. tuberculosis*.

Dasar resistensi isoniazid, Sekarang diketahui bahwa mekanisme isoniazid resistensi sangat kompleks dan melibatkan mutasi pada sejumlah gen yang relatif besar. Laporan Dari berbagai wilayah di dunia telah mendeteksi mutasi pada daerah intergenik *katG*, *inhA*, *kasA*, *ndh*, *oxyR-ahpC*, dan beberapa gen lainnya. Di antara semua gen yang terlibat dalam resistensi INH, Mutasi di *katG* nampaknya menjadi kontributor utama (Unissa A. S., 2016, hal. 4).

Ripamfisin

Mayoritas mutasi yang bertanggung jawab atas resistensi ripamfisin telah dipetakan ke tiga hal yang berbeda, yaitu RIF- cluster I (512-534), RIF-cluster II (563-574), dan RIF-cluster III (687), dan dekat pusat gen *rpoB*. Resistensi terhadap ripamfisin biasanya berkembang dalam satu langkah tunggal, dan penyebab genetiknya resistensi RIF pada sebagian besar kasus (95%) disebabkan oleh mutasi pada RIF 81-bp daerah penentuan resistansi (RRDR) dari gen *rpoB* MTB. Wilayah ini sesuai dengan kodon 426 sampai 452 pada genom MTB dan kodon 507 - 533. Substitusi asam amino tunggal adalah jenis mutasi yang paling dominan, diikuti dengan penghapusan infark dan sisipan yang terjadi pada frekuensi rendah. Sebagian besar mutasi yang dilaporkan terjadi pada posisi 521, 526, 531 dan 533 yang sesuai dengan posisi 440, 445, 450 dan 452 pada genom MTB. Perubahan asam amino pada kodon 526 dan 531 umumnya terkait dengan resistansi rifampicin tingkat tinggi, Sementara mutasi pada posisi 514 atau 533 biasanya menghasilkan resistansi rifampicin tingkat rendah. Secara umum, ada korelasi kuat antara substitusi asam amino spesifik dan MIC. Dalam salah satu penelitian kami sebelumnya yang

menyelidiki interaksi molekuler antara rifampicin dan mutasi klinis yang berbeda (MTs) dari MTB dengan mutasi *RpoB* yang bertanggung jawab terhadap tingkat resistansi rifampicin yang sedang, tinggi dan rendah, kami mengamati bahwa kemampuan pengikatan rifampicin bervariasi diantara WT dan MTs, sebagai hasil dari perubahan konformasi protein MT, yang menyebabkan variasi ikatan interaksi dengan rifampicin, dan akhirnya menghasilkan resistensi RIF (Unissa A. D., 2016, hal. 4).

Etambutol

Resistensi terhadap etambutol dalam *M. tuberculosis* biasanya berhubungan dengan mutasi di *embCAB operon*. Studi genetik dan biokimia telah menunjukkan bahwa *EmbA* dan *EmbB* protein yang terlibat dalam pembentukan terminal *hexaarabinofuranoside* selama sintesis arabinogalaktan, sementara *EmbC* terlibat dalam sintesis lipoarabinomannan, Sebagai besar resistensi etambutol mengandung mutasi pada gen *EmbB* (Anastasia S, 2012, hal. 215).

Pirazinamid

Kerentanan *Mycobacterium tuberculosis* terhadap pirazinamid berkorelasi dengan adanya enzim tunggal *PZase* dengan kedua aktivitas *nikotinamidase* dan *pirazinamidase*. Pirazinamid resisten *Mycobacterium tuberculosis* biasanya terjadi di Aktivitas *PZase*, dan korelasi yang baik telah diamati antara resistensi pirazinamid dan kehilangan Aktivitas *PZase*, yang menyebabkan kelangsungan hidup basil melalui penghambatan pembentukan POA. Zhang (1996) mengidentifikasi *pncA* dari *Mycobacterium tuberculosis* dan menunjukkan bahwa mutasi pada gen *pncA*

merupakan mekanisme utama untuk resistensi pirazinamid. Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa 70 - 97% mutasi resistansi pirazinamid terjadi pada bagian struktural atau di daerah Gen *pncA*. Mutasi *pncA* yang diidentifikasi sebagian besar adalah mutasi *missense* yang menyebabkan substitusi asam amino, dan dalam beberapa kasus, *insert* dan penghapusan nukleotida dan mutasi *nonsens* (Unissa A. D., 2016, hal. 16).

Streptomisin

Streptomisin menghambat sintesa protein dengan mengikat 30S subunit ribosom bakteri, menyebabkan kesalahan membaca pesan mRNA selama translasi. Resistensi streptomisin disebabkan oleh mutasi pada S12 protein yang dikode oleh gen *rpsL* dan 16S rRNA yang dikode gen *rrs* (Zhang, 2009).

Mutasi pada *rpsL* (50%) dan *rrs* (20%) merupakan mekanisme utama pada resistensi streptomisin. Mutasi utama pada *rpsL* adalah substitusi pada kodon 43 dari lisin ke arginin yang menyebabkan resisten yang tinggi terhadap streptomisin. Mutasi juga terjadi pada kodon 88. Mutasi gen *rrs* terjadi pada *loop* 16S rRNA yang terdiri dari 2 region nukleotida 530 dan 915 (Zhang, 2009).

3. Resistensi Tuberkulosis

a. Multi Drug Resisten (MDR)

TB-MDR (*Multiple Drug Resistance*) adalah suatu keadaan dimana *Mycobacterium tuberculosis* telah resisten terhadap isoniazid dan rifampisin saja atau resisten terhadap isoniazid dan rifampisin serta OAT lini pertama lainnya.

Fenomena amplifikasi dan penyebaran kasus resistensi TB atau TB-MDR seluruhnya adalah akibat perbuatan manusia. Telah dibuktikan bahwa kejadian resistensi *Mycobacterium tuberculosis* terhadap OAT adalah akibat mutasi alami. Amplifikasi *Mycobacterium tuberculosis* yang resisten selanjutnya terjadi akibat kesalahan manusia, seperti tersebut di bawah ini :

- 1) Kesalahan pengelolaan OAT.
- 2) Kesalahan manajemen kasus TB.
- 3) Kesalahan proses penyampaian OAT kepada pasien.
- 4) Kesalahan hasil uji DST
- 5) Pemakaian OAT dengan mutu rendah (Kementrian Kesehatan RI, 2012)

b. *Extremely Drug Resistant* (XDR)

Extremely Drug Resistant tuberkulosis (XDR-TB) merupakan TB-MDR disertai resistensi terhadap salah satu obat golongan fluorokuinolon dan salah satu dari OAT injeksi lini kedua (kapreomisin, kanamisin dan amikasin) Hasil berbagai kajian di luar negeri memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan insidensi TB-MDR dan TB-XDR. TB-XDR juga sudah dikonfirmasi keberadaannya di Indonesia. Jalan untuk menghambat laju kenaikan masalah TB-XDR dimulai dengan keharusan menjalankan program DOTS sebaik-baiknya dan tidak dengan mudah menjalankan pengobatan dengan OAT lini kedua. Jika akan melakukan pengobatan dengan OAT lini kedua, hendaknya konsisten mengacu pada pedoman yang telah terbukti validitasnya (Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan, 2012).

4. Perkembangan Obat Lama dan Obat Baru

Obat baru telah dikembangkan untuk pengobatan *multidrug-resistant tuberculosis*. Kemajuan dalam mengembangkan regimen obat baru yang ada dilakukan untuk mempersingkat durasi pengobatan obat yang sensitif dan yang resisten TB. Serta untuk membantu akses cepat ke obat-obatan ini dan regimen penting bagi pasien yang membutuhkan. Tetapi penggunaan obat baru dan rejimen harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari penggunaan yang tidak baik dan resisten terhadap obat ini.

Karena sifat dari penyakit ini, tuberkulosis selalu menggunakan rejimen yang terdiri dari setidaknya empat obat yang berbeda. Saat ini, anggota negara Uni Eropa / EEA mengikuti Standar Eropa untuk TB-Care, atau pedoman yang sama untuk pengobatan dan manajemen kasus TB. Karena panjangnya durasi pengobatan dan besarnya jumlah obat diperlukan, pengobatan TB-MDR bahkan lebih menantang daripada pengobatan obat sensitif (DST) TB. Tingkat keberhasilan pengobatan dari semua kasus TB untuk pengobatan kohort 2012 adalah 73,5%. Tingkat keberhasilan pengobatan TB-MDR jauh lebih rendah dengan 37,8% dari TB-MDR kasus memiliki hasil pengobatan yang berhasil untuk kohort pengobatan 2011 (kisaran antara negara 0-75%). Untuk XDR tingkat keberhasilan pengobatan TB terhadap resisten obat untuk kohort pengobatan 2010 hanya 25,9% (Kisaran antara negara 0-100%). Obat baru sangat dibutuhkan untuk memperkuat rejimen saat ini untuk meningkatkan pengobatan TB. Dua obat baru, bedaquiline (dalam produk obat Sirturo yang diproduksi oleh Janssen) dan delamanid (dalam produk obat Deltyba diproduksi oleh

Otsuka) telah resmi di Uni Eropa untuk pengobatan TB. Sebagai tambahan, kandidat obat lainnya sedang dievaluasi dan akan tersedia dalam waktu dekat. Ada beberapa yang sedang berjalan uji coba yang bertujuan untuk menemukan rejimen yang lebih baik untuk mengobati TB aktif dari standar rejimen saat ini. Dalam studi, calon obat baru dalam tahap awal pengembangan, dengan beberapa dari mereka sudah dalam tahap uji coba III. Selain obat-obatan baru, ada sejumlah obat *repurposed* (obat yang awalnya dikembangkan untuk infeksi lain) yang sekarang diuji dan digunakan untuk pengobatan TB (Andreas , 2015).

Beberapa obat baru telah diteliti sebagai calon potensial untuk pengobatan TB. Dalam kebanyakan kasus, mekanisme kerjanya berbeda dari obat anti-TB klasik, meskipun strain yang resisten terhadap beberapa obat-obatan baru sudah telah dijelaskan bahkan sebelum penggunaan klinis mereka.

Nitroimidazoles

Nitroimidazoles merupakan obat baru *antimycobacterial* yang aktif terhadap organisme sensitif dan organisme yang resistan. Obat ini menunjukkan kegiatan serupa terhadap kedua organisme replikasi dan non replikasi, yang menunjukkan potensi untuk mempersingkat terapi. Dua nitroimidazoles saat ini sedang dalam pengembangan klinis. Pertama, OPC-67.683, yang dikembangkan oleh Otsuka *Pharmaceutical Co Ltd* (Tokyo, Jepang), adalah anggota dari nitroimidazo-oxazole subkelas, obat tersebut saat ini sedang dievaluasi dalam percobaan fase II untuk pengobatan MDR TB. Kedua, PA-824, anggota dari nitroimidazooxazine yang subkelas, sedang dikembangkan oleh Aliansi TB New York City, Amerika Serikat,

dan telah menunjukkan keamanan dan tolerabilitas yang baik pada pasien dewasa TB paru Afrika Selatan ketika diberikan sekali dalam sehari selama 7 hari (Lienhardt, 2010).

E. Uraian Metode Pengujian Tuberculosis

1. Media kultur

Mycobacterium tuberculosis tumbuh lambat, dengan waktu 18-24 jam (Bakteri lain tumbuh dalam hitungan menit). Untuk itu, *M.tuberculosis* tidak dapat tumbuh pada teknik bakteriologis biasa dan isolasi primer pada media biasa. Satu-satunya media yang memungkinkan pertumbuhan bakteri ini ialah media telur yang diperkaya dengan gliserol dan asparagin, media agar atau media cair yang mengandung serum atau albumin sapi. Telah banyak media yang dikembangkan untuk pertumbuhan *M.tuberculosis* yang umumnya dikelompokkan menjadi dua yaitu media padat (media telur dan media agar) dan media cair. Antibiotik dapat ditambahkan ke media kultur untuk mencegah pertumbuhan flora non spesifik (Ködmön, 2016, hal. 49).

Media padat dan cair direkomendasikan untuk isolasi *M. tuberculosis* dari sampel biologis. Sebuah keuntungan media padat di atas media cair adalah koloni kultur campuran dan kontaminan dapat diamati sementara media cair meningkatkan pertumbuhan *Mycobacteria* yang lebih cepat. Pilihan media terutama bergantung pada jenis spesimen (Ködmön, 2016, hal. 49).

Media Non-Selektif :

- a. Media berbasis telur: Medium *Löwenstein-Jensen* (LJ) dan medium Ogawa
- b. Media berbasis agar : *Middlebrook 7H10* dan *Middlebrook 7H11*; dan
- c. Media cair : *Middlebrook 7H9*

Media cair memberikan keuntungan waktu yaitu 7-14 hari pada medium cair, dibandingkan dengan media agar *middlebrock 7H11* 18-28 hari, atau 21-42 hari pada medium LJ (Ködmön, 2016, hal. 49).

2. Metode Pengujian

a. *Lowenstein-Jensen* medium

Cara proporsi media *Lowenstein-Jensen* merupakan salah satu cara yang terstandarisasi (Ditjen Bina Upaya Kesehatan, 2012). Media *Lowenstein-Jensen* merupakan modifikasi dari media *Lowenstein* yang dikembangkan oleh Jensen, yang menggunakan telur segar. Jensen memodifikasi medium dengan mengganti sitrat dan fosfat, mengeliminasi *congo red*, dan meningkatkan konsentrasi *malachite green*. Pemakaian media dari telur untuk isolasi primer *Mycobacteria* mempunyai dua keuntungan yaitu media telur dapat digunakan untuk berbagai macam tipe dan pertumbuhan *Mycobacteria*. Medium *Lowenstein-Jensen* mengandung gliserol untuk pertumbuhan *M. tuberculosis*, sedangkan medium LJ tanpa gliserol tetapi mengandung piruvat untuk pertumbuhan *Mycobacterium bovis* (Welfare., 2009).

Prinsip prosedur media *Lowenstein-Jensen* yaitu: L-Asparagin dan *potato meal* merupakan sumber nitrogen dan vitamin dalam media *Lowenstein-Jensen*. Monopotasium fosfat dan magnesium fosfat meningkatkan pertumbuhan organisme

dan bertindak sebagai *buffer*. Gliserol dan suspensi telur menghasilkan asam lemak dan protein yang dibutuhkan untuk metabolisme *Mycobacteria*. Koagulasi dan albumin telur selama sterilisasi menghasilkan media padat untuk fungsi inokulasi. Sodium sitrat dan *malachite green* merupakan agen selektif untuk mencegah adanya kontaminasi dan membiarkan pertumbuhan dini *Mycobacteria* (Accumedia, 2010).

Penelitian yang dilakukan Yadav *et al* (2013) di India menunjukkan bahwa kelemahan metode kultur konvensional dengan media *Lowenstein-Jensen* adalah adanya kontaminasi sebesar 57% atau hasil kultur yang negatif sebesar 38%. Pada uji kepekaan obat dengan media *Lowenstein-Jensen* memerlukan waktu yang lebih lama yaitu 70 hari (28 hari untuk kultur pertumbuhan kuman dan 42 hari untuk uji kepekaan obat).

b. Metode Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT)

Cara ini menggunakan media cair *Middlebrook 7H9* yang dimodifikasi. Pada dasar botol media terdapat indikator yang akan berfluorosensi jika kadar oksigen dalam botol menurun sebagai akibat pertumbuhan *M. tuberculosis*. Tingkat fluoresensi dapat diukur secara manual ataupun secara otomatis. Pada cara manual, fluoresensi diamati sejak hari kedua dan isolat MTB dinyatakan resisten jika fluoresensi terjadi bersamaan sampai dua hari kemudian dibandingkan kontrolnya. Cara manual ini dapat pula diterapkan untuk uji kepekaan langsung dari sputum. Cara MGIT ini telah diakui oleh *Federal Drug Administration* (FDA) Amerika dan setara dengan uji kepekaan cara konvensional maupun BACTEC radiometrik (Sjahrurachman, 2008).

c. Uji Reduktase Nitrat

Uji *nitrat reduktase* (NRA) adalah teknik yang didasarkan pada kapasitas *M. tuberculosis* untuk mengubah nitrat menjadi Nitrit, yang dideteksi dengan menambahkan reagen *Griess* ke medium. Dengan memasukkan 1 mg/ml potasium nitrat (KNO_3) dalam media LJ, reduksi nitrat dapat dideteksi dengan menggunakan pereaksi *Griess*, yang menghasilkan reaksi berwarna dengan adanya rifampisin atau isoniazid pada konsentrasi kritis, kemunculan warna merah-pink untuk mengindikasikan adanya pertumbuhan yang diartikan sebagai resistensi terhadap obat. Hasil bisa didapat lebih cepat dibandingkan dengan deteksi makroskopis koloni, karena NRA menggunakan deteksi penurunan nitrat sebagai indikator (Ködmön, 2016, hal. 79).

d. Metode Microscopically Observed Drug Susceptibility (MODS)

Metode *Microscopically Observed Drug Susceptibility* merupakan metode biakan untuk kuman *M. tuberculosis* dengan media *Middlebrook 7H9* yang sekaligus dapat mendeteksi kepekaan obat TB secara mikroskopik. Uji kepekaan tersebut difasilitasi dengan *Middlebrook 7H9* ditambah obat anti-TB. Metode MODS mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode biakan yang lain dan dapat mendeteksi lebih cepat pertumbuhan *M. tuberculosis* dengan biaya yang relatif lebih murah serta cara yang mudah.

Metode MODS dapat digunakan untuk mendiagnosis yang sensitif (DST), monoresisten dan *multidrug resisten* (MDR) dengan cepat dibandingkan dengan pengujian konvensional. Metode MODS telah dilaporkan memiliki kepekaan 97,8%, dan spesifitas 99,6% (Hardy Diagnostics, 2012, hal. 6).

F. Tinjauan Islam

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan banyaknya berbagai penyakit yang muncul di kalangan masyarakat. Dan salah satu penyakit yang paling berbahaya saat ini adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai penyakit di kalangan masyarakat maka masyarakat dituntut untuk menggunakan akal pikirannya yang juga merupakan pemberian dari sang khalik sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-imran (3): 190-191 yang firmannya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Departemen Agama RI, 2014).

Dari ayat diatas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah swt. memberikan akal kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengkaji hasil ciptaan Allah yang terdapat di sekitar kita. Salah satunya adalah

dengan melakukan penelitian ini, dimana tujuannya adalah untuk memperoleh obat baru dari tumbuhan botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang dapat digunakan sebagai obat anti tuberkulosis.

Allah berfirman dalam Q. S. Asy-syuara (26) : 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, 1989 : 572).

Dalam kitab Tafsir al-Mishbah, dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraian keniscayaan dan ke-Esaan Allah swt, karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2009).

Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah SWT telah menciptakan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang baik di muka bumi ini. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan baik tersebut, salah satunya dalam pengobatan.

Firman Allah swt dalam QS. Al An’am / 6 : 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
خُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ وَمِنَ التَّنَجْلِ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

"Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman" (Q.S Al-An'am: 99).

Menurut Jamaluddin Mahran dalam bukunya Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan, bahwa ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang menurunkan hujan dari awan, lantas mengeluarkan tumbuhan dari berbagai jenis, menumbuhkan tanaman, lalu mengistimewakan salah satu organ tubuhnya yakni daun untuk menjadi piranti penghasil zat hijau yang penting untuk memasak bahan makanan. Perhatikanlah keteraturan dan keindahan buahnya, bagaimana ia diciptakan sampai matangnya, bagaimana ia disempurnakan bentuknya yang beraneka (Mahran, 2005).

Dari ayat tersebut dijelaskan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut terdapat bagian yang menghijau yaitu daun. Sesuai dengan penelitian ini, yaitu memanfaatkan

tanaman hijau tersebut berupa daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) sebagai obat baru dalam pengobatan tuberkulosis.

Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain pada tubuh tumbuhan. Daun biasanya tipis melebar, kaya akan suatu zat warna hijau yang dinamakan klorofil, oleh karena itu daun biasanya berwarna hijau dan menyebabkan tumbuhan atau daerah-daerah yang ditempati tumbuh-tumbuhan nampak hijau pula. Daun ini mempunyai umur yang terbatas, akhirnya akan runtuh dan meninggalkan bekas pada batang (Tjitrosoepomo P. , 2007).

Bentuk daun yang tipis melebar, warna hijau, dan duduknya pada batang yang menghadap ke atas itu memang sudah selaras dengan fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan, yaitu sebagai :

1. Pengambilan zat-zat makanan (*resorpsi*), terutama yang berupa zat gas (CO_2)
2. Pegolahan zat-zat makanan (*asimilasi*)
3. Penguapan air (*transpirasi*)
4. Pernafasan (*respirasi*) (Tjitrosoepomo P. , 2007).

Setiap daun mempunyai kandungan senyawa yang berbeda-beda, sehingga aktifitas farmakologi dari masing-masing daun juga berbeda. Allah SWT menciptakan daun yang beraneka ragam, sehingga manfaatnya juga berbeda-beda. Daun yang mempunyai kandungan senyawa flavanoid dapat digunakan sebagai

antioksidan dan antibakteri. Sedangkan daun yang mempunyai kandungan senyawa fenol dan alkaloid dapat digunakan sebagai antibakteri.

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya (Mushin, 1994: 938).

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada Obatnya, prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah saw. diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw. mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah swt. yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt. maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt. karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muadzin, 2009).

Pengobatan dengan tumbuhan telah lama dilakukan bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti penggunaan air zam-zam, madu dan jintan hitam (Habbatussauda) dalam mengobati berbagai penyakit. Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya di dalam habbatussauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit, kecuali kematian”* (HR. Bukhari).

Madu sebagai sebagai obat tidak hanya terdapat dalam hadits Rasulullah, namun juga dijelaskan dalam firman Allah SWT, yang artinya :

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhan-mu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda (Kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 69).

Untuk itu, seiring berkembangnya zaman, pengobatan dengan obat herbal atau yang berasal dari tumbuhan telah banyak digunakan bahkan telah terbukti khasiatnya melalui berbagai penelitian ilmiah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental kuantitatif.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Maret – 20 Juni 2017.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biofarmasi, Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Laboratorium HUM-RC Pusat Penelitian Kedokteran & Kesehatan Universitas Hasanuddin di RS. Wahidin.

C. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *True Experimental* dengan desain penelitian *Control Group Post Test Only*. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yaitu kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol (Siswanto, S.Ap., M.M, 2014).

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Peralatan yang digunakan yaitu batang pengaduk, *chamber*, corong, effendorf, gelas kimia (pyrex®), gelas ukur (pyrex®), inkubator (Hirayama®), lampu UV 254 dan 366, *Laminar air Flow* (Thermo®), lumpang dan alu, mikroskop, oven,

pipet mikro (Bio-Rad), pipet non pyrogenic 25 ml (Coston®), pipet tetes, plate 24 well (Nunclon®), plate tetes, rotary evaporator (heildoph®), sendok besi, sentripuge, seperangkat alat kromatografi cair vakum, timbangan (Deltarange®), tabung reaksi (pyrex®), tabung sentripuge, timbangan analitik (kern®), toples, Tip (Sorenson®), valcon (Biologix®) vial, vortex (Heidolph®),

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah aquadest, casiton (Bacto®), daun botto-botto (*Chromolaena odorata*), dimetil sulfoksida (DMSO), etil asetat (Brataco®), H₂SO₄ P, isoniazid, isolat bakteri H₃₇RV, gliserol, lempeng KLT, metanol (Brataco®), *middlebrook* 7H9 (Difco®), n-heksan (Brataco®), nutrien OADC (*oxalid acid*, albumin, destrosa, dan katalase) (BD®), pereaksi (AlCl₃, FeCl₃, *Liebermann-Buchard*, *dragendroff*, mayer, wagner), silika GF 254, dan PANTA (*polymyxin*, *amphotericin B*, *nalidixic acid*, *trimethoprim* and *azlocillin*) (BD®).

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan sampel

Sampel penelitian diambil di daerah Samata, Kab.Gowa, Sulawesi Selatan, sebanyak 10 kg basah, kemudian dibersihkan dari kotoran dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah itu diserbukkan.

2. Ekstraksi sampel secara maserasi

Sampel daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang telah diserbukkan dimasukkan ke dalam wadah untuk proses maserasi, dibasahi dengan pelarut metanol hingga semua simplisia terbasahi, diaduk kemudian ditambahkan kembali metanol hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring. Filtrat dan ampas dipisahkan dalam wadah yang berbeda, ampas yang didapatkan dimaserasi kembali dengan menggunakan pelarut metanol, proses ini dilakukan hingga cairan penyari tidak dapat lagi menarik senyawa yang terdapat dalam sampel yang ditandai dengan jernihnya cairan penyari. Sedangkan filtrat yang telah didapatkan, dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator* kemudian diangin-anginkan hingga kering.

3. Metode partisi

Ekstrak kental metanol sebanyak 24,54 gr dimasukkan ke dalam lumpang. Pelarut n-heksan ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam lumpang kemudian digerus. Hasil gerusan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge dan disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 7 menit. Ekstrak yang telah disentrifugasi akan menghasilkan pemisahan antara ekstrak larut heksan dan ekstrak tidak larut heksan. Sentrifuge dilakukan sampai ekstrak larut n-heksan berwarna bening mendekati semula. Ekstrak yang larut n-heksan kemudian ditampung pada mangkuk. Ekstrak yang tidak larut n-heksan digerus kembali dengan penambahan etil asetat sedikit demi

sedikit dan disentrifugasi kembali sehingga akan menjadi ekstrak yang larut etil dan tidak larut etil.

4. Metode fraksinasi (Kromatografi cair vakum)

Fraksinasi dilakukan dengan metode KCV (Kromatografi cair vakum), hasil partisi larut etil daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) ditimbang sebanyak 3,2 g, kemudian ditambahkan sebagian silika GF 254 secara sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen, hingga terbentuk bubuk ekstrak dan silika. Dimasukkan ke dalam senterglass sisa silika GF 254 dan dimanatkan, kemudian ditambahkan bubuk ekstrak ke dalam senterglass dan dimanatkan, dan ditutup dengan kertas saring pada bagian atasnya. Cairan pengelusi adalah eluen pertama yang akan digunakan, ditambahkan melalui dinding kolom dijalankan sehingga eluen turun dan mengelusi komponen kimia. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan, kemudian diamati profil KLT-nya.

Tabel 4 Perbandingan Eluen KCV

No.	Eluen	Perbandingan	Volume (ml)
1	n-Heksan : Etil asetat	6 : 1	110
2	n-Heksan : Etil asetat	4 : 1	110
3	n-Heksan : Etil asetat	2 : 1	110
4	n-Heksan : Etil asetat	1 : 2	110
5	n-Heksan : Etil asetat	1 : 4	110
6	n-Heksan : Etil asetat	1 : 6	110
7	n-Heksan : Etil asetat	1 : 8	110
8	n-Heksan : Etil asetat	1 : 10	110
9	Etil asetat	-	110
10	Etil asetat – Metanol	10 : 1	110
11	Etil asetat – Metanol	8 : 1	110
12	Etil asetat – Metanol	6 : 1	110
13	Etil asetat – Metanol	4 : 1	110
14	Etil asetat – Metanol	2 : 1	110
15	Metanol	-	110

5. Identifikasi komponen senyawa

a. Uji alkaloid

Ekstrak sebanyak 5 mg digerus dengan penambahan kloroform hingga larut. Ditambahkan 0,5 ml asam sulfat 1 M, kemudian dikocok perlahan. Didiamkan beberapa saat sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas yang jernih dibagi dua, 1 bagian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi *dragendorff* dan bagian berikutnya ditambahkan 2-3 tetes pereaksi *mayer*. Endapan merah bata yang terbentuk oleh pereaksi *dragendorff* dan endapan putih oleh pereaksi *mayer* menunjukkan adanya senyawa alkaloid (Fransworth, 1996).

b. Uji Flavonoid

Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dalam 5 ml air panas, didihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat yang didapat lalu dilarutkan dan ditambahkan AlCl_3 . Dikocok dan biarkan terpisah. Terbentuknya warna merah, kuning atau jingga pada lapisan etanol menunjukkan adanya senyawa flavonoid.

c. Uji Saponin

Ekstrak dilarutkan dalam 10 ml air panas, lalu biarkan hingga dingin. Setelah dingin lalu dikocok kuat secara vertikal selama 10 detik. Terbentuknya busa yang stabil setinggi 1 cm dan bila ditambahkan HCL 1% 1 tetes busa tetap stabil menunjukkan adanya senyawa saponin (Tiwari, 2011).

d. Uji Steroid

Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dan disaring. Kemudian filtrat ditambahkan beberapa tetes reagen *Liebermann-Buchard*. Terbentuknya warna hijau atau kebiruan menandakan adanya steroid.

e. Uji Fenol

Sebanyak 0,5 gram ekstrak dilarutkan dengan 2 ml etanol 96% dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl. Terbentuknya warna hitam kebiruan mengindikasikan adanya senyawa fenol (Tiwari, 2011)

6. Uji Aktivitas Antituberkulosis (Ködmön, 2016)

a. Pembuatan media cair *Middlebrook 7H9*

Ditimbang 0,65 g *Middlebrook 7H9* dan casiton 0,138 g kemudian dimasukkan dalam wadah, ditambahkan 0,34 ml gliserol ke dalam wadah dan dicukupkan dengan aquadest hingga 100 ml. Dikocok sampai homogen, disterilisasi menggunakan autoklaf ± 20 menit pada suhu 121°C.

b. Pembuatan stok larutan fraksi 2500 ppm

Ditimbang 25 mg tiap fraksi dan dimasukkan ke dalam wadah vial. Ditambahkan 500 μ l DMSO ke dalam masing-masing vial kemudian dihomogenkan dengan *magnetik stirrer*. Sampel disimpan sebagai larutan stok fraksi.

c. Suspensi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Diambil larutan media cair *middlebrook 7H9* sebanyak 25 ml, dan ditambahkan OADC 2,5 ml, PANTA + 4 OADC 0,5 ml, dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV sebanyak

1 ml, dan disuspensikan ke dalam tabung steril yang berisi 25 ml media *middlebrook* 7H9 dan dihomogenkan.

d. Metode MODS (*Microscopically Observed Drug Susceptibility*)

Disiapkan *plate 24 well* untuk strain H₃₇RV. Dipipet 50 µl DMSO kemudian ditambahkan ke plat H₃₇RV (masing-masing duplo) sebagai kontrol negatif. Dipipet 50 µl obat isoniazid kemudian ditambahkan ke plat H₃₇RV (masing-masing duplo) sebagai kontrol positif. Selanjutnya dipipet 50 µl ekstrak/partisi/fraksi uji ke dalam *well* piring H₃₇RV (masing-masing duplo). Setelah itu, ditambahkan 950 µl suspensi bakteri ke dalam seluruh *well* pada plat lalu dihomogenkan. Kemudian diinkubasi di inkubator selama 7 hari dengan suhu 37° C dan diamati pada mikroskop *fluorescence*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstrak

Dari 10 kg sampel daun botto-botto basah menjadi 5 kg sampel daun botto-botto kering yang di maserasi dengan pelarut metanol sebanyak 17,5 L, diperoleh ekstrak kental sebanyak 275,4 g.

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{274,42 \text{ gram}}{5000 \text{ gram}} \times 100\% = 5,49 \%$$

2. Partisi

Ekstrak metanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.), di partisi dengan metode partisi cair-padat menggunakan pelarut n-Heksan sebanyak 4 L dan etil asetat sebanyak 2 L. Maka diperoleh hasil partisi seperti pada tabel 5.

Tabel 5 Hasil partisi sampel daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.)

Sampel	Hasil Partisi	Berat Hasil Partisi
Ekstrak metanol daun botto-botto 24 gr	n-Heksan	339,4 mg
	Etil Asetat	3951,1 mg
	Tidak Larut Etil Asetat	1045,5 mg

3. Fraksinasi

Hasil partisi larut etil asetat dari ekstrak metanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) di fraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum (KCV) sebanyak 3,2 g dengan perbandingan eluen n-heksan – etil asetat 1:2 sebanyak 15 perbandingan dengan volume 110 ml tiap perbandingan dengan total volume pelarut yang digunakan n-heksan 462,1 ml dan etil asetat 1,091 L. Sehingga diperoleh hasil

15 fraksi yang kemudian digabung menjadi 7 fraksi yang sama melalui penampakan bercak lampu UV 254 nm dan 366 nm pada tabel 6.

Tabel 6 Hasil penggabungan fraksi

No	Fraksi	Fraksi Gabungan	Berat
1	A	Fraksi 2-3	94,8 mg
2	B	Fraksi 4	816,5 mg
3	C	Fraksi 5	760,5 mg
4	D	Fraksi 6	250 mg
5	E	Fraksi 7-10	116,7 mg
6	F	Fraksi 11- 14	197,6 mg
7	G	Fraksi 15	420 mg

4. Uji Golongan Senyawa

Hasil fraksinasi kemudian diidentifikasi dengan uji golongan senyawa yang diujikan dengan beberapa reagen yaitu $AlCl_3$, $FeCl_3$, *mayer*, *dragendroff*, *liebermann-Buchard*, dan *wagner*.

Tabel 7 Hasil Identifikasi Senyawa

No	Sampel	Golongan Senyawa				Kesimpulan
		Alkaloid	Steroid	Flavonoid	Fenol	
1	Ekstrak	+	+	+	+	Alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenol
2	Partisi larut n-heksan	+	-	-	-	Alkaloid dan fenol
3	Partisi tidak larut etil	+	-	+	-	Alkaloid dan flavonoid
4	Partisi larut etil	+	-	+	-	Alkaloid dan flavonoid
5	Fraksi A	+	-	-	+	Alkaloid dan fenol
6	Fraksi B	+	+	-	+	Alkaloid, steroid, dan fenol
7	Fraksi C	+	-	-	+	Alkaloid dan fenol
8	Fraksi D	+	-	+	+	Alkaloid, flavonoid, dan fenol
9	Fraksi E	+	-	+	+	Alkaloid, flavonoid, dan fenol

10	Fraksi F	+	-	+	+	Alkaloid, flavonoid, dan fenol
11	Fraksi G	-	-	-	+	fenol

Keterangan :

- + : Mengandung
- : Tidak Mengandung

5. Uji antituberkulosis

Sampel (ekstrak, partisi, dan fraksi-fraksi) dengan konsentrasi 2500 ppm diujikan dengan metode MODS pada *plate 24 well* dengan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV yang diamati pada hari ke-7 menggunakan mikroskop. Dengan kontrol (-) menggunakan DMSO, dan kontrol (+) menggunakan obat isoniazid. Hasil yang diperoleh sesuai dengan tabel 8.

Tabel 8 Hasil uji Antituberkulosis

No	Sampel	Uji antituberkulosis	Keterangan
1	Kontrol (-)	Tidak Menghambat	Dapat diamati
2	Kontrol (+)	Menghambat	Dapat diamati
3	Ekstrak	-	Tidak dapat diamati
4	Partisi larut heksan	Menghambat	Dapat diamati
5	Partisi tidak larut etil	-	Tidak dapat diamati
6	Partisi larut etil	-	Tidak dapat diamati
7	Fraksi B	Menghambat	Dapat diamati
8	Fraksi C	Menghambat	Dapat diamati
9	Fraksi D	Menghambat	Dapat diamati
10	Fraksi E	Menghambat	Dapat diamati
11	Fraksi F	-	Tidak dapat diamati
12	Fraksi G	Menghambat	Diamati

B. Pembahasan

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi yang menular, disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Penularan langsung terjadi melalui aerosol yang mengandung kuman tuberkulosis. Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok umur dan semua organ tubuh manusia, terutama paru. Tingginya angka default serta penggunaan obat-obat tuberkulosis lini pertama dan kedua yang tidak rasional khususnya oleh rumah sakit dan sektor swasta memberikan tantangan ke depan yang besar dalam masalah TB-MDR dan bahkan TB-XDR telah ditemukan di Indonesia. Menurut perkiraan WHO secara nasional angka MDR sekitar 2-3% untuk kasus baru di Indonesia (Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan, 2012, hal. 1-2)

Mycobacterium tuberculosis strain H₃₇RV adalah strain tuberkulosis yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Bakteri ini pertama kali diisolasi oleh Dr. Edward R baldwin pada tahun 1905. Strain ini berasal dari seorang pasien berusia 19 tahun dengan penyakit tuberkulosis paru klinis di Newyork. Seiring waktu, strain ini memiliki virulensi yang bervariasi. H₃₇R merupakan strain yang kurang ganas, H₃₇S merupakan strain yang ganas, dan H₃₇RV merupakan strain yang lebih ganas (*Virulent*).

Tanaman botto-botto telah banyak digunakan sebagai tanaman obat yang telah terbukti memiliki aktivitas penyembuhan luka, antibakteri, antimalaria, antiinflamasi, antioksidan, analgesik dan antiimunopresif, *sitotoxic*, antifungi, dan efektif untuk kanker payudara.

Kandungan kimia dari tanaman ini ialah flavonoid (yaitu, rhamnetin, tamarixetin, ombuin, kaempferid, isosakuranetin, odoratin, rhamnositrin, laciniatin, acacetin, luteolin), fenolik (seperti p-cumaric, ferulic, asam vanilic), alkaloid, dan kaya akan *essential oil* seperti α -pinene, β -pinene, germacrene D, β -copaen-4-alpha-ol, β -caryophyllene, geigerene, pregeijerene, cadinene, camphor, limonene (Finnie, 2015).

Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa dengan pelarut tertentu. Penggunaan pelarut metanol pada proses ekstraksi untuk menarik senyawa-senyawa yang ada pada daun botto-botto. Pelarut metanol ini bersifat semipolar yang dapat melarutkan senyawa kimia yang memiliki kepolaran tinggi maupun kepolaran rendah dalam simplisia, sulit ditumbuhi jamur dan bakteri, mudah diuapkan serta relatif lebih murah. Hasil ekstraksi sampel daun botto-botto diperoleh sebanyak 275,4 g dari 5 g simplisia.

Partisi merupakan tahap awal pemurniaan ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut yang tak bercampur yang ditambahkan ke dalam ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut tak bercampur yang kepolarannya meningkat. Partisi biasanya melalui dua tahap yaitu n-heksan untuk menghasilkan senyawa non polar di lapisan organik, air/diklorometan atau air/etil asetat untuk membuat fraksi agak polar di lapisan organik. Partisi dapat memberikan pemisahan yang sangat baik terutama untuk senyawa-senyawa yang memiliki kelarutan yang sangat berbeda (Heinrich, 2005). Hasil partisi yang diperoleh dari ekstrak metanol daun botto-botto yaitu, partisi

larut n-heksan sebanyak 339,4 mg, partisi tidak larut etil sebanyak 1045,5 mg, dan partisi larut etil sebanyak 3951,1 mg.

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dan paling umum untuk memurnikan sejumlah kecil komponen (2-4). Metode ini menggunakan lempeng kaca atau aluminium yang telah dilapisi dengan penyerap (misalnya silika gel) dengan ketebalan tertentu. Campuran senyawa diisikan 1-2 cm dari tepi dasar lempeng berupa bercak ataupun pita memanjang. Lempeng kemudian dimasukkan ke dalam bejana kromatografi berisi pelarut yang telah ditentukan sebelumnya yang akan meresap naik ke di dalam lempeng dan memisahkan campuran berdasarkan polaritas komponennya (Heinrich, 2005). Hasil identifikasi KLT yang diperoleh dari partisi larut etil dengan pelarut n-heksan-etil asetat ialah 1:2 yang kemudian dilanjutkan ke fraksinasi.

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada partisi larut etil asetat 3 gram dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, IR, 2012).

Adapun hasil yang diperoleh pada fraksinasi diperoleh 15 fraksi yang kemudian digabung menjadi 7 fraksi. Fraksi 2-3 (fraksi A) sebanyak 94,8 mg, fraksi 4 (fraksi B) sebanyak 816,5 mg, fraksi 5 (fraksi C) sebanyak 760,5 mg, fraksi 6 (fraksi D) sebanyak 250 mg, fraksi 7-10 (fraksi E) sebanyak 116,7 mg, fraksi 11-14 (fraksi F) sebanyak 197,6 mg, fraksi 15 (fraksi G) sebanyak 420 mg. Dan hasil identifikasi senyawa yang diperoleh, untuk sampel ekstrak metanol mengandung senyawa alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenol. Partisi larut heksan mengandung alkaloid. Partisi tidak larut etil mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid. Partisi larut etil mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid. Fraksi A mengandung senyawa alkaloid dan tanin. Fraksi B mengandung senyawa alkaloid, steroid dan tanin. Fraksi C mengandung senyawa alkaloid dan tanin. Fraksi D mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin. Fraksi E mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin. Fraksi F mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin. Fraksi G mengandung senyawa steroid dan tanin,

Pada uji antituberkulosis digunakan metode MODS, karena pada metode ini memiliki beberapa kelebihan yaitu penggunaan media cair (*middlebrook 7H9*) sehingga bakteri lebih cepat berkembangbiak, terdapat kandungan nutrisi pada media cair yaitu OADC (*oxalid acid*, albumin, destrosa, dan *katalase*) sebagai nutrisi pertumbuhan bakteri dan PANTA (polymyxin, amphotericin B, nalidixic acid, trimethoprim and azlocillin) sebagai antibiotik untuk mencegah adanya pertumbuhan bakteri lain (selain bakteri *Mycobacterium tuberculosis*) pada medium, waktu

pengerjaan berlangsung cepat, sekitar 7-14 hari.. Dan dilakukan pengamatan langsung di bawah mikroskop.

Pada metode MODS, plat yang digunakan adalah plat 24 *well*, dengan kapasitas tiap *well* (sumuran) adalah 1 ml. Dalam 1 ml mengandung 940 µl media MODS, 10 µl bakteri tuberkulosis, dan 50 µl ekstrak. Perbandingan ini merupakan perbandingan yang terbaik untuk pengujian MODS.

Adapun hasil dari pengujian antituberkulosis, dengan *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv diperoleh hasil untuk kontrol (-) dengan perlakuan penambahan DMSO terdapat pertumbuhan bakteri, untuk kontrol (+) dengan perlakuan penambahan obat isoniazid tidak terdapat pertumbuhan bakteri, sampel partisi larut heksan diperoleh hasil dapat menghambat pertumbuhan bakteri, hal ini ditandai dengan adanya bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang membentuk *cord* pada sumuran dengan jumlah yang sedikit dibandingkan kontrol negatif. pada sampel fraksi B, fraksi C, fraksi D, fraksi E, fraksi G, diperoleh hasil tidak ada pertumbuhan bakteri. Untuk sampel ekstrak, partisi larut etil, partisi tidak larut etil, dan fraksi F tidak dapat diamati, hal ini disebabkan karena konsentrasi ekstrak yang tinggi sehingga sampel menutupi permukaan sumuran.

(Suksamrarn A. C., 2004), telah melakukan penelitian yang berjudul “*Antimycobacterial activity and cytotoxicity of flavonoids from the flowers of Chromolaena odorata*”. Dalam penelitiannya, mereka mengisolasi senyawa flavonoid yang terdapat pada daun botto-botto, yang kemudian diujikan pada *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Ra dengan metode *microplate alamar blue*

assay (MABA). Dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa senyawa flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* adalah senyawa isosakuratenin, 4'-Hydroxy-5,6,7-trimethoxyflavanone, acacetin dan luteolin.


Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antimikroba. Golongan fenolik ini diduga menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab menghambat pertumbuhan mikroba. Cara kerja senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. (Pelczar, Michael J, 2008)

Berbagai mekanisme flavonoid sebagai antibakteri ialah : (Lamb, Cushnie, & J., 2005)

1. Penghambatan sintesis asam nukleat
2. Penghambatan fungsi membran sitoplasma
3. Penghambatan metabolisme energi

Berbagai flavonoid telah diidentifikasi mempunyai sifat antimikroba yaitu apigenin, galangin, pinocembrin, ponciretin, sophoraflavanone G dan turunannya, naringin dan naringenin, epigallocatechin gallate dan turunannya, luteolin dan luteolin 7-Glukosida, kuersetin, 3-O-methylquercetin dan berbagai quercetin glikosida, kaempferol dan turunannya. Flavon lainnya, flavon glikosida, isoflavon, flavanon, isoflavanon, isoflavans, flavonol, flavonol glikosida dan *chalcones* (Lamb, Cushnie, & J., 2005).

Senyawa flavonoid yang terdapat pada tanaman botto-botto ialah Isosakuranetin (1), Persicogenin (2), 5,6,7,4'-Tetramethoxyflavanone (3), 4'-Hydroxy-5,6,7-trimethoxyflavanone (4), 2'-Hydroxy-4,4',5',6'-tetramethoxychalcone (5), 4,2'-Dihydroxy-4',5',6'-trimethoxychalcone (6), Acacetin (7), dan Luteolin (8).




senyawa flavonoid yang bersifat sebagai antimikroba ialah Isosakuranetin, Acacetin, Luteolin yang dapat menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.


Alkaloid merupakan senyawa yang telah banyak menghasilkan obat antibakteri. Mekanisme antibakteri yang telah diidentifikasi yaitu

1. Menghambat sintesis asam nukleat, karena menghambat reduktase enzim dihydrofolat.

2. Menghambat pembentukan Z-ring dan menghambat pembelahan sel.
3. Menghambat sintesis enzim topoisomerasi tipe I dan II

Beberapa senyawa alkaloid telah diidentifikasi sebagai senyawa yang mempunyai aktifitas antimikroba yaitu aaptamin, indol, indolizidin, isoquinoline, piperazine, quinoline, quinolone, agelasine, dan polyamine, aaptamine-indole, bisindole, indol quinoline, pyridoacridine, bispirol, dan kelas pirol-imidazol (Cushnie, Cushnieb, & J., 2014, hal. 3).





- kelas alkaloid heterosiklik utama yang memiliki aktivitas antibakteri
- subkelas alkiloid indol yang memiliki aktivitas antibakteri
- subkelas isoquinolin yang memiliki sifat antibakteri (Cushnie, Cushnie, & J., 2014, hal. 5).

Hasil penelitian dari sampel partisi larut heksan, fraksi B, fraksi C, fraksi D, fraksi E, fraksi G, yang dapat menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* hal dapat dikaitkan dengan adanya kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, dan fenol yang mempunyai aktivitas sebagai antimikroba.

Islam sangat memperhatikan kesehatan, terutama pengobatan baik itu kuratif maupun preventif. Baik itu pengobatan yang didasari oleh penelitian. Karena setiap penyakit ada obatnya, untuk itu kita terus melakukan penelitian atau eksperimen yang didasari dengan ilmu pengetahuan untuk pencarian obat baru. Diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraik , bahwasanya Nabi SAW. bersabda,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدَاوَى فَقَالَ نَعَمْ عِبَادَ اللَّهِ
 تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ
 قَالُوا مَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

Terjemahan : Dari Usamah bin Syuraik “Bahwa Aku pernah berada di samping Rasulullah SAW. Lalu datanglah serombongan orang Arab. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al-Jami’ Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486).

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua. Dengan begitu, penyakit tuberkulosis, meskipun telah lama ditemukan obatnya namun masih banyak menyebabkan kematian. Untuk itu, pencarian obat baru untuk penyakit tuberkulosis terus dilakukan, untuk mengurangi akibat dari penyakit tuberkulosis. Salah satunya ialah daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang telah terbukti dapat menghambat *Mycobacterium tuberculosis*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa partisi larut heksan, fraksi B, fraksi C, fraksi D, fraksi E, dan fraksi G memiliki aktifitas sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang ditandai tumbuhnya sedikit *Mycobacterium tuberculosis* dibandingkan kontrol negatif (DMSO). Sedangkan untuk sampel yang lain, tidak dapat diambil kesimpulan karena hasil yang diperoleh tidak dapat diamati.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, agar menggunakan konsentrasi yang lebih rendah pada sampel dan dilakukan pengujian lanjutan dengan mengkombinasi MODS (*Microscopically Observed Drug Susceptibility*) dan metode *Lowenstein jensen* untuk mengetahui jumlah bakteri yang dapat dihambat oleh daun botto-botto (*Chromolaena odorata*).

KEPUSTAKAAN

- Amatya,S., T. (2011). *In vitro antioxidant activity of extracts from Eupatorium odoratum* L. Res.J.Med.Plant, 79-84.
- Amazu, L. (2013). *Anticonvulsant potency of the leaf extract of Chromolaena odorata in rats*. UniqueRes.J.Med.Med.Sci.1., 1, 64-69.
- Anastasia S, K. (2012). *Old and New TB Drugs : Mechanisms of Action and Resistance, Understanding Tuberculosis*. Dalam *Understanding Tuberculosis - New Approaches to Fighting* (hal. 209-229). USA: INTECH.
- Andreas , S. (2015). *Expert Opinion on the introduction of new drugs for tuberculosis control in the EU/EEA*. Eropa: ECDC.
- Atindehou, M. (2013). *Isolation and Identification of two Antibacterial Agents from Chromolaena odorata L. Active againts four diarrheal strains* (Vol. 3). France: University of Strasbourg, Strasbourg, France.
- Atindehou, M., L. (2013). *Isolation and identification of two anti-bacterial agents from Chromolaena odorata L. Active Agents from diarrheal strains*. Adv. Microbial, 3, 115-121.
- Ayensu, E. (1978). *Medicinal Plants of West Africa*. Reference Publication Inc.
- Bhargava,D., S. (2011). *Screening of anti-gonorrhoeal activity of some medicinal plants in Nepal* . 203-212.
- Biller, A., Michael, witte, L., Hartmann, & Thomas. (1993). *Pyrrolizidine Alkaloids In Chromolaena Odorata. Chemical And Chemoecological Aspects*. PhytochemLclry., 35(3), 615-619.
- Biswal PR et al. (1997). *Wound healing effect of eupatorium odoratum linn, and himax in rabbits*. India: Indian Journal of Indigenous Medicines.
- Brooks GF, , B. (2010). *Medical Microbiology. International Edition*. New York: McGraw-Hill.

- Caceres, A., M. (1995). *Anti-gonorrhoeal activity of plants use din Guatemala for the treatment of sexually transmitted diseases*. J.Ethnopharma, 85-88.
- Chakraborty et al., (2010). *Evaluation of Analgesic Activity Studies of Various Extracts of Leaves of Eupatorium Oduratum Linn*. Internasional Jurnal of Pharmacy and Technology.
- Chakraborty, A. K., Rambhade, S., & Patil, U. k. (2011). *Chromolaena odorata (L.) : An Overview*. Journal of Pharmacy Research, 4(3), 573-576.
- Cushnie, T. T., Cushnie, B. L., & J., A. (2014). *Review Alkaloids: An overview of their antibacterial, antibiotic-enhancing and antivirulence activities*. International Journal of Antimicrobial Agents, 1-10.
- Dat, N. T., Lee, K., Hong, Y.-S., Kim, Y. H., Minh, C. V., & Lee, J. J. (2009). *A Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma Agonist and Other Constituents from Chromolaena odorata*. Korean Research Institute of Biosciences and Biotechnology, 75, 803-807.
- Debidani Mishra et. (2010). *Phytochemical investigation and evaluation of anthelmintic activity of extract from leaves of Eupatorium odoratum linn*. J.Pharm. Educ. Res., 369-374.
- Debidani Mishra et al., M. (2010). *Phytochemical investigation and evaluation of anthelmintic activity of extract from leaves of Eupatorium odoratum linn*. J.Pharm. Educ. Res., 369-374.
- Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan. (2012). *Perunjuk Teknis Pemeriksaan Biakan, Identifikasi, dan Uji Kepekaan Mycobacterium Tuberculosis pada Media Padat*. Kementerian Kesehatan RI.
- Dirjen POM. (1986). *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Emeje, C. E. (2014). *Antiplasmodial Activity-Aided Isolation and Identification of Quercetin-4'-methyl ether in Chromolaena odorata Leaf Fraction with High Activity Against Chloroquine-Resistant Plasmodium falciparum*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

- Finnie, A. G. (2015). *Chromolaena odorata (L.) R.M.King&H.Rob.(Asteraceae) in sub-Saharan Africa : A synthesis and review of its medicinal potential*. Journal of Ethnopharmacology .
- Fransworth, N. (1996). *Biological and Phytochemical Screening of Plants*. Pharmaceutical Sciences, 55(3).
- Gill, L. (1992). *Ethnomedical Uses of Plants Nigeria*. Uniben Press .
- Hang, H. &. (2011). *Anti-inflammatory Effect Of Fatty Acids Isolated From Chromolaena Odorata*. Elsevier.
- Harbone JB.,. (1973). *Phytochemical Methods*. New York: Holdsted Press.
- Hardy Diagnostics. (2012). *Hardy TB MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility Assay) Kit™. TB MODS KIT*.
- Heinrich, M. (2005). *Farmakognosi dan Fitoterapi*. (S. Amalia H.Hadinata, Penyunt.) Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Idu, M.,, O. (2007). *Medicinal plants of Edostate*. Res.J.Med.Plant, 32-41.
- Irobi, O. (1992). *Activities of Chromolaena odorata (Compositae) leaf extract against Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus faecalis*. Journal of Ethnopharmacology, 37, 81-83.
- Jasnie, F. (2009). *Biological Activities And Chemical Constituents Of Chromolaena odorata (L.) King & Robinson*.
- Jawetz, ed al. (2010). *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Julian, R. (2015, May). *Activity-Guided Separation of Chromolaena odorata Leaf Extract Reveals Fractions With Rice Disease-Reducing Properties*. Eur J Plant Pathol.
- Kemenkes. (2016). *Pusat Data dan Informasi Tuberkulosis*. Infodatin.
- Kementrian Kesehatan RI. (2012). *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Biakan, Identifikasi, dan Uji Kepekaan Mycobacterium Tuberculosis pada Media Padat*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

- Ködmön, C. (2016, Maret). *Handbook on TB laboratory diagnostic methods for the European Union*. European Centre for Disease Prevention and Control.
- Kouamé, P. B.-K., Jacques, C., Bedi, G., Silvestre, V., Loquet, D., Barillé-Nion, S., et al. (2012). *Phytochemicals Isolated from Leaves of Chromolaena odorata: Impact on Viability and Clonogenicity of Cancer Cell Lines*. Elucidation of Biosynthesis by Isotopic Spectrometry Group, CEISAM, University of Nantes.
- Lamb, T., Cushnie, T., & J., A. (2005). *Antimicrobial activity of flavonoids*. *Antimicrobial Agents*, 26, 343-356.
- Lienhardt, C. (2010). *New drugs and new regimens for the treatment of tuberculosis: review of the drug development pipeline and implications for national programmes*. USA: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
- Lubis, A. H. (1994). *Pemeriksaan Fitokimia dan Uji Pendahuluan Aktivitas Turbinaria*. Bandung: Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
- Mahran, J. (2005). *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan Obat-obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Manli, Z. L. (2015). *A New Bidihydroflavone Isolated From Chromolaena odorata*. *Chemistry of Natural Compounds*, 15, 637-639.
- Muadzlin, M. d. (2009). *Semua Penyakit ada Obatnya, Menyembuhkan Penyakit Ala Rasulullah*. Jakarta: Mutiara Medika.
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa*. *Jurnal Kesehatan*.
- Mullika, T. (2005). *Antimicrobial effects of Thai medicinal plants against acneinducing bacteria*. *Journal of Ethnopharmacology*, 330-333.
- Mutiasari, IR. (2012). *Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi Aktif*. *Jurnal Fitokimia*.
- Naidoo, K.K, C. (2011). *Screening of Chromolaena odorata (L.) King and Robinson for anti-bacterial and anti-fungal properties*. *J.Med. Plant.*, 4859-4862.


- Ngono, N. (2006). *Anti-fungal activity of Chromolaena odorata (L.) King & Robinson (Asteraceae) of Cameroon*. Chemotherapy. 103-106.
- Ngozi, , I. (2009). *Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*. Journal of Nutrition.
- Oludare, T. (2000). *Anti-Inflammatory, Antipyretic And Antispasmodic Properties Of Chromolaena Odorata*. Pharmaceutical biology., 367-370.
- Owoyele, V.B., A. (2005). *Anti-inflammatory activity of aqueous leaf extract of Chromolaena odorata*. Inflammo pharmacology, 479-484.
- PDPI. (2011). *Tuberkulosis. Pedoman diagnosis dan penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Pelczar, Michael J, C. (2008). *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- Phan, T. (2004). *Extracts from Leaves of Chromolaena odorata A.Potential Agent for wound Healing*. Herbal Traditional Medicine: Marcel Dekker.
- Phan, Toan Thang et al. (2000). *Anti-oxidant effects of the extracts from the leaves of Chromolaena odorata on human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes against hydrogen peroxide and hypoxanthine–xanthine oxidase induced damage*., J of the international society.
- Prawiradiputra, , B. (2006). *Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak.
- Prawiradiputra, B. R. (2006). *(Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak.
- Raina, R., P. (2008). *Medicinal plants and the irrole in wound healing*. Outl.Vet.J.3,, 1-7.
- Raman, S. (2012). *Anti-bacterial, antioxidant activity and GC–MS analysis of Eupatorium odoratum*. J.Pharmacol.Clin.Res., 99-106.
- Rejitha, G. (2009). *Diuretic activity of Eupatorium odoratum Linn*. Journal of Pharmacy Research,.

- Rungnapa, O. (2003). *Phytochemistry and Antimalarial activity of Eupatorium Odoratum. L.*
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. Volume 3). Jakarta: Lentera Hati.
- Siswanto, S.Ap., M.M, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Kedokteran.* Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Sjahrurachman, A. (2008). *Kultur dan uji kepekaan M. tuberculosis terhadap obat anti tuberculosis lini pertama.* Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Smeltzer, S, Bare BG. (2002). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth* (Vol. 8). Jakarta: Buku Kedokteran.
- Sudarmo, S. (2014). *Mudah Membuat Peptisida Nabati.* Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Sudjadi. (1988). *Metode pemisahan.* Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM.
- Suksamrarn, a. e. (2004). *Antimycobacterial activity and cytotoxicity of flavonoids from the flowers of Chromolaena odorata.* Article of Pharmacial Research, 27(5).
- Takayama, S. e. (1975). *Site of inhibitory action of isoniazid in the synthesis of mycolic acids in Mycobacterium tuberculosis.* 308-317.
- Thoung L.H, H. T. (2015). *Antimicrobial Activity of Senna alata (L.), Rhinacanthus nasutus and Chromolaena odorata (L.) Collected in Southern Vietnam.* Springer International, 46, 1.
- Tiwari, P. B. (2011). *Phytochemical Screenig and Extraction : A Review.* International Pharmaceutical Science. Pharmaceutical Sciences, 1(1), 98-106.
- Tjitrosoepomo, G. (2010). *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).* Yogyakarta.
- Tjitrosoepomo, P. (2007). *Morfologi Tumbuhan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Triratana T., S. (1991). *Effect of Eupatorium odoratum on blood coagulation.,* J Med Assoc Thai.


- Unissa, A. D. (2016). *Molecular mechanism of action, resistance, detection to the first-line anti tuberculosis drugs: Rifampicin and pyrazinamide*. India: Department of Clinical Research,.
- Unissa, A. S. (2016). *Overview on mechanisms of isoniazid action and resistance in Mycobacterium*. india: Division of Mycobacteriology, National Tuberculosis Institute.
- Vaisakh,M.N, , P. (2012). *The Invasive Weed With Healing Properties: A Review On Chromolaena odorata*. International Journal Of Pharmaceutical Sciences & Research, 3(1), 80-83.
- Welfare., M. o. (2009). *Revised national TB control programme training manual for Mycobacterium tuberculosis culture & drug susceptibility test*.
- World Health Organization. (2014). *Global Tuberculosis Report 2014*. Switzerland: WHO.
- World Health Organization. (2016). *Global Tuberculosis Report 2016*. Switzerland: WHO.
- Yun Astuti. N, M. (2010). *Hambatan Pertumbuhan Koloni M.Tuberculosis H37RV dan MDR-TB oleh Ekstrak Daun Hibiscus Similis (Waru) di Laboraturium*. (B. P. Pengembangan, Penyunt.) Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Zhang, Y. (2009). *Mechanisms of Drug Resistance in Mycobacterium tuberculosis*. The International journal of tuberculosis and lung disease.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian



Lampiran 2. Uji Antituberkulosis



Lampiran 3. Perhitungan

1. Pembuatan larutan stok fraksi

$$\begin{aligned} 50.000 \text{ bpj} &= 50.000 \text{ mg} / 1000 \text{ ml} \\ &= 50 \text{ mg} / 1 \text{ ml} \text{ atau } 25 \text{ mg} / 500 \mu\text{l} \end{aligned}$$

Konsentrasi dalam media (2500 bpj/ppm)

$$\begin{aligned} 50.000 (0,05 \text{ ml}) &= 2500 \cdot X \\ 2500 &= 2500 \cdot X \\ X &= 1 \text{ ml} \end{aligned}$$

2. Perhitungan nilai Rf

$$R_f : \frac{\text{Jarak Tempuh Noda}}{\text{Jarak Tempuh Eluen}}$$

a. Fraksi 2

$$R_f : \frac{5,5}{5,5} = 1$$

b. Fraksi 3

$$R_f : \frac{5,4}{5,5} = 0,981$$

c. Fraksi 4

$$R_f : \frac{5}{5,5} = 0,909$$

d. Fraksi 5

$$R_f : \frac{4,8}{5,5} = 0,872$$

e. Fraksi 6

$$R_f : \frac{3,2}{5,5} = 0,581$$

f. Fraksi 7

$$R_f : \frac{1,6}{5,5} = 0,290$$

g. Fraksi 8
 $Rf : \frac{1,6}{5,5} = 0,290$

h. Fraksi 9
 $Rf : \frac{1,6}{5,5} = 0,290$

i. Fraksi 10
 $Rf : \frac{1,6}{5,5} = 0,290$


j. Fraksi 11
 $Rf : \frac{1,1}{5,5} = 0,2$

k. Fraksi 12
 $Rf : \frac{1,1}{5,5} = 0,2$

l. Fraksi 13
 $Rf : \frac{1,1}{5,5} = 0,2$

m. Fraksi 14
 $Rf : \frac{1,1}{5,5} = 0,2$

n. Fraksi 15
 $Rf : \frac{0,5}{5,5} = 0,09$




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4. Gambar Penelitian



Gambar 7 Ekstrak Daun Botto-botto


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 8. Partisi

Keterangan :

- A. Proses partisi ekstrak metanol daun botto-botto
- B. Hasil partisi tidak larut etil
- C. Hasil partisi larut etil
- D. Hasil partisi larut n-heksan



Gambar 9. Profil KLT



Keterangan :

A : Profil KLT dilihat pada UV 254

B : Profil KLT dilihat pada UV 366


Fase Gerak : n-Heksan : Etil asetat (1:2)

Fase Diam : Silika gel GF₂₅₄



Gambar 10. Fraksinasi


- Keterangan :
- A : Proses Fraksinasi
- B : Hasil Fraksinasi
- Eluen : n-Heksan : Etil asetat (1:2) 110 ml
- Jumlah fraksi : 15



Gambar 11. Profil KLT fraksi

Keterangan :


- A. Profil KLT fraksi 2-5 dilihat pada UV 254
- B. Profil KLT fraksi 6-9 dilihat pada UV 254
- C. Profil KLT fraksi 10-13 dilihat pada UV 254
- D. Profil KLT fraksi 2-5 dilihat pada UV 366
- E. Profil KLT fraksi 6-9 dilihat pada UV 366
- F. Profil KLT fraksi 10-13 dilihat pada UV 366



Gambar 12. Hasil Penggabungan Fraksi

Keterangan :

- A. Fraksi A : Fraksi 2-3
- B. Fraksi B : Fraksi 4
- C. Fraksi C : Fraksi 5
- D. Fraksi D : Fraksi 6
- E. Fraksi E : Fraksi 7-10
- F. Fraksi F : Fraksi 11-14
- G. Fraksi G : Fraksi 15



Gambar 13. Identifikasi Senyawa


Keterangan :

A : Fraksi A sebelum penembahan reagen

B : Fraksi B sebelum Penambahan Reagen

C : Fraksi ABCDEF setelah penembahan reagen


Reagen : *Dragendroff*, AlCl_3 , wagner, mayer, FeCl_3 , *Liebermann-buchard*




Gambar 14. Proses pengujian antituberkulosis

Keterangan :

- A. Proses pembuatan larutan stok fraksi
- B. Pengujian sampel dengan metode MODS
- C. Plate 24 well :
 - 1 - 2 : Kontrol – (DMSO)
 - 3 - 4 : Kontrol + (Isoniazid)
 - 5 - 6 : Ekstrak
 - 7 - 8 : Partisi larut n-heksan
 - 9 - 10 : Partisi tidak larut etil
 - 11 - 12 : Partisi larut etil
 - 13 - 14 : Fraksi B
 - 15 - 16 : Fraksi C
 - 17 - 18 : Fraksi D
 - 19 - 20 : Fraksi E
 - 21 - 22 : Fraksi F
 - 23 - 24 : Fraksi G





gambar 15. Hasil Pengujian Antituberkulosis strain H₃₇RV hari ke-7

Keterangan :

1. DMSO sebagai Kontrol (-)
2. Obat Isoniazid sebagai kontrol (+)
3. Ekstrak metanol daun botto-botto
4. Partisi larut heksan
5. Partisi tidak larut etil
6. Partisi larut etil
7. Fraksi B
8. Fraksi C
9. Fraksi D
10. Fraksi E
11. Fraksi F
12. Fraksi G

RIWAYAT HIDUP



St. Rahmah Akbar, biasa dipanggil Ammha. Anak ketiga dari H.Akbar (Alm) dan Hj. Wahidah dari empat bersaudara. Lahir pada tanggal 21 September 1995 di Takkalasi Kab.Barru. Dia memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Takkalasi, kemudian lanjut ke Madrasah Tsanawiah PONPES DDI Takkalasi pada tahun 2007 di Kab. Barru, kemudian SMAN 1 SOPPENG RIAJA Kab.Barru pada tahun 2010. Dan pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Dan pada tahun 2017 berhasil memperoleh gelar sarjana Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R