

**ISOLASI DAN UJI AKTIVITAS ENZIM AMILASE DARI
BAKTERI TERMOFILIK PADA SUMBER AIR PANAS DESA
PINCARA KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh

KHADIJAH JAKA

NIM.60500108009

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini berupa duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2012

penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Khadijah Jaka
NIM:60500108009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "Isolasi Dan Uji Aktivitas Enzim Amilase Dari Bakteri Termofilik Pada Sumber Air Panas Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara", yang disusun oleh Khadijah Jaka, NIM: 6050010800, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 M, bertepatan dengan 5 Safar 1433 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi Jurusan Kimia

Makassar, 19 Desember 2012 M.
5 Safar 1433 H.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd (.....)

Sekretaris : Wasilah. S.T.,M.T (.....)

Munaqisy I : Aisyah, S.Si.,M.Si (.....)

Munaqisy II : Syamsidar HS, S.T.,M.Si (.....)

Munaqisy III : Hasyim Haddade, S.Ag.,M.Ag (.....)

Pembimbing I : Maswati Baharuddin, S.Si.,M.Si (.....)

Pembimbing II : Suriani, S.Si.,M.Si (.....)

Diketahui oleh :
Dekan fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd
NIP : 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi umat di dunia. Dialah Nabi akhir zaman, revolusioner dunia, yang mampu menguak dan merubah kejahilnaan menuju *sirothol mustaqim*, yakni agama Islam. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Atas segala fasilitas yang diberikan selama dalam proses pembelajaran di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd,selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi serta Ibu Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Pembantu dekan I, Bapak Muhammad Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed. selaku Pembantu dekan II, dan Bapak Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag., selaku Pembantu Dekan III dan pembimbing III

atas segala fasilitas yang diberikan selama proses pembelajaran serta nasehat dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

3. Ibu Maswasti Baharuddin, S.Si., M.Si, selaku ketua Jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi dan sekaligus pembimbing I yang segala ketulusan hati meluangkan kesempatan untuk membimbing, memberi arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Suriani S.Si, M.Si selaku pembimbing II yang tidak pernah mengenal lelah dalam membimbing, membina dan memberi petunjuk dengan penuh ketulusan hati hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
5. Bapak H. Asri Saleh ST. M.Si selaku sekretaris Jurusan Kimia
6. Ibu Syamsidar HS S.T, M.Si, ibu Aisyah SSi, M.Si., dan Bapak Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag selaku penguji I, penguji II dan penguji III yang senantiasa memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Makassar.
8. Ibu Nurmiah Muin dan seluruh pegawai Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan pelayanan akademik pada penulis
9. Kepada sahabat-sahabatku tersayang kimia 08 (Sri Wahyuni Jaris, Irwan, Irnaningsih, Ismawanti, Mirnawati, Saadatul Husna, Ummi Zahra, Jumriani, Fitriani, Fitri Abidin, Abdul Kholiful Amri, Syamsuddin, Muhammad Tasjiddin

Teheni dan Annisah) yang selalu menasehati, menemani menjalani hari-hari di Kampus dan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Terkhusus Mutmainnah yang sama-sama berjuang dalam penelitian ini

10. Para Laboran jurusan Kimia, Terkhusus Kak Fitri yang dengan sabar membimbing penulis selama melakukan penelitian, Kak Rahma, Kak Anna, Kak Uni, Kak yani dan Kak awal serta kepada kakak senior angkatan 2006, 2007 juga adik-adik junior angkatan 2009, 2010, 2011 dan 2012 terima kasih semuanya.

Skripsi ini penulis persembahkan buat kedua orang tua tercinta ayahanda Kasim Jaka dan ibunda Siti Dahyana Alm dan juga saudara saudarku (kk Tia, kk Tini, adik Musa) yang ku cintai karena Allah.

Akhir kalam, semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar	
Belakang	1
B. Rumusan	
Masalah.....	4
C. Tujuan	
Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6-42
A. Bakteri	
Termofilik.....	6
1..... Struktur	
sel bakteri termofilik.....	7
2..... Isolasi dan	
identifikasi bakteri	11
B. Enzim	
.....	16
1..... Pengolom	
an enzim.....	17
2..... Enzi	
amilase (golongan hidrolase).....	25
3..... Faktor-	
faktor yang mempengaruhi kerja enzim	31
4..... Aplikasi	
enzim.....	37
C. Amilum	
.....	37
D. Kajian	
Islami Tentang Air	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42-48

A.....	Waktu dan	
Tempat Penelitian	42	
B.....	Alat dan	
Bahan	42	
1.....	Alat	
.....	42	
2.....	Bal	viii
.....	42	
C.....	Prosecur	
Penelitian	vii	43
1.....	Pembuatan	
LA	43	
2.....	Pembuatan	
amilotik	43	
3.....	Pembuatan	
inokulum	44	
4.....	Pembuatan	
media fermentasi	44	
5.....	Isolasi dan	
pemurnian mikroba	44	
6.....	Penyiapan	
inokulum	45	
7.....	Pembuatan	
stok kultur	45	
8.....	Pentuan	
waktu optimum enzim amilasi	45	
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	48-59
A.....	Hasil	
.....	48	
1.....	Gambar	
.....	48	
a.....	Gambar	
isolasi bakteri pada media dasar	48	
b.....	Gambar	
isolasi bakteri pada media dasar	48	
c.....	Gambar	
bakteri sebelum uji iodin	49	
d.....	Gambar	
bakteri setelah iodin.....	50	
2. Tabel pengaruh lama inkubasi	50	
B. Pembahasan	51	

BAB V. PENUTUP.....	59
A.....Kesimpul	
n.....	60
B.....Saran	
.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

ABSTRAK

Nama Penyusun : Khadijah Jaka
Nim : 60500108009
Judul Skripsi : Isolasi dan uji aktivitas enzim amilase dari bakteri termofilik pada sumber air panas masammba

Bakteri termofilik merupakan salah satu sumber yang mampu menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase dari bakteri termofilik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam bidang industri. Enzim amilase merupakan enzim yang mampu memecah ikatan pada pati hingga membentuk maltosa atau glukosa. Pada penelitian ini, enzim amilase diisolasi dari bakteri termofilik pada sumber air panas Masamba yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, isolasi bakteri dari termofilik dari sumber air panas, uji kualitatif adanya enzim amilase dan penentuan waktu produksi optimum enzim amilase dengan metode Nelson-Samogyi. Bakteri termofilik mampu menghasilkan enzim amilase yang diindikasikan dengan terbentuknya zona bening pada uji iodin sedangkan waktu produksi optimum enzim amilase dari bakteri termofilik adalah 48 jam dengan konsentrasi glukosa sebesar 0.02708 μ .mol per menit .

Kata kunci : *Bakteri termofilik, Enzim amilase, Uji aktivitas*

ABSTRAK

Nama Penyusun : Khadijah Jaka
Nim : 60500108009
Judul Skripsi : Isolation of the enzyme amylase from thermophilic bacteria
in hot spring Masamma

Thermophilic bacteria is one source that could produce the enzyme amylase. The enzyme amylase from thermophilic bacteria have a high economic value in the field industri. It is have capable of breaking bonds in the starch to form maltose or glucose. In this study, amylase enzymes isolated from thermophilic bacteria in hot springs Masamba performed with several stages, from the thermophilic bacterium isolated from a hot spring, a qualitative assay and the enzyme amylase . Determination optimum enzyme amylase production time by the method of Nelson-Samogyi. Thermophilic bacteria capable of producing the enzyme amylase which is indicated by the formation of clear zones on iodine test sedangkan optimum enzyme amylase production time from thermophilic bacteria is 48 hours with a glucose concentration 0.02708 μ .mol per amenit .

Keywords: *Thermophilic bacteria, Enzymes amylase, Activity test*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup besar diantaranya adalah keanekaragaman mikroorganisme. Salah satu jenis mikroorganisme adalah bakteri termofilik. Dimana mikroorganisme ini dapat ditemukan diberbagai tempat baik di tanah maupun air.

Bakteri termofilik merupakan mikroorganisme yang memiliki karakteristik sebagai berikut, hidup pada suhu tinggi dimana suhu optimum tumbuhnya bakteri ini adalah 55⁰C-60⁰C sedangkan minimumnya adalah 40⁰C dan maksimumnya adalah 75⁰C.¹ bakteri termofilik dapat memproduksi ezim. Salah satu tempat hidup bakteri termofilik adalah sumber air panas. Sebagai mana firman Allah yang berbunyi

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي
عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٥﴾

¹Umi Rahayu, *Skrining Bakteri Termofilik Penghasil enzim Protease*.Bul. Tek. Lit. akuakultur vol. 6. No.2, 2007. Balai Besar Riset Pengolaan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Jakarta

Terjemahannya

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedangkan sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” QS: An Nuur [24] : 45

Ayat diatas menegaskan bahwa disamping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya yang ditemukan sebelum ayat ini yang berbunyi

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

Terjemehannya

“Allah Mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi org-orang yang mempunyai penglihatan (yang tajam)” QS: An Nur [24] : 44.

Allah juga telah menciptakan hewan dari air yang memencar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka jenis, potensi dan fungsi.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT memiliki manfaat dalam kehidupan. Salah satu contohnya hewan dari air yaitu bakteri dimana bakteri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quraan adalah kitab yang didalamnya berisi berita dan informasi yang semua terbukti kebenarannya.

Aplikasi enzim sebagai katalisator telah banyak digunakan dalam bidang industri baik industri berskala rumah tangga maupun industri berskala besar seperti

²M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 8* (Ciputat : Lentera Hati, 2009), h. 597

industri farmasi dan pangan.³ Enzim dapat diproduksi baik dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme, salah satu jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim adalah bakteri termofilik. Salah satu enzim yang mampu dihasilkan oleh bakteri termofilik adalah enzim amilase.

Enzim yang diproduksi dari bakteri termofilik bersifat termostabil dimana enzim ini mampu bekerja menggunakan beberapa substrat, kecepatan reaksinya tinggi,⁴ tidak memerlukan sistem pendingin bioreaktor, kemungkinan kontaminasi rendah⁵.

Enzim merupakan biokatalisator, sebagaimana katalis anorganik yang berfungsi mempercepat suatu reaksi namun katalisator menggunakan enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan akhir reaksi. Enzim tersusun atas polimer biologi. Katalis menggunakan enzim mempunyai kelebihan dari katalis yang lain yaitu produktifitasnya dapat meningkat beberapa kali lebih tinggi, bekerja secara spesifik, selektif pada substrat tertentu serta dapat pula bekerja pada pH yang relatif netral dan pada suhu yang relatif tinggi sehingga menekan penggunaan energi yang tinggi,⁶

³Mukhamda Kosim, dkk, *Pengaruh Suhu Pada Protease dari Bacillus Subtilis* (Prosiding Skripsi Semester Genap, Jurusan Kimia FMIPA ITS 2009-2010)h, 1

⁴Brock. T.D “*Life at High Temperatures. Science*” (1989) vol; 230, h. 132

⁵ Lind. L.R “*Production Of Ethanol From Lignocellulosic Materials Using Therrnophilic Bacteria: Critical Evaluation Of Potential and Review. Adv. In Biochem. Eng/Biotechnol. Springer Verlag*” (1998) vol:38, h. 1-152

⁶ Mukhamad Kosim, *loc. cit*

selain itu penggunaan katalisator menggunakan enzim dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan tidak beracun.⁷

Enzim amilase mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang industri pangan maupun non pangan. Enzim amilase merupakan biokatalisator yang mampu mengkatalisis reaksi hidrolisis pati menjadi beberapa gula sederhana. Sehingga enzim ini banyak digunakan pada industri tekstil, deterjen dan gula cair non tebu.⁸ Namun di samping banyaknya kebutuhan untuk pemenuhan enzim amilase dalam bidang industri tetapi enzim amilase masi diimpor dari luar negri. Berdasarkan data yang diperoleh kebutuhan akan enzim amilase pada tahun 2010 di dunia sangat tinggi yaitu mencapai penjualan sekitar US S2 milyar. Hal ini yang melatar belakangi penelitian ini.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah

1. Apakah ada isolat bakteri termofilik pada sumber air panas Masamba ?
2. Bagaimana Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri termofilik ?
3. Bagaimana pengaruh lama inkubasi terhadap aktivitas enzim ?

⁷ Rena Yuneta dan Surya Rosa Putra, Pengaruh Suhu Pada Lipase dari *Basillus Subtilis* (Prosding Skripsi Semester Genap, Jurusan Kimia FMIPA ITS 2009), h. h1

⁸Elidar Naiola. Karakteristik dan Optimasi Media Produksi Amilase Dari *Aspergillus Dan Aspergillus Clavatus* (Puslit Biologi-LIPI Bogor. 2003) *Berita Biologi* vol 6. No. 3, h. 415

⁹Sivarmakrishnan S, Gangadharan D, Nampootheri KD, Sossol CD and Pandey A. 2006. A-amilase from microbial sources-An overview on rencet developments. *Technol Biotechnol.* 44: 173-184

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Memperoleh isolate bakteri termofilik dari sumber air panas Masamba.
2. Mengetahui pada suhu berapa bakteri termofilik dapat tumbuh
3. Mengetahui aktivitas enzim amilase dalam menghidrolisis pati



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bakteri Termofilik

Sejak tahun 1879 istilah termofilik sudah digunakan oleh Miquel. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pada mikroorganisme yang mampu hidup pada lingkungan dengan suhu yang tinggi dimana mikroorganisme lain tidak mampu hidup.¹⁰

Setiap mikroorganisme memiliki kemampuan tersendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya, begitu pula bakteri termofilik. Dimana bakteri ini mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim seperti pada suhu, pH dan kadar garam yang tinggi,¹¹ selain itu bakteri termofilik juga mampu hidup atau beradaptasi dalam kondisi ekstrim seperti dalam keadaan tekanan dan radiasi tinggi dan dalam senyawa toksis.¹² Ada beberapa faktor yang menyebabkan bakteri termofilik mampu bertahan hidup pada kondisi ekstrim yaitu membran penyusun memiliki struktur protein yang bersifat termostabil dan

¹⁰Desi Kristina Sianturi. *Isolasi Bakteri Dan Uji Aktivitas Amilase Termofil Kasar Dari Sumber Air Panas Penen Sibirubiru Sumatera Utara* (Tesis. universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), h.36

¹¹ *Ibid*

¹² Rosalina Pakpahan, *Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas Protease Termofilik dari Sumber Air Panas Sipolon Tapanuli Utara Sumatera Utara* (Tesis ,USU. Medan. 2009), h. 1

proteolisis sehingga tidak terjadi denaturasi.¹³ Membran penyusun dari bakteri ini adalah asam lemak jenuh yang melingkupi suatu lingkungan hidrofobik untuk sel, sehingga menjaga kekuatan sel untuk hidup pada suhu meningkat.¹⁴

1. Struktur Sel Bakteri Termofilik

Setiap makhluk hidup memiliki struktur sel. Begitu pula dengan bakteri termofilik. Bakteri ini memiliki struktur yang unik sehingga bakteri ini mampu bertahan hidup pada kondisi yang ekstrim. Keunikan struktur sel dari bakteri ini adalah sebagai berikut :

a. Membran Sel

Setiap makhluk hidup mempunyai membran sel. Pada umumnya membran sel dari makhluk hidup adalah lipoprotein. Dimana lipoprotein tersusun dari lipid dan protein. Pada makhluk hidup lipi dari membran selnya dihubungkan dengan ikatan ester. Begitu pula dengan bakteri termofilik memiliki sel yang tersusun atas lipid. Namun lipid dari membran sel bakteri termofilik terbentuk oleh proses kondensasi dari gliserol¹⁵. Gliserol yang terbentuk terdiri atas dua unit yang berikatan atau *cross link* dengan dua unit isoprenoid. Isoprenoid (tersusun atas 40 atom C) merupakan jembatan jenuh rantai panjang yang mencair hanya pada suhu tinggi. Digliserol tetramer akan membatasi pergerakan lateral dari

¹³ Jusuf Ginting,. *Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas enzim Amilase Kasar Termofilik dari Sumber Air Panas Semangat Gunung* (Tesis. USU. Medan. 2009), h. 10

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Desi *op cit.* h. 37

membran lipit yang tidak tergantung satu terhadap yang lain pada kedua permukaannya. Keadaan ini membuat membran menjadi stabil pada keadaan asam atau panas.¹⁶

b. Struktur Protein

Salah satu struktur penyusun dari sel mikroorganisme adalah protein. Protein yang menyusun struktur sel dari bakteri termofilik adalah *Chaperonin*. *Chaperonin* merupakan protein yang berperan dalam mempertahankan kembali struktur tiga dimensi dari protein fungsional sel dari denaturasi suhu lingkungan yang bersifat ekstrim. Protein ini dapat membantu organisme termofil mengembalikan fungsi aktifitas enzimnya bila terdenaturasi oleh suhu yang tinggi. *Chaperonin* tersusun oleh molekul yang disebut *chaperone*, yang membentuk struktur *chaperonin* seperti tumpukan kue donat pada sebuah drum. Tiap cincin donat ini terdiri atas 7, 8 atau 9 subunit *chaperone* tergantung jenis organismanya. Dalam aktivitasnya mempertahankan struktur protein fungsional agar tetap stabil, *chaperonin* membutuhkan molekul ATP.¹⁷

c. Struktur DNA

Bakteri termofilik memiliki struktur DNA yang dinamakan DNA Gyrase. DNA gyrase merupakan salah satu anggota kelompok enzim topoisomerase yang berperan dalam mengontrol topologi DNA suatu sel dan memegang peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi DNA. Semua

¹⁶ Rosliana Pakpahan.*op.cit.*h. 6

¹⁷ Desi *op cit.* h. 37

jenis topoisomerase dapat merelaksasikan DNA tetapi hanya DNA gyrase yang dapat mempertahankan struktur DNA tetap berbentuk supercoil. DNA gyrase disusun oleh 90-150 pasangan basa-N DNA. DNA gyrase ini juga selalu dijumpai pada organisma yang hidup di lingkungan di atas 70°C dan juga dapat dijumpai pada organisme yang hidup pada suhu sekitar 60°C. DNA ini merupakan salah satu kelengkapan sel dari organisma termofil.¹⁸

Bakteri termofilik dapat diisolasi dari beberapa macam habitat diantaranya adalah daerah yang memiliki gunung berapi yang kaya akan belerang, sumber air panas, geyser dan fumarol,¹⁹ tempat cadangan minyak bumi dan batu bara,²⁰ dan juga celah hidrotermal ke dalam laut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya adalah Gilter mengatakan bahwa suhu optimum tumbuhnya bakteri termofilik adalah 55°C dan suhu maksimum adalah 70°C. Lain lagi menurut Muir dan Rikhie mereka mengatakan bahwa bakteri termofilik mampu tumbuh dengan baik pada suhu 60°C-70°C .

Bakteri termofilik dipercaya berpotensi menjadi pilihan yang baik sebagai sumber enzim termostabil. Hal ini disebabkan karena bakteri termofilik mampu mensintesis molekul dalam kondisi panas, termasuk

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Suyono, Hairunisa.dkk, *Isolasi Bakteri Termofilik Asam Laktat dari Sumber Air Panas Gunung Pancar Bogor* , “Laporan Akhir Program Kreativitas Mahasiswa IPB” (2008):h. 2

²⁰ B. Van der Bug, *Extremophiles as a source for novel enzymes*. (t.t., 2003), dikutip dalam Rosalina Pakpahan, Tesis: Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas Protease

molekul enzim. Sehingga industri lebih tertarik menggunakan enzim yang berasal dari bakteri termofilik karena pada umumnya produksi yang dilakukan oleh industri berada pada kondisi suhu yang tinggi sehingga apabila menggunakan enzim yang tidak bersifat termostabil maka enzim tersebut akan mengalami denaturasi.²¹

Berbagai penelitian tentang bakteri termofilik telah dilakukan diantaranya karakteristik biokimia termofilik dari perairan pantai Likupang yang dilakukan oleh Urial pada tahun 1999, pemurnian dan karakteristik protease ekstraseluler dari isolat bakteri termofilik GP-04 yang dilakukan oleh Mubarak pada tahun 2001,²² selain itu beberapa mikroorganisme termofilik telah berhasil diisolasi dari berbagai sumber air panas di Indonesia diantaranya sumber air panas Banyuwedang Bali, Sumber mata air panas laut Poso, sumber air panas danau Ranu Sumatra Selatan, sumber air panas Sipolon Tapanuli Sumatra Utara, sumber air panas Semangat Gunung Karo Sumatra Utara dan masih banyak lagi sumber mata air panas.

Mengingat bertambahnya industri di Indonesia maka permintaan akan enzim semakin meningkat, sebagaimana enzim dapat diproduksi menggunakan bakteri termofilik sehingga eksplorasi tentang bakteri termofilik akan terus

²¹Muharni, *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Penghasil Kitinase dari Sumber Air Panas Danau Ranu Sumatra Selatan* "Jurnal Penelitian Sains, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya. Sumatra Selatan (2009),h.1

²²Sugiyono, dkk. *Penapisan dan Karakteristik Bakteri Termofilik asal Mat Air Laut Panas Poso Sulawesi Tengah*. h. 1

dilakukan. Bakteri termofilik mampu menghasilkan beberapa macam enzim yang bersifat termostabil.

Beberapa enzim termostabil telah berhasil diproduksi dari mikroorganisme termofilik yang dimanfaatkan sebagai konversi biokatalitik dalam industri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.²³

Tabel 2.1. Reaksi biokonversi dan penggunaan enzim termostabil

Enzim	Rentang Suhu (°C)	Biokonversi	Aplikasi
α -amilase (Bakteri)	90-100	Pati→dekstrosa	Hidrolisis pati, pembuatan bir dan deterjen
α -amilase (Jamur)	50-60	Pati→dekstrosa	Produksi maltosa
Pullulanase	50-60	Pati→dekstrosa	Produksi sirup glukosa
Xylanase	45-60	Bubur kayu→xylan	Industri kertas
Kitinase	65-75	kitin→kitobiose	Indutri makanan
Kitinase (Bakteri)		Kitin→N-asetil glukosamin N-asetil glukosamin→glukosamin Kitin→kitosan	Kosmetik, farmasi, argo kimia
Selulase (Bakteri)	45-55	Selulosa→glukosa	Hidrolisis selulosa, degradasi polimer dalam deterjen
Protease (Bakteri)	65-85	Protein→asam amino dan peptida	Pembuatan roti, pembuatan bir, deterjen
Lipase (Bakteri)	30-70	Pelepasan lemak	Industri susu dan deterjen

2. Isolasi dan Identifikasi Bakteri

Seiring dengan perkembangan zaman pemanfaat bakteri untuk menghasilkan berbagai macam produk diantaranya adalah enzim yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang industri pangan maupun

²³*Ibid*

industri non pangan. Pada dasarnya bakteri di alam selalu berada dalam populasi campuran . Oleh sebab itu untuk biakan murni bakteri yang diinginkan secara optimal maka dibutuhkan metode isolasi yang mendukung.

Metode untuk memperoleh biakan murni bakteri adalah dengan metode kultur murni. Kultur murni ini merupakan kunci pokok sehingga dapat mengidentifikasi bakteri dan memperoleh isolat dengan baik. Oleh karena begitu pentingnya untuk memperoleh kultur murni dalam mengidentifikasi bakteri maka dalam bidang mikrobiologi hal ini merupakan suatu hal yang sangat fundamentalis. Metode yang sangat mudah untuk mendapatkan isolat yang murni adalah dengan cara menanam bakteri dalam media agar dengan metode cawan gores atau dengan cawan tebar. Dalam metode ini sel-sel inokulum akan tersebar diatas media agar.²⁴

Pada umumnya untuk memperoleh isolat yang diinginkan pada tahap pertama media yang digunakan adalah media *enrichment* selektif atau biasa dikatakan media diferensial. Media *enrichment* selektif merupakan media yang dimana kondisi kultur dari bakteri disesuaikan, sehingga yang terstimulasi untuk tumbuh adalah bakteri yang diinginkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh biakan yang diinginkan. Seperti berikut menambahkan nutrient pada media untuk menstimulasi perumbuhan bakteri yang diinginkan, mengurangi atau menghilangkan nutrient yang dibutuhkan oleh

²⁴ Natsir Djide dan Sartini, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*, Makassar, UNHAS 2008.h.300

bakteri yang tidak diinginkan, menambahkan material-material selektif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan.²⁵

Selain kita memperhatikan metode yang digunakan untuk memperoleh isolat murni dari bakteri kita juga harus memperhatikan jenis-jenis nutrient yang disyaratkan untuk bakteri. Hal ini didasarkan karena bakteri amat beragam, sehingga persyaratan nutrient dari tiap bakteri berbeda-beda. Beberapa bakteri membutuhkan nutrient yang sederhana di sisi lain ada bakteri yang membutuhkan nutrient yang rumit. Beberapa spesies bakteri tumbuh pada suhu yang rendah yaitu 0°C di sisi lain ada bakteri yang tumbuh pada suhu yang tinggi yaitu sampai 75°C. Oleh karena itu maka kita harus menyesuaikan sedemikian rupa nutrient yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang dapat menguntungkan bagi bakteri yang ingin disolasi²⁶.

Ada beberapa persyaratan nutrient yang dibutuhkan bakteri diantaranya adalah nitrogen (N), sulfur (S), air (H₂O), karbon (C), tembaga (Cu), Magnesium (Mg), pospat (P), kalium (Ca).

Mikroorganisme seperti bakteri merupakan organisme hidup yang membutuhkan unsur seperti nitrogen dan sulfur. Kedua unsur harus berada dalam bentuk reduksi untuk kombinasi organik, misalnya nitrogen sebagai asam amino (R-NH₂) atau sulfur sebagai persenyawaan sulfid (R-SH). Berdasarkan genus, ada bakteri yang mampu melakukan proses *fiksasi nitrogen biologis*. *Fiksasi*

²⁵*Ibid.* h.301

²⁶Ratna Sari Hadi Utomo, dkk. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta: UI-Pres. H. 132

nitrogen biologis adalah suatu proses dimana bakteri mampu mereduksi nitrogen atmosfer yang dapat digunakan bakteri untuk melakukan sintesis persenyawaan organik dalam sel, sedangkan bakteri yang tidak mampu melakukan proses *fikasi nitrogen biologis* maka bakteri ini harus mendapatkan unsur-unsur ini dalam keadaan sudah direduksi, contohnya unsur nitrogen sebagai garam amoniu atau persenyawaan organik yang mengandung asam-asam amino, sulfur sebagai H₂S atau sulfida lain atau persenyawaan yang mengandung sulfur seperti persenyawaan merkapto²⁷.

Semua organisme membutuhkan air, begitu pula bakteri. Air yang digunakan bakteri berfungsi dalam proses pelarutan, hidrolisis, ionisasi, osmosis.²⁸ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan berbagai manfaat air. Allah berfirmana dalam Q.S Al-Jatsiyah : 5

وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا
 بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ؕ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahannya :

“Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah

²⁷Koes Irianto, *Mikrobiologi (Menguak Dunia Mikroorganisme)*. Bandung : Yrama Widia. 2010.h. 46

²⁸Ratnasari loc.cit. h134

*mati; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal”QS: al-Jatsiyah [45] : 5*²⁹

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya air merupakan salah satu sumber penghidupan bagi makhluk hidup di dunia yang mempunyai peranan yang sangat penting. Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bahkan mikroorganisme yang sangat kecil ukurannya, dari air lah Allah SWT menghidupkan manusia, tumbuh-tumbuhan hewan bahkan mikroorganisme seperti bakteri.

Selain air, nitrogen dan oksigen bakteri juga membutuhkan karbon. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen organisme dapat digolongkan dalam dua golongan dengan menggunakan alasan seperti dibawah ini

- a. Organisme dapat hidup dari diet bahan organik (diet mineral) dengan menggunakan CO₂ atau karbon sebagai satau-satunya sumber karbon.

Golongan *autotrof*.

- b. Tidak dapat menggunakan CO₂ sebagai satu-satunya sumber karbon, tetapi membutuhkan satu atau lebih zat organik seperti glukosa, asam amino. Di samping mineral sebagai sumber karbon . Golongan ini disebut *heterotrof*.

Beberapa unsur logam berat seperti (Co, Mo, Cu, Zn) sangat dibutuhkan untuk kehidupan meskipun dalam jumlah yang sedikit.kadang-kadang jumlahnya sangat kecil sehingga sukar dideteksi atau bila ditemukan tidak mudah

²⁹ Al-Hikmah Al-Qur'an., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : CV Diponegoro. 2009)

dipastikan apakah zat ini bersifat fungsional atau hanya merupakan kotoran belaka. Zat-zat ini biasanya berfungsi sebagai molekul kecuali dalam enzim.

A. Enzim


Enzim merupakan katalis yang tersusun atas gugus polipeptida (protein) yang berfungsi mempercepat suatu reaksi tanpa habis bereaksi dan ikut bereaksi³⁰. Aktivitas enzim di lingkungan juga terjadi pada berbagai sumber mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan aktinomisetes. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler merupakan enzim yang langsung digunakan di dalam sel, dan sering ditemukan pada bagian membran dari sebuah organel sel. Enzim ekstraseluler merupakan enzim yang dilepas dari sel ke lingkungan untuk menghidrolisis molekul polimer di lingkungan, seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, ataupun juga untuk memfasilitasi pengambilan suatu zat dari lingkungan bagi kebutuhan metabolismenya. Enzim ekstraseluler dapat dipisahkan dari lingkungan dengan filtrasi ataupun sentrifugasi sedangkan enzim intraseluler dapat diekstrak dari dalam sel lewat proses pemecahan sel. Dalam reaksi enzimatik, enzim mengubah senyawa yang disebut substrat menjadi bentuk suatu senyawa baru yang disebut produk.³¹

Pada reaksi enzimatik, substrat akan berikatan pada sisi aktif enzim yang akan membentuk kompleks enzim substrat yang selanjutnya akan menghasilkan produk

³⁰ Jusuf Ginting, *op.cit.* h.7

³¹ Desi Kristina Sianturi, *op.cit.* . h.9

akhir. Substrak yang berikatan dengan sisi aktif enzim terbentuk karena adanya beberapa ikatan kimia yang lemah (misalnya interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals dan interaksi hidrofobik). Setelah berikatan dengan bagian sisi aktif enzim, substrat bersama-sama enzim kemudian membentuk suatu kompleks enzim-substrat, selanjutnya terjadi proses katalisis oleh enzim untuk memproduksi. Ketika produk sudah terbentuk enzim menjadi bebas kembali untuk selanjutnya bereaksi kembali dengan substrat.³²



Gambar 2.1 Mekanisme kerja enzim

1. *Pengolongan Enzim*

Enzim diklasifikasikan menjadi beberapa kelas sesuai dengan jenis kerja. Hal ini berdasarkan IUB (*Internasional Union of Biochemistry*) bekerja sama dengan IUPAK (*Internasional Union of Pure and Chemistry*)³³ :

a. Oksidoreduktase

Oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis dengan cara mengoksidasi substansi dan juga melakukan reduksi pada substrat yang lain pada waktu yang sama. NAD dan NADH biasanya merupakan substrat atau


³² Suhara. *Pengantar Enzim* h.118

³³ *Ibid*

produk dari reaksi-reaksi oksidasi. Enzim oksioreduktase dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu³⁴ :

1). Dehidrogenase.

Enzim ini bekerja dalam reaksi dehidrogenase yaitu reaksi pengambilan atom hidrogen dari suatu senyawa donor. Dimana hidrogen yang dilepaskan oleh pendonor maka akan ada senyawa lain yang menerima. Salah satu contoh reaksi dehidrogenase adalah reaksi pembentukan aldehyd dari alkohol. Gambaran reaksi pembentukan aldehyd dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini.³⁵




Gambar 2.2 Reaksi Pembentukan Aldehyd

2). Oksidase

Enzim ini mempunyai peran yang sama seperti enzim dehidrogenase namun pada enzim oksidase yang bertindak sebagai aseptor adalah hidrogen adalah oksigen. Salah satu contoh adalah enzim glukosa oksidase yang bekerja sebagai katalis pada reaksi oksidase glukosa menjadi asam glukonat, yang dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini

³⁴Anna Poedjiadi , *loc. cit*

³⁵*Ibid*




Gambar 2.3 Reaksi Pembentukan Asam Glukonat

Xantin oksidase merupakan enzim yang merupakan katalis pada reaksi oksidasi xantin menjadi asam urat. Contoh lain dari enzim oksidase adalah asam amino oksidase yang bekerja sebagai katalis pada reaksi oksidasi asam amino. Glison oksidase adalah enzim yang bekerja pada reaksi oksidasi glisin menjadi asam glikosilat.

b. Transferase

Enzim ini bekerja untuk memindahkan suatu gugus fungsional dari suatu substrat ke substrat yang lain. Gugus yang biasa dipindahkan biasanya gugus karbon, gugus karbohidrat, fosfat sulfat, alkali ataupun sulfat.

Beberapa contoh enzim yang termasuk golongan ini ialah metaltransferase, hidroksimetiltransferase, karboksiltransferase, asilmetiltransferase dan amino transferase atau disebut transaminase. Berikut ini adalah gambaran cara kerja enzim metiltransferase yaitu bekerja pada reaksi pembentukan keratin dari asam guanidino asetat dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini



Gambar 2.4 Reaksi Pembentukan Keratin


Pembentukan glisin dari serin merupakan reaksi pemindahan gugus hidroksil metil. Gugus ini dilepaskan dari molekul serin dengan dibantu oleh enzim hidroksilmetil transferase



Gambar 2.5. Reaksi Pembentukan Glisin

Dalam reaksi ini asam terhidrofolat (THFA) bekerja sebagai aseptor gugus beratom C satu.

Enzim transaminase bekerja pada reaksi transaminasi yaitu suatu reaksi pemindahan gugus amino dri suatu asam amino kepada senyawa lain. Sebagai contoh dapat dilihat dibawa ini




Gambar 2.6 Reaksi Pembentukan Asam Oksaloasetat

c. Hidrolase

Enzim hidrolase adalah enzim yang mampu mengkatalisis berbagai enzim dari kelas hidrolase , ikatan kolvalen, ikatan ester, glikosida, anhidrat asam, ikatan karbon dengan karbon, karbon halida ataupun nitrogen dengan fosfor yang dipecah kemudian memasukan fragmen-fragmen air dari ikatan yang terbuka. Beberapa contoh enzim hidrolase adalah amilase, lipase, fosfatase, esterase, amino peptidase karboksi, peptidase, pepsin, tripsin, kimotripsin. Enzim amilase dapat memecah ikatan-ikatan pada

amilum hingga terbentuk maltosa. Enzim lipase ialah enzim yang memecah ikatan ester pada lemak sehingga terjadi asam lemak dan gliserol. Fosfatase adalah enzim yang dapat memecah ikatan fosfat pada suatu senyawa misalnya glukosa -6-fosfat dapat dipecah menjadi glukosa dan asam fosfat. Enzim esterase adalah enzim yang dapat memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis. Esterase yang terdapat dalam hati dapat memecah ester sederhana, misalnya etil butirrat menjadi etanol.


Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis disebut enzim protolitik atau protease. Oleh karena yang dipecah adalah ikatan pada rantai peptida, maka enzim tersebut dinamakan juga peptidase. Ada dua macam peptidase yaitu endopeptidase dan eksopeptidase. Endopeptidase memecah protein pada tempat-tempat tertentu dalam molekul protein dan biasanya tidak mempengaruhi gugus yang terletak diujung molekul, contohnya enzim pepsin dan enzim papain. Eksopeptidase bekerja terhadap kedua ujung molekul protein. Karboksi peptidase dapat melepaskan asam amino yang memiliki gugus $-\text{COOH}$ bebas pada ujung molekul protein sedangkan amino peptidase dapat melepaskan asam amino pada ujung lain yang memiliki gugus $-\text{NH}_2$ bebas.



Gambar 2.7 Reaksi Pembentukan Amino Peptidase


d. Liase

Enzim liase adalah enzim yang dapat memecah dua gugus dari satu substrat yang membentuk ikatan rangkap. Reaksi seperti ini umumnya ditemukan dalam metabolisme karbohidrat. Contoh enzim dalam golongan ini adalah dekarboksilase, aldolase dan hidrotase. Piruvat dekarboksilase adalah enzim yang bekerja pada reaksi dekarboksilase asam piruvat dan menghasilkan aldehid.




Gambar 2.8 Reaksi Pembentukan Aldehid

Enzim aldolase bekerja pada reaksi pemecahan molekul fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul triosa yaitu aseton fosfat dan gliseraldehid-3-fosfat.



Gambar 2.9 Reaksi Pembentukan D-digliseraldehid

Adapun enzim fumarat hidratase berperan dalam reaksi penggabungan satu molekul H₂O kepada molekul asam fumarat dan membentuk asam malat.



Gambar 2.10 Reaksi Pembentukan Asam Malat

e. Isomerase

Enzim isomerase adalah enzim yang bekerja mengkatilis perubahan satu isomer ke isomer lain, misalnya reaksi perubahan glukosa menjadi fruktosa, perubahan senyawa L menjadi senyawa D, senyawa cis menjadi senyawa trans dan lain-lain. Contoh enzim yang termasuk dalam golongan ini adalah :

1). Ribulofosfat epimerase

Enzim ini merupakan katalis berbagai reaksi epimerisasi ribulosa. Dalam reaksi ribulosa-5-fosfat diubah menjadi xilulosa-5-fosfat.



Gambar 2.11 Reaksi Pembentukan Xilulosa

2). Fosfat isomerase


Disamping itu reaksi isomerasi glukosa-6-fosfat menjadi fruktosa-6-fosfat dapat berlangsung dengan bantuan enzim glukosa fosfat isomerase .



Gambar 2.12 Reaksi Pembentukan Fruktosa


f. Ligase

Ligase merupakan enzim yang mampu mengkatalisis pembentukan ikatan kovalen dengan menggunakan ATP atau senyawa lain untuk proses sintesis atau enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan dua molekul yang disebut sintetase. Ikatan yang terbentuk dari penggabungan tersebut adalah C-O, C-S, C-N atau C-C. Contoh enzim golongan ini antara lain adalah glutamin sintetase dan piruvat karboksilase. Enzim glutamin sintetase yang terdapat dalam otak dan hati merupakan katalis dalam reaksi pembentukan glutamin dari asam glutamat dapat dilihat pada gambar dibawa ini



Gambar 2.13 pembentukan glutamin dari asam glutamat

Di samping itu enzim karboksilase bekerja dalam reaksi pembentukan asam oksaloasetat dari asam piruvat



Gambar 2.14 Reaksi Pembentukan Asam Oksalat

Reaksi ini merupakan sebagian dari metabolisme karbohidrat.

2. Enzim Amilase (Golongan Hidrolase)

Enzim amilase memiliki nama asli diastase dan pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh Anselme Payen pada tahun 1833.³⁶ Amilase adalah salah satu enzim yang memiliki kemampuan untuk mengkatalisis proses hidrolisis ikatan (α 1,4) glikosida pada yang terdapat pada senyawa polimer karbohidrat. Hasil hidrolisis senyawa polimer karbohidrat ini berupa monomer-monomer yang lebih kecil seperti maltosa, dekstrin dan terutama molekul glukosa sebagai unit terkecil. Mikroorganisme seperti bakteri, kapang maupun khamir mampu menghasilkan enzim amilase.³⁷

a. Klasifikasi enzim amilase

Enzim glikosida hidrolase atau yang biasa disebut enzim amilase diklasifikasikan menjadi yaitu

1). Alfa amilase (α -amilase)

Disebut juga dengan 1,4- α -D-glukan glukonohidrolase atau glukogenase. Enzim ini bekerja memutus ikatan α -1,4 glikosida pada

³⁶ Desi Kristina Sianturi, *op.cit.*h.22

³⁷Nurhalija Sutiamiharja.*Isolasi Bakteri dan Uji aktivitas amilase Kasar Termofilik dari Sumber Air Panas Gurun Kinaya Sumatera Utara* (Tesis,USU, Medan. 2008)h. 10

amilum secara acak terutama pada rantai yang panjang, sehingga menghasilkan maltotriosa dan maltosa dari polimer amilosa pada amilum dan menghasilkan glukosa dan sedikit dekstrin dari polimer amilopektin penyusun amilum. Karena sifatnya yang dapat memutuskan ikatan glikosida secara acak, enzim ini bekerja lebih cepat dibanding amilase lainnya terutama β -amilase. Pada kelompok hewan α -amilase merupakan enzim pencerna amilum yang utama. Enzim α -amilase merupakan kelompok metaloenzim yang tidak dapat bekerja sama sekali bila ion kalsium tidak ada³⁸. Enzim α -amilase dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu³⁹

- a). Endoamilase merupakan enzim yang memutuskan ikatan α -1,4
- b). Eksoamilase merupakan enzim yang memutuskan ikatan α -1,4 atau α -1,6 rantai panjang polisakarida.
- c). Enzim pemutus cabang menghidrolisis ikatan α -1,6 rantai panjang polisakarida
- d). Enzim transfer memutuskan ikatan α -1,4 glikosida molekul donor dan mentransfer bagian dari donor kepada akseptor glikosida membentuk ikatan glikosida baru.

³⁸ Desi Kristina Sianturi, *op.cit.*h.11

³⁹ Anna Poedjadi, *loc.cit*

Selain klafikasi enzim α -amilase, enzim ini memilii beberapa kegunaan dalam bidang industri. Kegunaan Enzim α -amilase antara lain ⁴⁰:

a). Industri Makanan

Dalam industri makanan enzim α -amilase digunakan dalam produksi sirup glukosa, kristalin glukosa, produksi sirup fruktosa jagung, produksi sirup maltosa, pengurangan viskositas sirup gula dan pegurangan pembentukan uap pada jus.

b). Industri Deterjen

Dalam industri deterjen enzim α -amilase digunakan sebagai bahan tambahan untuk menghilangkan kotoran dari pati

c). Industri Kertas

Dalam industri kertasa enizim α -amilase digukan untuk mengurangi viskositas pati pada kertas

d). Industri Tekstil

Dalam industri tekstil enzim α -amilase digunakan sebagai pencegah pembesaran pada serat tekstil dan juga sebagai pembersih pakaian.

e). Industri Famasi

Dalam bidang farmasi enzim α -amilase digunakan dalam membantu sistem pencernaan.

⁴⁰*Ibid*

2). Amilase (β -amilase)

β -amilase biasa disebut juga 1,4- α -D-glukan maltohidrolase, glikogenase, sakarogen amilase. Enzim β -amilase dapat juga diproduksi oleh bakteri, jamur dan tumbuhan. Enzim β -amilase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan kedua dari α -1,4 glikosida, memutuskan dua unit glukosa pada saat yang sama. Dalam proses pematangan buah. β -amilase memecah pati menjadi gula, menghasilkan rasa manis pada buah yang matang. pH optimum β -amilase adalah 12.⁴¹

3). Gamma amilase (γ -amilase)

γ -amilase memiliki nama lain 1,4 glukan 1,4- α -D-glukan glukohidrolase, exo-1,4-glukosidase, glukomilase, lisomal α -glukosida. Pemutusan ikatan akhir α (1-4) glikosida pada ujung non reduksi dari amilase dan amilopektin, menghasilkan glukosa, γ -amilase juga memutuskan ikatan α (1-6) glikosida. γ -amilase sangat efisien pada lingkungan yang bersifat asam dan bekerja pada pH optimum 3⁴².

b. Sumber Enzim Amilase

Enzim amilase dapat diisolasi dari berbagai jenis organisme hidup seperti tumbuhan, hewan bahkan mikroba yang meliputi bakteri, kapang maupun fungi. Kelompok enzim amilase yang dihasilkan oleh berbagai jenis

⁴¹Jusuf Ginting. *Op cit.* h.8

⁴²*Ibid*

organisme hidup ini memiliki banyak variasi dalam aktivitasnya, sangat spesifik, tergantung pada sumber organismanya dan tempat enzim amilase bekerja.⁴³

Dari beberapa sumber yang dapat menghasilkan enzim amilase yang paling mendominasi dalam menghasilkan enzim amilase adalah fungi dan bakteri. Beberapa dari jenis *Bacillus sp.* dan *Actinomycetes*, termasuk *Thermomonospora* dan *Thermoactinomyces* adalah kelompok yang memiliki kemampuan sangat besar dalam memproduksi enzim amilase. Salah satu spesies *Basilus* yaitu *Bacillus licheniformis* memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim amilase dalam suasana lingkungan yang bersifat alkalis⁴⁴

Enzim amilase yang dihasilkan oleh bakteri merupakan enzim ekstra seluler. Dimana bakteri mensintesis enzim dari dalam selnya selanjutnya digunakan diluar selnya untuk memecah amilum yang merupakan sumber makanan yang terdapat dalam lingkungan. Sumber makan berupa amilum harus terlebih dahulu dipecah karena molekul amilum tidak dapat masuk secara langsung kedalam sel bakteri karena ukuran molekul dari amilum sangat besar sehingga molekul amilum harus dipecah terlebih dahulu menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga molekul-molekul tersebut dapat masuk kedalam sel bakteri. Molekul-molekul amilum yang

⁴³Desi Kristina Sianturi, *op.cit.*h.10

⁴⁴*Ibid*

terlah dipecah menjadi maolekul-molekul kecil yang telah masuk kedalam sel bakteri akan digunakan sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan bakteri.⁴⁵

Menurut Palmer (1985) Untuk memperoleh enzim ekstraseluler yang dihasilkan enzim dari bakteri tersebut maka kultur bakteri penghasil enzim amilase tersebut disentrifus untuk mendapatkan supernatant yang mengandung enzim amilase ekstra seluler.

Di antara jenis bakteri penghasil enzim amilase tersebut ada yang bersifat termofilik. Bakteri termofilik yang mampu menghasilkan enzim amilase biasanya tumbuh maksimal pada pH 5-6. Produksi amilase menggunakan bakteri termofilik memiliki keunggulan yang salah satunya dapat menurunkan resiko kontaminasi. Pada tahap awal untuk mendapatkan mikroba yang berpotensi sebagai penghasil enzim ialah dengan mengisolasi dan seleksi mikrba tersebut dari habitat alaminya. Mikroba yang diperoleh dari hasil isolasi harus memiliki kemampuan untuk melangsungkan reaksi atau menghasilkan produk yang diinginkan⁴⁶.

Pada tahun 1999 Mamo dan Geser telah berhasil membuktikan bahwa bakteri termofilik menghasilkan enzim amilase pada medium dengan pH 4 dan pH 9. Haki dan Rakehit pada tahun 2003 telah berhasil mengisolasi

⁴⁵Benson HJ. *Microbiological application* (Brown Publication 1994) dikutip dalam Desi Christian Santuri "Isolasi dan Uji Aktivitas Enzim Amilase dari Sumber Air Panas Sibiru (Tesis. USU, Medan 2009)

⁴⁶Nurhalija Sutiamiharjah., *op.cit.h* 11

bakteri termofilik ekstrim dan hipertermofilik yaitu *Thermosus sp* yang menghasilkan enzim amilase dan *Termococcus litrlaris* menghasilkan enzim pullulanase . *B. stearothermophilus* merupakan bakteri yang mampu hidup pada suhu 60-70°C berhasil diisolasi dari kawah pegunungan Dieng.⁴⁷

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan terhadap aktivitas enzim amilase dari bakteri temofilik yang diperoleh yaitu suhu optimum bakteri termofilik penghasil amilase berada antara 40-70°C pada pH 6-9⁴⁸, suhu 60°C pH 6⁴⁹, 60°C pada pH 5⁵⁰.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerja Enzim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu suhu, pH dari lingkungan tempat enzim bekerja, konsentrasi substrat, aktivator dan inhibitor enzim.

a. Suhu

Enzim merupakan suatu polimer yang tersusun atas suatu protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi, maka bagian

⁴⁷ *Ibid*


⁴⁸ JK Krisjon, *Thermophilic Bacteria* (New York, Prees New York, 1999) dikutip dalam Nurhajah Sutiamiharja, Tesis. *Isolasi Bakteri dan Ujik Aktivitas Amilase Kasar Termofilik dari Sumber airpanas Gurukinayan Karo Sumatra Utara* (Sumatra Utarara: Universitas Sumatra Utara, 2008)h. 38

⁴⁹Nurhajah Sutiamiharja, Tesis. *Isolasi Bakteri dan Ujik Aktivitas Amilase Kasar Termofilik dari Sumber airpanas Gurukinayan Karo Sumatra Utara* (Sumatra Utarara: Universitas Sumatra Utara, 2008)h. 51

⁵⁰ Jusuf Ginting, *op. cit.*h. 50

aktif enzim akan terganggu dan dengan demikian konsentrasi efektif enzim menjadi berkurang dan kecepatan reaksinya akan menurun.⁵¹

Kenaikan suhu sebelum terjadi proses denaturasi dapat menaikkan kecepatan reaksi. Namun kenaikan suhu pada saat mulai terjadinya proses denaturasi akan mengurangi kecepatan reaksi. Oleh karena ada dua pengaruh yang berlawanan, maka akan terjadi suatu titik optimum, yaitu suhu yang paling tepat bagi suatu reaksi.⁵² Berikut ini adalah gambaran pengaruh suhu terhadap laju reaksi yang dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawa ini



Gambar 2.15 Grafik hubungan antara suhu dan laju reaksi


b. pH

Seperti pada umumnya, struktur ion enzim tergantung pada pH lingkungan. Enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif atau bermuatan ganda (*zwitter ion*). Dengan demikian perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap aktivitas bagian aktif enzim dalam bentuk kompleks enzim substrat. Di samping pengaruh terhadap struktur ion pada enzim, pH

⁵¹Anna Poedjiadi. *Dasr-Dasar Biokimia*. Jakarta UI-Pres.2009.h.1

⁵²*Ibid*

rendah atau pH tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya proses denaturasi ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim.⁵³ Umumnya enzim bekerja optimum pada rentang pH 6-8, tetapi beberapa jenis organisme dapat hidup pada pH yang lebih rendah yang dikenal dengan istilah *asidofil* ataupun pada pH yang lebih tinggi yang dikenal dengan istilah *alkalifil*⁵⁴. Berikut ini adalah gambaran pengaruh pH terhadap laju reaksi yang dapat dilihat pada gambar dibawa ini.



Gambar 2.16. Grafik hubunga antara suhu dan laju reaksi


c. Konsentrasi Enzim

Seperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim.⁵⁵

⁵³*Ibid*

⁵⁴Dessy Christina Sianturi. *Op.cit.h.10*


⁵⁵*Ibid .h.158*



Gambar 2.17 Grafik hubungan antara konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi

d. Konsentrasi Substrat

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi enzim yang tetap, maka penambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi pada batas konsentrasi tertentu, tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat bertambah.⁵⁶



Gambar 2.18 Grafik hubungan antara konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi

⁵⁶*Ibid*

e. Inhibitor

Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu: a) yang bekerja secara tidak dapat balik (*irreversible*), b) yang bekerja secara dapat balik (*reversible*).⁵⁷


Penghambat yang *irreversible* adalah golongan yang bereaksi dengan, atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Sebagai contoh, adalah senyawa *diisopropilfluorofosfat* (DFP), yang menghambat enzim *asetilkolinesterase*, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi impuls syaraf. *Asetilkolinesterase* mengkatalisis hidrolisis *asetilkolin*, suatu senyawa neurotransmitter yang berfungsi di dalam bagian *sinaps* yang dihasilkan oleh ujung syaraf (akson) yang telah menerima impuls. *Asetilkolin* yang dihasilkan diteruskan ke sel syaraf lainnya atau ke efektor (misalnya otot) untuk meneruskan impuls syaraf. Akan tetapi, sebelum impuls kedua dapat dipancarkan melalui sinaps, *asetilkolin* yang dihasilkan setelah impuls pertama harus dihidrolisis oleh *asetilkolinesterase* pada sambungan sel syaraf.⁵⁸

Jenis kedua adalah, penghambat enzim yang dapat balik, yang dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: 1) zat penghambat yang bersaing

⁵⁷Suhara. *Pengantar Enzim* h.118

⁵⁸*Ibid*

(kompetitif), 2) zat penghambat yang tidak bersaing (non-kompetitif). Zat penghambat yang bersaing itu mempunyai struktur mirip dengan struktur molekul substrat. Suatu penghambat kompetitif berlomba dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi, sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Ciri penghambat kompetitif adalah penghambatan ini dapat dihilangkan dengan meningkatkan konsentrasi substrat



Gambar 2.19 Mekanisme Kerja Inhibitor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

4. Aplikasi Enzim

Beberapa contoh aplikasi enzim secara komersial dapat dilihat pada Tabel dibawa ini

Tabel II.2 Aplikasi enzim secara komersial⁵⁹

Industri	Aplikasi	Enzim	Sumber
Roti	Mempercepat proses fermentasi, meningkatkan volume adonan, memperbaiki kelunakan dan tekstur.	Amilase, protease	Kapang, Bakteri
Sereal	Pembuatan makanan bayi	Amilase	Kapang
Coklat	Pembuatan sirup	Amilase	Kapang, Bakteri
Sirup Jagung	Membuat sirup tinggi maltosa; produksi sirup rendah D.E.; produksi glukosa dari sirup jagung mengubah sirup jagung menjadi produk friuktosa yang lebih manis	Amilase, amiloglukosidase, glukosa Isomerase	Kapang, Bakteri
Laundry	Deterjen	Protease	Bakteri

C. Amilum

Amilum adalah polimer karbohidrat dengan rumus molekul $(C_6H_{10}O_5)_n$. Karbohidrat golongan polisakarida ini banyak terdapat di alam, terutama pada sebagian besar tumbuhan. Amilum dalam bahasa sehari-hari disebut juga pati terdapat pada umbi, daun, batang dan biji-bijian. Amilum merupakan kelompok terbesar karbohidrat cadangan yang dimiliki oleh tumbuhan sesudah selulosa. Butir-butir pati

⁵⁹Nur Hidayat dan Sri Suhartini, *Mikrobiologi Industri*. FTP Univ. Brawijaya Malang. Malang. 2009. h.7

apabila diamati dengan mikroskop ternyata berbeda-beda bentuknya dan ukurannya tergantung dari tumbuhan apa pati tersebut diperoleh⁶⁰.

Amilum disusun oleh dua kelompok polisakarida yaitu amilosa, kira kira 20–28% dan amilopektin sebagai sisanya. Baik amilosa maupun amilopektin memiliki monomer yang sama yaitu molekul glukopiranososa. Amilosa terdiri dari 100-10000 unit D-glukopiranososa per molekulnya, yang tiap unitnya berikatan lewat ikatan α -1,4 glikosida. Tiap rantai polimer molekulnya memiliki satu ujung gula tereduksi dan satu ujungnya lagi gula non reduksi sehingga molekul amilosa merupakan rantai terbuka.⁶¹ Amilosa merupakan bagian terdepan dari rantai amilum, bersifat larut dalam air yang dipanaskan dan dapat membentuk endapan dalam air, yang sifatnya tidak dapat balik. Amilopektin merupakan rantai molekul polisakarida yang memiliki banyak percabangan. Molekul D-glukopiranososa yang menjadi unit monomernya yang berikatan lewat ikatan α -1,4 glikosida seperti pada amilosa yang membentuk rantai lurus dan ikatan α -1,6 glikosida yang membentuk percabangan pada rantai amilopektin tersebut.⁶²

D. Kajian Islam Tentang Air

Kehidupan manusia punya hubungan dan erat dan langsung dengan air. Materi ini merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Mulai dari Makhluk hidup yang paling kecil seperti mikroba hingga yang paling besar.

⁶⁰Anna Poedjiadi. *Cit.* h 70

⁶¹*Ibid*

⁶²*Ibid*

Tanpa air tidak ada kicauan burung, ikan, bahkan enzim yang dibutuhkan dalam industri seperti pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.⁶³

Ayat-ayat Al-Quran banyak menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemhannya:

“Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya; dan kami Jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air” QS: Al-Anbiyaa[21]:30

Secara transparan Allah dalam ayat ini menyebut air sebagai sumber kehidupan. Dari ayat ini menurut penjelasan bahwa air menjadi tiang pokok bagi penciptaan ilahi. Air adalah ibu bagi segala fenomena alam.. Artinya, tanpa air kehidupan menjadi tidak bermakna⁶⁴.

Dalam banyak kasus penciptaan alam, ayat-ayat al-Quran menjelaskan penciptaan manusia, hewan, berkembangnya buah, rumput dan tanaman di dunia berasal dari air. Tampaknya bila menyelami lebih jauh ayat-ayat al-Quran hanya satu yang dapat disimpulkan bahwa air merupakan ciptaan Allah yang sangat bernilai setelah manusia. Setiap kehidupan sumbernya pasti berasal dari air yang menjadi nikmat dan anugerah Allah. Air memberikan kehidupan dan juga melindunginya.

⁶³ Darwis Hude, dkk. Cakrawala Ilmu Dalam Al-Qur'an. (2002). Jakarta : Pustaka Bogor

⁶⁴ *Ibid*

Bahkan air mensucikan segalanya. Bila dicermati secara seksama, ayat-ayat al-Quran mengajak manusia agar meneliti lebih dalam akan nilai materi sumber kehidupan ini.⁶⁵ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahannya

“Pernakahkamu memperhatikan air yang kamu minum” QS: Al-Waqi’ah [56]: 68

Baedasaerkan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat al-quran dia atas dapat kita simpulkan bahwa air mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Baik itu manusia mupun mikroorganisme renik. Salah satu contoh fungsi air dalam penelitian ini adalah Pembentukan sel bakteri, merupakan hasil dari interaksi yang dinamis dan rumit, antara berbagai jenis sel, setelah melewati berbagai proses. Agar interaksi ini bisa efektif, maka diperlukan unsur pokok yang bisa menyenawakan berbagai sel, sehingga proses kehidupannya bisa terus berkembang. Unsur pokok yang dimaksud adalah air. Karenanya, air mempunyai peranan teramat penting dalam kehidupan di dunia ini. Selain itu air juga memiliki peranan penting dalam proses pengubahan karbohidrat menjadi zat gula yang mudah dicerna dengan perantaraan enzim pelarut gula dan air. Sehingga terbentuk glukosa sebagai unsur penting bagi sel tubuh dalam menghasikan energi yang dibutuhkannya untuk tetap hidup⁶⁶.

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Anonim, “Fungsi Air Dalam Al-Qur’an”, diakses pada tanggal 2 Oktober 2012

Selain untuk kegunaan yang dijelaskan di atas, air juga merupakan unsur pokok dalam perubahan berbagai macam zat, seperti perubahan karbohidrat menjadi protein atau sebaliknya. Sebagaimana air juga termasuk unsur penting dalam pembentukan hormon dan enzim dan berbagai zat yang dikeluarkan dari tubuh. Dalam tumbuh-tumbuhan, air merupakan unsur penting dalam proses asimilasi khlorofil (butir hijau daun) yang merupakan proses penting bagi keberlangsungan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Dengan menggunakan akarnya, tumbuh-tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah, untuk disebarkan kepada semua batangnya sehingga menghidupkan semua sel yang ada. Disamping itu, air juga dibawa ke daun yang merupakan pusat penyediaan makanan bagi tumbuh-tumbuhan di mana dalam daun tumbuh-tumbuhan terdapat khlorofil. Dengan bantuan sinar matahari yang diserap oleh daun dan karbon dioksida yang diserap oleh pori-porinya dari udara, maka proses asimilasi khlorofil berlangsung sempurna dalam memberikan energi yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan agar bisa hidup⁶⁷.

⁶⁷ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Oktober 2012 bertempat di Laboratorium Biokimia UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Peternakan UIN Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah botol sampel steril, inkubator, neraca analitik, mikropipet, termometer, sheker, cawan petri, autoklaf, bunsen, sendok tanduk, lemari pendingin, spektrofotometer 20, jarum ose, botol semprot, oven, sentrifug dan alat-alat gelas yang umum dipakai di laboratorium.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah air panas Masamba, yeast ekstrak, pati, NaCl, pepton, tepung agar, akuades, CaCl₂, MgSO₄·7H₂O, NaNO₃, KH₂PO₄, CaCO₃, garam iodin, alkohol, reagen Nelson-Samogy, reagen arsenomolibdat, amonium sulfat, spiritus, alkohol 70%, aluminium foil, kertas pH universal., kertas warp.

C. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Mengambil sampel air panas dari sumber mata air panas Masaba, pada 1 titik. Sebelum sampel air diambil terlebih dahulu dilakukan pengukuran parameter fisika dan kimia di lapangan. Parameter yang diukur pertama adalah suhu air pada titik pengambilan dengan menggunakan termometer yang dicelupkan selama 3 menit ke titik pengambilan sampel dan di catat suhunya. Parameter kedua adalah pH air. Di titik pengambilan diukur dengan kertas pH universal yang dicelupkan ke permukaan air lalu angka pH yang tertera dicatat. Setelah pengukuran secara fisika selesai sampel air diambil kemudian diberi label dan dimasukkan ke *cool box* untuk dikultivasi pada skala laboratorium.

2. Pembuatan Media Padat LA

Komposisi medium LA adalah yeast ekstrak 0,01 gram, NaCl 0,1 gram, pepton 0,01 gram dan tepung agar 1,5 gram. Selanjutnya melarutkan komposisi tersebut dengan aquades hingga volume akhir 100 mL. Selanjutnya dihomogenisasi dengan magnetik stirrer, kemudian dipanaskan sampai larut lalu disterilkan dengan autoklaf, didinginkan kemudian dituang pada cawan petri steril

3. Pembuatan Media Selektif Amilolitik

Medium selektif amilolitik dibuat dengan melarutkan yeast ekstrak 0,01 gram, pepton 0,01 gram, NaCl 0,1 gram, $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 0,01 gram, $CaCl_2$ 0,01 gram, tepung agar 1,5 gram dan pati 0,05 gram dilarutkan dengan akuades hingga

volume akhir 100 mL pada. Selanjutnya larutan dipanaskan dan disterilkan dalam autoklaf didinginkan kemudian dituang ke dalam cawan petri.

4. Pembuatan Media Inokulum

Medium inokulum dibuat dengan melarutkan pati 0,2 gram, pepton 0,3 gram, KH_2PO_4 0,01 gram, NaNO_3 0,01 gram dengan yeast ekstrak 0,1 g, hingga volume akhir 100 mL. Media tersebut disterilkan di dalam autoklaf. Media yang telah disterilkan disimpan dalam erlenmeyer.

5. Pembuatan Media Fermentasi atau Media Produksi

Medium fermentasi dibuat dengan memasukkan pati 2 gram, pepton 3 gram, CaCl_2 0,04 gram dan KH_2PO_4 0,04 gram dengan yeast ekstrak 0,1 g hingga volume akhir 1000 mL. Kemudian disterilkan di dalam autoklaf.

6. Isolasi dan Pemurnian Mikroba

Sebanyak 0,5-1 mL sampel disebar dengan menggunakan mikropipet pada permukaan media LA untuk menumbuhkan mikroba, diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C , 50°C dan 62°C . Koloni mikroba yang tumbuh diambil dan digores kedalam cawan petri yang mengandung media agar selektif amilolitik kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 50°C . Pengujian mikroba penghasil enzim amilase dilakukan dengan uji iodine dengan cara meneteskan iodine pada permukaan agar yang berisi isolat. Bila terdapat zona bening, media mengindikasikan enzim amilase diproduksi oleh isolat sehingga di daerah tersebut amilum sudah dihidrolisis, sedangkan media yang berwarna biru kehitaman menandakan pati di tempat itu belum terhidrolisis.

7. Penyiapan Inokulum

Isolat mikroba yang telah ditumbuhkan diambil 1-2 ose kemudian digores ke dalam medium inokulum yang telah disiapkan. Biakan mikroba tersebut disheker dengan kecepatan 150 rpm selama 24 jam pada suhu 50°C.

8. Pembuatan Stok Kultur

Stok kultur disiapkan dengan cara menggores 1-2 ose dari tiap isolat mikroba yang tumbuh di kultur pemurnian sebelumnya, dalam bentuk media inokulum dengan komposisi yeast ekstrak 0,5 gram, NaCl 1 gram, pepton 1 gram dan tepung agar 2 gram dengan aquades dilarutkan volume akhir 100 mL. Kultur diinkubasi selama 24 jam pada suhu 50°C, selanjutnya disimpan di kulkas untuk stok isolat. Stok kultur ini diremajakan sekali dalam 3 minggu dengan cara menggores mikroba pada media agar miring.

9. Penentuan Waktu Optimum Enzim Amilase

Penentuan waktu optimum enzim amilase dilakukan dengan metode Nelson Samogy. Penentuan waktu produksi optimum dilakukan pada proses fermentasi.. Sebanyak 10 mL inokulum aktif dipindahkan ke dalam erlenmeyer 250 mL yang berisi 100 mL media produksi enzim (media fermentasi) selanjutnya dilakukan pengocokan dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 50°C dengan variasi waktu inkubasi (0, 6, 24,30, 48, 54, 72, 78) jam. Setelah diinkubasi media produksi enzim amilase disentrifugasi,selama 15 menit dengan kecepatan 5000 rpm.

Sebanyak 1 ml supernatant ezim (0, 6, 24,30, 48, 54, 72, 76) jam dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 ml reagen Nelson kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 10 menit lalu didinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin ditambahkan 1 ml reagen arsenomolibdat sambil diaduk kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 10 menit lalu didinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin ditambahkan 7 ml aquades dan segera dikocok hingga bercampur rata. Absorban diukur pada panjang gelombang 610 nm.

10. Pembuatan kurva Standar Glukosa

Sebanyak 1 ml larutan glukosa standar dengan konsentras(0 ; 0,20 ; 0,40 ; 0,60 ; 0,80 ; 1,00) mg/ml dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 ml reagen Nelson kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 10 menit lalu didinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin ditambahkan 1 ml reagen arsenomolibdat sambil diaduk kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 10 menit lalu didinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin ditambahkan 7 ml aquades dan segera dikocok hingga bercampur rata. Absorban diukur pada panjang gelombang 610 nm, kemudian dibuat kurva kalibrasi yang menunjukkan hubungan kadar glukosa dan absorban.

Untuk larutan blanko, larutan glukosa standar diganti dengan 1 ml aquades dan dikerjakan sama seperti di atas. Kadar glukosa yang dihasilkan setelah perlakuan enzim persatuan waktu inkubasi merupakan aktivitas enzim amilase dari mikroba pada isolat sumber air panas Masamba.

$$Y = AX + B$$

Dimana

Y = Nilai absorban sampel

X = Konsentrasi glukosa yang dicari (mg/ml)

1 U (unit aktivitas) = 1 μ M (konsentrasi glukosa) / menit⁶⁸



⁶⁸ Bintang Maria *loc.cit*

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambar Isolasi Bakteri Pada Media Dasar




Gambar 5.1
Bakteri termofilik pada media dasar

2. Gambar Isolasi Bakteri Pada Media Selektif



Gambar 5.2
Biakan murni bakteri termofilik penghasil enzim amilase

3. Uji Kualitatif Enzim Amilase



Gambar 5. 3
Gambar Sebelum Pengujian Kualitatif Enzim Amilase



Gambar 5.4
Gambar Setelah Pengujian Kualitatif Enzim Amilase

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Berikut ini dijadikan nilai aktivitas enzim amilase berdasarkan lama inkubasi.

Tabel 5.1
Tabel Pengaruh Lama Inkubasi Terhadap Aktivitas Enzim Amilase Kasar

Lama Inkubasi (Jam)	Konsentrasi Glukosa (mg.mL ⁻¹)	Unit Aktivitas Enzim (μ .mol.mL ⁻¹)/menit
0	0,038	-0.00538
6	0,427	-0.00492
24	1,076	0.00099
30	1,245	0.00528
48	2,456	0.02708
54	2,331	0.009945
72	-0,342	-0.01824
78	-0,370	-0.001028

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk memperoleh ekstrak kasar enzim amilase dan mengetahui bagaimana aktivitas enzim ini dari bakteri terofilik dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menumbuhkan bakteri termofilik pada media dasar dalam bentuk media padat, bakteri yang telah tumbuh kemudian diinokulasi lebih

lanjut kedalam media selektif amilolitik untuk penyeleksian bakteri termofilik penghasil enzim amilase. Pekerjaan ini dilakukan pada tempat yang steril dan menggunakan peralatan yang telah disterilkan agar tidak terjadi kontaminasi.

Tahap kedua adalah adalah penyiapan media untuk uji kualitatif. Dengan cara uji idin. Selanjutnya bakteri yang positif mengandung enzim amilase kemudian dibuat media inokulum. Tahap ketiga adalah tahap yang paling penting yaitu menumbuhkan bakteri termofilik dalam mediaproduksi .

1. Isolasi dan Seleksi Bakteri Termofilik Penghasil Enzim Amilase

Dalam proses isolasi bakteri termofilik penghasil enzim amilase ada beberapa proses yang dilakukan yaitu. Isolasi bakteri termofilik dimulai dengan preparasi awal sampel air panas untuk mengetahui ada tidaknya bakteri dalam sampel air panas tersebut untuk isolasi bakteri termofilik selanjutnya. Dalam proses preparasi awal menggunakan media cair dengan komposisi sebagai berikut (NaCl 1 g, pepton 1 g, yeast ekstrak 1 g) yang dilarutkan dalam 100 ml aquades.

Setelah proses preparasi awal selanjutnya dilakukan isolasi bakteri termofilik dari sumber air panas dengan menggunakan metode isolasi cawan tebar dimana sampel air panas hasil preparasi awal ditebar diatas permukaan media LA. Dimana media LA (*luria agar*) sebagai media dasar pertumbuhan bakteri. Komposisi media LA terdiri atas (KH_2PO_4 0,01 g, MgSO_4 0,01 g, NaCl 0,1 g, pepton 0,01 g, bacto agar 1,5 g dan yeast ekstrak 0,05 g). Komposisi dari media LA ini mempunyai fungsi masing-masing diantaranya pepton (sebagai sumber

karbon), yeast ekstrak (sebagai sumber nitrogen) sedangkan KH_2PO_4 , MgSO_4 , NaCl (berfungsi sebagai sumber mineral).

Proses isolasi bakteri termofilik dari sumber air panas Masamba dari satu titik dilakukan dengan beberapa variasi suhu yaitu pada suhu 37°C , 40°C dan 50°C . Berdasarkan variasi tersebut, bakteri termofilik yang tumbuh dengan baik pada suhu 50°C . Hasil yang diperoleh dari isolasi bakteri tersebut sesuai dengan teori hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu misalnya menurut Gilter secara fisiologis suhu bakteri termofilik mampu tumbuh pada suhu optimum 55°C dan maksimum tumbuhnya bakteri termofilik adalah 70°C . Sedangkan menurut Muir dan Rikhie berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa bakteri termofilik dapat tumbuh dengan baik pada suhu 50°C - 70°C .⁶⁹ Bakteri Termofilik yang telah tumbuh dapat dilihat pada gambar 4.1.

Selanjutnya untuk memperoleh biakan murni bakteri penghasil enzim amilase digunakan media selektif amilolitik dengan menggunakan pati sebagai substrat. Dimana komposisi media selektif amilolitik sama seperti media dasar isolasi bakteri tetapi ditambahkan pati sebagai substrat, karena enzim yang akan di isolasi dari bakteri ini adalah enzim amilase. Gambar biakan murni bakteri termofilik dapat dilihat pada gambar 4.2.

⁶⁹ Desi Kristina Sianturi, *loc. cit*

2. *Isolasi Dan Uji Aktivitas Enzim Amilase*

a. *Uji Kualitatif Enzim Amilase*

Untuk hasil isolat yang telah murni dapat diasumsikan bahwa isolat tersebut dapat menggunakan pati. Untuk memastikan bahwa isolat murni dari bakteri termofilik tersebut dapat menggunakan pati untuk memproduksi enzim maka dilakukan uji kualitatif dengan menggunakan metode perwarnaan iodin. Metode pewarnan iodin merupakan suatu cara untuk mendeteksi ada tidaknya enzim amilase yang dihasilkan oleh mikroorganisme termofilik. Ada tidaknya enzim amilase yang dihasilkan mikroorganisme termofilik diindikasikan dengan terbentuknya zona bening disekeliling isolat yang telah ditetesi iodin. Besarnya diameter zona bening yang terbentuk di sekeliling isolat bakteri termofilik dapat menggambarkan besarnya aktivitas enzim. Sebagaimana berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan diameter yang diperoleh adalah sebagai berikut 8 mm zona diameter medium agar pati⁷⁰, akan tetapi ada juga yang mendapatkan diameter zona bening sebesar 0.7 mm diameter inti dan 1.5 mm diameter luar⁷¹, selain itu diameter yang diperoleh dari peneliti lainnya adalah > 1 mm⁷².

⁷⁰Arikan, B., (2008), *Highly Thermostable, Thermophilic, Alkaline, SDS and Chelator Resistant Amylase from a Thermophilic Bacillus sp. Isolate A3-15*, Bioresource Technology, 99: 3071-3076

⁷¹Fernández, P. S., Periago, P. M., Salmerón, M. C., Martínez, A., (1998), *Predictive Model to Describe The Combined Effect of pH and NaCl on Apparent Heat Resistance of Bacillus stearothermophilus*, International Journal of Food Microbiology 44: 21–30

⁷²Elidar Naiola, karakterisasi dan Optimasi Media Produksi Amilase Dari *Aspergillus Niger* Dan *Aspergillus clavatus*, (Berita Biologi, LIPI Bogor 2002) vol 6. No 3. H 417

Hasil yang diperoleh dari isolasi bakteri termofilik dari sumber mata air panas Masamba positif mampu menghasilkan enzim amilase yang diindikasikan dengan adanya zona bening. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan uji aktivitas enzim amilase secara semi-kuantitatif yang dilakukan dengan cara pengukuran diameter zona bening.

b. Uji Aktivitas Enzim Amilase Secara Kuantitatif

Enzim dapat dihasilkan dari tanaman, hewan dan mikroba, tetapi enzim dari mikroba menunjukkan hasil yang lebih besar melalui teknik fermentasi dan lebih mudah untuk memperbaiki produktivitasnya daripada tanaman dan hewan. Enzim yang dihasilkan mikroba dapat dikontrol, misalnya pemberian bahan pemacu dalam medium, penghambatan umpan balik dapat diubah melalui teknik seleksi dan mutasi. Salah satu mikroba yang dapat digunakan adalah bakteri termofilik.

Bakteri termofilik dari sumber air panas yang telah diisolasi dan dilakukan uji kualitatif adanya enzim amilase yang mampu dihasilkan oleh bakteri termofilik ini, selanjutnya ditumbuhkan pada media fermentasi yang kemudian digunakan untuk mengukur aktivitas enzim amilase tersebut (waktu produksi optimum).

Enzim amilase yang dihasilkan oleh bakteri merupakan enzim ekstra seluler. Dimana bakteri mensintesis enzim dari dalam selnya selanjutnya digunakan diluar selnya untuk memecah amilum yang merupakan sumber makanan yang terdapat dalam lingkungan. Sumber makan berupa amilum

harus terlebih dahulu dipecah karena molekul amilum tidak dapat masuk secara langsung kedalam sel bakteri karena ukuran molekul dari amilum sangat besar sehingga molekul amilum harus dipecah terlebih dahulu menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga molekul-molekul tersebut dapat masuk kedalam sel bakteri. Molekul-molekul amilum yang telah dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang telah masuk kedalam sel bakteri akan digunakan sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan bakteri.⁷³

Menurut Palmer (1985) Untuk memperoleh enzim ekstraseluler yang dihasilkan enzim dari bakteri tersebut maka kultur bakteri penghasil enzim amilase tersebut disentrifus untuk mendapatkan supernatant yang mengandung enzim amilase ekstra seluler. Enzim amilase ekstra seluler dari hasil sentrifus selanjutnya digunakan untuk uji aktivitas.

Dalam pengukuran aktivitas enzim amilase (pentuan waktu produksi optimum) enzim amilase. Digunakan metode Nelson Samogyi. Metode Nelson Samogyi adalah metode untuk menguji enzim amilase dengan adanya gula pereduksi yang terbentuk dari hasil hidrolisis pati oleh enzim amilase yang menghasilkan gula pereduksi yang konsentrasinya sebanding dengan aktivitas enzim. Gula pereduksi adalah gula yang dapat dioksidasi oleh zat pengoksidasi⁷⁴.

⁷³ Benson, *op, cit*

⁷⁴Yeni Mulyani, *Perbandingan Aktivitas Enzim α -Amilase Dari Biji Jagung Yang Sedang Tumbuh*, Makala Seminar Penelitian

Aktivitas enzim biasanya menggunakan istilah unit (U). Dimana satu unit enzim dinyatakan bahwa sejumlah enzim yang mengkatalisis konversi dari satu mikromol substrat per unit dalam kondisi normal⁷⁵.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengukuran waktu produksi optimum dari enzim amilase adalah pada waktu inkubasi 0-6 jam merupakan fasa *lag* sehingga enzim amilase yang dihasilkan sedikit, yang kemudian menyebabkan aktivitas enzim amilase kecil. Fasa *lag* adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme (bakteri termofilik) masih melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan⁷⁶. Selanjutnya pada rentang waktu 30-48 jam terjadi peningkatan aktivitas enzim amilase yang cukup besar, pada rentang waktu ini bakteri termofilik memasuki fasa *eksponensial*, sehingga jumlah mikroorganisme yang dihasilkan meningkat sangat banyak dan aktivitas enzim amilase yang dihasilkan juga meningkat. Fasa *eksponensial* adalah suatu keadaan metabolis dari mikroorganisme terjadi secara cepat dan konstan. Keadaan tersebut berlangsung sampai salah satu atau beberapa nutrient habis atau terjadi penimbunan metabolisme yang bersifat racun⁷⁷. Namun setelah 48 jam aktivitas enzim menurun hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan mikroorganisme berada pada fasa *stasioner*. Fasa *stasioner* adalah keadaan dimana terjadi penurunan kadar nutrient dan adanya penimbunan zat-zat yang

⁷⁵Maria Bintang Biokimia Teknik Penelitian, Bogor. Erlangga : 2010. H. 51

⁷⁶Natsir Djide dan Sartini, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*, Makassar, UNHAS 2008.h.209

⁷⁷*Ibid*


bersifat racun sehingga kecepatan pertumbuhan dan perbanyakan mikroorganisme akan terhambat. Pada keadaan itu juga jumlah mikroorganisme yang mati semakin meningkat akibat dari terjadinya penumpukan racun⁷⁸. Berdasarkan teori tersebut maka yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas enzim adalah terjadinya penumpukan produk beracun atau kehabisan nutrient sehingga beberapa sel mati sedangkan yang tumbuh dan membelah sedikit.

Banyaknya pati yang berhasil dihidrolisis oleh enzim amilase selama satu menit sebanding dengan aktivitas enzim amilase. Jadi aktivitas enzim amilase diartikan sebagai jumlah enzim amilase yang diperlukan untuk menghidrolisis sejumlah pati dalam waktu satu menit

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa waktu akativitas enzim amilase kasar yang diukur menggunakan metode Nelson-Samogy dapat dikatakan bahwa semakin meningkat dari lama inkubasi 0 jam - 48 jam akan tetapi pada lama inkubasi 54 jam terjadi penurunan aktivitas enzim amilase. Hal ini menunjukan bahwa waktu inkubasi optimum enzim amilase barada pada lama inkubasi 48 jam yaitu sebesar $0.02708 \mu\text{.mol} / \text{menit}$. Artinya enzim amilase diari bakteri termofilki dari sumber air panas masamba dapat menghasilkan glukosa sebanya $0.02708 \mu\text{.mol}$ per menit. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang lain menggunakan metode Nelson-Samogy waktu produksi optimum enzim amilase dari *S. fibuligera* dengan medium biji

⁷⁸*Ibid.h* 210

jagung yang sedang tumbuh yaitu 6 jam dengan konsentrasi glukosa sebesar 0,00833 μ .mol per menit⁷⁹, sedangkan waktu produksi optimum enzim amilase dari *Aspergillus oryzae* pada medium pati biji nangka (*Arthocarpus heterophilus* Lmk) adalah 72 jam dengan konsentrasi glukosa sebesar 0,00850 μ .mol per menit⁸⁰ dan aktivitas enzim amilase dari *A.niger* dalam media dedak adalah 72 jam dengan konsentrasi glukosa sebesar 0,09116 μ .mol per menit, *A.niger* dalam media nasi adalah 72 jam dengan konsentrasi glukosa sebesar 0,08337 μ .mol per menit⁸¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁷⁹ Yeni Mulyani. *loc. cit.* h. 8

⁸⁰ Johni Azmi, *Penentuan Kondisi Optimum Fermentasi Aspergillus Oryzae Untuk Isolasi Enzim Amilase Medium Pati Biji Nangka (Arthocarpus heterophilus Lmk)*, Pekanbaru Universitas Riau Pekanbaru (Jurnal Biogenesis vol 2(2):55-58 2006) h.57

⁸¹ Elidar Naiola, *Karakterisasi dan Optimasi Media Produksi Amilase Dari A.niger Dan A. clavatus* (Berita Biologi. Vo 6. 2002 LIPI Bogor) h.418

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sumber air panas masamba mempunyai potensi untuk menghasilkan isolat bakteri termofilik penghasil enzim amilase
2. Aktivitas enzim amilase yang diperoleh dari bakteri termofilik pada sumber air panas masamba adalah sebesar 0.02708 μ .mol per amenit dengan waktu produksi optimum adalah 48 jam

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu


1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan karekterisasi dari bakteri termofilik.
2. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk aktivitas enzim ini pada tingkat yang lebih murni sehingga potensensim amilase dari isolat air panas Masamba ini dapat diketahui datanya lebih jelas dan dapat diketahui kemampuan yang dimiliki enzim amilase tersebut untuk digunakan pada bidang aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA


- Admin, 2009. *Mengenal Bakteri termofilik*, <http://www.scribd.com>. Diakses 25 Oktober 2011
- A. Dodi, dkk. "Pengaruh Konsentrasi Enzim α -Amilase Terhadap Sifat Fisik dan Organoleptik filtrat Bubur Buah Pisang" Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Universitas Lampung. h. (231-241) 2008

- Al-Hikmah. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Azmi Johni "Penentuan Kondisi Optimum Fermentasi *Asperiligus Oryzae* Untuk Isolasi Enzim Amilase Medium Pati Biji Nangka (*Arthocarpus heteropilus* LMK" Jurnal Biogenesis, Universitas Riau Pean Baru. 2006
- B. Arikan, "Highly Thermostable, Thermophilic, Alkaline, SDS and Chelator Resistan Amylasea From a Thermophilic *Bacillus* sp. Isolate A3-15", Bioresource Tecloghnology. (2008)
- Bintang Maria, *Teknik Penelitian Biokimia*, Bogor. Erlangga. 2010
- Djide Natsir dan Sartini, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*, Makassar : UNHAS. 2008
- Faernandes, P. S., Periago, p. M., Salmeron, M. C., Martinez, A. "Predictive Model to Describe The Combined Effect of PH and NaCl on Apparent Heat Resistance of *Bacillus Stearotherophilus*" International Journal of Food Microbiologi. 1998
- Ginting Jusuf."Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas Enzim Amilase Kasar Termoirfilok dari Sumber Air Panas Semangat Gunung Kabupaten Karo, Sumatra Utara".Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. 2009
- Muharni. "Isolasi dan Identifikasi Bakteri Penghasil Kitinase Dari Sumber Air Panas Danau Ranu Sumatra Selat". Jurnal Penenitian Sains. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya Sumatra Selatan. 2009
- Muharni. "Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas Enzim Amilase Kasar Termofilik dari Sumber Air Panas Semangat Gunung Karo, Sumatra Utara". Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. 2009
- Mulyani Yeni "Perbandingan Aktivitas Enzim Amilase Dari Biji Jagung Yang Sedang Tumbuh" Makala Seminar Penelitian
- Naiola Elidar, "Karakteristik dan Optimasi Media Produksi Amilase Dari *Asperiligus* Dan *Asperiligus Clavatus*", Berita Biologi Vol 6. No.3. Desember 2003
- Pakpahan Rosalina."Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas Protease Termofilik dari Sumber Air panas Sipoholon Tapanuli Utara Sumatra Utara" Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. 2009
- Poedjiadi Anna. 2009. *Dasr-Dasar Biokimia*. Jakarta UI-Pres.
- Rahyu Umi. "Skринing Bakteri TermofilikmPenghasil Protoase "Bul.Tek. Lit" (2007)vol. 6.h.145-146
- Sarah, dkk." Isolasi α -Amilase Termostabil dari BakteriTermofilik (*Bacillus stearotherophilus*)" Prosiding Skripsi Semester Genap,FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2010


- Sianturi Dessy Christina."Isolasi dan Uji Aktivitas enzim amilase Termofilik Kasar dari Sumber Air Panas Panen Sibirubiri Sumatra Utara" Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. 2009
- Sugiono, dkk. "Penapisan dan Karakteristik Protease Bakteri Termofilik Asal Mata Air Laut Poso Sulawesi Tenggara"
- Suyono, Hairunisa.dkk, "*Isolasi Bakteri Termofilik Asam Laktat dari Sumber Air Panas Gunung Pancar Bogor* ". Program Kreatif Mahasiswa. Institut Pertanian Bogor. 2008
- Sutiamiharja Nurhalijah." Isolasi dan Uji Aktivitas enzim amilase Termofilik Kasar dari Sumber Air Panas Gurunkinaya Karo. Sumatra Utara" Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. 2009
- Suhara. *Pengantar Enzim.* , <http://www.scribd.com>. Diakses 12 januari 2012
- Van der bug B. Extremopiles as source for novel enzim. *Curr in Microbiol.* vol.6 (.213-218) 2003
- Tika Nyoman."Isolasi Enzim Lipase Termostabil dari Bakteri Termofilik Isolat Air Panas Banyuwedeng Kecamatan Gerogak, Buleleng Bali" Akta Kimindo" FPMIPA, IKIP singaraja, Bali: 2007
- Rahayu.dkk *Eksplorasi Bakteri Termofilik Penghasil Enzim Kitinase Asal Indonesia* seminar hasil-hasil penelitian Bidang ilmu hayati Bogor, IPB: 1999
- Utomo, Ratna Sari Hadi dkk. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta : UI-Pres. 2007

LAMPIRAN 1**BAGAN PROSEDUR PENELITIAN**

1. Isolasi dan pemurnian mikroba




2. Isolasi enzim dari biakan mikroba penghasil enzim amylase




3. Pebgujian aktivitas enzim amylase


A. Pentuan waktu produksi optimum




4. Pembuatan Media LA




5. Pembuatan Media Selektif Amilolitik



6. Pembuatan Media Inokulum



7. Pembuatan Media Fermentasi



LAMPIRAN 2

A. Pembuatan Reagen Nelson

100 mL reagen Nelson

2,8 gram Na_2PO_4 anhidrat, 4 gram garam rosella. Dilarutkan dalam 70 mL aquades kemudian ditambahkan 10 mL NaOH dan 8 ml CuSO_4 10%, selanjutnya ditambahkan lagi 18 gram Na_2SO_4 , diencerkan hingga 100 mL, disimpan selama 2 hari dan disaring dengan kertas whatman no 40.

B. Pembuatan Larutan Arsenomolibd

Cara membuat larutan ini adalah sebagai berikut

Larutan A = 5,5 gram amonium molibdat dalam 100 mL aquades
kemudian ditambahkan 5,5 mL H_2SO_4 pekat

Larutan B = 3 gram $\text{Na}_2\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ dalam 25 mL aquades

Kemudian larutan A dan larutan B dicampurkan selanjutnya disimpan dalam botol gelap selama 2 hari

C. Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Amilase


1. Pembuatan Larutan Standar Glukosa

Ditimbang 0,01 gram glukosa kemudian dilarutkan dalam 100 mL aquades (larutan induk). Selanjutnya dilakukan pengenceran 10 mg/mL sebanyak 50 mL (5 mL larutan induk dalam 50 mL aquades), yang kemudian selanjutnya dilakukan pengenceran dengan variasi konsentrasi 0,20 : 0,40 : 0,60 : 0,80 : 1,00 mg/mL.

2. Hasil Pengukuran Serapan Larutan Standar Glukosa Pada Panjang Gelombang 610

Konsentrasi	Absorban
0,20	0,518
0,40	0,531
0,60	0,547
0,80	0,564
1,00	0,583

3. Kurva Serapan Larutan Standar Glukosa Pada Berbagai Konsentrasi



4. Hasil Pengukuran Serapan Sampel Pada Panjang Gelombang 610

Sampel (jam)	Absorban	Keterangan (Pengenceran)
0	0,342	10 x
6	0,393	10x
24	0,528	10x
30	0,563	10x
48	0,815	25x
54	0,789	10x
72	0,233	10x

Data absorban yang diperoleh disubstitusikan dalam persamaan kurva standar untuk menentukan kadar glukosa dalam sampel

$$y = 0.081x + 0.499$$

untuk y pada tabel dan x merupakan konsentrasi glukosa sehingga dapat dihitung konsentrasi glukosa seperti dibawa ini

a. Sampel (0 jam)

$$0,342 = 0.081x + 0.499$$

$$x = -1,9382\text{mg/mL}$$

b. Smpel (6 jam)

$$0,393 = 0.081x + 0.499$$

$$x = -1,2345 \text{ mg/mL}$$

c. Sampel (24 jam)

$$0,528 = 0,081x + 0,499$$

$$x = 0,3580 \text{ mg/mL}$$

d. Sampel (30 jam)

$$0,653 = 0,208x + 0,304$$

$$x = \text{mg/mL}$$

e. Sampel (48 jam)

$$0,815 = 0,081x + 0,499$$

$$x = 3,9012 \text{ mg/mL}$$

f. Sampel (54 jam)

$$0,789 = 0,081x + 0,499$$

$$x = 3,5802 \text{ mg/mL}$$

g. Sampel (72 jam)

$$0,233 = 0,081x + 0,499$$

$$x = -3,2839 \text{ mg/mL}$$

5. Aktivitas enzim amilase (U)

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol/menit}$$

a. Untuk (0 jam)

$$\text{Konsentrasi glukosa} = -1,9380 \text{ mg/mL}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \text{ } \mu\text{mol/menit}$$

$$\text{mM} = \frac{\frac{-1,9380 \frac{\text{mg}}{180 \text{mg}} \cdot \text{mol}}{m}}{1 \text{ mL}}$$

$$= -0,01076 \text{ mM} \times 1000$$

$$= -0,01076 \text{ } \mu\text{mol}$$

Sehingga

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \text{ } \mu\text{mol/menit}$$

$$= \frac{-0,01076 \text{ } \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}} \times 10$$

$$= -0,00538 \text{ } \mu\text{mol/menit}$$

b. Untuk (6 jam)

$$\text{Konsentrasi glukosa} = -1,2345 \text{ mg/mL}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \text{ } \mu\text{mol/menit}$$

$$\text{mM} = \frac{\frac{-1,2345 \frac{\text{mg}}{180 \text{mg}} \cdot \text{mol}}{m}}{1 \text{ mL}}$$

$$= -0,0685 \text{ mM} \times 1000$$

$$= -0,0685 \text{ } \mu\text{mol}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \text{ } \mu\text{mol/menit}$$

$$= \frac{-0,0685 \text{ } \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}} \times 10$$

$$= -0,04925 \mu\text{mol}/\text{menit}$$

c. Untuk (24 jam)

$$\text{Konsentrasi glukosa} = 0,3580 \text{ mg/mL}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol}/\text{menit}$$

$$\text{mM} = \frac{0,3580 \frac{\text{mg}}{180\text{mg}} \cdot \text{mol}}{1 \text{ mL}}$$

$$= 0,001988 \text{ mM} \times 1000$$

$$= 0,001988 \mu\text{mol}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol}/\text{menit}$$

$$= \frac{0,001988 \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}} \times 10$$

$$= 0,000994 \mu\text{mol}/\text{menit}$$

d. Untuk (30 jam)

$$\text{Konsentrasi glukosa} = 1,9012 \text{ mg/mL}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol}/\text{menit}$$

$$\text{mM} = \frac{1,9012 \frac{\text{mg}}{180\text{mg}} \cdot \text{mol}}{1 \text{ mL}}$$

$$= 0,01056 \text{ mM} \times 1000$$

$$= 0,01056 \mu\text{mol}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol}/\text{menit}$$

$$= \frac{0,01056 \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}} \times 10$$

$$= 0,00528 \mu\text{mol/menit}$$

e. Untuk (48 jam)

Konsentrasi glukosa = 3,9012 mg/mL

1 U (unit aktivitas) = 1 $\mu\text{mol/menit}$

$$\text{mM} = \frac{3,9012 \frac{\text{mg}}{180\text{mg}} \cdot \text{mol}}{1 \text{ mL}}$$

$$= 0,02167 \text{ mM} \times 1000$$

$$= 0,02167 \mu\text{mol}$$

1 U (unit aktivitas) = 1 $\mu\text{mol/menit}$

$$= \frac{0,02167 \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}} \times 25$$

$$= 0,02708 \mu\text{mol/menit}$$

f. Untuk (54 jam)

Konsentrasi glukosa = 3,5802 mg/mL

1 U (unit aktivitas) = 1 $\mu\text{mol/menit}$

$$\text{mM} = \frac{3,5802 \frac{\text{mg}}{180\text{mg}} \cdot \text{mol}}{1 \text{ mL}}$$

$$= 0,01989 \text{ mM} \times 1000$$

$$= 0,01989 \mu\text{mol}$$

1 U (unit aktivitas) = 1 $\mu\text{mol/menit}$

$$= \frac{0,01989 \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}} \times 10$$

$$= 0,009945 \mu\text{mol/menit}$$

g. Untuk (72 jam)

$$\text{Konsentrasi glukosa} = -3,2834 \text{ mg/mL}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol/menit}$$

$$\text{mM} = \frac{-3,2834 \frac{\text{mg}}{180 \text{mg}}}{1 \text{ mL}} \cdot \text{mol}$$

$$= -0,01824 \text{ mM} \times 1000$$

$$= -0,01824 \mu\text{mol}$$

$$1 \text{ U (unit aktivitas)} = 1 \mu\text{mol/menit}$$

$$= \frac{-0,01824 \mu\text{mol}}{20 \text{ menit}}$$

$$= -0,00912 \mu\text{mol/menit}$$