

PENGARUH PENAMBAHAN KONSENTRASI EKSTRAK TEH (*Camellia sinensis*) TERHADAP DAYA SIMPAN TELUR ASIN



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh :

ST. HAJAR
60700112085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Hajar

Nim : 60700112085

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli
- b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Makassar, Oktober 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
St. Hajar
60700112085
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara St. Hajar, NIM : 60700112085 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Pengaruh Penambahan Konsentrasi Ekstrak Teh (*Camellia sinensis*) terhadap Daya Simpan Telur Asin”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Jumriah Syam S.Pt., M.Si
NIP. 19720727 2000 03 2 008

Irmawaty S.Pt., M.P
NIP.-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Muh. Dr. Ir. Basir Paly M.Si
NIP. 19590712 1986 03 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya pada kita semua, shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad saw yang senantiasa menuntun kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan sumbangsih dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda tercinta H. Usman dan Ibunda Ene yang senantiasa mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tulus. Serta kakak ku tercinta yaitu Lukman, St. Hawa, Abdul Salam, Abdul Haris, SKM dan Nursi, S.Pd yang memberikan dorongan dan sarannya. Paman Dahlan, S. Pd dan bibi Rahma yang senantiasa meberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si selaku pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pengalaman selama penulis melaksanakan penelitian. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Irmawaty, S.Pt., M.P selaku pembimbing kedua yang dengan tulus membimbing dan mengarahkan hingga selesainya skripsi ini.

3. Buat teman-teman seangkatanku Macang 012 terutama kelas C, terimakasih atas bantuan, do'a, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin dan buat Adik-adik Banteng 013 dan Elang 014 serta kakak-kakak Angkatan 2008-2011.
4. Teman-teman KKN-Reguler Angkatan 51 Kecamatan Turatea Jeneponto, Kabupaten Jeneponto khususnya Desa Langkura.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Oktober 2018

St. Hajar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
E. Hipotesis	3
F. Defenisi Operasional.....	3
G. Kajian Terdahulu.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Al-Quran terhadap Proses Pembentukan Telur	8
1. Tinjauan Al-Quran tentang Proses Penciptaan Telur	8
2. Tinjauan Al-Quran tentang Telur Asin	9
B. Struktur Telur Itik	11
C. Telur Asin dan Metode Pengasinan	18

D. Jenis Pengawetan	26
1. Perendaman dengan Larutan Garam	26
2. Jenis pengawetan dengan Penyamak Nabati	27
E. Deskripsi Teh (<i>Camellia sinensis</i>)	27
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	32
B. Alat dan Bahan Penelitian	32
C. Jenis Penelitian	32
D. Metode Penelitian	32
E. Prosedur Penelitian	33
F. Parameter yang di amati	36
G. Analisis Data	36
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil dan Pembahasan	
1. Pengaruh Perlakuan terhadap Lama Simpan Bagian (Rongga Udara)	37
2. Pengaruh Perlakuan terhadap Lama Simpan Bagian (Warna Yolc)	37
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57

DAFTAR TABEL

No		Hal
1	Perbedaan Kadar Gizi Putih dan Kuning telur.....	17
2	Pengaruh perlakuan terhadap lama simpan bagian (Rongga Udara).....	37
3	Hasil analisis lanjutan yaitu Uji Duncan's multiple range test (DMRT) taraf 5%.....	38
4	Pengaruh perlakuan terhadap lama simpan bagian (warna yolk).....	39
5	Hasil analisis lanjutan yaitu Uji Duncan's multiple range test (DMRT) taraf 5%.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Telur	15
2. Daun Teh (<i>Camelia Sinensis</i>)	29



ABSTRAK

Nama : St. Hajar

Nim : 60700112085

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul Skripsi : “Pengaruh Penambahan Konsentrasi Ekstrak Teh (*Camellia sinensis*) terhadap Daya Simpan Telur Asin”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) terhadap daya simpan telur asin. Metode yang di gunakan adalah metode eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 5 butir telur adapun rancangan penelitian berdasarkan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) yang digunakan yaitu $P_0 = 0\%$, $P_1 = 20\%$, $P_2 = 30\%$, dan $P_3 = 40\%$. Hasil Pengaruh Perlakuan terhadap Lama Simpan Bagian (Rongga Udara) berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap daya simpan telur asin dan hasil Pengaruh Perlakuan terhadap Lama Simpan (Warna Yolk) juga berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap daya simpan telur asin.

Kata Kunci: *Telur asin, daya simpan, ekstrak teh, konsentrasi*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : St. Hajar
Nim : 60700112085
Major : Ilmu Peternakan
Title Of Research : “Effect of Addition of Tea Extraction (*Camellia sinensis*)
Concretion on Salted Egg Saving ”

This study aims to determine the effect of the concentration of tea extract (*Camellia sinensis*) on the salinity of salted eggs. The method used is the experimental method using a completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 replications. Each replication consisted of 5 eggs as for the study design based on tea extract (*Camellia sinensis*) used, namely P0 = 0%, P1 = 20%, P2 = 30%, P3 = 40%. The results of the treatment effect on the shelf life of parts (air cavity) had a significant effect ($<0,5$) on the salinity of salted eggs and as a result of the treatment effect on shelf life (yolk color) also had a significant effect ($<0,05$) on the salinity o salted eggs.

Keywords: Salted eggs, storability, extract, concentration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur utuh sekalipun dapat mengalami kerusakan, baik kerusakan fisik maupun kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. Mikroba dapat masuk ke dalam telur melalui pori-pori yang terdapat pada kulit telur, baik melalui air, udara, maupun kotoran ayam (Mahendradratta, 2007).

Mikroba perusak yang dapat mendekomposisi bahan pangan ini antara lain *Pseudomonas*, *Aloaligenes*, *Escherichia*, *Salmonella* (Rachmawan, 2001). *Pseudomonas* dapat menyebabkan *green rot*, yaitu kerusakan telur yang ditandai dengan isi telur menjadi encer, kadang-kadang dijumpai warna kehijauan, kuning telur tertutup oleh lapisan berwarna merah jambu keputih-putihan, putih telur kadang-kadang menjadi hitam, serta telur berbau busuk dan rasanya agak asam. Bakteri ini juga menyebabkan kerusakan telur yang disebut *red rot* yang ditandai dengan timbulnya warna merah pada kuning telur, putih telur menjadi encer dan berwarna keabu-abuan mendekati merah. *Aloaligenes* dan *Escherichia* menyebabkan *black rot*, yaitu telur menjadi sangat busuk, isinya berwarna coklat kehijauan, encer dan berair, serta kuning telur berwarna hitam (Rachmawan 2001).

Kontaminasi *Salmonella* di dalam telur, terutama oleh *Salmonella pullorum*, dapat dimulai dari ovarium, dimana bakteri ini masuk ke dalam ovum atau

kuning telur pada waktu ovulasi (Hartoko, 2009). Kontaminasi *Salmonella* yang lebih sering terjadi pada telur adalah penetrasi dari kotoran unggas melalui kulit telur ketika proses bertelur. Jika telur kemudian tidak disimpan pada suhu rendah, bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang biak di dalam membran kulit, dan akan mengkontaminasi isi telur sewaktu telur dipecahkan untuk diolah. Endotoksin yang merupakan bagian lipopolisakarida yang terdapat pada dinding sel bakteri tersebut diduga merupakan penyebab dari timbulnya gejala demam pada penderita salmonellosis dan demam tifus. Oleh sebab itu usaha pengawetan sangat penting untuk mempertahankan kualitas telur.

Pengawetan merupakan salah satu cara untuk mencegah penurunan kualitas telur. Beberapa contoh pengawetan yang dapat dilakukan diantaranya dengan perendaman dengan menggunakan *water glass* (Tediva, 2008). Selain dengan menggunakan bahan kimia, perendaman dapat menggunakan bahan alami yaitu perendaman dengan menggunakan ekstrak teh. Larutan teh dapat memperpanjang masa simpan dari telur karena adanya kandungan tanin. Teh memiliki kandungan tanin yang merupakan senyawa terpenting dalam daun teh karena dapat menentukan kualitas daun teh (Suardana, 2009).

Larutan tanin dan bahan nabati dapat menyamak kulit telur, sehingga dapat mengurangi penguapan CO₂ dan air pada telur (Sulistiono, 2010). Penyimpanan telur setelah peredaman dengan larutan teh (*Camellia sinensis*) selama beberapa hari diharapkan bisa mempengaruhi kualitas fisik telur itik, sehingga didapatkan telur yang tidak mudah rusak serta umur simpan telur yang lebih lama. Meningkatnya daya simpan telur berkaitan dengan sifat tanin dalam teh yang

mampu berikatan dengan protein dalam membran sel (Suardana, 2009). Kualitas telur dapat dinilai berdasarkan indeks kuning telur, indeks putih telur, rongga udara, warna kuning telur, dan berat telur (Haryan, 2015).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak teh terhadap daya simpan telur asin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) terhadap daya simpan telur asin.

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) terhadap daya simpan telur asin.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) terhadap daya simpan telur asin.

E. Hipotesis

Penambahan konsentrasi ekstrak teh akan mempengaruhi daya simpan telur asin.

F. Definisi Operasional

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu benda.

2. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran dibagi dengan volume total campuran tersebut. Konsentrasi ekstrak teh yang digunakan adalah 0 %, 20% , 30% dan 40%
3. Ekstrak teh adalah kandungan quertin, epigallocatechin gallate, dan poliphenol yang diduga mempunyai efek antibakteri sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Dan jenis teh yang digunakan adalah teh cap gunung.
4. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Telur yang diasinkan adalah telur itik yang berumur kurang dari 1 minggu. Metode pengasinan menggunakan metode pemeraman selama 10 hari (Sahria, 2017).

G. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Nuha (2011). *Pengaruh lama penyimpanan setelah perendaman dalam larutan teh hitam (Camellia sinensis) terhadap kualitas fisik dan organoleptik telur itik*. Rancangan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lama penyimpanan 0, 5, 10, 15 hari, menggunakan lima ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan 0, 5, 10, 15 hari pada telur itik setelah direndam dalam larutan teh hitam (*Camellia sinensis*) memberikan pengaruh beda yang sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap indeks albumin, indeks yolk, penurunan berat telur, pH albumen, pH yolk dan kesukaan bau dan rasa tetapi memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap nilai HU (*Haugh Unit*), dan kesukaan tekstur. Lama penyimpanan setelah perendaman dalam larutan teh hitam (*Camellia sinensis*) mampu menjaga kualitas fisik hingga penyimpanan hari ke 15 dan organoleptik dari tingkat kesukaan bau pada hari ke 10 sudah berkurang tingkat

kesukaanya tetapi pada rasa hari ke 5. Pada tingkat kesukaan tekstur tidak mempengaruhi tingkat kesukaan sampai hari ke 15.

Zulaekah dan Widiyaningsih (2005). *Pengaruh konsentrasi ekstrak daun teh pada pembuatan telur asin rebus terhadap jumlah bakteri dan daya terimanya*. Penggunaan ekstrak daun teh akan memperkecil kerugian dan dapat meningkatkan cita rasa telur asin. Alasan tersebut yang mendasari perlunya dilakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi ekstrak daun teh pada pembuatan telur asin rebus terhadap jumlah bakteri dan daya terimanya. Penghitungan jumlah bakteri dilakukan dengan uji total bakteri metode *Total Plate Count* (TPC) sedangkan penilaian daya terima menggunakan uji organoleptik metode *hedonik* meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur telur asin rebus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis *of varians* terhadap total bakteri menunjukkan ada pengaruh nyata konsentrasi ekstrak daun teh terhadap jumlah total bakteri pada telur asin rebus, sedangkan hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa telur asin rebus yang paling disukai adalah telur asin rebus yang pembuatannya menggunakan perendaman ekstrak daun teh dengan konsentrasi 3%.

Yulianto (2011). *Pengaruh penambahan ekstrak teh hijau, ekstrak daun jambu biji, dan ekstrak daun salam pada pembuatan telur asin rebus terhadap total bakteri selama penyimpanan*. Hasil total bakteri dianalisis secara deskriptif dan hasil analisis karakteristik sensoris dianalisis dengan SPSS versi 14 for window. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak teh hijau, ekstrak daun biji, dan ekstrak daun salam mempunyai antibakteri yang berbeda pada telur asin.

Estrak yang paling baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah ekstrak yang paling baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah ekstrak daun jambu biji. Total bakteri pada hari ke 20 pada telur asin kontrol sebanyak $3,4 \times 10^9$ cfu/g, pada telur asin penambahan ekstrak teh hijau sebanyak $2,8 \times 10^9$ cfu/g, pada penambahan ekstrak daun jambu biji sebanyak $2,4 \times 10^7$ dan pada penambahan ekstrak daun salam sebanyak $2,8 \times 10^8$ cfu/g. Hasil sensoris menunjukkan bahwa ekstrak teh hijau, ekstrak daun jambu biji dan ekstrak daun salam mempengaruhi karakteristik sensori telur asin. Nilai kesukaan telur asin kontrol sebesar 4,03; telur asin dengan penambahan ekstrak teh hijau sebesar 3,10; telur asin dengan penambahan ekstrak daun biji sebesar 3,20; dan nilai kesukaan telur asin dengan penambahan ekstrak daun salam sebesar 3,10.

Kadir (2013), *Pengaruh Kombinasi Konsentrasi Daun Teh (Camelia Sinensis) dengan Asap Cair (Liquid Smoke) Dan Lama Pengasinan Terhadap Kualitas Telur Asin*. Rataan nilai HU yang dihasilkan dengan pemberian kombinasi konsentrasi daun teh (*Camellia sinensis*) dengan asap cair (Liquid smoke) (Tabel 1) berturut-turut dihasilkan pada penggunaan kombinasi DT 0% dan AC 0% = (53,19), DT 10% dan AC 0% = (53,97), DT 0% dan AC 10% = (49,22), DT 20% dan AC 0% = (54,74) serta DT 0% dan AC 20% = (55,00)

Analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi konsentrasi daun teh (*Camellia sinensis*) dengan asap cair (*Liquid smoke*) tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase nilai HU. Hal ini disebabkan karena kandungan ovomucin yang terdapat pada putih telur tidak memberikan respon terhadap nilai HU, di mana nilai HU yang dihasilkan kurang lebih sama yaitu

berada pada kisaran 49,22 hingga 55,00. Nilai HU tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara kombinasi konsentrasi daun teh dengan asap cair 0% dan 10%, selanjutnya nilai HU dengan konsentrasi 20% juga tidak berbeda nyata dibandingkan dengan 10%.

Hutabarat (2014), *Pengaruh Penggunaan Daun Teh Sebagai Bahan Pengawet Telur Konsumsi*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa telur tanpa bahan pengawet sangat nyata ($P < 0,05$) mengakibatkan perbedaan pH kuning telur yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengawetan telur daun teh segar ataupun daun teh olahan yaitu 10,38 (P1) Vs 9,57 (P2) dan 9,59 (P3), sementara itu tidak adanya perbedaan nyata ($P < 0,05$) bahan pengawet menggunakan daun teh segar maupun daun teh olahan terhadap pH kuning telur yaitu 9,57 (P2) Vs 9,59 (P3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahan pengawet menutupi pori-pori kerabang telur sehingga penguapan air dari isi telur dibatasi. Demikian pula bakteri pembusuk dapat dikurangi dan hilangkan CO₂ yang pada akhirnya mengurangi kerusakan kuning telur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Al-Quran terhadap Proses Pembentukan Telur

1. Tinjauan Al-Quran tentang Proses Penciptaan Telur

Ternak ayam merupakan ternak penghasil telur. Telur merupakan produk asal hewan yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap. Dari telur tertetleslah ciptaan baru yang sepadam, secara biologis sebelum diteteteskan telur berada didalam sistem reproduksi selama 24 jam dalam sehari. Dalam penciptaan telur dijelaskan dalam Q S Ali-Imran/3: 27 sebagai berikut:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”.

Maksud dari ayat ini yaitu Allah menggilirkan peredaran waktu siang dan malam selama 24 jam dimana 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam, dalam edaran waktu tersebut segala hal dapat terjadi dari siang ke malam dari malam ke siang, seperti peristiwa pembentukan telur didalam sistem reproduksi ayam yang normalnya telur ayam terbentuk kurang lebih 24-26 jam. Perjalanan yolk dari ovarium menuju oviduct yang selanjutnya akan melewati setiap bagian-bagian

dari aoviduct sehingga waktu penelusuran dapat berlangsung normal kurang lebih 24-26 jam (R.Haryam, 2015).

Semua itu dapat terjadi sebagai bukti kekuasaan Allah supaya kita bersyukur dan tidak ada yang tidak mungkin selama Allah menghendaknya. Dalam tafsir “*Tafsir Al-Azhar*” Allah mendatangkan sesuatu yang memiliki sifat hidup dari sesuatu yang tidak memilikinya dan mendatangkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Yang berawal dari sesuatu yang hidup (ayam) dan kemudian mendatangkan sesuatu yang mati (telur). Demikian siklus kehidupan yang terjadi pada ayam yang merupakan rahasia keajaiban alam dan rahasia kehidupan. Begitulah sang pencipta yang maha kuasa mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup (Q.S Muhammad, 2002).

2. Tinjauan Al-Quran tentang Telur Asin

Kebutuhan gizi masyarakat, dapat dipenuhi melalui proses pengembangan pengendalian mutu dan keamanan pangan, mengenai produk pengelolaan telur harus memperhatikan unsur nutrisi yang ada di dalam telur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses pengawetan dengan pengasinan. Hal ini dijelaskan dalam Q S al-Waqi’ah/56: 70 sebagai berikut :

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Sekiranya kami kehendaki, niscaya Kami menjadikan asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur?”(Kementrian Agama RI, 2012).

Dalam “*Tafsir Al Azhar*”, perlu untuk memikirkan yang sedemikian, untuk memperdalam keyakinan betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia,

sebagaimana ujung ayat Allah swt berfirman “Alangkah baiknya kamu berterima kasih” karena Allah swt dalam beberapa menit saja dapat menciptakan gumpalan awan, air yang asin menjadi air tawar, untuk ditumpahkan dalam daerah yang sangat memerlukannya dan jarang sekali Allah menjadikan air yang tawar menjadi asin, karena kasih sayang Allah swt kepada manusia, oleh sebab itu dianjurkan kepada kita untuk bersyukur (Hamka, 1982).

Ayat tersebut menjelaskan betapa besar kebesaran Allah, yang telah menjadikan air hujan itu menjadi asi, padahal asal air hujan itu datangnya dari laut, tapi tidak asin. Karena rahmat Allah kepada kita, akan member kita air itu untuk kehidupan kita. Kalau Allah jadikan air itu asin tentulah pohon-pohon semua akan mati, dan kitapun akan mati. Dan air laut yang asin itupun kemudian diolah oleh manusia sebagai sumber kehidupan dibumi. Dari hasil olahan air laut (garam) tersebut itu kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kehidupan.

Ayat tersebut memberikan perumpamaan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, apabila kehendaki oleh Allah swt. Seperti halnya dengan telur pada mulanya tidak memiliki cita rasa yang khas, akan tetapi diolah dengan garam yang mempunyai kadar keasinan yang sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada dalam telur berupa protein, asam amino maupun unsure nutrisi lainnya. Pengawetan telur dengan pengasinan akan menghasilkan telur asin bercita rasa khas dan umumnya disukai. Telur yang diasinkan bersifat stabil, dapt disimpan tanpa mengalami proses perusakan dengan pengasinan rasa rasa amis telur akan berkurang dan tidak berbau busuk.

B. Struktur Telur Itik

Telur merupakan bahan pangan yang sempurna karena mengandung zat gizi yang lengkap bagi pertumbuhan makhluk hidup. Protein telur mempunyai mutu yang tinggi karena memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap sehingga dijadikan patokan untuk menentukan mutu protein dari bahan pangan yang lain. Telur dikelilingi oleh kulit setebal 0,2-0,4 mm yang berkapur dan berpori-pori (Suardana dan Swacita, 2009).

Sumbangan telur terbesar adalah dari jenis ayam petelur dengan total 69,57%. Telur ayam buras dan telur itik menyumbang masing-masing 12,16% dan 18,26%, tetapi dalam kenyataannya telur-telur busuk sebelum dimanfaatkan atau dikonsumsi karena kurangnya masa simpan dari telur-telur tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pembusukan telur yaitu dengan membuat telur asin. Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebagian besar telur asin dibuat dari telur bebek. Hal ini disebabkan telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur lebih lama. Semakin lama waktu pengasinan akan semakin tahan lama masa simpan telur.

Telur itik memiliki bau amis yang tajam sehingga penggunaan telur itik dalam bahan makanan tidak seluas telur ayam. Selain baunya yang amis, telur itik juga memiliki pori-pori kulit yang lebih besar dan mengandung nilai nutrisi lebih tinggi (Gsianturi, 2003).

Telur itik yang diolah melalui proses pengasinan dapat meningkatkan mutu gizinya. Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, kadar lemak pada bagian kuning telur itik adalah 35%, sedangkan kadar lemak kuning telur ayam adalah 31,9%. Kuning telur memiliki kadar kolesterol yang tergolong cukup tinggi yaitu 1075 mg/ 100gr kuning telur, menyebabkan konsumsi telur secara berlebihan berdampak negatif untuk kesehatan. Terjadinya peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh berperan dalam perkembangan radikal bebas yang melebihi kapasitas antioksidan dalam tubuh yang akan meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, penyakit jantung dan lainnya. Seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif sehingga konsumsi makanan dengan tinggi antioksidan dan rendah kolesterol menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.

Telur unggas mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan antioksidan. Pada umumnya masyarakat mengkonsumsi dengan mengolahnya menjadi telur dadar, telur rebus dan sebagai bahan pencampur dalam pembuatan kue, telur asin dan lain-lain. Telur memiliki sifat mudah rusak sehingga daya simpan tidak lama. Kandungan gizi telur itik segar per 100 gr yaitu mengandung energi sebesar 189 kal, protein 13,1 gr, lemak 14,3 gr, karbohidrat 0,8 gr, kalsium 56 mg sedangkan kandungan gizi telur itik asin yaitu energi sebesar 195 kal, protein 13,6 gr, lemak 13,6 kal, karbohidrat 1,4 gr dan kalsium sebesar 120 mg.^{4,5} Telur yang digunakan dalam pembuatan telur asin adalah telur itik, karena memiliki pori-pori kulit yang lebih lebar dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Dalam proses pembuatan telur asin, garam berfungsi sebagai

pencipta aroma asin dan bahan pengawet karena dapat mengurangi kelarutan oksigen, menghambat kerja enzim proteolitik, dan menyerap air dari dalam telur sehingga kandungan zat gizi tidak banyak rusak atau hilang.

Telur asin dapat dibuat dengan cara merendam menggunakan media garam. Garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet karena garam mampu menyerap air dari dalam telur. Garam akan masuk ke dalam telur melalui pori-pori kulit telur menuju ke putih telur, lalu ke kuning telur. Garam akan menarik air yang dikandung telur. Garam juga terdapat ion klor yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dalam telur, sehingga menyebabkan telur menjadi awet karena bakteri yang terkandung dalam telur mati. Telur bebek dapat dibuat telur asin dengan media yang bermacam-macam antara lain serbuk batu bata merah, abu pelepah kelapa dan lumpur sawah. Media yang sering digunakan untuk membuat telur asin yaitu serbuk batu bata merah dan abu pelepah kelapa, lumpur sawah kurang dimanfaatkan dalam pembuatan telur asin. Konsumsi telur pada umumnya dilakukan segar atau olahan. Di negara-negara Asia sebanyak 30% dari konsumsi telur tersebut merupakan hasil dari olahan telur (Pingle, 2009).

Produk olahan telur merupakan salah satu hasil olahan pangan termurah yang kualitas telur konsumsi dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah warna kuning telur dan kandungan gizi di dalam telur (seperti kadar lemak dan kadar kolesterol kuning telur). Kadar lemak dan kadar kolesterol kuning telur perlu diperhatikan, karena secara umum kadar lemak dan kadar kolesterol kuning telur dianggap cukup tinggi. Sehingga ada larangan atau batasan bagi penderita

cholesterol tinggi untuk mengkonsumsi telur, karena makanan dengan kadar lemak dan kolesterol tinggi dapat menimbulkan penyakit seperti jantung. Menurut uraian dari Oetoyo dari Fakultas kedokteran Universitas Indonesia lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi (Sudaryani, 2003).

Bentuk telur itik yang normal sama dengan telur ayam yang oval dengan salah satu ujung meruncing, sedang ujung yang lain tumpul. Bentuk seperti ini berguna untuk meningkatkan daya tahan kulit telur terhadap tekanan mekanis serta mengurangi kemungkinan tergelincir pada bidang datar (Medved, 1986).

Telur salah satu produk unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Telur yang banyak dikonsumsi adalah telur bebek, telur ayam dan telur puyuh. Di Indonesia jumlah telur yang tersedia sangat banyak yaitu sebesar 1,378 ton.

Telur yang sering dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam dan telur itik yang digunakan dengan media abu dapur, batu-bata, tanah liat dan lain sebagainya. Namun karena baunya yang amis, telur itik jarang digunakan dibandingkan telur ayam. Jarang sekali orang suka makan telur itik goreng karena pertimbangan bau amis. Sebagai usaha menghilangkan bau amis tersebut telur itik diolah menjadi telur asin. Hal ini memungkinkan karena telur itik memiliki pori-pori kulit telur yang lebih besar, tidak seperti telur ayam. Pori-pori ini menguntungkan saat proses pengasinan karena garam dapat berpenetrasi ke dalam telur itik. Telur itik yang digunakan sebaiknya yang baru ditelurkan (Romanoff, 1963).

Menurut *Kim Woo Jae* (2007) Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak, Kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh, secara normal diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang tepat, tetapi jumlah kolesterol tersebut dapat meningkat jumlahnya karena makanan eksterm yang berasal dari lemak hewani, telur dan junkfood. Kolesterol yang berlebih dalam tubuh akan tertimbun dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan penyempitan pembuluh darah dan bisa menyebabkan penyakit jantung.



Gambar 1. Struktur Telur (Romanoff, 1963)

Keterangan gambar yaitu :

- Cangkang Telur berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar-masuknya udara.
- Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara.
- Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio.
- Keping germinal (zigot/sel embrio) merupakan calon individu baru.

- Kuning telur (yolk) adalah cadangan makanan bagi embrio.
- Putih telur (albumin) berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air.
- Kalaza (tali kuning telur) berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur.

Romanoff (1963), menjelaskan bahwa sebaiknya kuning telur atau sering disebut yolk merupakan bagian yang dibentuk dari folikel dalam ovarium. Proses pembentukan ovum dinamakan *vitelogeni (vitelogenesis)*, yang merupakan sintesis asam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen, kemudian oleh darah diakumulasikan di ovarium sebagai folikel atau ovum yang dinamakan yolk atau kuning telur (Romanoff, 1963).

Dilihat dari struktur susunan telur dapat diketahui bahwa kuning telur berada ditengah-tengah telur (inti dari telur). proses pembentukan sebutir telur, proses awalnya adalah pematangan folikel (ovulasi) yang ada didalam ovarium. Setelah ovulasi kuning telur akan terbentuk. Kuning telur sendiri seperti yang telah disebutkan tadi di bentuk oleh folikel yang ada di ovarium, Setelah siap (matang) kuning telur akan jatuh, dan ditangkap oleh infundibulum untuk memulai tahap selanjutnya. Di infundibulum akan disekresikan protein yg membungkus membrane vitelin. Selanjutnya menuju ke *magnum*, pada bagian ini dihasilkan putih telur. Dari magnum akan menuju ke isthmus, bagian ini mensekresikan membrane atau selaput telur. Selanjutnya akan dibentuk kerabang telur, pembentukan kerabang berlangsung di uterus. Telur yang telah lengkap dengan kerabang akan menuju ke vagina, pada vagina dihasilkan lapisan kutikula yang merupakan selaput tipis untuk membungkus kerabang telur. Tahap akhir,

telur yang telah utuh akan menuju ke kloaka, dan siap untuk dikeluarkan. Ditinjau dari kandungan gizinya, kuning telur memiliki kadar zat gizi yang lebih baik daripada putih telur. Semua jenis protein, kolesterol, lemak, vitamin A yang terkandung di kuning telur tidak dimiliki oleh putih telur.

Tabel 1. Perbedaan Kadar Gizi Putih dan Kuning telur

No	Komposisi (%)	Telur + Kulit	Telur tanpa kulit	Putih telur	Kuning telur
1	Air	65,6	73,6	87,9	48,7
2	Protein	12,1	12,8	10,6	16,6
3	Lemak	10,5	11,8	-	32,6
4	Karbohidrat	0,9	1,0	0,9	1,05
5	Abu	10,9	0,8	0,6	1,05

Dilihat dari perbedaan kadar gizi dari kuning dan putih telur tersebut yang sangat berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa, cepatnya kerusakan yang terjadi pada kuning telur dalam hal ini busuk (oleh mikroba), disebabkan karena kadar zat gizi yang lebih tinggi dalam kuning telur dibandingkan dengan putih telur. Tingginya kadar gizi didalam kuning telur tersebut dapat menjadi zat makanan yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba, semakin tinggi kadar zat gizi dalam suatu bahan makanan maka kecepatan kerusakan (pembusukan) terutama oleh mikroba akan semakin cepat pula (Rahayu, 1998).

C. Telur Asin dan Metode Pengasinan

Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk mengawetkan telur segar (memperpanjang masa simpan), membuang bau amis telur (terutama telur bebek) serta menciptakan rasa yang khas. Ada banyak macam pengasinan

telur, secara tradisional masyarakat kita telah mengawetkan telur dengan cara pengasinan menggunakan adonan garam, yaitu garam yang dicampur dengan komponen-komponen lainnya seperti abu gosok, batu bata merah, kapur, tanah liat dan sebagainya.

Proses pengasinan telur mulai dari garam yang masuk ke dalam cangkang telur menembus masuk kedalam putih telur, apabila kadar garam yang digunakan sesuai maka garam akan masuk sampai pada bagian pekat yaitu kuning telur garam akan melepas ikatan lipoprotein yaitu kompleks antara lemak dan protein, sehingga lemaknya terpisah dari protein. Lemak yang terpisah dari protein pada granul akan menyebabkan protein-protein tersebut saling menyatu, sehingga padatan grand polihedral semakin membesar dan menimbulkan tekstur masir dan asin, apabila telur telah berstruktur masir, itu menandakan bahwa kadar air dalam telur telah berkurang dan digantikan oleh kadar garam yang menjadikan telur tidak berbau amis dan merubah warna kuning telur menjadi orange kekuningan Chi dan Tseng (1998).

Pengasinan telur juga dapat dilakukan dengan menggunakan media cair yaitu dengan larutan garam jenuh (Astawan, 1988). Menurut Dahro (1996), besarnya kerusakan iodium tergantung pada tipe pengolahan dan jenis pemasakan, waktu pengolahan dan variasi bumbu. Pada penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana pengaruh penambahan iodium pada garam terhadap kadar KIOI dan sifat organoleptik telur asin serta pengaruh penyimpanan telur asin terhadap kadar KIOI dan sifat organoleptik telur asin.

Menurut Harianto A (2016), bahwa prinsip pengawetan telur adalah untuk

1. Mencegah masuknya bakteri pembusuk ke dalam telur;
2. Mencegah keluarnya air dari dalam telur.

Beberapa proses pengawetan telur utuh yang diawetkan bersama kulitnya antara lain :

- a. proses pendinginan;
- b. proses pembungkusan kering;
- c. proses pelapisan dengan minyak;
- d. proses pencelupan dalam berbagai cairan.

Proses pengasinan telur yaitu telur yang direndam dalam media garam akan mengalami osmosis yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah (*Hipotonik*) ke konsentrasi lebih tinggi (*Hipertonik*) sehingga telur akan menjadi asin. Berat telur akan bertambah dan volume air dalam telur akan berkurang, kuning telur akan berubah menjadi keras karena molekul air garam masuk ke dalam telur. Semakin lama garam yang terdapat di dalam kuning telur akan semakin menumpuk sehingga kuning telur akan mengeras karena kelebihan mineral garam (Wulandari, 1999).

Untuk menjaga kesegaran dan mutu isi telur, diperlukan teknik penanganan yang tepat, agar nilai gizi telur tetap baik serta tidak berubah rasa, bau, warna, dan isinya. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar yang diawetkan dengan cara diasinkan (diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan perombak). Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain. Telur asin baik

dikonsumsi dalam waktu satu bulan. (Harianto A, 2016). Keuntungan telur asin yaitu:

1. Telur yang diasinkan bersifat stabil, dapat disimpan tanpa mengalami proses perusakan.
2. Dengan pengasinan rasa amis telur akan berkurang tidak berbau busuk, dan rasanya enak.

Catatan:

- a. Asin tidaknya telur asin dan keawetannya, sangat tergantung pada kadar garam yang diberikan. Semakin tinggi kadar garam, akan semakin awet telur yang diasinkan, tetapi rasanya akan semakin asin.
- b. Telur asin matang tahan selama 2~3 minggu, sedangkan pembubuhan larutan teh dalam adonan pengasin dapat meningkatkan ketahanan telur asin sampai 6 minggu.
- c. Penggunaan ekstrak daun teh (*Camellia sinensis*) bertujuan agar zat tanin yang terkandung dalam daun teh dapat menutupi pori-pori kulit telur serta memberikan warna coklat muda yang menarik dan bau telur asin yang dihasilkan lebih disukai konsumen. Konsentrasi 1% pada pembuatan larutan teh yaitu dengan Larutan daun teh 50 gram teh per 3 liter air serta Air bersih secukupnya.

Pembuatan telur asin memiliki beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Menurut (Sahria, 2017) Pembuatan telur asin dengan metode pemeraman akan menghasilkan telur asin yang lebih bagus mutunya, warna lebih menarik serta

memiliki cita rasa yang lebih enak, ini bisa disebabkan karna bahan yang digunakan seperti penambahan abu gosok dapat memberikan warna menarik dan dapat mempengaruhi daya masir dari suatu telur asin. Cara pembuatannya yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan yaitu Air 5 liter, Garam 3,6 kg, Batu bata 3,6 kg, Abu gosok 2,16 kg, Asap cair 350 ml
 - b. Mencuci telur kemudian mengamplasnya
 - c. Menimbang masing-masing bahan
 - d. Memasukkan abu gosok ke dalam baskom kemudian menambahkan garam lalu mengomogenkannya.
 - e. Menambahkan batu bata dalam adonan kemudian menghomogenkannya
 - f. Kemudian menambahkan asap cair dan air kemudian menghomogenkan semua bahan.
 - g. Setelah semua bahan homogen selanjutnya telur dapat dibalut dengan adonan tersebut dan disimpan selama 7 dan 10 hari.
2. Menurut (Sahria, 2017) Pembuatan telur asin dengan metode perendaman memiliki kelebihan yaitu prosesnya lebih singkat, sangat mudah dan praktis dilakukan serta bahan yang digunakan mudah didapat. Cara pembuatannya yaitu:
- a. Menyiapkan bahan yaitu Air 7,200 liter/ml, Asap cair 350 ml, Garam 3,6 kg.
 - b. Mencuci telur kemudian mengamplasnya
 - c. Menimbang semua bahan yang akan digunakan

- d. Memanaskan air
 - e. Melarutkan garam pada air tersebut kemudian menunggu sampai air dan garam larut dan menunggu sampai dingin.
 - f. Menambahkan asap cair kemudian menghomogenkan larutan tersebut.
 - g. Setelah larutan tercampur rata selanjutnya menuang kedalam tempat perendaman.
 - h. Menata telur pada tempat peredaman satu persatu, kemudian menutupnya kemudian direndam selama 7 dan 10 hari.
3. Menurut Warisno (2012), Pembuatan telur asin dengan metode injeksi (suntik) memiliki keunggulan yaitu rasa dari ekstrak buah yang disuntikkan masuk kedalam telur akan lebih terasa sehingga konsumen lebih meminati telur asin karena memiliki berbagai macam rasa. Cara pembuatannya yaitu:
- a. Penyiapan alat dan bahan yang diperlukan, Telur bebek yang bermutu baik 30 butir. Abu gosok atau bubuk batu bata merah 1 ½ lite, Garam dapur ½ kg. Larutan daun teh (bila perlu) 50 gram teh / 3 liter ai. Air bersih secukupnya. Ekstrak jahe. Essence. Label, Plastic kemas
 - b. Memeriksa telur yang akan diasinkan (retak/tidak)
 - c. Membersihkan telur yang akan diasinkan
 - d. Menghomogenkan semua bahan
 - e. Membungkus telur dengan adonan yang telah dibuat kemudian disimpan
 - f. Membongkar telur yang telah diasinkan
 - g. Penyuntikan ekstrak rasa ke dalam telur
 - h. Penutupan bekas lubang jarum suntik,

- i. Pematangan telur dengan dikukus 60 menit,
4. Menurut Ilham dan Muklisiin (2010) Pembuatan adonan pasta atau pengasin menghasilkan telur asin yang lebih berkualitas karena bahan yang digunakan seperti batu bata dapat membantu proses penyerapan garam sehingga rasa asin telur tersebut lebih enak. Cara pembuatannya yaitu:
 - a. Bahan yang digunakan pada pembuatan pasta pengasin ini adalah bubuk batu bata (22,5 kg) yang dicampur dengan garam (4,5 kg) dan dicampur dengan airsecukupnya, kemudian diaduk sampai tercampur sampai terbentuk adonan pasta.
 - b. Pembuatan ekstrak teh hijau Bahan yang digunakan adalah teh hijau yang diekstrak dengan air panas dengan konsentrasi 3% (300gram teh/10 liter air).
 - c. Pembuatan telur asin Telur dibalut atau dibungkus dengan adonan pasta pengasin secara merata pada permukaan telur kira-kira 1-1,5 cm, kemudian disimpan atau dilakukan pemeraman dalam ember plastik selama 14 hari. Setelah itu telur dibersihkan dan direndam dalam ekstrak teh selama 0 hari, 3 hari dan 5 hari. Kemudian direbus selama 15 menit dan disimpan dalam inkubator dengan suhu 300C, 400C dan 500C.

Penambahan garam dalam jumlah tertentu pada suatu bahan pangan dapat mengawetkan bahan pangan tersebut. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisis sel mikroba (sel mengalami dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel) dan sel menjadi peka terhadap CO₂. Penambahan

garam juga akan mengurangi oksigen terlarut, menghambat kerja enzim, dan menurunkan aktivitas air (a_w atau kandungan air bebas dalam bahan pangan).

Pengasinan merupakan proses penetrasi garam ke dalam bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam mengion menjadi Na^+ dan Cl^- . Laju difusi tergantung perbedaan tekanan osmosis antara isi telur dan kandungan garam dalam adonan. Makin besar perbedaannya, makin cepat laju difusi yang terjadi. Laju difusi mendapat hambatan dari lapisan kapur pada kulit dan lemak pada kuning telur.

Ukuran kristal garam berpengaruh pada proses pengasinan telur. Kristal garam yang besar (lebih dari 6 mm³) menghasilkan laju difusi yang lambat, sedangkan kristal yang kecil (kurang dari 1 mm³) laju difusi akan terlalu cepat yang dapat menyebabkan pengerasan lapisan protein terluar dari telur sehingga menghambat difusi garam ke bagian telur yang lebih dalam.

Pengasinan yang biasa dilakukan secara tradisional menghasilkan telur yang bercita rasa khas dan disukai. Meskipun demikian terjadi kehilangan berat telur yang relatif besar. Hal ini disebabkan adanya difusi air serta penguapan uap air dan gas-gas keluar dari dalam telur. Telur yang telah diasin mengalami penurunan berat sekitar 2 - 8,4 persen.

Penurunan berat tersebut dapat dikurangi dengan cara menyamak kulit telur setelah dilakukan pengasinan. Penyamakan dapat dilakukan dengan bahan-bahan nabati yang mengandung tanin, misalnya ekstrak daun akasia, ekstrak daun jambu biji dan ekstrak teh. Ekstrak daun teh menghasilkan telur asin dengan mutu dan cita rasa yang baik.

Pengasinan telur dikatakan berhasil dengan baik, jika telur asin yang dihasilkan bersifat :

1. Stabil, dapat disimpan lama tanpa banyak mengalami perubahan.

Keawetan telur asin tergantung pada konsentrasi garam yang digunakan dalam adonan. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin awet telur asin yang dihasilkan. Selain itu, waktu telur dibungkus dengan adonan juga berpengaruh terhadap keawetan. Semakin lama dibungkus adonan, semakin baik keawetannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan intensitas rasa asin yang dihasilkan. Dengan kata lain rasa asin yang diperoleh juga harus diatur.

2. Aroma dan rasa telur asin terasa dengan nyata (tidak tercium bau amoniak atau bau yang kurang sedap).

Telur bebek sangat cocok untuk diasinkan, karena rasa amis dari telur akan berkurang dengan pengasinan. Selain itu, pori-pori telur bebek lebih banyak sehingga garam mudah berpenetrasi (masuk ke dalam telur). Pembuatan telur asin menggunakan adonan garam dengan tanah liat atau abu gosok dengan perbandingan 1:1,5 menghasilkan telur asin yang disukai.

3. Penampakan putih dan kuning telur yang baik

Telur dengan albumen yang putih dan kuning telur yang mampur dan berminyak dipinggirnya saja merupakan telur asin yang disukai. Jika adonan pembungkus telur kurang baik, kuning telur akan berwarna kebiruan. Kuning telur pada telur asin yang ber mutu tinggi terletak di tengah, dengan ukuran kantong udara yang kecil. Jika letaknya tidak di tengah, menandakan telur yang digunakan

mutunya kurang baik. Penggunaan teh pada proses pengasinan telur ternyata dapat mengurangi pergeseran kuning telur ke arah kulit.

D. Jenis Pengawetan

1. Perendaman dengan Larutan Garam

Penggaraman merupakan salah satu cara pengawetan yang sudah lama dilakukan orang. Garam dapat bertindak sebagai pengawet karena garam akan menarik air dari bahan sehingga mikroorganisme pembusuk tidak dapat berkembang biak karena menurunnya aktivitas air. Garam digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme dan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme pencemar seperti mikroorganisme proteolitik dan spora. Sifat-sifat antimikroorganisme dari garam yaitu garam memberi sejumlah pengaruh bila ditambahkan pada jaringan tumbuh-tumbuhan yang segar. Garam akan berperan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme pencemar tertentu.

Mikroorganisme pembusuk atau proteolitik dan berbentuk spora adalah yang paling mudah terpengaruh walaupun dengan kadar garam yang rendah sekalipun (yaitu sampai 6%). Mikroorganisme patogen termasuk *clostridium botulinum* kecuali *streptococcus aureus* dapat dihambat oleh konsentrasi garam sampai 10-12 %. Beberapa mikroorganisme terutama jenis *leuconostoc* dan *lactobacillus* dapat tumbuh dengan cepat dengan adanya garam. Garam juga mempengaruhi aktivitas air (a_w) dari bahan sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme seperti bakteri *halofilik* (bakteri yang tahan hidup pada konsentrasi garam yang tinggi) dapat tumbuh dalam

larutan garam yang hampir jenuh, tetapi membutuhkan waktu penyimpanan yang lama untuk tumbuh dan selanjutnya terjadi pembusukan (Rhya, 2017).

2. Jenis Pengawetan dengan Penyamak Nabati

Jenis bahan penyamak yang digunakan adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar, batang dan daun. Prinsipnya bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang mengandung tanin dapat digunakan. Contoh tumbuhan yang sering digunakan antara lain : mahoni, pisang, teh, akasia dan bakau. Tumbuhan yang mengandung tanin dicirikan oleh rasa yang sepat dan reaksi dengan besi seperti pisau menghasilkan warna ungu kehitaman (Sukarbowo dan Sudarjo, 1987).

E. Deskripsi Teh (Camellia sinensis)

Tanaman teh (*Camellia sinensis*) adalah salah satu tanaman perdu yang berdaun hijau (*evergreen shrub*) yang dapat tumbuh dengan tinggi 6 – 9 m.

Di perkebunan-perkebunan, tanaman teh dipertahankan dengan ketinggian hingga 1 m dengan pemangkasan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan daun agar diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak. Pada umumnya tanaman teh tumbuh di daerah yang beriklim tropis dengan ketinggian antara 200 s/d 2000 m dpl dengan suhu cuaca antara 14°C – 25°C (Syamsinan dan Suekarta, 1982).

Varietas tanaman teh yang banyak dikenal ialah varietas assamica yang berasal dari Assam dan varietas sinensis yang berasal dari Cina. Yang membedakan kedua varietas ini adalah varietas assamica daunnya agak besar

dengan ujung runcing, sedangkan varietas sinensis daunnya lebih kecil dan ujungnya tumpul.

Menurut Syamsinan dan Suekarta (1982), klasifikasi tanaman teh adalah sebagai berikut :

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Spermatophyte*

Sub divisi : *Angiospermae*

Class : *Dicotyledoneae*

Ordo : *Guttiferales*

Famili : *Tehaceae*

Genus : *Camellia*

Spesies : *Camellia sinensis*





Gambar 2. Daun Teh (*Camelia Sinensis*) (Syamsinan dan Suekarta, 1982).

Umumnya tanaman teh berakar dangkal, sangat peka terhadap keadaan fisik tanah sehingga cukup sulit untuk menembus lapisan tanah. Pertumbuhan akar ke arah lateral dan penyebarannya dibatasi oleh perdu yang ada di dekatnya. Perakaran utama berkembang pada lapisan tanah atas sedalam 0-25 cm, dimana tempat utama berakumulasinya unsur-unsur hara. Batang tanaman teh berdiri tegak, berkayu, bercabang-cabang, ujung ranting dan daun muda berbulu halus. Daun teh merupakan daun tunggal yang bertangkai pendek dan letaknya berseling. Tiap helaian daun kaku seperti kulit tipis, bentuknya elips memanjang, ujung, dan pangkal runcing. Bentuk tepi daun teh bergerigi halus, pertulangan menyirip dengan panjang daun 6-18 cm dan lebar adalah 2-6 cm. Bunga teh terletak di ketiak daun, tunggal atau beberapa bunga bergabung menjadi satu. Perkembangan bunga mengikuti fase pertumbuhan daun. Bunga teh termasuk ke dalam bunga sempurna dengan garis tengah 3-4 cm. Warna bunga putih cerah dengan kepala sari berwarna kuning dan baunya harum (Mahendradratta, 2007)

Teh sebagai bahan minuman dibuat dari pucuk muda daun teh yang telah mengalami proses pengolahan seperti pelayuan, oksidasi enzimatis, penggilingan dan pengeringan. Manfaat yang dihasilkan dari minuman teh adalah memberi rasa segar, dapat memulihkan kesehatan badan dan terbukti tidak menimbulkan dampak negatife (Muchtadi dan Sugiyono, 1992)

Khasiat yang dimiliki oleh minuman teh tersebut berasal dari kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam daun teh. Senyawa kimia yang terkandung dalam daun teh terdiri dari empat kelompok besar yaitu golongan fenol, bukan fenol, aromatis dan enzim. Keempat kelompok senyawa kimia tersebut berdsama-sama mendukung terjadinya sifat-sifat yang baik pada seduhan daun teh, apabila pengendaliannya selama pengolahan dapat dilakukan dengan tepat (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).

Selain vitamin, kandungan mineral juga terkandung di dalam teh. Sehingga manfaat teh sebagai minuman cukup besar. Berikut beberapa manfaat teh untuk kesehatan tubuh.

1. Menurunkan resiko penyakit jantung. Di dalam teh, terdapat *intake flavonoid* dimana merupakan zat yang mencegah seseorang terkena penyakit jantung dan sejenisnya yang berkaitan dengan jantung. Sistem kerja zat ini adalah melakukan pencegahan penyerapan kolesterol dan penumpukan pada pembuluh darah jantung. Sehingga pembuluh darah tidak tersumbat.
2. Menurunkan berat badan. Berat badan memang menjadi suatu masalah, apalagi bagi wanita yang cenderung memperhatikan penampilan. Teh mengandung zat dimana mampu meningkatkan adanya pembakaran energi serta protein dan

lemak yang mengakibatkan berat badan bisa turun. Terutama jika mengonsumsi teh hijau.

3. Mencegah penyakit berhubungan dengan tulang seperti osteoporosis, dimana tulang mengalami pengeroposan. Teh mengandung suatu zat, dimana zat tersebut mirip seperti esterogen yang membantu tulang tidak mengalami pengeroposan dengan cepat. Ini telah dibuktikan penelitian di Inggris.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari 2018 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Terpadu, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan antara lain baskom, ember, jangka sorong, kompor, sendok nasi, spiner, panci, toples, timbangan digital, dan timbangan manual.

Bahan yang digunakan yaitu telur itik sebanyak 60 butir berumur kurang dari 7 hari, ekstrak teh dengan konsentrasi berbeda yaitu 0, 16.3, 33.7 dan 49.8%. garam 450 gr, abu gosok 450 gr, batu bata 450 gr dan air 1,800 ml.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sintesis*) terhadap daya simpan telur asin.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini didesain dengan rancangan acak lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 5 butir telur, adapun rancangan penelitian berdasarkan ekstrak teh yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$P_0 = 0\%$$

$$P_2 = 30\%$$

$$P_1 = 20\%$$

$$P_3 = 40\%$$

E. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

Telur yang akan digunakan pada penelitian ini adalah telur yang berumur ± 7 hari yang diperoleh dari pasar Tradisional. Selanjutnya dilakukan pemilihan telur dengan memperhatikan ukuran, berat, kebersihan, dan keutuhan cangkang dengan tujuan agar telur yang digunakan memiliki kualitas yang baik.

Bahan lainnya seperti abu gosok, batu bata, dan garam diperoleh dari pasar tradisional yang ada dikota Makassar.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pembuatan Adonan

Pencampuran abu gosok dan batu bata dilakukan terlebih dahulu hingga homogen, kemudian ditambahkan garam ke dalam campuran abu gosok dan batu bata, selanjutnya diaduk hingga homogen. Air ditambahkan sedikit demi sedikit hingga adonan dapat melekat pada telur.

b. Tahap pembuatan telur asin

Telur yang sudah dicuci dan dicampur selanjutnya dibungkus dengan adonan yang sudah dibuat dengan ketebalan ± 5 cm, kemudian disimpan dalam wadah yang terbuka dengan tujuan untuk mempercepat osmosis garam ke dalam telur selanjutnya dilakukan penyimpanan dalam waktu ± 11 hari. Setelah 11 hari telur dibersihkan.


c. Pembuatan larutan teh Menurut Ilham dan Muklisin (2010):

1. Konsetrasi 16,3 % yaitu menimbang 189 gram teh, kemudian ditambah air yang sudah mendidih.
2. Konsetrasi 33,7 % yaitu menimbang 390.4 gram teh, kemudian ditambah 1 liter air mendidih.
3. Konsetrasi 49,8 % yaitu menimbang 576.6 gram teh, kemudian ditambah 1 liter air mendidih.

3. Tahap Pengamatan

Pada tahap ini mengamati telur dari segi warna, kekentalan, dan kedalaman rongga udara.

Diagram alir pembuatan telur asin



Gambar 3. Diagram alir pembuatan telur Asin.

F. Parameter yang diamati

1. Rongga Udara

Pengukuran kedalaman rongga udara dilakukan dengan cara mengambil pecahan telur bagian tumpul (bagian yang memiliki rongga udara) dari telur yang dipecah saat pengukuran diameter putih telur, kemudian mengukur kedalaman rongga udara dari membran dalam kerabang yang berpisah dengan membran kerabang bagian luar hingga kerabang dengan menggunakan jangka sorong (Djaelani, 2016).

2. Warna *Yolk*

Cara mengukur warna *yolk* dengan menggunakan *Roche Yolk* atau *colour fan* yaitu pembanding yang paling umum digunakan yang terdiri dari serangkaian 15 plastik berwarna. Kualitas warna *Yolk* ditentukan secara visual, yaitu membandingkan dengan berbagai warna standar dari *roche Yolk* atau *colour fan* berupa lembaran kipas warna standar dengan skor 1-15 dari warna pucat sampai orange tua (pekat). Warna yang terbaik terdapat dikisaran 9-12.

3. Berat telur

Berat telur di ukur dengan menggunakan timbangan digital.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam atau *Analysis of Variance* (ANOVA). Apabila hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan pada perlakuan, maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5% (Steel and Torrie, 1995).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Perlakuan terhadap Lama Simpan Bagian (Rongga Udara)

Hasil pengukuran rongga udara selama penelitian dari masing-masing perlakuan diperlihatkan pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Rataan Daya Simpan Telur Asin dengan Penambahan Konsentrasi Ekstrak Teh (*Camellia sinensis*) berdasarkan kedalaman Rongga Udara

Ulangan	Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
1	1.87	1.6	1.49	1.05
2	1.66	1.54	1.40	1.25
3	1.83	1.40	1.64	1.23
Total	5.36	4.54	4.53	3.53
Rata-rata	1.79	1.51	1.51	1.18

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2018.

Tabel 2. menunjukkan, bahwa rata-rata kedalaman rongga udara telur yang dihasilkan bervariasi, antar perlakuan. Nilai terendah terdapat pada P₃ dan paling besar atau tinggi pada perlakuan P₀. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi level konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) yang diberikan, maka rata-rata rongga udaranya semakin kecil. Guna mengetahui bagaimana pengaruh penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) terhadap kualitas telur asin berdasarkan rongga udara, dilakukan analisis ragam (ANOVA).

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa, penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap daya simpan telur asin. Kemampuan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) untuk menekan peningkatan luas rongga udara disebabkan karena adanya kandungan tannin. Teh memiliki kandungan tannin yang merupakan senyawa terpenting dalam daun teh karena dapat menentukan kualitas daun teh.

Guna mengetahui pengaruh teh antar perlakuan P_0 (kontrol, 0%), P_1 (20%), P_2 (30%), P_3 (40%) maka dilakukan uji lanjut Duncan dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil analisis lanjutan yaitu Uji Duncan's multiple range test (DMRT) taraf 5%.

Perlakuan	Rataan	Signifikansi 0,05
P_0 (kontrol)	1.79	A
P_1 (20%)	1.51	B
P_2 (30%)	1.51	B
P_3 (40%)	1.18	C

Sumber : *Data Sekunder, (2018)*.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) berpengaruh nyata terhadap daya simpan telur asin berdasarkan kedalaman rongga udara artinya, penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) dapat meningkatkan daya simpan telur asin (dapat memperpanjang daya simpan telur asin dan kualitas telur semakin baik).

Tabel 3. menunjukkan, bahwa penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) pada perlakuan P_3 (40%) menghasilkan kedalaman rongga udara yang lebih baik dari pada perlakuan P_0 (kontrol, 0%), P_1 (20%) dan P_2 (30%), hal ini diduga disebabkan pada konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) yang lebih tinggi, menyebabkan lebih banyaknya

ekstrak teh (*Camellia sinensis*) yang melekat pada telur asin, sehingga lapisan ekstrak tehnya lebih tebal. Lebih tebalnya lapisan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) berdampak pada lebih tingginya daya pencegahan penguapan telur, sehingga kedalaman rongga udara yang dihasilkan lebih baik.

2. Pengaruh Perlakuan terhadap Lama Simpan (Warna Yolk)

Hasil pengukuran warna yolk selama penelitian dari masing-masing perlakuan adalah sebagian berikut:

Tabel 4. Hasil Pengamatan Telur Asin pada Penggunaan Konsentrasi Ekstrak Teh (*Camellia sinensis*) terhadap Warna Yolk

Ulangan	Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
1	11	13	14	4
2	12	14	11	3
3	11	11	14	4
Total	34	38	39	11
Rata-rata	11.33	12.67	13	3.67

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2018.

Tabel 4. menunjukkan, bahwa rata-rata warna yolk telur yang dihasilkan bervariasi, antar perlakuan. Semakin tinggi level konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) yang diberikan semakin pucat warna yolk telur yang terlihat, maka rata-rata warna yolk telur bervariasi. Hal ini menunjukkan, bahwa konsentrasi ekstrak (*Camellia sinensis*) memiliki pengaruh terhadap warna yolk telur asin. Guna mengetahui bagaimana pengaruh penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) terhadap daya simpan telur asin berdasarkan warna yolk, dilakukan analisis ragam (ANOVA).

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa, penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap daya simpan telur asin. Kemampuan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) untuk menekan peningkatan warna yolk disebabkan karena adanya kandungan tanin. Teh memiliki kandungan tanin yang merupakan senyawa terpenting dalam daun teh karena dapat menentukan kualitas daun teh.

Guna mengetahui pengaruh teh antar perlakuan P_0 (kontrol, 0%), P_1 (20%), P_2 (30%), P_3 (40%) maka dilakukan uji lanjut Duncan dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil analisis lanjutan yaitu Uji Duncan's multiple range test (DMRT) taraf 5%.

Perlakuan	Rataan	Signifikansi 0,05
P_0 (kontrol)	11.33	a
P_1 (20%)	12.67	a
P_2 (30%)	13	a
P_3 (40%)	3.67	b

Sumber : *Data Sekunder, (2018).*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) berpengaruh nyata terhadap daya simpan telur asin berdasarkan warna yolk telur artinya, penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) dapat meningkatkan daya simpan telur asin (dapat memperpanjang daya simpan telur asin dan kualitas telur semakin baik).

Tabel 5. menunjukkan, bahwa penambahan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) pada perlakuan P_2 (30%) menghasilkan warna yolk telur yang lebih baik dari pada perlakuan P_0 (kontrol, 0%), P_1 (20%) dan P_3 (40%), hal ini diduga disebabkan pada konsentrasi ekstrak teh (*Camellia sinensis*) yang lebih tinggi, menyebabkan lebih banyaknya ekstrak teh (*Camellia*

sinensis) yang melekat pada telur asin, sehingga lapisan ekstrak tehnya lebih tebal. Lebih tebalnya lapisan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) berdampak pada lebih tingginya daya pencegahan penguapan telur, sehingga warna yolk yang dihasilkan lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dengan menambahkan ekstrak teh (*Camellia sinensis*) dapat memberikan pengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap lama simpan bagian rongga udara dan warna yolk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diharapkan untuk melakukan pengawetan telur asin dengan menggunakan ekstrak teh (*Camellia sinensis*), karena ekstrak teh (*camellia sinensis*) dapat memberikan pengaruh terhadap daya simpan telur asin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristyan, I. 2014. *Pengaruh Perbedaan Kadar Garam terhadap Mutu Organoleptik dan Mikrobiologis Terasi Rebon (Acetes sp.)*. Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan Vol 3, No 2.
- Coufal CD, Chavez C, Knape KD, Carey JB. 2003. Evaluation of a Method of Ultraviolet Light Sanitation of Broiler Hatching Eggs. *J. Poultry Science* 82:754–759.
- Djaelani, M.A. 2016. *Kualitas Telur Ayam Ras (Gallus L) setelah Penyimpanan yang dilakukan Pencelupan pada Air Mendidih dan Air Kapur sebelum Penyimpanan*. Buletin Anatomi dan Fisiologi . 24 (1) :122-127.
- Gaspersz, V. 2002. *Metode Perancangan Percobaan untuk Ilmu-Ilmu Pertanian, Ilmu-Ilmu Teknik, Biologi*. Bandung. CV. Armico.
- Gsianturi. 2003. *“Reptensi Kandungan Iodium”*. *Kualitas Sensori dan Anti oksidasi dan Telur Asin dengan Pencampuran KCl dan Ekstrak Daun Jati*. Skripsi Nur, 2010. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Surakarta.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al Azhar*. Pustaka Panjimas, Jakarta
- Harianto A, 2016. *Cara Pembuatan Telur Asin Metode Pemeraman* <http://www.Indo forum. org/t34666/#ixzz1NnHisx00> (15 Juni 2017).
- Haryan R. (2015) *Kualitas Telur*. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/104/jtpunismus-gdl-Rinaharyan-5167-3-3bab2.pdf>. 2015. Diakses tanggal 13 Mei 2017.
- Hutabarat H (2014), *Pengaruh Penggunaan Daun Teh Sebagai Bahan Pengawet Telur Konsumsi*. Lembaga Penelitian Universitas Hkbp Nommensen: Medan.
- Ilham N. J, dan Muklisin M, 2010. *Membuat Telur Asin Metode Pasta*. Jakarta : PT Agromedia Pustaka.
- Kadir, IA. 2013. *Pengaruh Kombinasi Konsentrasi Daun Teh (Camelia Sinensis) dengan Asap Cair (Liquid Smoke) Dan Lama Pengasinan Terhadap Kualitas Telur Asin*. UIN Press: Makassar.

- Kementrian Agama RI 2012. *Al Quran dan Terjemahannya*. Al- Jumanatul 'Ali. Jakarta.
- Kim Woo Jae. 2007. *Kolesterol*. Yayasan Jantung Indonesia. [http// id.heart.or.id/?P=32](http://id.heart.or.id/?P=32).(24 oktober, 2016).
- Kurtini, T., K. Nova., dan D. Septinova. 2011. *Produksi Ternak Unggas*. Universitas Lampung. Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandar Lampung.
- Medved, E. 1986. *Food: Preparation and Theory*. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Mahendradratta, M. 2007. *Pangan Aman dan Sehat Prasyarat Kebutuhan Mutlak Sehari-hari*. LEPHAS. Makasar.
- Muchtadi, T. R. dan Sugiyono, 1992. *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Muhammad Q.S, 2002. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Nuha, S. 2011. *Pengaruh Lama Penyimpanan Setelah Perendaman dalam Larutan Teh Hitam (Camellia sinensis) terhadap Kualitas Fisik dan Organoleptik Telur Itik*. Diakses 23 Oktober 2017.
- Piliang, W.G., A. Suprayogi, N. Kusmorini, M. Hasnah, S. Yuliani, dan Risfaheri. 2001. *Efek Pemberian Daun Katuk (Sauropus androgynus) Dalam Ramsum terdapat Kandungan Klestrol Karkas dan Telur Ayam Lokal*. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Proyek ARMP II. Desember 2001.
- Rachmawan O. 2001. *Penanganan Telur dan Daging Unggas* [Oktober 2009]. Diakses 25 Oktober 2017.
- Rahayu, W. P. 1998. *Penuntun Praktikum Penilaian Organoleptik*. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian. IPB, Bogor.
- Romanoff, A. L. and A. J. Romanoff. 1963. *The Avian Egg*. 2nd. Ed. John Wiley and Sons, New york.
- Ranto dan Sitanggang, M. *Panduan Lengkap Beternak Itik*. Edisi Revisi. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009.
- Rhya, P. 2017. <http://rhyafile./2013/01/ Pengolahan-makanan-dengan- garam-asam.html>.

- Sahria, 2017. *Pengaruh Metode dan Lama Pengasinan yang Berbeda Dengan Penambahan Asap Cair Terhadap Kualitas Telur Asin*. UIN Press: Makassar.
- Suardana, I W., dan I B.N. Swacita. 2009. *Higiene Makanan*. Udayana University Press :Denpasar.
- Sudaryani, T. 2003. *Kualitas Telur*. Penebar Swadaya. Cetakan ke-4: Jakarta.
- Sulistiono, A. D. 2010. *Tannin*. file://E:/Tannin.htm. Diakses pada 16/11/2017. 02.13 am.
- Sukarbowo, P dan Sudarjo, S. 1987. *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*. Akademi, Teknologi Kulit, Yogyakarta.
- Sutrisno dan Koswara. 1991. *Perbaikan Proses Pengasinan Telur Ayam dan Telur Itik*. Pusbangtepa-IPB, Bogor.
- Tediva, 2008, *Cara Mengawetkan Telur*. Di akses pada tanggal 16 November 2017.
- Tyczkowski, J. K. and P. B. Hamilton. 1991. *Altered metabolism of carotenoids during pale-bird syndrome in chickens infected with eimeria acervulina*. Journal. Poultry. Sci 70: 2074-2081.
- Syamsinan, S.T. dan Suekarta, 1982. *Penggunaan Teh pada Proses Pengasinan Telur Bebek*. (Muscovy sp) Pusbangtepa.
- Warisno. 2012. *Membuat Telur Asin Aneka Rasa*. Jakarta : PT Agromedia Pustaka
- Yulianto, T (2011). *Pengaruh Penambahan Ekstrak Teh Hijau, Ekstrak Daun Jambu Biji, dan Ekstrak Daun Salam pada Pembuatan Telur Asin Rebus terhadap Total Bakteri Selama Penyimpanan*. Diakses 06 November 2017.
- Zulaekah, S dan Widiyaningsih, E.N. 2005. *Pengaruh Konsetrasi Ekstrak Daun Teh pada Pembuatan Telur Asin Rebus terhadap Jumlah Bakteri dan Daya Terimanya*. Diakses 23 Oktober 2017.

LAMPIRAN 1

Descriptives

yolk_indeks

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
1.00	3	.6750	.00500	.00289	.6626	.6874	.67	.68	
2.00	3	.6350	.00500	.00289	.6226	.6474	.63	.64	
3.00	3	.6700	.07211	.04163	.4909	.8491	.59	.73	
4.00	3	.6100	.02784	.01607	.5408	.6792	.58	.64	
Total	12	.6475	.04320	.01247	.6201	.6749	.58	.73	
Model			.03881	.01120	.6217	.6733			
Fixed Effects				.01534	.5987	.6963			
Random Effects									.00044

ANOVA

yolk_indeks

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.008	3	.003	1.876	.212
Within Groups	.012	8	.002		
Total	.021	11			

yolk_indeks

Duncan

	N	Subset for alpha = .05
ulangan	1	1
4.00	3	.6100
2.00	3	.6350
3.00	3	.6700
1.00	3	.6750
Sig.		.090

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Descriptives

rongga_udara

	N	Mean		Std. Deviation		Std. Error		95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
		Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound		
1.00	3	1.7867	.11150	.06438	1.5097	2.0637	1.66	1.87				
2.00	3	1.5133	.10263	.05925	1.2584	1.7683	1.40	1.60				
3.00	3	1.5100	.12124	.07000	1.2088	1.8112	1.40	1.64				
4.00	3	1.1767	.11015	.06360	.9030	1.4503	1.05	1.25				
Total	12	1.4967	.24504	.07074	1.3410	1.6524	1.05	1.87				
Model												
Fixed Effects			.11158	.03221	1.4224	1.5709						
Random Effects				.12482	1.0994	1.8939						.05817

ANOVA

rongga_udara

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.561	3	.187	15.017	.001
Within Groups	.100	8	.012		
Total	.660	11			

rongga_udara

Duncan

ulangan	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
4.00	3	1.1767			
3.00	3		1.5100		
2.00	3		1.5133		
1.00	3			1.7867	
Sig.		1.000	.972	1.000	

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Descriptives

warna_yolk

	N	Mean		Std. Deviation		Std. Error		95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
		Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound		
1.00	3	11.3333	.57735	.33333	9.8991	12.7676	11.00	12.00				
2.00	3	12.6667	1.52753	.88192	8.8721	16.4612	11.00	14.00				
3.00	3	13.0000	1.73205	1.00000	8.6973	17.3027	11.00	14.00				
4.00	3	3.6667	.57735	.33333	2.2324	5.1009	3.00	4.00				
Total	12	10.1667	4.10838	1.18599	7.5563	12.7770	3.00	14.00				
Model			1.22474	.35355	9.3514	10.9820						
Fixed Effects												
Random Effects				2.19638	3.1768	17.1565					18.79630	

ANOVA

warna_yolk

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	173.667	3	57.889	38.593	.000
Within Groups	12.000	8	1.500		
Total	185.667	11			

warna_yolk

Duncan

ulangan	N	Subset for alpha = .05		
		1	2	1
4.00	3	3.6667		
1.00	3			11.3333
2.00	3			12.6667
3.00	3			13.0000
Sig.		1.000		.149

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Descriptives

berat_telur

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			Lower Bound
1.00	3	63.3333	7.50555	4.33333	44.6885	81.9782	56.00	71.00	
2.00	3	63.3333	4.50925	2.60342	52.1317	74.5349	59.00	68.00	
3.00	3	63.3333	6.02771	3.48010	48.3597	78.3070	57.00	69.00	
4.00	3	66.0000	5.29150	3.05505	52.8552	79.1448	60.00	70.00	
Total	12	64.0000	5.20489	1.50252	60.6930	67.3070	56.00	71.00	
Model			5.93717	1.71391	60.0477	67.9523			
Fixed Effects									
Random Effects				1.71391(a)	58.5456(a)	69.4544(a)			-9.97222

a Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.

ANOVA

berat_telur

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16.000	3	5.333	.151	.926
Within Groups	282.000	8	35.250		
Total	298.000	11			

berat_telur

Duncan

	N	Subset for alpha = .05
	ulangan	1
1.00	3	63.3333
2.00	3	63.3333
3.00	3	63.3333
4.00	3	66.0000
Sig.		.617

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Descriptives

indeks_albumin

	N	Mean		Std. Deviation		Std. Error		95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
		Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound	Upper Bound	Lower Bound		
1.00	3	.2250	.08000	.04619	.0263	.4237	.15	.31				
2.00	3	.1217	.02082	.01202	.0700	.1734	.11	.15				
3.00	3	.1517	.02082	.01202	.1000	.2034	.14	.18				
4.00	3	.1517	.01041	.00601	.1258	.1775	.14	.16				
Total	12	.1625	.05408	.01561	.1281	.1969	.11	.31				
Model												
Fixed Effects			.04294	.01240	.1339	.1911						
Random Effects				.02200	.0925	.2325						.00132

ANOVA

indeks_albumin

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.017	3	.006	3.150	.086
Within Groups	.015	8	.002		
Total	.032	11			

indeks_albumin

Duncan

ulangan	N	Subset for alpha = .05	
		1	2
2.00	3	.1217	
3.00	3	.1517	.1517
4.00	3	.1517	.1517
1.00	3		.2250
Sig.		.435	.080

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

LAMPIRAN 2. Persiapan dan pencucian serta pengamplasan telur



Gambar 1. bahan yang digunakan dalam penelitian



Gambar 2. Pencucian telur



Gambar 3. Pengaplasan telur

Lampiran 3. Gambar distruk teh dan proses pencampuran adonan serta pengamatan



Gambar 1. Ekstrak Teh



Gambar 2. Mencampur semua bahan



Gambar 3. Mengukur kedalaman rongga udara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4. Gambar bagian dalam (isi telur) sebagai indikator penilaian



Gambar 1. Posisi yolk yang tanpa menggunakan ekstrak teh



Gambar 2. Posisi yolk yang menggunakan ekstrak teh dengan konsentrasi 20%



Gambar 3. Posisi yolk menggunakan ekstrak teh dengan konsentrasi 30%



Gambar 4. Posisi yolk menggunakan ekstrak teh dengan konsentrasi 40%

M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



St. Hajar. Lahir di Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 13 Mei 1993. Penulis adalah anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan suami istri H.Usman dan Ene. Pendidikan yang ditempuh yaitu di SDN Inpres Kananga II, masuk tahun 2000 dan tamat tahun 2006. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 BOLO 2006 dan lulus tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA MAN 3 BIMA masuk tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun yang sama atau tahun 2012, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMM sebagai mahasiswa program Strata 1 (S1) Pada Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya pada Jurusan Ilmu Peternakan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1014 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **ST. HAJAR** NIM : **60700114085** tertanggal **07 Juni 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **"Pengaruh Pemanfaatan Metode Suntik Terhadap Kualitas Telur Asin"**
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Irmawaty, S.Pt., M.Si.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 07 Juni 2017



Prof. Dr. H. Anifuddin M. Ag
Nip. 19691205 199303 1001

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ST. HAJAR
 NIM : 60700112085
 JUDUL : PENGARUH PENAMBAHAN KONSETRASI EKSTRAK TEH (CAMELLIA SINENSIS)
 TERHADAP DAYA SIMPAN TELUR ASIN
 PEMBIMBING : Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.

No	Tanggal	Uraian	Tanda tangan pembimbing	Tanda tangan Mahasiswa
1	20-10-2017	Bab I Teknik penyusunan Latar belakang dan daftar isi		
2	15-11-2017	Bab II Integrasi keilmuan		
3	17-11-2017	Bab III prosedur penelitian dan analisis data		
4	15-07-2018	Acc seminar proposal		
5	10-08-2018	konsultasi hasil penelitian		
6	18-09-2018	Menggunakan pembahasan dengan jelas		
7	20-09-2018	Acc seminar hasil		
8	13-10-2018	Acc ujian munaqasyah		
9	25-10-2018	pergesahan skripsi		
10	25-10-2018	pergesahan ^{drag} skripsi		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
 MAKASSAR

Samata-Gowa,..... 2018

Mengetahui
 Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
 Nip. 195907121986031002

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA : ST. HAJAR
NIM : 60700112085
JUDUL : PENGARUH PENAMBAHAN KONSETRASI EKSTRAK TEH (CAMELLIA SINENSIS) TERHADAP DAYA SIMPAN TELUR ASIN
PEMBIMBING : Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.

No	Tanggal	Uraian	Tanda tangan pembimbing	Tanda tangan Mahasiswa
1	15-07-2017	Konsultasi judul		
2	15-11-2017	Bab I tentang penyusunan latar belakang dan daftar isi		
3	15-11-2017	Bab II integrasi keilmuan		
4	17-11-2017	Bab III prosedur penelitian dan Analisis		
5	15-01-2018	Acc seminar proposal		
6	10-09-2018	Konsultasi hasil penelitian		
7	18-09-2018	Menggunakan pembatasan dgn jelas		
8	20-09-2018	Acc seminar hasil		
9	25-09-2018	Revisi seminar hasil		
10	13-10-2018	Acc Ujian Munqasyah		
11	25-10-2018	Pengasahan skripsi		
12	25-10-2018	pengesahan draft skripsi		
13				
14				

Samata-Gowa, 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


 Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si

Nip. 195907121986031002