

**UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK DAUN ANGSANA
(*Pterocarpus indicus* WILLD) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Oleh

AYU LESTARI NUSA
NIM. 70100112013

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

**UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK DAUN ANGSANA
(*Pterocarpus indicus* WILLD) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh
AYU LESTARI NUSA
NIM. 70100112013

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari Nusa
NIM : 70100112013
Tempat/TanggalLahir : Ujung Pandang, 7 September 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Daun Angsana
(*Pterocarpus indicus* Willd.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 31 Mei 2016

Penyusun,

AYU LESTARI NUSA
NIM. 70100112013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Daun Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)”, yang disusun oleh Ayu Lestari Nusa, NIM: 70100112013, mahasiswa jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 M, bertepatan dengan 23 Sya’ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi.

Makassar, 30 Mei 2016 M
23 Sya’ban 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc. (.....)

Sekretaris : Haeria, S. Si., M. Si. (.....)

Pembimbing I : Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Andi Tenriugi S. Si., M. Si. (.....)

Penguji Kompetensi : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M. Si., Apt. (.....)

Penguji Agama : Dr. Darsul Puyu., M. Ag. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr.dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā*, Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penulis, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penulis menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penulis mendapatkan limpahan rahmat dari Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā*.

Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah *Ṣallāllāhu 'Alayhi Wa Sallam*, keluarga dan para sahabat nabi yang telah memperjuangkan agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā*.

Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang terealisasi dalam bentuk skripsi sebagai pedoman untuk menambah wawasan keilmuan ke depannya. Penulis sangat menyadari bahwa apa yang terurai sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, namun bagi penulis penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan moral dan material dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada, ibu/bapak :

1. Ayahanda tercinta Saharuddin, S.Pd dan ibunda Nurlaela, Amd. Kep serta adik-adikku Nurul Misna Lestari Nusa dan Moehammad Rifai Atria yang telah

memberikan dukungan, do'a dan kasih sayangnya tanpa batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
3. Bapak Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Farmasi.
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si selaku ketua jurusan Farmasi serta seluruh staf jurusan Farmasi yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan karya ilmiah ini.
5. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si, Apt selaku sekretaris jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Andi Tenriugi, S.Si., M.Si., selaku dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sekaligus selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Darsul Puyu, M.Ag selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Farmasi 2012 dan teman-teman KKN Profesi UIN Alauddin Makassar Angkatan VI tahun 2015 Kecamatan Tombolo Pao Desa Kanreapia yang telah banyak memberikan motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Samata, 31 Mei 2016

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Ayu Lestari Nusa
70100112013

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-46
A. Uraian Tanaman.....	9
B. Metode Ekstraksi	12
C. Kandungan Senyawa Aktif	16
D. Inflamasi	19
E. Antiinflamasi	22
F. Uraian Hewan Coba	25
G. Metode Pengujian	28


H. Karagen	32
I. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat	33
BAB III METODE PENELITIAN	47- 51
A. Jenis dan lokasi penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Alat dan Bahan	47
D. Metode Kerja	48
E. Uji Efek Antiinflamasi	49
F. Penyiapan Bahan Uji	49
G. Perlakuan Terhadap Hewan uji	50
H. Pengamatan dan Pengumpulan Data	51
I. Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52 - 63
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sifat Biologis Mencit (<i>Mus musculus</i>)	28
Tabel 2. Hasil Ekstraksi Daun Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i> willd.)	53
Tabel 3. Presentase Rata-Rata Penurunan Volume Udem Telapak Kaki Mencit, Mencit Yang Diberikan Perlakuan Dengan Pemberian Peroral Sediaan Uji, Dibandingkan Dengan Sediaan Kontrol Negatif	53
Tabel 4. Penurunan Volume Udem Telapak Kaki Mencit, Mencit Yang Diberikan Perlakuan Dengan Pemberian Peroral Sediaan Uji, Dibandingkan Dengan Sediaan Kontrol	54
Tabel 5. Hasil Pengukuran Rata-Rata Penurunan Volume Udem Kaki Mencit, Volume Awal, Setelah Induksi, Terapi, Dan Persen Penurunan	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Skema Kerja.
2. Perhitungan Dosis Obat Natrium Diklofenak dan Ekstrak 4%,6%, dan 8%.
3. Gambar Penelitian
4. Lampiran Analisis Statistik Pengukuran Volume Udem (Anova)
5. Lampiran uji BJND
6. Lampiran SPSS



ABSTRAK

Judul : Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Daun Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*).

Nama Penulis : Ayu Lestari Nusa

NIM : 70100112013

Salah satu tanaman obat yang digunakan secara empiris untuk pengobatan secara tradisional adalah Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd). Tanaman ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat antiinflamasi. Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antiinflamasi ekstrak daun angšana (*Pterocarpus indicus* Willd) terhadap mencit dengan metode edema buatan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti aktivitas antiinflamasi ekstrak daun angšana (*Pterocarpus indicus* Willd) terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen.

Penelitian dilakukan dengan pemberian secara oral suspensi Ekstrak Daun Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd) dalam konsentrasi 4%, 6% dan 8%, Natrium CMC sebagai Kontrol negatif dan Natrium Diklofenak sebagai kontrol positif. Pengukuran dilakukan tiap-tiap 1 jam selama 6 jam setelah diinduksi dengan karagen.

Hasil penelitian setelah dianalisis secara statistik dengan metode Rancangan Acak Lengkap (*One Way Anova*) menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak 4%, 6% dan 8% memiliki aktivitas Antiinflamasi. Hasil uji Lanjutan Tukey (BNJ) dan uji Duncan pada konsentrasi 6% dan 8% menunjukkan aktivitas Antinflamasi yang Tidak Berbeda Nyata dengan Pembandingan Natrium Diklofenak ($\alpha = 0,05$).

Kata kunci : Ekstrak Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd), karagen, natrium diklofenak, aktivitas antiinflamasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Title : **Anti-Inflammatory Activity Test Of Extract Of Angsana (*Pterocarpus indicus Willd*) To Mice (*Mus musculus*).**
Author Name : **Ayu Lestari Nusa**
NIM : **70100112013**

One of medicinal plant empirically used for traditional medicine is angsana leaves (*Pterocarpus indicus Willd*) This plant is potential to be developed as medicine for anti-inflammatory. A research on anti-inflammatory activity test of extract of angsana leaves (*Pterocarpus indicus Willd*) to mice with Rat hind paw edema method. The aim of this study was to investigate the anti-inflammatory activity of the Extract angsana leaves (*Pterocarpus indicus Willd*) to mice induced with carrageen.

The Research has done by giving orally suspension of ethanol extract angsana leaves (*Pterocarpus indicus Willd*) in the concentration of 4%, 6% and 8%, Sodium CMC 1% w/v as Control negative and Sodium Diclofenac as control positive. Measurements were made every hour for six hours after induction with carrageen.

The results after statistically analyzed using Complete Randomized Design showed that concentrations of 4%, 6% and 8% can alicit anti-inflammatory activity. The result of Tukey test and Duncan test concentration of 6% and 8% shows that the effects did not significantly different with Sodium Diclofenac Suspension ($\alpha = 0,05$).

Keywords : *extract angsana (Pterocarpus indicus Willd), carrageen, Sodium diclofenac, anti-inflammatory activity*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat tradisional dan tanaman obat banyak digunakan masyarakat terutama dalam upaya preventif, promotif dan rehabilitatif. Sementara ini banyak orang beranggapan bahwa penggunaan tanaman obat atau obat tradisional relatif lebih aman dibandingkan obat sintesis. Agar penggunaannya optimal, perlu diketahui informasi yang memadai tentang tanaman obat. Informasi yang memadai akan membantu masyarakat lebih cermat untuk memilih dan menggunakan suatu produk obat tradisional atau tumbuhan obat dalam upaya kesehatan (Sigit Prayoga, 2008).

Indonesia sendiri negara beriklim tropis yang kaya akan buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran, termasuk untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masyarakat saat ini banyak yang beralih ke pengobatan herbal karena bahan yang berasal dari alam jauh lebih baik bagi kesehatan. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih untuk pengobatan atau kesehatan. Oleh karena itu, herbal dalam perkembangannya dimasukkan sebagai pengobatan alternatif, pengobatan dengan cara non medis (Intan Nisa, 2012).

Pengobatan herbal adalah penggunaan seluruh atau beberapa bagian tanaman untuk mengobati berbagai macam penyakit dan mempertahankan kesehatan. Penggunaan tanaman sebagai obat sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Walaupun

sering dikategorikan sebagai pelengkap atau alternatif di negara barat, obat herbal tetap obat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia (Deni Damayanti, 2013).

Salah satu tanaman yang berkhasiat dalam dunia pengobatan yaitu *Pterocarpus indicus* Willd. Dalam bahasa Filipina disebut juga dengan nama *Narra*, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama Angsana Kembang atau Sonokembang. Khasiat dari Angsana Kembang ini adalah untuk mengobati disentri dan diare. Ekstrak kulit batang Angsana Kembang di Filipina digunakan untuk terapi leprosis dan flu, di Malaysia jus dari akar tanaman ini digunakan untuk pengobatan sifilis, di Indonesia daun mudanya digunakan sebagai pengobatan ulcer atau borok. Di samping itu getah atau kino dapat digunakan sebagai pengobatan sariawan, daun muda untuk pengobatan diabetes. Begitu banyak khasiat dari Angsana Kembang ini namun di Indonesia, tanaman ini hanya populer sebagai tanaman peneduh dan penghias tepi jalan di perkotaan (Ferdiand Ricky Dharmawan, 2013). Secara empiris daun angšana digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit seperti bisul, biang keringat, jerawat, burut (pecah-pecah di bagian vagina), luka, koreng, borok.

Peradangan atau inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya. Jaringan yang mengalami inflamasi tersebut melepaskan berbagai zat yang menimbulkan perubahan sekunder yang dramatis disekeliling jaringan yang normal (Guyton, A.C, 1997).

Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Junanto “Aktivitas Antimikroba Ekstrak Angsana (*Pterocarpus indicus*) terhadap *Bacillus Subtilis* dan *Klebsiella pneumoniae*”, telah dilakukan studi pendahuluan fitokimia ekstrak daun angšana (*Pterocarpus indicus* Willd) menunjukkan tes positif terhadap fenol, flavonoid saponin, triterpenoid dan tanin. Senyawa-senyawa seperti flavonoid, saponin, tanin memiliki efek farmakologis sebagai antiinflamasi. Flavonoid bekerja menghambat fase penting dalam biosintesis prostaglandin, yaitu pada menghambat enzim lipooksigenase dan enzim siklooksigenase-2. Sedangkan aktivitas farmakologi saponin yang telah dilaporkan antara lain sebagai antiinflamasi, dimana Saponin bekerja menghambat dehidrogenase prostaglandin, sehingga peradangan dapat dikurangi. Tanin juga mempunyai aktivitas antiinflamasi, namun mekanisme kerjanya sebagai antiinflamasi belum dijelaskan secara pasti (Atik Fitriyani. 2011).

Di dalam al-Qur’an, termuat seluruh kebenaran yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pengobatan. Didalam al-Qur’an sendiri terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di muka bumi (Hendri Wasito, 2008). Sebagaimana dalam firman Allah asy-Syu’ara’/26 : 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya : Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan menjadi rezeki yaitu memberikan manfaat bagi kehidupan (Savitri, 2008).

Secara empiris daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi, namun belum ada pengujian secara ilmiah tentang aktivitas antiinflamasi dari tanaman ini. Oleh karena itu, Penelitian khasiat tanaman obat khususnya daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) perlu dilakukan untuk menunjang penggunaan secara empiris masyarakat dengan data-data ilmiah, sehingga penggunaannya dapat lebih dipertanggung jawabkan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) memiliki aktivitas antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen ?
2. Berapa konsentrasi ekstrak daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) yang memiliki aktivitas antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ekstrak daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) memiliki aktivitas antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen.

2. Mengetahui konsentrasi ekstrak daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) yang memiliki aktivitas antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup penelitian

1. Definisi operasional

- a. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.
- b. Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda ketebalannya sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu.
- c. Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bias disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya.
- d. Hewan coba atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik.
- e. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran dibagi dengan volume total campuran tersebut.

- f. Eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana (untuk membuktikan kebenaran suatu teori).
- g. Uji aktivitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan aktivitas suatu bahan yang akan diuji.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan alam yang diujikan pada hewan coba.

E. Manfaat Penelitian

- a. Bagi ilmu pengetahuan
Memberikan sumbangan informasi untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional.
- b. Bagi masyarakat
Dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional, terkhusus bagi tanaman angkana (*Pterocarpus indicus* Willd).

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanaman Angkana (*Pterocarpus indicus* Willd):

1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Cut, Fatimah, Dkk. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Angkana (Pterocarpus Indicus Willd) Secara In Vitro*. Berdasarkan Penelitian Yang Telah Dilakukan, Bahwa Ekstrak Daun Angkana Setelah diteliti menunjukkan ekstrak etanol daun angkana mempunyai aktivitas penghambatan

- pertumbuhan yang baik pada *Staphylococcus aureus* dan kurang baik terhadap *Streptococcus pyogenes* dan *Escherichia coli*, sedangkan ekstrak kloroform dan heksan tidak menunjukkan penghambatan pertumbuhan seluruh bakteri. 2006.
2. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Tulus Junanto, Dkk. *Aktivitas Antimikroba Ekstrak Angsana (Pterocarpus Indicus) Terhadap Bacillus Subtilis Dan Klebsiella Penumoniae*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum Antimikroba, Maka Ekstrak Kasar Daun, Kulit Batang Dan Akar Angsana (*P. Indicus*) Dapat Menghambat Pertumbuhan Bakteri Gram Positif (*B. Subtilis*) Dan Bakteri Gram Negatif (*K. Pneumoniae*). 2008.
 3. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Ferdiand Ricky Dharmawan. *Pengujian Aktivitas Hipoglikemik Ekstrak Air Daun Angsana Pterocarpus Indicus Willd Terhadap Histopatologi Sel Hepar Tikus Diabetes Aloksan*. Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan, Maka Diketahui Bahwa Ekstrak Etanol Daun Angsana Menginhibisi Enzim Glucosidase Dengan Daya Yang Kecil Jika Dibandingkan Dengan Obat Oral Anti Diabetes Seperti Acarbose. 2013.
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Djoko Hargono, dkk. *Uji Efek Antidiare Infus Kulit Batang Angsana (Pterocarpus indicusWilld) Terhadap Tikus Putih Jantan*. Berdasarkan hasil penelitian uji toksisitas akut menghasilkan LD50 infus kulit batang angsana yang diberikan secara oral pada tikus putih jantan dengan metode transit intestinal menunjukkan bahwa infuse kulit batang angsana mempunyai efek antidiare. 1998.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Retno Apriani. *Uji efek antiinflamasi kombinasi ekstrak air akar tanaman akar kucing (*acalypha indica* Linn.) dan ekstrak atanol 70% rimpang jahe merah (*Zingiber officinali* Rosc.) terhadap udem telapak kaki tikus yang diinduksi dengan karagenin*. Hasil penelitian diperoleh kombinasi ekstrak air akar tanaman akar kucing (*acalypha indica* Linn.) dan ekstrak atanol 70% rimpang jahe merah (*Zingiber officinali* Rosc.) mempunyai efek antiinflamasi ditinjau dari penurunan volume udem telapak kaki tikus putih jantan yang diinduksi karagenin. 2011.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Risda Yulianti. *Standarisasi Ekstrak Etanol Daun Angsana (*Pterocarpus indicus* willd)*. Berdasarkan hasil penelitian pada penapisan golongan kimia ekstrak menunjukkan adanya senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, tannin, kuinon, dan triterpenoid. 2013.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Uraian Tanaman*

1. **Klasifikasi tanaman**

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub Kelas	: Dialypetalae
Bangsa	: Rosales
Famili	: Papilionaceae
Genus	: Pterocarpus
Spesies	: <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.

(Gembong Tjitrosoepomo, 2010)

2. **Sinonim**

Pterocarpus wallichii Wight & Arn; *P. zollingeri* Miq.; *P. papuanus*
F.v.Mueller, *P. vidalinus* Rolfe (Joker, D.2002).

3. **Nama umum.**

a). Nama Lain Di Beberapa Negara

Cendana merah, sono kembang,angsana (Indonesia); angsana (Malaysia, Singapura); pradoo (Thai.); Zonnehout (Belanda); Pradoo (Filipina).

b). Nama Lain Di Beberapa Daerah

Asan (Aceh), Athan, Hasona (Batak Toba), Sena (Batak Karo), Lansano, Sana (Lampung); Angsana (Jawa Tengah), Asana, Sana (Madura), Sana Kapur, Sono Kembang, Sana Kembang (Sunda, Jawa Barat), Sana (Sasak), Ai Kenawa (Sumba), Angsan, Angsane, Kayu Merah, Matani, Aina (Nusa Tenggara), Tonala (Gorontalo), Yonoba (Buoi), Patene (Makassar), Candana (Bugis); Nara, Lala (Ambon), Lina (Halmahera), Linga (Ternate), Ingi (Seram) (Joker, D.2002).

4. Morfologi tanaman

Penyebaran alami di Asia Tenggara – Pasifik, mulai Birma Selatan menuju Asia Tenggara sampai Filipina dan kepulauan Pasifik. Dibudidayakan luas di daerah tropis. Merupakan jenis pionir yang tumbuh baik di daerah terbuka yang sedikit terlindung dari sinar matahari, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Tumbuh pada berbagai macam tipe tanah, dari yang subur ke tanah berbata. Biasanya ditemukan sampai ketinggian 600 meter dari permukaan laut, namun masih bertahan hidup sampai 1.300 meter dari permukaan laut. Sering menjadi tanaman hias di taman dan sepanjang jalan sebagai tanaman peneduh. (Joker, 2002).

5. Deskripsi tanaman

Pohon, tinggi 10-40 m. Ujung ranting rambut. Daun penumpu bentuk lanset, panjang 1-2 cm. Daun berseling. Anak daun 5-13, bulat telur memanjang, meruncing, tumpul, mengkilat sekali, 4-10 kali 2,5-5 cm, anak tangkai lk 0,5-1,5 cm. Tandan bunga diujung dan duduk di ketiak, sedikit atau tidak bercabang,

berambut coklat, dan berambut banyak, panjang 7-11 cm, anak tangkai 0,5-1,5 cm, bunga sangat harum. Kelopak bentuk lonceng sampai bentuk tabung begigi 5, tinggi lk 7 mm. Mahkota kuning oranye. Daun mahkota berkuku, bidang bendera bentuk lingkaran atau buak telur terbalik, berlipat kuat, melengkung kembali, garis tengah lebih kurang 1 cm, lunas lebih pendek daripada sayap, pucat. Bakal buah berambut leba, bertangkai pendek, bakal biji 2-6. Polongan bertangkai di atas sisa kelopak, hamper bulat lingkaran, dengan paruh disamping, pipih sekali, sekitarnya bersayap, tidak membuka, garis lk 5 cm, pada sisi yang lebar dengan ibu tulang daun yang tebal. Biji kebanyakan 1. Kerap kali ditanam 1-800 m (Van Steenis, 2006).

Angsana merupakan tanamana hias yang banyak dimanfaatkan sebagai peneduh. Bunganya berwarna kuning dengan aroma semerbak. Getah yang dikeluarkan dari batang akibat luka berwarna merah. Tanaman ini mudah tumbuh dan menyebar didataran rendah hingga ketinggian 800 m di atas permukaan laut. Potongan batang yang ditanam di tanah dapat tumbuh dengan baik sebagai tanaman baru (Bambang Mursito, 2011).

6. Manfaat

Semua jenis *Pterocarpus* menghasilkan kayu bernilai tinggi. Kayunya agak keras, digunakan untuk mebel halus, lantai, lemari dan alat musik. Merupakan jenis pengikat nitrogen. Direkomendasikan sistem agroforestry, dan penaung kopi dan tanaman lain (Joker, 2002). Berdasarkan beberapa jurnal

penelitian, bahwa tanaman angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) memiliki efek antidiare, antimalaria, antidiabetes.

7. Kandungan kimia

Berdasarkan jurnal penelitian tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak daun angkana, dituliskan bahwa kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman angkana adalah terpen, fenol, isoflavon, tannin, dan ligan.

Berdasarkan jurnal penelitian tentang pengujian “Aktivitas Hipoglikemik Ekstrak Air Daun angkana (*Pterocarpus indicus* Willd) Terhadap Histopatologi Sel Hati Tikus Diabetes Aloksan” dituliskan Zat-zat yang terkandung dalam *Pterocarpus indicus* Willd antara lain ; flavon, isoflavon, narin, santalin, angolensin, pterocarpin, pterostilben homopterocarpin, prunetin (prunusetin), formonoetin, isoliquiritigenin, phydroxyhydratropic acid, pterofuran, pterocarpol, dan β -eudesmol serta (-)-epicatechin yang berperan dalam penurunan glukosa darah (Ferdinand Ricky Dharmawan, 2013).

B. Metode Ekstraksi

1. Metode Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari tersebut. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin luas. Dengan demikian maka makin halus serbuk simplisia seharusnya makin baik penyariannya.

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Septiningsih, 2008).

2. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan koentrasi dalam sel tanaman (Mukhriani, 2014).

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses ekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah : pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Ahmad Alwy, 2012).

Ada beberapa metode ekstraksi sampel bahan alam, antara lain maserasi, infusdasi, digesti, perkolasi dan soxletasi (Sri Atun, 2014).

3. Metode – metode ekstraksi

Cara dingin

a. Maserasi

Metode maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana, yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung berosin, trias dan lilin.

Maserasi merupakan teknik ekstraksi dari sampel padat menggunakan pelarut tertentu biasanya digunakan metanol atau etanol. Metanol memiliki kelebihan memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga mudah diuapkan pada suhu yang lebih rendah, tetapi bersifat lebih toksik. Sedangkan etanol memiliki kelemahan memiliki titik didih yang relative tinggi sehingga lebih sulit diuapkan, tetapi relatif tidak toksik dibanding methanol (Sri Atun, 2014).

Proses maserasi dilakukan selama waktu tertentu dengan sesekali diaduk, biasanya dibutuhkan waktu 1-6 hari. Selain metanol atau etanol pelarut yang lain yang biasa digunakan antaralain aseton, kloroform, atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah waktu tertentu ekstrak yang disebut maserat dipisahkan dengan cara penyaringan (Sri Atun, 2014).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada temperature ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahap perkolasi

sebenarnya (penetapan/penampungan ekstrak) yang jumlahnya 1-5 bahan (Depkes RI, 1986).

Cara Panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 1986).

b. Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 1986).

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinue) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50⁰C (Depkes RI, 1986).

d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air air (bejana infuse tercelup dalam penangas air yang mendidih, temperatur terukur 96-98⁰C) selama waktu tertentu 15-20 menit (Depkes RI, 1986).

e. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama ($\geq 30^{\circ}\text{C}$) dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 1986).

C. Kandungan Senyawa Aktif

1. Flavonoid

Flavonoid merupakan golongan senyawa bahan alam dari senyawa fenolik yang merupakan pigmen tumbuhan. Saat ini lebih dari 6.000 senyawa yang berbeda masuk dalam golongan flavonoid. Flavonoid merupakan bagian penting dari diet manusia karena banyak manfaatnya bagi kesehatan. Fungsi kebanyakan flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai anti oksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin C), antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik.

Flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum dan terdapat pada seluruh dunia tumbuhan mulai dari fungus sampai angiospermae. Efek flavonoid terhadap macam-macam organisme sangat banyak macamnya dan dapat menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung flavonoid dipakai dalam pengobatan tradisional. Flavonoid dapat bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan. Beberapa flavonoid menghambat fosfodiesterase, flavonoid lain menghambat aldoreduktase, monoamina oksidase, protein kinase, DNA polimerase dan lipooksigenase. Penghambatan lipooksigenase dapat menimbulkan pengaruh yang lebih luas karena pengaruh lipooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju

hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan. Flavonoid tertentu dalam makanan tampaknya menurunkan agregasi platelet dan dengan demikian mengurangi pembekuan darah jika dipakai pada kulit, flavonoid lain menghambat perdarahan (Destyka Fridiana, 2012).

Mekanisme flavonoid dalam menghambat terjadinya radang melalui dua cara yaitu menghambat asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari endothelial sehingga menghambat proliferasi dan eksudasi dari proses radang. Terhambatnya pelepasan asam arakhidonat dari sel inflamasi akan menyebabkan kurang tersedianya substrat arakhidonat bagi jalur siklooksigenase dan jalur lipooksigenase (Destyka Fridiana, 2012).

Lisosom mengandung protease dan enzim lain. Protease lisosom merupakan salah satu mediator kimiawi inflamasi yang memiliki aktivitas enzimatis langsung sehingga penghambatan enzim ini dapat mengurangi inflamasi.

2. Alkaloid

Senyawa yang mengandung nitrogen mempunyai sifat alkaloid dan sering sekali digolongkan kedalam golongan alkaloid meskipun kerangka karbonnya menunjukkan bahwa senyawa ini turunan isoprenoid. Anggota terpenting dalam golongan ini adalah alkaloid nakonitum dan alkaloid steroid. Alkaloid ini mengandung senyawa penolak serangga dan senyawa antifungus (Destyka Fridiana, 2012).

3. Seskuiterpenoid

Seskuiterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang dihasilkan oleh tiga unit isopren yang terdiri dari kerangka asiklik dan bisiklik dengan kerangka dasar naftalen. Anggota seskuiterpenoid yang penting adalah farnesol, alkohol yang tersebar luas. Senyawa ini mempunyai bioaktivitas yang cukup besar diantaranya adalah sebagai antifeedant, antimikroba, antibiotik, toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis (Destyka Fridiana, 2012).

4. Tannin

Sejenis kandungan tumbuhan yang bersifat fenol mempunyai rasa sepat dan mempunyai kemampuan menyamak kulit, tetapi secara kimia tanin tumbuhan dibagi menjadi dua golongan. Kadar tanin yang tinggi mungkin mempunyai arti pertahanan bagi tumbuhan, membantu mengusir hewan pemangsa tumbuhan. Selain itu, kadar tanin yang tinggi dianggap mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap nilai gizi tumbuhan makanan ternak. Beberapa tanin terbukti mempunyai aktivitas antioksidan, menghambat pertumbuhan tumor, dan menghambat pertumbuhan tumor dan menghambat enzim seperti reverse transkriptase dan DNA topoisomerase (Destyka Fridiana, 2012).

5. Saponin

Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Beberapa saponin bekerja sebagai antimikroba juga. Diantara banyak efek yang dilaporkan, efek yang ditunjang dengan baik oleh bukti

ialah penghambatan jalur ke steroid anak ginjal, tetapi senyawa ini menghambat juga dehidrogenase jalur prostaglandin (Destyka Fridiana, 2012).

D. Inflamasi

1. Definisi

Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya. Jaringan yang mengalami inflamasi tersebut melepaskan berbagai zat yang menimbulkan perubahan sekunder yang dramatis disekeliling jaringan yang normal (Guyton, A.C, 1997).

2. Macam-macam inflamasi

a. Inflamasi akut

Inflamasi ini ditandai dengan kemerahan dan panas yang terlihat jelas pada jaringan luar. Hal ini akibat pecahnya sel mast sehingga melepaskan mediator-mediator inflamasi dan enzim lisosom serta ditandai dengan banyaknya leukosit. Selain dari peristiwa tersebut, terjadi eksudasi cairan plasma ke tempat inflamasi yang terus meningkat sehingga terbentuk cairan eksudat yang ditandai dengan edema (Vogel, 2002; Alfi Inayati, 2010).

b. Inflamasi kronik

Inflamasi ini ditandai dengan banyaknya eksudat jaringan granulomatosis, monosit, dan pengumpulan plasma sel. Akibat jaringan mengalami fibrosis dan timbullah hyperplasia disekitar jaringan. Tetapi hal ini

dapat terjadi tergantung dari kedudukan dan inflamasi kronik. Elemen-elemen jaringan yang diserang akan menghasilkan reaksi imun antara suatu antigen dengan suatu antibodi yang merangsang terjadinya inflamasi. Inflamasi kronik mempunyai waktu kerja yang lama (Vogel, 2002; Alfi Inayati, 2010).

2. Tanda-tanda inflamasi

Inflamasi ditandai oleh adanya vasodilatasi pembuluh darah lokal yang mengakibatkan terjadinya aliran darah setempat yang berlebihan, peningkatan permeabilitas kapiler. Inflamasi menyebabkan pembekuan cairan di dalam ruang interstisial yang disebabkan oleh fibrinogen dan protein lainnya yang bocor dari kapiler dalam jumlah yang besar. Inflamasi juga menyebabkan migrasi sejumlah besar granulosit dan monosit ke dalam jaringan, pembengkakan sel jaringan (Guyton, A.C, 1997).

Tanda klasik umum yang terjadi pada proses inflamasi yaitu rubor (kemerahan), tumor (pembengkakan), calor (panas setempat yang berlebihan), dolor (rasa nyeri), dan *functiolaesa* (gangguan fungsi/kehilangan fungsi jaringan yang terkena).

- a. Rubor terjadi pada tahap pertama dari proses inflamasi yang terjadi karena darah terkumpul di daerah jaringan yang cedera akibat dari pelepasan mediator kimia tubuh (*kinin, prostaglandin, histamine*). Ketika reaksi radang timbul maka pembuluh darah melebar (vasodilatasi pembuluh darah) sehingga lebih banyak darah yang mengalir ke dalam jaringan yang cedera.

- b. Tumor (pembengkakan) merupakan tahap kedua dari inflamasi yang ditandai adanya aliran plasma ke daerah jaringan yang cedera.
- c. Kalor (panas) berjalan sejajar dengan kemerahan karena disebabkan oleh bertambahnya pengumpulan darah (banyaknya darah yang disalurkan), atau mungkin karena pirogen yang mengganggu pusat pengaturan panas pada hipotalamus.
- d. Dolor (nyeri) disebabkan banyak cara, perubahan lokal ion-ion tertentu dapat merangsang ujung saraf, timbulnya keadaan hiperalgesia akibat pengeluaran zat kimia tertentu seperti histamin atau zat kimia bioaktif lainnya dapat merangsang saraf, pembengkakan jaringan yang meradang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal juga dapat merangsang saraf.
- e. *Funciolaesa*, kenyataan adanya perubahan, gangguan, kegagalan fungsi telah diketahui, pada daerah yang bengkak dan sakit disertai adanya sirkulasi yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat juga menghasilkan lingkungan lokal yang abnormal sehingga tentu saja jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi secara normal (Price dan Wilson, 2005).

3. Mekanisme inflamasi

Proses inflamasi merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai macam sel, misalnya dalam beberapa jam sel sel leukosit yang berfungsi sebagai sel pertahanan tubuh menempel ke sel endotel pembuluh darah di daerah inflamasi dan bermigrasi melewati dinding kapiler masuk ke rongga jaringan yang disebut

extravasasi. Keluarnya berbagai faktor plasma seperti immunoglobulin, komplemen, sistem aktivasi kontak-koagulasi-fibrinolitik, sel-sel leukosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit yang berinteraksi satu sama lain dalam proses inflamasi. Sel sistem imun nonspesifik seperti neutrofil, basofil, eosinofil, dan monosit ini diproduksi dan disimpan di sumsum tulang dan diedarkan di dalam darah. Pada keadaan normal, leukosit hanya sedikit melekat pada sel endotel, tetapi pada inflamasi adhesi antara leukosit dan sel endotel ini sangat ditingkatkan sehingga meningkatnya sel mediator inflamasi ke dalam jaringan (Mansjoer, 1999).

Inflamasi (radang) biasanya dibagi dalam 3 fase: inflamasi akut, respon imun, dan inflamasi kronis. Inflamasi akut merupakan proses respon awal terhadap cedera jaringan, hal tersebut terjadi melalui rilisnya autacoid. Serta umumnya didahului oleh pembentukan respon imun. Respon imun terjadi bila sejumlah sel yang mampu menimbulkan kekebalan diaktifkan untuk merespon organism asing atau substansi antigenik yang terlepas selama respon terhadap inflamasi akut serta kronis. Akibat respon imun bagi tuan rumah mungkin menguntungkan, seperti bilamana ia menyebabkan organisme penyerang menjadi difagositosis atau dinetralisir. Inflamasi kronis melibatkan keluarnya sejumlah mediator yang tidak menonjol pada respon akut. salah satu dari kondisi yang melibatkan mediator-mediator ini adalah arthritis rheumatoid (Katzung, G, 2002).

E. Antiinflamasi

Antiinflamasi adalah sebutan untuk agen/obat yang bekerja melawan atau menekan proses peradangan. Terdapat tiga mekanisme yang digunakan untuk

menekan peradangan yaitu pertama penghambatan enzim siklooksigenase. Siklooksigenase mengkatalisa sintesis pembawa pesan kimia yang poten yang disebut prostaglandin, yang mengatur peradangan, suhu tubuh, analgesia, agregasi trombosit dan sejumlah proses lain. Mekanisme kedua untuk mengurangi peradangan melibatkan penghambatan fungsi-fungsi imun. Dalam proses peradangan, peran prostaglandin adalah untuk memanggil sistem imun. Infiltrasi jaringan local oleh sel imun dan pelepasan mediator kimia oleh sel-sel seperti itu menyebabkan gejala peradangan (panas, kemerahan, nyeri). Mekanisme ketiga untuk mengobati peradangan adalah mengantagonis efek kimia yang dilepaskan oleh sel-sel imun. Histamin, yang dilepaskan oleh sel mast dan basofil sebagai respon terhadap antigen, menyebabkan peradangan dan konstiksi bronkus dengan mengikat respon histamine pada sel-sel bronkus (Olson, 2004).

Sampai beberapa tahun yang lalu, ada dua jalan untuk mengurangi peradangan secara farmakologi. Pendekatan yang pertama adalah kortikosteroid, dan yang kedua adalah penggunaan obat antiinflamasi non steroid (AINS) (Olson, 2004).

1. Antiinflamasi Non Steroid (AINS)

Obat-obat antiinflamasi non steroid (AINS) merupakan suatu grup obat yang secara kimiawi tidak sama dan berbeda aktivitas antiinflamasinya. Obat-obat ini bekerja dengan jalan menghambat enzim siklooksigenase tetapi tidak menghambat enzim lipooksigenase (Mycek dkk, 2001). Walaupun demikian obat-obat ini memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek samping.

2. Antiinflamasi steroid

Golongan steroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin melalui penghambatan metabolisme asam arakidonat. Dalam klinik umumnya kortikosteroid dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Efek terapeutik glukokortikoid yang paling penting adalah kemampuannya untuk mengurangi respon peradangan secara dramatis. Efek ini didapat dari proses penurunan dan penghambatan limfosit serta makrofag perifer A2 secara tidak langsung yang menghambat pelepasan asam arakidonat, prekursor prostaglandin dan leukotrien (Mycek, 2001).

Setelah pemberian dosis tunggal glukokortikoid bekerja singkat dengan konsentrasi neutrofil meningkat yang menyebabkan pengurangan jumlah sel pada daerah peradangan (Katzung, 2002).

3. Diklofenak

Diklofenak adalah derivat sederhana dari asam fenilasetat yang menyerupai flurbiprofen dan melofenamot, obat ini adalah penghambat *cyclooxygenase* yang relatif nonselektif dan kuat serta mengurangi aktifitas asam arakidonat obat ini mempunyai waktu paruh 1-2 jam. Obat ini dilaporkan dapat mengurangi sintesis prostaglandin dan leukotrien. Efek-efek yang tidak diinginkan bisa terjadi pada kira-kira 20% dari pasien dan meliputi distress gastrointestinal, pendarahan gastrointestinal yang terselubung dan timbulnya ulserasi lambung, sekalipun timbulnya ulkus lebih jarang terjadi daripada dengan beberapa AINS lainnya (Katzung, 2002). Walaupun waktu paruhnya singkat, diklofenak diakumulasikan di

cairan sinovia yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut.

a. Farmakokinetik

Natrium Diklofenak diabsorpsi secara cepat dan sempurna setelah pemberian oral; konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 2 sampai 3 jam. Pemberian bersama dengan makanan dapat memperlambat laju absorpsi tetapi tidak mengubah jumlah yang diabsorpsi (Gilman, A.G, 2014).

b. Farmakodinamik

Natrium Diklofenak mempunyai aktivitas antiinflamasi yaitu menghambat aktivitas dari enzim siklooksigenase yang mengurangi produksi prostaglandin oleh jaringan.

c. Efek Samping

Toksisitas Natrium Diklofenak serupa dengan toksisitas obat AINS lain, misalnya masalah saluran cerna dan obat ini juga dapat meningkatkan kadar enzim hepar (Gilman, A.G, 2014).

F. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi mencit

Phylum	: Chordata
Sub phylum	: Vertebrata
Class	: Mammalia
Ordo	: Rodentia
Family	: Muridae

Genus : Mus

Species : *Mus musculus*

Mencit (*Mus musculus L.*) termasuk mamalia pengerat (rodensia) yang cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomisnya dan fisiologisnya terkarakteristik dengan baik. Mencit yang sering digunakan dalam penelitian di laboratorium merupakan hasil perkawinan tikus putih “*inbreed*” maupun “*outbreed*”. Dari hasil perkawinan sampai generasi 20 akan dihasilkan strainstrain murni dari mencit (Budhi Akbar, 2010).

2. Ciri – ciri

Mencit (*Mus musculus L.*) memiliki ciri-ciri berupa bentuk tubuh kecil, berwarna putih, memiliki siklus estrus teratur yaitu 4-5 hari. Kondisi ruang untuk pemeliharaan mencit (*Mus musculus L.*) harus senantiasa bersih, kering dan jauh dari kebisingan. Suhu ruang pemeliharaan juga harus dijaga kisarannya antara 18-19°C serta kelembaban udara antara 30-70% (Budhi Akbar, 2010).

Mencit betina dewasa dengan umur 35-60 hari memiliki berat badan 18-35g. Lama hidupnya 1-2 tahun, dapat mencapai 3 tahun. Masa reproduksi mencit betina berlangsung 1,5 tahun. Mencit betina ataupun jantan dapat dikawinkan pada umur 8 minggu. Lama kebuntingan 19-20 hari. Jumlah anak mencit rata-rata 6-15 ekor dengan berat lahir antara 0,5-1,5 g (Budhi Akbar, 2010).

Mencit digunakan sebagai hewan model hidup dalam berbagai kegiatan penelitian terutama yang akan diterapkan pada manusia. Hewan ini mudah didapat,

mudah dikembangbiakkan dan harganya relatif murah, ukurannya kecil sehingga mudah ditangani, dan jumlah anak sepelahirannya banyak (Lala Somala, 2006). Hewan ini termasuk dalam filum Chordata, kelas mammalia, ordo Rodentia, familia Muridae, genus *Mus* dan spesies *Mus musculus*. Sifat biologis mencit menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988).

Tabel 1. Sifat Biologis Mencit (*Mus musculus*)

Kriteria	Keterangan
Lama hidup (tahun)	1-3 dapat 4
Lama produksi ekonomis (bulan)	9
Lama bunting (hari)	19-21
Kawin sesudah beranak (jam)	1-24
Umur disapih (hari)	21
Umur dewasa (hari)	35
Umur dikawinkan (minggu)	8
Berat dewasa	
Jantan (g)	20-40
Betina (g)	18-35
Berat lahir (g)	0,5-1,0
Jumlah anak (ekor)	6-15
Kecepatan tumbuh (g/hari)	1

Sumber : Smith dan Mangkoewidjojo (1988)

Mencit digunakan dalam berbagai penelitian dan diagnosis dalam bidang obat-obatan dan kosmetik seperti penelitian tentang ketuaan, virologi, anemia, kegemukan, kekerdilan, diabetes melitus, penyakit ginjal dan tingkah laku (*behavior*). Mencit hidup dalam daerah yang cukup luas penyebarannya mulai dari iklim dingin, sedang maupun panas dan dapat hidup terus menerus didalam kandang (Malole dan Pramono, 1989). Temperatur ruangan untuk pemeliharaan mencit berkisar antara 20-25°C dengan kelembaban 45-55% (Lala Somala, 2006).

Mencit merupakan hewan yang jinak, lemah, mudah ditangani, takut cahaya dan aktif pada malam hari. Mencit yang dipelihara sendiri makannya lebih sedikit dan bobotnya lebih ringan dibanding yang dipelihara bersama-sama dalam satu kandang (Yuwono *et al.*, 1994). Mencit merupakan binatang proliflik. Kelahiran anak mencit biasanya berlangsung satu sampai empat jam. Mencit betina mengelompokkan semua anaknya setelah anak terakhir keluar kemudian menyusui anak-anaknya (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988; Lala Somala, 2006).

G. Metode Pengujian

Metode pengujian efek antiinflamasi suatu bahan calon obat dilakukan berdasarkan kemampuan obat uji mengurangi atau menekan derajat udema pada hewan percobaan. Induksi udema dilakukan pada kaki hewan percobaan, dengan cara menyuntikan larutan albumin putih telur secara intraplantar. Kemudian obat diberikan secara topikal. Ukuran udema kaki tikus diukur dengan alat yang bekerja berdasarkan hukum Arhimedes pletysmometer) (Widysusanti, dkk, 2011).

Perbedaan metode pengujian terletak pada cara menginduksi edema pada hewan percobaan, yaitu induksi secara kimia (menggunakan berbagai bahan kimia dan berbagai cara pemberian induktor), secara fisika (penyinaran radiasi ultraviolet) secara mekanik dan induksi oleh mikroba (Widysusanti, dkk, 2011).

Efek antiinflamasi obat uji ditunjukkan oleh kemampuannya mengurangi edema yang diinduksi pada kaki hewan uji (Widysusanti, dkk, 2011).

1. Metode-metode uji antiinflamasi

a. Metode pembentukan edema buatan

Metode ini didasarkan pengukuran volume dari edema buatan. Volume edem diukur sebelum dan sesudah pemberian bahan uji. Contoh iritan yang dipakai adalah formalin, kaolin, ragi, dan dekstran. Iritan yang umum digunakan dan memiliki kepekaan yang tinggi adalah karagen (Alfi Inayati, 2010).

b. Metode pembentukan eritema

Metode ini didasarkan pengamatan secara visual terhadap eritema pada kulit hewan yang telah dicukur bulunya. Eritema dibentuk akibat iritasi inar UV selama 20 detik sehingga terjadi vasodilatasi yang diikuti dengan meningkatnya permeabilitas pembuluh darah dan leukositosis lokal. Dua jam kemudian eritema yang terbentuk diamati (Alfi Inayati, 2010).

c. Metode iritasi dengan panas

Metode ini berdasarkan luas radang dan berat edema yang terbentuk setelah diiritasi dengan panas. Mula-mula hewan diberi zat pewarna tripan biru yang disuntikkan secara IV, dimana zat ini akan berikatan dengan albumin

plasma. Kemudian pada daerah penyuntikan tersebut dirangsang dengan panas yang cukup tinggi. Panas menyebabkan pembebasan histamine endogen sehingga timbul inflamasi. Zat warna akan keluar dari pembuluh darah yang mengalami dilatasi bersama-sama dengan albumin plasma sehingga jaringan yang meradang kelihatan berwarna. Penilaian derajat inflamasi diketahui dengan mengukur luas radang akibat perembesan zat ke jaringan yang meradang. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan menimbang edema yang terbentuk, dimana jaringan yang meradang dipotong kemudian ditimbang (Alfi Inayati, 2010).

d. Metode pembentukan kantong granuloma

Metode ini berdasarkan volume pengukuran eksudat yang terbentuk di dalam kantong granuloma. Mula-mula benda berbentuk pellet yang terbuat dari kapas yang ditanam dibawah kulit abdomen hewan coba menembus linia alba. Respon yang terjadi berupa gejala iritasi, migrasi leukosit dan makrofag ke tempat radang yang mengakibatkan kerusakan jaringan dan timbullah granuloma (Alfi Inayati, 2010).

e. Metode iritasi pleura

Metode ini berdasarkan pengukuran volume eksudat yang terbentuk karena iritasi dengan induktor radang. Adanya aktivitas obat yang diuji ditandai dengan berkurangnya volume eksudat. Obat diberikan secara oral. Satu jam kemudian disuntik dengan induktor radang seperti formalin. Setelah 24 jam hewan dibunuh dengan eter lalu rongga pleura dibuka dan volume eksudat inflamasi diukur (Alfi Inayati, 2010).

f. Metode penumpukan Kristal synovitis

Pada percobaan ini telapak kaki hewan coba disuntik dengan suspensi ragi brewer dalam larutan metil selulosa secara subkutan. Akibat penyuntikan ini menyebabkan suhu rectal lebih kurang 2°C atau lebih. Pada waktu 18 jam setelah penyuntikan diberikan obat secara oral dan suhu rectal diukur dalam selang waktu 30 menit (Alfi Inayati, 2010).

2. Bahan yang dapat digunakan sebagai penginduksi antara lain :

a. Complete Freund's Adjuvant

Complete Freund's Adjuvant adalah emulsi air dalam minyak yang mengandung *Mycobacterium butyricum* yang digunakan untuk meningkatkan antigen dan menstimulasi respon imun yang lebih baik dibandingkan dengan antigen saja. Injeksi CFA pada hewan percobaan akan memberikan respon inflamasi yang sangat keras. Untuk itu, pada percobaan antiinflamasi injeksi pada telapak kaki dibenarkan secara ilmiah jika hanya diberikan pada satu kaki saja pada tiap percobaan (Widysusanti, dkk, 2011).

b. Karagen

Karagen adalah senyawa polisakarida yang berasal dari rumput laut *Chondus crispus*. Karagen diperoleh sebagai hasil ekstraksi karaginofit dengan air dan larutan alkali. Proses ekstraksi karagen dilakukan melalui proses modifikasi dengan alkali, filtrasi, presipitasi atau koagulasi dengan alkohol, pengeringan dan terakhir penghancuran menjadi tepung karagen.

Pada umumnya karagen dapat berinteraksi dengan makromolekul yang bermuatan, misalnya protein sehingga mampu memberikan jenis pengaruh seperti peningkatan viskositas, pembentukan gel, pengendapan dan stabilitas (Widysusanti, dkk, 2011).

c. Albumin putih telur

Albumin merupakan jenis Protein terbanyak di dalam plasma yang mencapai kadar 60%. Manfaatnya untuk pembentukan jaringan sel baru. Didalam ilmu kedokteran, albumin ini dimanfaatkan untuk mempercepat Pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak. Albumin juga berperan mengikat obat-obatan serta logam berat yang tidak mudah larut dalam darah. Albumin adalah istilah untuk suatu jenis protein yang larut dalam air. Albumin dapat ditemukan dalam putih telur dan darah manusia. Secara teknis albumin putih telur dikenal sebagai ovalbumin (Widysusanti, dkk, 2011).

d. Venomular

Venom merupakan zat yang diperoleh dari spesimen *B.asper* dewasa yang berada di bagian Pacific Costa Rica dan hidup di kolam lebih dari 40 individu. Pada kondisi dingin venom dapat bertahan pada suhu -200 C' Venom memediasi enzim cyclooxygenase produksi eucosanoid lipooxygenase dan mengaktivasi alfa I dan 2 reseptor adrenergik (Widysusanti, dkk, 2011).

H. Karagen

Karagen merupakan polisakarida sulfat yang berasal dari tanaman *Chondrus crispus* (Karagen merupakan suatu polisakarida sulfat bermolekul besar sebagai

induktor inflamasi. Penggunaan karagen sebagai penginduksi radang memiliki beberapa keuntungan antara lain tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kerusakan jaringan dan memberikan respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibanding senyawa iritan lainnya (Corsini dkk., 2005).

Pada proses pembentukan edema, karagen akan menginduksi cedera sel dengan dilepaskannya mediator yang mengawali proses inflamasi. Edema yang disebabkan induksi karagen dapat bertahan selama 6 jam dan berangsur –angsur berkurang dalam waktu 24 jam. Edema yang disebabkan oleh injeksi karagen diperkuat oleh mediator inflamasi terutama PGE1 dan PGE2 dengan cara menurunkan permeabilitas vaskuler. Apabila permeabilitas vaskuler turun maka protein-protein plasma dapat menuju ke jaringan yang luka sehingga terjadi edema (Corsini dkk, 2005).

I. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat

Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* menciptakan makhluk-Nya dengan memberikan cobaan dan ujian, lalu menuntut konsekuensi kesenangan, yaitu bersyukur dan konsekuensi kesusahan, yaitu sabar. Semua ini bisa terjadi dengan Allah membalikkan berbagai keadaan manusia sehingga peribadahan manusia kepada Allah menjadi jelas. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa musibah, penderitaan dan penyakit merupakan hal yang lazim bagi manusia dan semua itu pasti menimpa mereka. Hal ini untuk mewujudkan peribadahan kepada Allah semata, serta untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Baik dan buruk semua ada manfaatnya.

Hal tersebut sesuai firman Allah swt. Q.S. Al Mulq (67) ; 2 :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠٠﴾

Terjemahnya :

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Departemen Agama, 2005).

Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohani tanpa mengindahkan aspek jasmania. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi, dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan ukhrawi (Al-Qaradhawi, 2001).

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, demikian sabda Nabi Muhammad Rasulullah *Ṣallāllāhu ‘Alayhi Wa Sallam*. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah dalam memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sebagaimana Islam memperhatikan kesehatan, Islam juga memperhatikan pengobatan baik yang bersifat kuratif maupun preventif. Dan Islam menentang

pengobatan versi dukun dan para tukang sihir. Dalam hal ini dukun yang dimaksud adalah perdukunan yang tidak berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist. Misalnya dukun yang mengobati dengan menggunakan jimat atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, karena perbuatan ini termasuk mempersekutukan Allah (syirik). Adapun dukun yang diperbolehkan misalnya dukun beranak, yang membantu kelahiran bayi dengan cara-cara tradisional dan tidak berbuat syirik.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari dengan ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hukum sebab akibat, Obat atau syifa merupakan zat yang berfungsi untuk memberikan suplemen bagi tubuh untuk meregenerasi sel yang rusak dan menyembuhkan penyakit. Perkembangan zaman juga meningkatkan jumlah penyakit yang menyerang manusia. Penyakit tertentu ada yang sudah diketahui obatnya dan ada pula yang belum diketahui. Namun, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hamba-Nya melewati batas kemampuan mereka. Setiap penyakit pasti ada obatnya, seperti sabda Rasulullah *Ṣallāllāhu 'Alayhi Wa Sallam* Islam sangat menganjurkan untuk memperhatikan tentang pengobatan baik itu dari segi keharusan berobat dan hukum bahan-bahan yang digunakan dalam berobat. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaii Wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaii Wa Sallam*, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءِ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abi Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim)”

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani dan penyakit jasmani (Faiz, 1991: 324). Penyakit jasmani sering muncul karena dipicu faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan dalam makanan atau malas mengkonsumsi zat-zat gizi seperti vitamin dan sebagainya.

Keanekaragaman hayati tanaman obat yang dimiliki Indonesia merupakan sumber daya yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat sebagai bahan baku obat tradisional. Hal ini ditunjang dengan penggunaan obat di masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk kembali ke alam dengan memanfaatkan berbagai tanaman obat, karena obat sintesis dirasakan terlalu mahal dengan efek samping yang cukup besar, sehingga konsumsi obat tradisional di Indonesia semakin meningkat (Hendri Wasito, 2008).

Tumbuhan dipandang sebagai pelindung yang selektif dari hal yang membahayakan. Setiap tumbuhan atau rerumputan pada dasarnya merupakan apotek lengkap yang menyediakan zat-zat penting dengan banyak spesies yang telah diciptakan oleh Allah berdasarkan pada hikmah dan ketetapanNya. Dan bukankah ini membuka mata dan pikiran kita atas ciptaan Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* yang

memiliki banyak manfaat dan tidak tercipta sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhānahū Wa Ta‘ālā dalam Q.S Ali- Imran/3 : 191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Departemen Agama, 2005).

Di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk memikirkan alam semesta, memperhatikan ayat-ayat-Nya dan merenungkan ciptaan-Nya. Yakni dalam setiap keadaan. Menurut Ibnu Abbas, bahwa maksudnya mereka melakukan shalat sesuai kemampuan, yakni jika tidak sanggup berdiri, maka sambil duduk dan seterusnya. Namun demikian, ayat ini mencakup semua dzikir lainnya dengan lisan maupun hati. Memikirkan kekuasaan Penciptanya atau memikirkan maksudnya (Marwan, Yahya Abu Bin Musa).

Ayat ini menunjukkan bawa berpikir merupakan ibadah dan termasuk sifat wali-wali Allah Subhānahū Wa Ta‘ālā yang mengenal-Nya. Setelah mereka memikirkannya, mereka pun tahu bawa Allah Subhānahū Wa Ta‘ālā tidak menciptakannya sia-sia. Bahkan di sana terdapat dalil sempurnanya kekuasaan-Mu. Yakni dari menciptakan sesuatu secara main-main (Marwan, Yahya Abu Bin Musa).

Telah menjadi ciri *Ulû al-Albâb* bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* dalam hati di mana pun mereka berada, dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Mereka selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan keunikan yang terkandung di dalamnya sambil berkata, "Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu. Hindarkanlah kami dari siksa neraka, dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintah-Mu.

Berdzikir dan berfikir adalah ciri khas orang yang beriman dalam mengamati ciptaan Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* yang berguna bagi manusia. Tumbuhan setidaknya memiliki fungsi sebagai obat dengan khasiat yang berbeda dan beraneka macam mulai dari akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga, secara keseluruhan memiliki khasiat dan kandungan zat aktif yang berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* dalam Q.S Al-An'am (6) : 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu dengan segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitu dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Departemen Agama, 2005).

Ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan biji atau benih atau yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang. Bermula dengan menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu kami, yakni Allah *Subhānahū Wa Ta‘ālā* mengeluarkan, yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau (Shihab, 2002).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih.

Selanjutnya Allah *Subhānahū Wa Ta‘ālā* memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir yaitu bahwa dan dari mayang, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitu dan delima yang

serupa bentuk buahnya dan *tidak serupa* aroma dan kegunaannya. *Perhatikanlah* buah yang dihasilkan dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase *diwaktu* pohonnya *berbuah*, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase *Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman* (Shihab, 2002).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab *al-Muntakhab fi al-tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi tadi untuk didistribusikan kebagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah (Shihab, 2002).

Kata نَبَاتٍ (*nabat*) dalam kamus bermakna Tumbuh-Tumbuhan tanaman, jadi kata نَبَاتٍ (*nabat*) dalam ayat ini bermakna semua kehidupan yang tumbuh dari tanah. Seperti rerumputan, pepohonan, bunga dan sebagainya. Sedangkan didalam Tafsir al-Qurtuby di jelaskan bahwa kata نَبَاتٍ (*nabat*) berbagai dari macam tumbuhan, juga dikatakan karunia setiap mahluk hidup (Tafsir al-Baghawy, 1997).

Kata *خضرا* (*khadhr*) pada ayat tersebut memiliki arti yang tidak jauh berbeda dalam beberapa kamus. Di dalam kamus Mahmud Yunus, kata *خضرا* (*khadhr*) berasal dari kata *خضر-يخضر-خضرا* yang artinya hijau. Sedangkan *خضرا* (*khadhr*) artinya yang hijau. Sedangkan dalam kamus Lisan al-A'rab, *خضرا* (*khadhr*) yaitu *لون الأخضر، يكون ذلك في الحيوان والنبات: الخضرة من الألوان* , artinya *khadhr* adalah satu nama dari warna yang terdapat pada hewan dan tumbuhan dan selainnya. Adapun penjelasannya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Maraghi dan didalamnya hanya dijelaskan bahwa *خضرا* (*khadhr*) itu adalah tanaman dan pepohonan yang hijau (Tafsir al-Baghawy, 1997).

Namun jika diteliti kembali hijau yang terdapat pada tumbuhan tadi adalah klorofil pada istilah sainsnya. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia anabolisme, pembentukan zat makanan atau tenaga yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara (tanah), karbon dioksida, dan air serta diperlukan bantuan tenaga cahaya matahari. Klorofil memberi warna hijau pada daun tumbuhan hijau karena adanya klorofil, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari tenaga yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis

menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebahagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Para ahli tumbuh-tumbuhan mendapati bahwa klorofil merupakan pengeluar tunggal di muka bumi yang menghasilkan makanan dan oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk hidup sesuai dengan tahapannya.

Jadi kata نَبَات (*nabat*) dan خضرا (*khadhr*) maknanya tidak jauh berbeda, karena pada dasarnya tumbuh-tumbuhan itu sifatnya berwarna hijau dan tumbuh di tanah yang subur juga banyak manfaatnya terutama dalam hal pengobatan.

Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantara klorofil dengan menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makan organik yang dibentuknya.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā*. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernafasan manusia dan sejumlah jenis hewan, berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun. Atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen mengandung atom zat besi di dalam molekul hemoglobin. hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium dalam molekul klorofil. Di dunia kedokteran, ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Pencampuran itu kemudian memberikan

tenaga dan kekuatan melawan berbagai macam bakteri penyakit. Dengan demikian ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit.

Sehubungan dengan itu Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S Asy-Syu'ara'/26 : 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Departemen Agama, 2005).

Ayat-ayat al-Qur'an yang baru diturunkan yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan untuk mereka serta mengingatkan mereka hal yang bermanfaat dan hal yang bermadharat. Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* berfirman mengingatkan mereka untuk berpikir karena yang demikian bermanfaat bagi mereka.

Adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah di bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahaesa dan Mahakuasa.

Usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam pemberian Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* . Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* menurunkan hujan, manusia mengatur pengairan. Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* mentakdirkan biji-bijian dan

tumbuh-tumbuhan, manusia mengatur kebun-kebun dan sawah dan menyusunnya menurut keadaan buminya.

Segala suatu adalah ciptaan Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* swt, baik itu pepohonan maupun rumput-rumputan yang tumbuh diatas tanah tanpa nyawa, ataupun binatang-bintang kecil dan besar yang kalian bisa memanfaatkannya. Semua itu adalah makhluk Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* yang tentunya untuk memanfaatkannya harus dengan ijin Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā*.

Dari ayat tersebut dapat dipahami adanya perintah manusia untuk memperhatikan bumi, yang mana dapat diartikan sebagai perintah untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut.

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenis dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugrah Allah, yang harus dipelajari dan dimanfaatkan. Seperti disebutkan dalam Q.S Al-Qashash (28) : 57

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

“Dan mereka berkata: "Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya Kami akan diusir dari negeri kami". dan Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Departemen Agama, 2005).

Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan, dan bahan obat-obatan. Subhanallah begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak pernah mengharap balasan dari makhluk lain (Savitri, 2002).

Salah satu tanaman yang berkhasiat dalam dunia pengobatan yaitu *Pterocarpus indicus* Willd. Dalam bahasa Filipina angkana disebut juga dengan nama *Narra*, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama Angkana Kembang atau Sonokembang. Khasiat dari Angkana Kembang ini adalah untuk mengobati disentri, diare, dan sifilis. Selain itu, secara empiris daun angkana digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit seperti bisul, biang keringat, jerawat, burut (pecah-pecah di bagian vagina), luka, koreng, borok.

Begitu banyak manfaat dari tanaman Angkana, hal ini seiring dengan firman Allah *Subhānahū wa ta'ālā* dalam Q.S Ali-Imran (3) : 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

“ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Departemen Agama, 2005).

Semua yang diciptakan oleh Allah *Subhānahū Wa Ta'ālā* memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen, salah satunya adalah pemanfaatan sebagai obat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorium yang menggunakan mencit sebagai hewan coba.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmakologi Universitas Muslim Indonesia.

B. Pendekatan ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di laboratorium yang menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan dalam suatu fenomena yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Penelitian eksperimental adalah suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan (*experiment*) yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperiment tersebut

C. Alat dan Bahan

1. Alat yang Digunakan

Adapun alat-alat yang digunakan eksikator (*Lion Star*[®]), gelas ukur (*Pirex Iwaki*[®]), kain putih, kandang mencit, kanula, kipas angin (*cosmos*[®]), klem, lap halus, lap kasar, lumpang, neraca analitik (*Precisa*[®]), oven (*Memmert*[®]), pipet tetes,

pletismometer (PanLab LE 7500), rotary evaporator (Heidolph), sendok tanduk, spatel, toples, spoit injeksi 1 ml (One-med), spoit oral 1 ml (One-med), tangas air, dan wadah (royalex).

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah daun angšana (*Ptercarpus indicus* Willd) yang diperoleh dan dikumpulkan dari Salojampu, Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo. Hewan uji yang digunakan yaitu mencit (*Mus musculus*).

Bahan kimia yang digunakan adalah aquadest, etanol 70%, Na-CMC, NaCl 0,9%, tablet Natrium Diklofenak, karagen.

D. Metode Kerja

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel daun angšana (*Ptercarpus indicus* Willd) diperoleh di Salojampu, Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Daun yang diambil mulai dari daun pucuk hingga daun kelima dari pucuk yang tidak rusak dan tidak berjamur.

b. Pengolahan sampel

Daun angšana (*Ptercarpus indicus* Willd) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir dan dikeringkan dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari langsung, kemudian dipotong-potong kecil.

2. Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah Mencit Jantan sebanyak 15 ekor, dipilih yang berbadan sehat, dewasa dengan bobot badan 20-30 gram. Mencit Jantan, diadaptasikan dengan lingkungan selama 1 minggu dan sebelum digunakan tidak menunjukkan adanya penurunan bobot badan, kemudian dibagi dalam 5 kelompok dengan tiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit jantan.

E. Uji Efek Antiinflamasi

Pengujian efek antiinflamasi ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu penyiapan hewan coba, penyiapan bahan uji, penyiapan pembanding, kontrol, penginduksi radang dan pengujian efek antiinflamasi. Pengujian efek antiinflamasi dilakukan pada masing-masing konsentrasi ekstrak etanol daun angšana (4%, 6%, dan 8%) dengan menggunakan hewan percobaan mencit (*Mus musculus*).

F. Penyiapan Bahan Uji

1. Ekstraksi Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Angšana

Simplisia daun angšana (*Ptercarpus indicus* Willd) ditimbang sebanyak 300 g dimasukkan dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 70% hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan selama 3 x 24 jam. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya sampai diperoleh ekstrak etanol 70% kental. Selanjutnya ekstrak dibebaskan etanolkan.

2. Pembuatan larutan koloidal Na-CMC

Sebanyak 1 gram Na- CMC dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam gelas kimia 100 ml yang berisi 50 ml air suling panas (70^0) sambil di aduk dengan batang pengaduk hingga terbentuk larutan koloidal, lalu volumenya di cukupkan dengan air suling hingga 100 ml.

3. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak

Sebanyak 10 tablet Natrium Diklofenak (setiap tablet mengandung natrium diklofenak 25 mg) ditimbang, kemudian dihitung bobot rata-rata lalu digerus.

Tablet natrium diklofenak yang telah digerus di timbang kemudian disuspensikan dengan dalam larutan Na-CMC 1% sebanyak 10 ml sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen dalam gelas kimia 100 ml.

4. Pembuatan Suspensi Karagen 1%.

Karagen 1% di peroleh dengan mensuspensikan dan dilarutkan dalam larutan natrium klorida 0,9% dalam beker gelas.

G. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Mencit di kelompokkan menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor mencit. Mencit ditimbang beratnya, untuk mendapatkan dosis pemberian yang sesuai. Mencit dipuasakan selama 18 jam sebelum perlakuan. Volume kaki mencit diukur dan dicatat sebagai volume dasar untuk tiap mencit.

Semua hewan uji diukur volume telapak kaki normal menggunakan pletismometer dan diinduksi dengan karagen 1%, disuntikkan intraplanar. Satu jam

setelah induksi , diukur volume telapak kaki mencit, kemudian diberikan perlakuan sesuai masing-masing kelompok.

Masing-masing kelompok diberi perlakuan, yaitu:

1. kelompok kontrol negatif : diberi Na CMC 1%
2. kelompok kontrol positif : diberi suspensi Natrium Diklofenak
3. kelompok uji 1 : diberi ekstrak etanol daun angkana dengan konsentrasi 4%
4. kelompok uji 2 : diberi ekstrak etanol daun angkana dengan konsentrasi 6%
5. kelompok uji 3: diberi ekstrak etanol daun angkana dengan konsentrasi 8%

H. Pengamatan dan Pengumpulan Data

Setelah semua hewan uji mencit mendapat perlakuan, masing-masing ditempatkan dalam kandang mencit sesuai dengan kelompok masing-masing, kemudian diamati dengan cara mengukur volume kaki mencit dengan menggunakan Pletismometer, kemudian dicatat data yang diperoleh dari perlakuan.

I. Pengolahan Data

Data hasil penelitian akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, data perbandingan variasi konsentrasi akan ditentukan melalui analisis statistik menggunakan rancangan acak lengkap karena penelitian ini merupakan penelitian instrumental sehingga lebih tepat menggunakan RAL.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Daun Angsana (*Pterocarpus indicus willd*)

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Daun Angsana (*Pterocarpus indicus willd*)

No.	Sampel	Berat sampel	Berat Ekstrak	%rendamen
1.	Daun Angsana	300 gram	17,1 gram	5,7 %

2. Data pengukuran volume Edema

Tabel 3. Persentase rata-rata Penurunan volume edema telapak kaki mencit, mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian peroral sediaan uji, dibandingkan dengan sediaan kontrol.

Perlakuan	Penurunan edema rata-rata (ml)
Kontrol negatif (Na CMC)	0 ml
4%	0,023 ml
6%	0,03 ml
8%	0,04 ml
Kontrol Positif (Na-diklofenak)	0,05 ml

Tabel 4. Penurunan volume Edema telapak kaki mencit, mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian peroral sediaan uji, dibandingkan dengan sediaan kontrol.

Perlakuan	Hewan uji	Pra perlakuan (ml)	Vt (setelah induksi)	Volume Penurunan Edema Tiap 6 Jam Setelah Induksi						Penurunan Edema (ml) ($V_t - V_6$)
				1	2	3	4	5	6	
Kontrol Negatif	1	0.09	0.18	0.21	0.25	0.25	0.21	0.20	0.20	-0,02
	2	0.10	0.18	0.20	0.23	0.24	0.26	0.26	0.26	-0,08
	3	0.09	0.19	0.21	0.22	0.24	0.27	0.27	0.27	-0,08
rata-rata		0.09	0.20	0.20	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0,06
Kontrol Positif	1	0.12	0.21	0.2	0.2	0.15	0.13	0.14	0.12	0.09
	2	0.12	0.21	0.19	0.17	0.15	0.15	0.12	0.11	0.1
	3	0.12	0.19	0.2	0.15	0.19	0.14	0.12	0.1	0.09
rata-rata		0.09	0.18	0.19	0.17	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
ekstrak 4%	1	0.09	0.20	0.20	0.22	0.19	0.18	0.19	0.17	0.03
	2	0.15	0.25	0.19	0.25	0.18	0.17	0.18	0.14	0.07
	3	0.17	0.20	0.25	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13	0.07
rata-rata		0.13	0.21	0.2	0.2	0.18	0.17	0.17	0.14	0.05
ekstrak 6%	1	0.15	0.24	0.23	0.18	0.19	0.18	0.17	0.16	0.05
	2	0.14	0.25	0.24	0.21	0.17	0.2	0.19	0.17	0.06
	3	0.12	0.24	0.2	0.16	0.15	0.18	0.16	0.15	0.06
rata-rata		0.13	0.24	0.22	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16	0.05
Ekstrak 8%	1	0.12	0.25	0.22	0.17	0.14	0.12	0.16	0.15	0.06
	2	0.12	0.28	0.25	0.23	0.19	0.17	0.13	0.14	0.09
	3	0.13	0.23	0.28	0.25	0.21	0.15	0.14	0.13	0.1
rata-rata		0.12	0.25	0.25	0.21	0.18	0.14	0.14	0.13	0.048

Tabel 5. Hasil pengukuran rata-rata Penurunan volume Edema telapak kaki mencit awal, setelah induksi, terapi, dan persen penurunan

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran volume Edema (ml)				
		Awal	Induksi	Terapi	Penurunan Volume Edema setelah perlakuan (Vinduksi - Vterapi)	Persentase Penurunan (%)
Kelompok IV Kontrol (-) Na-CMC	1	0,09	0,18	0,22	0	0
	2	0,10	0,18	0,24	0	0
	3	0,09	0,19	0,25	0	0
Kelompok II Kontrol (+) Natrium diklofenak	1	0,12	0,21	0,16	0,05	23,8%
	2	0,12	0,21	0,15	0,06	28,5%
	3	0,12	0,19	0,15	0,04	21,05%
Kelompok III Ekstrak 4%	1	0,09	0,20	0,19	0,01	5%
	2	0,15	0,21	0,18	0,03	14,2%
	3	0,15	0,20	0,17	0,03	15%
Kelompok IV Ekstrak 6%	1	0,15	0,21	0,18	0,03	14,2%
	2	0,14	0,23	0,19	0,04	17,3%
	3	0,12	0,21	0,17	0,04	19,1%
Kelompok V Ekstrak 8%	1	0,12	0,21	0,16	0,04	20%
	2	0,12	0,23	0,18	0,05	21,7%
	3	0,13	0,23	0,19	0,04	17,3%

B. Pembahasan

Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya. Jaringan yang mengalami inflamasi tersebut melepaskan berbagai zat yang menimbulkan perubahan sekunder yang dramatis disekeliling jaringan yang normal.

Inflamasi ditandai oleh adanya vasodilatasi pembuluh darah lokal yang mengakibatkan terjadinya aliran darah setempat yang berlebihan, peningkatan permeabilitas kapiler. Inflamasi menyebabkan pembekuan cairan di dalam ruang interstisial yang disebabkan oleh fibrinogen dan protein lainnya yang bocor dari kapiler dalam jumlah yang besar. Inflamasi juga menyebabkan migrasi sejumlah besar granulosit dan monosit ke dalam jaringan, pembengkakan sel jaringan (Guyton dan Hall, 1997).

Tanda klasik umum yang terjadi pada proses inflamasi yaitu rubor (kemerahan), tumor (pembengkakan), calor (panas setempat yang berlebihan), dolor (rasa nyeri), dan *functiolaesa* (gangguan fungsi/kehilangan fungsi jaringan yang terkena).

Pengobatan inflamasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan menggunakan bahan sintetik maupun bahan alam. Tetapi, dengan seiring berkembangnya *back to nature*, masyarakat sekarang lebih senang menggunakan bahan alam dibandingkan bahan sintetik karena penggunaan bahan alam lebih banyak

memiliki keuntungan dibandingkan dengan bahan sintetik. Selain harganya lebih murah dan mudah diperoleh, bahan alam mudah untuk diolah menjadi bahan obat dan kurang efek sampingnya.

Salah satu bahan alam yang biasa dijadikan obat antiinflamasi adalah daun Angsana (*Pterocarpus indicus* willd). Daun angšana ini dibuat dalam bentuk simplisia sebelum diolah menjadi ekstrak kemudian dilakukan sortasi basah. Sortasi basah merupakan suatu proses pemisahan daun yang kualitasnya kurang baik seperti daun yang sudah layu ataupun daun yang telah ditumbuhi jamur. Setelah proses sortasi basah, daun dicuci dengan air mengalir yang bersih. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel dipermukaan daun angšana. Setelah proses pencucian, daun diangin-anginkan di dalam ruangan yang terlindung oleh sinar matahari langsung untuk menghindari rusaknya kandungan kimia yang terkandung dalam daun angšana. Salah satu tujuan pengeringan daun yaitu untuk mengurangi kadar air dalam daun, karena kadar air yang tinggi dapat membuat simplisia cepat rusak dan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada simplisia. Pengeringan yang baik adalah dengan suhu rendah dan penguapannya cepat sehingga lingkungan sekitar simplisia tidak lembab

Sampel yang telah kering selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi yang merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan), dan cocok untuk sampel yang bertekstur lunak. Selain itu pemanasan dapat menyebabkan kerusakan kandungan kimia dalam simplisia. Metode ini memiliki keuntungan yaitu semua bagian sampel dapat kontak dengan larutan. Maserasi dilakukan dengan cara

merendam simplisia sebanyak 300 g dalam cairan penyari etanol 70%. Etanol bersifat semipolar sehingga dapat menarik sebagian besar senyawa kimia dalam tanaman, mudah menguap, serta tidak memerlukan panas yang tinggi untuk pemekatan. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi dan dilakukan 2x24 jam, lalu dilakukan remaserasi 2x24 jam. Filtrat yang dihasilkan dirotavapor pada suhu 60⁰ C agar ekstrak menjadi pekat dan kental. Kemudian ekstrak ditimbang dan diperoleh bobot ekstrak sebesar 17,1 gram dengan % rendamen 5,7%. Selanjutnya ekstrak kental di simpan dalam eksikator yang berisi silika gel yang telah aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak.

Setelah itu dilakukan pengujian pada hewan coba dengan uji aktivitas antiinflamasi ekstrak daun angkana (*Pterocarpus indicus* willd) dengan metode yang menggunakan mencit jantan sebagai hewan uji karena mencit jantan memiliki sistem hormonal dan faktor psikologi yang lebih stabil dibanding mencit betina sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian dan karagen sebagai penginduksi. Selain itu, mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan coba mudah untuk diperoleh, mudah ditangani dan murah. Mencit yang digunakan berumur 1 – 2 bulan, karena pada umur tersebut berat mencit 18 – 35 g, berkelamin jantan. Sebelum dilakukan pengujian, mencit dibagi dalam 5 kelompok, yang terdiri dari kelompok kontrol negatif,

kelompok kontrol positif, kelompok ekstrak 4%, kelompok ekstrak 6%, dan kelompok ekstrak 8%, dalam tiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit, kemudian mencit diadaptasikan selama $\pm 1 - 2$ minggu, agar mencit tidak stress dan sakit. Kebersihan dan kesehatan mencit harus dijaga dan diperhatikan. Pada pengujian ini, kaki mencit diinduksi dengan karagen, alasannya bagian kaki mencit tidak ditumbuh bulu, dan penanganannya mudah. Bagian kaki yang digunakan adalah kaki kiri mencit, karena memudahkan peneliti dalam mengukur volume edema pada kaki mencit. Sebelum dilakukan pengujian mencit dipuasakan terlebih dahulu, agar tidak mempengaruhi hasil pengujian nantinya.

Dalam penelitian ini digunakan tablet Natrium diklofenak sebagai pembanding (kontrol positif) karena Diklofenak adalah derivat sederhana dari asam fenilasetat yang menyerupai flurbiprofen dan melofenamat, obat ini adalah penghambat *cyclooxygenase* yang relatif nonselektif dan kuat serta mengurangi aktifitas asam arakidonat. Obat ini mempunyai waktu paruh 1-2 jam. Obat ini dilaporkan dapat mengurangi sintesis prostaglandin dan leukotrien.

Sebelum pemberian bahan uji dilakukan pada hewan coba, terlebih dahulu masing-masing kelompok diinduksikan dengan karagen. Karagen merupakan polisakarida sulfat yang berasal dari tanaman *Chondrus crispus*. Karagen merupakan suatu polisakarida sulfat bermolekul besar sebagai induktor inflamasi. Pada proses pembentukan edema, karagen akan menginduksi cedera sel dengan dilepaskannya mediator yang mengawali proses inflamasi. Edema yang disebabkan induksi karagen dapat bertahan selama 6 jam dan berangsur –angsur berkurang dalam waktu 24 jam.

Edema yang disebabkan oleh injeksi karagen diperkuat oleh mediator inflamasi terutama PGE1 dan PGE2 dengan cara menurunkan permeabilitas vaskuler. Apabila permeabilitas vaskuler turun maka protein-protein plasma dapat menuju ke jaringan yang luka sehingga terjadi edema. Penggunaan karagen sebagai penginduksi radang memiliki beberapa keuntungan antara lain tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kerusakan jaringan dan memberikan respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibanding senyawa iritan lainnya.

Pada pengujian aktivitas antiinflamasi, mencit tiap kelompok perlakuan dipuasakan selama 8 jam dan ditimbang berat badannya, untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai. Dilakukan pengukuran volume awal (normal) pada kaki kiri mencit untuk mengetahui volume kaki sebelum diberi perlakuan lebih lanjut dengan menggunakan alat ukur *Pletismometer Panlab LE 7500*. Setelah itu tiap kelompok perlakuan diinduksi dengan karagen, dengan cara disuntikkan secara intraplantar pada bagian kaki mencit. Setelah diinduksi dengan karagen, ditunggu selama 1 jam, hal ini disebabkan karena 1 jam setelah pemberian karagen terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamine dan serotonin. Lalu diukur volume kaki kiri mencit setelah induksi dengan alat ukur *Pletismometer Panlab LE 7500*, kemudian diberikan ekstrak 4%, 6%, dan 8%, serta kontrol positif, dan kontrol negatif sesuai kelompok perlakuannya. Diukur volume penurunan edema tiap-tiap 1 jam selama 6 jam dengan menggunakan alat *Pletismometer Panlab LE 7500*. Pada jam-jam pertama akan timbul mediator-mediator inflamasi seperti histamine dan serotonin berlangsung selama 90 menit, ini merupakan fase pertama dari

pembentukan edema. Fase kedua yaitu pelepasan bradikinin yang terjadi selama 1,5 jam – 2,5 jam setelah induksi. Fase ketiga adalah terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah. Kemudian edema berkembang cepat dan bertahan pada volume maksimal sekitar 5 jam setelah induksi. Bertahan selama 6 jam dan berangsur-angsur berkurang dalam waktu 24 jam.

Dari data yang diperoleh kemudian dihitung % penurunannya dengan cara menghitung selisih antara volume setelah induksi dengan *karagen* dengan volume penurunan edema akhir dibagi volume setelah induksi kemudian dikalikan 100 % berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian terlihat bahwa semua kelompok perlakuan mengalami penurunan edema. Pada ekstrak 4% terjadi penurunan volume edema rata-rata sebesar 5 %, 14,2 %, dan 15 %. Pada ekstrak 6% terjadi penurunan sebesar 14,2%, 17,3%, 19,1%, sedangkan pada ekstrak 8% terjadi penurunan sebesar 20%, 21,1%, 17,3%. Pada kelompok kontrol positif yang diberi Natrium diklofenak mengalami penurunan volume edema sebesar 23,8%, 28,5%, dan 21,05%. Sedangkan pada kelompok kontrol negatif yang diberi Na CMC pada data hasil penelitian terjadi peningkatan edema secara terus-menerus selama 6 jam pengamatan. Hal ini disebabkan pada kelompok kontrol negatif, yang diinduksi karagen tidak diberi perlakuan apapun sehingga tidak ada rangsangan berupa obat untuk mengurangi edema sehingga edema akan terus membesar atau meningkat. Sehingga presentase penurunan edemanya 0%.

Berdasarkan persentase penurunan yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak 6% dan 8% memberikan aktivitas antiinflamasi paling baik karena tidak

berbeda jauh dengan persen penurunan dosis kontrol positif obat yaitu Natrium diklofenak.

Dari data persentase penurunan volume edema kaki mencit selama 6 jam, menunjukkan adanya aktivitas antiinflamasi yang dihasilkan., hal ini disebabkan karena kemungkinan adanya penghambatan enzim siklooksogenase yang disebabkan oleh flavonoid yang tersari dalam ekstrak, dimana flavonoid secara umum mempunyai kemampuan menghambat enzim lipooksigenase dan siklooksigenase. Flavonoid terutama bekerja pada endotelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya hiperpermeabilitas dan edema. Flavonoid memiliki kemampuan memblok siklooksigenase dan lipooksigenase asam arakidonat sehingga sintesis PGE₂, leukotrien, histamin, bradikinin dan tromboksan terhambat. Adanya kemampuan flavonoid dalam menghambat sintesis mediator inilah yang berperan dalam mengurangi edema. Selain menghambat metabolisme asam arakidonat, flavonoid juga menghambat sekresi enzim lisosom yang merupakan mediator inflamasi. Penghambatan mediator inflamasi ini dapat menghambat proliferasi dari proses radang.

Hasil analisis data secara statistik dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada taraf kepercayaan 0,05% F-hitung lebih besar dari F-tabel yang menunjukkan signifikan artinya ada perbedaan efek antara perlakuan, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh pemberian ekstrak angkana terhadap aktivitas antiinflamasi mencit jantan.

Aktivitas antiinflamasi ekstrak daun angšana dapat dilihat pada hasil analisis uji Tukey, dengan menggunakan spss 16 ternyata pada konsentrasi 4%, 6% dan 8% menunjukkan efek antiinflmasi yang tidak berbeda secara bermakna. Pada konsentrasi 6% dan 8% menunjukkan aktivitas antinflmasi yang tidak berbeda secara bermakna dengan pembanding suspensi natrium diklofenak, sedangkan pada uji lanjutan Duncan secara manual, aktivitas antiinflamasi ekstrak daun angšana menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata antar perlakuan. Data tersebut menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 6%, dan 8% sangat berbeda nyata dengan pembanding positif yaitu natrium diklofenak sehingga ekstrak daun angšana dengan konsentrasi 6%, dan 8% memiliki aktivitas antiinflamasi.

Pada kelompok kontrol negatif yakni Na-CMC, baik dari uji Tukey maupun uji Duncan menunjukkan perbedaan yang nyata pada kelompok perlakuan yaitu kelompok ekstrak 6%, kelompok ekstrak 8%, dan kelompok kontrol positif natrium diklofenak.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak dengan konsentrasi 6% dan 8% memiliki aktivitas yang baik, hal ini mungkin disebabkan oleh semakin tinggi konsentrasi zat aktif yang terkandung di dalamnya semakin banyak yang memberikan aktivitas antiinflamasi, yang artinya zat aktif pada konsentrasi tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk menurunkan volume edema yang sama dengan suspensi natrium diklofenak. Dari uji lanjutan yang dilakukan ekstrak 6% menunjukkan adanya pengaruh nyata/ berbeda nyata dengan kontrol negatif, dan pengaruh tidak nyata/berbeda tidak nyata dengan kontrol positif. Dengan demikian,

ekstrak 6% merupakan konsentrasi yang efektif, yang dapat dijadikan sebagai dosis awal dalam pengobatan edema atau radang.

Pengukuran volume telapak kaki mencit dengan pletismometer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sulitnya mengkondisikan hewan uji dan kejelasan hewan uji pada saat pembacaan skala. Kedua banyaknya zat-zat pengotor yang bercampur pada larutan NaCl 0,9%, dimana NaCl sebagai indikator pembengkakan, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti cairan setiap 1 jam atau ketika cairan terlihat keruh, serta melakukan pengukuran secara triplo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak daun angšana (*Ptereocarpus indicus* willd) memiliki aktivitas antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen.
2. Konsentrasi ekstrak daun angšana 6% dan 8% memiliki aktivitas antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan karagen dengan rata-rata presentase untuk ekstrak 6% yaitu 16,8%, dan untuk ekstrak 8% yaitu 20%.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjut tentang efek antiinflamasi dau angšana dengan konsentrasi yang berbeda dan pelarut ekstraksi yang berbeda.
2. Perlu dilakukan pengujian toksisitas akut dan kronis untuk menunjang tingkat keamanan penggunaan daun angšana sebagai obat herbal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Budhi. *Tumbuhan dengan kandungan senyawa aktifitas yang berpotensi sebagai bahan antifertilitas*. Jakarta : adabia press. 2010.
- Alwy, Ahmad. *Uji Aktifitas Penyembuhan Luka Bakar Ekstrak Metanol Daun Kayu Colok (Samanea Saman) Dalam Bentuk Sediaan Krim*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar. 2012.
- Apriani, Retno Diah. *Uji Efek Antiinflamasi Kombinasi Ekstrak Air Akar Tanaman Akar Kucing (Acalypha indica Linn) dan Ekstrak Etanol 70% Rimpang Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc) Terhadap Udem Telapak Kaki Tikus yang Diinduksi Dengan Karagen*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universtas Indonesia. 2011.
- Corsini, E., Paola R. D., Viviani, B., Genovese, T., Mazzon, E., Lucchi, L., Galli, C.L., and Cuzzorcrea S. Increased Carragenan-Induced Acute Lung Inflammation in Old Rats, *Immunology*. 2005.
- Deni Damayanti. 2013. *Pintar Meracik Sendiri Ramuan Herbal Untuk Penyakit Kanker DM, dan Tekanan Darah Tinggi*. Yogyakarta : Araska.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an al- Karim*. Bandung : CV. Penerbit J-ART. 2005.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Sediaan Galenik*. Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta. 1986.
- Dharmawan Ferdian Ricky. *Pengujian Aktivitas Hipoglikemik Ekstrak Air Daun angšana Pterocarpus Indicus Willd Terhadap Histopatologi Sel Hepar Tikus Diabetes Aloksan*. Skripsi Sarjana Farmasi. Universitas Katholik Widya Mandala, Surabaya. 2013.
- Fatimah, Cut, dkk. *Uji Aktivitas Antibakteti Ekstrak Daun Angšana (Pterocarpus indicus Willd) Secara In Vitro*. Jurnal Ilmiah PANMMED. Vol. 1 No. 1 Juli. Medan. 2006.
- Fitriyani, Atik dkk. *Uji Antiinflamasi Ekstrak Metanol Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav) Pada Tikus Putih*. Fakultas Farmasi Universitas Jember. *Majalah Obat Tradisional*, 16(1), 2011.
- Fridiana, Destyka. *Uji Antiinflamasi Ekstrak Umbi Rumput Teki (Cyperus rotundus L) Pada Kaki Tikus Wistar Jantan Yang Diinduksi Karagen*. Skripsi. Bagian Biomedik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 2012..
- Gilman, A.G. *Goodman and Gilman Dasar Farmakologi Terapi Edisi IV*, diterjemahkan oleh Tim Ahli Bahasa Sekolah Farmasi ITB. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2014.

- Guyton, A.C dan Hall, J.E. 1997. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 11*. Jakarta: EGC.
- Hargono, Djoko, dkk. *Uji Efek Antidiare Infuse Kulit Batang Angsana (Pterocarpus indicus Willd) Terhadap Tikus Putih Jantan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. 1998.
- Al-Husayni Bin Mas'ud, Al-Bagawy Abu Muhammad. *Tafsir Al-Bagawy. Juz. 8*. Beirut : Daar Toybah Li Al-Nasyri Wa At-Tauzi. 1997 M/1417H.
- Inayati, Alfi. *Uji Efek Analgetik dan Antiinflamasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih (Piper betle Linn) Secara In Vivo*. Skripsi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010.
- Intan Nisa. *Ajaibnya Terapi Herbal Tumpas Penyakit Darah Tinggi*. Jakarta Timur: Dunia Sehat. 2012.
- Joker, D. *Informasi Singkat Benih : Pterocarpus indicus Willd*. Indonesia Forest Seed Project. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2002.
- Katzung, B.G. *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi VIII*. Alih Bahasa: Dripta Sjabana. 2002.
- Malole, M. B. M dan C. S. U. Pramono. *Penggunaan Hewan – hewan Percobaan di Laboratorium*. Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 1989.
- Mansjoer, S. *Efek Antiradang Minyak Atsiri Temu Putih (Curcuma zeodaria Rosch)*. Media Farmasi Indonesia 8(1) 1997
- Marwan, Yahya Abu Bin Musa. *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1 dan 3*. www. Tafsir. web. id.
- Mukhriani. *Farmakognosi Analisis*. UIN Alauddin Makassar. Makassar : Alauddin University Press. 2014.
- Mursito, Bambang, dkk. *Tanaman Hias Berkhasiat Obat*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2011.
- Mycek, Mary J. 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar*. Jakarta: Widya Medika.
- Olson, James. *Belajar Mudah Farmakologi*. Jakarta:EGC. 2004.
- Prayoga, Sigit. *Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Kumis Kucing (Orthosiphon stamines Benth) Pada Tikus Putih Jalur Galur Wistar*. Skripsi Farmasi. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.


- Price, S. A & Wilson, L. M. *Patofisiologi Konsep Klinik Proses-Proses Penyakit*.(Edisi 4). Jakarta : EGC. 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar. 2001.
- Savitri, Evikasandi. *Rahasia tumbuhan berkhasiat obat prespektif islam*. Malang : UIN Malang Press. 2008.
- Septiningsih, Erna. *Efek Penyembuhan Luka Bakar Ekstrak Etanol 70% Daun Pepaya (Carica papaya) Dalam Sediaan Gel Pada Kulit Punggung Kelinci (New zealand)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 2008.
- Steenis, Van, dkk. *Flora*. Jakarta : PT. Pranadya Paramita. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Smith, B. J. dan S. Mangkoewidjojo. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1988.
- Sri Atun. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Bahan Organik Alam*. Jurnal konservasi Cagar Budaya Borobudur, volume 8, nomor 2.FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Somala, Lala. *Sifat Reproduksi Mencit (Mus Musculus) Betina Yang Mendapat Pakan Tambahan Kemangi (Ocimum Basilicum) Kering*. Skripsi Sarjana. Program Studi Teknologi Produksi Ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. 2006.
- Tjiptosopomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan Obat-Obatan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994.
- Tulus Junanto, dkk. *Aktivitas Antimikroba Ekstrak Angsana (Pterocarpus indicus) terhadap Bacillus Subtilis dan Klebsiella penumoniae*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bioteknologi 5 (2): 63-69, November 2008, ISSN: 0216-6887. 2008.
- Vogel, H. G., W. H. *Drug Discovery and Evaluation Pharmacological Assay*. Springer, Nerlag Berlin Heiderberg. 2002.
- Wasito, Hendri. *Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Obat Tradisional*. Jurusan Farmasi FMIPA, Universitas Islam Bandung (Unisba). MIMBAR, Vol. XXIV, No. 2 (Juli - Desember 2008).
- Widysusanti Abdulkadir, Dkk. *Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Bunga Rosela (Hibiscus Sabdariffa Linn.) Pada Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus)*. Jurnal Health & Sport, Vol. 3, Nomor 2. Universitas Negeri Gorontalo. 2011.

Yulianti, Risdha. *Standarisasi Ekstrak Etanol Daun Angsana (Pterocarpus indicus Willd)*. Skripsi Farmasi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2013.



SKEMA KERJA

Lampiran 1. Skema kerja



Lampiran 2. Perhitungan dosis obat natrium diklofenak dan perhitungan dosis hasil ekstrak.

A. Perhitungan dosis natrium diklofenak

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Dosis mencit} &= D_o \times FK \times \frac{30}{20} \\
 &= 25 \times 0,0026 \times \frac{30}{20} \\
 &= 0,065 \times 1,5 \\
 &= 0,0975 \\
 2. \text{ Berat rata-rata} &= \frac{\text{berat 10 tablet}}{10} \\
 &= \frac{2,1046 \text{ g}}{10} \\
 &= 0,21046 \text{ g} \\
 &= 210,46 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

3. Perhitungan larutan stok

Berat yang digunakan untuk larutan stok 10 ml

$$\frac{10 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} \times 0,0975 \text{ mg} = 0,975 / 10 \text{ ml}$$

4. Berat yang ditimbang

$$= \frac{\text{berat yang digunakan}}{\text{berat etiket}} \times \text{berat rata-rata}$$

$$= \frac{0,975 \text{ mg}/10\text{ml}}{25 \text{ mg}} \times 210,46 \text{ mg}$$

$$= 8,20 \text{ mg}$$

B. Perhitungan konversi pemberian sediaan/sampel

Volume pemberian secara oral pada mencit (*Mus musculus*) adalah 1 ml

- Hewan coba dengan BB tertinggi : 30 g/kgBB
- Volume pemberian sediaan sampel : 1 ml/30 g/kgBB

$$1. \text{ Ekstrak etanol daun angkana 4\%} = \frac{4 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$$

$$= \frac{0,4 \text{ g}}{10 \text{ ml}}$$

$$= 0,04 \text{ g}$$

$$= 40 \text{ mg}$$

$$2. \text{ Ekstrak etanol daun angkana 6\%} = \frac{6 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$$

$$= \frac{0,6 \text{ g}}{10 \text{ ml}}$$

$$= 0,06 \text{ g}$$

$$= 60 \text{ mg}$$

$$3. \text{ Ekstrak etanol daun angkana 8\%} = \frac{8 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$$

$$= \frac{0,8 \text{ g}}{10 \text{ ml}}$$

$$= 0,08 \text{ g}$$

$$= 80 \text{ mg}$$

C. Perhitungan dosis ekstrak

- Ekstrak daun angkana 4%

$$1. \text{ Ekstrak untuk mencit } 30\text{g} = \frac{40 \text{ mg}}{\text{kgBB}} \times 0,03 \text{ kg}$$

$$= 1,2 \text{ mg}$$

$$\text{Larutan stok } 10 \text{ ml} = \frac{10 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} \times 1,2 \text{ mg}$$

$$= 12 \text{ mg}$$

- Ekstrak daun angkana 6%

$$2. \text{ Ekstrak untuk mencit } 30\text{g} = \frac{60 \text{ mg}}{\text{kgBB}} \times 0,03 \text{ kgBB}$$

$$= 1,8 \text{ mg}$$

$$\text{Larutan stok } 10 \text{ ml} = \frac{10 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} \times 1,8 \text{ mg}$$

$$= 18 \text{ mg}$$

- Ekstrak daun angkana 8%

$$3. \text{ Ekstrak untuk mencit } 30\text{g} = \frac{80 \text{ mg}}{\text{kgBB}} \times 0,03 \text{ kgBB}$$

$$= 2,4 \text{ mg}$$

$$\text{Larutan stok } 10 \text{ ml} = \frac{10 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} \times 2,4 \text{ mg}$$

$$= 24 \text{ mg}$$

D. Volume pemberian untuk mencit:

$$1. \text{ Berat badan } 22 \text{ g} = \frac{22}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,73 \text{ ml}$$

$$2. \text{ Berat badan } 23 \text{ g} = \frac{23}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,76 \text{ ml}$$

$$3. \text{ Berat badan } 24 \text{ g} = \frac{24}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

$$4. \text{ Berat badan } 25 \text{ g} = \frac{25}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,83 \text{ ml}$$

5. Berat badan 27 g $= \frac{27}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$
6. Berat badan 28 g $= \frac{28}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,93 \text{ ml}$
7. Berat badan 30 g $= \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$

Lampiran 3. Gambar Penelitian



Gambar. 1 : Tumbuhan Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd)

Gambar	Keterangan
	Gambar 2. Tanaman angsana
	Gambar 3. Proses maserasi menggunakan etanol 70%



Gambar 4. Ekstrak kental etanol daun
angsana



Gambar 5. Penyuntikan karagen
(penginduksi)



Gambar 6. Pemberian perlakuan bahan
uji



Gambar 7. Proses pengukuran



Gambar 8. Alat plethysmometer PANLAB
LE 7500



Gambar 9. Kaki normal mencit



Gambar 10. Kaki mencit setelah induksi
karagen

Lampiran 4. Analisis Statistik Pengukuran Volume Edema

Tabel 7. Data rata-rata penurunan volume edema

Perlakuan	Replikasi	Volume penurunan udem tiap 6 jam setelah induksi						Jumlah	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6		
Kontrol Negatif	1	0,21	0,25	0,25	0,21	0,2	0,2	1,32	0,22
	2	0,2	0,23	0,24	0,26	0,26	0,26	1,45	0,24
	3	0,21	0,22	0,24	0,27	0,27	0,27	1,48	0,24
Jumlah		0,62	0,7	0,73	0,74	0,73	0,73	4,25	0,70
rata-rata		0,40	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	1,61	0,26
Kontrol Positif	1	0,2	0,2	0,15	0,13	0,14	0,12	0,94	0,15
	2	0,19	0,17	0,15	0,15	0,12	0,11	0,89	0,14
	3	0,2	0,15	0,19	0,14	0,12	0,1	0,9	0,15
jumlah		0,59	0,52	0,49	0,42	0,38	0,33	2,73	0,455
rata-rata		0,19	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11	0,91	0,15
ekstrak 4%	1	0,2	0,22	0,2	0,18	0,19	0,17	1,16	0,19
	2	0,19	0,25	0,18	0,17	0,18	0,14	1,11	0,185
	3	0,25	0,18	0,17	0,16	0,15	0,13	1,04	0,17
jumlah		0,64	0,65	0,55	0,51	0,52	0,44	3,31	0,55
rata-rata		0,21	0,21	0,18	0,17	0,17	0,14	1,10	0,18
ekstrak 6%	1	0,23	0,18	0,19	0,18	0,17	0,16	1,11	0,185
	2	0,24	0,21	0,17	0,2	0,19	0,17	1,18	0,19
	3	0,2	0,16	0,15	0,18	0,16	0,15	1	0,16
Jumlah		0,67	0,55	0,51	0,56	0,52	0,48	3,29	0,54
rata-rata		0,22	0,18	0,17	0,18	0,17	0,16	1,09	0,18
Ekstrak 8%	1	0,22	0,17	0,14	0,12	0,16	0,15	0,96	0,16
	2	0,25	0,23	0,19	0,17	0,15	0,14	1,13	0,18
	3	0,28	0,25	0,21	0,15	0,14	0,13	1,16	0,19
Jumlah		0,75	0,65	0,54	0,44	0,45	0,42	3,25	0,54

rata-rata	0,25	0,21	0,18	0,14	0,15	0,14	1,08	0,18
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

A. Derajat Bebas

$$\text{DB Total} = (\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}) - 1$$

$$= (5 \times 3 \times 6) - 1$$

$$= 89$$

$$\text{DB Perlakuan} = \text{Total Banyaknya perlakuan} - 1$$

$$= 5 - 1$$

$$= 4$$

$$\text{DB Galat} = \text{DB Total} - \text{DB Perlakuan}$$

$$= 89 - 4$$

$$= 85$$

$$\text{Faktor Koreksi (FK)} = \frac{(\text{Jumlah})^2}{rk}$$

$$= \frac{(16,83)^2}{90}$$

$$= \frac{283,2489}{90}$$

$$= 3,14721$$

B. Jumlah Kuadran (JK)

1. Jumlah Kuadrat Total (JKT)

$$\begin{aligned}
 &= \sum(Y_{ij})^2 - FK \\
 &= [(0,21)^2 + (0,25)^2 + \dots + (0,13)^2 - \\
 &\quad 3,14721] \\
 &= 3,3127 - 3,14721 \\
 &= 0,16549
 \end{aligned}$$
2. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\sum T_{ij})^2}{r} - \text{Faktor Koreksi} \\
 &= \frac{[(1,32)^2 + (1,45)^2 + \dots + (1,16)^2]}{6} - 3,14721 \\
 &= \frac{19,3489}{6} - 3,14721 \\
 &= 3,224817 - 3,14721 \\
 &= 0,077607
 \end{aligned}$$
3. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)

$$\begin{aligned}
 &= JKT - JKP \\
 &= 0,16549 - 0,077607 \\
 &= 0,087883
 \end{aligned}$$

C. Kuadrat Tengah

1. Kuadrat Tengah Perlakuan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\
 &= \frac{0,077607}{4} \\
 &= 0,019402
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Kuadrat Tengah Galat} &= \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\
 &= \frac{0,087883}{85} \\
 &= 0,001034
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ F Hitung perlakuan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\
 &= \frac{0,019402}{0,001034} \\
 &= 18,76
 \end{aligned}$$

Tabel 8. Analisis Sidik Ragam

Sumber Variasi	DB	JK	KT	Fh	F-Tabel	
					5%	1%
perlakuan	4	0,077607	0,019402	18,76*	2,48	3,55
Galat	85	0,087883	0,001034			
total	89	0,16549				

Keterangan :

* = Signifikan

Ns = Non signifikan

Karena F hitung = 18,76 > F tabel pada taraf (α) 5% = 2,48 dan taraf (α) 1% = 3,55 maka hasil signifikan artinya lebih dari satu antar perlakuan yang memiliki efek yang berbeda terhadap penurunan volume udem kaki mencit.

Lampiran 5. Uji BJND

1. Untuk menentukan perlakuan yang signifikan, dilakukan Uji BJND sebagai berikut:

- Untuk mendapatkan nilai BJND dapat digunakan rumus :

$$S_y = \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,001034}{6}}$$

$$= 0,013$$

BJND = $P \times S_y$

S_y = Galat Baku Rerata Umum

KT galat = Kuadrat Galat Tengah

r = Jumlah Ulangan

$P 0,05$ dan $P 0,01$ = Nilai Baku Signifikan Studentized Rangers

BJND = Beda Jarak Nyata Duncan

Tabel 8. Hasil uji BNJD menurut RAL dalam angka

Perlakuan	Rata-rata (ml)	Selisih pada jarak P				BJND	
		2	3	4	5	005%	0,01%
A (K -)	0					a	A
C (4%)	0,02	0,02				ab	AB
D (6%)	0,04	0,02	0,04*			b	B
E (8%)	0,04	0	0,02	0,04*		c	C
B (K +)	0,05	0,01	0,01	0,03	0,05*	c	C
P 0,05 (p85)		2,18	2,95	3,057	3,128		
P 0,01 (p85)		3,728	3,88	3,993	4,073		
BJND 0,05 (p85)		0,036	0,038	0,039	0,040		
BJND 0,01 (p85)		0,048	0,05	0,051	0,052		

Angka-angka yang diikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata. Aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol daun angkana (*Pterocarpus indicus* willd) 6%, 8%, dan kontrol positif berbeda nyata berarti ekstrak 6%, 8%, dan kontrol positif memiliki pengaruh nyata dengan Na- CMC (kontrol negatif).

Keterangan



Signifikan



Non signifikan

1. Uji normalitas terhadap kelompok uji

- a. Tujuan : untuk mengetahui kenormalan data sebagai syarat uji

ANOVA

- b. Hipotesis :

H_0 = data penurunan volume edema kaki mencit terdistribusi normal

H_a = data penurunan volume edema kaki mencit tidak terdistribusi normal

- c. Pengambilan kesimpulan

Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

- d. Hasil :

Uji Normalitas

hasil	Statistik	df1	df2	Sig.
Welch	33.461	4	4.880	.001
Brown-Forsythe	61.538	4	7.860	.000

Kesimpulan :

H_0 diterima, berarti data penurunan volume edema kaki mencit terdistribusi normal.

2. Uji homogenitas terhadap kelompok uji

- a. Tujuan : untuk mengetahui homogenitas data sebagai syarat uji

ANOVA

- b. Hipotesis :

H_0 = data penurunan volume edema kaki mencit terdistribusi homogen

H_a = data penurunan volume edema kaki mencit tidak terdistribusi homogen

- c. Pengambilan kesimpulan

Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

- d. Hasil :

Uji Homogenitas

hasil

Statistik Levene	df1	df2	Sig.
1.053	4	10	.428

Kesimpulan :

H_0 diterima, berarti data penurunan volume edema kaki mencit terdistribusi homogen.

3. Uji ANOVA terhadap kelompok uji

- a. Tujuan : untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume edema kaki menci
- b. Hipotesis :
- Ho = tidak terdapat adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume penurunan edema kaki menci
- Ha = terdapat adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume edema kaki menci
- c. Pengambilan kesimpulan
- Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka Ho diterima
- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka Ho ditolak
- d. Hasil :

ANOVA

hasil	Jumlah	df	Rata-rata	F	Sig.
Antar Kelompok	.021	4	.005	61.538	.000
Perlakuan	.001	10	.000		
Total	.022	14			

esimpulan :

Ho diterima, berarti terdapat adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume edema kaki menci.

4. Uji Tukey (BNT) terhadap kelompok uji

a. Tujuan : untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume edema kaki mencit

b. Hipotesis :

H_0 = tidak terdapat adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume edema kaki mencit

H_a = terdapat adanya perbedaan yang bermakna dari penurunan volume Edema kaki mencit

c. Pengambilan kesimpulan

Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

d. Hasil :

Uji Tukey (BNT)							
Dependent Variable:hasil							
	(I) perlakuan	(J) perlakuan	Nilai Tengah (I-J)	Std. Error	Sig.	Taraf Kepercayaan 95%	
						Minimum	Maksimum
Tukey HSD	kontrol negatif	kontrol positif	-.10333 [*]	.00760	.000	-.1283	-.0783
		ekstrak 4%	-.07667 [*]	.00760	.000	-.1017	-.0517
		ekstrak 6%	-.09000 [*]	.00760	.000	-.1150	-.0650
		ekstrak 8%	-.09667 [*]	.00760	.000	-.1217	-.0717
	kontrol positif	kontrol negatif	.10333 [*]	.00760	.000	.0783	.1283
		ekstrak 4%	.02667 [*]	.00760	.036	.0017	.0517
		ekstrak 6%	.01333	.00760	.447	-.0117	.0383
		ekstrak 8%	.00667	.00760	.899	-.0183	.0317
	ekstrak 4%	kontrol negatif	.07667 [*]	.00760	.000	.0517	.1017
		kontrol positif	-.02667 [*]	.00760	.036	-.0517	-.0017
		ekstrak 6%	-.01333	.00760	.447	-.0383	.0117
		ekstrak 8%	-.02000	.00760	.137	-.0450	.0050
	ekstrak 6%	kontrol negatif	.09000 [*]	.00760	.000	.0650	.1150
		kontrol	-.01333	.00760	.447	-.0383	.0117


		positif					
		ekstrak 4%	.01333	.00760	.447	-.0117	.0383
		ekstrak 8%	-.00667	.00760	.899	-.0317	.0183
	ekstrak 8%	kontrol negatif	.09667*	.00760	.000	.0717	.1217
		kontrol positif	-.00667	.00760	.899	-.0317	.0183
		ekstrak 4%	.02000	.00760	.137	-.0050	.0450
		ekstrak 6%	.00667	.00760	.899	-.0183	.0317

- Taraf uji 0,05%

Kesimpulan :

1. Kelompok kontrol negatif berbeda secara bermakna dengan kelompok kontrol positif dan seluruh kelompok dosis pada taraf uji 0,05%.
2. Kelompok kontrol negatif berbeda secara bermakna dengan kelompok dosis rendah dan tidak berbeda secara bermakna pada kelompok dosis sedang dan dosis tinggi pada taraf uji 0,05%.
3. Data semua kelompok dosis ekstrak menunjukkan tidak berbeda secara bermakna antara ketiga dosis pada taraf uji 0,05%.

5. Grafik Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Daun Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd)



UNIVERSITAS
MAKASSAR