

**FORMULASI SEDIAAN DEODORAN EKSTRAK DAUN BOTTO'-
BOTTO' (*Chromolaena odorata* L) DALAM BENTUK STIK DAN UJI
EFEKTIVITAS PENGHAMBATANNYA TERHADAP BAKTERI
*Staphylococcus epidermidis***



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Farmasi**

**Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**A.TENRI RAWE
NIM. 70100112007**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.TENRI RAWE
NIM : 70100112007
Tempat/Tgl. Lahir : BULUKUMBA,10 JANUARI 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Minasa Upa Blok N.11 No.21
Judul : Formulasi Sediaan Deodoran Ekstrak Daun Botto'-Botto'
(*Chromolaena odorata* L) Dalam Bentuk Stik dan Uji
Efektivitasnya Terhadap Bakteri *Staphylococcus
epidermidis*.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Juli 2016

Penyusun,

A.TENRI RAWE
NIM. 70100112007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Formulas Sediaan Deodoran Ekstrak Daun Botto’-Botto**” (*Chromolaena odorata* L) Dalam Bentuk Stik dan Uji Efektivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*” yang disusun oleh A.Tenri Rawe, NIM 70100112007, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang di selenggarakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo’idah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2016 M
20 Dzulqo’idah 1437

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. (.....)
Sekretaris : Dr. Mukhtar Lutfi. M.Pd. (.....)
Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt (.....)
Pembimbing II : Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm.,M.Si.,Apt.(.....)
Penguji Kompetensi : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)
Penguji Agama : Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr.dr. H. A. Armyun Nurdin, M.Sc
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ‘sarjana’ di bidang pendidikan Strata 1 (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis sadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan hingga selesainya perampungan skripsi ini.

Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis, Andi Jemma dan Erniwati Latif atas segala do’a, kesabaran, kegigihan, serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Terima kasih pula kepada Bapak/ Ibu :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes selaku Wakil Dekan 1, Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Haeria, S.Si., M.Si. Selaku ketua jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. Selaku sekretaris jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
6. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. Selaku Pembimbing I penelitian bagi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.

7. Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. Selaku pembimbing II penelitian bagi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
8. Muhammad Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. selaku penguji kompetensi bagi penulis yang senantiasa menunjukkan besarnya arti perjuangan dan kesabaran selama penelitian.
9. Dr. Arman Arsyad, M.Ag. Selaku penguji dan pembimbing agama dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
10. Seluruh dosen, staf, civitas dan keluarga besar Farmasi atas bantuan dan informasi yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.
11. Keluarga besar jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Rekan-rekan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pada khususnya teman seperjuangan angkatan 2012 (Isohidris).
13. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah Swt dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal Aalamin..*

Samata-Gowa, Juli 2014

Penyusun,

A.TENRI RAWÉ

NIM. 70100112007

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Uraian Tanaman	8
1. Klasifikasi Sampel	8
2. Nama Daerah	9
3. Morfologi Tumbuhan	9
4. Penyebaran	10
5. Kandungan kimia	12
6. Kegunaan Tanaman	14
B. Ekstraksi	14
1. Fase pembilasan	15
2. Fase ekstraksi	15
3. Tujuan ekstraksi	16
C. Antimikroba	18

1. Defenisi Antimikroba.....	18
2. Sifat Antimikroba.....	18
3. Pembagian Antimikroba	18
4. Prinsip Kerja Antimikroba	18
5. Mekanisme Kerja Antimikroba	19
6. Uraian bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>	20
7. Sifat dan morfologi bakteri uji	20
D. Uji aktivitas antimikroba	21
1. Metode difusi	21
2. Metode dilusi	22
E. Uraian tentang kulit	23
1. Gambaran umum kulit	23
2. Anatomi kulit	23
3. Fisiologi kulit	26
F. Kosmetik	27
1. Defenisi kosmetik	27
2. Kebersihan badan	28
G. Antiperspiran dan deodoran	30
1. Defenisi antiperspiran	30
2. Perbedaan antiperspiran dan deodoran	30
H. Deodoran stik	31
1. Defenisi deodoran stik	31
I. Komposisi sediaan deodoran stik	32
1. Basis stik	32
2. Penstabil	33
3. Parfum	33
J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Menjadi Obat	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Peneliian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40

C. <i>Populasi dan sampel</i>	40
a) Populasi sampel	40
b) Sampel	40
D. <i>Metode pengumpulan data dan teknik pengolahan</i>	40
1. Metode pengumpulan data	40
a) Penyiapan sampel	40
b) Pengolahan sampel	41
c) Ekstraksi sampel	41
d) Sterilisasi alat	42
e) Uji kadar hambat ekstrak n-heksan daun botto'-botto'	42
1. Penyiapan mikroba uji	42
2. Uji aktivitas anti bakteri ekstrak n-heksan daun botto'-botto'	42
3. Pembuatan sediaan deodoran	43
4. Uji penghambatan dan karakteristik sediaan deodoran stik	45
2. Teknik pengolahan data	46
E. <i>Instrumen penelitian</i>	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. <i>Hasil Penelitian</i>	48
1. Hasil Ekstraksi Daun Botto'-botto'	48
2. Pengujian Skrining Antimikroba	48
3. Pengamatan organoleptik deodoran stik	49
4. Pengamatan konsistensi variasi basis	49
5. Hasil pengukuran pH	50
6. Hasil pengukuran zona hambat sediaan deodoran stik	50
7. Hasil pengamatan uji hedonik	51
B. <i>Pembahasan</i>	52
BAB V PENUTUP	59
A. <i>Kesimpulan</i>	59
B. <i>Saran</i>	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan formula sediaan deodoran stik ekstrak Daun Botto'-Botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	43
2. Rancangan sediaan deodorant stik dengan basis yang sesuai	44
3. Hasil ekstraksi Daun Botto'-Botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	48
4. Hasil pengukuran zona hambat ekstrak Daun Botto'-Botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	48
5. Hasil pengamatan organoleptik stik	49
6. Hasil pengamatan konsistensi variasi basis pembentuk stik	49
7. Hasil pengukuran pH sediaan deodorant stik	50
8. Hasil pengukuran zona hambat sediaan deodorant stik	51
9. Hasil pengamatan uji hedonik deodorant stik	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema kerja	63
2. Foto Daun Botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L)	76
3. Foto sortasi basah Daun Botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L).....	76
4. Foto proses pengeringan sampel Daun Botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L)	76
5. Foto proses maserasi Daun Botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L).....	77
6. Foto proses maserasi menggunakan alat rotavapor Daun Botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L)	77
7. Foto Hasil Pengujian Skrining Ekstrak n-Heksan daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	78
8. Foto hasil pengukuran zona hambat ekstrak n-heksan Daun Botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.) pada uji pendahuluan	78
9. Foto hasil formula basis yang melebur.....	78
10. Foto sediaan deodorant dengan konsentrasi yang berbeda	78
11. Hasil pengukuran transmitten bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>	79
12. Hasil pengukuran Formula 1,2,dan 3, kontrol positif dan kontrol negatif terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>	80

ABSTRAK

Nama Penulis : A.Tenri Rawe
NIM : 70100112007
Judul Skripsi : Formulasi Sediaan Deodoran Ekstrak Daun Botto'-Botto'
(*Chromolaena odorata* L) Dalam Bentuk Stik dan Uji Efektivitas Penghambtannya Terhadap Bakteri *Stapylococcus epidermidis*

Telah dilakukan penelitian formulasi sediaan deodoran ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dalam bentuk stik dan uji efektivitas penghambatannya terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui komposisi formula ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang dibuat dalam bentuk stik dengan karakteristik yang baik, dan mengetahui konsentrasi dari ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang dapat menghambat bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa basis dengan karakteristik yang baik adalah dengan menggunakan asam stearat direaksikan dengan NaOH untuk mendapatkan natrium stearat dibandingkan dengan basis yang menggunakan cera alba.

Hasil zona hambat untuk sediaan deodorant stik ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus epidermidis* yaitu konsentrasi 0,006 gr menghambat 26,7667 mm, konsentrasi 0,06 gr menghambat 2,67 mm, serta konsentrasi 0,6 gr menghambat 26,96667 mm.

Kata kunci: Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.), deodoran stik, antimikroba

ABSTRACT

Researcher : A.Tenri Rawe
Reg.Number : 70100112007
Research Title : Formulation of Deodorant Product with Extract of 'Botto'-botto' Leaf (*Chromolaena odorata* L) in the Form of Stick and Effectiveness of its Obstructing Experiment toward *Staphylococcus epidermidis* Bacteria.

Research about the formulation of deodorant product with extract of "botto-botto" leaf (*Chromolaena odorata* L.) in the form of stick and effectiveness of its obstructing experiment toward *Staphylococcus epidermidis* bacteria. The objective of this research is to detect the composition of extract of "botto-botto" leaf (*Chromolaena odorata* L.) formula which is made in the form of stick in good characteristics and detect the concentration of extract of "botto-botto" leaf (*Chromolaena odorata* L.) that can obstruct *Staphylococcus epidermidis* bacteria. The results obtained indicate that basis with good characteristics is to use stearate acid reacted with NaOH to obtain Sodium stearate compared to the basis using Cera Alba.

The results of obstruction zone for stick deodorant product with extract of n-hexane and "botto-botto" leaf (*Chromolaena odorata* L.) in obstruct the growth of *Staphylococcus epidermidis* bacteria is concentration of 0.006 g inhibit 26.7667 mm, Pconcentration of 0.06 gr inhibit 2,67 mm, and concentration of 0.6 g inhibit 26.96667 mm.

Keywords: "botto-botto" leaf (*Chromolaena odorata* L.), deodorant stick, antimicrobial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara tropis yang selalu disinari matahari sehingga berkeringat tidak dapat dihindari. Bagi seseorang keluarnya keringat yang berlebihan dapat menimbulkan masalah seperti misalnya menimbulkan bau badan yang kurang sedap. Bau badan sangat berhubungan dengan sekresi keringat seseorang dan adanya pertumbuhan mikroorganisme, serta makanan dan bumbu-bumbuan yang berbau khas seperti bawang (Anonim,2009). Keringat merupakan hasil sekresi dari kelenjar-kelenjar yang bermuara pada kulit berupa sebum, asam lemak tinggi dan debris (pigmen yang terkumpul ; sisa hasil metabolisme pada kulit), oleh karena itu keringat dapat membantu terbentuknya produk yang berbau, hasil dekomposisi atau penguraian oleh bakteri. Bau badan lebih tercium pada daerah dengan kelenjar apokrin yang lebih banyak, seperti pada ketiak (aksila) dan daerah genital (Mutschler, 1991 ; Rikowski *et.,al.*, 1999).

Kebersihan (*Personal hygiene*) adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwoto *et.,al.*, 2006). Seseorang akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi bila badannya berbau harum dan menyegarkan (Hasby, 2001).

Masalah bau badan dapat dialami oleh setiap orang dan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor genetik, kondisi kejiwaan, faktor makanan, faktor kegemukan dan bahan pakaian yang dipakai. Keringat yang dikeluarkan seseorang sangat terlibat dalam proses timbulnya bau badan, dimana kelenjar apokrin yang menghasilkannya telah terinfeksi oleh bakteri yang berperan dalam proses pembusukan (Jacoeb, 2007). Beberapa bakteri yang diduga menjadi penyebab bau badan tersebut diantaranya ialah *Staphylococcus epidermidis*, *Corynebacterium*

acne, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Streptococcus pyogenes* (Endarti *et.al.*, 2002).

Mekanisme kerja deodoran untuk mengurangi bau badan dengan cara menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau badan dan antiperspiran yang mengurangi keluarnya keringat dengan cara menutup dan menghalangi pori-pori kulit ketiak. Tambahan pewangi tubuh berfungsi menutup bau badan.

Melihat banyaknya penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat penggunaan deodoran sintetis maka diperlukan suatu alternatif bahan yang lebih aman dengan memanfaatkan bahan alami. Seperti telah diketahui di Indonesia banyak terdapat tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat-obatan dan kosmetika. Tumbuhan dan tanaman obat ini telah dijadikan obat tradisional yang turun temurun karena obat tradisional memiliki banyak kelebihan diantaranya mudah diperoleh, harganya yang lebih murah, dapat diramu sendiri, dan memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan obat-obatan dari produk farmasi. Oleh sebab itu, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan obat tradisional yang berasal dari alam atau herbal dalam pemeliharaan kesehatan, kebugaran, dan pengobatan semakin meningkat.

Tanaman Botto- botto (*Chromolaena odorata* L) adalah salah satu tanaman endemik Indonesia, yang kerap kali telah dianggap sebagai tanaman liar, tanaman ini pula dianggap sebagai gulma pada padang rumput dan perkebunan, bahkan telah dikategorikan sebagai gulma kelas 1 yang menjadi prioritas untuk dikendalikan (Departemen of Natural Resources *et.al.*, 2006). Skrining fitokimia pada sampel daun botto'-botto' yang dilakukan oleh Harbone (1973) dan Sofowora (1980). Mereka menyaring beberapa senyawa kimia kelompok pada sampel, berupa alkaloid, glikosida sianogen, flavonoid (auron, kalkon, flavon, dan flavonol), fitat, saponin, dan tanin. Determinasi kuantitatif

pada senyawa fitat, saponin, dan tanin dipublikasi dengan metode relevan oleh Asosiasi Kimia Analisis Resmi tahun 2006.

Daun botto-botto *Chromolaena odorata* L juga dilaporkan memiliki efek antispasmodik, antiprotozoa, antitripanosoma, antibakteri, dan antihipertensi. Telah dilaporkan pula bahwa tanaman ini memiliki efek antiinflamasi, astringen, diuretik, dan hepatotropic kegiatan (Watt *et.al.*, 1962; Feng *et.al.*, 1964; Wenigeret.*et.al.*, 1988; Iwu , 1993 dalam Akinmoladun,2009) sehingga sangat tepat digunakan untuk dibuat dalam sediaan deodoran karena efektivitasnya sebagai antibakteri dan astringen yang dapat mengatasi bau badan dan memperkecil pori sehingga pengeluaran keringat dari ketiak dapat terkontrol.

Sediaan kosmetika deodoran mempunyai beberapa bentuk, seperti bentuk-bentuk sediaan serbuk, krim, lotio, batang (*deo-stick*), aerosol (*spray*), dan lain sebagainya. Bentuk batang atau *stick* deodoran adalah suatu sediaan antibau badan yang sangat disukai karena mudah dan praktis digunakan, serta mudah dibawa kemana-mana (Leon A.Greenberg Ph.D.,1954).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Syadsyam, 2015) mengatakan bahwa hasil skrining aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan daun “botto-botto” *Chromolaena odorata* L memberikan aktivitas lebih banyak bakteri uji yakni *Staphylococcus epiermidis*, dimana bakteri ini merupakan bakteri penyebab bau badan. Selain itu, berdasarkan (Vital *et.al.*, 2009) daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L) juga memiliki efek anti astringen yang berfungsi untuk membuat suatu jaringan biologis berkontraksi dan mengkerut yang dapat digunakan sebagai antiperspiran.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang uji efektivitas sediaan deodoran stik ekstrak n-heksan dari daun botto-botto *Chromolaena odorata* (L.) dan uji efektivitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Pada penelitian ini peneliti merancang sediaan dalam bentuk deodoran stik, karena berdasarkan penelitian sebelumnya efek antibakteri dari daun *Chromolaena odorata* L memiliki efek yang bagus pada ekstrak n-heksan terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dibandingkan dengan ekstrak etanol, selain itu ekstrak n-heksan dari daun ini juga mampu dibuat dalam bentuk stik karena tidak mengandung air sehingga cocok untuk dibuat dalam sediaan deodoran stik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komposisi formula ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) yang dibuat dalam bentuk sediaan stik dengan karakteristik yang baik ?
2. Bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) dalam sediaan deodoran stik terhadap efektivitas bakteri *Staphylococcus epidermidis* ?
3. Bagaimana tinjauan syariat islam terhadap upaya untuk menghambat bau badan ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional
 - a. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan.
 - b. Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan

dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansia, preservatif.

- c. Bau badan adalah berasal dari proses dekomposisi protein dan lipid yang terdapat dalam keringat, terutama apokrin. Bakteri dan jamur akan berperan pada pH sekresi apokrin yang netral atau sedikit alkali. Adanya rambut diketiak juga merupakan faktor sekunder yang dapat menyebabkan bertambah bau ketiak. Keringat ekrin tidak akan berbau sekalipun terjadi inokulasi bakteri, karena kelenjar ekrin tidak cukup mengandung substrak untuk pertumbuhan bakteri.
- d. Bentuk batang atau stik deodoran adalah suatu sediaan anti bau badan yang sangat disukai karena mudah dan praktis digunakan, serta mudah dibawa kemana-mana (Leon A.Greenberg Ph.D., 1954).
- e. Deodoran adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat, menutupi bau badan dan mengurangi bau badan (Rahayu, dkk., 2009). Deodoran dapat juga diaplikasikan pada ketiak, kaki, tangan dan seluruh tubuh biasanya dalam bentuk *spray* (Egbuobi, dkk., 2013).
- f. Eksperimen adalah percobaan yang sistematis dan berencana (untuk membuktikan kebenaran suatu teori).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dengan menguji efektivitas sediaan deodoran stik ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah originalitas kemanfaatan dan posisi dari

penelitian ini dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Syadsyam, Sriyanty (2015) dengan judul penelitian “Skринing Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun Botto-Botto (*Chromolaena odorata* L.)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daun botto’botto’ (*Chromolaena odorata* L.) mengandung senyawa bioaktif yang memberikan aktivitas antimikroba terhadap mikroba *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Shigella dysenteriae* dengan ekstrak sampel konsentrasi 1 mg/ml.
2. Debnath, Subhashis (2011) dengan judul penelitian “Formulasi dan evaluasi sediaan deodorant stik sebagai antimikroba alami”. Metode kerja dari penelitian ini adalah dengan membandingkan basis dalam sediaan deodorant stik dengan menggunakan bahan-bahan alami dan cera alba sebagai basisnya dengan membandingkan perbedaan konsentrasi yaitu formula 1 sebanyak 5 gram, formula 2 sebanyak 6 gram, dan formula 3 sebanyak 7 gram. Hasil penelitian ini setelah dilakukan evaluasi sediaan deodorant stik adalah melalui beberapa uji diantaranya adalah dari uji pelunakan, uji waktu hancur, Ph, Stabilitas penyimpanan dan evaluasi anti mikroba memberikan hasil bahwa formula 3 yang paling baik.
3. Nurfitriani, Ika (2012) dengan judul penelitian “ Pemanfaatan ekstrak rimpang jahe merah (*Zingiber officinale* Linn.var.*Rubbum*) untuk bahan pembuatan deodoran herbal alami. Penelitian ini menggunakan metode kerja meliputi empat tahapan, yaitu pembuatan ekstrak rimpang jahe merah, pembuatan deodorant stik, pengujian bakteri di laboratorium, dan

uji organoleptik. Hasil penelitian ini adalah ekstrak rimpang jahe merah yang mempunyai kadar oleoresin 2,85345 % berpotensi digunakan sebagai antibakteri *Staphylococcus aureus*. Proses pembuatan deodorant stik dari ekstrak rimpang jahe merah memiliki dua tahap, yaitu dengan pembuatan ekstrak rimpang jahe merah dengan metode maserasi dan mencampurkan ekstrak rimpang jahe merah dengan natrium stearat dan propilen glikol hingga berbentuk padat.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komposisi formula ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) yang dibuat dalam bentuk sediaan stik dengan karakteristik yang baik.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) dalam sediaan deodoran stik terhadap efektivitas bakteri *Staphylococcus epidermidis*.
3. Untuk mengetahui tinjauan syariat islam terhadap upaya untuk menghambat bau badan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi alternatif produk farmasi yang berasal dari alam dan memperoleh sediaan deodoran yang mengandung ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) yang memiliki karakteristik yang baik sehingga dapat menjadi antibakteri yang baik terhadap bau badan dan aman untuk digunakan.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian Tanaman

Chromolaena odorata (L.) adalah tanaman semak, dan merupakan gulma perkebunan tanaman dan padang rumput di Asia Selatan dan Afrika Barat. Tanaman ini adalah gulma dari 13 tanaman di 23 negara (Phan, 2004: 813). Gulma ini tiba-tiba mendapat perhatian lagi setelah peneliti padang rumput Australia mencemaskan gulma ini akan masuk ke Australia dari padang rumput di NTT (Departemen of Natural Resources *et.al.*, 2006). Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tanaman ini terhadap subsektor peternakan ternyata sangat tinggi. Australia yang merupakan negara peternakan telah mengeluarkan banyak dana selama tujuh tahun untuk mencegah dan mengendalikan gulma ini. Tanaman ini menjadi racun bagi ternak karena daun dan tunas mudanya memiliki kadar nitrat yang sangat tinggi (5 sampai 6 kali di atas kadar toksik), sehingga dapat mematikan ternak yang makan tanaman ini (Akinmoladun, 2007: 191).

1. Klasifikasi Sampel

Regnum : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Famili : Asteraceae
Genus : *Chromolaena*
Spesies : *Chromolaena odorata* L (The Plants database, 2000)

2. Nama daerah

Chromolaena odorata L dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti Botto'-Botto' (Makassar), Laruna (Pangkep), dan Gondrong-Gondrong (Takalar). Beberapa daerah lain misalnya, memiliki nama tersendiri, Kopasanda (Maros), Ki Rinyuh (Sunda), Tekelan (Jawa), dan *Siam Weed* atau *Jack in the Bush* di Inggris (Prawiradiputra, 2006: 46).

3. Morfologi

Botto'-botto' termasuk keluarga *Asteraceae* atau *Compositae*. Daunnya oval, bagian bawah lebar, makin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6–10 cm dan lebar 3–6 cm. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun berhadap-hadapan. Karangan bunga terletak di ujung cabang. Setiap karangan terdiri atas 20 – 35 bunga. Warna bunga putih.

Botto'-botto' berbunga pada musim kemarau, perbungaannya serentak selama 3–4 minggu. Pada saat biji masak, tumbuhan mengering. Pada saat itu biji pecah dan terbang terbawa angin. Kira-kira satu bulan setelah awal penghujan, potongan batang, cabang dan pangkal batang bertunas kembali. Biji-biji yang jatuh ke tanah mulai berkecambah sehingga dalam waktu dua bulan kecambah dan tunas-tunas telah mendominasi area.

Tanaman ini membentuk semak, tinggi tumbuhan dewasa berkisar 3-7 meter tingginya ketika tumbuh di tempat terbuka. Batang muda berwarna hijau dan agak lunak yang kelak akan berubah menjadi coklat dan keras (berkayu) apabila sudah tua. Letak cabang biasanya berhadap-hadapan (oposit) dan jumlahnya sangat banyak. Percabangannya yang rapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, sehingga menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya. Dengan

demikian gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan mampu mendominasi area dengan cepat pula. Kemampuannya mendominasi area dengan cepat ini juga disebabkan oleh produksi bijinya yang sangat banyak (Phan, 2004: 813).

Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepat perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gulma ini cepat membentuk komunitas sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Botto-Botto dapat tumbuh pada ketinggian 1000–2800 m dpl, tetapi di Indonesia banyak ditemukan di dataran rendah (0–500 m dpl) seperti di kebun karet dan kelapa serta di padang penggembalaan (Prawidiputra, 2006: 47).

4. Penyebaran

Tanaman Botto'-Botto' merupakan tanaman asli Meksiko, Hindia Barat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan tropis, dan kini telah tersebar di daerah-daerah tropis dan subtropis. Gulma ini dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah dan akan tumbuh lebih baik lagi apabila mendapat cahaya matahari yang cukup. Kondisi yang ideal bagi gulma ini adalah wilayah dengan curah hujan > 1000 mm/tahun. Dengan demikian, gulma ini tumbuh dengan baik di tempat-tempat yang terbuka seperti padang rumput, tanah terlantar dan pinggir-pinggir jalan yang tidak terawat. Menurut FAO (2006) gulma ini tidak tahan naungan sehingga tidak ditemukan di hutan-hutan yang tertutup, namun walaupun demikian di Indonesia dan di berbagai negara lain di Asia, Botto'Botto' banyak ditemukan di perkebunan-perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mente dan sebagainya (Muniappan dan Marutani, 1988 dalam Wilson Dan Widayanto (2004) memperkirakan bahwa Botto'Botto' menyebar di kepulauan Indonesia sejak Perang Dunia II. Dengan penyebaran itu kini Botto'-Botto' dapat dijumpai di semua pulau-pulau besar di Indonesia. Di lain pihak Sipayung *et.al.* (1991) memperkirakan Botto'-Botto' telah

ada di Indonesia sebelum tahun 1912. Namun demikian, laporan pertama yang menyangkut kerugiannya terhadap ternak baru dilaporkan pada tahun 1971 (Soerohaldoko, 1971), yaitu mengenai keberadaan *Chromolaena odorata* di cagar alam Pananjung, Jawa Barat, yang merugikan banteng di suaka alam tersebut karena rumput pakannya berkurang akibat invasi gulma berkayu ini. Botto'-Botto' tidak hanya ditemukan di Pulau Jawa, tetapi juga ditemukan di seluruh Indonesia seperti di Sumatera (Sipayung, *et.al.*, 1991), Di Kalimantan (De Chenon, *et.al.*, 2003), di Lombok, Sumbawa, Flores, Timor (Wilson Dan Widayanto, 2004; De Chenon *et.al.*, 2003; Mcfayden, 2004), Sulawesi dan Irian Jaya (Sipayung *et.al.* , 1991;Wilson Danwidayanto, 2004). Di Afrika, gulma padang rumput ini digolongkan pada gulma yang paling berbahaya selain dari alangalang (*Imperata cylindrica*), puteri malu (*Mimosa sp.*), sadagori (*Sida acuta*), *Commelina sp.*, *Hyptis sp.* dan saliar (*Lantana camara*) karena mengganggu padang rumput dengan mengurangi produktivitas dan mengurangi diversitas jenis-jenis rumput. Gulma berkayu ini tidak hanya tumbuh di daratan Afrika, tetapi juga di pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Madagaskar dan Mascarene. Tidak hanya di Asia dan Afrika, gulma ini juga ternyata sudah masuk ke Australia. Laporan Pheloung (2003) menunjukkan bahwa pada tahun 1994 Botto'-Botto'telah berada di Queensland, bahkan kini digolongkan pada gulma kelas 1, yaitu gulma yang mendapat prioritas untuk dikendalikan (Department Of Natural Resources, Mines And Water, 2006). Karantina Australia pada tahun 2003 telah menganggarkan dana sebanyak 200 juta AUD untuk mengendalikan berbagai hama dan gulma. Untuk *C. odorata* saja selama tujuh tahun sejak 1994 telah dihabiskan dana sebanyak 1,1 juta AUD (Prawiradiputra,2007:46).

5. Kandungan Kimia

Skrining fitokimia pada sampel daun botto'-botto' yang dilakukan oleh Harbone (1973) dan Sofowora (1980). Mereka menyaring beberapa senyawa kimia kelompok pada sampel, berupa alkaloid, glikosida sianogen, flavonoid (auron, kalcon, flavon, dan flavonol), fitat, saponin, dan tanin. Determinasi kuantitatif pada senyawa fitat, saponin, dan tanin dipublikasi dengan metode relevan oleh Asosiasi Kimia Analisis Resmi tahun 2006.

Spackman (1985) menemukan asam amino dari botto'-botto', dengan melakukan serangkaian metode yaitu dengan mengeringkan daun botto'-botto' hingga bobotnya konstan, dibebaskan lemak, dihidrolisis, lalu dievaporasi hingga diproses lebih lanjut dalam Aplikator Teknisi Multi-sampel dari Analitik Asam Amino (Ngozi, 2009: 521).

Kandungan nitratnya yang tinggi (lima hingga enam kali di atas kadar toksik) dapat menyebabkan aborsi bahkan kematian ternak serta dapat meracuni daun dan tunas muda tanaman kebun (Akinmoladun, 2007:191).

Hasil kromatografi lapis tipis yang dilihat pada lampu UV 254 nm dan UV 366 nm menunjukkan bahwa fraksi n-heksan mengandung senyawa terpenoid, triterpenoid, flavonoid, dan fenol. Sedangkan pada fraksi ekstrak etanol 70% mengandung senyawa fenol, flavonoid, steroid, dan terpenoid. Senyawa tersebutlah yang memiliki aktivitas antimikroba terhadap beberapa bakteri patogen (Sadsyam Sriyanti, 2014: 64).

Golongan triterpenoid/steroid merupakan senyawa yang larut dalam pelarut non polar seperti n-heksan, sedangkan golongan alkaloid termasuk senyawa semi polar yang dapat larut dalam pelarut semi polar. Sedangkan senyawa flavonoid dan tanin dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, etilasetat, atau pelarut polar lainnya (Harbone, 1987).

Flavonoid umumnya lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar dikarenakan memiliki ikatan dengan gugus gula. Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan senyawa aktifnya dapat diekstraksi dengan etanol 70% (Harbone, 1987).

Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antimikroba. Golongan fenolik ini diduga menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab menghambat pertumbuhan mikroba uji. Meskipun komponen senyawa fenol sendiri masih tergolong luas, sehingga belum dapat dipastikan senyawa spesifik apa yang memiliki aktivitas antimikroba. Cara kerja senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel, senyawa flavonoid diduga memiliki mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Pelczar, 2008: 260).

Pada tumbuhan, flavonoid sebagai antimikroba dapat membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dinding sel. Selain itu flavonoid yang bersifat lipofilik dapat merusak membran mikroba. Terpena atau terpenoid memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Mekanismenya tidak sepenuhnya diketahui, akan tetapi diduga senyawa ini bekerja pada pengrusakan membran oleh senyawa lipofilik (Cowan, 1999: 564-582).

Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan dari terpena atau skulena. Mekanisme kerja antibakteri senyawa steroid yaitu dengan cara merusak membran sel bakteri. Aktivitas antimikroba senyawa fenolik adalah dengan merusak lipid pada membran plasma mikroorganisme sehingga menyebabkan isi sel keluar (Pratiwi, 2008).

6. Kegunaan

Dilaporkan oleh Ngozi (2009) bahwa dalam pengobatan tradisional, botto'-botto' digunakan sebagai bahan alam yang berkhasiat antispasmodik, antiprotozoa, antibakteria, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, astringen, antitripanosoma, diuretik dan bahan hepatotropik.

Senada dengan laporan Ngozi, Vital (2009) juga turut menyebutkan khasiat terapeutik dari botto'-botto' seperti antidiare, antispasmodik, astringen, antihipertensi, antiinflamasi, dan diuretik. Penggunaan daunnya yang dibuat dalam dekokta dimanfaatkan sebagai obat batuk atau bila dicampurkan rumput lemon dan daun jambu biji berkhasiat mengobati penyakit malaria.

B. Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya.

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses ekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel.

Proses terektraksinya zat aktif dalam tanaman adalah pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat

aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus samapai terjadi keseimbangan antara konsentrasi dalam sel dan di luar sel (Alam. G. Rahim A, 2008 : 1)

Pada proses ekstraksi dapat dibedakan menjadi 2 fase yaitu :

1. Fase pembilasan

Pada saat cairan ekstraksi kontak dengan material simplisia maka sel-sel yang rusak atau tidak utuh lagi akibat operasi penghalusan langsung bersentuhan dengan bahan pelarut. Dengan demikian komponen sel yang terdapat di dalamnya lebih mudah diambil atau dibilas. Oleh karena itu, dalam fase pertama ekstraksi ini, sebagian bahan aktif telah berpindah kedalam bahan pelarut. Semakin halus serbuk simplisia, akan semakin optimal proses pembilasannya.

2. Fase ekstraksi

Proses selanjutnya adalah proses yang lebih kompleks, karena bahan pelarut untuk melarutkan komponen dalam sel yang tidak terluca harus mampu mendesak masuk lebih dulu kedalamnya. Membran sel yang mengering, mengkerut di dalam simplisia mula-mula harus diubah kondisinya sehingga memungkinkan bahan pelarut masuk kebagian dalam sel. Hal itu terjadi melalui pembengkakan, dimana membran mengalami pembesaran volume akibat masuknya sejumlah molekul bahan pelarut. Dengan mengalirnya bahan pelarut kedalam ruang sel, protoplasma akan membengkak dan bahan kandungan sel akan terlarut sesuai dengan tingkat kelarutannya. Bahan kandungan sel akan terus masuk ke dalam cairan disebelah luar sampai difusi melintasi membran mencapai keseimbangannya yakni pada saat konsentrasi antara larutan di sebelah dalam dan sebelah luar sel sama besar (Voigt 1995, 562-564).

Tujuan ekstraksi secara umum terdapat empat situasi :

- a. Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikannya dengan kebutuhan pemakai.
- b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya: alkaloid, flavanoid, atau saponin meskipun struktur kimia walaupun dari senyawa ini, metode umum yang digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh dari pustaka.
- c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya dibuat dengan bebrbagai cara misalnya *Tradisional Chinese Medicine* (TCM) sering kali membutuhkan herba yang didihkan dalam air dan dekok dalam air untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan tradisional.
- d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (umumnya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau berdasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologi tertentu (Alam. G. Rhim. A, 2008 : 11-12).

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara kering. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Sudjadi,1988: 60).

Pada dasarnya metode ekstraksi ada beberapa macam di antaranya yaitu maserasi (perendaman), perkolasi, digesti, infusi, dan dekoksifikasi. Ekstraksi

dilakukan dengan pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harga murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak (Wientarsih & Prasetyo, 2006).

Maserasi

Metode maserasi merupakan penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam sejumlah serbuk simplisia dalam larutan penyari yang sesuai selama beberapa hari dalam temperatur kamar dan terlindung cahaya. Maserasi digunakan untuk menyari simplisia dengan komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari.

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau pelarut lain. Bila cairan penyari yang digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian.

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna.

Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan diluar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari seperti malam dan lain-lain.

C. Anti Mikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Obat-obatan yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus sangat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidaktoksis terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008).

Antimikroba dapat bersifat: (Djide, 2008)

1. Bakteriostatika, yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri)
2. Bakteriosida, yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri).

Antibakteri berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi:

1. Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri gram negatif maupun gram positif (benzyl penisilin dan streptomisin).
2. Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri gram negatif atau gram positif saja (tetrasiklin dan kloramfenikol) (Ganiswara, 2007).

Mekanisme penghambatan antibakteri dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu menghambat sintesis dinding sel mikrobia, merusak keutuhan dinding sel mikrobia, menghambat sintesis protein sel mikrobia, menghambat sintesis asam nukleat, dan merusak asam nukleat sel mikroba (Sulistyo, 1971).

Menurut Djide (2008) mekanisme kerja dari suatu antiseptika dan desinfektansia sangat beragam yang dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu :

a. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia seperti turunan aldehid, amida, karbanilida, etilenoksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa amonium quaertener. Aldehid dan etilen oksida bekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus nukleofil seperti gugus amino, karboksil, fenol, dan thiol dari protein sel bakteri. Reaksi alkilasi tersebut menyebabkan pemblokiran sisi aktif dan perubahan konformasi enzim sehingga terjadi hambatan pertumbuhan sel bakteri.

b. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, merkuri, peroksida, turunan fenol, dan senyawa ammonium quartener bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konjugasi kodein sel bakteri itu turunan fenol, senyawa ini berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses absorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami penguraian, diikuti penetrasi fenol kedalam sel dan menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein sel dan membran sitoplasma mengalami lisis.

c. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa amonium kuartener. Dengan mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri, senyawa-senyawa tersebut dapat mengakibatkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian. Contohnya klorheksidin.

d. Interkalasi DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesis DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

Uraian Bakteri Uji (*Staphylococcus epidermidis*)

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-187)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Bacillales
Suku	: Staphylococcaceae
Marga	: Staphylococcus
Jenis	: <i>Staphylococcus epidermis</i>

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus epidermis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 - 1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 - 40°C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulasa negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

D. Uji Aktivitas Mikroba (Pertiwi, 2008)

a. Metode difusi

1. Metode *disc diffusion*

Untuk menentukan aktivitas antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar.

2. E-test

Digunakan untuk mengestimasi MIC (*minimum inhibitory concentration*) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

3. *Ditch-plate technique*

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan Petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

4. *Cup-plate technique*

Dimana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji. Metode lubang/sumuran yaitu membuat lubang pada agar padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, kemudian lubang diinjeksikan dengan ekstrak yang akan diuji. Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang (Kusmayati dan Agustini, 2007).

5. *Gradient-plate technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media Agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan Petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya.

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan permukaan media mengering. Mikroba uji digoreskan pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah hasil perbandingan yang didapat dari lingkungan padat dan cair, faktor difusi agen antimikroba dapat mempengaruhi

b. Metode dilusi

1. Metode dilusi cair

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration atau kadar hambat minimum, KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration atau kadar bunuh minimum, KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM.

2. Metode dilusi padat

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji.

E. Uraian Tentang Kulit

1. Gambaran Umum Kulit

Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkaran hidup manusia. Luas kulit orang dewasa sekitar 1,5 m² dengan berat kira-kira 15% tubuh orang dewasa. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan, iklim, umur, jenis kelamin, ras dan lokasi tubuh (Anwar Effionora, 2012: 190).

Kulit merupakan organ besar yang berlapis-lapis, dimana beratnya kira-kira delapan pon, tidak termasuk lemak. Kulit menutupi permukaan lebih dari 20.000 cm² dan mempunyai berbagai macam fungsi dan kegunaan. Kulit berfungsi sebagai pembatas terhadap serangan fisika dan kimia. Kulit juga berfungsi sebagai thermostat dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan berperan pula dalam mengatur tekanan darah (Lachman, 1994: 1092-1093).

2. Anatomi Kulit

Secara histologis kulit tersusun atas 3 lapisan utama yaitu: (a) lapisan dermis atau kutikel, (b) lapisan dermis, (c) lapis subkutis (*hypodermis*). Tidak ada garis tegas yang memisahkan antara dermis dan subkutis. Subkutis ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan sel-sel yang membentuk jaringan lemak. Lapis epidermis dan dermis dibatasi oleh taut dermoepidermal (*dermoepidermal junction*) yang berbeda, irregular, dengan cones, ridges dan cord.

Struktur kulit dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: (Anwar Effionora, 2012; 190-192).

a. Epidermis

Epidermis merupakan jaringan epitel berlapis pipih, dengan sel epitel yang mempunyai lapisan tertentu. Lapisan ini terdiri dari lima lapisan yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum dan stratum corneum.

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan 50µm sampai 1,5 mm. terdiri dari 5-25 sel, merupakan penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit dan nutrisi tubuh serta masuknya senyawa asing dari luar.

Struktur kimia dari sel-sel epidermis manusia terdiri dari protein 27%, lemak 2%, garam mineral 0,5%, air dan bahan-bahan larut air 70,5%. Protein terpenting adalah albumin, globulin, musin, elastin, kolagen dan keratin. Secara kasar 40% dari bahan-bahan yang larut air terdiri dari asam amino bebas.

Epidermis terbagi menjadi 5 lapisan yaitu;

1) Stratum Korneum

Stratum korneum adalah lapisan paling luar dan terdiri dari beberapa lapisan sel. Selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus dilepaskan namun selnya kompak, rata dan bening serta tidak berinti dan protoplasmanya tidak berubah menjadi keratin, tidak mengalami metabolisme dan sebagian besar terdiri dari keratin (protein yang tidak larut air yang dihasilkan selama proses diferensiasi). Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T.

Pada permukaannya terdapat lapisan tipis yang disebut dengan mantel asam yang fungsinya sebagai penyangga (menetralisir bahan kimia yang terlalu

asam atau alkalis masuk ke kulit). Memiliki ketebalan 1% - 10% dari total lapisan kulit yakni sekitar 10-20 μm . Sangat kering, mengandung kurang lebih 15% air, tersusun tumpang tindih dan merupakan sel mati yang disebut korneosit, mengandung 65% keratin. Sel korneum melekat satu sama lain sehingga merupakan penghalang penting dari kulit terhadap masuknya benda asing.

2) Stratum Lusidum

Secara normal hanya ditemukan pada kulit yang tebal seperti telapak kaki dan tangan. Lapisan ini merupakan lapisan tipis dan jernih mengandung eleidin yang dibentuk dari keratohialin akhirnya diubah menjadi keratin. Bila serabut keratin telah berkembang sempurna maka sel-sel penghasilnya akan berubah menjadi bentuk pipih dan tipis, membrannya menebal serta permeabilitasnya berkurang kemudian inti dan organel lainnya mengalami desintegrasi dan akhirnya mati. Membran sel akhirnya tertutup oleh keratin.

3) Stratum Granulosum

Merupakan lapisan berbutir kasar keratohialin dimana terdapat bahan logam khusus Cu (tembaga yang menjadi katalisator pertandukan kulit), terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar yang terdapat inti sel diantaranya. Stratum Spinosum/ Lapisan Malphigi

4) Stratum Germinativum / Lapisan Basal

Merupakan lapisan dasar epidermis dan merupakan lapisan yang mampu mengalami reproduksi. Lapisan ini terdiri dari sel-sel berbentuk kubus atau volumnar yang tersusun vertikal pada perbatasan dermis dan epidermis, berbentuk seperti seperti pagar dan mengadakan mitosis, dan berfungsi reproduksi.

b. Dermis

Dermis merupakan jaringan ikat fibroelastis, dimana didalamnya didapatkan banyak pembuluh darah, pembuluh-pembuluh limfa, serat-serat saraf,

kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, yang masing-masing mempunyai arti fungsional untuk kulit itu sendiri. Lapisan ini jauh lebih tebal daripada epidermis. Terbentuk oleh jaringan elastis dan vibrosa padat dengan elemen seluler, kelenjar, dan rambut sebagai edneksa kulit.

c. Subkutis

Lapisan ini merupakan kelanjuta dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh trabekula dan vibrosa. Lapisan sel lemak disebut panikulus adiposa, berfungsi sebagai cadangan makanan. Dilapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan saluran getah bening. Tebal jaringan lemak tidak sama, bergantung pada lokasi, di abdomen 3 cm, sedangkan di daerah kelopak mata dan penis sangat tipis. Lemak ini juga berfungsi sebagai bantalan.

3. Fisiologi Kulit

Faal kulit sangat kompleks dan berkaitan satu dengan yang lainnya didalam tubuh manusia, dengan berbagai fungsi antara lain : (Anwar Effionora, 2012: 192-193).

a. Fungsi proteksi

Kulit melindungi bagian dalam tubuh manusia terhadap gangguan fisik maupun mekanik. Gangguan tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya bantalan lemak subkutis, tebalnya lapisan kulit dan serabut penunjang yang berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh. Gangguan sinar ultraviolet diatasi oleh sel melanin yang menyerap sebagian sinar tersebut. Gangguan kimia ditanggulangi dengan adanya lemak permukaan kulit yang berasal dari kelenjar palit kulit yang mempunyai pH 4,5-6,5.

b. Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme dalam tubuh. Sebum yang diproduksi kelenjar palit kulit melindungi kulit dan menahan penguapan yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering.

4. Fungsi Kulit

Sesuai dengan sifat sel penyusunnya serta adneksa yang berada disekitarnya, maka fungsi kulit menurut adalah:

- a. Fungsi proteksi Menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.
- b. Fungsi absorpsi Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak.
- c. Fungsi ekskresi Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia.

F. Kosmetik

Berasal dari kata "kosmein" (Yunani) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di alam sekitar. Sekarang kosmetik tidak hanya dari bahan alami tetapi juga dari bahan sintetis untuk maksud meningkatkan kecantikan (Wasitaatmadja, 1997).

Menurut peraturan kepala BPOM Republik Indonesia No. HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik Kebersihan Badan

Kebersihan badan (*personal hygiene*) adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwoto dan Wartonah, 2006). Seseorang akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi bila badannya berbau harum dan menyegarkan (Hasby, 2001).

Setiap hari badan dibersihkan dengan frekuensi tidak terbatas sesuai kebutuhan. Kosmetika pembersihan dan perawatan badan sehari-hari seperti; body shampoo/sabun, body lotion, body talk, serta deodoran antiperspiran (lotion, spray, stick, talk dan lain-lain) (Anonim, 2014). Membuat badan (kulit, rambut, dan gigi) bersih merupakan tujuan utama pemakaian kosmetik. Meskipun badan mengusahakan pembersihan dirinya sendiri, misalnya dengan penggantian sel-sel lapisan tanduk dan penggantian rambut tua dengan rambut baru, itu belum cukup, terutama bagi manusia modern yang menuntut kebersihan yang lebih baik. Bahan pembersih yang paling umum digunakan adalah air. Pembersih dengan air atau bahan dasar air mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah air dapat melunakkan lapisan tanduk sehingga mudah dibersihkan, tidak toksik, tidak menimbulkan efek samping, mudah didapat dan murah harganya.

Tetapi dari sudut kosmetik modern, air memiliki kekurangan, tidak mempunyai daya pembasah yang kuat karena ditolak oleh keratin dan sebum yang sedikit menyerap air, tidak dapat membersihkan seluruh kotoran yang melekat

pada kulit, tidak membersihkan jasad renik pada permukaan kulit, bukan merupakan pembersih kulit yang baik dan sukar mencapai lekuk dan pori kulit dan kurang efektif mencegah bau badan (Wasitaatmadja, 1997; Tranggono dan Latifah, 2007).

Kosmetik paling tua yang dikenal sebagai pembersih badan dan pengharum kulit adalah sabun. Sabun bukan pembersih yang ideal dan tidak dapat mencegah bau badan. Pertama, sabun tidak dapat mencegah terbentuknya keringat dan pertumbuhan flora normal kulit. Kedua, sabun cenderung mengendapkan ion K^+ dan Mg^{2+} yang kadang terdapat di dalam air (disebut sebagai air berat) yang akan mengurangi daya pembersih sabun. Ketiga, sabun terdiri atas substansi alkalis kuat (NaOH dan KOH) dan asam lemak (asam lemak jenuh dan tidak jenuh), yang dapat mengiritasi kulit. Deodoran dalam sabun mulai dipergunakan sejak tahun 1950, namun oleh karena efek sampingnya, penggunaannya dibatasi. Sabun digunakan untuk membersihkan kotoran pada kulit baik berupa kotoran yang larut dalam air maupun kotoran yang larut dalam lemak (Wasitaatmadja, 1997).

Deodoran merupakan jawaban atas kebutuhan tersebut, karena dapat mencegah dan menghilangkan bau badan dengan cara menghambat dekomposisi atau penguraian keringat oleh bakteri (Young, 1972). Bau badan biasanya berhubungan erat dengan peningkatan keluarnya keringat (perspirasi) baik kelenjar keringat ekrin maupun apokrin, maka antiperspiran yang menekan perspirasi kulit, dibutuhkan untuk melengkapi kosmetik ini (Wasitaatmadja, 1997).

G. Antiperspiran dan Deodoran

Meningkatnya penggunaan antiperspiran dan deodoran disebabkan pergaulan modern dalam hal kebersihan badan, sehingga dirasa perlu untuk mengurangi atau menghilangkan bau badan, yang disebabkan perubahan kimia keringat oleh bakteri (Gros dan Keith, 2009). Bentuk sediaan deodoran antiperspiran dapat berupa bedak, cairan atau losio, krim, stick, spray atau aerosol (Leon dan David, 1954). Dermatitis akibat deodoran antiperspiran biasanya disebabkan oleh senyawa-senyawa aluminium, antiseptik, dan zat pewangi. Iritasi ini dapat berkurang jika penggunaan dikurangi, iritasi terjadi karena pH yang rendah, kandungan klorida yang tinggi dan adanya pelarut alkohol dalam sediaan (Swaile, *dkk.*, 2011). Reaksi yang terjadi biasanya dalam bentuk reaksi iritasi, bukan sensitisasi. Reaksi terjadi di ketiak dan bagian-bagian badan lainnya dimana deodoran dikenakan. Penghentian pemakaian biasanya meredakan reaksi dengan cepat (Tranggono dan Latifah, 2007).

Perbedaan antara antiperspiran dan deodoran; antiperspiran diklasifikasikan sebagai kosmetik medisinal/obat karena mempengaruhi fisiologi tubuh yaitu fungsi kelenjar keringat ektrin dan apokrin dengan mengurangi laju pengeluaran keringat sedangkan deodoran membiarkan pengeluaran keringat, tetapi mengurangi bau badan dengan mencegah penguraian keringat oleh bakteri (efek antibakteri) dan menutupi bau dengan parfum. Penggunaan deodoran bukan hanya pada ketiak saja, tetapi bisa juga pada seluruh bagian tubuh. Deodoran tidak mengontrol termoregulasi, sehingga deodoran digolongkan sebagai sediaan kosmetik (Butler, 2000; Egbuobi, *dkk.*, 2013).

Deodoran

Deodoran adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat, menutupi bau badan dan mengurangi bau badan (Rahayu, *dkk.*, 2009).

Deodoran dapat juga diaplikasikan pada ketiak, kaki, tangan dan seluruh tubuh biasanya dalam bentuk spray (Egbuobi, *dkk.*, 2013). Bahan aktif yang digunakan dalam deodoran dapat berupa: (Wasitaatmadja, 1997, Butler, 2000).

- a. Pewangi (parfum); untuk menutupi bau badan yang tidak disukai. Dengan adanya pewangi maka deodoran dapat digolongkan dalam kosmetik pewangi (perfumery).
- b. Pembunuh mikroba yang dapat mengurangi jumlah mikroba pada tempat asal bau badan.
 - 1) Antiseptik: pembunuh kuman apatogen atau patogen, misalnya heksaklorofen, triklosan, triklokarbanilid, amonium kwartener, ion exchange resin.
 - 2) Antibiotik topikal: pembunuh segala kuman, misalnya neomisin, aureomisin. Pemakaian antibiotik tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan resistensi dan sensitisasi.
 - 3) Antienzim yang berperan dalam proses pembentukan bau, misalnya asam malonat, metal chelating, klorofil. Dosis yang diperlukan terlalu tinggi sehingga dapat menimbulkan efek samping.
- c. Eliminasi bau (odor eliminator); yang dapat mengikat, menyerap, atau merusak struktur kimia bau menjadi struktur yang tidak bau, misalnya seng risinoleat, sitronelik senesiona, ion exchange resin.

H. Deodoran Stik

Deodoran stik, berbentuk batang padat, mudah dioles dan merata pada kulit, bau sedap, stik transparan atau berwarna. Pembuatannya berbeda dengan pembuatan lipstik karena deodoran ini merupakan gel sabun. Pembuatannya mirip dengan pembuatan emulsi, yaitu suatu fase minyak (fatty acid) diadukkan dalam suatu fase larutan alkali dalam air/alkohol pada suhu sekitar 70 °C. Gel panas

yang terbentuk diisikan ke dalam cetakan pada suhu sekitar 60 - 65 °C dan dibiarkan memadat (Ditjen POM, 1985; Tranggono dan Latifah, 2007).

Deodoran stik adalah kosmetika yang berbahan dasar; natrium stearat (asam stearat dan natrium hidroksida) dan sebagai pelarut menggunakan propilen glikol atau alkohol (Bulter, 2000). Untuk mencegah kristalisasi garam aluminium maka digunakan gliserin atau propilen glikol dan untuk alasan yang sama maka hanya sejumlah kecil alkohol yang ditambahkan pada formula (Poucher, 1978).

I. Komposisi Sediaan Deodoran Antiperspiran

1. Basis stik

Cera Alba (Farmakope Indonesia IV hal 186, Excipient 6th edition hal 558) Pemerian : berbentuk padatan putih kekuningan, sedikit tembus cahaya dalam keadaan lapis tipis, bau khas lemah dan bebas bau tengik. Kelarutan : Tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol dingin. Larut sempurna dalam kloroform dan eter juga minyak lemak. Konsentrasi : 1-20% Kegunaan : Stabilisator emulsi. OTT : Inkompatibel dengan zat pengoksidasi. Stabilitas : Stabil jika disimpan pada wadah tertutup dan terlindung dari cahaya.

Natrium stearat adalah Campuran garam-garam natrium dari asam lemak yang berbeda terutama terdiri dari asam stearat ($C_{18}H_{35}O_2Na = 306,5$) dan asam palmitat ($C_{16}H_{31}O_2Na = 278,4$). Ini berisi 7,4-8,5% dari natrium, dihitung dengan mengacu substansi kering. Fraksi asam lemak mengandung tidak kurang dari 40% dari asam stearat dan jumlah asam stearat dan asam palmitat tidak kurang dari 90%. Pemerian : serbuk halus putih atau kekuningan, dengan sentuhan berminyak. Kelarutan: perlahan larut dalam air dingin dan dalam alkohol dingin, mudah larut dalam air panas dan dalam alkohol panas. Konsentrasi : 7.4 to 8.5% (Sweetmen 6th hal: 2139)

2. Penstabil

Propilen glikol digunakan dalam kosmetika sebagai pelarut dalam jumlah 15-50%. Propilen glikol berfungsi sebagai humektan yang akan menjaga kestabilan sediaan dengan cara mengabsorpsi lembab dari lingkungan dan mengurangi penguapan air dari sediaan. Selain menjaga kestabilan sediaan, secara tidak langsung humektan juga dapat mempertahankan kelembaban kulit sehingga kulit tidak kering (Martin et al., 1993; Barel et al., 2009). Propilenglikol juga dapat memberikan efek yang sinergis terhadap metil paraben dan propil paraben (Rowe, 2009).

3. Parfum

Parfum sebaiknya dipilih yang sederhana, lembut, dan menyenangkan dan banyak disukai dan dapat menutupi bau badan yang mungkin kurang sedap untuk orang lain (Balsam dan Sagarin, 1972).

J. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat

Islam senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan. Hal inilah yang mendorong umat muslim untuk mengenal banyak ilmu salah satunya adalah ilmu pengobatan yang menggunakan bahan alam khususnya tumbuhan. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim juga tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Luqman/31: 10.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَالْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Kementerian Agama RI, 2013: 411).

Firman-Nya: *wa anzalna min as-sama'i ma'an/Kami turunkan air dari langit* menggunakan bentuk persona pertama (*Kami*), sedang redaksi sebelumnya yang berbunyi: *wa batstsa fiha min kulli dabbah/ dan Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang* menggunakan persina ketiga (*Dia*). Pengalihan bentuk ini agaknya untuk menggarisbawahi pentingnya air sebagai sumber hidup manusia (Shihab, 2012: 287).

Kata *Karim* digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. *Rizk* yang *karim* adalah yang banyak, halal dan bermanfaat. Pasangan tumbuhan yang *karim* adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamanya (Shihab, 2012: 288).

Ayat ini menerangkan beberapa tanda dan bukti kekuasaan Allah yang terdapat di alam ini salah satunya adalah Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan itu berasal dari awan yang dihalau-Nya ke suatu tempat tertentu, kemudian berubah menjadi hujan yang membasahi permukaan bumi. Dengan air hujan itu, tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, dengan warna yang indah dan manfaat yang banyak (Departemen Agama RI, 2009: 543).

Ayat di atas menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah swt. kepada makhluknya dengan menciptakan dan menyediakan segala kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, dimana Allah swt. telah menciptakan segala tumbuhan-tumbuhan yang tidak hanya sebagai bahan makanan tetapi juga memiliki manfaat yang lain. Sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah swt. mempunyai hikmah yang amat besar bagi setiap makhluk yang melata diatas bumi, yang terbang di udara, yang hidup di air, manusia, tumbuhan, dan sebagainya semua itu menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tumbuhan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntunan islam.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadist Abu Zubair, dari Zahir bin Abdullah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah Azza wa jalla [HR. Bukhari]

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani dan penyakit jasmani (Faiz, 1991: 324). Penyakit jasmani sering muncul karena dipengaruhi oleh faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan dalam makanan atau malas mengkonsumsi zat-zat yang gizi seperti vitamin dan sebagainya (Faiz, 1991: 324).

Resistennya senyawa obat terhadap sebuah penyakit dapat mempengaruhi seberapa cepat pasien itu dapat sembuh dari penyakitnya oleh karena itu penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui apakah senyawa obat ini masih dapat digunakan sebagai terapi antibiotik atau tidak (Faiz, 1991: 324).

Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh dan ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah SWT (Faiz, 1991: 324).

Melihat kekuasaan dan keagungan Allah bukanlah perkara yang sulit. Di alam raya ini tak terhitung banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Semuanya dapat kita saksikan dengan mata dan indra kita dan dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Bahkan, pada diri kita sendiri pun luar biasa banyaknya tanda kekuasaan Allah jika kita mau memikirkannya (Faiz, 1991: 324).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit memiliki obat, dan obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya. Oleh karena itu manusia harus senantiasa berusaha dan mencari tahu, meneliti obat untuk memperoleh pengobatan yang sesuai. Namun, tidak lupa tidak lupa bahwa kesembuhan dari suatu penyakit hanya karena izin Allah swt.

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah saw. bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun karena Allah Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram.

Hal ini patut menjadi perhatian, karena perihal halal haram menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Islam yang bisa membuat amalan seseorang tidak diterima oleh Allah swt.karena permasalahan obat yang diminum. Selain itu, suatu obat selain halal juga baik, antara lain tidak membawa mudharat yang akan mencacatkan tubuh atau berbau takhayul, bid'ah, dan khurafat.

Dalam pengobatan Islam, dianjurkan untuk tidak melakukan pengobatan yang membawa kemudharatan dan menimbulkan masalah baru seperti merusak tubuh. Terlebih bila pengobatan tersebut bisa mengakibatkan pelakunya jatuh dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, dalam kitab Thibbun Nabawi diajarkan semampu mungkin umat manusia menjaga tubuh kesehatan secara jasadi dan rohani dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam dan landasan normatif (Zaidul Akbar, 2011).

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, demikian sabda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaii Wa Sallam. Karena kesehatan merupakan hak azasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah dalam memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Allah swt. berfirman dalam QS. Yunus/10: 101.

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Kementerian Agama RI, 2013: 220).

Allah tidak akan memaksa, engkau tidak perlu memaksa mereka agar beriman, tetapi *katakanlah* kepada mereka, "*Perhatikanlah* dengan mata kepala dan hati kamu masing-masing *apa*, yakni makhluk dan atau sistem kerja, *yang ada di langit dan di bumi*. Dalam ayat ini, banyak yang dapat diperhatikan, satu diantaranya saja, bila menggunakan akal yang dianugerahkan Allah swt. sudah cukup untuk mengantar manusia beriman dan menyadari bahwa Allah Mahakuasa, Dia Maha Esa dan Dia membimbing manusia antara lain melalui perantaraan para Nabi guna mengantar manusia ke jalan bahagia (Shihab, 2012: 515).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan perintah-Nya kepada Rasul-Nya, agar dia menyeru kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala dan akal mereka segala kejadian di langit dan di bumi. Mereka diperintahkan agar merenungkan keajaiban langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari, dan bulan, keindahan pergantian malam dan siang, air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang mati, dan menumbuhkan tanam-tanaman dan pohon-pohonan dengan buah-buahan yang beraneka warna rasanya. Hewan-hewan dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam hidup di bumi, memberi manfaat yang tidak sedikit bagi manusia. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang luas, dataran yang subur, samudera yang penuh dengan ikan berbagai jenis, kesemuanya itu tanda keesaan dan kekuasaan Allah, bagi orang yang mau berpikir dan yakin kepada Penciptanya. Akan tetapi bagi mereka yang tidak percaya akan adanya pencipta alam ini, karena fitrah insaniahnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kesemua tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah dalam alam ini tidak bermanfaat baginya.

Demikian pula peringatan nabi-nabi kepada mereka tidak mempengaruhi jiwa mereka. Akal dan perasaan mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari ayat Allah dan tidak membawa mereka pada keyakinan adanya Allah Yang Maha Esa. Mereka tidak memperoleh pelajaran dari sunnah Allah pada umat manusia di masa lampau. Sekiranya mereka memperoleh pelajaran daripada ayat-ayat Allah itu dan dari sunnah Allah pada umat manusia, tentulah jiwa mereka bersih dan terpelihara dari kotoran dan najis yang mendorong mereka kepada kekafiran dan kesesatan (Departemen Agama RI, 2009: 369).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat memberikan gambaran kepada umat manusia bahwa kemajuan umat terletak pada cara berpikirnya, dan berdasarkan ayat ini juga menjadi landasan bagi kita untuk meneliti, menemukan, dan mencetuskan gagasan baru untuk kemajuan Bangsa dan Agama seperti halnya dibidang farmasi, salah satunya, dengan menemukan alternatif-alternatif pengolahan limbah tumbuhan agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasetika, Laboratorium Fitokimia, dan Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu eksperimentatif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi:

Tanaman Botto-Botto diperoleh di sekitar kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, daerah Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Sampel :

Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata L.*) yang diambil di sekitar kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, daerah Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

D. Metode pengumpulan data dan Teknik Pengolahan

1. Metode pengumpulan data

Cara pengumpulan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyiapan sampel (Syadsyam, 2015)

Sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) diperoleh di sekitar kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, daerah Samata, Kabupaten

Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari, pukul 09.00-12.00 karena pada saat itulah terjadi fotosintesis maksimum. Daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak dan tidak berjamur.

b. Pengolahan sampel (Syadsyam, 2015)

Sebelum dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu daun botto'-botto' yang telah dipetik di sortasi basah. Sortasi basah merupakan suatu proses pemisahan daun yang kualitasnya kurang baik seperti daun yang sudah layu ataupun daun yang telah ditumbuhi jamur. Setelah proses sortasi basah, kemudian daun dicuci dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir. Proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang menempel, setelah proses pencucian kemudian daun diangin-anginkan tanpa terkena sinar matahari langsung karena dapat merusak kandungan kimia yang terkandung dalam daun botto'-botto'.

c. Ekstraksi Sampel (Syadsyam, 2015)

Sebanyak 500 g sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) dimasukkan kedalam wadah maserasi, dibasahi dengan pelarut n-heksan sebanyak 5 liter hingga semua simplisia terbasahi, diaduk kemudian ditambahkan kembali n-heksan hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 2 x 24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya disaring. Dipisahkan antara ampas dan filtratnya.

Ampas diekstraksi kembali dengan n-heksan yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan hingga cairan penyari tampak bening sebanyak tiga kali. Ekstrak n-heksan yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan alat *rotary evaporator* pada suhu 40°C sampai diperoleh ekstrak n-heksan pekat.

d. Sterilisasi alat (Syadsyam, 2015)

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi, botol coklat dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca di sterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung sehingga memijar.

e. Uji kadar hambat ekstrak n-heksan daun botto'-botto'

1. Penyiapan mikroba uji

Mikroba uji yaitu *Staphylococcus epidermidis* diambil satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasikan pada medium NA miring, lalu diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam.

2. Uji Aktivitas Anti Bakteri ekstrak n-Heksan daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata L*)

Medium NA dituang secara aseptik kedalam cawan petri steril sebanyak 10 ml kemudian ditambahkan 0,2 ml biakan suspensi bakteri dicampur dengan baik supaya bakteri terdistribusi secara merata. Kemudian *paperdisc* dicelupkan kedalam masing-masing sampel uji ekstrak n-Heksan daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata L*). *Paperdisc* yang telah dicelupkan kedalam masing masing sampel uji diletakkan pada permukaan media yang telah memadat secara aseptis dengan menggunakan pinset steril, dengan jarak 2-3 cm dari pinggir cawan petri, diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. Daerah hambatan yang terbentuk diukur dengan jangka sorong. Perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan diambil rata-ratanya.

3. Pembuatan sediaan deodoran

a. Rancangan formula

Tabel 3.1. Rancangan sediaan deodoran ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) dengan perbandingan basis stik

NO.	Nama Bahan	Formula		
		I	II	III
1	Ekstrak daun botto'-botto'	0,6 gr	0,6 gr	0,6 gr
	Cera alba	12 gr	24 gr	36 gr
	Propilen glikol	47,8 gr	35,8 gr	23,8 gr
	Parfum	qs	qs	qs
2	Ekstrak daun botto'-botto'	0,6 gr	0,6 gr	0,6 gr
	Cetil Alkohol	15 gr	15 gr	15 gr
	Asam stearate	20,3 gr	22,3 gr	23,3 gr
	NaoH	0,653 gr	0,653 gr	0,653 gr
	Propilen glikol	18 gr	18 gr	18 gr
	Parfum	qs	qs	qs

Ket :

Formula I = Konsentrasi (%) formula dengan basis

Formula II = Konsentrasi (%) formula dengan basis

Formula III = Konsentrasi (%) formula dengan basis

b. Pembuatan formula

1. Formula dengan ekstrak n-heksan daun botto-botto konsentrasi 0,6 gr dengan basis cera alba

Ekstrak n-heksan daun botto-botto ditimbang sebanyak 0,6 gr kemudian dibuat basis sediaan stik yaitu cera alba dilebur diatas penangas air dan ditambahkan dengan propilen glikol, selanjutnya semua bahan dicampur dengan perlahan-lahan secara bersamaan diatas penangas air, setelah itu ditambahkan parfum kemudian semua bahan dimasukkan kedalam cetakan *roll up* dan biarkan sampai memadat.

2. Formula dengan ekstrak n-heksan daun botto-botto konsentrasi 0,6 gr dengan basis natrium stearat

Ekstrak n-heksan daun botto-botto ditimbang sebanyak 0,6 gr kemudian dibuat basis sediaan stik yaitu asam stearat sebanyak dilebur diatas penangas air dan ditambahkan dengan propilen glikol dan cetil alkohol, NaoH dilebur diatas penangas air menggunakan cawan porselin, selanjutnya semua bahan dicampur dengan perlahan-lahan secara bersamaan, setelah itu ditambahkan parfum kemudian semua bahan dimasukkan kedalam cetakan *roll up* dan biarkan sampai memadat.

c. Rancangan formula

Tabel 3.2. Rancangan sediaan deodoran stik ekstrak daun botto'-botto'
(*Chromolaena odorata* L)

NO	Nama bahan	Formula		
		I	II	III
1	Ekstrak botto'-botto'	0,006 gr	0,06 gr	0,6 gr
2	Asam stearate	23,347 gr	23,347 gr	23,347 gr
3	NaoH	0,653 gr	0,653 gr	0,653 gr
4	Cetil alcohol	15 gr	15 gr	15 gr

5	Parfum	qs	qs	qs
---	--------	----	----	----

d. Pembuatan formula

Formula dengan ekstrak n-heksan daun botto-botto konsentrasi 0,01 %, 0,1% dan 1%

Ekstrak n-heksan daun botto-botto ditimbang sebanyak 0,006 gram, 0,06 gram dan 0,6 gram kemudian dibuat basis sediaan stik, selanjutnya sediaan stik dilebur diatas penangas air, kemudian semua bahan dicampur dengan perlahan-lahan secara bersamaan diatas penangas air, setelah itu ditambahkan parfum kemudian semua bahan dimasukkan kedalam cetakan *roll up* dan biarkan sampai memadat.

4. Uji penghambatan dan karakteristik sediaan deodorant stik

a. Uji karakteristik sediaan deodoran stik

1. Uji parameter farmasetik stik

Uji parameter sediaan deodorant stik diamati berdasarkan beberapa pengujian yaitu, warna, bau, dan tekstur.

2. Uji hedonik

Uji hedonik dilakukan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap produk deodoran ini. Dalam melakukan uji hedonik, peneliti menyebarkan angket. Kondisi optimal diperoleh melalui parameter warna dan tampilan, bau, dan kelengketan terhadap kulit. Dalam angket yang dibagikan kepada responden, responden diminta untuk mengisi skor pada parameter sesuai dengan pendapat mereka. Nilai A berarti sangat baik, B berarti baik, C berarti cukup, D berarti kurang, dan E berarti sangat kurang. Skor untuk masing-masing skor tersebut secara berturut-turut adalah lima, empat, tiga, dua, dan satu. Dengan begitu, peneliti dapat mengolah datanya dengan uji hedonik.

b. Uji penghambatan sediaan deodorant stik terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Disiapkan mikroba uji yang akan digunakan (*Staphylococcus epidermidis*), disiapkan dan disterilisasi dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C sebanyak 10 ml medium nutrient agar, setelah agak dingin ditambahkan 200 µl mikroba uji dalam LAF dan dihomogenkan, lalu dituang dalam cawan petri dan ditunggu sampai beku. Selanjutnya sediaan deodoran stik dipotong menggunakan pisau steril dan dimasukkan kedalam cawan petri, diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam kemudian dihitung zona hambatnya untuk masing-masing formula I, II, III, kontrol negatif dan kontrol positif.

2. Teknik pengolahan data

Data hasil penelitian akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, data perbandingan variasi konsentrasi ekstrak daun botto-botto akan dilakukan formulasi dan pengujian daya hambat terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Selanjutnya akan diamati dengan metode statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL).

E. Instrument Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah alat maserasi, autoklaf, batang pengaduk, cawan petri, cawan porselin, gelas Erlenmeyer (*Pyrex*) 100 ml, gelas kimia (*Pyrex*) 250 ml, gelas ukur (*Pyrex*) 5 ml, 10 ml dan 50 ml, inkubator, kompor, lampu spiritus, Laminary Air Flow (LAF), lemari pendingin, ose bulat, ose lurus, oven, pengorek, penangas air, *rotary evaporator*, sendok besi, spoit, tabung reaksi, timbangan analitik, *water bath*, dan wadah maserasi.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah Air suling, aluminium foil, biakan bakteri *Stapylococcus epidermidis*, kapas, medium Nutrient Agar (NA), sampel ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.), pelarut n-heksan, propilen glikol, cera alba, cetil alkohol, asam stearat, NaoH, dan parfum.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Hasil Ekstraksi Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) kering diperoleh sebanyak 500 gram. Kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi hasil ekstraksi daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dapat dilihat pada tabel.

Tabel. 3. Hasil Ekstraksi daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Sampel Daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	Bobot kosong wadah (gr)	Bobot wadah + ekstrak (gr)	Bobot total (gr)	Bobot (liter)
Ekstrak n-heksan	174,022	180,390	6,368	-
Cairan penyari n-heksan	-	-	-	5

2. Hasil pengukuran zona hambat Ekstrak Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*

Tabel 4. Hasil pengukuran zona hambat Ekstrak Daun Botto'-botto'

Ekstrak	Daya Hambat (mm)
E1	16,23
E2	16,52
E3	18,67
Kontrol negatif	-
Kontrol positif	-

Keterangan :

- E1 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,006 gr
 E2 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,06 gr
 E3 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,6 gr
 Kontrol negatif : Basis pembentuk stik
 Kontrol positif : Sediaan deodorant stik yang dijual di pasaran

3. Pengamatan organoleptik deodoran stik ekstrak Daun Botto'-botto'
 (*Chromolaena odorata* L.)

Tabel 5. Pengamatan organoleptik stik

Formula	Warna	Bau	Kenampakan
F1	Bening	Tidak berbau	Jernih
F2	Hijau	Khas ekstrak	Jernih
F3	Hijau tua	Khas ekstrak	Jernih
Kontrol negatif	Bening	Tidak berbau	Bening
Kontrol positif	Kuning	Bau mawar	Bening

Keterangan :

- F1 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,006 gr
 F2 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,06 gr
 F3 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,6 gr
 Kontrol negatif : Tanpa zat aktif
 Kontrol positif : Sediaan deodorant stik yang dijual di pasaran

4. Pengamatan konsistensi variasi basis pembentuk deodorant stik ekstrak
 Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Tabel 6. Pengamatan konsistensi variasi basis pembentuk stik

No	Nama Bahan	Formula			Sebelum penyimpanan	Setelah Penyimpanan
		F1 (gr)	F2 (gr)	F3 (gr)		
1	Ekstrak daun botto'- botto'	0,6	0,6	0,6	Padat	Mencair
	Cera alba	12	24	36		
	Propilen glikol	47,8	35,8	23,8		

	<i>Fragrance</i>	qs	qs	qs		
2	Ekstrak daun botto'-botto'	0,6	0,6	0,6	Padat	Padat
	Cetil alkohol	15	15	15		
	NaoH	0,653	0,653	0,653		
	Asam stearat	20,3	22,3	23,3		
	Propilen glikol	18	18	18		
	<i>Fragrance</i>	qs	qs	qs		

5. Hasil pengamatan pengukuran pH sediaan deodorant stik ekstrak Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Tabel 7. Hasil pengukuran pH sediaan deodorant stik

Formula	Hasil pengamatan
F1	6
F2	6,5
F3	6
Kontrol negatif	-
Kontrol positif	-

Keterangan :

- F1 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,006 gr
 F2 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,06 gr
 F3 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,6 gr
 Kontrol negatif : Tanpa zat aktif
 Kontrol positif : Sediaan deodorant stik yang dijual di pasaran

6. Hasil pengukuran zona Hambat sediaan deodorant stik ekstrak Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan menggunakan metode difusi agar.

Tabel 8. Hasil pengukuran zona Hambat deodorant stik

Formulasi	Replikasi (mm)			Total (mm)	rata-rata (mm)
	1	2	3		
1	26,5	26,9	26,9	80,3	26,76
2	26,8	26,5	26,8	80,1	26,7
3	26,9	27,1	26,8	80,8	26,93
kontrol negatif	-	-	-	-	-
kontrol positif	27,7	27,9	27,8	83,4	27,8
Total	107,9	108,4	108,3	324,6	108,19

Keterangan :

F1 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,006 gr

F2 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,06 gr

F3 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,6 gr

Kontrol negatif : Tanpa zat aktif

Kontrol positif : Sediaan deodorant stik yang dijual di pasaran

7. Hasil pengamatan uji hedonik sediaan deodorant stik ekstrak Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Tabel 9. Hasil pengamatan uji hedonik deodorant stik

NO	DAFTAR PERTANYAAN	PRODUK	ALTERNATIF JAWABAN				
			SS	S	RG	TS	STS
			%	%	%	%	%
1	Apakah deodorant ini memiliki tekstur yang baik?	Formula 1	40	52	8	-	-
		Formula 2	28	52	20	-	-
		Formula 3	12	52	32	4	-
2	Apakah deodorant ini lembut digunakan ?	Formula 1	28	68	4	-	-
		Formula 2	16	68	8	8	-
		Formula 3	20	52	16	12	-
	Apakah warna dari	Formula 1	48	48	-	4	-

3	deodorant ini menarik perhatian anda ?	Formula 2	20	60	20	-	-
		Formula 3	12	20	44	24	-
4	Apakah deodorant ini memiliki bau yang wangi ?	Formula 1	72	28	-	-	-
		Formula 2	42	44	12	-	-
		Formula 3	24	68	4	4	-
5	Apakah anda menyukai deodorant ini ?	Formula 1	60	40	-	-	-
		Formula 2	24	68	8	-	-
		Formula 3	24	36	36	8	-

Keterangan :

SS : Sangat suka

S : Suka

RG : Ragu-ragu

TS : Tidak suka

STS : Sangat tidak suka

B. Pembahasan

Allah swt menunjukkan kasih sayang kepada makhluknya dengan menciptakan dan menyediakan segala kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, dimana Allah swt. telah menciptakan segala tumbuhan-tumbuhan yang tidak hanya sebagai bahan makanan tetapi juga memiliki manfaat yang lain. Sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah swt. mempunyai hikmah yang amat besar bagi setiap makhluk yang melata diatas bumi, yang terbang di udara, yang hidup di air, manusia, tumbuhan, dan sebagainya semua itu menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tumbuhan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntunan islam.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Luqman/31: 10.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَالْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Kementerian Agama RI, 2013: 411).

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi, para ilmuwan muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim juga tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadist Abu Zubair, dari Zahir bin Abdullah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah Azza wa jalla [HR. Bukhari]

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani

dan penyakit jasmani (Faiz, 1991: 324). Penyakit jasmani sering muncul karena dipengaruhi oleh faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan dalam makanan atau malas mengonsumsi zat-zat yang gizi seperti vitamin dan sebagainya (Faiz, 1991: 324).

Sesuai dengan penjelasan dari ayat dan hadits diatas, peneliti mengkaji dan meneliti manfaat dari tumbuh-tumbuhan khususnya yang berperan dalam bidang kefarmasian yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pengobatan dalam hal ini melakukan formulasi sediaan deodoran stik dari ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* yang merupakan penyebab terjadinya bau badan.

Penelitian ini menggunakan ekstrak n-heksan dari daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) untuk menghambat perkembangbiakan bakteri penyebab bau badan, hal ini didasarkan atas hasil skrining aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) memberikan aktivitas lebih banyak terhadap bakteri uji yakni *Staphylococcus epidermidis*.

Bentuk sediaan stik dipilih karena zat aktif yang digunakan adalah daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang dikenal sebagai gulma terhadap beberapa tanaman ternyata juga berfungsi sebagai antimikroba pada konsentrasi rendah. Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) diformulasikan menjadi sediaan deodorant stik supaya zat aktif lebih stabil, nyaman digunakan dan memiliki nilai estetika yang lebih baik.

Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata*) yang selama ini telah dimanfaatkan secara optimal untuk pengobatan tradisional yang berkhasiat sebagai antispasmodik, antiprotozoa, antibakteria, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, astringen, antitripanosoma, dan diuretik. Daun ini mempunyai

kemampuan antibakteri sebagai inovasi yang solutif bagi masyarakat karena akan lebih ramah lingkungan karena berasal dari alam dan tidak menimbulkan iritasi.

Kandungan kimia dari tanaman botto'-botto' adalah fenol, terpenoid, limonen, tanin, alkaloid dan flavonoid. Daun dari tanaman ini kaya akan flavonoid, yaitu tanin, quercetin, sinensetin, sakuranetin, padmatin, kaempferol dan salvagenin.

Pada tumbuhan, flavonoid sebagai antimikroba dapat membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan dinding sel. Selain itu flavonoid yang bersifat lipofilik dapat merusak membran mikroba. Terpena atau terpenoid memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Mekanismenya tidak sepenuhnya diketahui, akan tetapi diduga senyawa ini bekerja pada pengrusakan membran oleh senyawa lipofilik. Aktivitas antimikroba senyawa fenolik adalah dengan merusak lipid pada membran plasma mikroorganisme sehingga menyebabkan isi sel keluar.

Dari hasil maserasi didapatkan ekstrak n-heksan kental daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebanyak 6,368 gram, dilanjutkan dengan pembuatan variasi konsentrasi basis pembentuk stik dalam bentuk sediaan deodorant yang bertujuan untuk membandingkan antara basis yang menggunakan cera alba dan natrium stearat yang memenuhi karakteristik sediaan deodorant stik. Untuk basis pertama cera alba konsentrasi F1 (12 gr), F2 (24 gr), F3 (36 gr) dengan propilen glikol F1 (47,8 gr), F2 (35,8 gr) , dan F3 (23,8 gr) dilebur bersamaan diatas penangas air hingga melebur, selanjutnya ditambahkan ekstrak kental daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dengan konsentrasi tertinggi sebanyak 1% untuk masing-masing formula, diaduk hingga homogen menggunakan batang pengaduk, setelah itu ditambahkan parfum sebanyak 2 tetes kemudian semua bahan dimasukkan kedalam cetakan *roll up* dan dibiarkan sampai memadat.

Pada basis kedua dibuat natrium stearat menggunakan asam stearat konsentrasi F1 (20,3 gr), F2 (22,3), dan F3 (23,3 gr) ditambahkan dengan NaoH (0,653 gr), cetil alkohol (15 gr), propilen glikol (18 gr), parfum sebanyak dua tetes untuk masing- masing formula, dan konsentrasi ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebanyak 1 %, dibuat fase minyak yaitu asam stearat, cetil alkohol, propilen glikol dilebur bersamaan diatas penangas air, NaoH dilebur menggunakan cawan porselin diatas penangas air, setelah itu fase minyak dan fase air dicampur dan diaduk menggunakan batang pengaduk, selanjutnya ditambahkan ekstrak dari daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dan ditambahkan parfum sebanyak 2 tetes kemudian semua bahan dimasukkan kedalam cetakan *roll up* dan dibiarkan sampai memadat.

Setelah dilakukan penyimpanan selama kurang lebih satu minggu untuk mengamati basis yang sesuai dan memenuhi karakteristik basis yang baik maka diperoleh karakteristik pembentuk basis stik yang baik terdapat pada formula 3 yaitu pada basis yang menggunakan asam stearat ditambah NaoH untuk membentuk natrium stearat, karena pada basis yang menggunakan cera alba terjadi peleburan setelah dilakukan penyimpanan selama kurang lebih satu minggu. Selanjutnya dilakukan formulasi dengan konsistensi basis yang baik dengan memvariasikan konsentrasi ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yaitu untuk F1 (0,006 gr), F2 (0,06 gr), F3 (0,6 gr).

Penentuan konsentrasi ekstrak yang digunakan berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan sebelumnya yaitu menggunakan variasi konsentrasi ekstrak 0,006 g, 0,06 gr, dan 0,6 gr. Uji pendahuluan ini dilakukan dengan menggunakan medium NA yang telah dimasukkan 1 ose bakteri *Stapylococcus epidermidis* selanjutnya dimasukkan dalam cawan petri hingga medium memadat. Selanjutnya *papper disk* dicelupkan dalam ekstrak yang telah dilarutkan

sebelumnya menggunakan DMSO dan diletakkan dalam medium yang telah memadat, hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa ekstrak yang akan digunakan pada pembuatan formula sediaan deodorant stik memiliki efek antibakteri terhadap bakteri uji yaitu *Stapylococcus epidermidis*. Semua pengerjaan dilakukan secara aseptis. Pengukuran dari uji pendahuluan diperoleh hasil yaitu konsentrasi 0,006 gr daya hambatan terhadap bakteri *Stapylococcus epidermidis* sebesar 16,23 mm, konsentrasi 0,06 gr diperoleh daya hambatan sebesar 16,52 mm, sedangkan pada konsentrasi 0,6 gr menghasilkan daya hambatan sebesar 18,67 mm. Dari hasil tersebut diperoleh daya hambatan terbesar terhadap bakteri *Stapylococcus epidermidis* terbesar terdapat pada konsentrasi tertinggi yaitu 0,6 gr. Berdasarkan hasil dari uji pendahuluan yang positif menghambat bakteri uji yaitu *Stapylococcus epidermidis* dijadikan acuan konsentrasi yang digunakan dalam pembuatan sediaan deodorant stik.

Metode yang digunakan dalam pengujian sediaan deodorant stik yaitu metode *disc diffusion* yaitu untuk menentukan aktivitas antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar. (Pertiwi, 2008). Dari pengujian aktivitas antimikroba sediaan deodorant stik ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dengan konsentrasi ekstrak yang digunakan berdasarkan uji pendahuluan yaitu dengan F1 (0,006 gr), F2 (0,06 gr), F3 (0,6 gr), kontrol negatif (Basis stik, tanpa menggunakan ekstrak), dan kontrol positif (Sediaan deodorant stik yang dijual dipasaran). Dari formulasi tersebut diperoleh hasil rata-rata zona hambat tiap formula dengan menggunakan 3 replikasi

pengukuran berdasarkan metode difusi agar yaitu F1 26,7667 mm, F2 26,7 mm, F3 26,96667 mm, serta kontrol positif 27,8 mm.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) diperoleh data yang menunjukkan kemampuan daya hambat ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan adanya hasil yang diperoleh melalui pengujian lanjut secara statistik yang ditunjukkan dengan besarnya nilai F hitung daripada F tabel pada taraf 5% sebesar 3,45 dan 1% sebesar 5,99. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri tiap perlakuan sangat berbeda nyata (sangat signifikan), artinya ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Berdasarkan analisis data dari uji hedonik yang dilakukan terhadap 25 responden yang sebagian besar dari kalangan mahasiswa berusia sekitar 19-23 tahun, dapat disimpulkan bahwa F1 memiliki tekstur yang baik, lembut digunakan, warna yang menarik, memiliki aroma yang wangi, dan banyak disukai oleh responden dibandingkan dengan F2 dan F3, dapat dilihat pada tabel 8 yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut F1 menunjukkan karakteristik dan nilai estetika yang lebih baik dibandingkan dengan F2 dan F3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam formulasi dan uji aktivitas deodorant stik ekstrak n-Heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Basis dengan karakteristik yang baik adalah dengan menggunakan Asam stearat direaksikan dengan NaOH untuk mendapatkan natrium stearat dibandingkan dengan yang menggunakan cera alba sebagai basisnya.

2. Zona hambatan untuk sediaan deodorant stik ekstrak n-Heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) dalam menghambat pertumbuhan *Staphylococcus epidermidis* yaitu konsentrasi 0,006 gr menghambat 26,7667 mm, Konsentrasi 0,06 gr menghambat 26,7 mm, serta konsentrasi 0,6 gr menghambat 26,93 mm.

3. Allah swt menunjukkan kasih sayang kepada makhluknya dengan menciptakan dan menyediakan segala kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, dimana Allah swt. telah menciptakan segala tumbuhan-tumbuhan yang tidak hanya sebagai bahan makanan tetapi juga memiliki manfaat yang lain. dituliskan dalam firman-Nya QS. Al-Luqman/31: 10, dalam hal ini pembuatan formulasi sediaan deodorant stik dari ekstrak daun botto'-botto' sebagai penghilang bau badan.

B. Saran

Disarankan untuk melakukan pengujian stabilitas kimia dan stabilitas fisika pada sediaan deodorant stik ekstrak n-heksan daun botto'- botto' (*Chromolaena odorata* L)


KEPUSTAKAAN


- Anonim, 2014, Pakai deodoran tiap hari untuk cegah bau badan. Diunduh <http://health.detik.com/read/2014/11/12/140129/2746232/775/pakai-deodoran-tiap-hari-untuk-cegah-bau-badan-wajibkah>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2015.
- Akinmoladun, Afolabi C., Ibukun, E.O., Dan-Ologe, I.A. *Phytochemical Constituents and Antioxidant Properties of Extracts from the Leaves Of Chromolaena odorata*, scientific Research and Essay Volume 2. 2007
- Balsam, M.S., dan Sagarin, E. *Cosmetic Science and Technology Volume I*. Edisi Kedua. London: John Wiley and Sons. 1972
- Cowan, M.M. *Plant Product as Antimicrobial Agents*. Oxford. Miami
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta. PT. syamil
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta. PT. syamil
- Djide, M. N., Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas). 2008
- Depkes RI. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 1995
- Ditjen POM. *Formularium Kosmetika Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1985
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1995
- Egbuobi, R. C., Ojiegbe, G. C., Dike-ndudim, J. N., dan Enwun, P. C. *Antibacterial Activities of different brands of deodorants marketed inowerrri, imo state, Nigeria. African Journal of clinical and experimental microbiologi* 14 (1): 14-1. 2013
- Faiz Muhammad Almath, Dr. *1100 hadits terpilih: Sinar ajaran Muhammad*, Gema Insani, Jakarta. 1991
- Ganiswara Sulistia, G. *Farmakologi dan Terapi, Edisi IV*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2007


- Garrity, G.M; Bell, J.A dan Lilburn, T.G. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systemic Bacteriology*. New York, Bergey's manual Trust, 2004.
- Gros, L., dan Keith H, 2009, *Chemistry Changes Everything-Deodorant and Antiperspirant*. Chemsitry Changes Everything-CITiEs. www.citiseu.org/sites/.../057_Deodorant_antiperspirant.pdf.
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia Penentuan Cara Modern Menganalisa Tumbuhan*, Diterjemahkan oleh Kosasih, Padmawinata, Terbitan ITB, Bandung. 1987
- Hasby,E. *Keringat dan Bau Badan*. 2001
- Ismail, isriyani, *Pengembangan Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Daun Botto'-Botto' (Chromolaena odorata (L.) King & H.E Robins) Sebagai Obat Luka*. Fakultas Kesehatan, Jurusan Farmasi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2013
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2013
- Leon, A. G., dan David L. *Handbook of Cosmetic Materials-The Properties, Uses and Toxic and Dermatologic Actions*. Interscience Publishes Inc.: New York. 1954
- Lachman, L., H.A. Lieberman dan J.L Kaning. *Teori dan Praktek Farmasi Industri II, Edisi III*. Diterjemahkan oleh Siti Suyatmi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. 1994
- Martin, A., J. Swarbrick, dan A. Cammarata. *Farmasi Fisik: Dasar-dasar Farmasi Fisik dalam Ilmu Farmasetik. Edisi Ketiga*. Penerjemah: Yoshita. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Nater,JP.,de Groot AC., dan Liem DH. *Unwanted Effects of Cosmetic and Drug Used in Dermatology*. Amsterdam : Excerpta Medica. 1983
- Ngozi, Igboh M., Jude, Ikewuchi C. and Catherine, Ikewuchi C. *Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*. Pakistan Journal of Nutrition 8. 2009
- Pelczar, michael J. And Chan. E. C. S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna Sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008


- Phan, Thang T., *et.al. Extracts from Leaves of Chromolaena odorata (A.Potential Agent for wound Healing)*, Herbal Traditional Medicine, New York: Marcel Dekker. 2004
- Rowe, R.C., Paul, J.S., dan Marian, E.Q. *Handbook of Pharmaceutical Excipients. Edisi Keenam*. London: Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association. 2009
- Sadsyam, sriyanti. *Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Daun Botto'-Botto' (Chromolaena odorata L.)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi. Makassar: Universitas Islam Negeri Aluddin. 2009
- Shihab, quraish. *Tafsir Al- Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Cetakan V. Jakarta: Lentera hati, 2012.
- Sulistyo. *Farmakologi dan Terapi*. Yogyakarta: EKG. 1971
- Vital, P.G., and W.L, Rivera. *Antimicrobial activity and citotoxicity of Chromolaena odorata (L.f) King and Robinson and Uncaria perrottetii (A. rich) Merr. Extracts*, Available online at <http://www.academicjournals.org/JMPR> Journal of Medicinal Plant Research Vol. 3(7), pp. 511-518. 2009
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Penerjemah: Soendani, Noerono. Edisi kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994
- Wasitaatmadja, S.M. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: UI-Press. 1997
- Wientarsih, I., Prasetyo, BF. *Diktat Farmasi dan Ilmu Resepsir*. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan IPB. 2006
- Young, A. *Practical Cosmetic Sciense*. Mills dan Boon Limited: London. 1974


Lampiran 1. Penyiapan Sampel




Lampiran 2. Ekstraksi Sampel

Lampiran 3. Pembuatan variasi konsentrasi basis



Lampiran 4. Pembuatan formula deodorant stik

Lampiran 5. Pembuatan formula deodorant stik

Lampiran 6. Angket penelitian uji hedonik

Identitas Responden

(Responden tidak perlu menulis nama)

1. No. Responden : (Diisi oleh peneliti)
2. Jenis Kelamin : Pria/Wanita
3. Usia : Tahun
4. Pekerjaan :

A. KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

Berdasarkan pengamatan saudara/saudari, berilah tanda centang () pada bobot nilai alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat saudara/saudari pada setiap pertanyaan. Untuk jawaban Sangat Suka (SS) diberi nilai 5, Suka (S) diberi nilai 4, Ragu-Ragu (RG) diberi nilai 3, Tidak Suka (TS) diberi nilai 2, dan Sangat Tidak Suka (STS) diberi nilai 1.

NO	DAFTAR PERTANYAAN	PRODUK	ALTERNATIF JAWABAN				
			SS	S	RG	TS	STS
			5	4	3	2	1
1	Apakah deodorant ini memiliki tekstur yang baik ?	Formula 1					
		Formula 2					
		Formula 3					
2	Apakah deodorant ini lembut digunakan ?	Formula 1					
		Formula 2					
		Formula 3					
3	Apakah warna dari deodorant ini menarik	Formula 1					
		Formula 2					

	perhatian anda ?	Formula 3					
4	Apakah deodorant ini memiliki bau yang wangi ?	Formula 1					
		Formula 2					
		Formula 3					
5	Apakah anda menyukai deodorant ini ?	Formula 1					
		Formula 2					
		Formula 3					

Lampiran 7. Perhitungan bobot ekstrak n-heksan daun botto'-botto'

(*Chromolaena odorata* L)

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot total} &= \text{Bobot wadah ekstrak} - \text{Bobot wadah kosong} \\
 &= 180,390 \text{ gr} - 174,022 \text{ gr} \\
 &= 6,368 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

Lampiran 8. Zona hambat ekstrak n-heksan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L) terhadap bakteri *Stapylococcus epidermidis*

Tabel 9. Zona hambat ekstrak Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan menggunakan papper disk

Formula	Replikasi (mm)			Daya hambat (mm)
	1	2	3	
1	15,5	16,4	16,8	16,23
2	16,55	16,7	16,3	16,52
3	19,9	18,4	17,7	18,67
Kontrol negatif	-	-	-	-
Kontrol positif	-	-	-	-

Keterangan :

- F1 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,006 gr
 F2 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,06 gr
 F3 : Ekstrak daun botto'-botto' 0,6 gr

- Kontrol negatif : basis deodorant stik tanpa zat aktif
 Kontrol positif : sediaan deodorant stik yang dijual di pasaran

Lampiran 9. Perhitungan formula sediaan deodorant stik

Formula standar *deo stick* (Nater, dkk., 1983)

R/ Aldioxa	10 g
Triclosan	0,5 g
Propilen Glikol	60 g
Etanol	10 g
Asam stearat	5 g
Natrium stearat	5 g
Parfum	qs

Persamaan reaksi natrium stearat :



$$\text{Mol} = \frac{\text{Massa (g)}}{\text{BM}}$$

$$\text{Mol Natrium stearat} = 7,5 \text{ g} / 306,46 = 0,0247 \text{ (F1)}$$

$$\text{Berat asam stearat} = 284,47 \times 0,0247 = 6,9618 \text{ gr}$$

$$\text{Berat natrium hidroksida} = 40,01 \times 0,0163 = 0,653 \text{ gr}$$

$$\text{Mol Natrium stearat} = 8 \text{ g} / 306,46 = 0,0261 \text{ (F2)}$$

$$\text{Berat asam stearat} = 284,47 \times 0,0261 = 7,4246 \text{ gr}$$

$$\text{Berat natrium hidroksida} = 40,01 \cdot 0,0163 = 0,653 \text{ gr}$$

$$\text{Mol Natrium stearat} = 8,5 \text{ g} / 306,46 = 0,0277 \text{ (F3)}$$

$$\text{Berat asam stearat} = 284,47 \times 0,0277 = 7,879 \text{ gr}$$

$$\text{Berat natrium hidroksida} = 40,01 \cdot 0,0163 = 0,653 \text{ gr}$$

Perhitungan formula dengan basis pertama

$$\text{Ekstrak n-heksan daun botto'-botto'} = 1/100 \times 60 \text{ gr} = 0,6 \text{ gr}$$

$$\text{Cetil alkohol} = 25/100 \times 60 \text{ gr} = 15 \text{ gr (F1, F2, dan F3)}$$

$$\text{Asam stearat} = 284,47 \times 0,0247 = 6,9618 \text{ gr (F1)}$$

$$284,47 \times 0,0261 = 7,4246 \text{ gr (F2)}$$

$$284,47 \times 0,0277 = 7,879 \text{ gr (F3)}$$

$$\text{NaOH} = 40,01 \cdot 0,0163 = 0,653 \text{ gr (F1, F2, dan F3)}$$

$$\text{Propilen glikol} = 30/100 \times 60 \text{ gr} = 18 \text{ gr (F1, F2, dan F3)}$$

$$\text{Parfum} = \text{qs}$$

Perhitungan formula dengan basis kedua

$$\text{Ekstrak n-heksan daun botto'-botto'} = 1/100 \times 60 \text{ gr} = 0,6 \text{ gr}$$

$$\text{Cera alba} = 20/100 \times 60 \text{ gr} = 12 \text{ gr (F1)}$$

$$= 40/100 \times 60 \text{ gr} = 24 \text{ gr (F2)}$$

$$= 60/100 \times 60 \text{ gr} = 36 \text{ gr (F3)}$$

$$\text{Propilen glikol} = 79,6/100 \times 60 \text{ gr} = 47,8 \text{ gr (F1)}$$

$$59,6/100 \times 60 \text{ gr} = 35,8 \text{ gr (F2)}$$

$$39,6/100 \cdot 60 \text{ gr} = 23,8 \text{ gr (F3)}$$

$$\text{Parfum} = \text{qs}$$

Perhitungan formula dengan basis yang baik

$$\text{Ekstrak n-heksan daun botto'-botto'} = 0,01/100 \times 60 \text{ gr} = 0,006 \text{ gr (F1)}$$

$$0,1/100 \times 60 \text{ gr} = 0,06 \text{ gr (F2)}$$

	$1/100 \times 60 \text{ gr} = 0,6 \text{ gr (F3)}$
Cetil alcohol	$= 25/100 \times 60 \text{ gr} = 15 \text{ gr (F1,F2, dan F3)}$
Asam stearat	$= 38,9/100 \times 60 \text{ gr} = 23,347 \text{ gr (F1,F2,F3)}$
NaoH	$= 40,01 \times 0,0163 = 0,653 \text{ gr (F1,F2, dan F3)}$
Propilen glikol	$= 30/100 \times 60 \text{ gr} = 18 \text{ gr (F1,F2,dan F3)}$
Parfum	$= \text{qs}$

Lampiran 10. Zona Hambat sediaan deodoran stik ekstrak daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap *Staphylococcus epidermidis* dengan metode difusi agar.

Tabel 10. Hasil pengukuran zona Hambat deodorant stik ekstrak daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap *Staphyococcus epidermidis*

Formula	Replikasi (mm)			Total (mm)	rata-rata (mm)
	1	2	3		
1	26,5	26,9	26,9	80,3	26,76
2	26,8	26,5	26,8	80,1	26,7
3	26,9	27,1	26,8	80,8	26,93
kontrol negatif	-	-	-	-	-
kontrol positif	27,7	27,9	27,8	83,4	27,8
Total	107,9	108,4	108,3	324,6	108,19

Perhitungan :

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(324,6)^2}{5 \times 3} = 7024,34$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total} &= (26,5)^2 + (26,9)^2 + (26,9)^2 + \dots + (27,8)^2 - \text{FK} \\ &= 8804,36 - 7024,34 \\ &= 1780,02 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{JK Kondisi} &= \frac{(80,3)^2 + (80,1)^2 + \dots + (83,4)^2}{3} - \text{FK} \\
 &= \frac{26348,3}{3} - \text{FK} \\
 &= 8782,77 - 7024,34 \\
 &= 1758,43
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{JK Galat (JKG)} &= \text{JK Total} - \text{JK Kondisi} \\
 &= 1780,02 - 1758,43 \\
 &= 21,59
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Bebas Total} &= (r \times t) - 1 \\
 &= (5 \times 3) - 1 \\
 &= 14
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Bebas Perlakuan} &= r - 1 \\
 &= 5 - 1 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Bebas Galat} &= \text{DBT} - \text{DBP} \\
 &= 14 - 4 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

$$\text{Kuadrat Tengah Perlakuan} = \frac{\text{JKP}}{\text{DBP}} = \frac{1758,43}{4} = 439,6075$$

$$\text{Kuadrat Tengah Galat} = \frac{\text{JKG}}{\text{DBG}} = \frac{21,59}{10} = 2,159$$

$$\text{F Hitung (FH) perlakuan} = \frac{\text{KTP}}{\text{KTG}} = \frac{439,61}{2,16} = 203,52$$

Tabel 11. Analisis statistik zona hambat formula deodoran stik dengan rancangan acak lengkap (RAL) terhadap *Staphylococcus epidermidis*

Rumus Varians	Db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
Kondisi	4	1758,43	439,61	203,52	3.48	5.99
Galat	10	21,59	2,159			
Total	14					

Kriteria Penilaian Hasil Uji F :

Bila F hitung \leq F tabel (0.05) berbeda tidak signifikan

Bila F tabel (0.01) $>$ F hitung $>$ F tabel (0.05) berbeda signifikan

Bila F hitung $>$ F tabel (0.01) berbeda sangat signifikan

Lampiran 11. Perhitungan nilai BNT/LSD

$$\begin{aligned} KK &= \sqrt{\frac{2 \text{ KTG}}{\gamma}} \times 100\% = \sqrt{\frac{2,159}{64,92}} \times 100\% \\ &= 0,02 \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

Nilai LSD_{0,05}

$$\begin{aligned} \text{LSD} &= t_{0,05;10} \sqrt{\frac{2 \text{ KTG}}{r}} \\ &= 1,812 \sqrt{\frac{2 \times 2,159}{3}} \\ &= 1,812 \times 1,199 \\ &= 2,172 \end{aligned}$$

Nilai LSD_{0,01}

$$\begin{aligned} \text{LSD} &= t_{0,01;10} \sqrt{\frac{2 \text{ KTG}}{r}} \\ &= 2,764 \sqrt{\frac{2 \times 2,159}{3}} \\ &= 2,764 \times 1,199 \\ &= 3,314 \end{aligned}$$

Tabel 9. Analisis BNT/LSD zona hambat sediaan deodoran stik dengan rancangan acak lengkap (RAL) terhadap *Staphylococcus epidermidis*

Perlakuan	Rataan	Kontrol positif	Formula 3	Formula 1	Formula 2	Kontrol negatif
		27,8	26,93	26,76	26,7	0
Kontrol positif	27,8	0	0,87 ^{NS}	1,04 ^{NS}	1,1 ^{NS}	27,8*
Formula III	26,93	-	0	0,17 ^{NS}	0,23 ^{NS}	26,93*
Formula I	26,76	-	-	0	0,06 ^{NS}	26,76*
Formula II	26,7	-	-	-	0	26,7*
Kontrol negatif	0	-	-	-	-	0

BNT/LSD_{0,05} : 2,172

BNT/LSD_{0,01} : 3,314

Keterangan : ** = Signifikan (Berbeda nyata)

NS = Non signifikan (Tidak Berbeda Nyata)

Lampiran 12. Gambar Hasil penelitian

A. Penyiapan ekstrak Daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.)



Gambar 2. Daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.)



Gambar 3. Sortasi basah Daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.)



Gambar 4. Proses pengeringan sampel Daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.)




Gambar 5. Proses maserasi Daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.) dengan menggunakan pelarut n-Heksan



Gambar 6. Proses maserasi



Gambar 7. Ekstrak n-heksan Daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.)




Gambar 8. Zona hambat ekstrak n-Heksan daun botto-botto pada uji pendahuluan



Gambar 9. Formula basis yang melebur



Gambar 10. Formula dengan konsentrasi 0.006 gr, 0,06 gr, dan 0,6gr



IDM	UHD Base
1	46.334
2	63.254
3	37.240
4	31.472
5	25.030

Merkus	Dosis	Merkus
D1000	D1000	D1000

Gambar 11. Hasil pengukuran transmittan bakteri *Staphylococcus epidermidis*



Gambar 12. Zona hambat deodorant stik formula 1 dan kontrol positif terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*



Gambar 13. Zona hambat deodorant stik formula 3 dan kontrol negatif terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*



Gambar 14. Zona hambat deodorant stik formula 3 dan Formula 3 terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Tenri Rawe, Lahir pada tanggal 10 Januari 1995, di sebuah kota kecil daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Bulukumba,. Ia lahir dari pasangan bahagia Andi Jemma dan Erniwati. Anak pertama dari dua bersaudara ini biasa disapa Tenri. Anak pertama ini dibesarkan dalam keluarga yang sederhana.

Masa kecilnya ia nikmati di sebuah kota di Bulukumba yang bernama Desa Topanda. Ia mulai menikmati masa pendidikannya pada usia 4.5 thn di TK Bahagia. Kemudian bersekolah di SDN 98 Bontomanai. Dia tamat pada tahun 2006, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 3 Bontomanai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009. Kemudian lanjut SMAN 2 Bulukumba, di masa inilah banyak kesan dan pesan yang ia tidak pernah lupa, dan menyelesaikan sekolahnya pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012, dan sekarang aktif sebagai mahasiswa jurusan farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. menghentakkan kaki harapan serta jiwa keberhasilannya di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi

Berkat semangat dari keluarga tercinta khususnya orangtua tercinta dan adek tersayangya Andi Nurjannah serta orang-orang terdekat yang menjadikannya pribadi yang tidak pantang menyerah.

Penulis dalam hidupnya memiliki harapan dimana suatu hari kelak dapat membahagiakan dan membalas semua jasa-jasa orangtuanya, terutama ibu. Tanpa doa dari seorang ibu, penulis tidak dapat melakukan apa-apa. Karena doa seorang ibu merupakan Rahmat dari Allah SWT.

