

**ANALISIS MINIMALISASI BIAYA (*COST MINIMIZATION ANALYSIS*)
PENGUNAAN ANTIBIOTIK PADA TERAPI DEMAM TIFOID**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

JURANA

NIM. 70100113019

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jurana
NIM : 70100113019
Tempat/ Tanggal Lahir : Belawa/09 April 1995
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/ Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Sappa, Kec. Belawa Kab. Wajo
Judul : Analisis Minimalisasi Biaya(*Cost Minimization Analysis*)
Penggunaan Antibiotik pada Terapi Demam Tifoid

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Februari 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

JURANA
NIM. 70100113019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Minimalisasi Biaya (*Cost Minimization Analysis*) Penggunaan Antibiotik pada Terapi Demam Tifoid**" yang disusun oleh **Jurana, NIM : 70100113019**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 14 Februari 2018 M** yang bertepatan dengan **28 Jumadil Awwal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 Februari 2018 M
28 Jumadil Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Haeria, S.Si., M.Si.** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)

Pembimbing II : **Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.** (.....)

Penguji I : **Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Nurhaelah Abbas, Ika, M.A.** (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad saw, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Hamzah dan Ibunda Hj. Nurbaya yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Untuk saudara(i) ku tercinta Sukriadi, Almarhumah Zamzam, Nurhakimah dan Amlia, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan, dan dukungannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Mereka juga adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada mereka.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan dan pembimbing akademik serta ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku sekretaris jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc.,M.A. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.

11. Dosen jurusan farmasi yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Pegawai RSUD Haji Pov. Sul-Sel. yang telah membantu penulis, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt.
13. Rekan, saudara, teman seperjuangan angkatan tahun 2013 “FAR13ION” yang telah banyak membantu serta berjuang bersama dari awal hingga akhir.
14. Rekan, saudara, teman seperjuangan A. Zulfiati, Nurhidayah Ismah, Kiki Rezki, Fitriyani, Ika Pertiwi Dewi Putri, Ayu Andari, Nur Afdhaliah yang telah membantu dan berjuang bersama dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 14 Februari 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1. Definisi Operasional	3
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian	9
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	9

B. Tinjauan Farmakoekonomi	13
1. Definisi	13
2. Biaya	14
3. Metode Kajian Farmakoekonomi	15
4. Analisis Minimalisasi Biaya	16
C. Tinjauan Tentang Demam Tifoid.....	17
1. Definisi	17
2. Epidemiologi	17
3. Etiologi	19
4. Patogenesis.....	20
5. Manifestasi Klinis	22
6. Penegakan Diagnosis	25
7. Tatalaksana	26
8. Pencegahan	29
D. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan	31


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
1. Lokasi Penelitian.....	36
2. Waktu Penelitian.....	36
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Populasi.....	36
E. Sampel	36
1. Kriteria Inklusi	37
2. Kriteria Eksklusi	37

	3. Variabel.....	38
	F. Penentuan Besar Sampel.....	38
	G. Metode Pengumpulan Data.....	38
	H. Instrumen Penelitian	39
	I. Pengolahan Data	39
	1. Menentukan Tujuan	39
	2. Identifikasi Alternatif Pemecahan Masalah	39
	3. Identifikasi Besarnya Efektivitas Pilihan Pengobatan	39
	4. Identifikasi Biaya.....	39
	5. Melakukan Analisis Minimalisasi Biaya (AMiB)	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	41
	B. Pembahasan.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Alur Penelitian	69
2. Dokumen Farmasi Penderita.....	70
3. Surat Izin Penelitian	76
4. Surat Keterangan Penelitian.....	77
5. Surat Persetujuan Etik.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Metode analisis dalam kajian farmakoekonomi	15
2. Rekomendasi pemberian antibiotika pada demam tifoid tanpa komplikasi	27
3. Rekomendasi pemberian antibiotika pada demam tifoid berat	27
4. Harga obat antibiotik Ceftriaxon	41
5. Harga obat antibiotik Ciprofloxacin	41
6. Harga obat antibiotik Cefixime.....	41
7. Harga obat antibiotik Ofloxacin.....	41
8. Data pasien yang menggunakan antibiotik Ceftriaxon	42
9. Data pasien yang menggunakan antibiotik Ciprofloxacin	43
10. Data pasien yang menggunakan antibiotik Cefixime	44
11. Data pasien yang menggunakan antibiotik Ofloxacin	44
12. Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 2 hari.....	45
13. Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari.....	45
14. Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 4 hari.....	46
15. Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari.....	46
16. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 2 hari	47
17. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari	47

18. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 4 hari	47
19. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari	48
20. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 2 hari	48
21. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari	48
22. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 4 hari	49
23. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 5 hari	49
24. Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 6 hari	50
25. Biaya total antibiotik Cefixime oral dengan lama pengobatan selama 4 hari.	50
26. Biaya total antibiotik Cefixime oral dengan lama pengobatan selama 5 hari.	50
27. Biaya total antibiotik Cefixime oral dengan lama pengobatan selama 6 hari.	51
28. Biaya total antibiotik Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari.	51
29. Biaya total antibiotik Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 4 hari.	51
30. Tabel langkah perhitungan analisis minimalisasi biaya (AMiB)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Karakteristik Subjek Penelitian berdasarkan jenis kelamin.....	52
2. Karakteristik Subjek Penelitian berdasarkan usia.....	52
3. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia dan jenis kelamin.....	52
4. Karakteristik Subjek Penelitian berdasarkan kategori BPJS	53
5. Karakteristik Subjek Penelitian berdasarkan jenis obat	53
6. Karakteristik Subjek Penelitian berdasarkan lama penggunaan obat	53



ABSTRAK

Nama : Jurana

Nim : 70100113019

Judul : Analisis Minimalisasi Biaya (*Cost Minimization Analysis*)
Penggunaan Antibiotik pada Pasien Demam Tifoid

Demam Tifoid merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* terutama menyerang bagian saluran pencernaan. Alternatif dalam pemilihan obat yang sangat beragam, menyebabkan pengetahuan dalam farmakologi harus diiringi dengan aspek ekonomi yang berperan dalam pemilihan obat yang terjangkau sehingga memberikan hasil terapi yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel periode Januari-Desember 2016 dan untuk mengetahui manakah biaya penggunaan antibiotik yang paling minimal pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel.

Penelitian ini bersifat observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *quota sampling* berjumlah 92 rekam medis. Data yang diperoleh dilakukan analisis minimalisasi biaya untuk mengetahui biaya pengobatan yang paling minimal diantara obat Ceftriaxon, Ciprofloxacin, Cefixime dan Ofloxacin.

Hasil menunjukkan bahwa Biaya total rata-rata antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari dan 5 hari adalah Rp. 498.795,00/pasien dan Rp. 726.373,00/pasien. Biaya total rata-rata antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari dan 5 hari adalah Rp. 565.241,00/pasien dan Rp. 791.637,00/pasien. Biaya total rata-rata antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari, 5 hari, dan 6 hari berturut-turut adalah Rp. 471,135,00/pasien, Rp. 550.563,00/pasien dan Rp. 882.955,00/pasien. Dan biaya total rata-rata antibiotik Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari adalah Rp. 446.884,00/pasien. Antibiotik yang memiliki biaya paling minimal pada terapi demam tifoid adalah Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari.

Kata kunci: Analisis Minimalisasi Biaya, Demam Tifoid, Ceftriaxon, Ciprofloxacin, Cefixime dan Ofloxacin .

ABSTRACT

Nama : Jurana

Nim : 70100113019

Judul : Cost Minimization Analysis of Antibiotic used by Typhoid Fever Patients

Typhoid fever is a disease caused by *Salmonella typhi* bacteria mainly attacks the digestive tract. The alternative in the selection of highly diverse drugs, leading to knowledge in pharmacology must be accompanied by economic aspects that play a role in the selection of affordable drugs to provide optimal therapeutic results. This study aims to find out how much the cost of antibiotic use in patients with typhoid fever in installation RSUD Haji South Sulawesi period January-December 2016 and to find out where the cost of the minimum use of antibiotics in patients with typhoid fever in installation RSUD Haji South Sulawesi.

This research is observational with retrospective retrieval data. The sample obtained by using quota sampling amounted to 92 medical records. The data obtained are Cost Minimization Analysis to find out the most minimal treatment cost among Ceftriaxon, Ciprofloxacin, Cefixime and Ofloxacin drugs.

The results showed that the average total cost of Ceftriaxon injection with treatment duration for 3 days and 5 days was Rp. 498.795,00 / patient and Rp. 726.373,00 / patient. The average total cost of Ciprofloxacin injection with duration of treatment for 3 days and 5 days was Rp. 565.241,00 / patient and Rp. 791.637,00 / patient. The average total cost of Ciprofloxacin oral with duration of treatment for 3 days, 5 days, and 6 days was Rp. 471,135.00 / patient, Rp. 550.563,00 / patient and Rp. 882.955,00 / patient. And the average total cost of Ofloxacin oral with a duration of treatment for 3 days is Rp. 446.884,00 / patient. Antibiotics that have the least cost in the treatment of typhoid fever is Ofloxacin oral with duration of treatment for 3 days.

Kata kunci: Cost Minimization Analysis, Typhoid Fever, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Cefixime and Ofloxacin .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biaya pelayanan kesehatan khususnya biaya obat telah meningkat tajam beberapa dekade terakhir dan kecenderungan ini tampaknya akan terus berlangsung. Hal ini antara lain disebabkan karena populasi pasien yang semakin banyak dengan konsekuensi meningkatnya penggunaan obat dan adanya obat-obat baru yang lebih mahal (Haluang dkk, 2015: 118).

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan (Kementrian Kesehatan RI, 2016: 34).

Salah satu penyakit yang memerlukan upaya kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh dari rumah sakit yaitu penyakit demam tifoid. Penyakit terbanyak yang masuk ke rumah sakit adalah penyakit demam tifoid khususnya di RSUD Haji Prov. Sul-Sel. Demam tifoid menempati urutan pertama penyakit terbanyak yang masuk ke RSUD Haji Prov. Sul-Sel di tahun 2016, dengan jumlah pasien di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel di tahun 2016 sebanyak 1166 pasien. Instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel terdiri dari ruang perawatan umum dan ruang perawatan khusus. Penyakit Typhus atau Demam Tiphoid (bahasa Inggris: *Typhoid fever*) yang biasa juga disebut *typhus* atau tipes dalam bahasa Indonesianya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhii* terutama menyerang bagian saluran pencernaan (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2015: 31).

Demam tifoid adalah penyakit infeksi yang memerlukan pengobatan antibiotik. Antibiotik merupakan kelompok obat yang paling sering digunakan untuk menyembuhkan penyakit infeksi. Oleh karena itu penggunaan antibiotik harus dilakukan secara tepat. Menurut *World Health Organization (WHO) Global Strategy*, penggunaan antibiotik yang tepat adalah penggunaan antibiotik yang efektif dari segi biaya dengan peningkatan efek terapeutik klinis, meminimalkan toksisitas obat dan meminimalkan terjadinya resistensi (Amin, 2014: 40-41).

Alternatif dalam pemilihan obat yang sangat beragam, menyebabkan pengetahuan dalam farmakologi harus diiringi dengan aspek ekonomi yang berperan dalam pemilihan obat yang terjangkau sehingga memberikan hasil terapi yang optimal. Analisis yang digunakan untuk membandingkan biaya dari dua atau lebih intervensi kesehatan, dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi alternatif dengan biaya yang terendah dengan *outcome* sama ialah *Cost Minimization Analysis (CMA)* atau Analisis Minimalisasi Biaya. Jika dua terapi atau dua (jenis, merek) obat setara secara klinis, yang perlu dibandingkan hanya biaya untuk melakukan intervensi. Sesuai prinsip efisiensi ekonomi, jenis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang membutuhkan biaya paling kecil. Oleh karena itu pada penelitian ini, akan dikaji analisis minimalisasi biaya penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar biaya penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel periode Januari-Desember 2016?
2. Manakah biaya penggunaan antibiotik yang paling minimal pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

- a. Analisis minimalisasi biaya (AMiB—cost minimization analysis, CMA) adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan dua pilihan (opsi, *option*) intervensi atau lebih yang memberikan hasil (*outcomes*) kesehatan setara untuk mengidentifikasi pilihan yang menawarkan biaya lebih rendah (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 6).
- b. Demam tifoid yang biasa juga disebut *typhus* atau tipes dalam bahasa Indonesiannya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella enterica*, khususnya turunannya yaitu *Salmonella typhii* (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2015: 31).
- c. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri (Amin, 2014: 42).
- d. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan perawatan kesehatan, termasuk biaya obat, biaya alat kesehatan, biaya pelayanan, biaya laboratorium dan biaya rawat inap (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 14).

- e. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah dengan perubahan kuantitas atau volume produk atau layanan yang diberikan dalam jangka pendek (umumnya dalam rentang waktu 1 tahun atau kurang), seperti biaya pelayanan, biaya laboratorium, dan biaya rawat inap (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 13).
- f. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring perubahan hasil yang diperoleh, seperti biaya alat kesehatan dan biaya pengobatan (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 13).
- g. Observasi adalah proses mengamati dan mengurai fenomena. Sedangkan pengukuran variabel adalah observasi variabel (fenomena) dengan maksud agar variabel tersebut dapat dianalisis (Sastroasmoro dan Ismael, 2014: 67).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis minimalisasi biaya penggunaan antibiotik pada terapi demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dimana sampel yang digunakan adalah penderita demam tifoid yang menggunakan antibiotik dan menjalani pengobatan di RSUD Haji Prov. Sul-Sel periode Januari-Desember tahun 2016 yang memenuhi kriteria inklusi.

D. Kajian Pustaka

1. Peneliti Abdullah, Kumamba dan Sinuraya ddk., 2016 dalam jurnal penelitian dengan judul “*Analisis Minimalisasi Biaya Penggunaan Antibiotik Meropenem dan Ceftazidime pada Terapi Febrile Neutropeni*”. Penelitian ini merupakan studi observasi analisis dengan pengambilan data secara retrospektif yang dilakukan pada bulan Februari 2014 melalui data rekam medis pasien rawat inap *febrile neutropenia* yang mendapatkan terapi

antibiotik meropenem atau ceftazidime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan bermakna, rata-rata total biaya terapi menggunakan antibiotik meropenem adalah sebesar Rp11.094.147, sedangkan rata-rata biaya total perawatan kelompok antibiotik ceftazidime sebesar Rp7.082.523. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga profesional kesehatan dalam manajemen terapi *febrile neutropenia*.

2. Peneliti Chandra, Adi, 2015 dalam tesis penelitian dengan judul “*Analisis Minimalisasi – Biaya Anestesi Umum Propofol Target Controlled Infusion (Tci) Dan Anestesi Inhalasi Di Rsup Sanglah*”. Rancangan penelitian yang digunakan adalah *Consecutive Randomized controlled trial* pada pasien yang menjalani pembedahan dengan anestesi umum di kamar operasi RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian ini mengambil sampel 40 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok ($n = 40$), kelompok A menggunakan *target controlled infusion* propofol dan kelompok B menggunakan anestesi inhalasi isofluran. Uji statistik menggunakan *Shapiro Wilk*, *Lavene Test*, dan *independent sample T-test* (dengan derajat kemaknaan < 0.05). Analisis data menggunakan program SPSS v. 17.0 for windows (*Statistical Package for the Social Sciences Inc, USA*). Pada penelitian ini didapatkan rasio penggunaan obat persatuan waktu kelompok A 8,54 mg ($\pm 2,04$ mg) per menit dan kelompok B 0,42 ml ($\pm 0,09$ ml) per menit. Biaya obat anestesi umum pada kelompok A Rp. 800,85 (\pm Rp. 127,99) per menit. Pada kelompok B Rp. 1.266,32 (\pm Rp. 227,26) per menit ($p < 0.001$). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis minimalisasi – biaya obat anestesi umum menggunakan TCI propofol secara signifikan berbeda bermakna

menghasilkan beban biaya yang lebih murah dibandingkan anestesi inhalasi isofluran.

3. Peneliti Jainam, Shah dan Kalyani, Patni dkk., 2016 dalam jurnal penelitian dengan judul "*Pharmacoeconomic Evaluation, Cost Minimization Analysis of Anti-Diabetic Therapy in Gujarat*". Tiga merek dari dua obat yang dipilih dan dilakukan analisis laboratorium untuk semua merek yang dipilih untuk membandingkan bioekivalensi. Untuk obat yang diresepkan, harga dibandingkan dengan menggunakan sumber daya yang dikeluarkan. Metformin 500 mg adalah obat yang paling sering diresepkan. Sitagliptin 50 mg obat termahal diresepkan. Glycomet, Glyciphage dan Forson adalah merek Metformin, Januvia dan Zeta adalah merek Sitagliptin, dipilih untuk analisis laboratorium. Isi obat untuk metformin di Glycomet (100%), Glyciphage (99,24%) dan Forson (98,95%) untuk Sitagliptin, Januvia (100%) dan Zeta (102,43%) hampir sama. Variasi harga Metformin ditemukan 94,83% dan yang dari Sitagliptin ditemukan menjadi 174,5%. Jelas bahwa molekul obat yang sama dengan variasi biaya memiliki konten kekuatan obat yang sama akan menghasilkan hasil klinis yang sama. Dapat disimpulkan bahwa obat murah dapat diresepkan untuk pasien agar mengurangi beban ekonomi pada pasien diabetes.
4. Peneliti Gu, dan Tang, Zhiliu dkk., 2015, dalam jurnal penelitian dengan judul "*Cost-Minimization Analysis of Metformin and Acarbose in Treatment of Type 2 Diabetes*". Analisis minimalisasi biaya dilakukan dengan asumsi bahwa metformin dan acarbose memiliki efektivitas klinis setara. Biaya pengobatan terdeteksi dan dievaluasi dari perspektif pembayaran. analisis ketidakpekaan, beberapa skenario klinis dikembangkan sesuai dengan praktek

klinis dan perilaku resep dokter di Cina. Hasil: Metformin dapat menghemat biaya perawatan tahunan 39,87% menjadi 40,97% dibandingkan dengan acarbose. Menghemat biaya dengan 19,83% untuk 40,97% pada pasien yang berat badannya 60 kg atau kurang dan dengan 39,87% untuk 70,49% pada pasien yang berat badannya lebih dari 60kg, yang menguatkan hasil bahwa metformin lebih hemat biaya daripada acarbose. Kesimpulan: Metformin lebih murah dibandingkan dengan acarbose. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan orang-orang dari penelitian sebelumnya yang metformin tidak diragukan lagi sebagai pilihan pertama dalam pengelolaan DMT2, dengan efek penurunan glukosa yang signifikan dan biaya perawatan yang rendah.

5. Peneliti Andayani, dkk., 2004, dalam jurnal penelitian dengan judul “*Analisis Cost-Minimization Penggunaan Injeksi Antibiotik Sulbenisilin Dibandingkan Amoksisilin Dan Kalium Klavulanat Pada Seksio Sesarea*”. Penelitian penggunaan antibiotik profilaksis, sulbenisilin dibandingkan amoksisilin dan kalium klavulanat injeksi. Penelitian dilakukan secara retrospektif pada pasien yang melahirkan secara seksio sesarea dan mendapatkan sulbenisilin atau coamoxiclav injeksi di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Data diambil dari tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2000. Langkah-langkah penelitian meliputi pencatatan data mengenai identitas pasien, indikasi dilakukan bedah sesar, jenis irisan abdominal dan antibiotik yang digunakan. Data yang terkait dengan biaya meliputi pemakaian obat dan alat operasi, biaya obat, biaya perbekalan farmasi, waktu yang diperlukan perawat untuk memberikan obat, dan biaya untuk mengatasi komplikasi yang terjadi. Dari 98 catatan medik yang terkumpul dilakukan analisis *costminimization*.

Hasil penelitian menunjukkan lama hari perawatan pasien yang mendapatkan sulbenisilin injeksi adalah 4,85 hari dan pada pasien yang mendapatkan amoksisilin dan kalium klavulanat 4,90 hari. Dari perhitungan didapatkan biaya total rata-rata penggunaan sulbenisilin injeksi per hari lebih kecil, yaitu Rp.140.509, dibandingkan dengan amoksisilin dan kalium klavulanat, yaitu Rp. 376.310.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui berapa besar biaya penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel periode Januari-Desember 2016.
- b. Untuk mengetahui manakah biaya penggunaan antibiotik yang paling minimal pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu sebagai bahan acuan bagi pengambil kebijakan (rumah sakit) dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dengan menerapkan kajian farmakoekonomi, dalam rangka pemilihan dan penggunaan obat yang efektif dan efisien, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan tetap mempertahankan kualitas obat yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat RSUD Haji Makassar

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 1992 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berdiri di atas tanah seluas 1,06 Hektar milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di Jalan Dg. Ngeppe No. 14 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate. Latar belakang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang ditetapkan di daerah bekas lokasi Rumah Sakit Kusta Jongaya adalah diharapkan Rumah Sakit ini dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan Calon Jemaah Haji dan masyarakat sekitarnya.

Pengoperasian RSUD Haji Makassar didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Nomor : 488/IV/1992 tentang pengelolaan Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan SK Gubernur Nomor : 802/VII/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit serta SK Gubernur Nomor : 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. Maka pada tanggal 13 Desember 1993 Departemen Kesehatan menetapkan RSU Haji Makassar sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan klasifikasi C yang dituangkan ke dalam SK Nomor: 762/XII/1993.

Pada awal pengoperasiannya, jumlah pegawai tetap RSUD Haji Makassar berjumlah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan

pada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan PNS Daerah. Adapun pejabat yang melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit sementara dirangkap oleh Kepala Kanwil Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu dr. H. Udin Muhammad Muslaini.

Pada tanggal 31 Desember 1992 dilaksanakan serah terima kepada Dr. H. Sofyan Muhammad dan setelah ditetapkan pelembagaan Rumah Sakit maka berdasarkan Kepres No. 9 Tahun 1985 Direktur RSUH kelas C, ditetapkan sebagai pejabat Struktural Eselon III/a definitive. Pada tanggal 26 Agustus 2001 Jabatan Direktur RSUD Haji diserahkan kepada pejabat baru yaitu, dr. Hj. Magdaniar Moein, M.Kes kemudian pada tanggal 28 Februari 2007 dilaksanakan serah terima jabatan kepada drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes sebagai Direktur Rumah Sakit umum Haji Makassar dan pada tanggal 21 Juli 2008 jabatan Direktur diserahkan kepada drg. Hj. Nurhasanah Palinrungi, M.Kes. dan pada tahun 2015 jabatan Direktur diserahkan kepada dr. Arman Bausat, Sp.B, Sp.OT(K)Spine dan pada tahun 2017 jabatan Direktur digantikan kembali oleh drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes sebagai Direktur RSUD Haji Prov. Sul-Sel.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1226/MENKES/SK/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Rumah Sakit Umum Haji Makassar telah ditingkatkan kelasnya dari tipe C menjadi tipe B. dengan system pelayanan menggunakan standard ISO.9001: 2008 oleh PT. SGS Indonesia – System & Service Certification.

b. Visi, Misi, Motto dan Tujuan RSUD Haji Makassar

1) Visi

Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagai sarana Pelayanan Kesehatan paripurna yang professional dan Pusat Rujukan Sulawesi Selatan serta Wilayah Indonesia Timur.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna
- b) Meningkatkan cakupan pelayanan dan pendapatan Rumah Sakit
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit
- e) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan staf sebagai asset yang bernilai bagi Rumah Sakit.

c. Motto

Motto RSUD Haji adalah “CEPAT” yang merupakan singkatan dari Cepat, Etika, Profesionalisme, Akurat, dan Transparan.

d. Tujuan

- 1). Terciptanya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit
- 2). Memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan
- 3). Peningkatan disiplin dan kualitas kerja pegawai

e. Pelayanan Medis

1). Instalasi Rawat Jalan

Terdiri atas 9 poliklinik yang melayani setiap hari kerja, yaitu: Poliklinik Interna, Poliklinik Bedah, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Anak, Poliklinik Kulit dan Kelamin, dan Poliklinik Kebidanan

2). Instalasi Rawat Darurat

Instalasi Rawat Darurat (IRD) melayani penderita yang tergolong gawat darurat selama 24 jam. Namun tidak menutup kemungkinan merawat penderita yang

bukan Gawat Darurat. Ruangan di Instalasi rawat darurat dipimpin oleh seorang dokter umum.

a) Instalasi Rawat Inap

Kapasitas perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Makassar terdiri dari :

- 39 ruang perawatan umum.
- 3 ruang perawatan khusus (Ruang Bedah Sentral, Isolasi dan Kamar Bersalin).

Jumlah Tempat Tidur yang tersedia 122 tempat tidur, terdiri :

- Tempat tidur Kelas Utama = 4
- Tempat tidur Kelas I = 15
- Tempat tidur Kelas II = 40
- Tempat tidur Kelas III = 63

b) Instalasi Bedah Sentral

Ruang Instalasi Bedah Sentral terdiri dari :

- Ruang Tunggu
- Ruang Dokter
- Ruang Gips/Suster
- Ruang Pemulihan
- Ruang Operasi (3)
- Ruang Spoolhox/Cuci (2)
- Ruang Ganti
- Ruang Persiapan
- Ruang Gudang
- Ruang Sentralisasi

B. Tinjauan Farmakoekonomi

1. Definisi

Menurut Waley dan Davey (1995) farmakoekonomi adalah suatu metoda baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik (*cost effective with best clinical outcome*) (Chandra, 2015: 26).

Menurut Vogenberg (2001) farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur dan membandingkan biaya, resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Evaluasi farmakoekonomi memperkirakan harga dari produk atau pelayanan berdasarkan satu atau lebih sudut pandang (Mufriha, 2009: 15).

Sanchez (1994) mendefinisikan farmakoekonomi sebagai bidang studi yang mengevaluasi perilaku individu, perusahaan dan pasar yang relevan dengan penggunaan produk farmasi, jasa dan program, dan yang sering berfokus pada biaya (Input) dan konsekuensi (hasil) (Scaria dkk., 2015: 38).

Sedangkan menurut Haycox (1991) farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dalam bidang farmakologi yang mempelajari mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, dimana pembiayaan dalam hal ini mencakup bagaimana mendapatkan terapi yang efektif, bagaimana dapat menghemat pembiayaan, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup (Chandra, 2015: 26).

2. Biaya

Dalam kajian farmakoekonomi, biaya selalu menjadi pertimbangan penting karena adanya keterbatasan sumberdaya, terutama dana. Dalam kajian yang terkait dengan ilmu ekonomi, biaya (atau biaya peluang, *opportunity cost*) didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumberdaya dalam sebuah kegiatan. Patut dicatat bahwa biaya tidak selalu melibatkan pertukaran uang. Dalam pandangan para ahli farmakoekonomi, biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekadar biaya pelayanan kesehatan, tetapi termasuk pula, misalnya, biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 12).

Secara umum, biaya yang terkait dengan perawatan kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan perawatan kesehatan, termasuk biaya obat (dan perbekalan kesehatan), biaya konsultasi dokter, biaya jasa perawat, penggunaan fasilitas rumah sakit (kamar rawat inap, peralatan), uji laboratorium, biaya pelayanan informal dan biaya kesehatan lainnya. Dalam biaya langsung, selain biaya medis, seringkali diperhitungkan pula biaya non-medis seperti biaya ambulan dan biaya transportasi pasien lainnya.

b. Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung (Bootman et al., 2005) adalah sejumlah biaya yang terkait dengan hilangnya produktivitas akibat menderita suatu penyakit, termasuk biaya transportasi, biaya hilangnya produktivitas, biaya pendamping (anggota keluarga yang menemani pasien).

c. Biaya nirwujud (*intangible cost*)

Biaya nirwujud adalah biaya-biaya yang sulit diukur dalam unit moneter, namun sering kali terlihat dalam pengukuran kualitas hidup, misalnya rasa sakit dan rasa cemas yang diderita pasien dan/atau keluarganya.

d. Biaya terhindarkan (*averted cost, avoided cost*)

Biaya terhindarkan (Berger et al., 2003) adalah potensi pengeluaran yang dapat dihindarkan karena penggunaan suatu intervensi kesehatan (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 14).

3. Metode Kajian Farmakoekonomi

Pada kajian farmakoekonomi dikenal empat metode analisis, yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Empat metode analisis ini bukan hanya mempertimbangkan efektivitas, keamanan, dan kualitas obat yang dibandingkan, tetapi juga aspek ekonominya. Karena aspek ekonomi atau unit moneter menjadi prinsip dasar kajian farmakoekonomi, hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk menetapkan penggunaan yang paling efisien dari sumber daya kesehatan yang terbatas jumlahnya.

Tabel 1: Metode analisis dalam kajian farmakoekonomi

Metode Analisis	Karakteristik analisis
Analisis minimalisasi biaya (AMiB)	Efek dua intervensi sama (atau setara), biaya dalam rupiah.
Analisis efektivitas biaya (AEB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah/indikator kesehatan, biaya dalam rupiah.
Analisis utilitas-biaya (AUB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dalam <i>quality adjusted life years</i> (QALY), biaya dalam rupiah.
Analisis manfaat-biaya (AMB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, biaya dalam rupiah.

(Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 15-16).

4. Analisis Minimalisasi Biaya

Metode analisis minimalisasi biaya (AMiB) adalah analisis farmakoekonomi yang paling sederhana. AMiB digunakan untuk membandingkan dua intervensi kesehatan yang telah dibuktikan memiliki efek yang sama, serupa, atau setara. Jika dua terapi atau dua (jenis, merek) obat setara secara klinis, yang perlu dibandingkan hanya biaya untuk melakukan intervensi. sesuai prinsip efisiensi ekonomi, jenis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang membutuhkan biaya paling kecil per periode terapi yang harus dikeluarkan untuk mencapai efek yang diharapkan (Chandra, 2015: 27).

Dengan demikian, langkah terpenting yang harus dilakukan sebelum menggunakan AMiB adalah menentukan kesetaraan (equivalen) dari intervensi (misalnya obat) yang akan dikaji. Tetapi, karena jarang ditemukan dua terapi, termasuk obat, yang setara atau dapat dengan mudah dibuktikan setara, penggunaan AMiB agak terbatas, misalnya untuk:

1. Membandingkan obat generik berlogo (OGB) dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia obat sejenis dan telah dibuktikan kesetaraannya melalui uji bioavailabilitasbioekuivalen (BA/BE). Jika tidak ada hasil uji BA/BE yang membuktikan kesetaraan hasil pengobatan, AMiB tidak layak untuk digunakan.
2. Membandingkan obat standar dengan obat baru yang memiliki efek setara (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2013: 17-18).

C. Tinjauan Tentang Demam Tifoid

1. Definisi

Penyakit Typhus atau Demam Tiphoid (bahasa Inggris: Typhoid fever) yang biasa juga disebut typhus atau tipes dalam bahasa Indonesianya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella enterica*, khususnya turunannya yaitu *Salmonella typhi* terutama menyerang bagian saluran pencernaan. Demam tiphoid adalah penyakit infeksi akut yang selalu ada di masyarakat (endemik) di Indonesia, mulai dari usia balita, anak-anak dan dewasa, bahkan lanjut usia (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2015: 31).

Demam tiphoid termasuk infeksi sistematik dengan gejala yang khas yaitu demam. Adapun demam yang dialami oleh pasien yang menderita penyakit ini umumnya memiliki pola khusus dengan suhu yang meningkat (sangat tinggi) naik-turun. hal ini terjadi pada sore dan malam hari sedangkan di pagi hari hampir tidak terjadi demam. hal inilah yang biasanya tidak disadari oleh si penderita maupun keluarga si penderita (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2015: 31).

2. Epidemiologi

Menurut World Health Organization (2003) jika kita membandingkan insiden, cara penyebaran dan konsekuensi dari demam tifoid antara negara maju dan negara berkembang sangat berbeda. Insiden sangat menurun di negara maju sedangkan di negara berkembang kasus demam tifoid sangat marak. Di negara berkembang *Salmonella typhi* sering merupakan isolate *Salmonella* yang paling sering menginfeksi dengan insiden yang dapat mencapai 500 per 100.000 (0,5%) dan angka mortalitas tinggi. Sekitar 16 juta penduduk dunia mengalami demam tifoid setiap tahunnya, 7 juta kasus terjadi di Asia Tenggara dengan angka kematian mencapai 600.000, sedangkan di Indonesia angka kejadian demam tifoid mencapai

760-810 kasus per 100.000 penduduk per tahun dengan angka kematian 3,1-10,4% (Puspita, 2012: 4).

Demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang selalu ada di masyarakat (endemik) di Indonesia, mulai dari usia balita, anak-anak dan dewasa, bahkan lanjut usia. Penyakit demam tifoid berdasarkan Riskesdas tahun 2007 secara nasional di Sulawesi Selatan, tersebar di semua umur dan cenderung lebih tinggi pada umur dewasa. Prevalensi klinis banyak ditemukan pada kelompok umur sekolah yaitu 1,9%, terendah pada bayi yaitu 0,8% (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2015: 31).

Di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 suspek penyakit demam tifoid tercatat sebanyak 23.271 yaitu laki-laki sebanyak 11.723 dan perempuan sebanyak 11.548 sedangkan penderita demam tifoid sebanyak 16.743 penderita yaitu laki-laki sebanyak 7.925 dan perempuan sebanyak 8.818 penderita, dengan kasus yang tertinggi yaitu di Kabupaten Bulukumba (3.270 kasus), Kota Makassar (2.325 kasus) Kabupaten Enrekang (1.153 kasus) dan terendah di Kabupaten Toraja Utara (0 kasus), Kabupaten Luwu (1 kasus) dan Kabupaten Tana Toraja (19 kasus) (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2015: 32).

Manusia adalah natural reservoir dari *Salmonella typhi* dan manusia yang terinfeksi *Salmonella typhi* dapat mengekskresikan bakteri ini untuk kemudian menularkan ke individu yang lain melalui secret saluran napas, urin, dan tinja dalam jangka waktu yang sangat bervariasi. *Salmonella typhi* yang berada di luar tubuh dapat hidup untuk beberapa minggu apabila berada di dalam air, es, debu atau kotoran yang kering ataupun pada pakaian, akan tetapi *Salmonella typhi* hanya dapat hidup kurang dari satu minggu pada suhu ruangan, dan mudah dimatikan dengan klorinasi dan pasteurisasi (temperature 63°C) (Puspita, 2012: 4-5). Masa inkubasi biasanya 8-14 hari, namun bisa berkisar antara 3 hari sampai 2 bulan. Sekitar 2-5%

orang yang terinfeksi menjadi pembawa kronis yang membawa *Salmonella typhi* di kantong empedu (WHO, 2016: 6). Terjadinya penularan *Salmonella typhi* sebagian besar melalui minuman atau makanan yang tercemar oleh kuman yang berasal dari penderita atau pembawa kuman, biasanya keluar bersama-sama dengan tinja (melalui rute fecal oral). Dapat juga terjadi transmisi transplental dari seorang ibu hamil yang berada dalam bakterimia kepada bayinya (Sumarmo dkk (2012) dalam Puspita, 2012: 4-5).

3. Etiologi

Demam tifoid disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*. *Salmonella* adalah bakteri berbentuk basil gram negative yang memiliki panjang bervariasi dan bersifat aerobik (Puspita, 2012: 5).

Bakteri ini tahan terhadap selenit dan natrium deoksikolat yang dapat membunuh bakteri enterik lain, menghasilkan endotoksin, protein invasin dan MRHA (*Mannosa Resistant Haemagglutinin*). *Salmonella typhi* mampu bertahan hidup selama beberapa bulan sampai setahun jika melekat dalam, tinja, mentega, susu, keju dan air beku. *Salmonella typhi* adalah parasit intraseluler fakultatif, yang dapat hidup dalam makrofag dan menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal hanya pada akhir perjalanan penyakit, biasanya sesudah demam yang lama, bakteremia dan akhirnya lokalisasi infeksi dalam jaringan limfoid sub mukosa usus kecil (Cita, 2011: 43).

Kuman *Salmonella* umumnya peka terhadap sinar matahari langsung dan rentan terhadap suhu tinggi, tetapi tahan terhadap pendinginan, kelembaban dan pembekuan (Soedarto, 2012: 161). Infeksi *Salmonella typhi* paling banyak terjadi pada saat musim panas dan sangat erat hubungannya dengan banyaknya konsumsi

makanan yang terkontaminasi. Menurut Nasronudin (2007) *Salmonella t typhi* memiliki 3 macam antigen yaitu:

- a. Antigen O (somatik) terletak di lapisan luar dari bakteri yang mempunyai komponen protein, lipopolisakarida, dan lipid. Antigen O ini sering disebut dengan endotoksin.
- b. Antigen H (flagela) terletak pada flagela, fimbriae dan pili dari bakteri dengan struktur kimia berupa protein.
- c. Antigen Vi (antigen permukaan) terletak pada selaput dinding bakteri yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari fagositosis oleh sel imun dengan struktur kimia yang sama dengan antigen yang terletak di flagela yaitu protein (Puspita, 2012: 5).

4. Patogenesis

Patogenesis demam tifoid merupakan proses yang kompleks yang melalui beberapa tahapan. Bakteri *Salmonella typhi* masuk ke dalam tubuh melalui mulut yang terbawa lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri tersebut. Dosis infeksius dari *Salmonella typhi* yang masuk ke saluran pencernaan adalah 10^5 - 10^9 mikroorganisme dengan masa inkubasi sekitar 4-14 hari. Pada saat bakteri melewati lambung dengan pH asam yang mencapai <2 banyak bakteri yang mati namun sebagian ada yang lolos. Bakteri yang berhasil bertahan dari asam lambung selanjutnya akan masuk ke usus halus tepatnya di ileum dan jejunum kemudian akan menepel di mukosa usus. Bakteri ini akan menginvasi mukosa dan menembus dinding usus (Bhutta (2011) dalam Puspita, 2012: 6).

Kemudian *Salmonella typhi* menyebar ke sistem limfoid mesenterika dan masuk ke dalam pembuluh darah melalui sistem limfatik. Bakteremia primer terjadi

pada tahap ini dan biasanya tidak didapatkan gejala dan kultur darah biasanya masih memberikan hasil yang negatif. Periode inkubasi ini terjadi selama 7-14 hari.

Bakteri dalam pembuluh darah ini akan menyebar ke seluruh tubuh dan berkolonisasi dalam organ-organ sistem retikuloendotelial, yakni di hati, limpa, dan sumsum tulang. Bakteri juga dapat melakukan replikasi dalam makrofag. Setelah periode replikasi, bakteri akan disebarkan kembali ke dalam system peredaran darah dan menyebabkan bakteremia sekunder sekaligus menandai berakhirnya periode inkubasi. Bakteremia sekunder menimbulkan gejala klinis seperti demam, sakit kepala, dan nyeri abdomen.

Bakteremia dapat menetap selama beberapa minggu bila tidak diobati dengan antibiotik. Pada tahapan ini, bakteri tersebar luas di hati, limpa, sumsum tulang, kandung empedu, dan *Peyer's patches* di mukosa ileum terminal. Ulserasi pada *Peyer's patches* dapat terjadi melalui proses inflamasi yang mengakibatkan nekrosis dan iskemia. Komplikasi perdarahan dan perforasi usus dapat menyusul ulserasi.

Kekambuhan dapat terjadi bila kuman masih menetap dalam organ-organ sistem retikuloendotelial dan berkesempatan untuk berproliferasi kembali. Menetapnya *Salmonella typhi* dalam tubuh manusia diistilahkan sebagai pembawa kuman atau *carrier* (Nelwan, 2012: 248).

Menurut Bhutta (2011) dan Sumarmo (2012) proses patogenesis dari demam tifoid terjadi melibatkan 4 proses di mana proses tersebut mengikuti ingesti organisme. Keempat proses tersebut terdiri dari:

- a. Penempelan dan invasi bakteri ke *peyer's patch*.
- b. Bakteri yang telah masuk ke sel-sel M *peyer's patch* akan bertahan hidup dan bermultiplikasi di makrofag *peyer's patch*, nodus limfatikus mesentrikus, dan

organ-organ ekstraintestinal system retikuloendotelial. Selain itu infeksi *Salmonella thypi* di mukosa usus dan komponen limfoid usus akan menyebabkan inflamasi, hyperplasia, yang kemudian bias berlanjut menjadi nekrosis.

- c. Bakteri bertahan hidup di aliran darah.
- d. Bakteri memproduksi enterotoksin yang akan meningkatkan kadar cAMP di dalam kriptus usus yang akan menyebabkan keluarnya elektrolit dan air ke dalam lumen intestinal (Puspita, 2012: 6).

5. Manifestasi Klinis

Gejala klinis yang ditemukan pada demam tifoid diantaranya adalah:

a. Demam

Demam remiten pada minggu pertama, biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat pada sore dan malam hari, yaitu mencapai 39,4 – 40°C. Dalam minggu kedua, pasien terus berada dalam keadaan demam, yang turun secara berangsur-angsur pada minggu ketiga. Demam seringkali disertai denyut jantung yang lambat dan kelelahan luar biasa.

b. Gangguan saluran pencernaan

Sering ditemukan bau mulut yang tidak sedap, bibir kering dan pecah, lidah kotor tertutup oleh selaput putih, sakit tenggorokan serta batuk. Pada umumnya penderita sering mengeluh nyeri perut, penurunan nafsu makan, mual, muntah dan keluhan buang air besar.

c. Gangguan kesadaran

Umumnya terdapat gangguan kesadaran yang kebanyakan berupa penurunan kesadaran ringan dengan kesadaran seperti berkabut. Apabila gejala klinis berat tak jarang penderita sampai koma.

d. Hepatosplenomegali

Hati dan limpa, ditemukan sering membesar. Hati terasa kenyal dan nyeri jika ditekan.

Setelah 7-14 hari tanpa keluhan atau gejala, dapat muncul keluhan atau gejala yang bervariasi mulai dari yang ringan dengan demam yang tidak tinggi, malaise, dan batuk kering sampai dengan gejala yang berat dengan demam yang berangsur makin tinggi setiap harinya, rasa tidak nyaman di perut, serta beraneka ragam keluhan lainnya.

Gejala yang biasanya dijumpai adalah demam sore hari dengan serangkaian keluhan klinis, seperti anoreksia, mialgia, nyeri abdomen, dan obstipasi. Dapat disertai dengan lidah kotor, nyeri tekan perut, dan pembengkakan pada stadium lebih lanjut dari hati atau limpa atau kedua-duanya. Pada anak, diare sering dijumpai pada awal gejala yang baru, kemudian dilanjutkan dengan konstipasi. Konstipasi pada permulaan sering dijumpai pada orang dewasa. Walaupun tidak selalu konsisten, bradikardi relatif saat demam tinggi dapat dijadikan indikator demam tifoid. Pada sekitar 25% dari kasus, ruam makular atau makulopapular (*rose spots*) mulai terlihat pada hari ke 7-10, terutama pada orang berkulit putih, dan terlihat pada dada bagian bawah dan abdomen pada hari ke 10-15 serta menetap selama 2-3 hari.

Sekitar 10-15% dari pasien akan mengalami komplikasi, terutama pada yang sudah sakit selama lebih dari 2 minggu. Komplikasi yang sering dijumpai adalah reaktif hepatitis, perdarahan gastrointestinal, perforasi usus, ensefalopati tifosa, serta gangguan pada sistem tubuh lainnya mengingat penyebaran kuman adalah secara hematogen.

Bila tidak terdapat komplikasi, gejala klinis akan mengalami perbaikan dalam waktu 2-4 minggu (Nelwan, 2012: 248).

Menurut World Health Organization (WHO), ada dua macam klasifikasi demam tifoid dengan perbedaan gejala klinis:

a. Demam Tifoid Akut Non Komplikasi

Demam tifoid akut ditandai dengan demam yang berkepanjangan, gangguan fungsi usus (sembelit pada orang dewasa, diare pada anak-anak), sakit kepala, malaise dan anoreksia. Batuk bronkitis sering terjadi pada tahap awal penyakit. Selama masa demam, hingga 25% pasien menunjukkan ruam atau *rose spot*, di dada, perut dan punggung (WHO, 2011: 7)..

b. Demam Tifoid dengan Komplikasi

Bergantung pada kualitas pengobatan dan keadaan kliniknya, hingga 10% pasien dapat mengalami komplikasi (Marhamah, 2010: 67). Perforasi usus juga telah dilaporkan sampai 3% kasus rawat inap. Ketidaknyamanan perut, gejala dan tanda perforasi usus dan peritonitis, adalah komplikasi lain. Perubahan status mental pada pasien tifoid dikaitkan dengan angka fatalitas kasus yang tinggi. Pasien tersebut umumnya mengalami delirium dan bisa mengalami koma.

Komplikasi lain yang jarang dilaporkan meliputi: meningitis tipus, encephalomyelitis, sindrom Guillain-Barre, neuritis kranial atau perifer, dan gejala psikotik. Komplikasi serius lainnya yang didokumentasikan dengan demam tifoid termasuk perdarahan (menyebabkan kematian yang cepat pada beberapa pasien), Hepatitis, miokarditis, radang paru-paru, koagulasi intravaskular diseminata, trombositopenia dan sindrom uremik hemolitik.

Pada era pra antibiotik, yang memiliki gambaran klinis berbeda, jika pasien tidak meninggal dengan peritonitis atau perdarahan usus, 15% kasus demam tifoid meninggal dengan demam dan penyakit yang terus berlanjut tanpa alasan yang jelas.

Pasien mungkin juga mengalami manifestasi saluran genitourinaria atau kambuh, dan/ atau keadaan pembawa kronis dapat berkembang (WHO, 2011: 7).

6. Penegakan Diagnosis

Penegakan diagnosis untuk demam tifoid didasarkan dengan gejala klinis berupa demam, keluhan gastrointestinal dan dapat disertai dengan keluhan penurunan kesadaran yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium. Diagnosis pasti atau diagnosis definitif demam tifoid ditegakkan ketika ditemukannya *Salmonella typhi* pada hasil kultur darah, sumsum tulang, atau lesi anatomi lain.

Berikut adalah kriteria yang bisa membantu penegakan diagnosis untuk demam tifoid menurut World Health Organization:

a. Kasus demam tifoid yang sudah dikonfirmasi

Seorang pasien dengan demam persisten (38°C atau lebih) yang sudah diderita dan berlangsung selama 3 hari atau lebih, dengan positif ditemukan organisme *Salmonella typhi* yang dilakukan tes laboratorium (darah, sumsum tulang, dan cairan usus).

b. Kemungkinan kasus demam tifoid

Pasien dengan demam terus-menerus (38°C atau lebih) yang sudah diderita dan berlangsung 3 hari atau lebih, dengan tes deteksi serodiagnosis atau deteksi antigen yang positif namun tanpa pemeriksaan kultur *Salmonella typhi*.

c. Kronik carrier

Seorang individu mengekskresikan *Salmonella typhi* dalam tinja atau urine setelah 1 tahun atau lebih setelah terserang demam tifoid akut. *Carrier* jangka pendek juga ada, namun peran epidemiologisnya tidak sepenting kronik *carrier*. Beberapa pasien yang mengekskresikan *Salmonella typhi* tidak memiliki riwayat demam tifoid (WHO, 2011: 7).

7. Tatalaksana

Tatalaksana untuk pasien demam tifoid terbagi menjadi dua bagian besar menurut Prayitno (2012) yaitu tatalaksana umum dan tatalaksana antibiotik. Tatalaksana umum demam tifoid yang bersifat suportif terdiri dari tirah baring, pemberian rehidrasi oral maupun parenteral, penggunaan antipiretik, pemberian nutrisi yang adekuat, serta transfuse darah jika diindikasikan. Komponen-komponen tersebut ikut memberikan kontribusi untuk perbaikan kondisi kesehatan pasien. Berdasarkan dengan etiopatogenesis dari demam tifoid yaitu infeksi *Salmonella typhi* maka pengobatan utama untuk penyakit ini adalah pemberian antibiotik (Puspita, 2012: 11).

a. Istirahat dan Perawatan

Tirah baring dan perawatan bertujuan untuk mencegah komplikasi. Tirah baring dengan perawatan sepenuhnya di tempat tidur, seperti makan, minum, mandi, buang air kecil, dan buang air besar akan membantu dan mempercepat masa penyembuhan. Dalam perawatan perlu sekali dijaga kebersihan tempat tidur, pakaian dan perlengkapan yang dipakai. Maksud tirah baring adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi perdarahan usus atau perforasi usus.

b. Manajemen Nutrisi

Penderita demam tifoid selama menjalani perawatan haruslah mengikuti petunjuk diet yang dianjurkan oleh dokter, seperti makan makanan yang cukup cairan, kalori, vitamin dan protein, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas, makan makanan lunak selama istirahat.

c. Manajemen Medik

Pengobatan simptomatik diberikan untuk menekan gejala-gejala simptomatik yang dijumpai seperti demam, diare, sembelit, mual dan muntah.

Pengobatan suportif dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan penderita, misalnya pemberian cairan, elektrolit, bila terjadi gangguan keseimbangan cairan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh (Nugrah, 2010: 8-14).

Berikut adalah tabel rekomendasi pemberian antibiotika pada demam tifoid menurut World Health Organization (WHO) 2003 yaitu:

a. Pengobatan demam tifoid tanpa komplikasi

Tabel 2: Rekomendasi pemberian antibiotika pada demam tifoid tanpa komplikasi

Kepekaan	Terapi Optimal			Obat Alternatif		
	Antibiotik	Dosis Harian(mg/kg BB)	Lama Pemberian (Hari)	Antibiotik	Dosis Harian(mg/kg BB)	Lama Pemberian (Hari)
Sensitif	Floroquinolon	15	5-7	Kloramfenikol	50-75	14-21
				Amoksisilin	75-100	14
				TMP-SMX	8-40	14
MDR	Floroquinolon atau Sefiksim	15 15-20	5-7 7-4	Azitromisin	8-10	7
				Sefiksim	15-20	7-14
Resisten quinolone	Azitromisin atau Seftriakson	8-10 75	7 10-14	Sefiksim	20	7-14

b. Pengobatan demam tifoid berat

Tabel 3: Rekomendasi pemberian antibiotika pada demam tifoid berat

Kepekaan	Terapi Optimal			Obat Alternatif		
	Antibiotik	Dosis Harian(mg/kg BB)	Lama Pemberian (Hari)	Antibiotik	Dosis Harian(mg/kg BB)	Lama Pemberian (Hari)
Sensitif	Floroquinolon	15	10-14	Kloramfenikol	100	14-21
				Amoksisilin	100	14
				TMP-SMX	8-40	14
MDR	Floroquinolon	15	10-14	Seftriakson atau Sefotaksim	60 80	10-14
				Floroquinolon	20	7-14
Resisten quinolone	Seftriakson atau Sefotaksim	60 80	10-14	Floroquinolon	20	7-14

Terapi pada demam tifoid adalah untuk mencapai keadaan bebas demam dan gejala, mencegah komplikasi, dan menghindari kematian. Yang juga tidak kalah penting adalah eradikasi total bakteri untuk mencegah kekambuhan dan keadaan *carrier*.

Pemilihan antibiotik tergantung pada pola sensitivitas isolat *Salmonella typhi* setempat. Munculnya galur *Salmonella typhi* yang resisten terhadap banyak antibiotik (kelompok MDR) dapat mengurangi pilihan antibiotik yang akan diberikan. Terdapat 2 kategori resistensi antibiotik yaitu resisten terhadap antibiotik trimethoprim sulfamethoxazole (kelompok MDR), dan kelompok kloramfenikol, ampicillin, dan resisten terhadap antibiotik fluoroquinolon. *Nalidixic acid resistant Salmonella typhi* (NARST) merupakan petanda berkurangnya sensitivitas terhadap fluoroquinolon.

Antibiotik golongan fluoroquinolon (ciprofloxacin, ofloxacin, dan pefloxacin) merupakan terapi yang efektif untuk demam tifoid yang disebabkan isolat tidak resisten terhadap fluoroquinolon dengan angka kesembuhan klinis sebesar 98%, waktu penurunan demam 4 hari, dan angka kekambuhan dan *fecal carrier* kurang dari 2%.

Fluoroquinolon memiliki penetrasi ke jaringan yang sangat baik, dapat membunuh *Salmonella typhi* intraseluler di dalam monosit/makrofag, serta mencapai kadar yang tinggi dalam kandung empedu dibandingkan antibiotik lain.

Namun, fluoroquinolon tidak diberikan pada anak-anak karena dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan kerusakan sendi.

Kloramfenikol sudah sejak lama digunakan dan menjadi terapi standar pada demam tifoid namun kekurangan dari kloramfenikol adalah angka kekambuhan yang tinggi (5-7%), angka terjadinya *carrier* juga tinggi, dan toksis pada sumsum tulang.

Azithromycin dan cefixime memiliki angka kesembuhan klinis lebih dari 90% dengan waktu penurunan demam 5-7 hari, durasi pemberiannya lama (14 hari) dan angka kekambuhan serta *fecal carrier* terjadi pada kurang dari 4%.

Selain pemberian antibiotik, penderita perlu istirahat total serta terapi suportif. Yang diberikan antara lain cairan untuk mengkoreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dan antipiretik. Nutrisi yang adekuat melalui TPN dilanjutkan dengan diet makanan yang lembut dan mudah dicerna secepat keadaan mengizinkan (Nelwan, 2012: 249-250).

8. Pencegahan

Strategi pencegahan yang dipakai adalah untuk selalu menyediakan makanan dan minuman yang tidak terkontaminasi, higiene perorangan terutama menyangkut kebersihan tangan dan lingkungan, sanitasi yang baik, dan tersedianya air bersih sehari-hari. Strategi pencegahan ini menjadi penting seiring dengan munculnya kasus resistensi.

Selain pencegahan di atas dilakukan juga edukasi kepada masyarakat dengan cara mendidik anggota masyarakat, terutama yang paling rentan termasuk penanganan makanan dan orang-orang dalam kelompok seperti penitipan anak, lembaga tertutup seperti pondok pesantren perumahan untuk lansia, panti asuhan dan penjara. Hal ini didorong untuk melakukan hal berikut:

- a. Berlatih mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyiapkan makanan dan makan, setelah menggunakan toilet, menangani popok kotor, spreii, dan menjaga standar kebersihan pribadi yang tinggi secara umum.
- b. Menjaga standar kebersihan yang ketat dalam persiapan makanan dan penanganan makanan, terutama salad dan makanan ringan lainnya.
- c. Pastikan untuk benar mendinginkan makanan jika memungkinkan.

- d. Melaporkan semua kematian karena penyakit diare kepada petugas kesehatan (WHO, 2011: 9).

Untuk melakukan tindak pencegahan lainnya, diberikan pesan pendidikan kesehatan untuk masyarakat, yaitu antara lain:

- a. Makan makanan yang telah dimasak dengan matang dan yang masih panas dan dikukus.
- b. Pastikan makanan yang dimasak ditutup untuk melindungi dari lalat.
- c. Hindari sayuran dan buah mentah yang tidak bisa dikupas. Sayuran seperti selada mudah terkontaminasi dan sangat sulit dicuci dengan baik.
- d. Saat mengonsumsi buah atau sayuran mentah yang bisa dikupas, kupas sendiri. (Cuci tangan dulu dengan sabun), jangan makan kulitnya.
- e. Hindari makanan dan minuman dari pedagang kaki lima. Sulit bagi makanan untuk tetap bersih di jalanan, dan banyak turis sakit karena makanan yang dibeli dari pedagang kaki lima.
- f. Semua air minum atau produk pengolahan air rumah tangga lainnya dimasak mendidih selama 1 menit sebelum meminumnya.
- g. Minta minuman tanpa es kecuali es dibuat dari air yang direbus atau diberi klorin.
- h. Hindari es yang mempunyai rasa dan jus karena mungkin telah dibuat dengan air yang terkontaminasi (WHO, 2011: 9).

Selain strategi di atas, dikembangkan pula vaksinasi terutama untuk para pendatang dari negara maju ke daerah yang endemik demam tifoid. Vaksin-vaksin yang sudah ada yaitu:

a. Vaksin *Vi Polysaccharide*

Vaksin ini diberikan pada anak dengan usia di atas 2 tahun dengan disuntikkan secara subkutan atau intra-muskuler. Vaksin ini efektif selama 3 tahun dan direkomendasikan untuk revaksinasi setiap 3 tahun. Vaksin ini memberikan efikasi perlindungan sebesar 70-80%.

b. Vaksin Ty21a

Vaksin oral ini tersedia dalam sediaan salut enterik dan cair yang diberikan pada anak usia 6 tahun ke atas. Vaksin diberikan 3 dosis yang masing-masing diselang 2 hari. Antibiotik dihindari 7 hari sebelum dan sesudah vaksinasi. Vaksin ini efektif selama 3 tahun dan memberikan efikasi perlindungan 67-82%.

c. Vaksin *Vi-conjugate*

Vaksin ini diberikan pada anak usia 2-5 tahun di Vietnam dan memberikan efikasi perlindungan 91,1% selama 27 bulan setelah vaksinasi. Efikasi vaksin ini menetap selama 46 bulan dengan efikasi perlindungan sebesar 89% (Nelwan, 2012: 250).

D. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan. Tidaklah Allah metakdirkan suatu takdir melainkan dibalik takdir itu terdapat hikmah, baik diketahui ataupun tidak. Dengan demikian, hati seorang Muslim harus senantiasa ridho dan pasrah kepada ketetapan Rabb-Nya.

Seorang Muslim pasti pernah terserang penyakit ringan ataupun berat. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah swt. Allah juga telah menetapkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan pada saat seseorang mengalami sakit, hendaknya ia

menyadari bahwa Rasulullah saw. yang merupakan manusia termulia sepanjang sejarah juga pernah mengalaminya.

Hendaknya orang yang sakit maupun orang yang mengobati meluruskan niatnya. Orang yang sakit berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah swt. orang yang mengobati berniat untuk membantu saudaranya sesama Muslim dan menolong semampunya. Ia melakukan semua itu untuk mendapatkan pahala dari Allah semata dan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya agar seorang Muslim memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim (Nada, 2007: 180).

Hendaknya seseorang berkonsultasi dengan kalangan orang-orang yang diketahui bertakwa kepada Allah swt. dan mengetahui ilmu pengobatan.

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nahl: 43)

Tidak semua orang mengetahui ilmu pengobatan, sebagaimana lafazh

Ahmad disebutkan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

((تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلْمُهُ، وَجِهَلُهُ مَنْ جِهَلُهُ.))

Artinya:

“Berobatlah kalian! Sesungguhnya Allah swt. tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ia diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.”

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah swt.

menghendaki agar pengobatan itu dipeleajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan (Al-Qahtani, 2006: 260).

Oleh karena itu, orang yang sedang menderita sakit hendaknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyakit dan mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya.

Dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun sesuatu kita hendaknya berlaku sederhana (hemat) dan kita diperintahkan untuk berlaku seimbang (pertengahan) jadi tidak kikir dan tidak boros pula. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 29, sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”. (QS. Al-Isra’: 29)

Inilah bentuk sikap sederhana yang diperintahkan, tidak bakhil, dan tidak menahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga boros, akan tetapi diantara demikian.

Janganlah engkau enggan mengulurkan tanganmu untuk kebaikan seakan-akan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu kuat yang terikat ke lehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkannya. Maksudnya janganlah kita menjadi orang kikir dan bakhil, tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfag karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, lagi tercela oleh dirimu sendiri atau orang lain karena boros, berlebih-lebihan, dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena telah kehabisan harta. Maksudnya jangan berlebihan dalam berinfag, memberi di luar kemampuan dan mengeluarkan

pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Sehingga kita akhirnya menjadi tercela dan menyesal (Shihab, 2002: 75).

Kata *mahsuran* terambil dari kata *hasara* yang berarti tidak berbusana, telanjang, atau tidak tertutup. Seseorang yang tidak memakai tutup kepala dinamai *Hasiru ar-Rai*. Seseorang yang keadaanya tertutup, dari segi rezeki adalah yang memiliki kecukupan sehingga dia tidak perlu berkunjung kepada orang lain dan menampakkan diri untuk meminta karena itu berarti dia *membuka* kekurangan atau *aibnya* (Shihab, 2002: 75).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dan kekikiran (Shihab, 2002: 75).

Dalam sabda Rasulullah saw. “*khairul umur ausatuha*” yang artinya “sebaik-baik perkara adalah pertengahannya”. Pertengahan secara hakikat adalah menjauh dari dua sisi, dan dua sisi itu adalah sikap berlebihan dan sikap kekurangan yang buruk. Sedangkan sikap pertengahan adalah sikap yang seimbang dalam hidup di dunia ini dan dalam segala hal (Mahmud, 1998: 37-38).

Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 67, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar”. (QS. Al-Furqan: 67)

Ayat di atas menyatakan bahwa: *Dan* mereka juga adalah *orang-orang yang apabila bernafkah, yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah ia, yakni pembelanjaan mereka, pertengahan antara keduanya* (Shihab, 2002: 151-152).

Kata *yusrifu* terambil dari kata *sarf* yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan diberi nafkah. Kata *yaqturu* adalah lawan dari *yusrifu*. Ia adalah memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima (Shihab, 2002: 151-152).

Kata *qawaman* berarti *adil, moderat dan pertengahan*. Melalui anjuran ini, Allah swt. dan Rasulullah saw. mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh. Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan merupakan perintah agama. Moderasi dan sikap pertengahan yang dimaksud ini adalah dalam kondisi normal dan umum (Shihab, 2002: 151-152).

Dari beberapa ayat di atas Allah swt. memerintahkan kepada manusia dalam membelanjakan harta hendaknya bersifat sederhana (hemat), tidak berlebih-lebihan. Kewajiban seorang Muslim adalah membelanjakan atau menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, baik dalam membelanjakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun orang lain. Seperti dalam membelanjakan dalam hal pembelian obat hendaknya bersifat sederhana atau pertengahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pengambilan data secara retrospektif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Haji Prov. Sul-Sel.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Oktober tahun 2017.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif berdasarkan pada data kuantitatif dimana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (Siswanto dan Susilo dkk, 2015: 10).

D. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang terdiagnosis demam tifoid pada instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel pada periode Januari-Desember tahun 2016. Populasi adalah sekelompok subyek dengan karakteristik tertentu (Sastroasmoro dan Ismael, 2014: 55).

E. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap dengan diagnosa demam tifoid di RSUD Haji Prov. Sul-Sel yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mana ciri-cirinya diselidiki atau

diukur atau dapat diartikan sebagian dari populasi (Susilo, 2012: 45). Teknik sampling yang digunakan adalah *quota sampling*. *Quota sampling* adalah pengambilan sampel dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel secara *quotum* atau jatah. Dengan cara pertama-tama menetapkan berapa besar jumlah sampel yang diperlukan atau menetapkan *quotum* atau jatah. Kemudian jumlah *quotum* itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan (Notoatmodjo, 2012: 125). Semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi (Siswanto dan Susilo dkk, 2015: 227).

Kriteria pasien pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian pada populasi target dan pada populasi terjangkau (Sastroasmoro dan Ismael, 2014: 56).

- a. Pasien dengan usia 15-64 tahun (DinKes Prov. Sul-Sel, 2015: 11).
- b. Pasien mendapat pengobatan antibiotik untuk terapi demam tifoid.
- c. Pasien BPJS.
- d. Pasien dinyatakan sembuh.

2. Kriteria Eksklusi

Kriterian eksklusi adalah mengeluarkan subyek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena pelbagai sebab (Sastroasmoro dan Ismael, 2014: 57).

- a. Pasien demam tifoid dengan komplikasi.
- b. Pasien dengan infeksi lain
- c. Pasien tidak menyelesaikan terapi.
- d. Pasien dengan rekam medik tidak lengkap.

3. Variabel

- a. Variabel independent adalah biaya pelayanan, biaya laboratorium, biaya rawat inap, biaya alat kesehatan, dan biaya pengobatan.
- b. Variabel dependent adalah analisis minimalisasi biaya penggunaan antibiotik.

F. Penentuan Besar Sampel

Penentuan besar sampel apabila jumlah populasi (N) diketahui maka teknik pengambilan sampel menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d^2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%) (Siswanto dan Susilo dkk, 2015: 233-234).

Berdasarkan rumus di atas, dengan jumlah populasi 1166, maka diperoleh minimal jumlah sampel 92.

G. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari rekam medis pasien demam tifoid di RSUD Haji Prov. Sul-Sel periode Januari-Desember tahun 2016 meliputi informasi klinis pasien dan biaya langsung yang terkait dengan pasien. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Siswanto dan Susilo, 2015: 265).

H. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini menggunakan rekam medis pasien demam tifoid di RSUD Haji Prov. Sul-Sel periode Januari-Desember tahun 2016.

I. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari rekam medik RSUD Haji Prov. Sul-Sel dilakukan penyuntingan data untuk memastikan data yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diperlukan. Cara analisis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan Tujuan

Tahap ini untuk menentukan tujuan. Tujuan masalah yang akan diatasi yaitu untuk mengetahui biaya yang digunakan pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel dan untuk mengetahui antibiotik mana yang memiliki biaya lebih rendah diantara antibiotik yang lain pada pengobatan demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel.

2. Identifikasi Alternatif Pemecahan Masalah

Tahap ini dilakukan dengan membuat daftar cara untuk mencapai tujuan yaitu dengan membandingkan pengobatan yang dilakukan pada pasien demam tifoid.

3. Identifikasi Besarnya Efektifitas Pilihan Pengobatan

Besarnya efektifitas pilihan pengobatan diperoleh dari hasil studi literatur yang dilakukan.

4. Identifikasi Biaya

Biaya yang teridentifikasi dan diukur adalah biaya langsung, meliputi biaya obat, biaya alat kesehatan, biaya pelayanan, biaya laboratorium dan biaya rawat inap.

5. Melakukan Analisis Minimalisasi Biaya (AMiB)

Dilakukan analisis minimalisasi biaya untuk mengetahui biaya pengobatan yang paling minimal diantara obat yang diberikan pada pasien demam tifoid dengan

cara menghitung biaya total dari masing-masing komponen dari biaya, dengan menggunakan perspektif biaya dari RSUD Haji Prov. Sul-Sel, dengan rumus:

$$\text{Biaya Total} = \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel}$$

Komponen biaya yang termasuk biaya tetap yaitu biaya pelayanan, biaya laboratorium, dan biaya rawat inap, sedangkan biaya variabel yaitu biaya alat kesehatan dan biaya pengobatan.

Masing-masing komponen biaya dihitung dengan terlebih dahulu menghitung biaya masing-masing pasien kemudian dijumlahkan keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah pasien berdasarkan kelompok pemberian terapi sehingga didapat total biaya rata-rata per pasien. Hasil perhitungan dianalisis secara minimalisasi biaya dan ditarik kesimpulan pengobatan demam tifoid yang paling murah terhadap total biaya perawatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pasien demam tifoid yang dirawat di ruang instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel pada periode Januari-Desember tahun 2016 berjumlah 1.166. Dan sampel yang diperoleh dari perhitungan penentuan besar sampel yaitu minimal 92 sampel.

Daftar harga obat antibiotik pada terapi demam tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel yaitu, sebagai berikut:

1. Ceftriaxon

Tabel 4: Harga obat antibiotik Ceftriaxon

No.	Obat	Sediaan	Harga
1.	Ceftriaxon (G)	Vial	Rp. 11.000,00

2. Ciprofloxacin

Tabel 5: Harga obat antibiotik Ciprofloxacin

No.	Obat	Sediaan	Harga
1.	Ciprofloxacin (G)	Botol	Rp. 11.990,00
2.	Ciprofloxacin (G)	Tablet	Rp. 450,00

3. Cefixime

Tabel 6: Harga obat antibiotik Cefixime

No.	Obat	Sediaan	Harga
1.	Cefixime (G)	Tablet	Rp. 899,00

4. Ofloxacin

Tabel 7: Harga obat antibiotik Ofloxacin

No.	Obat	Sediaan	Harga
1.	Ofloxacin (G)	Tablet	Rp. 400,00

Daftar data pasien yang menggunakan antibiotik pada terapi demam tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel yaitu, sebagai berikut:

1. Ceftriaxon

Tabel 8: Data pasien yang menggunakan antibiotik Ceftriaxon

No	RM	Usia	Jenis Kelamin	Lama Pengobatan	Obat	Oral	Injeksi	Kelas BPJS
1	214944	24	Perempuan	2 hari	Ceftriaxone		√	3
2	213377	57	Perempuan	2 hari	Ceftriaxone		√	3
3	213295	16	Perempuan	2 hari	Ceftriaxone		√	3
4	213766	59	Perempuan	2 hari	Ceftriaxone		√	3
5	182619	22	Laki-laki	2 hari	Ceftriaxone		√	3
6	183438	36	Laki-laki	2 hari	Ceftriaxone		√	3
7	213440	20	Perempuan	2 hari	Ceftriaxone		√	3
8	213032	18	Perempuan	2 hari	Ceftriaxone		√	3
9	147094	25	Laki-laki	3 hari	Ceftriaxone		√	2
10	214882	16	Perempuan	3 hari	Ceftriaxone		√	3
11	214365	35	Perempuan	3 hari	Ceftriaxone		√	3
12	214431	28	Perempuan	3 hari	Ceftriaxone		√	3
13	214567	27	Perempuan	3 hari	Ceftriaxone		√	3
14	176970	49	Perempuan	3 hari	Ceftriaxone		√	3
15	214956	27	Laki-laki	3 hari	Ceftriaxone		√	2
16	215011	40	Laki-laki	3 hari	Ceftriaxone		√	3
17	212613	45	Perempuan	3 hari	Ceftriaxone		√	3
18	213291	40	Laki-laki	3 hari	Ceftriaxone		√	2
19	214034	20	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	3
20	28352	22	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
21	214028	16	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
22	153676	24	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	2
23	219381	60	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
24	213365	46	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	3
25	214723	19	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
26	214864	23	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	3
27	214812	45	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	2
28	214888	20	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
29	214644	16	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
30	212616	53	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	2

31	213736	22	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	2
32	212544	64	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
33	213602	43	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
34	175669	37	Perempuan	4 hari	Ceftriaxone		√	3
35	213226	21	Laki-laki	4 hari	Ceftriaxone		√	3
36	213872	16	Laki-laki	5 hari	Ceftriaxone		√	2
37	214132	32	Laki-laki	5 hari	Ceftriaxone		√	3
38	214998	18	Laki-laki	5 hari	Ceftriaxone		√	3
39	213198	40	Laki-laki	5 hari	Ceftriaxone		√	3

2. Ciprofloxacin

Tabel 9: Data pasien yang menggunakan antibiotik Ciprofloxacin

No	RM	Usia	Jenis Kelamin	Lama Pengobatan	Obat	Oral	Injeksi	Kelas BPJS
1	214784	19	Perempuan	2 hari	Ciprofloxacin		√	2
2	214533	35	Laki-laki	2 hari	Ciprofloxacin	√		3
3	152444	45	Laki-laki	2 hari	Ciprofloxacin		√	3
4	212582	64	Perempuan	2 hari	Ciprofloxacin		√	2
5	213461	24	Perempuan	2 hari	Ciprofloxacin		√	3
6	175997	20	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin	√		3
7	214685	30	Laki-laki	3 hari	Ciprofloxacin	√		3
8	213988	31	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin	√		3
9	213666	30	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin		√	3
10	214462	18	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin	√		2
11	214900	21	Laki-laki	3 hari	Ciprofloxacin	√		3
12	127802	22	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin		√	2
13	212660	36	Laki-laki	3 hari	Ciprofloxacin		√	3
14	212600	45	Laki-laki	3 hari	Ciprofloxacin	√		3
15	212501	15	Laki-laki	3 hari	Ciprofloxacin		√	3
16	213612	37	Laki-laki	3 hari	Ciprofloxacin	√		2
17	213524	35	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin		√	2
18	213540	52	Perempuan	3 hari	Ciprofloxacin	√		3
19	213931	26	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
20	192614	44	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		2
21	213998	28	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
22	214079	15	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
23	214893	28	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
24	212882	16	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
25	213737	20	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3

26	144929	19	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		2
27	214951	20	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
28	214914	28	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
29	213676	31	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
30	213904	29	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
31	213542	37	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		2
32	213445	17	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin		√	2
33	213374	31	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
34	213547	46	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
35	213274	18	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
36	56850	51	Laki-laki	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
37	96783	27	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
38	213426	17	Perempuan	4 hari	Ciprofloxacin	√		3
39	214675	23	Perempuan	5 hari	Ciprofloxacin		√	3
40	212679	30	Laki-laki	5 hari	Ciprofloxacin		√	3
41	213475	64	Perempuan	5 hari	Ciprofloxacin	√		3
42	214957	57	Perempuan	5 hari	Ciprofloxacin	√		3
43	63391	63	Laki-laki	6 hari	Ciprofloxacin	√		2

3. Cefixime

Tabel 10: Data pasien yang menggunakan antibiotik Cefixime

No	RM	Usia	Jenis Kelamin	Lama Pengobatan	Obat	Oral	Injeksi	Kelas BPJS
1	196449	30	Laki-laki	4 hari	Cefixime	√		3
2	192612	20	Perempuan	4 hari	Cefixime	√		3
3	214130	29	Laki-laki	4 hari	Cefixime	√		3
4	213001	22	Laki-laki	4 hari	Cefixime	√		3
5	214847	20	Laki-laki	5 hari	Cefixime	√		3
6	214987	25	Laki-laki	5 hari	Cefixime	√		3
7	213735	18	Perempuan	5 hari	Cefixime	√		3
8	214631	51	Laki-laki	6 hari	Cefixime	√		3

4. Ofloxacin

Tabel 11: Data pasien yang menggunakan antibiotik Ofloxacin

No	RM	Usia	Jenis Kelamin	Lama Pengobatan	Obat	Oral	Injeksi	Kelas BPJS
1	194349	30	Laki-laki	3 hari	Ofloxacin	√		3
2	206564	25	Laki-laki	4 hari	Ofloxacin	√		3

Daftar biaya total yang digunakan pasien demam tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel yaitu, sebagai berikut:

1. Ceftriaxon

Tabel 12: Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 2 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214944	44,000	41,410	107,500	60,000	76,000	328,910
2	213377	44,000	44,578	107,500	60,000	76,000	332,078
3	213295	44,000	43,826	222,500	60,000	76,000	446,326
4	213766	44,000	41,410	57,500	60,000	76,000	278,910
5	182619	44,000	42,994	107,500	60,000	76,000	330,494
6	183438	44,000	53,155	165,000	60,000	76,000	398,155
7	213440	44,000	42,994	107,500	60,000	76,000	330,494
8	213032	44,000	39,826	107,500	60,000	76,000	327,326
Total		352,000	350,193	982,500	480,000	608,000	2,772,693
Rata-rata							Rp. 346,587

Tabel 13: Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	147094	66,000	71,900	107,500	120,000	216,000	581,400
2	214882	66,000	58,155	165,000	90,000	114,000	493,155
3	214365	66,000	60,155	165,000	90,000	114,000	495,155
4	214431	66,000	46,323	107,500	90,000	114,000	423,823
5	214567	66,000	73,068	107,500	90,000	114,000	450,568
6	176970	66,000	69,900	107,500	90,000	114,000	447,400
7	214956	66,000	81,404	107,500	120,000	216,000	590,904
8	215011	66,000	58,155	57,500	90,000	114,000	385,655
9	212613	66,000	54,987	165,000	90,000	114,000	489,987
10	213291	66,000	62,907	165,000	120,000	216,000	629,907
Total		660,000	636,954	1,255,000	990,000	1,446,000	4,987,954

Rata-rata	Rp. 498,795
-----------	-------------

Tabel 14: Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 4 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214034	88,000	50,242	107,500	120,000	152,000	517,742
2	028352	88,000	83,652	222,500	120,000	152,000	666,152
3	214028	88,000	94,984	107,500	120,000	152,000	562,484
4	153676	88,000	88,229	165,000	160,000	288,000	789,229
5	219381	88,000	96,149	107,500	120,000	152,000	563,649
6	213365	88,000	85,988	107,500	120,000	152,000	553,488
7	214723	88,000	73,316	157,500	120,000	152,000	590,816
8	214864	88,000	78,068	165,000	120,000	152,000	603,068
9	214812	88,000	89,156	107,500	160,000	288,000	732,656
10	214888	88,000	83,236	107,500	120,000	152,000	550,736
11	214644	88,000	74,900	215,000	120,000	152,000	649,900
12	212616	88,000	84,820	157,500	160,000	288,000	778,320
13	213736	88,000	90,740	215,000	160,000	288,000	841,740
14	212544	88,000	80,053	107,500	120,000	152,000	547,553
15	213602	88,000	81,236	322,500	120,000	152,000	763,736
16	175669	88,000	88,229	107,500	120,000	152,000	555,729
17	213226	88,000	74,900	107,500	120,000	152,000	542,400
Total		1,496,000	1,397,898	2,587,500	2,200,000	3,128,000	10,809,398
Rata-rata							Rp. 635,847

Tabel 15: Biaya total antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	213872	110,000	91,645	107,500	200,000	360,000	869,145
2	214132	110,000	108,142	107,500	150,000	190,000	665,642
3	214998	110,000	106,558	107,500	150,000	190,000	664,058
4	213198	110,000	91,645	165,000	150,000	190,000	706,645
Total		440,000	397,990	487,500	650,000	930,000	2,905,490
Rata-rata							Rp. 726,373

2. Ciprofloxacin

Tabel 16: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lam pengobatan selama 2 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214784	47,960	44,578	222,500	80,000	144,000	539,038
2	152444	47,960	39,826	107,500	60,000	76,000	331,286
3	212582	47,960	44,578	107,500	80,000	144,000	424,038
4	213461	47,960	44,994	272,500	60,000	76,000	501,454
Total		191,840	173,976	710,000	280,000	440,000	1,795,816
Rata-rata							Rp. 448,954

Tabel 17: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	213666	71,940	64,491	222,500	90,000	114,000	562,931
2	127802	71,940	62,907	107,500	120,000	216,000	578,347
3	212660	71,940	61,323	157,500	90,000	114,000	494,763
4	212501	71,940	64,491	165,000	90,000	114,000	505,431
5	213524	71,940	61,793	215,000	120,000	216,000	684,733
Total		359,700	315,005	867,500	510,000	774,000	2,826,205
Rata-rata							Rp. 565,241

Tabel 18: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 4 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	213445	95,920	87,572	107,500	160,000	288,000	738,992
Total		95,920	87,572	107,500	160,000	288,000	738,992
Rata-rata							Rp. 738,992

Tabel 19: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214675	119,900	130,814	272,500	150,000	190,000	863,214
2	212679	119,900	95,160	165,000	150,000	190,000	720,060
Total		239,800	225,974	437,500	300,000	380,000	1,583,274
Rata-rata							Rp. 791,637

Tabel 20: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 2 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214533	1,800	34,578	57,500	60,000	76,000	229,878
Total		1,800	34,578	57,500	60,000	76,000	229,878
Rata-rata							Rp. 229,878

Tabel 21: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	175997	2,700	44,739	107,500	90,000	114,000	358,939
2	214685	2,700	64,068	107,500	90,000	114,000	378,268
3	213988	2,700	46,323	115,500	90,000	114,000	368,523
4	214462	2,700	53,907	445,000	120,000	216,000	837,607
5	214900	2,700	54,900	157,500	90,000	114,000	419,100
6	212600	2,700	50,739	107,500	90,000	114,000	364,939
7	213612	2,700	65,652	280,000	120,000	216,000	684,352
8	213540	2,700	43,155	107,500	90,000	114,000	357,355
Total		21,600	423,483	1,428,000	780,000	1,116,000	3,769,083
Rata-rata							Rp. 471,135

Tabel 22: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 4 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	213931	3,600	87,894	165,000	120,000	152,000	528,494
2	192614	3,600	61,637	222,500	160,000	288,000	735,737
3	213998	3,600	61,316	165,000	120,000	152,000	501,916
4	214079	3,600	58,068	57,500	120,000	152,000	391,168
5	214893	3,600	63,236	107,500	120,000	152,000	446,336
6	212882	3,600	72,981	107,500	120,000	152,000	456,081
7	213737	3,600	53,316	107,500	120,000	152,000	436,416
8	144929	3,600	59,652	57,500	160,000	288,000	568,752
9	214951	3,600	94,317	165,000	120,000	152,000	534,917
10	214914	3,600	62,068	107,500	120,000	152,000	445,168
11	213676	3,600	72,981	280,000	120,000	152,000	628,581
12	213904	3,600	71,813	165,000	120,000	152,000	512,413
13	213542	3,600	71,397	107,500	160,000	288,000	630,497
14	213374	3,600	78,981	107,500	120,000	152,000	462,081
15	213547	3,600	65,652	107,500	120,000	152,000	448,752
16	213274	3,600	62,820	222,500	120,000	152,000	560,920
17	56850	3,600	58,068	107,500	120,000	152,000	441,168
18	96783	3,600	65,988	107,500	120,000	152,000	449,088
19	213426	3,600	56,484	107,500	120,000	152,000	439,584
Total		68,400	1,278,669	2,575,000	2,400,000	3,296,000	9,618,069
Rata-rata							Rp. 506,214

Tabel 23: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 5 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	213475	4,500	66,645	107,500	150,000	190,000	518,645
2	214957	4,500	72,981	165,000	150,000	190,000	582,481
Total		9,000	139,626	272,500	300,000	380,000	1,101,126
Rata-rata							Rp. 550,563

Tabel 24: Biaya total antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 6 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	63391	5,400	98,055	107,500	240,000	432,000	882,955
Total		5,400	98,055	107,500	240,000	432,000	882,955
Rata-rata							Rp. 882,955

3. Cefixime

Tabel 25: Biaya total antibiotik Cefixime oral dengan lama pengobatan selama 4 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	196449	7,192	87,572	165,000	120,000	152,000	531,764
2	192612	7,192	59,652	384,500	120,000	152,000	723,344
3	214130	7,192	67,988	57,500	120,000	152,000	404,680
4	213001	7,192	71,397	107,500	120,000	152,000	458,089
Total		28,768	286,609	714,500	480,000	608,000	2,117,877
Rata-rata							Rp. 529,469

Tabel 26: Biaya total antibiotik Cefixime oral dengan lama pengobatan selama 5 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214847	8,990	66,645	215,000	150,000	190,000	630,635
2	214987	8,990	80,565	57,500	150,000	190,000	487,055
3	213735	8,990	70,229	107,500	150,000	190,000	526,719
Total		26,970	217,439	380,000	450,000	570,000	1,644,409
Rata-rata							Rp. 548,136

Tabel 27: Biaya total antibiotik Cefixime oral dengan lama pengobatan selama 6 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	214631	10,788	81,558	107,500	180,000	228,000	607,846
Total		10,788	81,558	107,500	180,000	228,000	607,846
Rata-rata							Rp. 607,846

4. Ofloxacin

Tabel 28: Biaya total antibiotik Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	194349	2,400	75,484	165,000	90,000	114,000	446,884
Total		2,400	75,484	165,000	90,000	114,000	446,884
Rata-rata							Rp. 446,884


Tabel 29: Biaya total antibiotik Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 4 hari

No	RM	Daftar Biaya Langsung Pasien					Biaya Total
		Obat	Alkes	Laboratorium	Rawat Inap	Pelayanan	
1	206564	3,200	59,652	107,500	120,000	152,000	442,352
Total		3,200	59,652	107,500	120,000	152,000	442,352
Rata-rata							Rp. 442,352

Karakteristik subjek penelitian yaitu, sebagai berikut:


1. Jenis Kelamin

Gambar 1: Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin



2. Usia


Gambar 2: Karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia



3. Pembagian Usia dan Jenis Kelamin


Gambar 3: Karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia dan jenis

Kelamin




4. Kategori BPJS

Gambar 4: Karakteristik subjek penelitian berdasarkan kategori BPJS




5. Jenis Obat

Gambar 6: Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis obat



6. Lama Penggunaan Obat

Gambar 7: Karakteristik subjek penelitian berdasarkan lama penggunaan obat



Tabel 30: Tabel langkah perhitungan analisis minimalisasi biaya (AMiB)

No.	Langkah	Analisis
1	Tentukan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui biaya yang digunakan pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel pada periode Januari-Desember 2016. • Mengetahui antibiotik mana yang memiliki biaya lebih rendah diantara antibiotik yang lain pada pengobatan demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sul-Sel pada periode Januari-Desember 2016.
2	Buat daftar untuk mencapai tujuan tersebut.	<p>Membandingkan penggunaan obat antibiotik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ceftriaxon b. Ciprofloxacin c. Cefixime d. Ofloxacin
3	Identifikasi Tingkat efektivitas	<p>Efektivitas menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektivitas Pengobatan Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari = 100% b. Efektivitas Pengobatan Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari = 100% c. Efektivitas Pengobatan Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari = 100% d. Efektivitas Pengobatan Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari = 100% e. Efektivitas Pengobatan Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari = 100% f. Efektivitas Pengobatan Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 5 hari = 100% g. Efektivitas Pengobatan Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 6 hari = 100% h. Efektivitas Pengobatan Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari = 100%
4	Identifikasi dan hitung biaya pengobatan	<p>Biaya yang teridentifikasi dan diukur adalah biaya langsung, meliputi biaya obat, biaya alat kesehatan, biaya pelayanan, biaya laboratorium dan biaya rawat inap.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya rerata pengobatan Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari = Rp. 498.795,00/pasien b. Biaya rerata pengobatan Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari = Rp.

		<p>726.373,00/pasien</p> <p>c. Biaya rerata pengobatan Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari = Rp. 565.241,00/pasien</p> <p>d. Biaya rerata pengobatan Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 5 hari = Rp. 791.637,00/pasien</p> <p>e. Biaya rerata pengobatan Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari = Rp. 471.135,00/pasien</p> <p>f. Biaya rerata pengobatan Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 5 hari = Rp. 550.563,00/pasien</p> <p>g. Biaya rerata pengobatan Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 6 hari = Rp. 882.955,00/pasien</p> <p>h. Biaya rerata pengobatan Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari = Rp. 446.884,00/pasien</p>
5	Interpretasi	Jadi, diantara semua terapi demam tifoid, antibiotik yang memiliki biaya paling minimal yaitu antibiotik ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari.

B. Pembahasan

Metode analisis dalam kajian farmakoekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis minimalisasi biaya (AMiB) pada penggunaan antibiotik pada terapi demam tifoid di instalasai rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel pada periode Januari-Desember tahun 2016.

Pengobatan demam tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel untuk pasien dengan usia 15-64 tahun menggunakan Ceftriaxon, Ciprofloxacin, Cefixime dan Ofloxacin.

Total data yang diperoleh dari rekam medik yang telah tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel dalam penelitian ini berjumlah 92 data dengan kasus demam tifoid. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data. Data yang diambil meliputi informasi klinis pasien dan biaya langsung yang terkait dengan pasien.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 92 pasien demam tifoid yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan jenis kelamin, pasien demam tifoid yang paling banyak adalah pasien yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 48 orang dibandingkan pasien yang berjenis kelamin perempuan yaitu 44 orang. Di usia 15-24 tahun, jumlah perempuan sebanyak 23 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 15 orang. Kemudian di usia 25-34 tahun, jumlah perempuan sebanyak 6 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 16 orang. Lalu di usia 35-44 tahun, jumlah perempuan sebanyak 4 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang. Selanjutnya Di usia 45-54 tahun, jumlah perempuan sebanyak 4 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang. Serta di usia 55-64 tahun, jumlah perempuan sebanyak 7 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang. Pada umur 15-24 tahun merupakan usia sekolah sehingga pada usia ini orang lebih sering jajan di sekolah sehingga lebih rawan terinfeksi demam tifoid yang tertular melalui makanan atau minuman yang tercemar bakteri yang di bawah oleh lalat (Nuruzzaman, 2016: 76). Sedangkan pada umur 25-34 tahun, 35-44 tahun, dan 45-54 tahun yang tergolong usia produktif atau usia kerja (DinKes Prov. Sul-Sel, 2015: 11), sehingga lebih banyak laki-laki terkena demam tifoid. Hal ini sesuai menurut Bursch yang mengatakan bahwa laki-laki lebih sering terkena demam tifoid, karena laki-laki lebih sering bekerja dan makan di luar rumah yang tidak terjamin kebersihannya (Nadyah, 2014: 306).

Prevalensi demam tifoid berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tersebar di semua umur dan cenderung lebih tinggi pada umur dewasa (DinKes Prov. Sul-Sel, 2015: 31). Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 92 pasien demam tifoid yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan usia, pasien demam tifoid yang paling banyak adalah pasien yang berusia 15-24 tahun sebanyak 38 orang, kemudian diikuti pasien yang berusia 25-34

tahun sebanyak 22 orang, pasien yang berusia 35-44 tahun sebanyak 13 orang, pasien yang berusia 45-54 tahun sebanyak 11 orang, dan pasien yang berusia 55-64 tahun sebanyak 8 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa angka demam tifoid tertinggi pada kelompok umur 15-24 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Rohman (2010) bahwa insidens tertinggi demam tifoid terjadi pada pasien yang berumur 15-24 tahun.

Pasien demam tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Prov. Sul-Sel jaminan kesehatan yang banyak digunakan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 92 pasien demam tifoid yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan kategori BPJS, pasien demam tifoid yang paling banyak adalah pasien dengan kategori BPJS kelas 3 sebanyak 73 orang dibandingkan pasien dengan kategori BPJS kelas 2 yaitu sebanyak 19 orang. Pemberian terapi pada pasien demam tifoid dengan kategori BPJS kelas 2 dan kategori BPJS kelas 3 tidak ada perbedaan pemberian terapi yaitu pasien BPJS kelas 2 dan kelas 3 diberikan antibiotik Ceftriaxon, Ciprofloxacin, Cefixime dan Ofloxacin. Terapi yang diperoleh pasien demam tifoid dengan kategori BPJS kelas 2 dan kategori BPJS kelas 3 tidak diberikan berdasarkan faktor ekonomi dari pasien, tetapi berdasarkan pada kebutuhan terapi yang dibutuhkan oleh pasien itu sendiri.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 92 pasien demam tifoid yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan jenis pemberian obat, pasien demam tifoid yang paling banyak adalah pasien yang diberikan antibiotik secara injeksi sebanyak 51 orang (Ceftriaxon sebanyak 39 orang dan Ciprofloxacin sebanyak 12 orang) dibandingkan pasien yang diberikan antibiotik secara oral sebanyak 41 orang (Ciprofloxacin sebanyak 31, Cefixime sebanyak 8 orang dan Ofloxacin sebanyak 2 orang). Pemberian antibiotik didominasi oleh rute

pemberian secara parenteral karena obat yang diberikan dengan rute secara parenteral memiliki keuntungan onset yang cepat dan dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar atau susah untuk menelan (Wijaya, 2016: 6), dibandingkan dengan rute pemberian secara oral. Pada demam tifoid, pasien mengalami gangguan saluran pencernaan (mual dan muntah) dan gangguan kesadaran yang berupa penurunan kesadaran ringan (Nelwan, 2012: 248), sehingga lebih digunakan pemberian obat secara parenteral.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 92 pasien demam tifoid yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan jenis obat, pasien demam tifoid yang paling banyak adalah pasien yang menggunakan jenis antibiotik Ciprofloxacin sebanyak 43 orang (Ciprofloxacin injeksi 12 orang dan Ciprofloxacin oral sebanyak 31), pemberian Ciprofloxacin pada pengobatan demam tifoid lebih dianjurkan karena Ciprofloxacin memiliki aktivitas lebih tinggi terhadap *Salmonella*, dengan efek penetrasi terhadap makrofag, mencapai konsentrasi tinggi di usus dan lumen empedu dan memiliki potensi yang tinggi diantara antibiotik lain dalam terapi demam tifoid dan menurut Harrison *First Line* pilihan antibiotik untuk demam tifoid yaitu Ciprofloxacin (Utami, 2010: 15-17). Kemudian diikuti pasien yang menggunakan jenis antibiotik Ceftriaxon injeksi sebanyak 39 orang, pasien yang menggunakan jenis antibiotik Cefixime oral sebanyak 8 orang, dan pasien yang menggunakan jenis antibiotik Ofloxacin oral sebanyak 2 orang.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 92 pasien demam tifoid yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan lama penggunaan obat. Lama penggunaan obat pada penelitian ini berkisar 2-6 hari. Pada antibiotik Ciprofloxacin injeksi dan Ceftriaxon injeksi lama penggunaan obat pada penelitian ini yaitu 2 hari, 3 hari, 4 hari dan 5 hari. Kemudian pada antibiotik Ciprofloxacin oral

lama penggunaan obat pada penelitian ini yaitu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6 hari. Selanjutnya pada antibiotik Cefixime oral lama penggunaan obat pada penelitian ini yaitu 4 hari, 5 hari dan 6 hari. Serta pada antibiotik Ofloxacin oral lama penggunaan obat pada penelitian ini yaitu 3 hari dan 4 hari. Sedangkan menurut Acharya (1995) pemberian Ceftriaxone selama 3 hari memberikan efek terapi yang sama dengan regimen obat yang diberikan 10-14 hari. Respon yang baik juga dilaporkan dengan pemberian Ceftriaxon selama 5-7 hari (Kalra, Naithani dan Mehta dkk, 2003: 132), jadi penggunaan Ceftriaxon injeksi yang sudah sesuai yaitu pada pemberian selama 3 hari dan 5 hari sedangkan pemberian selama 2 hari dan 4 hari tidak sesuai dengan *guideline therapy*. Pemberian Ofloxacin dan Ciprofloxacin pada terapi demam tifoid diberikan selama 5-7 hari. Dan pemberian Fluoroquinolone (Ofloxacin dan Ciprofloxacin) selama 3 hari juga efektif pada terapi demam tifoid (WHO, 2003: 20). Menurut Nguyen TC (1997) pengobatan dengan Ofloxacin selama 2-3 hari efektif pada orang dewasa dengan demam enterik tanpa komplikasi (Rizvi, 2007: 62). Serta menurut Smith dkk (1994) pengobatan antibiotik pada terapi demam tifoid menggunakan Floroquinolon (Ciprofloxacin, Ofloxacin dan Gatifloxacin) diberikan selama 3-7 hari (Butler, 2011: 960), jadi penggunaan Ciprofloxacin injeksi dan Ciprofloxacin oral yang sudah sesuai yaitu pada pemberian selama 3 hari, 5 hari, dan 6 hari sedangkan penggunaan Ofloxacin oral yang sudah sesuai yaitu pada pemberian selama 3 hari, dan pada pemberian Ciprofloxacin injeksi dan Ciprofloxacin oral selama 2 hari dan 4 hari serta Ofloxacin oral dengan pemberian selama 4 hari tidak sesuai dengan *guideline therapy*. Begitupula dengan penggunaan Cefixime oral dengan lama pemberian 4 hari, 5 hari dan 6 hari tidak sesuai dengan *guideline therapy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik Ceftriakson injeksi sebanyak 39 orang. Biaya pengobatan Ceftriakson injeksi sebanyak 8 orang dengan lama pengobatan selama 2 hari sebesar Rp. 352.000,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 350.193,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 982.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 480.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 608.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 8 pasien adalah Rp. 2.772.693,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 346.587,00/ pasien. Biaya pengobatan Ceftriakson injeksi sebanyak 10 orang dengan lama pengobatan selama 3 hari sebesar Rp. 660.000,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 636.954,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 1.255.000,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 990.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 1.446.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 10 pasien adalah Rp. 4.987.954,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 498.795,00/ pasien. Biaya pengobatan Ceftriakson injeksi sebanyak 17 orang dengan lama pengobatan selama 4 hari sebesar Rp. 1.496.000,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 1.397.898,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 2.587.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 2.200.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 3.128.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 17 pasien adalah Rp. 10.809.398,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 635.847,00/ pasien. Dan biaya pengobatan Ceftriakson injeksi sebanyak 4 orang dengan lama pengobatan selama 5 hari sebesar Rp. 440.000,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 397.990,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 487.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 650.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 930.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 4 pasien adalah Rp. 2.905.490,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 726.373,00/ pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik Ciprofloxacin injeksi sebanyak 12 orang. Biaya pengobatan Ciprofloxacin injeksi sebanyak 4 orang

dengan lama pengobatan selama 2 hari sebesar Rp. 191.840,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 173.976,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 710.000,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 280.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 440.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 4 pasien adalah Rp. 1.795.816,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 448.954,00/ pasien. Biaya pengobatan Ciprofloxacin injeksi sebanyak 5 orang dengan lama pengobatan selama 3 hari sebesar Rp. 359.700,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 315.005,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 867.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 510.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 774.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 5 pasien adalah Rp. 2.826.205,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 565.241,00/ pasien. Biaya pengobatan Ciprofloxacin injeksi sebanyak 1 orang dengan lama pengobatan selama 4 hari sebesar Rp. 95.920,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 87.572,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 107.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 160.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 288.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 1 pasien adalah Rp. 738.992,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 738.992,00/ pasien. Dan biaya pengobatan Ciprofloxacin injeksi sebanyak 2 orang dengan lama pengobatan selama 5 hari sebesar Rp. 239.800,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 225.974,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 437.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 300.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 380.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 2 pasien adalah Rp. 1.583.274,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 791.637,00/ pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik Ciprofloxacin oral sebanyak 31 orang. Biaya pengobatan Ciprofloxacin oral sebanyak 1 orang dengan lama pengobatan selama 2 hari sebesar Rp. 1.800,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 34.578,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 57.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 60.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 76.000,00. Sehingga biaya

total yang digunakan dari 1 pasien adalah Rp. 229.878,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 229.878,00/ pasien. Biaya pengobatan Ciprofloxacin oral sebanyak 8 orang dengan lama pengobatan selama 3 hari sebesar Rp. 21.600,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 423.483,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 1.428.000,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 780.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 1.116.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 8 pasien adalah Rp. 3.769.083,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 471.135,00/ pasien. Biaya pengobatan Ciprofloxacin oral sebanyak 19 orang dengan lama pengobatan selama 4 hari sebesar Rp. 68.400,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 1.278.669,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 2.575.000,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 2.400.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 3.296.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 19 pasien adalah Rp. 9.618.069,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 506.214,00/ pasien. Biaya pengobatan Ciprofloxacin oral sebanyak 2 orang dengan lama pengobatan selama 5 hari sebesar Rp. 9.000,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 139.626,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 272.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 300.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 380.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 2 pasien adalah Rp. 1.101.126,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 550.563,00/ pasien. Dan biaya pengobatan Ciprofloxacin oral sebanyak 1 orang dengan lama pengobatan selama 6 hari sebesar Rp. 5.400,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 98.055,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 107.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 240.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 432.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 1 pasien adalah Rp. 882.955,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 882.955,00/ pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik Cefixime oral sebanyak 8 orang. Biaya pengobatan Cefixime oral sebanyak 4 orang dengan lama

pengobatan selama 4 hari sebesar Rp. 28.768,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 286.609,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 714.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 480.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 608.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 4 pasien adalah Rp. 2.117.877,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 529.469,00/ pasien. Biaya pengobatan Cefixime oral sebanyak 3 orang dengan lama pengobatan selama 5 hari sebesar Rp. 26.970,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 217.439,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 380.000,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 450.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 570.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 3 pasien adalah Rp. 1.644.409,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 548.136,00/ pasien. Dan biaya pengobatan Cefixime oral sebanyak 1 orang dengan lama pengobatan selama 6 hari sebesar Rp. 10.788,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 81.558,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 107.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 180.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 228.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 4 pasien adalah Rp. 607.846,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 607.846,00/ pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik Ofloxacin oral sebanyak 2 orang. Biaya pengobatan Ofloxacin oral sebanyak 1 orang dengan lama pengobatan selama 3 hari sebesar Rp. 2.400,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 75.484,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 165.000,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 90.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 114.000,00. Sehingga biaya total yang digunakan dari 1 pasien adalah Rp. 446.884,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 446.884,00/ pasien. Dan biaya pengobatan Ofloxacin oral sebanyak 1 orang dengan lama pengobatan selama 4 hari sebesar Rp. 3.200,00, biaya alat kesehatan sebesar Rp. 59.652,00, biaya laboratorium sebesar Rp. 107.500,00, biaya rawat inap sebesar Rp. 120.000,00, dan biaya pelayanan sebesar Rp. 152.000,00. Sehingga biaya total

yang digunakan dari 1 pasien adalah Rp. 442.352,00 dengan biaya total rata-rata Rp. 442.352,00/ pasien.

Data yang telah diperoleh di atas menunjukkan bahwa antibiotik yang sesuai dengan *guideline* terapi demam tifoid, yaitu Ceftriaxon injeksi (1g/12 jam) dengan lama pengobatan selama 3 hari dan 5 hari dengan biaya total rata-rata sebesar Rp. 498.795,00/pasien dan Rp. 726.373,00/pasien. Ciprofloxacin injeksi (200 mg/100 mL) dengan lama pengobatan selama 3 hari dan 5 hari dengan biaya total rata-rata sebesar Rp. 565.241,00/pasien dan Rp. 791.637,00/pasien. Ciprofloxacin oral (500 mg) dengan lama pengobatan selama 3 hari, 5 hari, dan 6 hari dengan biaya total rata-rata sebesar Rp. 471,135,00/pasien, Rp. 550.563,00/pasien dan Rp. 882.955,00/pasien. Dan Ofloxacin oral (200 mg) dengan lama pengobatan selama 3 hari dengan biaya total rata-rata sebesar Rp. 446.884,00/pasien.

Tidak dilakukan Analisis Minimalisasi Biaya (AMiB) pada pemberian antibiotik Ceftriakson injeksi, Ciprofloxacin injeksi dan Ciprofloxacin oral (2 hari dan 4 hari), Cefixime oral (4 hari, 5 hari dan 6 hari) dan Ofloxacin oral (4 hari) karena terapi antibiotik yang diberikan kepada pasien dengan lama pengobatan seperti di atas tidak sesuai dengan penggunaan terapi antibiotik (*guideline therapy*).

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh di atas, antibiotik yang memiliki biaya paling minimal yaitu Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari dengan biaya total rata-rata sebesar Rp. 446.884,00/pasien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Biaya total rata-rata antibiotik Ceftriaxon injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari dan 5 hari adalah Rp. 498.795,00/pasien dan Rp. 726.373,00/pasien. Biaya total rata-rata antibiotik Ciprofloxacin injeksi dengan lama pengobatan selama 3 hari dan 5 hari adalah Rp. 565.241,00/pasien dan Rp. 791.637,00/pasien. Biaya total rata-rata antibiotik Ciprofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari, 5 hari, dan 6 hari berturut-turut adalah Rp. 471,135,00/pasien, Rp. 550.563,00/pasien dan Rp. 882.955,00/pasien. Dan biaya total rata-rata antibiotik Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari adalah Rp. 446.884,00/pasien.
2. Antibiotik yang memiliki biaya paling minimal pada terapi demam tifoid adalah Ofloxacin oral dengan lama pengobatan selama 3 hari.

B. Saran

Disarankan sebagai bahan acuan bagi pengambil kebijakan (rumah sakit) untuk menggunakan Ofloxacin oral dalam rangka pemilihan dan penggunaan obat yang efektif dan efisien, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan tetap mempertahankan kualitas obat yang digunakan.

KEPUSTAKAAN


- Abdulah, Kumamba, dan Sinuraya dkk., “Analisis Minimalisasi Biaya Penggunaan Antibiotik Meropenem Dan Ceftazidime Pada Terapi Febrile Neutropenia”. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, Vol 5 no 2 (2016): h. 132.
- Amin, Lukman Zulkifli. “Pemilihan Antibiotik yang Rasional”. *Medicinus Cermin Dunia Kedokteran*, Vol 27 no 3 (2014): h. 40-41, 42.
- Andayani, Tri Murti dkk., “Analisis Cost Minimization Penggunaan Injeksi Antibiotik Sulbenisilin Dibandingkan Amoksisilin Dan Kalium Klavulanat Pada Seksio Sesarea”. Yogyakarta: Faculty Of Pharmacy, (2004): h. 201.
- Butler, T. “Treatment of Thypoid Fever in The 21st Century: Promise and Future”. Departement of Microbiology dan Imunology USA, *Clinical Microbiology and Infection*, Volume 17 Number 7, (2011): h 960. Dikutip dalam Smith MD, dkk. “Comparison of Ofloxacin and Ceftriaxone for Short Course Treatment of Enteric Fever”. *Antimicrob Agents Chemother*, (1994): h. 38.
- Chandra, Adi. “Analisis Minimalisasi Biaya Anestesi Umum Propofol Target Controlled Infusion (TCI) Dan Anestesi Inhalasi Di RSUP Sanglah”. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Udayana (2015): h. 1, 26, 27.
- Cita, Yatnita Parama. “Bakteri Salmonella Typhi Dan Demam Tifoid”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 6 no 1 (2011): h. 43.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014*. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (2015): h. 11, 31, 32.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan. *Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI (2013): 6, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-18.
- Gu, Shuyan dan Tang, Zhiliu dkk., “Cost Minimization Analysis Of Metformin And Acarbose In Treatment Of Type 2 Diabetes”. *Science Direct, Value In Health Regional Issues* (2015): h. 84.
- Haluang, Olnike dkk., “Analisis Biaya Penggunaan Antibiotik Pada Penderita Demam Tifoid Anak Di Instalasi Rawat Inap Rsup Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Periode Januari 2013 - Juni 2014”. *Pharmacon, Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT*, Vol 4 no3 (2015): h. 118.
- Jainam, Shah dan Kalyani, Patni dkk., “Pharmacoeconomic Evaluation, Cost Minimization Analysis Of Anti Diabeti Therapy In Gujarat”. *International Journal of Medical Research and Health Sciences* (2016): h. 34.
- Kalra, Naithani dan Mehta dkk. “Current Trends in The Mangement of Thypoid Fever”. *MJAFI*, Vol. 59, No.2 (2003): h. 132. Dikutip dalam Acharya G, dkk. “Treatment of Thypoid Fever: Randomized Trial of a Three Day Course of Ceftriaxone Versus a Fourteen Day Course of Chloramphenicol”. *Am J Trpo Med Hyg* (1995): h. 52.

- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI (2016): h. 34.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press (1998): h. 37-38.
- Marhamah. "Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Dewasa Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Tahun 2009". Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010): h. 67.
- Mufriha, Ihda. "Analisis Biaya Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Rawat Inap Di RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 2008". Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009): h. 15.
- Nada, 'Abdul'aziz bin Fathi as-Sayyid. *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I (2007): h. 180.
- Nadyah. "Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Insidens Penyakit Demam Tifoid Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 2013". Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (2014): h. 306.
- Nelwan. "Tata Laksana Terkini Demam Tifoid". *Continuing Medical Education Vol 39 no 4* (2012): h. 248, 249-250.
- Nguyen TC. "Effectiveness of Anti Typhoid Drugs Currently Used in Pakistan". Department of Pharmacology & Therapeutics, Hamdard College of Medicine & Dentistry, Karachi, *Pakistan Journal of Surgery* (2007): h. 62.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta (2012): h. 125.
- Nuruzzaman, Hilda. "Analisis Risiko Kejadian Demam Tifoid Berdasarkan Kebersihan Diri dan Kebiasaan Jajan di Rumah". Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur (2016): h. 76.
- Puspita, Angelina. "Profil Pemberian Antibiotika Rasional pada Pasien Demam Tifoid Anak Bangsal Rawat Inap RSUD Tangerang Tahun 2010-2011". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2012): h. 4-5, 6, 8-9.
- Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaafi'I (2006): h. 260.
- Rohman. "Distribusi Penderita Demam Tifoid Menurut Umur dan Gejala (Studi Kasus di RSI.Roemani)". Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (2010): h. 89.
- Rizvi, Qamar. "Effectiveness of Anti-Thyphoid Drugs Currently Used in Pakistan". Karachi: Departement of Pharmacology and Therapeutics (2007): h. 62.
- Sastroasmoro, Sudigdo dan Sofyan Ismael. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: CV Sagung Seto (2014): h. 55, 56, 57, 67.
- Scaria, Soniya dkk., "Pharmacoeconomics: Principles, Methods And Indian Scenario". *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research* (2015): h. 38.

- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 9 (Surah al-Furqan, Surah asy-Syu'ara, Surah an-Naml, dan Surah al-Qashash)*. Jakarta: Lentera Hati (2002): 151-152.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 7 (Surah al-Isra', Surah al-Kahf, Surah Maryam, dan Surah Thaha)*. Jakarta: Lentera Hati (2002): h. 75.
- Siswanto dan Susilo dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu (2015): h. 10, 227, 233-234, 265.
- Soedarto. *Penyakit Zoonosis Manusia Ditularkan Oleh Hewan*. Jakarta: Sagung Seto (2012): h. 161.
- Susilo, Wilhelmus Hary. *Statistika dan Aplikasi Untuk Penelitian Ilmu Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media (2012). h. 45.
- Utami, Tania Nugrah. "Demam Tifoid". Fakultas Kedokteran Universitas Riau (2010): h. 15-17.
- Wijaya, Mareta Endra. "Gambaran Pemberian Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Di Instalasi Rawat Inap RSUD Sleman Yogyakarta Tahun 2015". Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2016): h. 6.
- World Health Organization. *Background Document: The Diagnosis, Treatment and Prevention of Typhoid Fever*. Switzerland: World Health Organization (2003): h. 20-23.
- World Health Organization. *Guidelines for the Management of Typhoid Fever*. Eropa: World Health Organization (2011): h. 7, 9.
- World Health Organization. *Guidelines Typhoid*. South Africa: World Health Organization, (2016.): h. 6.

Lampiran 1

Alur Penelitian



Lampiran 2

DOKUMEN FARMASI PENDERITA
RSUD HAJI MAKASSAR PROV. SUL-SEL

No. RM : Ruangan asal : Nama/Jenis Kelamin: Alamat: Umur/BB/TB: Riwayat Alergi: (); Asma()	Diagnosa: Alasan MRS: Rujukan dari: Skala Nyeri: RPD	Tgl MRS/Tgl KRS: Keterangan KRS: Pindah Ruangan Tgl: Nama Dokter: Status Px: Nama Farmasis:
---	--	--

No	Obat	Dosis Regimen	Lama Terapi	Tanggal Pemberian Obat																

PEMERIKSAAN PENUNJANG

No	Jenis Pemeriksaan	Tanggal	Kesan/Kesimpulan

DATA KLINIK

Data Klinik	Tanggal								
TD (120/80)									
RR (20X/menit)									
Nadi (60-100x/menit)									
Suhu (37°C ± 0,3°C)									
KU/GCS (4-5-6)									

Data Lab	Nilai Normal	Tanggal					
DL:RBC	4-6.10 ⁶ /μl						
Hb	13,5-16,5 g/dl						
Hct	41-50%						
WBC	3,7-10,1. 10 ³ /μl						
Plt(trombosit)	150-450. 10 ³ /μl						
RFT:SCR	0,5-1,4 mg/dl						
BUN	10-20 mg/dl						
Bilirubin Direct	<0,2						
Bilirubin Total	0,2-1						
SE:NA (mEq/L)	135-145						
K(mEq/L)	3,8-5,0						
Cl(mEq/L)	97-103						
Ca (mg/dL)	8,3-10,4						
LFT:SGOT	<38 U/L						
SGPT	<41 U/L						
Albumin	3-5 g/dl						
GDA	≤200 mg/dl						
LDH	240-480						
MCV	81,1-96						
MCH	27,0-31,2						
MCHC	31,8-35,4						
CRP	0-10 mg/dl						
CK_MB	7-25 U/L						
Troponin	Neg<0,03ng/ml						
INR							

Data Lab	Nilai Normal	Tanggal					
BGA :Ph	7,35-7,45						
pO2	80-107						
pCO2	35-45						
HCO3	21-25						
PPT/Kon PPT	≤2 dtk						
APPT/Kon APPT	≤7 dtk						
Urinalisis:Blood							
Colour							
Clarity							
Eritrosit	0-2						
Leukosit	0-5						
Epitel	Sdkt						
Kristal							
Silinder							
Ph	6-8						
Protein	-						
Uro	-						
Leu	-						
Nit	-						
SG	1010-1015						
GLU	-						
BIL	-						
KET	-						

c. Biaya Pelayanan

No	Pelayanan	Harga

d. Biaya Laboratorium

No	Laboratorium	Harga

e. Biaya Rawat Inap

No	Rawat Inap	Harga

Lampiran 3




12017181428501

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6807/S.01/PT/16/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur RSUD Haji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.993/FK/PP.00.9/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peserta dibawah ini:

N a m a : JURANA
Nomor Pokok : 70100113019
Program Studi : Farmasi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. MuH. Yasin Limpo No. 36 Somata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS MINIMALISASI BIAYA (COST MINIMIZATION ANALYSIS) PENGGUNAAN TERAPI ANTIBIOTIK PADA PASIEN DEMAM TIFOID DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD HAJI PROV. SULSEL "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Mei s/d 22 Juni 2017

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demiikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekolah Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Np : 10610513 100002 1 002

Terdapat 10:
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Perihal

3844/PTSP/16/2017



Jl. Boulevard No.3, Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 446036
Webste : <http://dpmptsp.sulselprov.go.id> Email : dz_pemasdes@wiban.com
Makassar 90222



Lampiran 4



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR**

Alamat : Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Makassar ,Telp. 855934 – 856091 Fax (0411)855934

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor *470p* / TU / RSUD / VIII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : H. AHDY SYAFAR, SKM, S.Kep, M.Kes
NIP : 19630706 198603 1 028
PANGKAT/GOL. : Pembina, IV/a
JABATAN : Kabid Diklat, Litbang Dan Etika

Dengan ini menerangkan :

NAMA : JURANA
NIM : 70100113019
JURUSAN : S1 FARMASI
MAHASISWA : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** pada tanggal 22 Mei s/d 22 Juli 2017 dengan Judul :

"ANALISIS MINIMALISASI BIAYA (COST MINIMALIZATION ANALYSIS) PENGGUNAAN TERAPI ANTIBIOTIK PADA PASIEN DEMAM TYPHOID DI INSTALASI RAWAT INAP DI RSUD HAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Juli 2017

Kesid Diklat, Litbang & Etika,



H. Ahdy Syafar, SKM, S.Kep, M.Kes
 NIP. :19630706 198603 1 028

Lampiran 5



Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Universitas Muslim Indonesia dan Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI
(KEPK UMI dan RSIS YW-UMI Makassar)

Jalan Urip Sumahurjo Gedung Mensura UMI Lantai 3 Telp. & Fax. (0411) 425075 Makassar 90231



REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK (Expedited)

Nomor : 940/KEPK-UMI/XI/2017

Berdasarkan Pemeriksaan Protokol dan Dokumen yang berhubungan dengan Protokol Penelitian;

Nama Peneliti : Jurana

Judul Penelitian : Analisis minimalisasi biaya (cost minimization analysis) penggunaan antibiotik pada terapi demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Haji Prov. Sulawesi

No Register :

U	M	I	0	2	1	7	0	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Telah di review secara (Expedited) oleh tim reviewer KEPK UMI dan Rumah Sakit Ibnu Sina dengan

No Versi : 3

No PSP : 2

Berdasarkan hasil pemeriksaan reviewer, maka Pengurus KEPK UMI dan Rumah Sakit Ibnu Sina memberikan **Persetujuan / Rekomendasi Etik** untuk Pelaksanaan Penelitian tersebut di atas sampai dengan Tanggal **06 November 2018**.

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti diminta untuk menjaga dan menghormati martabat manusia yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang baik dari penelitian ini.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK UMI dan RSIS YW-UMI Makassar. Jika ada perubahan protokol dan / atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Makassar, 06 November 2017

Pengurus KEPK UMI – RS IBSI YW UMI

Ketua

Wa. Sekretaris

Dr. dr. Sri Vitayani, Sp.KK, FINSDV

Dr. Andi Emelda, S.Si, Msi, Apt



RIWAYAT HIDUP



Jurana, lahir di Belawa Kabupaten Wajo tanggal 9 April 1995 hari minggu. Sekarang berusia 22 tahun. Merupakan anak terakhir dari pasangan H. Hamzah dan Hj. Nurbaya. Mempunyai 4 saudara, 2 perempuan dan 2 laki-laki.

Pendidikan dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Lonra (2002-2008). Dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama 2 Belawa (2008-2010). Dan setelah lulus melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Wajo (2010-2013). Dilanjutkan menempuh program studi sarjana Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.