


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY “I”
DENGAN PREMATUR DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh:
EKA RISKAWATI
70400115027

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EkaRiskawati

Nim : 70400115027

Tempat,Tanggal Lahir : Tukade, 06 April 1997

Jurusan/Prodi : DIII Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma III

Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan PadaBayiNy “ I “ Dengan Prematur di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2018
Penyusun

EkaRiskawati
70400115027

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Eka Riskawati
NIM : 70400115027
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny. "I" Dengan Prematur
di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 21 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SLT, SKM, M.keh dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.kes
NIP. 19760126 200604 2 001 NIP. 19810621 200604 2 005

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny " I " Dengan Prematur di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018". Yang disusun oleh Eka Riskawati NIM : 70400115027, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 November 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 21 November 2018 H
Rabiul Awwal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdiyanti, S.SiT., M.keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Siti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.kes	(.....)
Penguji I	: dr. Nadyah, M.kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Sahir Masdin, Mag	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
MAKASSAR

Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil ‘Alaamiin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny “ I “ Dengan Prematur di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Sehingga penulis dapat mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai hadiah istimewa dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuanya yaitu bapak Muh. Saleh dan ibu Nursina yang tidak pernah bosan untuk memberikan doa serta dukungan moril maupun moral meskipun penulis mengetahui bahwa karya tulis ini tidak bisa membalas kedua orang tuanya namun setidaknya karya tulis ini bisa membuat orang tuanya menjadi bangga dan tersenyum bahagia.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,S.KM.,M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan dan sekaligus sebagai pembimbing 1 yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Ibunda Firdayanti, S.SiT.,M.Keb selaku Sekertaris Jurusan Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibunda dr.Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbingku dan memberi saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda dr.Hj. Nadyah, M.Kes selaku Penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Sabir Maidin, M.Ag selaku Penguji II Agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar Program Studi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Kakak saya Irmawansyah, S.kep, Ns yang telah banyak membantu dan senantiasa memberikan semangat dan doa kepada saya dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Kebidanan Angkatan 2015 serta adik-adik Kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih.

Namun bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semaunya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarangan mempergunakan ilmu dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipelajari dengan niat baik dan tulus untuk diamalkan di jalan Allah SWT melalui kehidupan umat manusia sebagai perantaranya.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’maalu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih

semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, November 2018

Penyusun,

EkaRiskawati

70400115027



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Manfaat Penulisan.....	4
E. Metode Penulisan.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir	8
B. Tinjauan Umum Tentang Bayi Prematur	26
C. Tinjauan Kasus Bayi Prematur dalam Pandangan islam.....	38
D. Tinjauan Umum tentang Manajemen Kebidanan	49
BAB III STUDI KASUS	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	61
B. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 21 September 2018.....	75
C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 22 September 2018.....	80

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 23 September 2018	84
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 24 September 2018	88
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 28 September 2018	92
G. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 04 Oktober2018	98
H. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 11Oktober2018	103
I. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 23Oktober2018	108
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Langkah I Pengumpulan Data Dasar (Pengkajian)	115
B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	120
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial	120
D. Langkah IV Tindakan segera /kolaborasi	122
E. Langkah V Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh	122
F. Langkah VI Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan	125
G. Langkah VII Evaluasi	125
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Sistem pulmunal.....	11
Tabel 2.2 Apgar Score.....	23
Tabel 2.3 Maturity Neuromuskuler	24
Tabel 2.4 Maturity Fisik	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Grafik Lubchenco.....	25
Gambar 2.2 : 7 Langkah Varney	58
Gambar 2.3 : Alur Fikir Studi Kasus.....	59



ABSTRAK

Nama Penyusun : Eka Riskawati
NIM : 70400115027
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SIT., SKM., M.Keb
Pembimbing II : dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
Judul KTI : “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Ny “I” dengan Prematur di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018”.

KTI ini merupakan studi kasus tentang pendekatan manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny “I” dengan bayi lahir prematur. Bayi lahir prematur adalah bayi yang lahir sebelum sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kelahiran prematur adalah penyebab langsung kematian bayi yang paling umum.

Etiologi yang mempengaruhi kejadian bayi lahir prematur yaitu faktor Ibu: malnutrisi, kelahiran prematur sebelumnya, hipertensi, infeksi, trauma, diabetes, umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih 35 tahun, jarak kehamilan dan persalinan terlalu dekat, preeklamsia berat dan eklampsia. Faktor janin: infeksi, kehamilan ganda, kelainan bawaan janin, kelainan kromosom. Faktor plasenta: pembukaan leher rahim yang lebih awal, kelainan bentuk rahim, kelainan plasenta, terlepasnya plasenta dari dalam rahim yang lebih awal.

Asuhan yang diberikan pada bayi lahir prematur yaitu menganjurkan ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI dan cara menyusui yang benar, menimbang berat badan bayi setiap hari, mempertahankan suhu tubuh bayi dengan perawatan inkubator dan membedong, mengobservasi tanda-tanda vital, mengganti popok/pakaian bayi setiap kali basah, perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik dan memberikan bayi obat.

Kesimpulan kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data pada bayi Ny ”I”. pemantauan dilakukan mulai tanggal 21 September s/d 23 Oktober 2018. Pengkajian pertama sampai ke empat tanggal 21 s/d 24 September 2018 dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan dilanjutkan kunjungan rumah 4 kali. Pengkajian pertama tanggal 28 September 2018, pengkajian kedua dan ketiga tanggal 04 dan 11 Oktober 2018, dan pengkajian ke empat tanggal 23 Oktober 2018. Berat badan bayi mulai dari 2200 gram menjadi 2515 gram, maka terjadi kenaikan berat badan selama asuhan.

Daftar Pustaka : 24 (2012-2018)

Kata Kunci : Prematur, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

Name : Eka Riskawati
Student Reg. No. : 70400115027
Supervisor 1 : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.ST.,SKM.,M.Keb
Supervisor 2 : dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
Title : The Midwifery Care Management on Baby "I" with Premature Birth at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018

Premature births refer to the baby delivery occurred before it reaches thirty-seven-week pregnancy. Etiologically, some contributing factors to premature births can be attributed to the mother, the fetus, and the placenta condition. The risk of premature births can increase due to the mother's undernourishment, premature delivery history, history of hypertension, trauma, infection, preeclampsia and eclampsia. Additionally, mothers who are younger than 20 and/or older than 35, and those who have just given birth recently may have higher risk of premature delivery. Beside mother-related factors, premature births can be caused by fetus condition. The risk of premature births escalates due to infection, multiple pregnancy, fetus congenital abnormalities or chromosome abnormalities. The placenta-related factors can also be triggers to premature such as early cervix openings, uterine deformities, or placental abnormalities.

The premature birth care includes providing counseling supports to the mothers, such as teaching how to breastfeed babies, reminding them to weight the babies regularly, monitoring baby's body temperature whether they are in the incubators or wrapped, observing the TTV, replacing diapers, taking care of the placenta in aseptic and antiseptic way, as well as feeding babies with medication.

To conclude, the baby "I" case has been treated by a set of observations and analysis using the 7 steps of Varney and SOAP, from 21 September to 23 October 2018. The early treatments have been conducted at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital, which were followed up with four home-visit treatments. The first, second, third, and fourth analysis treatments were conducted in 28 September 2018, 4 October 2018, 11 October 2018, and 23 October 2018 respectively. The baby's weight increases from 2200 grams to 2515 grams during the midwifery care program.

Keywords: premature, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kematian bayi yang baru lahir atau neonatal mencakup 45% kematian diantara anak-anak dibawah umur 5 tahun. Mayoritas dari semua kematian neonatal, 75% terjadi pada minggu pertama kehidupan dan diantara 25% sampai 45% terjadi dalam 24 jam pertama. Penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah prematuritas 28% dari berat lahir rendah, infeksi 36%, asfiksia 23% dan trauma kelahiran. Penyebab ini menyebabkan hampir 80% kematian pada kelompok usia ini (WHO, 2016).

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2015). AKB di Indonesia pada tahun 2015 yaitu 27 per 1000 kelahiran KH lebih tinggi dibandingkan dengan Negara ASEAN (Association of South East Asia Nations) yaitu di Singapura 3 per 1000 kelahiran hidup, Malaysia 5,5 per 1000 kelahiran hidup, Thailand 17 per 1000 kelahiran hidup, Vietnam 18 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi dari Negara ASEAN lainnya, jika dibandingkan dengan target dari MDGs (*Millinium Development Goals*) tahun 2015 yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2015).

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk mencerminkan derajat kesehatan anak, serta cerminan dari status kesehatan suatu

Negara. Tahun 2015 AKB menurut survey penduduk antar sensus (SUPAS) yaitu 22,23 per 100.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup (Kementrian Kesehatan, 2016).

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa terdapat satu dari sepuluh kelahiran adalah bayi prematur. Lebih dari 15 juta bayi lahir dalam keadaan prematur. Prematuritas ini dapat menyebabkan angka kematian perinatal yang cukup tinggi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Indonesia tahun 2013 menunjukkan angka kelahiran bayi pada 2010 sebanyak 4.371.800 jiwa. Dari jumlah tersebut, satu dari enam yang lahir mengalami prematur atau 15 % per 1000 kelahiran hidup (675.700 jiwa) terlahir prematur.

Dalam profil Kesehatan Indonesia tahun 2014, AKB di Indonesia sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu AKB sebanyak 34 per 1000 kelahiran hidup, tetapi angka tersebut jauh dari target SDG's yaitu AKB pada tahun 2015 sebanyak 23 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015:26-27).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, AKB terbanyak (48%) terjadi pada bulan pertama atau masa neonatus dan penyebab terbanyak (44%) kematian neonatus adalah prematuritas. Demikian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKB dilaporkan sebanyak 87 kematian neonatal (7 per 1000 kelahiran), 16 kematian Bayi (1 per 1000 kelahiran) terjadi pada tahun 2015 (Dinkes, 2016).

Berdasarkan data Rekam Medik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Gowa, tahun 2015 tercatat jumlah Bayi Baru Lahir Prematur sebanyak 62 bayi, untuk tahun 2016 tercatat 42 bayi dan pada tahun 2017 sebanyak 55 bayi (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dengan Bayi Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi “I” dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Asuhan Kebidanan Pada Bayi “I” dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian data pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

- b. Dirumuskannya untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah aktual pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- c. Dirumuskannya untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menengakkan diagnosis atau masalah potensial pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan kebidanan pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- g. Diketahui hasil tindakan yang telah dilaksanakannya pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan asuhan kebidanan telah diberikan pada bayi dengan Prematur di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi ilmiah bagi dunia pendidikan daan memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan terkhusus pada mahasiswa kebidanan serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan bacaan bagi peneliti berikutnya di bidang kesehatan dalam proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya asuhan Bayi Baru Lahir dan masukan bagi institusi terkhususnya jurusan DIII Kebidanan dalam proses penerapan asuhan kebidanan bayi dengan Bayi Lahir Prematur.

4. Manfaat Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam penerapan ilmu pengetahuan yang di dapat selama pendidikan di Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam bidang neonatus.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulisan ilmiah ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatul-literatul yang relevan, dari datainternal yang digunakan sebagai dasar teori yang berkaitan dengan laporan kasus bayi lahir prematur.

2. *Studi kasus*

Yaitu penulis melakukan studi kasus pada bayi lahir prematur dengan menggunakan 7 langkah Varney yang meliputi : pengkajian data, merumuskan diagnosa/masalah aktual maupun masalah potensial, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan dan mengevaluasi serta mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan pada bayi dengan Bayi Lahir Prematur untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik :

a. Anamnesa

Penulis mengadakan tanya jawab dengan ibu atau keluarga bayi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis yaitu palpasi dan pemeriksaan diagnostik lainnya.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, perawat, bidan, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

d. Diskusi

Penulis mengadakan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan yang menangani langsung klien tersebut yaitu serta berdiskusi dengan dosen pembimbing.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu : pada bab 1 yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, akan menguraikan mengenai konsep dasar tentang bayi, tinjauan umum tentang Bayi Baru Lahir Normal, tinjauan umum tentang Bayi Baru Lahir Prematur, tinjauan umum tentang bayi menurut pandangan Islam dan tinjauan tentang proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada Bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Vaarney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan pada bayi dengan Bayi Lahir Prematur.

Bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Ayat-ayat diatas menjelaskan proses kejadian manusia. Ayat ini mengemukakan tujuh tahap proses kejadian manusia sehingga ia lahir di permukaan bumi ini. *Dan sesungguhnya Kami* bersumpah bahwa *Kami* telah *menciptakan manusia*, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu *saripati* berasal *dari tanah* (yang diproduksi alat pencernaan dari bahan makanan yang kemudian menjadi darah, yang kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika terjadi hubungan seks). *Kemudian, Kami menjadikannya*, yakni saripati itu, *nuthfah* (setetes yang dapat membasahi) yang disimpan dalam tempat yang *kukuh*, yakni Rahim ibu.

Kemudian Kami ciptakan, yakni jadikan, *nuthfah* itu *alaqah* (segumpal darah), *lalu Kami ciptakan*, yakni jadikan ‘alaqah itu mudghah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, *lalu Kami ciptakan*, yakni jadikan *mudghah* itu tulang belulang, *lalu Kami bungkus* tulang belulang itu dengan daging. *Kemudian, Kami mewujudkannya*, yakni tulang yang terbungkus daging itu menjadi setelah Kami meniupkan ruh ciptaan Kami kepadanya *makhluk lain* daripada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Maka, *maha banyak* lagi mantap keberkahan yang tercurah dari *Allah, pencipta yang terbaik* (Shihab, MQ, Vol.8, 2002).

2. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir:

- a. Berat badan 2500 - 4000 gram
- b. Panjang badan 48 - 52 cm
- c. Lingkar dada 30 - 38 cm
- d. Lingkar kepala 33 - 35 cm
- e. Frekuensi jantung 120 - 160 kali/menit
- f. Pernapasan \pm 40 - 60 kali/menit
- g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup
- h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna
- i. Kaku agak panjang dan lemas
- j. Genitalia ;
Perempuan, labia mayora sudah menutupi labia minora
Laki-laki, testis sudah turun ke skrotum
- k. Refleks hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik
- l. Refleks morrow atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik
- m. Refleks graps atau menggenggam sudah baik
- n. Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Marni & Rahardjo, 2014)

3. Adaptasi BBL Terhadap Kehidupan Di Luar Uterus

- a. Sistem Pernapasan

Berikut adalah tabel mengenai perkembangan sistem pulmonal sesuai dengan usia kehamilan.

Tabel 2.1 Perkembangan System Pulmonal

NO	Usia Kehamilan	Perkembangan
1	24 hari	Bakal paru-paru terbentuk
2	26 – 28 hari	Kedua bronkus terbentuk
3	6 minggu	Lobus ter-diferensiasi
4	12 minggu	Lobus ter-diferensiasi
5	24 minggu	Alveolus terbentuk
6	28 minggu	Surfaktan terbentuk
7	34 – 36 minggu	Struktur paru matang

(Sumber : Indrayani & Moudy emma, 2013)

Ketika struktur matang, ranting paru – paru sudah bisa mengembang sistem alveoli. Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta dan setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru – paru bayi. Saat kepala bayi melewati jalan lahir, ia akan mengalami penekanan yang tinggi pada toraksnya dan tekanan hilang dengan tiba – tiba setelah bayi lahir.

Proses mekanis ini akan menyebabkan cairan yang ada di dalam paru-paru hilang karena terdorongnya ke bagian perifer paru untuk kemudian diabsorpsi. Karena, terstimulus oleh sensor kimia, suhu, serta mekanis akhirnya bayi mulai beraktivitas untuk bernapas pertama kalinya.

Tekanan intratoraks yang negatif disertai dengan aktifasi napas yang pertama memungkinkan adanya udara masuk ke dalam paru-paru. Setelah

beberapa kali napas pertama, udara dari luar mulai mengisi jalan napas pada trakea dan bronkus, akhirnya semua alveolus mengembang karena terisi udara. Fungsi alveolus dapat maksimal jika dalam paru-paru bayi terdapat surfaktan yang adekuat. Surfaktan membantu menstabilkan dinding alveolus sehingga alveolus tidak kolaps saat akhir napas.

b. Sirkulas Darah

Pada masa fetus darah dari plasenta melalui vena umbilikal is sebagian ke hati, sebagian langsung ke serambi kiri jantung, kemudian ke bilik kiri jantung. Dari bilik kiri darah di pompa melalui aorta keseluruhan tubuh. Dari bilik kanan darah di pompa sebagian ke paru dan sebagian melalui duktus arteriosus ke aorta.

Ketika janin dilahirkan segera bayi menghirup udara dan menangis kuat. Dengan demikian paru-paru berkembang, tekanan paru-paru mengecil dan darah mengalir ke paru-paru.

Dampak hemodinamik dari berkembangnya paru-paru bayi adalah :

- 1) Aliran darah menuju paru dari ventrikel kanan bertambah sehingga tekanan darah pada atrium kanan menurun karena tersedot oleh ventrikel kanan, akibatnya tekanan darah pada atrium kiri makin meningkat.
- 2) Tekanan darah pada atrium kiri meningkat sehingga secara fungsional foramen ovale tertutup.
- 3) Penutupan secara anatomis masih berlangsung lama sekitar 2-3 bulan.

- 4) Pada saat bayi lahir, umbilicus akan dipotong sehingga aliran darah vena umbilicus menuju vena kava inferior akan berhenti total.

Aliran darah dalam paru pada hari pertama ialah 4-5 liter per menit/m² (Gessner,1965). Aliran darah sistolik pada hari pertama rendah yaitu 1,96 liter/menit/m² dan bertambah pada hari kedua dan ketiga (3,54 liter/m²) karena penutupan *duktus arteriosus*. Tekanan darah waktu lahir di pengaruhi oleh jumlah darah yang melalui transfusi plasenta dan pada jam-jam pertama sedikit menurun, untuk kemudian naik lagi dan menjadi konstan kira-kira 85/40 mmhg (Marni & Kukuh Rahardjo, 2014)

c. Perubahan Metabolisme Karbohidrat

Luas permukaan tubuh neonatus relatif lebih luas dari tubuh orang dewasa, sehingga metabolisme basal per kg berat badan akan lebih besar. Oleh karena itulah, BBL harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energi dapat diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak.

Pada jam pertama kehidupan, energi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat susu, sekitar di hari keenam energi didapat dari lemak dan karbohidrat yang masing-masing sebesar 40-60% (Indrayani & Moudy emma, 2013).

d. Keseimbangan air dan fungsi ginjal

Tubuh BBL mengandung relative banyak air dan kadar natrium relative lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena :

- 1) Jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa.
- 2) Ketidakseimbangan luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal.
- 3) Renal blood flow relative kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa (Indrayani & Moudy emma, 2013)

e. Imunoglobulin

- 1) Pada neonatus tidak terdapat sel plasma pada sum-sum tulang dan lamina propia ilium dan apendiks.
- 2) Plasenta merupakan sawar sehingga fetus bebas dari anti – gen dan stres imunologis.
- 3) Pada BBL hanya terdapat gama globulin G, sehingga imunologi dari ibu dapat melalui plasenta karena berat molekulnya kecil.
- 4) Tetapi bila ada infeksi yang dapat melalui plasenta (Lues, toksoplasma, herpes simpleks) reaksi imunologis dapat terjadi dengan pembentukan sel plasma dan antibody gama A, G dan M.

f. Traktus Digestivus

Traktus digestivus relative lebih berat dan panjang dibandingkan dengan orang dewasa. Pada neonatus traktus digestivus mengandung zat yang berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida dan di

sebut meconium. Pengeluaran mekonium biasanya dalam 10 jam pertama dan dalam 4 hari biasanya tinja sudah berbentuk dan berwarna biasa. Enzim dalam traktus digestivus biasanya sudah terdapat pada neonatus kecuali amylase pankreas. Bayi sudah ada refleks hisap dan menelan, sehingga pada bayi lahir sudah bisa minum ASI. Gumoh sering terjadi akibat dari hubungan oesofagus dengan lambung belum sempurna dan kapasitas dari lambung juga terbatas yaitu ± 30 cc.

g. Hati

Segera setelah lahir, hati menunjukkan perubahan kimia dan morfologis, yaitu kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak dan glikogen. Sel hemopoetik juga mulai berkurang, walaupun memakan waktu agak lama. Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru lahir, daya detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna, contohnya pemberian obat kloramfenikol dengan dosis lebih besar dari 50 mg/Kg BB/hari dapat menimbulkan *grey baby syndrome* (Indrayani dan Moudy Emma, 2013).

h. Keseimbangan asam basa

pH darah pada waktu lahir rendah karena glikolisis anaerobic. Dalam 24 jam neonatus telah mengkompensasi asidosis ini (Indrayani & Moudy Emma, 2013)

4. Tanda Bahaya Pada Bayi Baru Lahir

a. Bayi tidak mau menyusui

Jika bayi tidak mau menyusui maka patut dicurigai. Seperti yang kita ketahui bersama, ASI adalah makanan pokok bagi bayi, jika bayi tidak mau menyusui maka asupan nutrisinya akan berkurang dan ini akan berefek pada kondisi tubuhnya. Biasanya bayi tidak mau menyusui ketika sudah dalam kondisi lemah dan mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat (Ana, 2015).

b. Kejang

Kejang pada bayi memang terkadang terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu kejang. Apakah kejang terjadi saat bayi demam. Jika ya kemungkinan kejang dipicu dari demamnya, selalu sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter. Jika bayi kejang namun tidak dalam kondisi demam, maka curigai ada masalah lain. Perhatikan frekuensi dan lamanya kejang, konsultasikan pada dokter (Ana, 2015).

c. Lemah

Jika bayi terlihat tidak seaktif biasanya, maka waspadalah. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa dipicu dari diare, muntah yang berlebihan ataupun infeksi berat (Ana, 2015).

d. Sesak napas

Frekuensi napas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa yaitu sekitar 30-60 x/menit. Jika bayi bernapas kurang dari 30 x/menit atau lebih dari 60 x/menit maka wajib waspada. Lihat dinding dadanya, ada tarikan atau tidak (Ana, 2015).

e. Pusing kemerahan

Tali pusat yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi. Yang harus diperhatikan saat merawat tali pusat adalah jaga tali pusat bayi tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Betadine dan alkohol boleh diberikan tapi tidak untuk dikompreskan. Artinya hanya dioleskan saja saat sudah kering kemudian tutup dengan kasa steril yang bisa didapatkan di apotik terdekat (Ana, 2015).

f. Demam atau tubuh merasa dingin

Suhu normal bayi berkisar antara $36,5^{\circ}\text{C}$ – $37,5^{\circ}\text{C}$. Jika kurang atau lebih perhatikan kondisi sekitar bayi. Apakah kondisi di sekitar membuat bayi kehilangan panas tubuh seperti ruangan yang dingin atau pakaian yang basah (Ana, 2015).

g. Mata bernanah banyak

Nanah yang berlebihan pada mata bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat lalu konsultasikan pada dokter atau bidan (Ana, 2015).

h. Kulit terlihat kuning

Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun jika kuning pada bayi terjadi pada waktu ≤ 24 jam setelah lahir atau ≥ 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki bahan tinja bayi berwarna kuning maka harus segera dikonsultasikan pada dokter.

Tindakan yang harus dilakukan bila ada salah satu tanda bahaya yang timbul : rujuk segera ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat (Ana, 2015)

5. Asuhan Bayi Baru Lahir

a. Pencegahan Infeksi

Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan mikroorganisme yang terpapar selama proses persalinan berlangsung ataupun beberapa saat setelah lahir. Pastikan penolong persalinan melakukan pencegahan infeksi sesuai pedoman (Indrayani & Moudy Emma Unaria, 2013).

b. Menilai Bayi Baru Lahir

Segera setelah lahir, letakkan bayi diatas kain yang bersih dan kering yang sudah disiapkan di atas perut ibu. Apabila tali pusat pendek, maka letakkan bayi di antara kedua kaki ibu, pastikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Segera lakukan penilaian awal pada bayi baru lahir :

- 1) Apakah bayi bernafas atau menangus kuat tanpa kesulitan ?

- 2) Apakah bayi bergerak aktif ?
- 3) Bagaimana warna kulit, apakah berwarna kemerahan atau ada sianosis ?

Apabila bayi mengalami kesulitan bernafas maka lakukan tindakan resusitasi pada bayi baru lahir (Indrayani & Moudy Emma Unaria, 2013).

c. Menjaga Bayi Tetap Hangat

Mekanisme pengaturan suhu tubuh bayi baru lahir belum berfungsi sempurna, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas dari tubuh bayi karena bayi berisiko mengalami hipotermi. Bayi dengan hipotermi sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian. Hipotermi mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun di dalam ruangan yang relatif hangat (Indrayani & Moudy Emma Unaria, 2013).

1) Mekanisme kehilangan panas

Ada empat mekanisme kemungkinan hilangnya panas tubuh dari bayi baru lahir ke lingkungannya :

a) Konduksi

Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung).

b) Konveksi

Panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak (jumlah panas yang hilang tergantung kepada kecepatan dan suhu udara).

c) Radiasi

Panas dipancarkan dari BBL, keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2 objek yang mempunyai suhu berbeda).

d) Evaporasi

Panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada kecepatan dan kelembaban udara (perpindahan panas dengan cara merubah cairan menjadi uap).

2) Proses adaptasi

Dalam proses adaptasi kehilangan panas, bayi mengalami :

- a) Stress pada BBL menyebabkan hipotermi
- b) BBL mudah kehilangan panas
- d. Merawat tali pusat

Setelah plasenta lahir dan kondisi ibu dinilai sudah stabil maka lakukan pengikatan tali pusat atau jepit dengan klem plastik tali pusat (bila tersedia).

- 1) Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % untuk membersihkan darah dan sekresi lainnya.

- 2) Bilas tangan air dtt

- 3) Keringkan dengan handuk atau kain bersih dan kering.
 - 4) Ikat tali pusat dengan jarak sekitar 1 cm dari pusat bayi.
 - 5) Jika pengikatan dilakukan dengan benang, lingkarkan benang di sekeliling punting tali pusat dan ikat untuk kedua kalinya dengan simpul mati pada bagian yang berlawanan.
 - 6) Lepas semua klem penjepit tali pusat dan rendam dalam larutan klorin 0,5 %.
 - 7) Bungkus tali pusat yang sudah diikat dengan kassa steril.
- e. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Rangsangan hisapan bayi pada puting susu ibu akan diteruskan oleh serabut syaraf ke hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormone prolactin. Prolactin akan mempengaruhi kelenjar asini untuk memproduksi ASI di alveoli. Semakin sering bayi menghisap puting susu maka akan semakin banyak prolactin dan ASI yang diproduksi. Penerapan inisiasi menyusui dini (IMD) akan memberikan dampak positif bagi bayi, antara lain menjalin/memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, memberikan kekebalan pasif yang segera kepada bayi melalui kolostrum, merangsang kontraksi uterus, dan lain sebagainya (Indrayani & Moudy Emma Unaria, 2013).

- f. Pencegahan Infeksi Mata

Pencegahan infeksi mata dapat segera diberikan kepada bayi baru lahir. Pencegahan infeksi tersebut dilakukan dengan menggunakan salep mata tetrasilin 1%. Salep antibiotik tersebut harus diberikan dalam waktu 1 jam setelah kelahiran. Upaya profilaksisi infeksi mata tidak efektif jika diberikan lebih dari satu jam setelah kelahiran (Indrayani & Moudy Emma Unaria, 2013).

g. Pemberian Suntikan Vitamin K1

Semua bayi baru lahir harus diberi suntikan vitamin K1 1mg intramuskuler, di paha kiri anterolateral segera setelah pemberian salep mata. Suntikan vitamin K1 untuk mencegah perdarahan BBL akibat defisiensi vitamin K (Indrayani & Moudy Emma Unaria, 2013).

h. Pemberian Imunisasi Bayi Baru Lahir

Imunisasi HB-0 diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1 dengan dosis 0,5 ml intramuskuler dipaha kanan anterolateral. Imunisasi HB-0 untuk mencegah infeksi Hepatitis B terhadap bayi

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan minimal 3 kali dan sesuai dengan standar (menggunakan form tatalaksana bayi muda atau form MTBM), yakni :

- 1) Saat bayi usia 6 jam – 48 jam
- 2) Saat bayi usia 3 – 7 hari
- 3) Saat bayi usia 8 – 28 hari

6. Apgar Score

Apgar score dikembangkan pada tahun 1952 oleh Dr. Apgar yang digunakan dalam menilai kesehatan bayi baru lahir, memantau kondisi, keadaan bayi dan meramalkan kemungkinan bayi untuk bertahan hidup.

Uji coba biasanya dilakukan di satu dan lima menit setelah kelahiran, dan akan dilakukan pemantauan ulang jika nilai apgar yang didapatkan rendah. Nilai apgar dihitung dengan mengevaluasi bayi pada skala 0, 1, 2, maka kriteria dari nilai apgar (American Baby & Child Law Centers, 2018) adalah

Tabel 2.2 Apgar Score

Skor	0	1	2	NA
Apperance (warna kulit)	Pucat	Badan merah, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerah-merahan	
Pulse (frekuensi nadi)	Tidak ada	≤ 100	≥ 100	
Grimance (reaksi rangsangan)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimik	Batuk / bersin	
Activity (tonus otot)	Tidak ada	Ekstermitas dalam sedikit fleksi	Gerakan aktif	
Respiration (pernapasan)	Tidak ada	Lemah / tidak teratur	Baik / menangis	

(Sumber : American Baby & Child Law Centers, 2018)

7. Ballard Score

Ballard score merupakan suatu versi sistem Dubowitz. Pada prosedur ini penggunaan kriteria neurologis tidak tergantung pada keadaan bayi yang tenang dan beristirahat, sehingga lebih dapat diandalkan selama beberapa jam kehidupan.

Ballard adalah dengan menggabungkan hasil penilaian maturitas neuromuskuler dan maturitas fisik.

Kriteria pemeriksaan maturitas neuromuskuler diberi skor, demikian pula kriteria pemeriksaan maturitas fisik. Jumlah skor pemeriksaan maturitas neuromuskuler dan maturitas fisik digabungkan, kemudian dengan menggunakan tabel nilai kematangan dicari masa gestasinya (Ira, 2012) :

Tabel 2.3 Maturitas Neuromuskuler

	-1	0	1	2	3	4	5
Postur							
Jendela pergelangan tangan							
Gerakan lengan membalik							
Sudut poplitea							
Tanda selangpang							
Lutut ke telinga							

(Sumber :Adam W. Lowry, dkk. 2014)

Tabel 2.4 Maturitas Fisik

	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Kulit		Lengket, rapuh, transparan	Merah seperti gelatin, tembus pandang	Licin, merah muda, vena membayang	Pengelupasan & Mottu nam super lilat, beberapa vena	Pecah, daerah pucat, jarang vena	Periamen, pecah-pecah dalam, tidak terlihat vena	Seperti kulit, pecah-pecah, beberapa
Lanugo		Tidak ada	Jarang sekali	Banyak sekali	menipis	(+) daerah tanpa rambut	Sebagian besar tanpa rambut	
Garis telapak kaki	Tumit – ibu jari kaki < 40 mm	Tumit – ibu jari kaki 40 – 50 mm	> 50 mm, tidak ada lipatan	Garis-garis merah tipis	Garis melintang hanya pd bag. anterior	Garis lipatan sampai 2/3 anterior	Garis lipatan pada seluruh telapak	
Payudara		Tidak dikenali	Susah dikenali	Areola datar (-) periorolar	Areola bening, Periorolar 1-2 mm	Areola mengangkat, Periorolar 3-4 mm	Areola penuh Periorolar 5-10 mm	
Mata / telinga	Kelopak menyala eral	Kelopak menyala longgar	Kelopak terbuka, pinna datar, lipatan terlipat	Pinna sedikit bergelombang, rekoll lambat	Pinna bergelombang baik, lembek tapi slag rekoll	Keras & berbentuk segit rekoll	Kapitago lebar, daun telinga kaku	
Genitalia pria		Skrotum datar & halus	Skrotum buncung, rugae samar	Testis di kanal bagian atas, rugae jarang	Testis menuju ke bawah, sedikit rugae	Testis sudah turun, rugae jelas	Testis tergnalung, rugae dalam	
Genitalia wanita		Kloris menonjol, labia datar	Kloris menonjol, labia minora kecil	Kloris menonjol, minora membesar	Labia mayora & minora menonjol	Labia mayora besar, labia minora kecil	Labia mayora menutupi kloris & labia minora	


Skor	Minggu
-10	20
-5	22
0	24
5	26
10	28
15	30
20	32
25	34
30	36
35	38
40	40
45	42
50	44

(Sumber : Adam W. Lowry, dkk, 2014)

8. *Grafik Lubchenco*

Hubungan berat badan lahir dengan usia kehamilan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.1



Grafik Lubchenco

B. Tinjauan Umum Tentang Bayi Prematur

1. Pengertian Bayi Prematur


Himpunan Kedokteran Fetomaternal POGI di Semarang tahun 2005 menetapkan bahwa persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 22 - 37 minggu (Sarwono Prawirahardjo, 2014).

Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu (WHO, 2017). Terdapat 4 sub kategori usia kelahiran prematur (dr. Dina, 2017), yaitu :

- a. Ekstrem prematur ialah bayi yang lahir dengan umur kehamilan < 28 minggu
- b. Sangat prematur ialah bayi yang lahir dengan umur kehamilan < 32 minggu
- c. Moderat prematur ialah bayi yang lahir antara umur kehamilan 32 - < 34 minggu
- d. Late prematur ialah bayi yang lahir antara umur kehamilan 34 – 36 minggu

2. Etiologi Bayi Prematur

- a. Banyak kasus persalinan prematur sebagai akibat proses patogenik yang merupakan mediator biokimia yang mempunyai dampak terjadinya kontraksi rahim dan perubahan serviks, yaitu:
 - 1) Aktivasi akses kelenjar hipotalamus - hipofisis - adrenal baik pada ibu maupun janin, akibat stres pada ibu atau janin.

- 2) Inflamasi desidua - koriamnion atau sistemik akibat infeksi asenden dari traktus genitourinaria atau infeksi sistemik.
 - 3) Perdarahan desidua
 - 4) Peregangan uterus patologik
 - 5) Kelainan pada uterus atau serviks (Maryunani & Puspitasari, 2013:166)
- b. Ada banyak faktor yang menyebabkan bayi lahir prematur (dr. Dina, 2017), yaitu:
- 1) Faktor Ibu
 - a) Ibu yang mengalami malnutrisi (kekurangan nutrisi) pada saat hamil
 - b) Riwayat kelahiran prematur sebelumnya
 - c) Hipertensi
 - d) Infeksi
 - e) Trauma
 - f) Diabetes
 - g) Penyakit kronik
 - h) Umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih 35 tahun
 - i) Jarak kehamilan dan persalinan yang terlalu dekat
 - j) Pre-eklampsia berat
 - k) Eklampsia
- 

- 2) Faktor Janin
 - a) Infeksi
 - b) Kelainan bawaan janin
 - c) Kelainan kromosom
- 3) Faktor Plasenta atau Rahim
 - a) Pembukaan leher rahim yang lebih awal
 - b) Kelainan bentuk rahim
 - c) Kelainan plasenta
 - d) Terlepasnya plasenta dari dalam rahim yang lebih awal

3. Tanda dan Gejala Persalinan Prematur

- a. Tanda-tanda dan gejala persalinan prematur sebagian besar sama dengan persalinan normal
- b. Tanda-tandanya terkadang samar sehingga sulit untuk di kenali dan tak terduga
 - 1) Kontraksi setiap 10 menit atau lebih sering dalam satu jam (lima atau lebih kontraksi rahim dalam satu jam).
 - 2) Kram seperti menstruasi yang di rasakan di perut bagian bawah yang terjadi terus-menerus atau hilang timbul. Kram perut ini biasa terjadi dengan atau tanpa diare.
 - 3) Nyeri punggung bawah yang terasa di bawah pinggang yang terjadi terus-menerus atau hilang-timbul.
 - 4) Tekanan panggul yang terasa seperti bayi mendorong ke bawah

- 5) Cairan encer yang keluar dari vagina. Cairan vagina meningkat jumlahnya atau berubah warna.
- c. Jika ibu hamil merasa mengalami tanda-tanda dan gejala di atas, segeralah menghubungi tenaga kesehatan terdekat (Maryunani & Puspita, 2013)

4. *Diagnosis Bayi Prematur*

Ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan pada bayi prematur, diantaranya adalah :

- a. Pemeriksaan pernapasan dan denyut jantung, dilakukan karena bayi prematur sering mengalami ketidakteraturan denyut jantung dan pernapasan. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan dengan pemasangan monitor di NICU (*Neonates Intensive Care Unit*).
- b. Pemeriksaan darah, khususnya untuk memeriksa kadar hemoglobin (sel darah merah), kalsium, gula darah, dan bilirubin.
- c. Ekokardiogram, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai adanya kebocoran katup jantung dan fungsi pompa jantung bayi.
- d. Pemeriksaa mata, diperlukan karena mata bayi prematur, khususnya bagian retina, sangat sering mengalami gangguan yang disebut sebagai *retinopathy of prematurity* yaitu gangguan mata yang berpotensi kebutakan (dr. Grace Valantine, 2018)

5. *Patofisiologi Bayi Prematur*

Alat tubuh bayi prematur belum berfungsi seperti bayi matur. Oleh karena itu, ia mengalami banyak kesulitan hidup di luar uterus ibunya yang bersangkutan dengan ketidaksempurnaan kerja organ tubuhnya, maka mudah timbul komplikasi, diantaranya:

a. Suhu tubuh

- 1) Pusat pengatur suhu tubuh masih belum sempurna
- 2) Luas badan bayi relatif besar, sehingga penguapannya bertambah
- 3) Otot bayi masih lemah
- 4) Lemak kulit dan lemak coklat kurang, sehingga cepat kehilangan panas badan
- 5) Kemampuan metabolisme panas masih rendah

b. Pernapasan

- 1) Pusat pengaturan pernapasan belum sempurna
- 2) Surfaktan paru-paru masih kurang, sehingga perkembangannya tidak sempurna
- 3) Otot pernapasan dan tulang iga lemah
- 4) Dapat disertai penyakit

c. Alat pencernaan makanan

- 1) Belum berfungsi sempurna, sehingga penyerapan makanan masih lemah atau kurang baik

- 2) Aktifitas otot pencernaan makanan masih belum sempurna, sehingga pengosongan lambung berkurang
- 3) Mudah terjadi regurgitasi isi lambung dan dapat menimbulkan pneumonia aspirasi.

d. Hepar yang belum matang (*Immature*)

Mudah menimbulkan pemecahan bilirubin, sehingga mudah terjadi hiperbilirubinemia (kuning) sampai karena ikterus.

e. Ginjal masih belum matang

Kemampuan mengatur pembuangan sisa metabolisme dan air masih belum sempurna sehingga mudah terjadi oedema.

f. Perdarahan dalam otak

- 1) Pembuluh darah bayi prematur masih rapuh dan mudah pecah
- 2) Sering mengalami gangguan pernapasan, sehingga mudah terjadi perdarahan dalam otak
- 3) Perdarahan dalam otak memperburuk keadaan dan menyebabkan kematian bayi
- 4) Pemberian O₂ belum mampu diatur sehingga mempermudah terjadi perdarahan dan nekrosis.

6. *Komplikasi Bayi Prematur*

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan bayi prematur, yaitu :

a. *Respiratory Distress Syndrome (RDS)*

Disebut juga sindrom gangguan pernapasan. Gangguan ini terjadi karena paru-paru bayi belum matang sehingga tidak bisa menghasilkan zat surfaktan dalam jumlah memadai. Surfaktan memungkinkan permukaan paru-paru mengembang dengan baik ketika bayi keluar dari dalam rahim untuk menghirup udara secukup yang bayi butuhkan. Singkatnya, surfaktan diperlukan paru-paru agar bisa bernapas bebas (Lily Tarungan, 2015).

b. Apnea

Bayi prematur kadang-kadang mengalami berhenti bernapas selama 20 detik atau lebih. Gangguan pada pernapasan seperti ini disebut apnea, dan mungkin disertai dengan denyut jantung yang lambat.

Bayi prematur seharusnya terus dimonitori untuk melihat apakah dia memiliki apnea. Jika bayi berhenti bernapas, petugas kesehatan akan merangsang bayi untuk mulai bernapas dengan cara menepuk-nepuk atau menyentuh telapak kakinya (Lily Tarungan, 2015).

c. *Interventrikuler Hemorrhage (IVH)*

Disebut juga perdarahan intraventrikular. Perdarahan di otak terjadi pada beberapa bayi prematur, terutama yang lahir sebelum usia kandungan

32 minggu. Perdarahan biasanya terjadi pada tiga hari pertama kehidupan dan umumnya di diagnosa dengan pemeriksaan USG.

Kebanyakan perdarahan otak ringan dan sembuh sendiri tanpa atau dengan sedikit efek samping lanjutan. Perdarahan yang lebih parah dapat menyebabkan struktur ventrikel otak berkembang pesat terisi cairan, menyebabkan otak tertekan dan dapat menyebabkan kerusakan otak seperti cerebral palsy, gangguan belajar dan masalah perilaku.

Dalam kasus tersebut, ahli bedah dapat memasukkan selang ke dalam otak untuk mengalirkan cairan dan mengurangi risiko kerusakan otak. Dalam kasus ringan, obat dapat mengurangi penumpukan cairan (Lily Tarungan, 2015).

d. Hiperbilirubinemia

Hiperbilirubinemia terjadi karena kadar bilirubin terlalu tinggi, ditandai oleh perubahan warna kulit dan bagian putih mata menjadi kuning (bayi kuning). Bilirubin adalah pigmen kuning yang memang ada pada sel darah manusia.

Hiperbilirubinemia lebih umum terjadi pada bayi prematur dibandingkan pada bayi lahir cukup bulan. Tingkat bilirubin yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan otak sehingga bayi kuning harus dirawat dengan cepat sebelum bilirubin mencapai tingkat berbahaya.

Bayi kuning ditempatkan di bawah lampu biru khususnya yang membantu tubuh menghilangkan bilirubin. Pada kasus yang parah,

transfusi harus dilakukan untuk mengganti darah bayi dengan darah baru yang sehat (Lily Tarungan, 2015).

e. *Retinopati Of Prematurity* (ROP)

ROP adalah pertumbuhan abnormal pembuluh darah di mata yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Hal ini terjadi terutama pada bayi yang lahir sebelum 32 minggu kehamilan. ROP didiagnosa ketika bayi diperiksa oleh dokter mata.

Kebanyakan kasus yang ringan dan sembuh dengan sendirinya dengan sedikit atau tanpa kehilangan penglihatan. Dalam kasus yang lebih parah, dokter mata dapat mengobati pembuluh abnormal dengan laser atau dengan *cryotherapy* (pembekuan) untuk melindungi retina dan mempertahankan penglihatan (Lily Tarungan, 2015).

f. Anemia

Dalam beberapa minggu pertama kehidupan, bayi tidak membuat banyak sel darah merah baru. Selain itu, sel darah merah bayi memiliki masa hidup yang lebih pendek dari pada orang dewasa. Hal tersebut menyebabkan banyak bayi prematur kekurangan jumlah sel darah merah yang diperlukan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Kondisi yang disebut anemia ini mudah di diagnosa dengan menggunakan tes hitung sel darah merah di laboratorium. Beberapa bayi prematur, terutama yang beratnya kurang dari 1.000 gram, membutuhkan transfusi sel darah merah (Lily Tarungan, 2015).

g. Pneumonia Aspirasi

Sering ditemukan pada bayi prematur karena refleks menelan dan batuk belum sempurna. Penyakit ini dapat dicegah dengan perawatan yang baik, antara lain dengan selalu menyendawakan bayi sesudah minum (Kusumawati, 2013).

h. Gangguan Imunologik

Daya tahan tubuh terhadap infeksi belum memadai karena kemampuan leukosit masih kurang, sehingga pembentukan antibody belum sempurna serta rendahnya kadar Ig G atau gamma globulin (Kusumawati, 2013).

i. Gangguan Pencernaan dan Masalah Nutrisi

Aktifitas alat pencernaan makanan masih belum sempurna, sehingga penyerapan makanan kurang baik, serta pengosongan lambung juga berkurang. Selain itu juga mudah terjadi regurgitasi isi lambung dan dapat menyebabkan pneumonia aspirasi (Kusumawati, 2013)

j. Hipotermi

Hipotermi dapat terjadi karena kemampuan untuk mempertahankan panas dan kesanggupan menambah produksi panas sangat terbatas karena pertumbuhan otot-otot yang belum cukup memadai, lemak subkutan yang sedikit, belum matang sistem saraf pengatur suhu tubuh, luas permukaan tubuh relatif lebih besar dibandingkan dengan berat badan sehingga masalah kehilangan panas (Kusumawati, 2013).

7. *Sebab-Sebab Kematian Bayi Prematur*

Kematian perinatal sebagian besar (70%) terjadi akibat persalinan prematur, terutama disebabkan oleh (Maryunani & Puspita, 2013) :

- a. Prematuritas alat vital
- b. Gangguan tumbuh kembang paru-paru sehingga tidak mampu beradaptasi dengan dunia di luar kandungan
- c. Perdarahan intracranial
- d. Kemungkinan infeksi karena daya tahan tubuh yang rendah
- e. Gangguan adaptasi dengan nutrisi yang diberikan
- f. Kegagalan dalam memberikan pertolongan adekuat di rumah sakit tersier.

8. *Penatalaksanaan Bayi Prematur (Maryunani & Puspitasari, 2013:319)*

Dengan memperhatikan gambaran klinik dan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada bayi prematur maka perawatan dan pengawasan ditujukan pada pengaturan suhu, pemberian makanan bayi, pernafasan, hipoglikemi dan menghindari infeksi, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengaturan suhu badan bayi prematuritas :
 - 1) Bayi prematur dengan cepat akan kehilangan panas badan dan menjadi hipotermi karena pusat pengaturan panas belum berfungsi dengan baik, metabolisme rendah dan permukaan badan relative luas

oleh karena itu bayi prematur harus di rawat dalam inkubator sehingga panas badannya mendekati dalam rahim.

- 2) Apabila tidak ada inkubator, bayi dapat di bungkus dengan kain dan di sampingnya di taruh botol berisi air panas sehingga panas badannya dapat dipertahankan.

b. Makanan bayi prematur

- 1) Alat pencernaan bayi belum sempurna lambung kecil enzim pencernaan belum matang sedangkan kebutuhan protein 3-5 gr/kg BB dan kalori 110 kal/ kg BB sehingga pertumbuhan dapat meningkat. Pemberian minum bayi sekitar 3 jam setelah lahir dan didahului dengan menghisap cairan lambung, reflek masih lemah sehingga pemberian minum sebaiknya sedikit demi sedikit dengan frekuensi yang lebih sering.
- 2) ASI merupakan makanan yang paling utama sehingga ASI lah yang paling dahulu di berikan, bila faktor menghisapnya kurang maka ASI dapat di peras dan diberikan dengan sendok perlahan-lahan atau dengan memasang sonde.
- 3) Permulaan cairan yang diberikan 50-60 cc/kg BB/ hari terus di naikkan sampai mencapai sekitar 200 cc/kg BB / hari.

c. Pernapasan

- 1) Bayi prematur mungkin menderita penyakit membrane hialin.

- 2) Pada penyakit ini tanda-tanda gawat pernapasan selalu ada dalam 4 jam bayi harus di rawat telentang atau tengkurap dalam inkubator dada abdomen harus dipaparkan untuk mengobserfasi pernapasan.

d. Menghindari Infeksi

- 1) Bayi prematuritas mudah sekali mengalami infeksi karena daya tahan tubuh masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang dan pembentukan antibody belum sempurna.
- 2) oleh karena itu tindakan preventif sudah dilakukan sejak antenatal sehingga tidak terjadi persalinan dengan prematuritas.

C. Tinjauan Kasus Bayi Prematur Dalam Pandangan Islam

Salah satu hak seorang anak setelah kelahirannya adalah hak untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya yang berguna untuk tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan bayi, banyak dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan kepada anak yang berupa ASI hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT Dalam Q.S. AL-Baqarah/2: 233

مِنْ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَمَا مَلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يَرْضَعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
مَوْلُودَهُنَّ لَا يُولَدْنَ لَهُنَّ وَأُولَادُهُنَّ تَضَارُّنَّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُهَا بِالْعُرْفِ وَكَسْوَتِهِنَّ رِزْقٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak terbebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Kementrian Agama RI, 2017: 37)

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Kata *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk merujuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah paraa ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram sebab, menurut penelitian ilmuan, ketika itu

bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dan wanita lain.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena QS. al-Ahqaf (46) : 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Tentusaja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena, anak itu meembawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni

berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *parawaris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *parawaris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahu dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dari sini, dipahami adanya tingkat penyusuan; *pertama*, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; *kedua*, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat *ketiga*, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan-misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecemasan, misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang

dapat menyusuanaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.*

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu*, yakni bagi ayah, memberikan kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa karena, ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikan (Shihab, 2012: 608-609-610-611).

Sekarang datanglah ayat menjelaskan tentang menyusukan anak: “*Dan ibu-ibu itu, hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, (yaitu) bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan,*” (pangkal ayat 233) (Hamka, 1982: 231)

Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dari hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapat bahwa maksud ayat ini adalah umum; baik isteri yang diceraikan suami, ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anak, walaupun tidak bercerai.

Ayat ini pun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, bahwa seorang ibu menyusukan

anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya dengan air susupun tidak menyerahkan kepada induk yang lain buat menyusukan anaknya, dan kalau penyusuan disia-siakannya, berdosalah dia di hadapan Allah. Di ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabiban moden, bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu lain. Disebut pula disini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu, yang sebaik-baiknya disempurnakan dua tahun.

Di dalam surat 46 (al-Ahqaf) ayat 15, disebutkan pula bahwa anak itu baru dilepaskan dari bendungan ibu setelah 30 bulan. Sebab secepat-cepatnya masa mengandung ialah enam bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi "*Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan,*" teranglah pengasuhan dua tahun itu ialah yang sebaik-baiknya bagi siapa yang ingin mencapai kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya baru anak berusia enam bulan si ibu telah mengandung pula, bolehlah masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangi dari dua tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu.

Sebagai kita katakan di atas tadi, ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli-ahli kesihatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain, bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama menjadi ibu susu dari anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahnya. Meskipun kejjadian padaa Rasulullah S.A.W. di waktu masih kecilnya bukanlah menjadi hujjah dan syariat, kita semuanya mengetahui bahwa di waktu kecilnya Rasulullah disusukan oleh

Tsuaibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa'diah, ibu susunya dari Bani Sa'ad (Hamka,1982: 232).

Seorang sarjana kenamaan Dr. Paul Gyorgy, mengatakan dalam uraiannya bahwa “Air susu ibu manusia untuk bayi manusia, dan air susu sapi adalah untuk sapi!”

Dikemukakannya pendapat tersebut diatas adalah sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa penggunaan air susu ibu untuk anak manusia dewasa ini muali kurang populer. Bahkan di negara-negara yang baru berkembang, antara lain disebutkan indonesia, Philipina, Brazil, Costa Rica, Libya dan lain-lain, lebihkurang 80% sampai 90% dari bayi-bayi yang mendapat susu dari ibunya sendiri selama kurang lebih sepuluh bulan, kini juga sudah mulai berkurang. Bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat misalnya, disana Cuma 12 sampai 25% saja anak-anak bayi yang menerima susu dari ibunya sendiri. Kebanyakan mereka mendapatkan susu berdasarkan resep-resep yang diberikan oleh dokter untuk mengganti susu ibunya.

Padahal dikatakan oleh sarjana tersebut bahwa penggunaan susu yang bahkan susu ibunya bagi anak-anak bayi mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang sangat membahayakan bagi kesehatan si bayi.

Demikian saran dari sarjana Dr. Paul, seorang professor dalam pediatrics pada Rumahsakit Umum di Philadelphia. Semoga pernyataan tersebut mendapat perhatian dari ibu-ibu di Indonesia, bahwa sesungguhnya : “Susu manusia adalah

untuk manusia dan susu sapi adalah untuk anak sapi.” (Disalin dari majalah *Selecta* no. 257 : Penjuru Angin) (Hamka, 1982 : 233).

Diwajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua (Al-Maragi, 1992 : 318).

Adapun sebab diwajibkannya menyusui bagi ibu, karena air susu ibu merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter. Bayi yang masih berada dalam kandungan di tumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia sudah terpisah dari kandungan ibunya. Hanya air susu ibu paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa ia akan terserang penyakit atau cedera disebabkan air susu ibu. Apa yang disadap oleh bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang diperoleh bayi dari ibunya tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap diri bayi tersebut, bahkan sebaiknya akan membuatnya lebih sehat dan lebih baik.

Apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diselidiki terlebih dahulu dalam hal kesehatan dan akhlaknya. Pandai-pandailah dalam hal memilih perempuan yang akan mengemban tugas ini. Sebab

air susu ini terbuat dari darah, kemudian dihisap oleh bayi maka bayi tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusunya, baik dalam hal kesehatan maupun karakternya. Terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akan lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas pada diri bayi. Jika memang demikian, maka pengaruh kecerdasan akal, perasaan dan watak perempuan tersebut jelas lebih besar dan lebih kuat.

Para ahli pendidikan di negara-negara maju telah memahami kenyataan ini. Oleh karena itu, tersebutlah bahwa kaisar Rusia telah memerintahkan istrinya untuk menyusui sendiri anak-anaknya dan melarang mereka disusukan oleh orang lain. Pada kenyataannya, banyak kita saksikan orang-orang yang telah menyepelkan masalah menyusui anak-anaknya dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan hartawan yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjagab kesehatannya. Padahal kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak (Al-Maragi, 1992 : 319).

Dalam hal ini kaum musliminlah yang beruntung. Sebab agama mereka memberi petunjuk kepada mereka hal-hal yang mendatangkan maslahat dalam mendidik anak-anak dan membina akhlak mereka. Kita belum pernah melihat satu agamapun yang mengemukakan masalah-masalah yang baik dalam hal mendidik generasi yang baru tumbuh, sebagaimana yang kita dapatkan dalam agama islam.

Ya Allah berilah taufik kepada kaum muslimin, agar mereka mengambil petunjuk agama-Mu dan berakhlak dengan nasihat-nasihat agama-Mu.

Sebagian ulama mengatakan bahwa menyusui sebaiknya dilakukan oleh ibu sendiri dan tidak wajib atasnya. Kecuali jika bayi tersebut hanya mau menghisap air susu ibunya dan tidak mau menghisap air susu orang lain, sebagaimana kita yang sering kita saksikan pada sebagian bayi. Atau barang kali ayahnya tidak mampu membayar upah tetapi tidak ada orang yang mau menyusui bayinya.

Firman Allah itu merupakan pengukuhan terhadap kewajiban ini. Menurut kebiasaan, sekalipun kurang dari dua tahun, hal ini bisa dikatakan dua tahun. Seperti yang dikatakan, “saya tinggal di rumah si Fulan selama dua tahun.” Maksud dari perkataan ini, terkadang masa tinggalnya tidak persis dua tahun, tetapi kurang sedikit dari itu. Katakanlah satu setengah tahun misalnya.

Hikmah ditetapkan pembatasan waktu menyusui bayi dengan masa ini ialah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini. Dan ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibunya sendiri. Dan apabila kedua orang tuanya melihat adanya masalah dalam memisahkan bayi dari ibunya kurang dari dua tahun, maka kedua orang tuanya harus memelihara kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, sebagian bayi yang tidak mau menghisap lagi air susu ibu sebelum cukup dua tahun, sehingga harus diberi makanan lembut sebagai gantinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Kebidanan

1. Pengertian

Manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah. Penemuan-penemuan keterampilan sedalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan satu keputusan yang berfokus pada pasien (Yulifah,2014: 126)

2. Langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan

Varney (1997) menjelaskan proses manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal tahun 1970-an. Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) langkah yaitu sebagai berikut :

Langkah I: Pengumpulan Data Dasar (Pengkajian)

Pengkajian adalah langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada saat pengkajian adalah: anamnesa atau wawancara dilakukan untuk mendapatkan data subjektif tentang keadaan klien (Maritalia,D, 2014:113-114).

a. Anamnesa dan riwayat kesehatan klien

Prematur adalah bayi lahir yang umur kehamilannya kurang dari 37 minggu dan berat badannya kurang 2500 gram dan ada beberapa banyak

penyebab bayi prematur yaitu saat hamil gizi ibu yang kurang merupakan salah satu faktor resiko melahirkan bayi lahir prematur karena kondisi asupan nutrisi saat kehamilan yang buruk atau tidak mencukupi kebutuhan ibu dan janinnya. Kunjungan ANC, dimana ibu yang tidak melakukan kunjungan antenatal, bahkan jumlah kunjungan kurang, dapat meningkatkan ibu melahirkan bayi prematur karena kunjungan ANC merupakan salah satu sumber utama ibu mendapatkan tablet Fe dan edukasi mengenai kebutuhan nutrisi yang penting selama masa kehamilan.

Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun karena usia muda untuk menjadi seorang ibu seringkali membuat para ibu muda tersebut kekurangan pengetahuan, pendidikan, pengalaman, pendapatan dan kekuatan dibandingkan dengan ibu yang lebih tua.

Hamil ganda. Riwayat ibu melahirkan bayi prematur: ibu yang memiliki riwayat melahirkan bayi prematur 3,3 kali lebih berisiko melahirkan bayi prematur dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat melahirkan bayi prematur.

b. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan

Keadaan umum klien, tanda-tanda vital : pernapasan sekitar 45 sampai 50 denyut per menit (pernapasan tidak teratur dapat terjadi apnea (gagal napas), frekuensi nadi 100 sampai 140 denyut per menit, dan suhu di bawah 36,5 c. ukuran antropometri: berat badan kurang dari 2500 gram, panjang kurang dari 45 cm,lingkar dada kurang 30 cm,lingkar

kepala kurang dari 33 cm, dan LILA dibawah dari 9,5 cm. kepala : relative lebih besar,tidak mampu tegak dan tulang tengkorak lunak mudah bergerak. Kulit :kulit tipis transparan,rambut lanugo banyak dan lemak kulit kurang.

Genetalia bayi perempuan: klitoris menonjoldengan labia mayora yang belum berkembang, bayi laki-laki:scrotum belum berkembang sempurna dengan ruga yang kecil,testis tidak turun kedalam scrotum. Ekstrimitas : paha abduksi, sendi lutut/kaki fleksi-lurus dan kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari. Refleks menelan dan menghisap yang lemah, menangis lemah dan tonus otot hipotonik lemah.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk selalu bermunajab kepada Allah SWT.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa /masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data dikumpulkan.**1.** Diagnosa

kebidanan yaitu diagnosis yang di tegakkan oleh bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnose kebidanan.

- a. Masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman klien yang ditemukan dan hasil pengkajian atau yang menyertai diagnosa. Masalah tidak dapat diidentifikasi seperti diagnosa, tetapi membutuhkan penanganan. Masalah yang sering timbul pada bayi prematur adalah suhu tubuh rendah dan refleks hisap lemah.
- b. Kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah. Hal ini didapatkan dengan melakukan analisa data pada bayi prematur. Kebutuhan bayi prematur antara lain pemberian rasa nyaman dan hangat, dan pemenuhan nutrisi.

Menganjurkan ibu untuk selalu bersabar dan bertawakal atas apa yang ditimpahnya saat ini (Purwoastuti,E,& Elisabeth, SW, 2014: 134&136).

Langkah III : Diagnosa Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan,sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi (Purwoastuti, E, & Elisabeth, SW, 2014:136).

Pada bayi prematur masalah potensial yang timbul yaitu antisipasi terjadinya respiratory distress syndrome (RDS), apnea, interventrikuler

hemorrhage (IVH), hiperbilirubinemia, retino prematurity (ROP), anemia, pneumonia aspirasi, gangguan imunologik, gangguan pencernaan, masalah nutrisi, dan hipotermi. Menganjurkan ibu untuk selalu berprasangka baik atas apa yang dialami bayinya sekarang.

Langkah IV: Tindakan Segera, Konsultasi, Kolaborasi, Rujukan

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau untuk di konsultasikan atau ditangani bersama dengan tim anggota kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien (Purwoastuti, E,& Elisabeth,SW, 2014: 137).

Tindakan segera pada kasus prematur adalah menghangatkan bayi di dalam incubator dengan suhu 35°C , menjaga jalan napas bayi.

Tindakan konsultasi, kolaborasi pada kasus prematur adalah konsultasikan dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk selalu menjaga shalatnya (sri, 2015).

Langkah V: Rencana Tindakan / Intervensi

Langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap dianosa atau masalah yang telah di identifikasikan atau di antisipasi. Pada langkah ini informasi / data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi (Purwoastuti, E,& Elisabeth, SW, 2014:138).

Adapun penatalaksanaan bayi baru lahir prematur adalah menjelaskan kepada klien penyebab terjadinya bayi lahir prematur yaitu karena saat ibu

hamil makan makanan yang bergizi, perdarahan antepartum, kehamilan ganda, kelainan kromosom, dan umur kehamilan kurang dari 37 minggu sehingga pada saat bayi lahir biasanya terjadi hipotermi dan hipoglikemia.

Lakukan tindakan umum dan tindakan khusus bagi bayi lahir prematur. Secara umum yaitu mempertahankan suhu tubuh dengan ketat karena bayi yang lahir prematur mudah mengalami hipotermi, maka itu suhu tubuhnya harus dipertahankan dengan ketat, mencegah infeksi dengan ketat karena bayi yang lahir prematur sangat rentan akan infeksi.

Adapun prinsip-prinsip pencegahan infeksi adalah termasuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, pengawasan nutrisi (ASI) refleks menelan bayi prematur belum sempurna dan sangat lemah, sehingga pemberian nutrisi harus dilakukan dengan cermat. Penimbangan ketat, perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat.

Adapun secara khusus yaitu inkubator, cara pemakaian incubator adalah pastikan incubator berfungsi dengan baik, nyalakan alat sebelum di pakai matras dan linen hangat dan atur suhu inkubator yang dikehendaki sesuai umur dan berat badan bayi. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk selalu mengingat kepada Allah SWT agar hatinya tenang dan damai.

Langkah VI :Melaksanakan Perencanaan

Pada langkah keenam ini pelaksanaan dari rencana asuhan menyeluruh dari perencanaan. Pada saat tertentu bidan bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, tetapi bidan tetap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan asuhan yang diberikan (Purwoastuti, E& Elisabeth, SW, 2014 : 139).

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan prematur (Sri, 2015), yaitu :

- a. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga
- b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi
- c. Mengobservasi TTV (suhu, denyut jantung bayi, pernapasan)
- d. Menghangatkan bayi dalam incubator
- e. Mengobservasi intake dan output bayi yang berkolaborasi dengan dokter spesialis anak
- f. Merawat tali pusat bayi
- g. Menjaga personal hygiene bayi
- h. Menimbang berat badan bayi setiap hari

Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi merupakan sebuah perbandingan dari hasil yang aktual dengan hasil yang diharapkan penilaian apakah rencana asuhan yang telah disusun dapat terlaksanan dan terpenuhi kebutuhannya seperti yang telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. Menganjurkan ibu untuk selalu

berikhtiar kepada Allah SWT untuk kesembuhan bayinya (Purwoastuti, E & Elisabeth, SW, 2014:139).

3. *Pendokumentasian Asuhan Kebidanan*

Data asuhan kebidanan ini menggunakan data perkembangan yang berupa SOAP yaitu :

S : Subyektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Berdasarkan teori yang di dapatkan pada data subyektif yaitu bayi lahir dengan prematur (langkah 1 Varney)

O : Obyektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah 1 Varney)

A : Assessment

Menggambarkan pendokumentasian, analisa dan interpretasi data subyektif dan obyektif dalam suatu identifikasi :


- a. Diagnosis/masalah
- b. Antisipasi diagnosis/masalah potensial
- c. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter /konsultasi/kolaborasi/dan atau rujukan (langkah II,III dan IV Varney)

P : Planning

Menggambarkan pendokumentasian perencanaan dan evaluasi berdasarkan Assesment (langkah V,VI,VII Varney) (Yulifah, 2013:136)

- a. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga
- b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi
- c. Mengobservasi TTV (suhu, denyut jantung bayi, pernapasan)
- d. Menghangatkan bayi dalam incubator
- e. Mengobservasi intake dan output bayi yang berkolaborasi dengan dokter spesialis anak
- f. Merawat tali pusat bayi
- g. Menjaga personal hygiene bayi
- h. Menimbang berat badan bayi setiap hari
- i. Langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney dapat dilihat pada bagan berikut :


Gambar 2.2 : 7 Langkah Varney



(Sumber : Kusumawati, 2013)

E. Kerangka Alur Pikir Studi Kasus

Gambar 2.3 Alur pikir Studi Kasus



Kesimpulan dari alur pikir :

Kelahiran bayi prematur merupakan faktor penyebab dari ibu, janin dan plasenta atau rahim. Faktor dari ibu yaitu, ibu yang mengalami mal nutrisi (kekurangan nutrisi) pada saat hamil, riwayat kelahiran prematur sebelumnya, hipertensi, infeksi, trauma, diabetes, penyakit kronik, umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, jarak kehamilan dan persalinan yang terlalu dekat, pre-eklampsia berat, dan eklampsia.

Adapun faktor dari janin yaitu, infeksi, kelainan bawaan janin, dan kelainan kromosom. Faktor penyebab bayi lahir prematur lainnya yaitu faktor dari plasenta atau rahim yaitu, pembukaan leher rahim yang lebih awal, kelainan bentuk rahim, kelainan plasenta, terlepasnya plasenta dari dalam rahim yang lebih awal.

Bayi yang lahir dengan prematur dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti : sindrom gangguan pernapasan idopatik atau penyakit membranialin, pneumonia aspirasi, perdarahan interventrikuler dan hiperbilirubinemia.

Adapun bentuk penatalaksanaan bayi prematur yaitu; menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, mengobservasi TTV (suhu, denyut jantung bayi, pernapasan), menghangatkan bayi dalam inkubator, mengobservasi intake dan output bayi yang berkolaborasi dengan dokter spesialis anak, merawat tali pusat bayi, menjaga personal hygiene bayi, menimbang berat badan bayi setiap hari.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY”I”
DENGAN PREMATUR DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018

No. Reg / Medical record : 509xxx
Tanggal Pengkajian : 21 September 2018, pukul 10.30 wita
Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. Langkah I. Pengumpulan Data Dasar (Pengkajian)

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By ”I”
Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita
Umur : 0 hari
Anak Ke : pertama (1)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny “I” / Tn” H”
Umur : 29 tahun / 33 tahun
Nikah : 1 kali
Lamanya : 2 tahun

Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

2. Data Biologis / Fisiologis

a. Riwayat Selama Hamil

Anak pertama dan tidak pernah keguguran, Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) tanggal 24 Januari 2018, Taksiran Persalinan (TP) tanggal 31 Oktober 2018, umur kehamilan \pm 8 bulan, pemeriksaan kehamilan sebanyak 3 kali di puskesmas.

b. Riwayat Kesehatan

Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, asma, tidak ada riwayat keturunan kembar baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, dan tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat.

c. Riwayat Kelahiran

Umur kehamilan 34 minggu 2 hari, tanggal lahir 21 September 2018, pukul 10.30 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa, penolong persalinan adalah bidan, jenis persalinannya yaitu Presentase Belakang Kepala (PBK), spontan, lahir kurang bulan, dan perlangsungan kala II-IV normal. Segera menangis dengan *apgar score* 7/9, Berat Badan

Lahir (BBL) 2200 gram, Panjang Badan Lahir (PBL) 45 cm, dan Jenis Kelamin (JK) Laki- Laki.

d. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar bayi

1) Nutrisi/Cairan

Kebutuhan nutrisi/cairan bayi sementara di peroleh dari pemberian ASI eksklusif oleh ibu dan dilakukan pemasangan OGT.

2) Personal Hygiene

Bayi belum dimandikan, rambut bayi belum pernah dicuci dan pakaian bayi diganti tiap kali basah/ habis BAK/BAB.

3) Eliminasi

Bayi sudah BAK selama pengkajian, Frekuensi BAK 1 kali selama pengkajian, warna kuning jernih dengan bau amoniak dan bayi belum pernah BAB selama pengkajian.

4) Istirahat

Bayi lebih banyak tidur dan terbangun jika bayi lapar dan pakaiannya basah dan waktu tidur belum dapat ditentukan.

e. Pemeriksaan Fisik

Jenis kelamin laki-laki, Berat badan 2200 gram, panjang badan 45cm, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 29 cm, lingkar perut 29 cm, dan lila 8 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu denyut jantung 123x/I, pernapasan 44x/I, suhu 36,5°C dan pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, dan auskultasi yaitu:

1) Wajah

Simestris kiri dan kanan, tidak pucat, dan tidak ada tanda lahir.

2) Mata

Simestris kiri dan kanan, kongjuntiva merah mudah, sclera tidak ikterus, tidak ada secret.

3) Mulut

Refleks menghisap lemah, pallatum tidak ada kelainan, lidah bersih, merah muda, bibir tampak agak kering dan pucat.

4) Leher

Tidak ada pembesaran atau pembengkakan, tidak ada nyeri tekan ditandai bayi tidak menangis.

5) Dada dan perut

Simestris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan napas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, tonus otot bayi baik, tali pusat masih basah.

6) Genitalia dan Anus

Tidak ada kelainan pada genitalia

7) Extremitas

a) Tangan : pergerakan baik, jari tangan kiri dan kanan lengkap, reflex mengenggam baik.

b) Kaki : pergerakan aktif, jari-jari kaki kiri dan kanan lengkap, refleks babi sky dan refleks moro baik.

8) Kulit

Integrasi kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo

9) Karakteristik menurut Ballard

a) Maturitas Neoromuskuler

(1) Postur	: 2
(2) Jendela pergelangan tangan	: 3
(3) Gerakan lengan membalik	: 2
(4) Sudut popitella	: 1
(5) Tanda selempang	: 2
(6) <u>Lutut ke telinga</u>	: 2 +
Jumlah	: 12

b) Maturitas fisik

1) Kulit	: 1
2) Lanugo	: 3
3) Permukaan plantar kaki	: 2
4) Payudara	: 2
5) Mata/daun telinga	: 3
6) <u>Genetalia</u>	: 2 +
Jumlah	: 13

c) Tingkat kematangan $12 + 13 = 25$, umur kehamilan 32-34 minggu.

f. Data Psikologis, spiritual dan ekonomi

Orangtua sangat senang dengan kelahiran bayinya dan sedih karena umur kehamilannya kurang dari 9 bulan dan berat badan bayinya kurang dari normal dan kecil, orangtua dapat bekerjasama dengan bidan dan dokter dalam perawatan bayinya terutama pemberian ASI, orangtua rajin sholat dan rajin berdoa agar anaknya segera sehat dan dapat berkumpul dengan keluarganya, hubungan ibu suami dan lingkungan sekitarnya baik, dan kedua orangtua berharap agar nutrisi bayinya dapat terpenuhi dengan ASI saja.

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa aktual : NKB/KMK/SPT/PBK, dengan umur 0 hari.

NKB/KMK/SPT/PBK (Neonatus Kurang Bulan / Kecil Masa Kehamilan / Spontan / Presentase Belakang Kepala)

1. Data subjektif

Ibu melahirkan dengan kurang bulan (8 bulan), HPHT tanggal 24 Januari 2018, dan bayi lahir secara normal, dan kepala duluan lahir tanggal 21 September 2018.

2. Data objektif

Masa gestasi 34 minggu 2 hari dan Taksiran Persalinan tanggal 31 Oktober 2018, berat badan lahir 2200 gram.

3. Analisa dan Interpretasi Data

Dilihat dari taksiran persalinan tanggal 31 Oktober 2018 dan bayi lahir secara spontan dan presentase belakang kepala tanggal 21 September 2018 dengan berat badan lahir 2200 gram, artinya bayi lahir spontan dan presentase belakang kepala dengan masa gestasi / usia kehamilan 34 minggu 2 hari dan mempunyai berat badan kurang dari seharusnya untuk masa kehamilan biasa disebut neonatus kurang bulan dan kecil untuk masa kehamilan (NKB/KMK/SPT/PBK) (Amiruddin, R, & Hasmi, 2014:138).

C. Langkah III. Merumuskan Diagnosa/ Masalah Potensial

Diagnosa potensial :

1. Terjadi Hipotermi

a. Data subjektif

Taksiran persalinan tanggal 31 Oktober 2018, bayi lahir kurang bulan pada tanggal 21 September 2018, dengan berat badan lahir 2200 gram.

b. Data objektif

Berat badan yaitu 2200 gram, masa gestasi 34 minggu 2 hari, denyut jantung 140x/menit, pernapasan 44x/menit, suhu 36,5°C, dan bayi terbungkus kain dan dirawat dalam inkubator.

c. Analisa dan interpretasi data

Hipotermi dapat terjadi karena kemampuan untuk mempertahankan panas dan kesanggupan menambah produksi panas sangat terbatas, di samping itu otot-otot yang belum memadai, jaringan lemak subkutan yang sedikit,

dan luas permukaan tubuh relatif lebih besar dibandingkan berat badan sehingga mudah kehilangan panas (Maryunani, A, 2013).

2. Terjadi Hipoglikemia

a. Data subjektif

Bayi masih lemah dan banyak tidur.

b. Data objektif

Berat badan sekarang 2200 gram, umur kehamilan 34 minggu 2 hari, dan refleks menghisap dan menelan lemah.

c. Analisa dan interpretasi data

Isapan bayi lemah saat di beri ASI dan banyak tidur yang menyebabkan hipoglikemia sehingga terjadi sedikitnya simpanan energi pada bayi atau cadangan glukosa dalam hati berkurang sehingga kadar gula dalam darah akan menurun.

3. Terjadi Hiperbilirubinemia

a. Data subjektif

Bayi lahir kurang bulan (8 bulan) pada tanggal 21 September 2018, dan berat badan kurang dari 2000 gram.

b. Data objektif

Masa gestasi 34 minggu 2hari dan berat badan 2200 gram dan panjang badan 45 cm.

c. Analisa dan interpretasi data

Bayi lahir kurang bulan dan berat badan 2200 gram kurang dari normal (2500-4000 gram) maka organ-organ pada bayi belum terbentuk sempurna atau belum matang sehingga dapat terjadi hiperbilirubinemia yaitu terjadi karena fungsi hati belum matang pada bayi menjadi kuning lebih awal dan lebih lama daripada bayi yang cukup beratnya (Maryunani, A, 2013)

4. Terjadi perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral

a. Data subjektif

Bayi lahir kurang bulan (8 bulan) pada tanggal 21 September 2018 dengan berat badan 2200 gram dan panjang badan 45 cm.

b. Data objektif

Masa gestasi 34 minggu 2 hari dan berat badan 2200 gram.

c. Analisa dan interpretasi data

Bayi lahir kurang bulan yaitu 8 bulan sehingga dapat menyebabkan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral ini berhubungan belum matangnya sistem pembekuan darah dan organ pada bayi belum matang.

D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ada data yang menunjang

E. Langkah V. Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh

1. Tujuan :

- a. Berat badan naik, tetap atau penurunan tidak lebih dari 10% dari berat badan sebelumnya
- b. Kebutuhan bayi akan nutrisi terpenuhi/teratasi.
- c. Tidak terjadi hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, dan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral.
- d. Tanda-tanda vital dalam batas normal

2. Kriteria

- a. Berat badan bayi bertambah.
- b. Bayi dapat minum sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bayi dapat menyusui pada ibunya dengan baik.
- d. Bayi tidak dirawat di inkubator.
- e. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu denyut jantung (120x/menit-160x/menit), pernapasan (40x/menit-60x/menit), dan suhu (36,5°C-37,5°C).

3. Rencana Tindakan

Tanggal 21 September, 10.35 wita.

- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Rasional : Tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi

b. Melakukan pemasangan selang Oral Gastric Tube (OGT)

Rasional : Refleks menghisap dan refleks menelan bayi masih lemah sehingga selangnya digunakan untuk memasukkan ASI atau obat dengan menggunakan spoit.

c. Memberikan intake ASIP sebanyak 3 cc dengan menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Rasional : Intake yang adekuat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi khususnya glukosa sehingga tidak terjadi hipoglikemia.

d. Observasi tanda-tanda vital

Rasional : Tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya

e. Timbang BB bayi setiap hari

Rasional : BB bayi sangat penting untuk menetapkan kalori dan cairan bayi dengan mengetahui perubahan BB bayi maka kita dapat mengetahui kondisi bayi.

f. Pertahankan suhu bayi dengan perawatan inkubator dan tetap terbungkus

Rasional : Perawatan bayi dengan terbungkus dalam inkubator akan menghindari terjadinya konduksi dan evaporasi

g. Rawat tali pusat

Rasional : Adanya luka yang terbuka dan lembab dapat terjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme.

h. Kaji tanda-tanda infeksi

Rasional : Bayi sangat rentan terhadap infeksi, terutama pada tali pusat yang dapat menjadi tempat masuknya mikroorganisme

i. Observasi eliminasi pasien

Rasional : Untuk mengetahui keseimbangan antara intake dan output

j. Gantikan pakaian/popok bayi setiap kali basah

Rasional : Pakaian bayi akan mempengaruhi suhu badan yang dapat mengakibatkan evaporasi.

k. Anjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya

Rasional : Pemberian ASI dan susu tambahan (formula) secara teratur sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi.

l. Anjurkan pada ibu untuk mengkomsumsi makanan dengan gizi seimbang

Rasional : kecukupan asuhan gizi pada ibu menyusui sangat mempengaruhi produksi ASI yang di butuhkan Bayi.

m. Ajarkan pada ibu cara menyusui yang benar

Rasional : Agar ibu tahu cara menyusui yang benar dan bayi merasa puas

F. Langkah VI. Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Tanggal 21 September 2018, pukul 10.35 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : Petugas sudah mencuci tangan

2. Melakukan pemasangan selang Oral Gastric Tube (OGT)

Hasil: Telah dilakukan pemasangan OGT pada bayi.

3. Memberikan intake ASIP sebanyak 3 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil : Intake yang adekuat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi khususnya glukosa sehingga tidak terjadi hipoglikemia.

4. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil :

- a. Denyut jantung : 144 x/i
- b. Pernapasan : 40 x/i
- c. Suhu : 36,5°c

5. Menimbang berat badan bayi setiap hari

Hasil : Berat badan bayi 2200 gram

6. Menyelimuti bayi dan meletakkan kedalam inkubator.

Hasil : Bayi telah didalam inkubator

7. Merawat tali pusat

Hasil : Tali pusat belum puput, masih basah dan nampak bersih

8. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil : Tidak ada tanda-tanda infeksi

9. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil : Bayi bak satu kali dan bab belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

10. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil : Bayi sudah memakai popok

11. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan asi eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar

Hasil : Ibu mau menyusui bayinya dengan ASI eksklusif menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

12. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar

G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 21 September 2018, Jam 10.35 wita

1. Berat Badan sekarang: 2200 gram, Panjang Badan 45 cm.
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu :
 - a. Denyut Jantung : 144 x/ i
 - b. Pernapasan : 40 x/ i
 - c. Suhu : 36,5 °C
3. Kebutuhan bayi akan nutrisi belum terpenuhi, ditandai dengan minum menggunakan spoit lewat OGT dengan refleks menelan dan menghisap bayi masih lemah dan bayi tidak dapat menyusui pada ibunya dengan baik.
4. Tidak terjadi hipotermi, ditandai dengan suhu tubuh 36,5 °C dan suhu tubuh teraba hangat serta dirawat di inkubator.

5. Tidak terjadi hipoglikemia ditandai dengan bantuan ASI serta susu formula untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADABAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018

No.Reg/Medical Record : 59xxxx
Tanggal Pengkajian : 21 September 2018
Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By “I”
Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita
Umur : 0 hari
Anak Ke : pertama (1)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny “I” / Tn” H”
Umur : 29 tahun / 33 tahun
Nikah : 1 kali
Lamanya : 2 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi lemah, banyak tidur, belum bisa menghisap puting susu, bayi didalam inkubator dan berat badan dibawah 2200 gram
2. Anak pertama dan tidak pernah keguguran
3. HPHT tanggal 24-01-2018
4. Selama hamil telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 3 kali di Puskesmas
5. Selama hamil telah mendapatkan suntik TT1 umur kehamilan 5 bulan tanggal 17 Juni 2018 dan TT2 umur kehamilan 7 bulan tanggal 11 Agustus 2018, dan mengkonsumsi tablet Fe (zat besi) selama hamil.
6. Ibu melahirkan kurang bulan (8 bulan) dengan HPHT tanggal 24-01-2018 dan melahirkan tanggal 21-09-2018 pukul 10.30 wita secara normal, ditolong oleh bidan dengan BBL: 2200 gram, PBL: 45 cm dan lingk kepala 29 cm, dan jenis kelamin laki-laki.
7. Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, dan diabetes melitus.
8. Tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat.
9. Orang tua dapat bekerja sama dengan bidan dan dokter dalam perawatan bayinya terutama pemberian ASI.

C. OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi lemah
2. Kesadaran composmentis
3. TP tanggal 31 Oktober 2018
4. Berat badan sekarang: 2200 gram, PB: 45 cm, Jenis Kelamin laki-laki
5. Tanda-tanda vital:
 - a. Suhu : 36,5 °C
 - b. denyut jantung : 140 x/menit
 - c. Pernapasan : 44 x/menit
6. Pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi dan auskultasi yaitu:
 - a. Wajah
Simetris kiri dan kanan, bentuk bulat, tidak pucat, dan tidak ada tanda lahir.
 - b. Mata
Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus, dan tidak ada sekret.
 - c. Mulut
Bibir tampak agak kering dan pucat, refleks menghisap lemah, pallatum tidak ada kelainan, lidah bersih, merah mudah, gusi tidak ada kelainan dan terpasang selang Oral Gastric Tube (OGT).

d. Leher

Tonus otot leher lemah, tidak ada pembesaran atau pembengkakan, dan tidak ada nyeri tekan ditandai dengan bayi tidak menangis.

e. Dada dan perut

Simetris kiri dan kanan, gerakan dada ikut dengan gerakan nafas, puting susu ada, belum menonjol dan tampak tipis, keadaan tali pusat sudah kering dan dijepit, tidak bengkak, tidak ada infeksi dan perdarahan, perut tidak kembung.

f. Genitalia dan Anus

Tidak ada kelainan pada genitalia dan terdapat lubang anus.

g. Kulit

Integritas kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo.

h. Ekstremitas

1) Tangan : pergerakan lemah, jari tangan kiri dan kanan lengkap, dan refleks menggenggam lemah.

2) Kaki : pergerakan lemah, jari kaki kiri dan kanan lengkap, refleks babinsky dan refleks moro lemah, dan terpasang infus pada kaki kanan.

D. ASSESMENT (A)

NKB/KMK/SPT/PBK, dengan umur 0 hari.

E. PLANNING (P)

Tanggal 21 September 2018 pukul 10.35 wita

1. Menganjurkan ibu memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi.

Hasil : Ibu bersedia memberikan ASI pada ibunya

2. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI dan cara menyusui yang benar.

Hasil : Ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pemberian ASI yang baik dan benar.

3. Memberikan intake ASIP sebanyak 3 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil : Bayi telah diberi minum

4. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil : Denyut jantung 140 x/i, pernapasan : 44 x/i, dan suhu 36,5 °C

5. Menimbang berat badan bayi setiap hari.

Hasil : Berat badan bayi sekarang 2200 gram.

6. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Hasil : Telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.

7. Mengganti pakaian basah dengan pakaian yang kering jika BAB/BAK

Hasil : Pakaian telah di ganti

8. Menyelimuti bayi dan meletakkan di inkubator.

Hasil : Bayi telah di inkubator dengan suhu inkubator 35°C.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018

No.Reg/Medical Record : 59xxxx
Tanggal Pengkajian : 22 September 2018
Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

Identifikasi Bayi dan Orangtua

1. Identitas Bayi

Nama : By “I”
Tanggal Lahir : 22 September 2018, jam 10.35 Wita
Umur : 1 hari
Anak Ke : pertama (1)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn” H”
Umur : 29 tahun / 33 tahun
Nikah : 1 kali
Lamanya : 2 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi masih lemah, kecil, banyak tidur, belum bisa menghisap puting susu dan berat badan bayi naik
2. Bayi di dalam inkubator
3. Masih ada selang terpasang di mulut bayi

C. OBJEKTIF (O)

1. Keadaan bayi lemah
2. Berat badan sekarang 2210 gram dan panjang badan 45 cm
3. Bayi diberi ASI dan susu formula menggunakan spoit lewat selang OGT setiap 3 jam pemberian.
4. Bayi masih di dalam inkubator
5. Tanda- tanda vital :
 - a. Denyut jantung : 142x/i
 - b. Suhu : 36,5°c
 - c. Pernapasan : 44x/i
6. Konjungtiva tampak merah mudah
7. Kulit tampak kemerahan, tipis, dan sedikit lemak
8. Refleks menghisap dan menelan masih lemah

9. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi
10. Tali pusat dijepit, tampak bersih, tidak ada perdarahan dan infeksi.
11. Gerakan tangan dan kaki masih lemah dan dibagian kaki masih terpasang infus

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny "I" NKB/KMK/SPT/PBK, dengan umur 1 hari.

E. PLANNING (P)

Tanggal 22 September 2018, pukul 09.15 wita

1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang benar.

Hasil : Ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pemberian ASI yang baik dan benar.

2. Memberikan intake ASI perah dibantu susu formula sebanyak 3 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil : Bayi telah diberi minum

3. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil : Denyut jantung 140 x/i, pernapasan 42 x/i, dan suhu 36,5 °C

4. Menimbang berat badan bayi setiap hari.

Hasil : Berat badan bayi sekarang 2220 gram.

5. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Hasil : Telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidakterbungkus kain.

6. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah

Hasil : Ibu telah melaksanakannya.

7. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

Hasil : Ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

8. Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan meletakkan kedalam inkubator.

Hasil : Bayi telah didalam inkubator 35°C.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018

No.Reg/Medical Record : 59xxxx
Tanggal Pengkajian : 23 September 2018
Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By “I”
Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita
Umur : 2 hari
Anak Ke : pertama (1)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn “H”
Umur : 29 tahun / 33 tahun
Nikah : 1 kali
Lamanya : 2 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi masih lemah, kecil, banyak tidur, belum bisa menghisap puting susu dan berat badan bayi naik.
2. Bayi di dalam inkubator
3. Masih ada selang terpasang di mulut bayi

C. OBJEKTIF (O)

1. Keadaan bayi lemah
2. Berat badan sekarang 2220 gram dan panjang badan 45 cm
3. Bayi diberi ASI dan susu formula menggunakan spoit lewat selang OGT setiap 3 jam pemberian.
4. Bayi masih di dalam inkubator
5. Tanda- tanda vital :
 - a. Denyut jantung : 142x/i
 - b. Suhu : 36,8°c
 - c. Pernapasan : 46x/i
6. Konjungtiva tampak merah mudah
7. Kulit tampak kemerahan, tipis, dan sedikit lemak
8. Refleks menghisap dan menelan masih lemah

9. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi
10. Tali pusat dijepit, tampak bersih, tidak ada perdarahan dan infeksi.

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny “I” NKB/KMK/SPT/PBK, dengan umur 2 hari.

E. PLANNING (P)

Tanggal 23 September 2018, pukul 08.00 wita

1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang benar.

Hasil : ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pemberian ASI yang baik dan benar.

2. Memberikan intake ASI perah dibantu susu formula sebanyak 3 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil : bayi telah diberi minum

3. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil : denyut jantung 140 x/i, pernapasan 46 x/i, dan suhu 36,8 °C

4. Menimbang berat badan bayi setiap hari.

Hasil : berat badan bayi sekarang 2220 gram.

5. Melaksanakan perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Hasil : telah dilakukan perawatan tali pusat dengan membiarkan tali pusat tidak terbungkus kain.

6. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah

Hasil : ibu telah melaksnakannya.

7. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

Hasil : ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

8. Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan meletakkan kedalam inkubator.

Hasil : bayi telah didalam inkubator 35°C.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018

No.Reg/Medical Record : 59xxxx
Tanggal Pengkajian : 24 September 2018
Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By “I”
Tanggal Lahir : 21 September, jam 10.35 Wita
Umur : 4 hari
Anak Ke : pertama (1)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn” H”
Umur : 29 tahun / 33 tahun
Nikah : 1 kali
Lamanya : 2 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. SUBJEKTIF (S)

1. Gerakan bayi baik, berat badan naik, dan sudah bisa menghisap puting susu ibu meskipun masih lemah
2. Bayi di dalam inkubator dan ASI banyak yang keluar
3. Bayi di susui ibu serta dibantu susu formula
4. Masih terpasang selang dimulut bayi
5. Ibu ingin pulang atau keluar dari Rumah Sakit karena pertimbangan ekonomi atau biaya rumah sakit walaupun berat badan bayi belum mencapai 2500 gram.

C. OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Berat badan sekarang 2230 gram
3. Bayi dirawat di inkubator
4. Bayi disusui ibu serta dibantu susu formula dengan menggunakan spooit lewat selang OGT sedikit demi sedikit dengan 3 cc setiap 3 jam pemberian.
5. Tanda-tanda vital:
 - a. Suhu : 36,6 °C
 - b. Denyut jantung : 140 x/menit

c. Pernapasan : 46 x/menit

6. Konjungtiva tampak merah mudah
7. Kulit tampak kemerahan dan jaringan lemak sedikit
8. Refleks menghisap dan menelan masih lemah
9. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny "I" NKB/KMK/SPT/PBK,) dengan umur 4 hari.

E. PLANNING (P)

Tanggal 24 September 2018, pukul 08.00 wita

1. Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang benar.

Hasil : ibu mengerti penjelasan yang diberikan tentang pemberian ASI yang baik dan benar.

2. Memberikan intake ASI perah serta dibantu susu formula sebanyak 3 cc dengan cara menggunakan spoit lewat OGT tiap 3 jam.

Hasil : bayi telah diberi minum

3. Mengobservasi tanda – tanda vital

Hasil : denyut jantung 140 x/i, pernapasan 46 x/i, dan suhu 36,6 °C

4. Menimbang berat badan bayi setiap hari.

Hasil : berat badan bayi sekarang 2230 gram.

5. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemulangan klien

Hasil : telah dilakukan kolaborasi

6. Melakukan informed consent pada ibu bayi bahwa bayi pulang dengan berat badan belum normal yaitu 2230 gram dan keinginan keluarga.

Hasil : ibu dan keluarga telah setuju

7. Mengingatkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah

Hasil : ibu telah melaksnakannya

8. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

Hasil : ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.

9. Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayi dengan selalu menyelimuti bayi dengan sarung.

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

10. Menganjurkan pada ibu melakukan metode kanguru.

Hasil : Ibu mau melaksanakannya.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RUMAH BTN ANAK GOWA
TAHUN 2018

No.Reg/Medical Record : 59xxxx
Tanggal Pengkajian : 28 September 2018
Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By”I”
Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita
Umur : 8 hari
Anak Ke : pertama (1)
Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn” H”
Umur : 29 tahun / 33 tahun
Nikah : 1 kali
Lamanya : 2 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 21 September, jam 10.30
WITA
2. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan
3. ASI sudah lancar dan ibu rutin menyusui bayinya
4. Bayi BAB 2-3 kali sehari, BAK 5-6 kali sehari
5. Ibu selalu membedong bayinya
6. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
7. Ibu dan keluarga merasa sangat senang atas kelahiran bayinya
8. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

C. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 8 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - a. HR : 132 x/i
 - b. P : 40 x/i
 - c. S : 36,6 °C

5. Pengukuran antropometri

a. BB : BBL : 2200 gram

BBS : 2300 gram

b. PB : PBL : 45 cm

PBS : 45cm

c. LILA : 7 cm

6. Pemeriksaan fisik

a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus

b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa

c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris

d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada

e. Telinga : simetris, tidak ada serumen

f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral

g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleks menghisap serta refleks rooting ada

h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada

- i. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 46 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi, frekuensi jantung 140 x/i, tidak ada peningkatan timpani pada lapang paru
- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
- k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat tampak kering yang dijepit umbilical cord, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
- l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
- m. Anus : tampak lubang anus
- n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap

7. Pemeriksaan refleks

- a. Refleks morro (+) : ada respon saat dikejutkan
- b. Refleks rooting (+) : ada respon mencari puting
- c. Refleks sucking (+) : ada respon ingin menghisap
- d. Refleks grafs (+) : ada respon ingin menggenggam
- e. Refleks plantar (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny "I" umur 8 hari

E. PLANNING (P)

Tanggal 28 September 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2300 gram dan keadaan bayi baik-baik saja

Hasil: ibu mengerti

2. Mengajarkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari seperti:

- a. Jangan membiarkan bayi bersentuhan dengan benda dingin dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar bayi agar tetap hangat
- b. Mengganti popok bayi tiap kali basah atau pada saat BAB dan BAK
- c. Mengganti pakaian bayi tiap kali basah dan lembab
- d. Segera menghangatkan bayi dan mengeringkan badan bayi setelah dimandikan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mengajarkan ibu cara perawatan metode kanguru yaitu:

- a. Anjurkan ibu untuk mencuci tangan sebelum melakukan perawatan
- b. Anjurkan ibu untuk membersihkan daerah dada dan abdomen dengan kain waslap

- c. Anjurkan ibu untuk memakaikan bayiya kaos kaki dan topi pada saat perawatan metode kanguru
- d. Letakkan bayi dengan posisi tegak diantara kedua payudara ibu, kontak kulit dada ke dada
- e. Kepala bayi menghadap ke samping dengan posisi sedikit menengadah supaya jalan napas terbuka dan dada kontak mata dengan ibu
- f. Panggul bayi dalam posisi seperti katak
- g. Ikat dengan kain kanguru, ikatan yang kencang dibagian punggung sedangkan bagian perut dilonggarkan supaya bayi dapat bernapas dengan baik
- h. Perawatan kanguru dapat dilakukan oleh suami
- i. Perawatan kanguru dapat dilakukan setiap hari sekitar 1-2 jam
- j. Anjurkan ibu untuk melakukannya rutin sampai berat badan bayi mencapai minimal 2500 gram

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin agar ASI lancar dan mempercepat kenaikan berat bada bayi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RUMAH BTN ANAK GOWA
TAHUN 2018

Tanggal Kunjungan : 04 Oktober 2018

Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

1. Identitas Bayi

Nama : By “I”

Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita

Umur : 14 hari

Anak Ke : pertama (1)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn” H”

Umur : 29 tahun / 33 tahun

Nikah : 1 kali

Lamanya : 2 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 21 September 2018, jam 10.30
WITA
2. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan
3. ASI sudah lancar dan ibu rutin menyusui bayinya
4. Bayi BAB 2-3 kali sehari, BAK 6-7 kali sehari
5. Ibu selalu membedong bayinya
6. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
7. Ibu dan keluarga merasa sangat senang atas kelahiran bayinya
8. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

C. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 14 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - a. HR : 132 x/i
 - b. P : 40 x/i
 - c. S : 36,6 °C
5. Pengukuran antropometri

a. BB : BBL : 2200 gram

BBS : 2350 gram

b. PB : PBL : 45 cm

PBS : 45cm

c. LILA : 7 cm

6. Pemeriksaan fisik

a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus

b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa

c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris

d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada

e. Telinga : simetris, tidak ada serumen

f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral

g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, reflek smenghisap serta refleks rooting ada

h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada

i. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 46 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi,

frekuensi jantung 140 x/i, tidak ada peningkatan timpani pada lapang paru.

- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
 - k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat tampak kering yang dijepit umbilical cord, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
 - l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
 - m. Anus : tampak lubang anus
 - n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap
7. Pemeriksaan refleks
- a. Refleks morro (+) : ada respon saat dikejutkan
 - b. Refleks rooting (+) : ada respon mencari puting
 - c. Refleks sucking (+) : ada respon ingin menghisap
 - d. Refleks grafs (+) : ada respon ingin menggenggam
 - e. Refleks plantar (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny "I" umur 14 hari

E. PLANNING (P)

Tanggal 04 Oktober 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2350 gram dan keadaan bayi baik-baik saja.

Hasil: ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan metode kanguru

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menjelaskan kembali kepada ibu mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik ibu maupun bayinya dan tetap melakukan perawatan bayi sehari-hari

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar ASI lancar.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RUMAH BTN ANAK GOWA
TAHUN 2018

Tanggal Kunjungan : 11 Oktober 2018

Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By”I”

Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita

Umur : 21 hari

Anak Ke : pertama (1)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn” H”

Umur : 29 tahun / 33 tahun

Nikah : 1 kali

Lamanya : 2 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 21 September, jam 10.30 WITA
2. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan
3. ASI sudah lancar dan ibu rutin menyusui bayinya
4. Bayi BAB 2-3 kali sehari, BAK 6-7 kali sehari
5. Ibu selalu membedong bayinya
6. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
7. Ibu dan keluarga merasa sangat senang atas kelahiran bayinya
8. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

C. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 21 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - a. HR : 140 x/i
 - b. P : 44 x/i
 - c. S : 36,8⁰C
5. Pengukuran antropometri
 - a. BB : BBL : 2200 gram

BBS : 2400 gram

b. PB : PBL : 45 cm

PBS : 45cm

c. LILA : 7 cm

6. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada
- e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
- f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral
- g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleks menghisap serta refleks rooting ada
- h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada
- i. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 46 x/i (normalnya 40-60 x/i), serta napas jernih, sama kedua sisi,

frekuensi jantung 140 x/i, tidak ada peningkatan timpani pada lapang paru

j. Payudara : jarak antar puting sejajar

k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat tampak kering yang dijepit umbilical cord, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada

l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh

m. Anus : tampak lubang anus

n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap

7. Pemeriksaan refleks

a. Refleks morro (+) : ada respon saat dikejutkan

b. Refleks rooting (+) : ada respon mencari puting

c. Refleks sucking (+) : ada respon ingin menghisap

d. Refleks grafs (+) : ada respon ingin menggenggam

e. Refleks plantar (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny "I" umur 21 hari

E. PLANNING (P)

Tanggal 11 Oktober 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2425 gram dan keadaan bayi baik-baik saja

Hasil: ibu mengerti

2. Mengajarkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mengajarkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesring mungkin untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia

4. Mengajarkan ibu untuk tetap melakukan perawatan metode kanguru

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali kepada ibu mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik ibu maupun bayinya dan tetap melakukan perawatan bayi sehari-hari

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengajarkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar ASI lancar

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BAYI NY “I” DENGAN PREMATUR
DI RUMAH BTN ANAK GOWA
TAHUN 2018

Tanggal Kunjungan : 23 Oktober 2018

Nama Mahasiswa : Eka Riskawati

A. IDENTIFIKAS DATA DASAR

1. Identifikasi Bayi dan Orangtua

a. Identitas Bayi

Nama : By”I”

Tanggal Lahir : 21 September 2018, jam 10.35 Wita

Umur : 32 hari

Anak Ke : pertama (1)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu / Ayah

Nama : Ny” I “ / Tn” H”

Umur : 29 tahun / 33 tahun

Nikah : 1 kali

Lamanya : 2 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Anak Gowa

B. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 21 September, jam 10.30
WITA
2. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan
3. ASI sudah lancar dan ibu rutin menyusui bayinya
4. Bayi BAB 1-2 kali sehari, BAK 5-6 kali sehari
5. Ibu selalu membedong bayinya
6. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
7. Ibu dan keluarga merasa sangat senang atas kelahiran bayinya
8. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

C. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 32 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - a. HR : 142 x/i
 - b. P : 42 x/i
 - c. S : 36,5⁰C
5. Pengukuran antropometri

- a. BB : BBL : 2200 gram
BBS : 2515 gram
 - b. PB : PBL : 45 cm
PBS : 46 cm
 - c. LILA : 8 cm
6. Pemeriksaan fisik
- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus
 - b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa
 - c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris
 - d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada
 - e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
 - f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral
 - g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleks menghisap serta refleks rooting ada
 - h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada
 - i. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 46 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi,

frekuensi jantung 140 x/i, tidak ada peningkatan timpani pada lapang paru

- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
 - k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat tampak kering yang dijepit umbilical cord, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
 - l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
 - m. Anus : tampak lubang anus
 - n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap
7. Pemeriksaan refleks
- a. Refleks morro (+) : ada respon saat dikejutkan
 - b. Refleks rooting (+) : ada respon mencari puting
 - c. Refleks sucking (+) : ada respon ingin menghisap
 - d. Refleks grafs (+) : ada respon ingin menggenggam
 - e. Refleks plantar (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh

D. ASSESMENT (A)

Bayi Ny "I" umur 32hari

E. PLANNING (P)

Tanggal 23Oktober 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2515 gram dan keadaan bayi baik-baik saja

Hasil: ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesring mungkin untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: ibu mengertidan bersedia

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatanmetode kanguru

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali kepada ibu mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik ibu maupun bayinya dan tetap melakukan perawatan bayi sehar-hari

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar ASI lancar

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny”I” dengan umur kehamilan 34 minggu 2 hari dan berat badan lahir 2200 gram umur 0 hari, kasus ini diambil di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Gowa dan asuhan yang dilakukan selama 4 kali kunjungan mulai dari tanggal 21 September s/d 24 September 2018.

Di ruang perinatologi asuhan dilakukan dengan bantuan bidan atau tenaga kesehatan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang tersedia dan sesuai standar rumah sakit. Pembahasan ini akan membahas tentang perbandingan studi kasus pada bayi Ny”I” dengan bayi lahir prematur dengan tinjauan teoritis. Pembahasan akan diuraikan secara narasi dengan 7 langkah varney dan soap sebagai berikut :

A. Langkah I. Pengumpulan Data Dasar (Pengkajian)

Tahap pengkajian diawali dengan pengumpulan data melalui anamnesis yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memberikan informasi yang paling akurat yang diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin seperti keluarga, bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain bersedia untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan klien sehingga memudahkan pengumpulan data.

Pengkajian anamnesa yaitu HPHT 24 Januari 2018, taksiran persalinan 31 Oktober 2018, anak pertama dan tidak pernah mengalami keguguran, selama

hamil pemeriksaan kehamilan sebanyak 3 kali, imunisasi TT 2 kali, selama hamil ibu mengkonsumsi tablet Fe setiap malam sebelum tidur. Bayi lahir secara normal dengan usia kehamilan 34 minggu 2 hari dan presentase belakang kepala dengan berat badan 2200 gram dan panjang badan 45 cm, jenis kelamin laki-laki pada tanggal 21 September 2018.

Pengkajian hari pertama diumur 0 hari dirawat dalam inkubator, keadaan umum bayi lemah, berat badan 2200 gram, refleks mengisap dan menelan masih lemah, dan bayi masih belum bisa mengisap puting susu, terpasang selang OGT pada mulut bayi, tanda-tanda vital bayi : suhu $36,4^{\circ}\text{C}$, denyut jantung 140x/menit, pernapasan 44x/menit, tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat, gerakan kaki dan tangan masih lemah, integritas kulit tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo, dan bayi diberi ASI perah yang dibantu dengan susu formula melalui selang OGT setiap 3 jam.

Pengkajian hari kedua umur 1 hari masih di inkubator, keadaan bayi sedang, berat badan sekarang 2210 gram, refleks mengisap dan menelan masih lemah dan bayi masih belum bisa mengisap puting susu ibu, terpasang selang OGT pada mulut bayi, tanda-tanda vital bayi : suhu $36,5^{\circ}\text{C}$, denyut jantung 140x/menit, pernapasan 42x/menit, tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat, gerakan kaki dan tangan masih lemah, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, tidak ada lanugo dan bayi diberi ASI Perah yang dibantu dengan susu formula melalui selang OGT setiap 3 jam.

Pengkajian hari ketiga umur 2 hari masih di inkubator, keadaan bayi lemah, berat badan sekarang 2220 gram, refleks mengisap dan menelan masih lemah dan bayi belum bisa putting susu ibu, terpasang selang OGT pada mulut bayi, tanda-tanda vital bayi : suhu $36,7^{\circ}\text{C}$, denyut jantung 144x/menit, pernapasan 42x/menit, tali pusat bayi dijepit, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi, gerakan kaki dan tangan masih lemah, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, tidak ada lanugo dan bayi diberi ASI Perah dan dibantu dengan susu formula melalui selang OGT setiap 3 jam.

Pengkajian hari keempat umur 3 hari dirawat dalam inkubator, keadaan bayi baik, berat badan sekarang 2230 gram, refleks mengisap dan menelan baik, dan bayi sudah bisa mengisap puting susu ibu, terpasang selang OGT pada mulut bayi, tanda-tanda vital bayi : $36,6^{\circ}\text{C}$, denyut jantung 140x/menit, pernapasan 40x/menit, tali pusat telah puput, gerakan tangan dan kaki masih lemah, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, tidak ada lanugo dan bayi diberi ASI dan dibantu susu formula melalui selang OGT setiap 3 jam serta ibu ingin pulang atau keluar dari rumah sakit karena pertimbangan ekonomi atau biaya rumah sakit walaupun berat badan bayi belum mencapai 2500 gram.

Pengkajian dirumah, kunjungan pertama hari ke 8, keadaan bayi telah membaik dan sudah bisa menghisap puting susu dan menelan dengan baik, bayi banyak tidur dan ASI banyak, bayi sudah BAB dan kencing, bayi diberi ASI saat bayi bangun atau lapar dan menagis, keadaan umum bayi baik, berat badan bayi sekarang 2300 gram, panjang badan 46 cm, tanda-tanda vital : suhu $36,6^{\circ}\text{C}$,

denyut jantung 132x/l, pernapasan 40x/i, konjungtiva tampak merah muda, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, gerakan tangan dan kaki aktif .

Pengkajian kunjungan kedua, umur 14 hari, keadaan bayi membaik, berat badan naik, bayi banyak tidur dan ASI banyak, bayi di susui saat bayi bangun, lapar atau menangis, bayi telah BAB dan kencing, berat badan sekarang 2350 gram, panjang badan 46 cm, kulit tampak kemerahan dan lemak sudah ada, tanda-tanda vital : suhu 36,6°C, denyut jantung 132x/i, pernapasan 40x/i, konjungtiva merah muda, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, refleks mengisap dan menelan cukup baik dan gerakan tangan dan kaki aktif.

Pengkajian kunjungan ketiga, umur 21 hari, keadaan bayi membaik telah membaik, bayi banyak tidur dan berat badan sekarang 2400 gram, bayi diberi ASI dan dibantu susu formula saat bayi bangun atau lapar dan menangis. Bayi telah BAB dan kencing, keadaan umum bayi baik, bayi menghisap putting susu dengan kuat, tanda-tanda vital : suhu 36,8°C, denyut jantung 140x/i, pernapasan 44x/i, konjungtiva merah muda, kulit tampak kemerahan dan lemak sudah ada, refleks mengisap dan menelan baik, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, abdomen tampak bersih, gerakan tangan dan kaki aktif.

Pengkajian kunjungan keempat, umur 30 hari, keadaan bayi membaik telah membaik, bayi banyak tidur dan berat badan sekarang 2515 gram, bayi diberi ASI dan dibantu susu formula saat bayi bangun atau lapar dan menangis. Bayi telah BAB dan kencing, keadaan umum bayi baik, bayi menghisap putting susu dengan kuat, tanda-tanda vital : suhu 36,6°C, denyut jantung 142x/i,

pernapasan 42x/i, konjungtiva merah muda, kulit tampak kemerahan dan lemak sudah ada, refleks mengisap dan menelan baik, gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi, abdomen tampak bersih, gerakan tangan dan kaki aktif.

Berdasarkan tinjauan teoritis, etiologi yang mempengaruhi kejadian bayi lahir prematur yaitu faktor ibu : ibu yang mengalami malnutrisi pada saat hamil, riwayat kelahiran premature sebelumnya, hipertensi, trauma, penyakit kronik, umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih 35 tahun, preeklampsia dan eklampsia.

Faktor janin : kelainan bawaan janin, kelainan kromosom, infeksi (missal : rubella, sifilis, toksoplasmosis), kehamilan ganda. Selain faktor ibu dan faktor janin adapula faktor lain yaitu : faktor kelainan plasenta, kelainan bentuk rahim, pembukaan leher rahim yang lebih awal dan terlepasnya plasenta dari dalam rahim yang lebih awal (dr.Dina, 2017)

Tanda dan gejala bayi lahir prematur yaitu : umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu, berat badan sama dengan atau kurang dari 2500 gram, panjang sama dengan atau kurang dari 46 cm, kuku panjangnya belum melewati ujung jari, batas dahi dan rambut tidak jelas, lingkaran kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm, lingkaran dada sama dengan atau kurang dari 30 cm, rambut lanugo masih banyak, jaringan lemak subkutan tipis atau kurang, tumit mengkilap dan telapak kaki halus.

Alat kelamin pada laki-laki : pigmentasi dan rugae pada scrotum kurang, testis belum turun ke dalam scrotum. Untuk bayi perempuan : klitoris menonjol, labia minora belum tertutup oleh labia mayora, tonus otot lemah, sehingga bayi

kurang aktif dan pergerakannya lemah, fungsi saraf yang belum atau kurang matang mengakibatkan refleks isap, menelan dan batuk masih lemah atau tidak efektif dan tagisannya lemah, jaringan kelenjar mammae masih kurang akibat pertumbuhan otot dan jaringan lemak masih kurang (Amiruddin, R, & Hasni, 2014: 147-148)

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi kasus pada bayi Ny”I” dengan bayi lahir prematur ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan bayi Ny”I” dengan bayi lahir prematur.

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Berdasarkan data yang diperoleh diagnosa atau masalah aktual pada bayi Ny “I” adalah NKB/KMK/SPT/PBK, prematur.

C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Adapun masalah potensial yang dapat ditegakkan pada studi kasus ini adalah gangguan imunologi ini berpotensi terjadi hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubin dan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral sebagai berikut.

Masalah potensial di RSUD Syekh Yusuf Gowa terjadinya hipotermi, berdasarkan teori bahwa bayi lahir rendah dengan umur kehamilan kurang mudah mengalami hipotermi karena hanya memiliki sedikit lemak tubuh dan pengaturan suhu tubuh pada bayi belum matang serta kehilangan panas disebabkan oleh permukaan tubuh bayi kurang relative lebih luas bila dibandingkan dengan berat badan (Maryunani,A,2013). Potensi terjadinya hipoglikemia, berdasarkan teori bahwa bayi berat lahir rendah mudah mengalami hipoglikemia karena hanya sedikitnya simpanan energy atau cadangan glukosa dalam hati berkurang sehingga kadar gula dalam darah akan menurun pada bayi (Maryunani,A, 2013).

Potensial terjadinya hiperbilirubinemia, berdasarkan teori bahwa bayi berat bayi lahir rendah dengan umur kehamilan kurang bulan dapat mengalami hiperbilirubinemia karena fungsi hati belum matang atau belum terbentuk sempurna pada bayi sehingga kuning lebih awal dan lebih lama dari pada bayi yang cukup beratnya (Maryunani,A, 2013).

Potensial terjadinya perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral, berdasarkan teori bahwa bayi berat lahir rendah dengan umur kehamilan kurang bulan dapat mengalami perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral karena belum matangnya sistem pembekuan darah dan organ pada bayi belum matang atau belum terbentuk sempurna (Maryunani,A, 2013).

Potensial terjadinya hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, dan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral tetap mengacu pada konsep dasar dan data yang ada dalam menegakkan masalah yang mungkin muncul pada klien

bila tidak segera ditangani. Sehingga pada tahap ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara konsep dasar dan masalah potensial pada bayi Ny “I”.

D. Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi

Menurut teori tindakan segera/kolaborasi, di Rumah Sakit jika dalam keadaan tertentu terjadi kejadian hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, sindrom gangguan pernapasan idiopatik (penyakit membran hialin), dan perdarahan spontan dalam ventrikel otak lateral maka perlu dilakukan tindakan tergantung keadaan bayi. Bayi Ny “I” tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut sehingga dapat terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dengan yang seharusnya menurut teori yang ada.

Pengkajian di rumah juga, bayi Ny “I” tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut sehingga dapat terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dengan yang seharusnya menurut teori yang ada.

E. Langkah V Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh

Tinjauan asuhan kebidanan pada bayi Ny “I” yang dilakukan di lahan praktik meliputi di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa selama 4 kali kunjungan mulai dari tanggal 21 s/d 24 September 2018 dan di Rumah klien di BTN Anak Gowa dengan 4 kali kunjungan pada tanggal 21 September s/d 18 Oktober 2018.

Pengkajian di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa meliputi menganjurkan ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI dan cara menyusui yang benar pemasangan selang Oral Gastric Tube (OGT), menimbang berat badan bayi setiap hari, dan mempertahankan suhu tubuh bayi dengan perawatan inkubator dan tetap terbungkus.

Kemudian mengobservasi tanda-tanda vital seperti suhu badan, pernapasan, dan frekuensi jantung, mengganti popok/pakaian bayi setiap kali basah, memberikan ASI perah dibantu susu formula dengan menggunakan spoit melalui OGT setiap 3 jam sebanyak 3 cc, perawatan tali pusat secara aseptik dan antiseptik.

Pengkajian di rumah klien meliputi memberikan penjelasan pada ibu tentang cara menyusui yang benar dan pentingnya pemberian ASI eksklusif yaitu bayi diberi ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan apapun kecuali obat dari dokter, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara on demand pada bayi, menganjurkan ibu memberi bayi MP ASI setelah 6 bulan, mengobservasi tanda-tanda vital, menimbang berat badan bayi setiap hari, menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah, mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, menganjurkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayi dengan membedong bayi, menganjurkan ibu untuk kontrol tumbuh kembang bayi dan imunisasi sesuai jadwal.

Berdasarkan tinjauan teoritis, asuhan yang diberikan pada bayi yang lahir prematur adalah tindakan umum dan khusus.

Adapun secara khusus yaitu inkubator. Cara pemakaian inkubator adalah pastikan inkubator berfungsi dengan baik, nyalakan alat sebelum di pakai agar matras, linen hangat dan atur suhu inkubator yang dikehendaki (dilakukan bertahap) sesuai umur dan berat bayi, lalu gunakan satu inkubator untuk satu bayi. Periksa suhu inkubator dengan termometer ruang, minimalkan membuka pintu inkubator, jaga lubang selalu tertutup agar suhu inkubator tetap hangat, lalu bersihkan inkubator dengan desinfektan dan ganti air reservoir setiap hari (Sudarti & Afroh, F, 2013:14-15).

Secara umum yaitu mempertahankan suhu tubuh dengan ketat karena bayi lahir prematur mudah mengalami hipotermi, maka itu suhu tubuhnya harus di pertahankan dengan ketat, mencegah infeksi dengan ketat karena bayi yang lahir prematur sangat rentan akan infeksi. Adapun prinsip – prinsip pencegahan infeksi adalah termasuk cuci tangan sebelum memegang bayi, pengawasan nutrisi (ASI) refleks menelan bayi baru lahir prematur belum sempurna dan sangat lemah, sehingga pemberian nutrisi harus di lakukan dengan cermat. Sebagai langkah awal jika bayi lahir prematur bisa menelan adalah tetesi ASI dan jika bayi lahir prematur belum bisa menelan segera rujuk (rujuk ke rumah sakit jika bayi prematur di tangani di Puskesmas) (Sudarti & Afroh, F, 2013:6).

Penimbangan ketat, perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi / nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu

penimbangan berat badan harus di lakukan dengan ketat. Kebutuhan cairan untuk bayi baru lahir adalah 120 – 150 ml/ kg/hari atau 100 – 120 ml/kg/hari. Pemberian di lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan bayi untuk segera mungkin mencukupi kebutuhan cairan/kalori. Selain itu kapasitas lambung bayi lahir prematur sangat kecil sehingga minum harus sering di berikan tiap jam. Perhatikan apakah selama pemberian minum bayi menjadi cepat lelah, menjadi biru atau perut membesar (kembung) (Amiruddin, R, & Hasmi, 2014:142-143).

Konsep dasar dan asuhan kebidanan pada bayi Ny “I” berdasarkan dengan intervensi yang dilakukan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara apa yang ada dalam konsep dasar dengan yang dilakukan dilahan praktik.

F. Langkah VI Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Tahap asuhan kebidanan pada bayi Ny “I” dalam pelaksanaan tindakannya didasarkan atas perencanaan yang telah ditetapkan. Penulis tidak menemukan permasalahan yang berarti, hal itu dikarenakan tindakan yang dilaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada dalam rencana disamping adanya kerjasama yang baik dengan petugas kesehatan, ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara konsep dasar dan studi kasus bayi Ny “I”.

G. Langkah VII Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan dalam asuhan kebidanan yang penting guna mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akanbantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana setelah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Evaluasi, berdasarkan dilahan praktik meliputi selama 4 kali kunjungan dirumah sakit pada tanggal 21 s/d 24 September 2018 dan 4 kali kunjungan dirumah klien yaitu mulai tanggal 21 September s/d 18 Oktober 2018, pada asuhan kebidanan bayi Ny “T” yang telah dilakukan untuk bayi lahir prematur diperoleh hasil, yaitu:


Selama asuhan 4 hari di RSUD Syekh Yusuf Gowa, kebutuhan bayi akan nutrisi belum terpenuhi karena terjadinya gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi sebab organ-organ pada bayi yang belum cukup bulan belum matang seperti organ pencernaan belum terbentuk sempurna dan refleks menghisap dan menelan masih lemah.

Selama 4 hari berat badan bayi mengalami kenaikan, keadaan umum bayi baik, refleks mengisap dan menelan sudah lumayan baik serta produksi ASI lancar dan ibu meninggalkan rumah sakit karena pertimbangan ekonomi. Potensi terjadinya hipotermi, hipoglikemia dan infeksi tidak terjadi karena perawatan bayi baik dan tepat.

Pemantauan berat badan di rumah dilakukan 4 kali, kunjungan pertama berat badan bayi sudah naik yaitu 2300 gram di umur 14 hari dengan refleks menghisap dan menelan baik. Kunjungan kedua berat badan 2350 gram di umur 23 hari dan kunjungan ketiga berat badan 2400 gram, kunjungan ke empat berat badan naik 2515 gram di umur 30 hari, berarti ibu mampu merawat bayinya dengan baik selama di rumah karena dibuktikan berat badan bayi naik setiap kali kunjungan dan faktor umur bayi yang juga menandakan organ-organnya sudah

terbentuk sempurna dan telah berfungsi sesuai fungsinya seperti organ pencernaan telah terbentuk sempurna dan berfungsi dengan baik dan dapat menampung banyak yang diminum bayi. Selama 4 kali kunjungan rumah mulai dari berat badan 2300smpai 2515 gram, berat badan bayi naik 215 gram.

Dari hasil evaluasi melalui tinjauan teoritis dengan asuhan kebidanan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara tinjauan teoritis dengan studi kasus bayi Ny “T” tetapi masih perlu adanya perhatian dalam memberikan asuhan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari tinjauan teoritis dan pengalaman langsung lahan praktik melalui studi kasus serta membandingkan antara tinjauan teoritis dan praktek tentang kasus Bayi Lahir Prematur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuhan kebidanan pada bayi Ny “I” dengan bayi lahir prematur dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dengan pengumpulan data sbjektif dan data objektif yang diperoleh dari hasil wawancara mulai dari anamnesa riwayat kesehatan sekarang, pemeriksaan lab, laporan singkat, dan keterangan tambahan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan pasien.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa / masalah aktual pada bayi Ny “I” di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan Bayi Lahir Prematur dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya. Maka diagnosis yaitu neonatus kurang bulan-kecil masa kehamilan (NKB-KMK).
3. Diagnosa / masalah potensial yang ditegakkan pada bayi Ny “I” dengan bayi lahir prematur umur 0 hari sangat rentan terjadi hipotermi, hipoglikemia, dan hiperbilirubinemia.

4. Tindakan segera (Emergency) /Kolaborasi yang dilaksanakan pada bayi Ny “I” dengan bayi lahir prematur umur 0 hari maka diperlukan tindakan segera, tetapi tidak di temukan adanya indikasi untuk dilakukannya kolaborasi dengan tingkat kesehatan yang lebih tinggi.
5. Intervensi/rencana asuhan kebidanan pada kasus bayi Ny “I” dengan bayi lahir prematur direncanakan seluruh kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani bayi lahir prematur serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, termasuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya komplikasi dan merencanakan penanganan segera.
6. Penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan pada kasus bayi “I” dengan bayi lahir prematur diagnosis NKB/KMK/ masa gestasi 34 minggu 2 hari umur 0 hari dengan pemenuhan nutrisi dan potensial terjadi hipotermi, hipoglikemia, dan hiperbilirubinemia maka penanganan yang dilakukan yaitu dengan pemberian nutrisi yang adekuat, mencegah terjadinya hipotermi, hipoglikemia dan hiperbilirubinemia.
7. Tindakan evaluasi pada bayi Ny “I” dengan bayi lahir prematur telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/ rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi rumah sakit

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya pada bayi lahir prematur.

2. Bagi pendidikan

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengambil kasus yang sama.

3. Bagi profesi

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan bayi lahir prematur secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quaran dan Terjemahannya, Jakarta : Kementrian Agama RI. 2016
- Aminah&Wahyu Sri Maesyaroh “Hubungan Bayi Prematur dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum”, Jurnal Obstetrika Scientia Vol.4 No.2
- Amiruddin, R& Hasmi. Determinan kesehatan ibu dan anak. Jakarta: TIM. 2014
- Etika,dkk: “Pengaruh Terapi Musik Lullaby Terhadap Hearth Rate, Respiration Rate, Saturasi Oksigen pada Bayi Prematur”, JKP- Volume 5 Nomor 3 Desember 2017
- Hikmah,dkk:// Peningkatan Suhu Bayi Prematur Melalui Terapi Sentuhan”, jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 14, Nomor 3, November 2011.
- Indrayani, Moudy Emma, 2013, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir,Jakarta:CV. Trans Info Media
- Kusumawati, Irma. *Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny’S’ Dengan Prematur Di Ruang KBRT RSUD Dr. Moewandi.*2013. Surakarta
- Mariam erma: “Hubungan Prematuritas dengan Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir Di RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro 2016”, Jurnal kesehatan” Akbid Wira Buana”, Vol.2, No.1, 2017
- Marni & Kukuh,R. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah.*Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015
- Maryunani Anik, Eka Puspita. *Asuhan Kegawardaruratan Maternal dan Neonatal.* 2013. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Meihartati, Tuti “*Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian Persalinan Prematur di Ruang Bersalin Rumah Sakit Ibu dan Anak Paradise Tahun 2015*”, Jurnal Darul Azhar Vol 2, No.1 2017
- Ningsih Fitria Neneng “*Pengaruh Terapi Sentuhan Tehadap Suhu Tubuh pada Bayi Prematur*”, Jurnal Ners Universitas Pahlawan Tuanku Tumbasai” Vol.1, No.1, April 2017
- Prawihardjo,Sarwono. Ilmu Kebidanan, Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo,2014.

Profil kesehatan prov. Sulsel tahun 2016

Purwoastuti,E & Elisabeth, SW. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Rachmawati,dkk: “*Hubungan Bayi Lahir Prematur dengan Infeksi Neonatorum di RSUD DR. Moewardi Surakarta*”, Jurnal KesMaDaSka-juli 2017

Risqiani fani dan yuliana lia: “Faktor yang Mempengaruhi Kematian Bayi Prematur di Indonesia”, *jurnal Ilmiah WIDYA kesehatan dan Lingkungan* Vol.1 No.2 November 2017

Saleha, S. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita*. Makassar: Alauddin University Press. 2012

Shihab, MQ. *Tafsir al-mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Vol.4*. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Shihab, MQ. *Tafsir al-mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Vol.8*. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Sudarti & Afroh, F. *Asuhan Neonatus Risiko Tinggi dan Kegawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.

USCF. *Preterm Birth Is Now Leading Cause Death in Young Children Globally 2014*. University Of California, San Fransisco.

Texas Children’s Hospital, buku pediatri dan neonatologi, 2014, ECG, penulisnya Adam W, Lowry.Kushal Y. Bhakta. Pratip K. Nag

IDENTITAS PENULIS



A. Identitas Peneliti

Nama : Eka Riskawati
 Nim : 70400115027
 Tempat, tanggal lahir : Tukade, 06 April 1997
 Suku : Konjo
 Asal Daerah : Bulukumba
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Bonto Bulaeng, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba,
 Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Riwayat Pendidikan

TK Minasa Te'ne : 2002 - 2003
 SDN 145 Tuju : 2203 - 2009
 SMPN 30 Bulukumba : 2009 - 2012
 SMAN 4 Bulukumba : 2012 - 2015
 UIN Alauddin Makassar : 2015 - 2018