

**FORMULASI GEL ANTI ACNE EKSTRAK BUAH TOMAT
(*Solanum lycopersicum* L) DAN UJI ANTIBAKTERI
TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :


ANSIR MUSTAWA

NIM 70 100 107 087

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2011

Penulis,

Ansir Mustawa
NIM. 70100107066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi Gel Anti Acne Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*) dan Aktivitasnya Terhadap Bakteri Penyebab jerawat” yang disusun oleh Ansir Mustawa, NIM: 70100107087, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 18 Agustus 2011 M
18 Ramadhan 1432 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Sekretaris Penguji	: Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt.	(.....)
Penguji II	: DR. H. Lomba Sultan, M.A	(.....)

Diketahui oleh:
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H.Ahmad M.Sewang, M.A
Nip. 19520811 198203 1001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas atas nikmat akal yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir manusia dari *jahiliyyah* menuju *Qur' aniyah* dan *Wahyuniyyah*.

Penulis menyadari bahwa banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu bersifat teknis maupun non teknis. Namun berkat do'a, motivasi dan kontribusi berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan terkendali dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Orang tua tercinta, Ayahanda M. Syarif dan Ibunda Hj. Junaedah yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus sehingga memperlancar penyelesaian skripsi ini dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri M.Si. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Drs. Supardin, M.HI. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang penuh kasih sayang, sabar, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai bantuan baik secara fisik maupun moril selama penelitian hingga penyusunan akhir skripsi ini.
5. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si, Apt. selaku pembimbing kedua serta sebagai Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang penuh kasih sayang, sabar, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai bantuan baik secara fisik maupun moril selama penelitian hingga penyusunan akhir skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt selaku Kepala Laboratorium Terpadu Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta sebagai penguji kompetensi dan yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak DR. H. Lomba Sultan, M.A selaku penguji agama yang memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Haeria, S.Si. selaku koordinator seminar yang memberikan kemudahan dalam mengurus berkas-berkas seminar serta Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan

kepada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

9. Bapak Rusli, S.Si., M.Si., Apt selaku Dosen Farmasi atas segala curahan ilmu pengetahuan dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyempurnaan skripsi penulis.
10. Para Laboran Laboratorium Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah sabar dalam mendukung penelitian ini. Serta teman seperjuangan angkatan 2007 dan rekan mahasiswa farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin pada umumnya yang telah dan akan terus memberikan semangat serta bantuan baik berupa materi maupun dukungan mental selama penyelesaian skripsi ini.

Makassar, Agustus 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penulis,
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ansir Mustawa
NIM: 701010787

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAS ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRACK.....	x
ABTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	4
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. <i>Uraian Tentang Tanaman</i>	6
a. <i>Klasifikasi tanaman</i>	6
b. <i>Deskripsi tanaman</i>	6
c. <i>Kandungan kimia</i>	7
B. <i>Jerawat</i>	7
C. <i>Kulit</i>	8
a. <i>Fungsi kulit secara umum</i>	8
b. <i>Anatomi fisiologi kulit</i>	10
c. <i>Absorbsi perkutan</i>	11
D. <i>Gel</i>	13
a. <i>Defenisi gel</i>	13
b. <i>Basis gel</i>	13

c. Uji stabilitas gel.....	15
E. <i>Uraian Basis</i>	18
F. <i>Uraian Bahan Tambahan</i>	19
G. <i>Antimikroba</i>	21
a. Mekanisme kerja antimikroba.....	21
b. Pengujian aktivitas mikroba.....	23
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroba.....	24
H. <i>Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. <i>Alat dan Bahan</i>	28
B. <i>Prosedur Kerja</i>	28
1. Penyiapan sampel.....	28
2. Sterilisasi alat.....	29
3. Uji daya hambat ekstrak Buah Tomat.....	30
4. Pembuatan sediaan gel.....	33
5. Pengujian aktivitas sediaan gel.....	34
6. Uji Stabilitas Sediaan gel ekstrak buah tomat.....	35
C. <i>Pengamatan dan Pengumpulan Data</i>	36
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	37
A. <i>Hasil Penelitian</i>	37
B. <i>Pembahasan</i>	40
BAB V KESIMPULAN	45
A. <i>Kesimpulan</i>	45
B. <i>Saran</i>	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Hasil daya hambat ekstrak buah tomat.....	37
2. Hasil pengamatan organoleptis.....	37
3. Hasil evaluasi kestabilan fisik sediaan gel.....	38
4. Hasil uji aktivitas antimikroba sediaan gel.....	40
5. Hasil uji aktivitas ekstrak buah tomat.....	53
6. Hasil pengukuran viskositas.....	54
7. Hasil analisis statistika viskositas gel dengan RAK.....	55
8. Hasil analisis variansi viskositas sediaan gel.....	56
9. Hasil uji BNJ viskositas sediaan gel.....	57
10. Hasil uji daya sebar gel.....	58
11. Hasil analisis statistika uji daya sebar sediaan gel RAK.....	59
12. Hasil analisis variansi daya sebar sediaan gel.....	60
13. Hasil uji BNJ daya sebar sediaan gel.....	61
14. Hasil pengukuran pH sediaan Gel.....	62
15. Pengujian sineresis.....	63
16. Hasil pengamatan uji aktivitas antimikroba sediaan gel.....	64
17. Hasil analisis statistik daya hambat sediaan gel.....	65
18. Hasil analisis variansi daya hambat sediaan gel.....	66
19. Hasil uji BNJ daya hambat sediaan gel.....	67

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Skema kerja ekstraksi buah tomat (<i>Solanum lycopersicum</i> L).....	49
2.	Uji Aktivitas Penghambatan Ekstrak Buah Tomat (<i>Solanum lycopersicum. L</i>).....	50
3.	Uji Stabilitas Gel Buah tomat (<i>Solanum lycopersicum</i>).....	51
4.	Uji Aktivitas Sediaan Gel Buah Tomat Terhadap Bakteri Penyebab jerawat	52
5.	Grafik daya sebar formula I konsentrasi basis 0,5%.....	68
6.	Grafik daya sebar formasi konsentrasi basis 1%.....	69
7.	Grafik daya sebar formasi konsentrasi 2%.....	70
8.	Grafik daya sebar formasi konsentrasi 2 % (Kontrol).....	71
9.	Gambar buah tomat (<i>Solanum lycopersicum</i>).....	72
10.	Uji organoleptis dan uji sineresis	72
11.	Uji daya hambat sediaan gel	74

ABSTRACT

Author Name : Ansir Mustawa
NIM : 70100107087
Thesis title : Anti Acne Formulation Fruit Extract of Tomato (*Solanum lycopersicum*) Test Aktivites Against Bacteria Causes Acne

Has been carried out anti-acne gel formulation extract of tomato fruit (*Solanum lycopersicum*) using karbopol base with test preparation and the stability of physical activity on the bacteria that cause acne. In tomatoes contain substances that are tomatin as anti-inflammatory and antibacterial so it can cure acne. Test the stability of gel is determined by observing changes in color, smell, shape, pH, viscosity, syneresis and gel dispersive power test before and after accelerated storage at a temperature of 5°C 35°C. pH testing is done by using a viscometer and proceed with testing the antimicrobial activity by difusi order. The results showed that the gel extract of tomato (*Solanum Lycopersicum*) is physically stable and testing of antimicrobial activity in bacteria that cause acne are very good.

ABSTRAK

Nama Penulis : Ansir Mustawa
NIM : 70100107087
Judul Skripsi : Formulasi Anti Acne Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*) dan Uji Aktivitasnya Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

Telah dilakukan formulasi sediaan gel anti acne dari ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan menggunakan basis karbopol dengan uji stabilitas fisik sediaan serta uji aktivitas pada bakteri penyebab jerawat. Dalam tomat mengandung zat tomatin yang bersifat sebagai antiinflamasi serta antibakteri sehingga dapat menyembuhkan jerawat. Uji stabilitas sediaan gel ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap perubahan warna, bau, bentuk, pH, viskositas dan sineresis serta uji daya sebar gel sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat pada suhu 5⁰C dan 35⁰C. pengujian pH dilakukan dengan menggunakan viscometer serta dilanjutkan dengan pengujian aktivitas antimikroba dengan cara diifusi agar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan gel ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) stabil secara fisik dan uji aktivitas antimikroba pada bakteri penyebab jerawat sangat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus dan kista pada permukaan luarnya yaitu muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas dan lengan bagian atas. Bentuknya seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama wajah terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepala kuning, berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri (Galuh P.Y.R, 2009). Pada sebuah penelitian menyatakan bahwa jerawat terjadi karena penyumbatan pada pilosebaceus dan peradangan yang umumnya dipicu oleh bakteri *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Staphylococcus aureus* (Ardina, 2007).

Salah satu tanaman atau buah yang berfungsi sebagai anti jerawat adalah Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*, L). Buah tomat memiliki kandungan kimia seperti alkaloid solanin (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, riboflavanoid, vitamin antara lain vitamin C, vitamin A dan B1, serta mengandung karotenoid dan zat tomatin sebagai antiinflamasi atau anti radang dan antibakteri. (Titien, 2009). Penggunaan buah tomat sebagai obat jerawat di masyarakat belum maksimal, karena penggunaannya yang kurang praktis jika harus disiapkan dan dioleskan langsung dengan buah tomat. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu

formula yang dapat memudahkan penggunaannya seperti sediaan gel. Selain itu gel mempunyai sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan.

Beberapa bentuk sediaan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit seperti salep, krim lotio, larutan topikal dan tinktur menggambarkan bentuk sediaan dermatologi yang paling sering dipakai. Preparat yang digunakan pada kulit antara lain untuk efek fisik yaitu kemampuan bekerja sebagai pelindung kulit, pelembut, pelembab dan lain-lain, atau untuk efek khusus dari bahan obat yang ada. Preparat bebas, sering mengandung campuran dari bahan obat yang digunakan dalam pengobatan kondisi tertentu seperti infeksi kulit, gatal-gatal, luka bakar, sengatan dan gigitan serangga, kutu air, mata ikan, penebalan kulit dan keras, kutil, ketombe, jerawat, penyakit kulit kronis dan eksim (Ansel, 1989).

Bentuk sediaan gel lebih mudah digunakan dan penyebarannya di kulit juga mudah, dilihat juga dari warna yang bening, sehingga banyak pasien yang lebih memilih menggunakan produk kosmetik dalam bentuk gel dibandingkan sediaan lainnya. Zat aktif dalam sediaan gel masuk ke dalam basis atau pembawa yang akan membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit. Bentuk gel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya tidak lengket, gel mempunyai aliran tiksotropik dan pseudoplastik yaitu gel berbentuk padat apabila disimpan dan akan segera mencair bila dikocok, konsentrasi bahan pembentuk gel yang dibutuhkan hanya sedikit untuk membentuk massa gel yang baik, viskositas gel tidak mengalami perubahan yang berarti pada suhu penyimpanan. Bahan pembawa yang

digunakan untuk sediaan topical akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap absorpsi obat dan memiliki efek yang menguntungkan jika dipilih secara tepat (Lieberman, 1989).

Secara ideal, basis (pembawa) harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit. Basis yang sering digunakan dalam sediaan gel adalah NaCMC, karbopol, HPMC, dan lain-lain. Basis ini apabila menghasilkan gel yang bening dan mudah larut dengan air.

Beberapa penelitian sebelumnya telah ada yg menggunakan basis karbopol seperti penelitian Putri Galuh Y.R. (2009) dengan konsentrasi 0,5% dan Rahman, H., (2010) dengan konsentrasi 2%. Basis karbopol termasuk dalam kelompok basis yang hidrofilik yaitu daya sebarinya pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya respirasio sensibilis oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Ansel, 1989).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang “Formulasi Sediaan Gel Obat Jerawat Dari Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*) dan Uji Antibakteri Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ekstrak buah tomat dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel dengan basis Karbopol?
2. Pada konsentrasi berapa karbopol menghasilkan sediaan gel dengan stabilitas fisik yang baik?
3. Apakah gel yang dihasilkan dari ekstrak buah tomat efektif terhadap bakteri penyebab jerawat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan konsentrasi basis pembentuk gel yang baik untuk sediaan gel anti jerawat ekstrak buah tomat
2. Untuk mendapatkan suatu sediaan gel anti jerawat yang efektif terhadap bakteri penyebab jerawat.



D. Manfaat penelitian

1. Pemanfaatan buah tomat (*Solanum lycopersicum L*) sebagai obat jerawat yang memiliki stabilitas fisik yang baik yang diharapkan dapat menjadi alternatif obat kulit, khususnya terhadap infeksi-infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri penyebab jerawat.
2. Dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan herbal, terutama meminimalisir efek samping yang dapat memicu timbulnya penyakit baru yang serius dibanding penyakit yang akan diobati itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Tanaman

a. Klasifikasi tanaman (Titin Yuniarti, 2008)

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buah Tomat

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Sub Kelas : Sympetalae

Ordo : Solanales

Famili : Solanaceae

Genus : Solanum

Spesies : *Solanum lycopersicum L.*

b. Deskripsi tanaman

Tomat termasuk tanaman perdu semusim, batangnya masif, berbulu, dan berbuku-buku. Bunganya keluar dari ketiak daun, berwarna putih. Buahnya ketika muda berwarna hijau, lantas menjadi merah setelah beranjak tua. Guna mengusir jerawat, coba pilih buah tomat yang sudah masak. Kemudian potong rata-rata, dan setelah itu langsung dipakai untuk menggosok wajah berjerawat. Jika Anda tekun membiasakan diri memakai

buah tomat, wajah Anda pun dijamin bakal kembali berseri-seri, bebas dari jerawat.

c. Kandungan kimia

Buah tomat memiliki kandungan kimia alkaloid solanin (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, riboflavanoid, vitamin antara lain vitamin C, vitamin A dan B1, serta mengandung karotenoid dan zat tomatin sebagai antiinflamasi atau anti radang dan antibakteri.

B. Jerawat

Jerawat adalah penyakit kulit akibat peradangan menahun dari folikel polisebasea yang ditandai dengan adanya erupsi komedo, papul, pustule, nodus dan kista. Adanya bahan comedogenik dalam beberapa kosmetik mungkin ada hubungannya dengan timbulnya jerawat tingkat ringan pada wanita umur 20-40 tahun. Jasad renik yang sering berperan dalam pembentukan jerawat adalah *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus epidermis* atau *Pityrosporum ovale*, *staphylococcus aureus* dan *P. orbiculare*. Kadang-kadang akne menyebabkan rasa gatal yang mengganggu atau rasa sakit kecuali bila terjadi pustule atau nodus yang besar (Wasita atmadja,1997). Jika dibiarkan saja kebanyakan jerawat yang meradang bisa hilang berangsur-angsur pada usia awal dua puluh tahun pada pria, sedang pada wanita terjadi lebih lambat. Isi komedo adalah sebum yang kental dan padat. Isi kista biasanya pus darah. Isi papul adalah masa yang padat dan pustule berisi pus (Corwin, 2000).

C. Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, selain peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan infeksi dari luar. Kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007).

a. Fungsi kulit secara umum (Galuh, 2009) :

1). Fungsi proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

2). Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu pun yang larut lemak.

3). Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia.

4). Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

5). Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.


6). Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf.

7). Fungsi keratinisasi

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, sel langerhans dan melanosit.

b. Anatomi fisiologi kulit.



Gambar 1. Struktur Kulit (Galuh, 2009)

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan yaitu:

1). Lapisan epidermis atau kutikula (Tranggono, 2007) :

Bagian-bagian epidermis dapat dilihat dengan mikroskop yaitu terdiri dari:

- a) Stratum korneum (Lapisan tanduk), selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus dilepaskan.
- b) Stratum lucidum (Lapisan jernih), selnya mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya.
- c) Stratum granulosum (Lapisan berbutir-butir), selapis sel yang jelas tampak berisi inti dan juga granulosum.
- d) Stratum spinosum (Lapisan malphigi), yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel yang satu dengan yang lainnya di dalam lapisan ini, sehingga setiap sel seakan-akan berduri.

e) Stratum germinativum (Lapisan basal), yaitu sel yang terus menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur, berderet dengan rapat dan membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang duduk di atas papiladermis.

2). Lapisan dermis.

Korium atau dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastik. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi ranting-ranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir syaraf sensorik yaitu puting peraba yang terletak di dalam dermis.

3). Lapisan subkutis

Lapisan subkutis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh trabekula fibrosa.

c. Absorpsi perkutan

Kulit karena impermeabilitasnya dapat dilewati oleh sejumlah senyawa kimia dalam jumlah sedikit. Bila suatu sistem obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan kulit. Obat dapat berdifusi ke jaringan kulit melalui daerah kantung rambut, melalui kelenjar keringat atau di antara kelenjar keringat dan kantung rambut.

Ada 4 jenis kulit wajah, yakni kulit kering, berminyak, normal dan kombinasi:

a. Kulit kering

Pada jenis kulit kering, kelenjar sebacea dan keringat hanya dalam jumlah sedikit. Jenis kulit kering mempunyai ciri-ciri penampakan kulit terlihat kusam.

b. Kulit berminyak

Pada jenis kulit berminyak, kelenjar sebacea dan keringat terdapat dalam jumlah banyak. Jenis kulit berminyak mempunyai ciri kulit wajah mudah berjerawat.

c. kulit normal

Pada jenis kulit normal, jumlah sebacea dan keringat tidak terlalu banyak karena tersebar secara merata. Ciri jenis kulit normal : kulit tampak lembut, cerah dan jarang mengalami masalah.

d. kulit kombinasi.

Pada jenis kulit kombinasi, penyebaran kelenjar sebacea dan keringat tidak merata. Jenis kulit kombinasi mempunyai ciri kulit dahi, hidung dan dagu tampak mengkilap, berjerawat, tetapi kulit dibagian pipi tampak lembut (Tranggono, 2007)

D. Gel

a. Defenisi Gel

Gel merupakan suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu disperse yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau organik yang besar dan saling diserap cairan (Ansel, 1989).

Idealnya pemilihan gelling agent dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan gelling agent dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topical. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka terhadap derajat microbial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya microbial (Libierman, 1996).

b. Basis Gel

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan gel hidrofilik (Ansel, 1989).

1. Basis gel hidrofobik

Basis hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus (Ansel, 1989).

Basis gel hidrofobik antara lain petrolatum, *mineral oil*/gel polyethilen, plastibase, alumunium stearat, carbowax.

2. Basis Gel hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 1989). Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voigt, 1995).

Gel dapat membengkak, absorbs cairan dalam suatu peningkatan volume. Ini dapat dilihat sebagai tahap awal disolusi. Solvent berpenetrasi ke dalam matrik gel dengan demikian interaksi gel dengan bahan pelarut (Lierberman, 1996).

Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilen glikol dan propilen glikol dalam konsentrasi 10-20% (Voigt, 1995).

Disebabkan oleh tingginya kandungan air, sediaan ini dapat mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan bahan pengawet. Untuk upaya stabilisasi dari segi mikrobial disamping penggunaan bahan-bahan pengawet seperti dalam balsam, khususnya untuk basis ini sangat cocok pemakaian metil dan propil paraben yang umumnya disatukan dalam bentuk larutan pengawet. Upaya lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap penguapan, untuk menghindari mengeringnya. Oleh karena itu untuk menyimpannya lebih baik menggunakan *tube*. Pengisian ke dalam botol, meskipun telah tertutup baik tetap tidak menjamin perlindungan yang memuaskan (Voigt, 1995).

Keuntungan gel hidrofilik antara lain : daya sebarinya pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya respirasio sensibilis oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Ansel, 1989).

c. Uji stabilitas fisik gel

Uji stabilitas dimaksudkan untuk menjamin kualitas produk yang akan diluluskan dan beredar spasaran. Dengan uji stabilitas dapat diketahui pengaruh factor lingkungan seperti suhu dan kelembaban terhadap parameter-parameter stabilitas produk seperti kadar zat aktif, pH, berat jenis

dan net volume, sehingga dapat ditetap[kan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya berdasarkan durasinya.

Uji stabilitas dibagi 2 yaitu:

a. Uji stabilitas jangka pendek (dipercepat)

Uji stabilitas jangka pendek dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim $40^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$. Interval pengujian dilakukan pada bulan ke tiga dan keenam .

b. Uji stabilitas jangka panjang

Uji stabilitas jangka panjang dilakukan sampai pada waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan.

Pengujian dilakukan setiap 3 bulan sekali, pada tahun kedua, pada tahun ketiga dan seterusnya, pengujian dilakukan setahun sekali.

Untuk uji stabilitas jangka panjang, sampel disimpan pada kondisi: ruangan dengan suhu $30^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$ untuk menyimpan produk-prroduk dan iklim penyimpanan pada suhu sejuk ruangan untuk uji stabilitas dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

- 1) Suhu ruangan $40^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$
- 2) Suhu ruangan $30^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$
- 3) Suhu ruangan $20^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 40\% \pm 5\%$
- 4) Suhu ruangan $40^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } \leq 35\%$

c. Kondisi penyimpanan yang dipercepat

Salah satu cara mempercepat evaluasi kestabilan adalah dengan penyimpanan selama beberapa periode waktu pada suhu yang lebih tinggi dari normal (Gennaro, AR., 1990).

Di dalam laboratorium siklus suhu 5°C dan 40°C dalam 24 jam digunakan selama 24 siklus, sedangkan siklus lainnya 5°C dan 35°C dalam 12 jam digunakan selama 20 siklus (Banker GS. Rodes CT., 1979).

Pengujian stabilitas fisik gel meliputi:

a. Viskositas

Pengujian viskositas ini dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana viskositas tersebut menyatakan besar tahanan suatu viskositas untuk mengalir, semakin tinggi viskositas maka semakin besar pula tahanannya. (Martin, 1971).

b. Pengukuran pH

Pengukuran pH digunakan untuk mengetahui pH gel apakah sesuai dengan pH kulit yaitu antara 5- 6,5.

c. Uji sineresis

Sineresis adalah keluarnya air atau merembesnya cairan dari dalam sediaan dimana air tidak terikat kuat oleh komponen, bahan yang ada (Winarno, 1997). Semakin tinggi tingkat sineresis maka semakin cepat lunak tekstur sediaan tersebut. Pada fenomena ini, jika suatu gel didiamkan selama

beberapa saat, maka gel tersebut sering kali akan mnegeruk secara alamiah dan cairan pembawa dalam matriks akan keluar atau lepas dari matriks.

E. Uraian Basis

Uraian basis yang digunakan untuk membuat sediaan gel buah tomat (*Solanum lypersicum, L*), adalah Carbomer 940 nama lain carbomer adalah *acritamer*, acrylic acid polymer, *carbopol*, carboxyvinyl polimer. Carbomer digunakan sebagian besar di dalam cairan atau sediaan formulasi semisolid berkenaan dengan farmasi sebagai agen pensuspensi atau agen penambah kekentalan.

Digunakan pada formulasi krim, gel dan salep, dan kemungkinan digunakan dalam sediaan obat mata dan sediaan topikal lain. Carbomer berwarna putih, serbuk halus, bersifat asam, higroskopik, dengan sedikit karakteristik bau. Carbomer dapat larut di dalam air, di dalam etanol (95%) dan gliserin, dapat terdispersi di dalam air untuk membentuk larutan koloidal bersifat asam, sifat merekatnya rendah. Carbomers bersifat stabil, higroskopik, penambahan temperature berlebih dapat mengakibatkan kekentalan menurun sehingga mengurangi stabilitas.

Carbomer 940 NF mempunyai viskositas antara 40.000 – 60.000 (cP) digunakan sebagai bahan pengental yang baik, viscositasnya tinggi, menghasilkan gel yang bening(Lachman *et al.*, 1989). Karbopol digunakan untuk emulsifying

agent pada konsentrasi 0,1-0,5%; gelling agent pada konsentrasi 0,5-2,0%; suspending agent pada konsentrasi 0,5-1,0% dan tablet binder pada konsentrasi 5-10%. Fungsinya adalah : sebagai bahan pembawa gel (Kibbe, 2000).

F. Uraian Bahan Tambahan

a. Gliserin (Gennaro, 1990 & Kibbe, 2000)

Rumus struktur gliserol adalah $C_3H_8O_3$ dan berat molekulnya 92,10. Pemerian cairan seperti seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat, higroskopik jika disimpan beberapa lama pada suhu rendah dapat memadat membentuk massa hablur tidak berwarna yang dapat melebur hingga suhu mencapai kurang lebih $20^{\circ}C$. Konsentrasi gliserin sebagai humektan dan emulient 30 % serta antimikroba > 20 %. Kelarutan dapat campur dengan air dan dengan etanol (95%)P, praktis tidak larut dalam kloroform p, dalam eter p dan dalam minyak lemak.

Gliserin digunakan dalam oral, optalmik, topical, dan parenteral. Juga digunakan dalam kosmetik dan tambahan makanan. Pada sediaan farmasi berfungsi sebagai humectants serta sebagai pelembut pada sediaan obat kulit serta menjaga kelembaban kulit dalam periode waktu tertentu. Fungsinya adalah sebagai humectant, antimikroba.

b. Trietanolamin (TEA) (Kibbe, 2000 & FI IV, 1995)

Trietanolamina adalah campuran dari trietanolamina, dietanolamina dan monoetanolamina. Rumus molekulnya $\text{CCO,CH}_2\text{CH}_3$ dan berat molekulnya 149,1. Mengandung tidak kurang dari 99,0 % dan tidak lebih dari 107,4 % dihitung terhadap zat anhidrat sebagai trietanolamina. $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$. Pemerian cairan kental; tidak berwarna hingga kuning pucat; bau lemah mirip amoniak; higroskopik. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam *etanol* (95%) P; larut dalam *kloroform*. Incompabilitasnya adalah TEA akan bereaksi dengan asam untuk TEA bereaksi dengan tembaga untuk membentuk garam.

Konsentrasi yang digunakan sebagai pengemulsi 2-4% trietanolamin dan 2-5 kali pada asam lemak. Fungsinya : zat tambahan dan membantu stabilitas gel dengan basis karbopol.

c. Metil paraben (Kibbe, 2000)

Metil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0% $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$. Rumus meolekulnya : $\text{C}_8 \text{H}_{18} \text{O}_3$ dan berat meolekulnya : 76,09. Pemerian serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton p, mudah larut dalam eter p dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol p panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih.

Range metil paraben sebagai pengawet antiseptic dan sediaan farmasi lainnya adalah 0,02-0,3%. Metil paraben disimpan dalam wadah , larutan berair pada pH 3-6, dapat disterilkan pada 120 ° C selama 20 menit mengubah posisinya. Fungsinya adalah preservatif dan zat pengawet.

G. Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotic, antiseptic, desinfektan, dan preservative.

Obat-obat yang digunakan untuk membasi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes. (Djide M.N. Sartini, 2005)

a. Mekanisme kerja Antimikroba

1. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, karbanilida, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa ammonium kuarternier.

2. Denaturasi protein

Turunan alcohol, halogen, dan halogenator, senyawa merkuri, per-oksida, turunan fenol dan senyawa ammonium kuarterner bekerja sebagai antiseptika dan desinfekstan dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri.

3. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri.

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang essensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

4. Interkalasi ke dalam DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesa DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

5. Pembentukan khelat

Beberapa turunan fenol, seperti heksokloroform dan oksikuinolin dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganismenya mengalami kematian. (Djide, 2005).

b. Pengujian aktifitas Antimikroba (Djide, 2005)

Dikenal beberapa cara pemeriksaan dan pengujian secara mikrobiologi terhadap kemampuan antimikroba dari bahan-bahan kemoterapeutika seperti antibiotik. Walaupun pada umumnya pengujian dilakukan terhadap kebanyakan antibiotik, namun ada juga bahan-bahan lain yang diduga mempunyai daya hambat mikroba.

Secara umum dilakukan dengan cara:

1. Metode Difusi (Penyerapan)

Pada metode ini kemampuan antimikroba ditentukan berdasarkan hambatan yang terjadi. Beberapa modifikasi metode ini adalah :

a. Cara Difusi dengan Lempeng Silinder

Cara ini berdasarkan difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan petri atau lempeng, sehingga mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran atau zona disekeliling silinder yang berisi antibiotik.

b. Cara difusi dengan kertas saring atau Kirby-Bauer

Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya berbentuk bulat dengan diameter 0,7-1,0 cm, yang akan dicelup pada larutan sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut di keringkan dan diletakkan diatas media agar

yang telah ditanam mikroba uji. Setelah diinkubasi akan terlihat daerah hambatan yang terbentuk.

2. Metode Dilusi

Pada metode ini yang biasa disebutkan dengan turbidimetri atau tabung, menggunakan pengenceran secara seri dari antimikroba dalam media broth dengan konsentrasi yang ebrbeda-beda, kemudian ditanami dengan mikroba uji pada konsentrasi tertentu.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba yaitu:

1. pH Lingkungan
2. Komponen-komponen perbenihan
3. Stabilitas obat
4. Besarnya inokulum bakteri
5. Masa pengeraman
6. Aktivitas metabolik mikroorganisme (Jawetz, 1996)

H. Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga di hamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan Allah menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka.

Pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang ada sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah swt. Hingga saat ini banyak pengobatan herbal dan mencari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan.

Firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2) : 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُسِيْبٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Allah swt memerintahkan untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi yang baik, dan tidak berefek negatif bagi kehidupan manusia. Dalam pemanfaatannya manusia jangan sampai mengikuti langkah syaitan yang sering memutar balik pemanfaatan apa yang diciptakan oleh Allah swt.

Dalam suatu pribahasa yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak akan memberikan suatu cobaan kepada hamba jika cobaan itu tidak bisa diselesaikan, begitu juga dengan penyakit yang diberikan oleh-Nya diturunkan bersama dengan obatnya. Obat itu menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hambanya yang beriman maupun yang kafir.

Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits Abu Hurairah Ra.:

أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ (رواه البخاري)

Artinya:

Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obat (H.R. Al-Bukhari).

Setiap ciptaan Allah itu pasti ada penawarnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh (As-Suyuthy, 1997).

Salah satu ilmu itu adalah mengenai ilmu tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mengandung banyak vitamin dan mineral serta unsur-unsur penyusun alamiah yang merupakan bahan kimia alamiah ciptaannya dan memungkinkan bagi tubuh untuk memanfaatkannya kembali. Unsur-unsur yang terkandung dalam tumbuhan sangat banyak dan kompleks seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Pengaruh tumbuhan sangat selektif, karena mengandung zat-zat penting bagi pertumbuhan manusia (As-Sayyid, 2006).

Sebagaimana pada Firman Allah SWT pada surat Q.S.*An-Nahl* (16) :11

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan atau buah-buahan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya adalah sebagai sampel penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

Salah satu tanaman yang relevan dengan penelitian ini adalah buah tomat (*Solanum lycopersicum L.*). Tanaman ini merupakan tanaman buah yang biasa digunakan sebagai campuran bumbu makanan oleh manusia, karena banyak mengandung berbagai zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Ternyata setelah diteliti, ternyata buah tomat ini dapat dimanfaatkan kembali dalam dunia pengobatan salah satunya sebagai obat jerawat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat gelas, blender, bejana maserasi, penangas air, timbangan analitik(Presica), cawan petri, erlenmeyer(Iwaki Pyrex), tabung reaksi(Iwaki Pyrex), ose bulat, ose lurus, autokaf(Memmert), oven(Memmert), inkubator(Memmert), Viskometer(Brookfield), laminar Air Flow(LAF), lampu spiritus, disk blank, gelas kimia(Iwaki Pyrex) dan pinset.

2. Bahan

Buah Tomat, Glukosa Nutrient Agar (GNA), Nutrient Agar (NA), etanol 96%, karbopol, metil paraben, air suling, gliserin, TEA dan bakteri jerawat dari probandus.

B. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel Buah Tomat diperoleh di kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada saat buah matang, sehat dan tidak berjamur dari tanaman tomat (*Solanum lycopersicum. L*).

b. Pengolahan sampel

Buat Tomat yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir dan kemudian dipotong-potong kecil dan dihaluskan dengan blender.

c. Ekstraksi

Sari/jus tomat dimasukkan dalam wadah maserasi, Kemudian ditambahkan etanol 96% hingga sampel terendam. Kemudian ditutup dan disimpan selama 24 jam ditempat gelap yang terlindung cahaya sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan ampas dan filtratnya.

Ampas kembali diekstraksi dengan etanol dengan perlakuan yang sama sebanyak 3 x 24 jam. Kemudian ekstrak etanol yang diperoleh diuapkan sampai diperoleh ekstrak etanol kental.

2. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan sabun, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam dan alat plastik yang tidak tahan pemanasan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit, sedangkan jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

3. Uji Daya Hambat Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum* L)

a. Pembuatan Medium (Djide, 2007)

1) Medium Nutrient Agar (NA)

Ekstrak daging	3 gram
Agar	15 gram
Pepton	5 gram
Air suling	1000 ml

Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan air bsuling hingga 800 ml, lalu dipanaskan sampai larut. Kemudian dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit.

2) Medium Glukosa Nutrient Broth (NB)

Ekstrak daging	5 gram
NaCl	2,5 gram
Pepton	10 gram
Air suling ad	1000 ml

Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dengan air suling sampai 800 ml, kemudian di panaskan sampai larut, lalu dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml. Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

3) Medium Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Glukosa	10 gram
Ekstrak daging	5 gram
Pepton	10 gram
Natrium klorida	2,5 gram
Agar	15 gram
Air suling	1000 ml

pH 7,0

Cara pembuatan :

Bahan-bahan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dengan air suling sampai 800 ml, kemudian di panaskan sampai larut, lalu dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml kemudian diatur pH 7,0. Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Penyiapan mikroba uji

Bakteri uji yang digunakan berasal dari spesimen probandus dengan cara bagian muka yang berjerawat terlebih dahulu dicuci dengan sabun kemudian didesinfeksi dengan antiseptik lalu isi jerawat dikeluarkan dan diambil dengan metode hapusan kemudian diinokulasikan ke dalam medium transport yaitu nutrient broth (NB) steril, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C.

c. Peremajaan Bakteri Uji

Bakteri diinokulasikan ke dalam medium NB baru kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C. Setelah itu hasil peremajaan, diukur transmitannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nm pada 25%, dan sebagai blanko medium NB.

d. Uji Aktivitas Penghambatan Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*.
L)

Ekstrak buah tomat dibuat dalam beberapa konsentrasi yaitu: 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% dan 3% dengan menggunakan air steril, Medium NA steril kemudian didinginkan hingga suhu 40 - 45 °C. Sebanyak 10 ml medium NA yang telah di campur dengan 1 ml suspensi biakan bakteri yang telah disiapkan dalam botol dituang ke dalam cawan petri, dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat.

Kemudian diletakkan blank disk ke dalam cawan petri yang berisi medium NA tadi, di mana blank disk tersebut dahulu dijenuhkan dengan ekstrak buah tomat dengan masing-masing konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% dan 3% secara aseptik. Kemudian cawan petri tersebut ditutup dan di inkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37 °C, kemudian diukur diameter hambatannya.

4. Pembuatan Sediaan Gel

a. Rancangan Formula

No.	Nama bahan	Formula			
		I	II	III	IV
1	Ekstrak Buah Tomat	3%	3%	3%	0
2	Carbopol (%)	0,5	1	2	2
3	TEA (%)	1	1	1	1
4	Metal paraben (%)	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Gliserin (%)	30	30	30	30
6	Air suling (g)	100	100	100	100

b. Pembuatan sediaan gel

Sediaan gel dikerjakan dengan cara basis karpobol ditambahkan dengan air suling 20 ml dalam gelas kimia, didiamkan hingga mengembang selama 1 jam. Kemudian TEA dicampurkan kedalam basis

lalu dihomogenkan, ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan 15 ml air suling panas suhu 90 °C dihomogenkan. Dimasukkan ekstrak buah tomat ditambahkan gliserin dan sisa air 30,4 ml lalu dihomogenkan kedalam basis, setelah itu dihomogenkan.

5. Uji Aktivitas Sediaan Gel Buah Tomat Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

a. Peremajaan Mikroba Uji

Mikroba uji yaitu hasil isolasi diambil satu ose dari biakan kemudian dinokulasikan pada medium NB steril, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C.

b. Pembuatan suspensi Mikroba Uji

Hasil peremajaan, diukur transmitannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nm pada 25%, dan sebagai blanko medium NB.

c. Pengujian daya hambat sediaan gel ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum* L)

Medium NA steril sebanyak 10 ml dicampur dengan 1 ml suspensi bakteri uji yang telah disiapkan. Setelah itu dituang secara aseptik ke dalam cawan petri dan dibiarkan hingga membeku. Disc blank di jenuhkan dengan formula gel yang telah dibuat tadi dan di letakkan di atas medium yang berisi medium tadi. Kemudian diinkubasikan pada suhu 37°C selama 1x 24 jam, lalu diukur diameter hambatannya.

6. Uji Stabilitas Sediaan Gel Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum*)

1) Pengamatan organoleptis

Analisis organoleptis dilakukan dengan mengamati perubahan-perubahan bentuk, warna, dan bau dari sediaan gel ekstrak buah tomat yang diberi basis karbopol sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

2) Uji stabilitas sediaan gel

a. Pengukuran pH

Pengukuran pH dilakukan dengan mencelupkan pH meter kedalam sediaan gel yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu 12 jam sebanyak 10 siklus.

b. Pengukuran viskositas

Pengukuran viskositas dilakukan terhadap sediaan gel dengan menggunakan viscometer Brookfield dengan spindel nomor 6. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan spindel dalam sediaan gel kemudian dilihat viskositasnya.

c. Uji sinerisis

Setelah terbentuk gel, dilakukan pengamatan apakah terjadi sinerisis (terbentuknya cairan pada permukaan gel) sebelum dan sesudah diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5⁰C dan 35⁰C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus.

d. Uji daya sebar

Uji daya sebar Gel hasil formulasi sebanyak 3 gram diletakkan dengan hati-hati di atas kertas grafik yang dilapisi plastik transparan, dibiarkan sesaat (15 detik) dan luas daerah yang diberikan oleh sediaan dihitung kemudian tutup lagi dengan plastik yang diberi beban tertentu masing-masing 2, 4 dan 6 gram dan dibiarkan selama 60 detik, pertambahan luas yang diberikan oleh sediaan dapat dihitung.

C. Pengamatan dan Pengumpulan Data

Pengamatan dan pengumpulan data dari diameter hambatan dilakukan dengan jangka sorong setelah diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan dari penelitian yang telah dilakukan meliputi pengamatan organoleptis (warna, bau dan bentuk), uji stabilitas sediaan (pengukuran pH, uji sineresis, uji daya sebar dan viskositas) pada sediaan gel dengan basis karbopol adalah sebagai berikut:

1. Daya Hambat Ekstrak buah Tomat (*Solanum lycopersicum L*)

Tabel 1. Hasil uji daya hambat ekstrak buah tomat

Diameter daerah hambatan(mm)					
Konsentrasi Ekstrak Buah Tomat					
0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
6,35	6,016	6.333	5,683	6,016	7,422

2. Stabilitas Fisik Sediaan Gel Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum L*)

Tabel 2. Hasil pengamatan organoleptis

Formula	Warna	Bau	Bentuk
I (Karbopol 0,5%)	Coklat	Bau ekstrak	Cair
II (Karbopol 1%)	Coklat	Bau ekstrak	Semi padat
III (Karbopol 2%)	Coklat	Bau ekstrak	Semi padat
IV Kontrol (Karbopol 2%)	Putih bening	Bau Karbopol	Semi padat

3. Evaluasi Kestabilan Fisik Sediaan Gel

a. Pengukuran Viskositas Gel

Tabel 3. Hasil Pengukuran Viskositas Gel

Formula	Viskositas (Poise)	
	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Kabopol 0,5%)	45,33	48
II (Kabopol 1%)	152	169,33
III(Kabopol 2%)	452,66	464
IV Kontrol (Kabopol 2%)	601,33	616

b. Uji Daya Sebar

Tabel 4. Hasil pengamatan uji daya sebar

Formula	Daya sebar pada beban 9.6 gram (cm ²)	
	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Kabopol 0,5%)	0.6	1.05
II (Kabopol 1%)	0.35	0.45
III(Kabopol 2%)	0.35	0.35
IV Kontrol (Kabopol 2%)	0.35	0.35

c. Pengukuran pH

Table 5. Hasil pengukuran pH

Formula	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Kabopol 0,5%)	6,5	6,5
II (Kabopol 1%)	5,2	5,4
III(Kabopol 2%)	4,5	4,6
IV Kontrol (Kabopol 2%)	4,5	4,6

d. Pengamatan sineresis

Table 6. Hasil pengamatan sineresis

Formula	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Kabopol 0,5%)	Tidak sineresis	Tidak Sineresis
II (Kabopol 1%)	Tidak sineresis	Tidak sineresis
III(Kabopol 2%)	Tidak sineresis	Tidak sineresis
IV Kontrol (Kabopol 2%)	Tidak sineresis	Tidak sineresis

4. Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

Tabel 7. Hasil pengamatan uji Aktivitas Antimikroba sediaan Gel

Formula	Diameter daerah hambatan (mm)	
	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Kabopol 0,5%)	32,73	33,08
II (Kabopol 1%)	32,40	33,08
III(Kabopol 2%)	32,40	32,40
IV Kontrol (Kabopol 2%)	0	0

B. Pembahasan

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus dan kista pada tempat permukaannya yaitu muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas dan lengan bagian atas. Bentuknya seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama wajah menjadi merah dan membengkak (inflamasi), terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepala kuning, berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri (Galuh, 2009).

Buah tomat (*Solanum lycopersicum* L) telah diteliti sebelumnya bahwa buah ini memiliki kandungan kimia alkaloid solanin (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, riboflavanoid, vitamin antara lain vitamin C,

vitamin A dan B1, serta mengandung karotenoid dan zat tomatin sebagai antiinflamasi atau anti radang dan antibakteri.

Pada penelitian uji aktivitas daya hambat ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum* L) terhadap bakteri penyebab jerawat dengan konsentrasi ekstrak 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% dan 3% menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak yang paling baik menghambat bakteri penyebab jerawat adalah 3% dengan diameter hambatan 7,422 mm. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*. L) pada kulit sebagai anti acne, maka dibuat formulasi sediaan topikal dalam bentuk gel. Sediaan gel dengan kandungan air yang tinggi memiliki efek mendinginkan, dan melembabkan sehingga dapat meredam reaksi inflamasi. Selain bentuk sediaan ini mudah digunakan dan penyebarannya dikulit lebih cepat dan mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan yang baik (Ansel, 1989).

Secara ideal, basis dan pembawa harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit. Basis yang digunakan pada pembuatan gel ekstrak etanol buah tomat ini adalah karbopol karena basis ini tergolong basis hidrofilik yang mempunyai daya sebar cukup baik pada kulit, tidak menyumbat pori-pori, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya yang baik. Sediaan topikal yang diaplikasikan harus memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-6,5 agar sediaan tidak mengiritasi kulit(Tranggono, 2007).

Hasil pengamatan organoleptis terhadap gel yang mengandung ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan basis karbopol tidak menunjukkan perubahan warna, bau dan bentuk setelah kondisi penyimpanan dipercepat artinya sediaan stabil selama penyimpanan.

Hasil pengamatan pH sediaan gel mengalami peningkatan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. Peningkatan pH gel selama kondisi penyimpanan masih sesuai dengan rentang pH kulit yaitu 4,5-6,5 sehingga pH sediaan masih dianggap stabil. Sediaan harus sesuai dengan pH kulit supaya tidak mengiritasi kulit atau tidak merusak mantel asam yang menjadi pelindung kulit paling luar. Oleh sebab itu pH sediaan harus sedekat mungkin dengan pH fisiologis mantel asam kulit (Tranggono, 2007).

Uji viskositas yang dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas maka makin besar tahanannya (Galuh, 2009). Hasil pengukuran viskositas sediaan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan viskositas pada semua formula selama penyimpanan. Hal ini mungkin sebabkan keluarnya air selama penyimpanan sehingga massa menjadi lebih kental. Hasil statistik dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) terhadap viskositas gel diperoleh bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ 5% dan 1% maka viskositas gel setelah dan sesudah penyimpanan berbeda nyata atau dapat dikatakan bahwa viskositas gel dipengaruhi oleh

penyimpanan. Sehingga dilakukan uji lanjutan dengan Beda Nyata Jujur untuk mengetahui Formula yang berbeda viskositasnya dan diperoleh hasil bahwa viskositas tiap Formula berbeda signifikan dengan formula lainnya. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi karbopol 2 kali akan meningkatkan viskositas sediaan gel secara signifikan.

Hasil uji sineresis selama penyimpanan pada formula karbopol 0,5 %, karbopol 1%, karbopol 2% dan kontrol basis 2% tidak menunjukkan adanya sineresis (terdapat cairan dipermukaan sediaan). Sineresis adalah keluarnya air atau merembesnya cairan dari dalam sediaan dimana air tidak terikat kuat dengan oleh komponen. Semakin tinggi sineresis maka tekstur sediaan semakin lunak (Winarno, 1997).

Uji daya sebar sediaan dilakukan untuk mengetahui gaya yang diperlukan gel untuk menyebar pada kulit dan untuk mengetahui kelunakan dari sediaan gel untuk dioleskan pada kulit. Sesuai dengan hasil statistik dengan Metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) bahwa daya sebar tiap formula tidak berbeda ($F_{hitung} \text{ Formula} < F_{tabel} 5\% \text{ dan } 1\%$) tetapi daya sebar gel setelah dan sesudah penyimpanan berbeda nyata ($F_{hitung} \text{ Formula} > F_{tabel} 5\% \text{ dan } 1\%$). Sehingga dilanjutkan dengan uji lanjutan untuk mengetahui formula yang berbeda. Hal ini menyatakan bahwa daya sebar akan bertambah sesuai dengan bertambahnya beban.

Pada pengujian aktivitas sediaan gel ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) diperoleh hasil bahwa sediaan Gel ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum* L.) dengan konsentrasi 3% dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya daerah hambatan disekitar piper disk.

Hasil statistik Rancangan Acak Kelompok (RAK) terhadap daya hambat gel diperoleh bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ 5% dan 1% maka daya hambat gel setelah dan sesudah penyimpanan berbeda nyata atau dapat dikatakan bahwa daya hambat gel dipengaruhi oleh penyimpanan sehingga perlu dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) untuk mengetahui Formula yang berbeda daya hambatnya. Setelah dilakukan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) diperoleh hasil bahwa Formula I berbeda signifikan dengan Formula III dan IV. Sedangkan Formula I Non signifikan dengan Formula II serta Formula II berbeda signifikan dengan III dan IV. Hal ini menyatakan bahwa Formula I dengan konsentrasi karbopol 0,5% memberikan daya hambat yang terbaik dari semua Formula dan daerah hambat tidak dipengaruhi oleh basis sediaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) dapat dibuat dalam bentuk sediaan gel dengan stabilitas fisik yang baik
2. Gel ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan konsentrasi karbopol 0,5% paling efektif terhadap bakteri penyebab jerawat.

B. Saran

Disarankan untuk pengujian stabilitas kimia dan upaya untuk menghilangkan warna ekstrak sediaan agar lebih menarik.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur 'an dan Terjemahan*. 2005. Departemen Agama RI, Bandung; CV. Penerbit J-ART
- As-Suyuthy, J., Abd., Rahman*. 1987. *Pengobatan Cara Nabi*, Pustaka Hidayah; Bandung
- As-Sayyid, A. B. M*. 2006. *Pola Makan Rasulullah; Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Almahira; Jakarta
- Andayani, 2008. *Penentuan Aktivitas Antioksidan, Kadar Fenolat Total dan Likopen pada Buah Tomat (Solanum Lycopersicum L)*. STIFI Yayasan Perintis; Padang
- Ardina. Yustine. 2007. *Pengembangan Formulasi Sediaan Gel Antijerawat Serta Penentuan Kontentrasi Hambat Ekstrak Daun Pepaya (Carica Papaya A Linn.)*. ITB; Bandung
- Ansel. C. Howard. 1989. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Universitas Indonesia; Jakarta
- Banker GS. Rode CT. 1979. *Modern Pharmaceutical, Durgs and Pharmaceutical Saences 7th Volume, New York; Marcel Dekker, Inc.*
- Corwin, J., Elisabeth. 2000. *Handbook Of phatofisiologi Edisi III*. Lippin Cop William dan Wilkins.
- Djide, M. Natsir, 2005, *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudddin (lephas); Makassar

- Djide, M. Natsir, 2007, *Penuntun Praktikum Mikrobiologi Farmasi Dasar*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudddin (lephas); Makassar
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan; Jakarta
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III*, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan; Jakarta
- Galuh. Putri. Y. 2009. *Formulasi Gel Obat Jerawat Minyak Atsiri Dauk Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia, Swingle)*. Muhammadiyah; Surakarta
- Gennaro AR Lund, Walter. 1990. *Remington Pharmaceutical Sciences, eighteenth edition*, Mack Publishing Compan; Easton Pennsylvania
- Ganiswara, sulistia, G., 1995, *Farmakologi dan Terapi, Edisi IV*, Bagian Farmakologi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia; Jakarta
- Jawetz, E., Melnick, J. L., Adelberg, and E. A., 1996, “*Mikrobiologi Kedokteran*”, Alih bahasa : Nugroho, E., dan Maulany, Penerbit EGC; Jakarta.
- Kurniawati, N., 2010, *Sehat dan Cantik Alami Berkat Bumbu Dapur*, Qanita; Jakarta
- Kibbe, Arthur .H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Exipients. 3th Edition*. University Of Pharmacy; Pennsylvany.
- Lahman L. Lieberman HA & Kaning JL. 1996. *Theory And Practice Of Industrial Pharmacy*. Mack Publishing Company; Easton Pennsylvania


- Lierbermen, HA.,Lachman L., Schwarziz. 1998.*Pharmaceutical Dosage Form: Dispersi System. Volume I.* Marcel Dekker, Inc.; New York.
- Martin Eric.L. 1971 *Dispensing of Madication. 7th Edition.* Mack Publishing Company. Easton. Pennsylvania
- Rahman, H., 2010. *Formulasi Sediaan Gel Luka Bakar Ekstrak Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale) dan Uji Stabilitas Fisik.*UIN Alauddin Makassar
- Suardi, Muslim. Amenia dan Maryati Anita. 2004. *Formulasi dan Uji Klinik Gek Anti Jerawat Benzoil Peroksida-HPMC.* Fakultas Farmasi FMIPA UNAND
- Titin, Yuniarti. 2009. *Ensiklopedia Tanaman Obat Tradisional.* Gajah mada Press; Jakarta
- Tranggono, I. R. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik,* PT Gramedia Pustaka Utama; Jarkata
- Wasita Atmadja, S.M. 1977. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik.* Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Winarno, F.G. 1997. *Kimia Pangan dan Gizi:* PT. Gramedia Pustaka Utama: . Jakarta
- Voigth, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi farmasi.* Edisi V., Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Lampiran 1. Ekstraksi Buah tomat (*Solanum lycopersicum. L*)




Gambar 1. Skema kerja ekstraksi buah tomat (*Solanum lycopersicum L*)

Lampiran 2. Uji Aktivitas Penghambatan Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum. L*)




Gambar 2. Skema Kerja Uji Aktivitas Penghambatan Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum. L*)

Lampiran 3. Uji Stabilitas Gel Buah tomat (*Solanum lycopersicum*)



Gambar 3. Skema kerja Uji Stabilitas Gel Buah tomat
(*Solanum lycopersicum*)

Lampiran 4. Uji Aktivitas Sediaan Gel Buah Tomat Terhadap Bakteri Penyebab jerawat



Gambar 4. Skema Uji Aktivitas Sediaan Gel Buah Tomat Terhadap Bakteri Penyebab jerawat

Lampiran 5. Hasil Pengamatan

A. Uji Aktivitas Ekstrak Buah Tomat (*Solanum lycopersicum* L)

Tabel 8. Hasil daya hambat ekstrak Buah Tomat

Konsentrasi	Diameter daerah hambatan(mm)					
	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
Ekstrak buah tomat	0,05	0.05	1	1	0.05	2
	2	2	2	1	1	2.633
	2	1	1	0.05	2	2.633
Rata-rata	6,35	6.016	6,333	5.683	6,016	7.422

A. Pengamatan Organoleptis

Tabel 9. Hasil pengamatan Organoleptis

Formula	Warna	Bau	Bentuk
I (Karbopol 0,5%)	Coklat	Bau ekstrak	Cair
II (Karbopol 1%)	Coklat	Bau ekstrak	Semi padat
III (Karbopol 02%)	Coklat	Bau ekstrak	Semi padat
IV Kontrol (Karbopol 2%)	Putih bening	Bau Karbopol	Semi padat

B. Evaluasi Kestabilan Fisik

a. Pengukuran Viskositas Gel

Tabel.10 Hasil Pengukuran Viskositas Gel

Gel	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
Formula I	40	44
	48	52
	48	48
Rata-rata (Poise)	45,33	48
Formula II	112	120
	128	156
	216	232
Rata-rata(Poise)	152	169,33
Formula III	448	460
	456	464
	456	468
Rata-rata(Poise)	452,66	464
Formula IV	600	616
	600	616
	604	616
Rata-rata(Poise)	601,33	616

Tabel 11. Analisis Statistika Viskositas Gel Dengan Rancangan acak Kelompok (RAK)

Viskositas	Formula Gel				Total	Rata-rata
	0,5 %	1 %	2 %	2%(Kontrol)		
Sebelum penyimpanan	45.33	152	452.66	601.33	1251.32	312,828
Sesudah penyimpanan	48	169.33	464	616	1297.33	324,333
Total	93.33	321.33	916.66	1217.33	2548.65	637,161
Rata-rata	46,67	160,67	458,33	608,67	1274,33	318,581

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} = \frac{(2548,65)^2}{2 \times 4} = 811952.1$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (45,33)^2 + (152)^2 + (452,66)^2 + \dots + (616)^2 - \text{FK} \\ &= 405434.2 \end{aligned}$$

$$\text{JK Formula (JKF)} = \frac{(93,33)^2 + (321,33)^2 + (916,66)^2 + (1217,33)^2}{2} - \text{FK}$$

$$= 405108.6$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(1251,32)^2 + (1297,33)^2}{4} - \text{FK} \\ &= 264.615 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - \text{JK Formula} - \text{JK Kondisi} \\ &= 405434,2 - (-203422) - 81281,3 \\ &= 61.01614 \end{aligned}$$

Tabel 15. Analisis Variansi Viskositas Sediaan Gel

Rumus variansi	Derajat bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	Fhitung	Ftabel	
					F _{5%}	F _{1%}
Formula	3	405108.6	135036.2	15491.86**	4.35	8.45
Kondisi	1	264.615	264.615	30.35763**	5.591	2.25
Galat	7	61.01614	8.716591		-	-
Total	11	40834,23114	-	-	-	-

Kesimpulan:

Fhitung Formula > Ftabel 5% dan 1% maka viskositas gel tiap-tiap formula berbeda nyata.

Fhitung kondisi > Ftabel 5% dan 1% maka viskositas gel setelah dan sesudah penyimpanan berbeda nyata.

Uji Nyata Jujur (BNJ)

$$1. \text{BNJ}\alpha = q(p, v, \alpha) \times \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{r}$$

$$\text{BNJ5\%} = (4.68) \times \frac{\sqrt{1.574777}}{1} = 5.873$$

$$2. \text{BNJ}\alpha = q(p, v, \alpha) \times \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{r}$$

$$\text{BNJ1\%} = (6.54) \times \frac{\sqrt{1.574777}}{1} = 8.207$$

Tabel 16. Hasil Uji BNJ Viskositas sediaan Gel

Formula	Rata-rata	Beda nyata dengan			
		I	II	III	IV
		46,67	160,67	458,33	608,67
I (Karbopol 0,5%)	46,67	0			
II (Karbopol 1%)	160,67	114**	0		
III (Karbopol 02%)	458,33	411.67**	297.67**	0	
IV Kontrol (Karbopol 2%)	608,67	562**	448**	150,34**	0
BNJ5% = 5.873		BNJ1% = 8.207			

Keterangan :

	Signifikan
	Non Signifikan
	Sangat Signifikan

Kesimpulan :

Formula I berbeda sangat nyata dengan Formula II, III dan IV

Formula II berbeda sangat nyata dengan Formula III dan IV

Formula III berbeda sangat nyata dengan Formula IV

ALAUDDIN
M A K A S S A R

b. Daya sebar

Table 17. Hasil pengamatan uji daya sebar

Formula		Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Karbopol 0,5%)	3,60 g	35	50
	5,60 g	45	70
	7,60 g	50	95
	9,60 g	60	105
II (Karbopol 1%)	3,59 g	15	25
	5,59 g	25	30
	7,59 g	30	40
	9,59 g	35	45
III (Karbopol 2%)	3,61 g	15	15
	5,61 g	20	20
	7,61 g	30	30
	9,61 g	35	35
I V Kontrol (Karbopol 2%)	3,65 g	15	15
	5,65 g	20	20
	7,65 g	30	30
	9,65 g	35	35

Tabel 18. Analisis Statistika Uji Daya Sebar Sediaan Gel Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Daya Sebar	Formula Gel				Total	Rata-rata
	0,5 %	1 %	2 %	2% (Kontrol)		
Sebelum penyimpanan	4	3.25	3.5	3.5	14.25	3.5625
Sesudah penyimpanan	9.5	3.5	3.5	3.5	20	5
Total	13.5	6.75	7	7	34.25	4.28125
Rata-rata	6,75	3,38	3.5	3,5	17.13	4.282

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} = \frac{(34.25)^2}{2 \times 4} = 146.6328$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (4)^2 + (3.25)^2 + (3.5)^2 + (3.5)^2 + \dots + (3.5)^2 - FK \\ &= 31.42969 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Formula (JKF)} &= \frac{(13.5)^2 + (6.75)^2 + (7)^2 + (7)^2}{2} - FK \\ &= 16.27344 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(14.25)^2 + (20)^2}{4} - FK \\ &= 4.132813 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - \text{JK Formula} - \text{JK Kondisi} \\ &= 31.42969 - 16.27344 - 4.132813 \\ &= 11.02344 \end{aligned}$$

Tabel 19. Analisis Variansi Daya Sebar Sediaan Gel

Rumus variansi	Derajat bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	Fhitung	Ftabel	
					F _{5%}	F _{1%}
Formula	3	16.27344	5.424479	3.444602 ^(ns)	4.35	8.45
Kondisi	1	4.132813	4.132813	2.62438 ^(**)	5.591	2.25
Galat	7	11.02344	1.574777	-	-	-
Total	11	31.429693	-	-	-	-

Kesimpulan:

Fhitung Formula = 3.444602 < Ftabel 5% dan 1% maka daya sebar gel tiap-tiap formula tidak berbeda

Fhitung kondisi = 2.62438 < Ftabel 5% maka daya sebar gel setelah dan sesudah penyimpanan tidak berbeda

= 2.62438 > 1% maka daya sebar gel setelah dan sesudah penyimpanan berbeda nyata

Uji Nyata Jujur (BNJ)

$$3. \text{BNJ}\alpha = q(p, v, \alpha) \times \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{r}$$

$$\text{BNJ}5\% = (4.68) \times \frac{\sqrt{1.574777}}{1} = 5.873$$

$$4. \text{BNJ}\alpha = q(p, v, \alpha) \times \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{r}$$

$$\text{BNJ}1\% = (6.54) \times \frac{\sqrt{1.574777}}{1} = 8.207$$

Tabel 20. Hasil Uji BNJ Daya Sebar sediaan Gel

Formula	Rata-rata	Beda nyata dengan			
		I	II	III	IV
		6,75	3,38	3,5	3,5
I (Karbopol 0,5%)	6,75	0			
II (Karbopol 1%)	3,38	3,37	0		
III (Karbopol 02%)	3,5	3,25	0,12	0	
IV Kontrol (Karbopol 2%)	3,5	3,25	0,12	0	0
BNJ5% = 5.873		BNJ1% = 8.207			

Keterangan :

- Signifikan
- Non Signifikan
- Sangat Signifikan

Kesimpulan :

Formula I berbeda signifikan dengan Formula II, III dan IV

Formula II Non signifikan dengan Formula III dan IV

c. Pengukuran pH

Table 21. Hasil pengukuran pH

Formula	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Karbopol 0,5%)	6,3	6,5
	6,5	6,5
	6,5	6,5
Rata-rata	6,43	6,5
II (Karbopol 1%)	5,2	5,4
	5,2	5,4
	5,2	5,4
Rata-rata	5,2	5,4
III (Karbopol 2%)	4,4	4,5
	4,4	4,5
	4,4	4,5
Rata-rata	4,4	4,5
I V Kontrol (Karbopol 2%)	4,5	4,6
	4,5	4,6
	4,5	4,6
Rata-rata	4,5	4,6

d. Pengamatan sineresis

Table 22. Hasil pengamatan sineresis

Gel	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
Formula I	Tidak sineresis	Sineresis
Formula II	Tidak sineresis	Tidak sineresis
Formula III	Tidak sineresis	Tidak sineresis
Formula IV	Tidak sineresis	Tidak sineresis

e. Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

Tabel 23. Hasil pengamatan uji Aktivitas Antimikroba sediaan Gel

Formula	Diameter daerah hambatan (mm)	
	Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat	Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat
I (Karbopol 2%)	33,06	34.1
	32,08	32,08
	33,06	33,06
Rata-rata(cm)	32,73	33,08
II (Karbopol 1%)	33,06	33,06
	32,08	33,06
	32,08	33,06
Rata-rata(cm)	32,40	33,06
III (Karbopol 2%)	32,08	32,08
	32,08	33,06
	33,06	32,08
Rata-rata(cm)	32,40	32,40
IV Kontrol (Karbopol 2%)	0	0

Tabel 11. Analisis Statistika Daya hambat Gel Dengan Rancangan acak Kelompok (RAK)

Daya hambat	Formula Gel				Total	Rata-rata
	0,5 %	1 %	2 %	2%(Kontrol)		
Sebelum penyimpanan	32.73	32.40	32,40	0	97.53	24.383
Sesudah penyimpanan	33.08	33.06	32,40	0	98.56	24.64
Total	65.81	65.48	64.8	0	196.09	24.5113
Rata-rata	32.91	37.74	32.4	0	98.05	12.256

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} = \frac{(196.09)^2}{2 \times 4} = 4806.411$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (32.73)^2 + (33.08)^2 + (32.40 + \dots + (32.40)^2 - \text{FK} \\ &= 1602.695 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Formula (JKF)} &= \frac{(65.81)^2 + (65.48)^2 + (64.8)^2 + (0)^2}{4} - \text{FK} \\ &= 1602.402 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(81.21)^2 + (83.54)^2}{2} - \text{FK} \\ &= 1602.402 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - \text{JK Formula} - \text{JK Kondisi} \\ &= 1602.695 - 1602.402 - 1602.402 \\ &= 0.159838 \end{aligned}$$

Tabel 24. Analisis Variansi Daya Hambat Sediaan Gel

Rumus variansi	Derajat bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	Fhitung	Ftabel	
					F _{5%}	F _{1%}
Formula	3	1602.402	534.1341	23392.12**	4.35	8.45
Kondisi	1	0.132613	0.132613	5.807695**	5.591	2.25
Galat	7	0.159838	0.022834			
Total	11	1602,6945	-	-	-	-

Kesimpulan :

Fhitung Formula > Ftabel 5% dan 1% maka daya hambat gel tiap-tiap formula berbeda nyata

Fhitung kondisi > Ftabel 5% dan 1% maka daya hambat gel setelah dan sesudah penyimpanan berbeda nyata

Uji Nyata Jujur (BNJ)

$$1. \text{BNJ}_\alpha = q(p, v, \alpha) \times \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{r}$$

$$\text{BNJ}_{5\%} = (4.68) \times \frac{\sqrt{0.022834}}{3} = 0.13$$

$$2. \text{BNJ}_\alpha = q(p, v, \alpha) \times \frac{\sqrt{0.022834}}{r}$$

$$\text{BNJ}_{1\%} = (6.54) \times \frac{\sqrt{0.021391}}{3} = 0.32$$

Tabel 25. Hasil Uji BNJ Daya Hambat sediaan Gel

Formula	Rata-rata	Beda nyata dengan			
		I	II	III	IV
		32.91	37.74	32.4	0
I (Karbopol 0,5%)	32.91	0			
II (Karbopol 1%)	37.74	4.89**	0		
III (Karbopol 02%)	32.4	0.51*	5.34**	0	
IV Kontrol (Karbopol 2%)	0	32.91**	37.74**	32.24**	0
BNJ5% = 0.13		BNJ1% = 0.32			

Keterangan :

	Signifikan
	Non Signifikan
	Sangat Signifikan

Kesimpulan :

Formula I berbeda signifikan dengan Formula II dan IV

Formula II non signifikan dengan Formula III

Formula II berbeda signifikan dengan Formula III dan IV

Formula III sangat signifikan dengan Formula IV


M A K A S S A R

Lampiran 6. Gambar grafik


A. Grafik Uji Daya Sebar Sediaan Gel

1. Grafik Uji Daya sebar Formula I

Gambar 5. Grafik Konsentrasi basis karbopol 0,5 % Sebelum kondisi penyimpanan




Gambar 6. Grafik Konsentrasi basis karbopol 0,5 % Sesudah kondisi penyimpanan




2. Grafik Daya Sebar Formula II

Gambar 7. Grafik Konsentrasi karbopol 1 % Sebelum kondisi penyimpanan




Gambar 8. Grafik Konsentrasi karbopol 1 % Sesudah kondisi penyimpanan




3. Grafik Daya sebar Formula III

Gambar 9. Grafik Konsentrasi basis karbopol 2 % Sebelum kondisi penyimpanan




Gambar 10. Grafik Konsentrasi basis karbopol 2 % Sesudah kondisi penyimpanan



4. Grafik Daya sebar Formula III

Gambar 11. Grafik Konsentrasi basis 2 % sebagai kontrol Sebelum dan Sesudah kondisi penyimpanan



Lampiran 7. Gambar Tomat dan hasil Pengamatan

i. Buah Tomat




Gambar 12. Buah tomat (*Solanum lycopersicum*)

7. Uji organoleptis dan uji sineresis

a. Gambar 13. Sediaan gel Sebelum penyimpanan dipercepat




A = Formula I (Tidak Sineresis) **B** = Formula II (Tidak Sineresis)




C = Formula III (Tidak Sineresis) **D** = Formula IV (Tidak Sineresis)

Gambar 13. Uji organleptis dan uji sineresis sediaan gel

b. Sediaan Gel Sesudah penyimpanan dipercepat



A = Formula I (Tidak Sineresis) **B** = Formula II (Tidak Sineresis)



C = Formula III (Tidak Sineresis) D = Formula IV (Tidak Sineresis)

Gambar 14. Uji organleptis dan uji sineresis sediaan gel

8. Daya hambat sediaan gel ekstrak buah Tomat



Gambar 16. Uji daya hambat sediaan gel ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum* L)

Keterangan

- A = Formula I konsentrasi basis 0,5%
- B = Formula II konsentrasi basis 1%
- C = Formula III konsentrasi basis 2%
- D = Formula IV kontrol basis 2%