

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY “N”  
DENGAN POST PARTUM NORMAL DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA  
TANGGAL 04 JULI- 31 JULI TAHUN 2018**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**OLEH:**

**ANNISA NURUL HIKMAH**

**NIM. 70400115042**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Nurul Hikmah  
Nim : 70400115042  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 22 November 1997  
Jurusan/Prodi : Kebidanan  
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma  
Alamat : BTN. Mutiata Permai Blok A/10  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada  
Ny “N” dengan Post Partum Normal di RSUD Syekh  
Yusuf Gowa Tanggal 04 Juli- 31 Juli Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penyusun

**Annisa Nurul Hikmah**

**70400115042**

**LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Annisa Nurul Hikmah

NIM : 70400115042

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada Ny "N" dengan  
Post Partum Normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 06 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Pembimbing I



Firdavanfi, S.ST, M. Keb

NIP: 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



dr. Nadiyah Haruna, M.Kes

NIP: 19790417 200801 2 018

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny "N" dengan Post Partum Normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 Juli- 31 Juli Tahun 2018, yang disusun oleh Annisa Nurul Hikmah, NIM: 70400115042, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 Agustus 2018 M

24 Dzulquidah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Dr. Hj. Sitti Saleha S.SiT, SKM, M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Firdayanti S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Nadyah M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Dewi Setiawati Sp.OG, M.Kes** (.....)

Penguji II : **Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag, M. Hum** (.....)

Dekan  
  
**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
NIP: 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

الرديم الرحمن الله بسم

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada Ny “N” dengan Post Partum Normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 Juli- 31 Juli Tahun 2018” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Terselesaikannya Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb, selaku ketua Prodi Kebidanan.
4. Ibu Firdayanti S.SiT, M.Keb, selaku pembimbing I yang senantiasa dengan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan support untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. dr. Nadyah, M.Kes, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
6. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.kes, selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Nurkholis A. Gaffar, M.Hum, selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membirijan bimbingan dan mendidik penulis semasa pendidikan.
9. Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa dan jajarannya atas bantuan dan perizinan yang diberikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.

10. Yang tercinta kedua orang tua saya, ayahanda Munir dan Ibunda Suristi Dasrip serta saudara-saudara saya, Diah, Rina, Fauziah dan Agung yang selalu memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis.
11. Teman-teman Kebidanan angkatan 2015 terkhusus Indriyani, Nisfawati, Evi, Risky, Mentari, Devi, Suriani, Salsa, Tiara, Wiwi, Insani, Jumriana, Zahrah, Salmah yang selalu memberikan dukungan berupa semangat dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Allahumma Aamiin.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penulis

**Annisa Nurul Hikmah**


**70400115042**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORI .....	10
A. Tinjauan Umum tentang Masa Nifas .....	10
1. Pengertian Masa Nifas .....	10
2. Tujuan Masa Nifas .....	10
3. Tahapan Masa Nifas.....	11
4. Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas .....	11

5. Perubahan Psikologis pada Masa Nifas .....	20
6. Peran Bidan pada Masa Nifas .....	21
7. Program dan Kebijakan Teknis Masa Nifas.....	22
8. Perawatan Masa Nifas.....	26
9. Tanda Bahaya Masa Nifas .....	34
B. Tinjauan Khusus tentang Nifas dalam Islam .....	35
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	43
1. Pengertian Asuhan Kebidanan .....	43
2. Tahapan Manajemen Kebidanan.....	44
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	49
4. SOP Perawatan Ibu Post Partum RSUD Syekh Yusuf .....	51
<b>BAB III STUDI KASUS.....</b>	<b>53</b>
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	53
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 04 Juli 2017 .....	70
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 05 Juli 2017 .....	77
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 06 Juli 2017 .....	83
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 09 Juli 2017 .....	88
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 17 Juli 2017 .....	92
G. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 31 Juli 2017 .....	96
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>100</b>
A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar .....	100

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual .....	102
C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial .....	103
D. Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi .....	104
E. Langkah V. Rencana Tindakan/Intervensi .....	106
F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan .....	111
G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	113
 BAB V PENUTUP.....	 117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	119
 DAFTAR PUSTAKA .....	 121



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Involusi Uterus.....	13
Tabel 2 : Program Dan Kebijakan Teknis Masa Nifas .....	25
Tabel 3 : Riwayat Persalinan.....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
Lampiran II	: Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kepada Bupati Gowa
Lampiran III	: Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Gowa kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa
Lampiran IV	: Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran V	: Riwayat hidup

## **ABSTRAK**

**JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018**

**Annisa Nurul Hikmah, 70400115042**

**Pembimbing I : Firdayanti S.SiT, M.Keb**

**Pembimbing II : dr. Nadyah M.Kes**

### **“Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada Ny “N” dengan Post Partum Normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018”**

---

Nifas adalah masa sesudah persalinan yaitu sejak kelahiran bayi, plasenta dan selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali kesehatan seperti sebelum hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi asuhan kepada ibu dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf, dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode manajemen asuhan kebidanan tujuh langkah Varney.

Studi kasus yang dilakukan menunjukkan bahwa masa nifas ibu berjalan dengan baik dan normal. Setelah dilakukan asuhan selama 28 hari dengan melakukan kunjungan masa nifas sebanyak 6 kali, ditemukan keadaan ibu normal, serta tidak ditemukan adanya masalah potensial yaitu bendungan payudara, subinvolusi uterus dan infeksi yang terjadi.

Pengkajian berupa pemantauan dan analisa data pada ibu dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018, pemantauan masa nifas berjalan normal dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada ibu dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan.

**Kata kunci: post partum, post partum normal, langkah Varney**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

Annisa Nurul Hikmah, 70400115042

Supervisor I : Firdayanti S.SiT, M.Keb

Supervisor II : dr. Nadyah M.Kes

**"The Postnatal Obstetric Care Management on Mrs. "N" with Normal Post Partum at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital, on July 04- 31, 2018"**

---

Post-partum is a period after the childbirth, that is, since the birth of the baby, placenta and membranes needed to restore health as before pregnancy. The study was aimed at providing care to mothers with normal post-partum at Syekh Yusuf Regional Public Hospital, using a case study approach, with Varney's seven-step obstetric care management method.

The case study conducted revealed that the post-partum period ran well and normal. After 28 days of care, the post-partum visit was 6 times; the maternal condition was normal, and no potential problems were found such as breast congestion, uterine subinvolution, and infection.

The assessments were in the forms of monitoring and data analysis on mothers with normal post-partum at Syekh Yusuf Regional Public Hospital in 2018. The monitoring of the post-partum period was normal, and all findings and actions implemented on the mothers had been documented by finding no gap between the theory and the case identified.

Keywords : post-partum, normal post-partum, Varney step



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masa nifas adalah masa dimana seorang ibu telah melewati proses persalinan dan melahirkan bayi disertai plasenta dan selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dan berlangsung kurang lebih 6 minggu (Saleha, 2013). Sekitar 50% kematian ibu terjadi dalam 24 jam pertama postpartum sehingga pelayanan kesehatan pada masa nifas harus tepat untuk menunjang kesehatan dan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).

Menurut laporan World Health Organization (WHO) tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa. Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), pada tahun 2012 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu pada tahun 2015 turun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun terjadi penurunan namun hal ini tetap jauh dari target global MDGs (*Millenium Development Goals*) ke-5 yaitu menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (Profil Kesehatan Indonesia, 2016).

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES RI) secara nasional penyebab langsung kematian ibu dengan penyumbang AKI terbesar adalah perdarahan 24%, komplikasi 8%, infeksi 11%, dan pastus macet 5%

(Wulansari,dkk, 2016). Menurut Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tahun 2013 angka kematian ibu dilaporkan sebesar 87,3 per 100.000 kelahiran hidup (Prasetya Lestari, 2016).

Menurut Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dilaporkan AKI sebanyak 149 orang atau 99,38 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 19 orang (12,75%), kematian ibu bersalin 44 orang (29,53%), dan kematian ibu nifas 86 orang (57,71%). Lalu pada tahun 2016 AKI naik menjadi 153 orang atau 103.00 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 47 orang (30,71%), kematian ibu bersalin 44 orang (27,45%) dan ibu nifas 62 orang (40,52%) (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016, angka kematian ibu di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, tentunya ini harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah dan tenaga medis.

Menurut data profil kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, jumlah AKI yang dilaporkan oleh Subdin Bina Kesga pada tahun 2015 sebanyak 14 orang, terdiri dari kematian ibu hamil 1 orang (7,14%), kematian ibu bersalin 5 orang (35,72%), dan kematian ibu nifas 8 orang (57,14%). Tahun 2016 AKI naik menjadi 18 orang, terdiri dari kematian ibu hamil 2 orang (11,11%), kematian ibu bersalin 9 orang (50%) dan ibu nifas 7 orang (38,89%). Lalu pada tahun 2017 AKI turun menjadi 13 orang, terdiri dari kematian ibu hamil 3 orang (23,08%), kematian ibu bersalin 6 orang (46,15%) dan ibu nifas 4 orang (30,77%). Terlihat pada tahun 2015 ke tahun 2016 di Kabupaten Gowa terjadi

peningkatan pada jumlah angka kematian ibu, namun turun pada tahun 2017. Meskipun mengalami penurunan hal ini tidak boleh diabaikan dan tentu harus tetap menjadi acuan agar para tenaga kesehatan bekerja optimal untuk menurunkan jumlah angka kematian ibu di Kabupaten Gowa (Profil Kesehatan Kab.Gowa, 2017).

Dari data di atas terlihat bahwa penyumbang AKI terbesar salah satunya adalah ibu nifas. Tahapan nifas adalah tahapan krisis bagi kesehatan ibu, sebab ibu akan mengalami perubahan fisik dan mental saat mengandung dan melahirkan. Sehingga saat kembali ke kondisi semula, perubahan ini dapat membuat ibu merasa tertekan. Hal ini bahkan dapat diperparah jika ibu dalam keadaan tidak siap dalam merawat bayinya.

Pada masa nifas, ibu rentan terhadap beragam gangguan, seperti depresi masa nifas dan infeksi. Terutama bagi ibu yang menjalani insisi vagina dan operasi caesar. Banyaknya hal yang harus diperhatikan pada masa nifas menjadi penyebab mengapa kunjungan nifas sangat penting dilakukan. Kunjungan nifas bertujuan untuk deteksi dini komplikasi dengan melakukan kunjungan minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: kunjungan nifas pertama pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari, kunjungan nifas kedua dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan dan kunjungan ketiga dilakukan pada minggu ke-6 setelah persalinan.

Saat masa nifas, ibu akan memperoleh pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kondisi umum (tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu),

pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lochia, pemeriksaan payudara, anjuran ASI eksklusif 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2x24 jam), dan pelayanan KB pasca persalinan.

Infeksi masa nifas masih berperan sebagai salah satu penyebab kematian ibu terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah ini terjadi karena pelayanan pada masa nifas yang masih jauh dari sempurna. Faktor penyebab lainnya yaitu daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi atau mal nutrisi, anemia, *hygiene* yang kurang baik, serta kelelahan (Tulas,dkk, 2017).

Data rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa mencatat pada tahun 2014 jumlah persalinan sebesar 1956, lalu terjadi penurunan sebesar 7% pada tahun 2015 menjadi 1804 persalinan. Tahun 2016 terjadi penurunan 12,5% dari tahun 2015 menjadi 1578 persalinan. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan 21% dari tahun 2016 yaitu terjadi 2012 persalinan.

Jumlah persalinan normal pada tahun 2014 sebesar 348 atau 17% dari total persalinan. Pada tahun 2015 terjadi penurunan total persalinan namun terjadi peningkatan pada partus normal yaitu 1011 persalinan atau 56% dari total persalinan di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan luar biasa yaitu 91% atau 1449 persalinan normal dari 1578 total persalinan. Jumlah peningkatan partus normal dari tahun sebelumnya sebesar 30% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 persalinan normal hanya 50% dari total 2012 persalinan. Terjadi penurunan sebesar 21% dari tahun sebelumnya.

Jumlah ibu nifas di RSUD Syekh Yusuf berdasarkan jumlah ibu yang dirawat di ruang nifas dari berbagai kasus termasuk kasus-kasus obstetri patologi seperti post abortus, post kuretase, pada kasus kehamilan ektopik terganggu (KET) dan molahidatidosa pada tahun 2014 sebesar 2609 pasien, tahun 2015 sebesar 2826 pasien, tahun 2016 naik menjadi 3887 pasien, sedangkan tahun 2017 sebesar 3780 pasien.

Persalinan normal yang dilalui oleh seorang ibu diharapkan dapat menjadi acuan ibu akan mengalami masa nifas yang normal. Ibu yang mengalami persalinan normal dioptimalkan asuhannya agar dapat mengalami masa nifas yang normal pula. Namun bukan berarti bidan mengabaikan ibu dengan riwayat persalinan abnormal. Ibu yang mendapat komplikasi pada saat persalinan harus diberikan asuhan yang tepat agar masa nifasnya dapat berlangsung normal.

Banyaknya hal yang harus diperhatikan saat masa nifas menjadi acuan untuk melakukan perawatan masa nifas yang tepat. Perawatan nifas yang tepat akan memperkecil risiko kelainan atau bahkan kematian ibu nifas. Kenyamanan ibu saat masa nifas termasuk dalam asuhan sayang ibu yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang bidan. Selain itu penanganan nifas yang benar dan memastikan semua proses nifas dalam batas normal akan membantu menurunkan resiko patologi pada ibu nifas sehingga tujuan menurunkan angka kematian ibu dapat tercapai. Mengingat pentingnya melakukan asuhan yang tepat kepada ibu nifas olehnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Manajemen

Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ibu dengan Nifas Normal di RSUD Syekh Yusuf.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah adalah Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada Ibu Nifas normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan terbagi atas 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

### **1. Tujuan Umum**

Dilaksanakannya Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan sesuai wewenang bidan.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Dilaksanakan pengumpulan, pengkajian dan analisis data ibu nifas normal.
- b. Dilaksanakan penentuan dan perumusan diagnosa/masalah aktual pada ibu nifas normal.
- c. Dilaksanakan penentuan dan perumusan diagnosa/masalah potensial pada ibu nifas normal.
- d. Dilaksanakan identifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu nifas normal.
- e. Dilaksanakan penentuan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal.

- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal.
- g. Dilaksanakan evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal.
- h. Dilaksanakan pendokumentasian semua temuan dan tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan karya tulis ilmiah ini memiliki 3 manfaat yaitu :

##### **1. Manfaat Bagi Instituti Terkait**

Sebagai bahan masukan bagi intituti terkait dalam pengembangan program pendidikan dan dapat memberikan pelayanan kebidanan yang aktual dan profesional pada masyarakat.

##### **2. Manfaat Ilmiah**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

##### **3. Manfaat bagi penulis**

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang masa nifas normal.

## **E. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

### **1. Studi Kepustakaan**

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sebagai dasar teori yang digunakan dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

### **2. Studi Kasus**

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney (2003), dengan 7 langkah yang meliputi: identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan dan pengkajian data menggunakan teknik antara lain:

#### **a. Anamnesa**

Penulis melakukan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan kepada pasien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.

#### **b. Pemeriksaan fisik**

Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik adalah untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu dan bayinya. Dilakukan secara sistematis yaitu secara berurut yang dimulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian ini meliputi pengkajian status emosional ibu, respon terhadap kondisi yang dialami oleh ibu serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, lingkungan serta petugas kesehatan.

**3. Studi Dokumentasi**

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, dokter, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.

**4. Diskusi**

Melakukan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan maupun dokter yang menangani langsung pasien tersebut serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang Masa Nifas

##### 1. Pengertian Masa Nifas

- a. Masa nifas adalah masa yang dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu (Prawirohardjo, 2014).
- b. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu (Saleha, 2013).
- c. Masa nifas adalah masa setelah ibu melahirkan bayinya yang digunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali dan memerlukan waktu 6-12 minggu (Nugroho, 2014).

Masa nifas adalah masa yang dimulai sejak kelahiran bayi, plasenta, dan selaput yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan dan organ kandungan seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kurang lebih 6 minggu.

##### 2. Tujuan Masa Nifas

Tujuan pemberian asuhan kebidanan pada masa nifas yaitu :

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis.

- b. Mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya.
- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari.
- d. Memberikan pelayanan KB (Saleha, 2013)

### 3. Tahapan Masa Nifas

Tahapan yang terjadi pada masa nifas yaitu :

- a. Puerperium dini  
Suatu masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan, serta melakukan aktivitas layaknya wanita normal lainnya.
- b. Puerperium intermedial  
Suatu masa di mana kepulihan dari organ-organ reproduksi yang lamanya sekitar 6-8 minggu.
- c. Remote puerperium  
Suatu masa yang diperlukan untuk ibu pulih dan sehat sempurna terutama ibu bila selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).

#### 4. Perubahan Fisiologis Pada Masa Nifas

##### a. Perubahan Sistem Reproduksi

##### 1.) Uterus

Uterus akan mengalami proses involusi. Proses involusi adalah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).

Proses Involusi Uterus adalah sebagai berikut:

##### a.) Iskemia Miometrium

Disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus-menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta membuat uterus relatif anemia dan menyebabkan serat otot trofi.

##### b.) Autolisis

Autolisis merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterus. Enzim proteolitik akan memendekkan jaringan otot yang telah sempat mengendur hingga 10 kali panjangnya dan lima kali lebarnya dari semula selama kehamilan atau dapat juga dikatakan sebagai pengrusakan secara langsung jaringan hipertropi yang berlebihan hal ini disebabkan karena penurunan hormone estrogen dan progesteron.

### c.) Efek Oksitosin

Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterus sehingga akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus. Proses ini membantu mengurangi situs atau tempat implantasi serta mengurangi perdarahan (Icesmi, Margareth, 2013)

Involusi	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus (gr)	Diameter Bekas Melekat Plasenta (cm)	Keadaan Serviks
Bayi Lahir	Setinggi pusat	1000		
Uri Lahir	2 jari di bawah pusat	750	12,5	Lembek
Satu minggu	Pertengahan pusat-simpisis	500	7,5	Beberapa hari setelah post partum dapat dilalui 2 jari . Akhir minggu pertama dapat dimasuki 1 jari
Dua minggu	Tak teraba di atas simpisis	350	3-4	
Enam minggu	Bertambah kecil	50-60	1-2	
Delapan minggu	Sebesar normal	30		

Tabel 2.1 Involusi Uterus (Sumber: Vivian, Tri Sunarsih, 2013)

### 2.) Serviks

Selain uterus, serviks juga mengalami involusi. Perubahan yang terdapat pada serviks yaitu bentuk serviks yang akan menganga seperti corong. Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang dapat berkontraksi sedangkan serviks tidak dapat berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks uteri berbentuk

semacam cincin. Warna serviks berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak. Segera setelah janin dilahirkan, serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu dengan luka persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari.

### 3.) Vagina

Estrogen postpartum yang menurun berperan dalam penipisan mukosa vagina dan hilangnya rugae. Vagina yang semula sangat teregang akan kembali secara bertahap pada ukuran sebelum hamil selama 6-8 minggu setelah bayi lahir. Rugae (lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan) akan kembali terlihat sekitar minggu keempat.

Sesuai dengan fungsinya sebagai bagian lunak jalan lahir dan merupakan saluran yang menghubungkan cavum uteri dengan tubuh bagian luar, vagina juga berfungsi sebagai saluran tempat dikeluarkannya sekret yang berasal dari cavum uteri selama masa nifas yang di sebut *lochea* (Maritalia, 2012).

*Lochea* adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai reaksi basa/alkalis yang dapat membuat orgasme lebih cepat berkembang daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. *Lochea* mengalami perubahan karena proses involusi. *Lochea* terbagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :

a.) *Lochea Rubra*

*Lochea* ini muncul pada hari pertama sampai hari ketiga masa postpartum. Warnanya merah dan mengandung darah dari perobekan/luka pada plasenta dan serabut dari desidua dan chorion.

*Lochea* ini terdiri atas sel desidua, verniks caseosa, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa darah.

b.) *Lochea Sanguilenta*

*Lochea sanguilenta* adalah *lochea* yang berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 post partum.

c.) *Lochea Serosa*

*Lochea serosa* adalah *lochea* yang keluar dari hari ke-7 sampai hari ke-14 post partum. Warnanya biasanya kekuningan atau kecoklatan. *Lochea* ini terdiri atas lebih sedikit darah dan lebih banyak serum.

d.) *Lochea Alba*

*Lochea alba* adalah *lochea* terakhir. Dimulai dari hari ke-14 kemudian makin lama makin sedikit hingga sama sekali berhenti sampai satu atau dua minggu berikutnya. *Lochea* yang keluar berwarna putih seperti *cream* serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua (Saleha, 2013).

#### 4.) Vulva

Vulva mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan vulva tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol (Maritalia, 2012).

#### 5.) Perineum

Saat persalinan, salah satu salah satu jalan lahir yang dilalui adalah perineum. Menurut (Prawirohardjo, 2014) perineum terletak diantara vulva dan anus, panjangnya kira-kira 4 cm (Icesmi, Margareth, 2013). Perineum sangat rentan mengalami robekan ketika melahirkan atau secara disengaja digunting (episiotomi) untuk memudahkan proses persalinan.

#### b. Perubahan Tanda-tanda vital

##### 1.) Suhu

Pada 24 jam pertama post partum suhu badan akan naik sedikit ( $37,5-38^{\circ}\text{C}$ ) sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan. Apabila keadaan normal, suhu badan menjadi biasa. Biasanya hari ke-3 suhu badan naik lagi karena ada pembentukan ASI dan payudara menjadi bengkak, berwarna merah karena banyaknya ASI. Bila suhu tidak turun kemungkinan adanya infeksi pada endometrium, mastitis, traktus genitalia, atau sistem lain.

## 2.) Nadi

Sehabis melahirkan biasanya denyut nadi ibu akan lebih cepat dibanding nadi normal orang dewasa yaitu 60-80 x/menit.

## 3.) Tekanan Darah

Tekanan darah biasanya tidak berubah. Kemungkinan tekanan darah akan rendah setelah melahirkan karena ada perdarahan sedangkan tekanan darah tinggi pada saat postpartum dapat menandakan terjadinya preklamsia postpartum (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).

## 4.) Pernapasan

Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernapasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran pernapasan (Bahiyatun, 2013).

## c. Perubahan Sistem Kardiovaskular

### 1.) Volume Darah

Perubahan volume darah bergantung pada beberapa faktor, misalnya kehilangan darah selama melahirkan dan mobilisasi. Kehilangan darah merupakan akibat penurunan volume darah total yang cepat tetapi terbatas. Pada minggu ke-3 dan ke-4 setelah bayi lahir, volume darah biasanya menurun sampai mencapai volume darah seperti sebelum hamil.

## 2.) Curah Jantung

Denyut jantung, volume sekuncup dan curah jantung meningkat sepanjang masa hamil. Segera setelah hamil, keadaan ini meningkat bahkan lebih tinggi selama 30-60 menit karena darah yang biasanya melintasi sirkulasi uteroplasenta tiba-tiba kembali ke sirkulasi umum.

## 3.) Sistem hematologi

Selama minggu-minggu kehamilan, kadar fibrinogen dan plasma, serta faktor-faktor pembekuan darah meningkat. Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma akan semakin menurun, tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah. Jumlah hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit akan sangat bervariasi pada awal-awal masa postpartum sebagai akibat dari volume darah. Kira-kira selama kelahiran dan masa postpartum terjadi kehilangan darah sekitar 200-500 ml.

## d. Perubahan Sistem Pencernaan

Sistem pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu yang berangsur-angsur untuk kembali normal. Pola makan ibu nifas tidak akan sama seperti biasa dalam beberapa hari dan perineum ibu akan terasa sakit untuk defekasi. Faktor-faktor tersebut mendukung konstipasi pada ibu nifas dalam minggu pertama. Selain itu penyebab lain konstipasi pada ibu

nifas adalah kurangnya pengetahuan ibu dan kekhawatiran lukanya akan terbuka bila ibu buang air besar.

e. Perubahan Sistem Perkemihan

1.) Sistem Urinarius

Perubahan hormonal pada masa hamil (kadar steroid yang tinggi) turut menyebabkan peningkatan fungsi ginjal lalu pada saat post partum kadar steroid akan menurun sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal selama masa post partum. Diperlukan waktu satu bulan setelah melahirkan untuk mengembalikan fungsi ginjal kembali normal.

2.) Diuresis Postpartum

Dalam 12 jam pasca melahirkan, ibu mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama ia hamil. Diuresis postpartum, yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen, hilangnya penurunan tekanan vena pada tingkat bawah, dan hilangnya peningkatan volume darah akibat kehamilan, merupakan mekanisme tubuh untuk mengatasi kelebihan cairan.

3.) Uretra dan Kandung Kemih

Selama proses melahirkan, uretra dan kandung kemih dapat mengalami trauma akibat tekanan sewaktu bayi melewati jalan lahir. Ibu postpartum dianjurkan sering mengosongkan kandung kemih selain untuk melatih mobilisasi dini, dengan mengosongkan kandung

kemih secara adekuat, tonus kandung kemih dapat kembali pulih dalam waktu lima sampai tujuh hari setelah bayi lahir.

f. Perubahan Sistem Integumen

Kloasma yang biasa muncul pada masa hamil atau yang biasa disebut dengan *cloasma gravidarum* biasanya akan menghilang saat kehamilan berakhir. Namun untuk *linea nigra* dan hiperpigmentasi pada *areola mammae* biasanya tidak menghilang seluruhnya dan pada beberapa ibu pigmentasi tersebut mungkin menetap (Roito, 2013).

## 5. Perubahan Psikologis Pada Masa Nifas

Perubahan yang mendadak dan dramatis pada status hormonal menyebabkan ibu yang berada dalam masa nifas menjadi sensitif terhadap faktor-faktor yang dalam keadaan normal mampu diatasinya. Disamping perubahan hormonal, keadaan fisiknya sering terkuras oleh tuntutan kehamilan serta persalinan, keadaan kurang tidur, lingkungan yang asing baginya dan oleh kecemasannya akan bayi, suami atau anak-anaknya yang lain. Adaptasi psikologi masa nifas yang terbagi atas 4 tahapan yaitu:

- a. *Taking On* : pada fase ini disebut meniru, pada *taking on* fantasi wanita tidak hanya meniru tapi sudah membayangkan peran yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Pengalaman yang berhubungan dengan masa lalu dirinya (sebelum proses) yang menyenangkan, serta harapan untuk masa yang akan datang. Pada tahap ini wanita akan meninggalkan perannya pada masa lalu.

- b. *Taking In* : periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan, ibu baru pada umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada tubuhnya. Peningkatan nutrisi ibu mungkin dibutuhkan karena selera makan ibu biasanya bertambah, kurangnya nafsu makan menandakan tidak berlangsung normal.
- c. *Taking Hold* : periode ini berlangsung pada hari 2-4 post partum ibu menjadi orang tua yang sukses dengan tanggung jawab terhadap bayinya. Pada masa ini ibu akan sensitif dan merasa tidak mahir melakukan hal-hal tersebut. Cenderung menerima nasihat bidan.
- d. *Letting Go* : periode yang biasanya terjadi setiap ibu pulang kerumah, pada ibu yang bersalin diklinik dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarganya. Dan depresi post partum terjadi pada periode ini (Sugihantono, 2015).

## 6. Peran Bidan pada Masa Nifas

Peran bidan pada masa nifas yaitu :

- a. Memberi dukungan secara terus-menerus selama masa nifas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ibu agar mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- b. Sebagai promotor hubungan yang erat antara ibu dan bayi secara fisik maupun psikologis.
- c. Mengondisikan ibu untuk menyusui bayinya dengan cara meningkatkan rasa nyaman (Saleha, 2013).

- d. Membuat kebijakan, perencana program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi.
- e. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- f. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekan kebersihan yang aman.
- g. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.
- h. Memberikan asuhan secara professional (Elisabeth, Endang, 2015).

## **7. Program dan Kebijakan Teknis Masa Nifas**

Kunjungan masa nifas dilakukan paling sedikit empat kali. Tujuannya untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi dini, serta mengatasi masalah-masalah yang terjadi (Saleha, 2013).

Kunjungan nifas bertujuan untuk deteksi dini komplikasi dengan melakukan kunjungan minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: kunjungan nifas pertama pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari, kunjungan nifas kedua dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan dan kunjungan ketiga dilakukan pada minggu ke-6 setelah persalinan.

a. Kunjungan I (6-8 jam persalinan)

Tujuan pada kunjungan pertama pada masa nifas ini adalah pencegahan masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga, bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Bidan juga mendukung ASI eksklusif, membina hubungan antara ibu dan bayi dengan dilakukan rawat gabung, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah terjadinya hipotermi.

b. Kunjungan II (6 hari setelah persalinan)

Kunjungan kedua pada masa nifas bertujuan memastikan involusio uterus berjalan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tidak ada perdarahan abnormal atau tidak ada bau. Bidan perlu menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal serta memastikan ibu menyusui bayinya dengan benar, memastikan ibu mendapatkan makanan, cairan dan istirahat yang cukup serta memberi konseling cara merawat bayi dan tali pusat.

c. Kunjungan III (2 minggu setelah persalinan)

Tujuan kunjungan pada minggu kedua setelah persalinan sama dengan kunjungan pada hari keenam setelah persalinan, bidan tetap memperhatikan involusi uterus, cara ibu menyusui, nutrisi dan istirahat ibu cukup dan juga memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan

pada bayi, tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari seperti mengganti popok bayi ketika basah, dan mengganti pakaian bayi ketika lembab.

d. Kunjungan IV (6 minggu setelah persalinan)

Kunjungan keempat yaitu pada minggu keenam setelah persalinan bertujuan untuk menanyakan pada ibu penyulit yang ia dan bayinya alami serta memberikan konseling tentang keluarga berencana (KB).



Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.</li> <li>- Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan <b>RUJUK</b> bila ada perdarahan berlanjut.</li> <li>- Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga cara mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri.</li> <li>- Pemberian ASI awal.</li> <li>- Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.</li> <li>- Mencegah bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.</li> <li>- Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.</li> </ul>
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal.</li> <li>- Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat.</li> <li>- Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit.</li> <li>- Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, dan menjaga bayi tetap hangat serta merawat bayi sehari-hari.</li> </ul>
3	2 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama dengan 6 hari setelah persalinan.</li> </ul>
4	6 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ibu atau bayi alami.</li> <li>- Memberikan konseling untuk KB secara dini. (Juraida dkk, 2013).</li> </ul>

Tabel 2.2 Program dan Kebijakan Teknis Masa Nifas (Sumber: Juraida dkk, 2013)

## 8. Perawatan Masa Nifas

Periode postpartum (masa nifas) adalah waktu penyembuhan dan perubahan yaitu waktu untuk kembali pada keadaan seperti sebelum hamil. Perawatan masa nifas dimaksudkan agar saat ibu keluar dari rumah sakit, ibu berada

dalam keadaan sehat dan mengetahui cara merawatannya dengan baik.

Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ibu nifas antara lain :

a. Nutrisi dan Cairan

Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup dan seimbang, terutama protein dan karbohidrat. Ibu menyusui harus mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari (anjurkan ibu untuk minum setia kali menyusui). Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya 40 hari pasca persalinan. Minum kapsul vitamin A (200.000 unit) agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

Gizi pada ibu nifas berkaitan erat dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Kekurangan gizi pada ibu menyusui dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu dan bayinya. Gangguan pada bayi meliputi proses tumbuh kembang anak, bayi mudah sakit dan mudah terkena infeksi. Kekurangan zat-zat esensial menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang.

b. Mobilisasi

Mobilisasi dini adalah kebiksanaan untuk secepat mungkin membimbing ibu untuk keluar dari tempat tidurnya dan membimbingnya secepat mungkin untuk berjalan. Pada persalinan normal sebaiknya

ambulasi dikerjakan setelah 2 jam. Keuntungan mobilisasi dini yaitu sebagai berikut:

- 1.) Melancarkan pengeluaran lochea, mengurangi infeksi perineum
- 2.) Mempercepat involusio alat kandungan
- 3.) Memperlancar fungsi alat gastrointestinal dan perkemihan
- 4.) Meningkatkan kelancaran peredaran darah, sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme

c. Eliminasi

Buang air kecil (BAK) pada ibu postpartum terutama ibu yang pertama kali melahirkan akan terasa pedih. Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh iritasi pada uretra sebagai akibat persalinan. Miksi disebut normal bila dapat BAK spontan tiap 3-4 jam.

Buang air besar (BAB) harus ada dalam 3 hari postpartum. Ibu postpartum rentan terkena konstipasi sebab takut bergerak dan terasa perih atupun jahitan akan terlepas (bagi ibu yang mendapat jahitan), hal ini dapat diatasi dengan konseling kepada ibu tentang pentingnya mobilisasi dini yang justru akan membantu mempercepat proses penyembuhan.

d. Kebersihan Diri

Anjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan daerah disekitar vulva terlebih dahulu, dari depan kebelakang, baru kemudian membersihkan daerah disekitar anus.

Nasihati ibu untuk membersihkan diri setiap kali selesai buang air kecil atau besar. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain setidaknya dua kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik, dan dikeringkan dibawah matahari atau disetrika sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelinanya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk tidak takut membersihkan perineum dan tetap menjaga kebersihan perineum. Waktu yang tepat untuk perawatan perineum sebaiknya dilakukan di saat-saat sebagai berikut :

1.) Saat mandi

Pada saat mandi, ibu post partum pasti melepas pembalut, setelah terbuka maka ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri pada cairan yang tertampung pada pembalut, untuk itu maka perlu dilakukan penggantian pembalut, demikian pula pada perineum ibu, untuk itu dilakukan pembersihan perineum. Selain kebersihan seluruh tubuh, saat mandi ibu diajarkan dan dianjurkan untuk membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan ibu membersihkan daerah sekita vulva dari depan ke belakang. Ibu juga harus mengganti pembalut minimal 2 kali sehari.

2.) Setelah buang air kecil

Pada saat buang air kecil, kemungkinan besar terjadi kontaminasi air seni pada rektum akibatnya dapat memicu pertumbuhan bakteri pada

perineum. Untuk itu, saat buang air kecil ibu harus membersihkan daerah kelamin dan membersihkan vulva dari arah depan ke belakang.

3.) Setelah buang air besar

Pada saat buang air besar, diperlukan pembersihan sisa-sisa kotoran di sekitar anus, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari anus ke perineum yang letaknya bersebelahan maka diperlukan proses pembersihan anus dan perineum secara keseluruhan. Ibu harus membersihkan daerah kelamin dan membersihkan vulva dari arah depan ke belakang dan tentunya mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah membersihkan daerah kelamin.

e. Istirahat

Umumnya wanita akan sangat lelah setelah melahirkan. Kebutuhan istirahat sangat dibutuhkan oleh ibu beberapa jam setelah melahirkan. Kebutuhan tidur rata-rata orang dewasa 7-8 jam per 24 jam. Kurangnya istirahat dapat mempengaruhi ibu dalam beberapa hal: mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan mengurus bayi dan dirinya sendiri.

f. Seksual

Dinding vagina kembali pada keadaan sebelum hamil dalam waktu 6-8 minggu. Secara fisik hubungan suami istri aman dilakukan saat darah merah berhenti, dan ibu dapat memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina

tanpa rasa sakit. Sebaiknya hubungan seksual dapat ditunda hingga 40 hari setelah persalinan karena pada saat itu diharapkan organ-organ telah pulih kembali.

g. Perawatan Payudara dan Menyusui

Payudara terutama puting susu harus selalu dijaga kebersihannya. Perawatan payudara telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting susu lemas, tidak keras, dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola dengan air susu ibu (ASI) setelah itu barulah bayi disusui. Sejak hamil konseling tentang pentingnya ASI harus dijelaskan kepada ibu. Sehingga segera setelah bayi lahir, ibu sudah mengerti dan tidak segan lagi menyusui bayinya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ibu yang menyusui bayinya dapat mengurangi resiko dirinya terkena depresi post partum sebab hormon laktogenik, oksitosin dan prolaktin yang diproduksi saat menyusui, berhubungan dengan ansiolitik dan efek antidepresan. Pentingnya pemberian ASI ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/ 2; 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun

bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Penyusuan selama dua tahun, walaupun diperintahkan namun tidak diwajibkan. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan “ bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan.

Dari sini dipahami, adanya tingkat penyusuan: pertama, tingkat sempurna yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. Kedua, masa cukup, yaitu kurang dari masa tingkat sempurna dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya dengan sengaja.

Dari ayat ini, terlihat betapa Al-Qur'an sangat menegaskan pentingnya ASI. Untuk itu bidan harus memberikan konseling kepada ibu, agar menyusui anaknya paling tidak selama enam bulan atau bahkan hingga 2 tahun bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuannya.

#### h. Keluarga Berencana

*Kontrasepsi* berasal dari kata *kontra* yang berarti mencegah atau melawan dan *konsepsi* yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma yang

mengakibatkan kehamilan. Idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali setiap pasangan harus menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan tentang keluarganya (Bahiyatun, 2013). Sedangkan menurut pendapat lain, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen (Firdayanti, 2012).

Selama masa perawatan pasca persalinan ibu perlu diberikan konseling mengenai kontrasepsi. Bila ibu menyusui secara maksimal (8-10 kali sehari), ibu akan mendapatkan efek kontrasepsi *Lactational Amenorrhoea* (LAM) selama 6 minggu. Namun setelah 6 minggu diperlukan kontrasepsi alternatif seperti pil progestin, suntik tiga bulan atau suntik *Depot Medroksiprogesteron Asetat* (DMPA), alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), atau menggunakan diafragma/kondom (Prawirohardjo, 2014).

i. Latihan Senam Nifas

Senam nifas penting dilakukan untuk mengembalikan otot-otot perut dan panggul menjadi normal. Ibu merasa lebih kuat dan ini menyebabkan otot perutnya menjadi lebih kuat sehingga mengurangi rasa sakit pada punggung. Menurut Wulansari,dkk manfaat senam nifas diantaranya :

- 1) Membantu memperbaiki sirkulasi darah.
- 2) Memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan.

- 3) Memperbaiki otot tonus, pelvis dan pereganga otot abdomen.
- 4) Membantu ibu lebih rileks dan segar pasca persalinan.
- 5) Memperbaiki dan memperkuat otot panggul.

## 9. Tanda Bahaya Masa Nifas

Tanda-tanda bahaya masa nifas menurut Maulani,dkk. (2015) antara lain:

- a. Perdarahan hebat atau peningkatan darah secara tiba-tiba atau pembalut penuh dalam waktu setengah jam telah mengganti 2 kali pembalut.
- b. Pengeluaran cairan vaginal dengan bau busuk.
- c. Rasa nyeri diperut bagian bawah atau punggung.
- d. Sakit kepala yang terus menerus atau, nyeri epigastrik, atau masalah penglihatan.
- e. Pembengkakan pada wajah dan tangan.
- f. Demam, muntah, rasa sakit pada waktu pembuangan air seni, atau merasa tidak enak badan.
- g. Payudara yang merah, panas, atau sakit.

## B. Tinjauan Khusus tentang Nifas dalam Islam

Masalah haid, nifas dan istihadhah adalah masalah yang lazim diketahui oleh setiap muslimah. Karena masalah tersebut berkaitan dengan prasyarat peribadatan, khususnya bagi kaum wanita, seperti ibadah shalat, puasa, tawaf (umrah dan haji), pernikahan, mapun masalah kesehatan.

Menurut Asy-Syabashi (2007) nifas adalah darah yang keluar dari perempuan ketika dan setelah melahirkan, sekalipun wanita itu melahirkan

sebelum genap bulan kandungan, seperti yang terjadi pada kondisi keguguran. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi nifas, seandainya seorang wanita melahirkan, lalu darahnya berhenti sama sekali setelah melahirkan, walau hanya sejam atau beberapa menit saja, maka selesailah nifasnya dan wajiblah ia melakukan apa yang wajib dilakukan oleh wanita-wanita yang dalam keadaan suci, yaitu shalat, puasa, dan sebagainya. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ibu nifas adalah :

#### 1. Shalat

Ummu Salamah ra mengatakan “Orang yang nifas di masa Rasulullah tidak melakukan shalat selama empat puluh hari”. Imam At-Tirmidzi mengatakan. “Ahli ilmu dari para sahabat Nabi SAW para tabi’in dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita yang sedang nifas itu meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali apabila ia suci sebelum itu, maka ia harus segera mandi dan melakukan shalat.” Jika ia masih melihat darah selama empat puluh hari, kebanyakan ahli ilmu mengatakan bahwa setelah itu shalat tidak boleh lagi di tinggalkan.

Sekalipun dalam keadaan nifas wanita haram melakukan shalat, tetapi dia tidak perlu mengqada shalat yang luput pada waktu nifas. Itu adalah untuk menghilangkan kesulitan, karena shalat banyak berulang (waktunya dapat berulang). Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah Binti Abi Hubaisy ra, “Tinggalkanlah shalat selama hari-hari haidmu, kemudian (selesai setelah haid) mandilah dan shalatlah.” Hadis ini sekalipun

berkaitan dengan haid juga mencakup nifas, karena nifas itu seperti haid berdasarkan ijmak sahabat (Asy-Syarbashi, 2007)

## 2. Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya di hari yang lain.

## 3. Tawaf

Imam Ahmad, Turmudzi, dan Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah Bin Abbas ra, dimana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya wanita yang sedang haid atau nifas boleh mandi dan berihram, dan kemudian melaksanakan semua amalan-amalan ibadah haji, hanya saja mereka tidak boleh melakukan tawaf disekitar Ka’bah hingga mereka suci.” Siti Aisyah ra meriwayatkan sebuah hadis, dimana dia mengatakan,

Rasulullah SAW mendatangiku sementara aku sedang menangis (itu terjadi tatkala Siti Aisyah tengah melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW), lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, “Apakah engkau sedang haid? Aku menjawab, “Ya.” Rasulullah SAW kemudian berkata, “Sesungguhnya hal itu adalah ketetapan yang Allah SWT telah tetapkan bagi anak-anak perempuan Nabi Adam. Lakukanlah apa-apa yang harus dilakukan dalam ibadah haji, namun jangan engkau melakukan tawaf mengelilingi Ka’bah hingga engkau mandi.

Hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang haid atau nifas boleh melaksanakan semua amalan ibadah haji kecuali melakukan tawaf mengelilingi Ka’bah hingga darah haid atau nifas berhenti dan kemudian mandi (Asy-Syarbashi, 2007).

#### 4. Larangan bersenggama

Larangan bersenggama dan haram begitu pula bagi suaminya untuk menikmati segala sesuatu dan tubuhnya antara pusat dan lutut. Larangan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/ 2; 222:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Kata *mahidh* adalah tempat atau waktu haid atau haid itu sendiri. Pertanyaan di atas muncul, karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah saat mereka sedang haid. Pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid, tetapi bagaimana tuntutan Illahi kepada suami atau pada saat istrinya sedang haid, jawaban di atas, menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang haid dan bagaimana menghadapi mereka kala itu.

Sesaat setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, “Lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini dibenarkan) kecuali hubungan seks.”(Shihab, 2002).

Disini ditegaskan lagi kata *mahidh*, walaupun bisa jadi ada sementara orang yang merasa cukup menunjukannya dengan kata itu. Misalnya “Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu itu, atau pada tempat itu.” Dari redaksi ini yang dimaksud, karena ada gangguan terhadap istri yang secara hukum tidak mengakibatkan larangan ini. Penyebutan kata *mahidh* sekaligus untuk menggambarkan bahwa darah yang keluar dari wanita misalnya *istihadhah* yang tidak selalu menimbulkan gangguan yang sama dengan gangguan yang dialami saat haid. Karena itu, jika wanita mengalami *istihadhah* dia wajib shalat, tidak seperti kalau mereka haid.

Sedangkan segi kesehatan melarang berhubungan seks karena berhubungan seksual selama masa nifas mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko. Mudah terkena infeksi kuman yang hidup diluar akibat hubungan seksual ketika mulut rahim masih terbuka, bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi. Karena itulah Islam menganjurkan agar kaum muslim terbiasa dengan kebersihan fisik dan jiwa, kesucian rohani dan jasmani, kemurnian hati dan tubuh.

Nifas dan haid pada dasarnya berbeda. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu

sesudahnya atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit. Ibnu Taimiyah mengatakan: “Darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas.” Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari, dan maksudnya adalah rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan nifas (Dahri, 2015). Sedangkan haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kelahiran. Namun meskipun berbeda haid dan nifas mempunyai kesamaan larangan-larangan dalam Islam. Kecuali untuk wanita yang dalam keadaan *istihadhah*, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan bulannya (haid) atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Pada umumnya, wanita mengalami haid selama 6 - 8 hari paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari disebut dengan *istihadhah*. Seorang wanita yang mengalami *istihadhah* dilarang meninggalkan ibadahnya, seperti salat, puasa dan ibadah lainnya.

Dalam keadaan seperti ini, maka cara untuk membedakan antara masa haid dan *istihadhah* adalah dengan cara mengenali bagaimana ciri – cirinya antara darah haid dan darah *istihadhah*. Jika dalam keadaan tidak mengetahui perbedaan darah haid dan darah *istihadhah* maka menurut hadis “Jika darah itu haid maka sesungguhnya darahnya kehitaman dan tidak dikenali. Jika demikian kondisinya maka tahanlah dirimu dari melakukan shalat. Sedangkan jika kondisinya tidak demikian, maka berwudhulah dan shalatlah

karena sesungguhnya itu hanyalah dari urat (rahim) yang terbuka.” (HR. Abu Dawud dan An Nasa’I dan dishahikan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim).

Bagi wanita yang sedang haid, batas darah haid yaitu 12-15 hari selebihnya termasuk dalam *istihadhah* dan bagi wanita nifas batas darah nifas yaitu 40-60 hari dan selebihnya terkena hukum darah *istihadhah*. Sehingga wanita yang mengalami darah *istihadhah*, wajib baginya untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah SWT seperti shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

Selain larangan dalam masa nifas, terdapat pula anjuran yang dapat dilakukan saat menjalani masa nifas. Ibadah lain yang dapat dilakukan saat masa nifas adalah:

#### 1. Membaca Al-Qur’an

Menurut Syaikh Utsaimin membaca al-Qur’an bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, jika dengan mata atau dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan maka tidak apa-apa hukumnya, misalnya mushaf atau lembaran Al-Qur’an diletakkan lalu matanya menatap ayat-ayat seraya hatinya membaca. Hal ini boleh tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun jika perempuan haid itu membaca Al-Qur’an dengan lisan, maka ada perbedaan di kalangan ulama. Namun agar tidak memperpanjang permasalahan secara singkat menurut Syaikh Utsaimin lebih utama bagi perempuan yang sedang haid tidak membaca al-Qur’an

secara lisan, kecuali jika diperlukan. Misalnya, seorang guru wanita yang perlu mengajarkan membaca Al-Qur'an kepada siswanya.

## 2. Mendengarkan Bacaan Qur'an

Perempuan yang sedang haid dan nifas diperbolehkan mendengarkan bacaan al-Qur'an orang lain.

## 3. Berdzikir

Perempuan yang sedang haid dan nifas diperbolehkan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, seperti dzikir, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan bismillah ketika hendak makan atau pekerjaan lainnya.

Allah SWT menyeru kepada umatnya agar berdzikir dan memuji kepada-Nya. Dia mendorong mereka untuk bertasbih, mensucikan, memuji, dan mengagungkan Allah, dan menjadikan dzikir sebagai sarana paling agung untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Faedah dzikir yang terbesar adalah membawa ketenangan dalam hati. Dengan berdzikir kepada Allah SWT hati menjadi tenang. Apalagi dikala sedang haid maupun nifas, psikis dan jiwa para perempuan terkadang mengalami kegundahan. Maka dari itu, berdzikir merupakan salah satu sarana untuk menenangkan jiwa dan mengobati hati yang lagi kosong.

## 4. Berdoa

Perempuan yang sedang haid atau nifas diperbolehkan memanjatkan doa. Doa merupakan perintah Allah, sehingga berdoa itu

termasuk ibadah. Banyak sekali doa yang bisa diucapkan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Melafalkan doa-doa tersebut akan menghindarkan ibu dari kekosongan hati, sehingga memberikan ketenangan. Doa yang dapat dipanjatkan seperti doa Nabi Ibrahim AS yang mendoakan anaknya seperti terdapat dalam Q.S Ibrahim/ 14; 40:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.”

Dan anjuran yang paling penting bagi ibu nifas yaitu menyusui anaknya. Selain dalam Q.S Al-Baqarah/ 2; 233, menyusui juga dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas/ 28; 7:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي  
الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau khawatir dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) rasul.

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya seorang ibu untuk menyusui bayinya seperti ibu Musa yang tetap dianjurkan menyusui anaknya dalam keadaan genting.

### **C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan**

#### **1. Pengertian Asuhan Kebidanan**

Asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, bersalin, nifas, bayi setelah lahir dan keluarga berencana (Varney, 2007).

Asuhan Kebidanan adalah prosedur tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dalam lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan memperhatikan pengaruh-pengaruh sosial, budaya, psikologis, emosional, spiritual, fisik, etik, dan kode etik serta hubungan interpersonal dan hak dalam mengambil keputusan dengan prinsip kemitraan dengan perempuan dan mengutamakan keamanan ibu, janin dan penolong serta kepuasan perempuan dan keluarganya (Tresnawati, 2012).

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh seorang bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan intervensi, pelaksanaan dan evaluasi.

## 2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan menurut varney (7 Langkah), meliputi :

### a. Langkah I: Pengumpulan data/ analisa data

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Yang termasuk data subjektif antara lain biodata, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, biopsikologi spritual, pengetahuan klien.

Data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus. Data objektif terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi), pemeriksaan penunjang (laboratorium, catatan baru dan sebelumnya). Data objektif adalah menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien.

Pada kasus post partum normal pengumpulan data dilakukan dengan anamnesa identitas pasien, setelah itu memeriksa tanda-tanda vital, melihat riwayat lab ibu sebelumnya baik riwayat saat hamil maupun riwayat saat persalinan, melakukan pemeriksaan fisik dan memperhatikan apakah seluruh pemeriksaan ditemukan dalam keadaan normal.

Selain hal di atas, yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologis ibu. Ibu nifas yang baru saja melewati masa persalinan, cenderung lebih sensitif sehingga perlu diberikan support dan perhatian serta selalu mengingatkan ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yaitu anjurkan ibu untuk memperbanyak doa dan dzikir agar dimudahkan dalam menjalani masa nifasnya. Anjuran ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al- Asr/ 103; 3:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا  
بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

b. Langkah II: Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Pada kasus post partum normal dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengeluh perutnya terasa mules. Pada data objektif ditemukan tanda vital baik, proses menyusui baik, lochea normal. Dan kebutuhan pada ibu nifas dengan post partum normal yaitu tetap menjaga keadaan ibu tetap baik . Dalam melakukan asuhan kebidanan hendaknya selalu berdoa kepada Allah SWT

agar asuhan yang diberikan dapat meringankan keluhan ibu, sehingga merasa lebih baik dari sebelumnya. Anjuran ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah/ 2; 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Terjemahnya :

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintahku) dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran.

c. Langkah III: Identifikasi diagnosa/ masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Selain itu, memberikan pemahaman kepada ibu bahwa masa nifas adalah anugerah dari Allah SWT, diberikan kepercayaan agar mampu menghadapi, merawat, dan sabar dengan keluhan yang dialami selama masa nifas. Pada kasus post partum normal masalah yang biasa timbul bisa saja terjadi tanda bahaya nifas seperti demam, lochea berbau dan lain sebagainya.

Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik ditemukan masalah potensial yang bersifat emergency seperti perdarahan tentunya bidan sudah harus menetapkan penanganan yang tepat yang akan dilakukan pada asuhan langkah 4 yaitu menindak lanjuti tindakan emergency.

d. Langkah IV: Tindakan emergency/ kolaborasi

Melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus post partum normal kasus emergency yang dapat terjadi seperti perdarahan post partum yang harus segera ditangani dengan segera dan memerlukan tindakan kolaborasi sebab ibu nifas yang mengalami perdarahan beresiko kehilangan banyak darah yang bisa menyebabkan ibu mengalami syok hipovolemik. Dalam menangani tindakan emergency, bidan hendaknya berusaha dan tetap berdoa kepada Allah SWT agar tindakan yang diberikan kepada ibu dapat menolong ibu dari keadaan emergency.

e. Langkah V: Rencana tindakan (merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi.

Pada kasus post partum normal rencana asuhan yang akan diberikan yaitu mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital, observasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia, observasi adakah tanda-tanda bahaya yang timbul seperti terjadi perdarahan hebat, pengeluaran cairan vaginal yang berbau busuk, rasa nyeri hebat pada perut bagian bawah atau punggung, nyeri kepala hebat hingga gangguan penglihatan, pembengkakan pada wajah dan tungkai, demam hingga muntah, payudara merah, bengkak dan keras. Lalu ibu dianjurkan agar menjaga kebersihan vulva (genitalia), yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap selesai BAK dan BAB atau setiap lembab, menganjurkan pada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang terutama makanan yang mengandung protein seperti telur, ikan atau daging sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan. Lalu menganjurkan ibu untuk membawa anaknya ke pusat kesehatan untuk diberikan imunisasi hingga lengkap. Selain itu untuk psikologis dan ketenangan batin ibu, ibu dianjurkan sering membaca Al-Qur'an, berdzikir dan hal-hal lain yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

- f. Langkah VI: Implementasi (melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang di uraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau

anggota tim kesehatan lainnya. Walau bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Pada kasus post partum normal perencanaan tindakan disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan pada langkah ke lima. Dalam memberikan asuhan hendaknya selalu berdoa kepada Allah SWT, seperti membaca basmallah tiap kali melakukan tindakan serta menyerahkan hasilnya kepada-Nya setelah kita berusaha dengan melakukan tindakan tersebut.

g. Langkah VII: Evaluasi.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya.

Pada kasus post partum normal mengevaluasi kembali dari asuhan yang telah diberikan yaitu tanda-tanda vital normal, TFU sesuai, kontraksi uterus baik teraba keras, lochia normal, tidak ada tanda bahaya yang timbul, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, ibu mengerti dan bersedia melakukan hal yang telah dianjurkan. Apapun hasil dari asuhan yang telah diberikan kepada ibu merupakan kehendak dari Allah SWT, hendaknya kita selalu bersyukur atas apapun hasil yang diterima, jika hasil asuhan yang kita berikan kepada ibu sesuai dengan harapan kita harus bersyukur kepada-Nya dan jika tidak sesuai harus tetap bersabar dan melihat,

memperbaiki, dan mengulang kembali asuhan agar hasilnya menjadi lebih baik.

### 3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Metode yang digunakan dalam pendokumentasian data perkembangan asuhan kebidanan ini adalah SOAP :

#### a. Subyektif (S)

Data dari pasien didapat dari anamnesa yang merupakan langkah I Varney.

#### b. Obyektif(O)

Hasil pemeriksaan fisik pemeriksaan diagnostik dan pendukung lain untuk mendukung asuhan.

#### c. Assesment (A)

Kesimpulan apa yang dibuat dari data subyektif dan obyektif tersebut merupakan langkah II, III, IV Varney.

#### d. Planning (P)

Menggambarkan pelaksanaan dari tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment sebagai langkah V, VI, VII Varney.

Adapun planning yang dapat dilakukan pada kasus post partum normal adalah :

Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan) yaitu mengobservasi tanda- tanda vital ibu serta mengobserfasi kontraksi uterus dan TFU ibu, mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, menganjurkan ibu untuk selalu

menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genetaliaanya, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menganjurkan pada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya, melakukan hubungan antar ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat dengan cara memandikan dan membedong bayi.

Kunjungan II (6 hari setelah persalinan) yaitu memastikan involusio uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus dan tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal, memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

Kunjungan ke III (2 minggu setelah persalinan) yang dilakukan pada kunjungan ketiga sama halnya dengan kunjungan kedua. Terakhir kunjungan ke IV (6 minggu setelah persalinan) yaitu menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami, memberikan konseling untuk KB secara dini.

4. Standar prosedur operasional (SOP) perawatan ibu post partum di ruang nifas  
RSUD Syekh Yusuf Gowa

a. Pengertian

Melakukan observasi pasien setelah melahirkan (dilakukan 2 jam post partum atau setiap hari selama post partum).

b. Tujuan

- 1). Untuk mencegah segala resiko atau komplikasi post partum
- 2.) Memberikan kenyamanan kepada ibu.

c. Prosedur

1.) Prosedur persiapan

- a.) Persiapan pasien: Pasien diberitahu maksud dan tujuan serta tindakan yang akan dilakukan dan pasien dianjurkan dalam posisi tidur santai.
- b.) Persiapan alat: Tensi meter, termometer, bengkok, air DTT, pembalut, *handscoon*.

2.) Pelaksanaan prosedur

- a.) Ucapkan salam
- b.) Lakukan identifikasi
- c.) Lakukan cuci tangan
- d.) Pakai *handscoon*
- e.) Siapkan peralatan yang diperlukan
- f.) Periksa vital sign
- g.) Lakukan pemeriksaan meliputi fundus uteri, kontraksi uterus, miksi, defikasi dan odem kaki
- h.) Desinfeksi daerah vulva, periksa lochea, perdarahan, jahitan perineum
- i.) Anjurkan pasien untuk mobilisasi secepatnya

j.) Anjurkan pasien untuk laktasi sedini mungkin k.) Motivasi KB dan penyuluhan antara lain: gizi, ibu menyusui, perawatan payudara, cara memandikan bayi, perawatan tali pusat, cara menyusui yang benar, imunisasi, perawatan bayi dirumah, jadwal kontrol

l.) Bereskan peralatan

m.) Lepas handscoon

n.) Lakukan cuci tngan

o.) Catat dalam rekam medis pasien



**BAB III**  
**STUDI KASUS**

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY “N”

DENGAN POST PARTUM NORMAL DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 04 JULI 2018

No Register	: 507xxx
Tanggal Partus	: 04 Juli 2018, Pukul 07.00 WITA
Tanggal Masuk Ruang Nifas	: 04 Juli 2018, Pukul 09.00 WITA
Tanggal Pengkajian	: 04 Juli 2018, Pukul 09.00 WITA
Pengkaji	: Annisa Nurul Hikmah

A. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

1. Identitas istri/suami

Nama	: Ny “N” / Tn “A”
Umur	: 18 tahun / 18 tahun
Nikah/Lamanya	: 1 kali / 1 tahun
Suku	: Makassar / Makassar
Agama	: Islam / Islam
Pendidikan	: SMA / SMP
Alamat	: Jl. Jeruk Kamp. Lett

## 2. Keluhan Utama

Post partum 2 jam yang lalu

## 3. Riwayat Keluhan Utama

Ibu baru saja selesai bersalin yaitu tanggal 04 Juli 2018 pukul 07.00 WITA. Ibu merasa sedikit lemas akibat kelelahan pasca persalinan dan merasa sedikit nyeri pada daerah jalan lahir.

## 4. Riwayat Kehamilan dan Persalian

### a. Riwayat Kehamilan

- 1.) Ibu mengatakan ini adalah anak yang pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
- 2.) Hari pertama haid terakhir tanggal 08 Oktober 2017
- 3.) Hari taksiran persalinan tanggal 15 Juli 2018
- 4.) Ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 8 kali di BPM Ika dan telah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali yaitu TT 1 pada tanggal 3 April 2018 dan TT II tanggal 3 Mei 2018.

## b. Riwayat Persalinan /Kelahiran

Kala I	Ibu datang pada pukul 04.00 wita, dengan GIP0A0, gestasi 38 minggu 3 hari, pembukaan 8 cm.
Kala II	Kala II berlangsung 20 menit. Ibu melahirkan secara normal (pervaginam) dengan tenaga mendedan ibu sendiri.
Kala III	Dilakukan manajemen aktif kala III. Plasenta lahir lengkap (selaput dan kotiledon lengkap), perdarahan 100 cc, tidak ada ruptur perineum, lama kala III yaitu 15 menit.
Kala IV	Kala IV berlangsung normal, pemantauan kala IV dilakukan sampai dengan 2 jam post partum.

Tabel 3.1 Riwayat Persalinan (Sumber: Data Primer)

## 5. Riwayat Kesehatan Ibu

- a. Ibu tidak memiliki riwayat alergi makanan dan obat-obatan
- b. Ibu tidak memiliki ketergantungan obat, alkohol, dan rokok
- c. Ibu tidak pernah mengalami penyakit kandungan maupun penyakit menular seksual.
- d. Tidak ada riwayat penyakit yang menyertai saat kehamilan seperti sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan kejang.

## 6. Riwayat Kesehatan Keluarga

- a. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit asma, diabetes mellitus, jantung, hipertensi, dsb.
- b. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit menular dan penyakit turunan.

## 7. Riwayat Reproduksi

- a. *Menarche* : 12 tahun
- b. Siklus Haid : Tidak teratur

- c. Lamanya Haid : 4-7 hari
- d. Keluhan Haid : Tidak Ada

8. Riwayat KB

Ibu belum pernah menjadi akseptor KB.

9. Data psikologi

Ibu dan keluarga sangat senang dengan kelahiran bayinya

10. Riwayat Sosial Ekonomi

- a. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
- b. Hubungan antara keluarga baik
- c. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga.

11. Data Spiritual

- a. Ibu dan suami senantiasa berdoa agar anaknya selalu sehat.
- b. Selama kehamilan, proses persalinan dan masa nifas ini ibu senantiasa berdoa dan berserah diri pada Allah SWT.

12. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari, dengan nasi, sayur, lauk pauk, dan kadang-kadang buah. Ibu minum 7-8 gelas/ hari.

b. Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 3-4 kali/hari, berwarna kuning muda dengan bau khas amoniak. BAB sebanyak 1-2 kali/hari

c. Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam/ hari dan tidur malam 7-8 jam/ hari

d. *Personal Hygiene*

Ibu mandi 2 kali sehari memakai sabun, keramas tiap rambut kotor dengan menggunakan sampo, sikat gigi 2 kali dalam sehari.

13. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat

b. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

c. Mulut

Inspeksi : Bibir tidak pucat, gigi tidak karies.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfa dan vena jugularis

e. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae livid.

Palpasi : Uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, tidak ada nyeri tekan.

g. Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varises tampak pengeluaran lochea rubra

Palpasi : Tidak ada edema

h. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Tidak ada edema

B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Dan Masalah Aktual

Diagnosa : Post partum 2 jam yang lalu

**Data subjektif:**

Ibu melahirkan secara normal (pervaginam) tanggal 04 Juli 2018 jam pukul 07.00 wita.

**Data objektif**

- a. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat
- b. Kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar
- c. Tampak pengeluaran lochea rubra

**Analisa dan interpretasi data**

- a. Uterus akan mengalami proses involusi. Proses involusi adalah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah melahirkan.

Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).

- b. *Lochea* adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai reaksi basa/alkalis yang dapat membuat orgasme lebih cepat berkembang daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. *Lochea* mengalami perubahan karena proses involusi. *Lochea* yang muncul pada hari pertama sampai hari ketiga masa postpartum adalah *lochea rubra* (Saleha, 2013).
- c. *Lochea rubra* adalah *lochea* yang muncul di hari pertama sampai hari ketiga. Warnanya berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo dan mekoneum (Saleha, 2013).

### C. Langkah III: Identifikasi Diagnosa Dan Masalah Potensial

Diagnosa potensial : Bendungan payudara, subinvolusi, infeksi

#### **Data Subjektif**

Ibu baru saja bersalin dan ini merupakan post partum hari pertama

Ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah ada meskipun sedikit

#### **Data Objektif**

- a. Terdapat pengeluaran ASI
- b. TFU I jari di bawah pusat
- c. Kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar
- d. Tampak pengeluaran lochea rubra

### **Analisa Dan Interpretasi Data**

- a. Uterus akan mengalami proses involusi. Proses involusi adalah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).
- b. Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mammae ibu, yang berguna sebagai makanan bayinya. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal. Sejak hamil konseling tentang pentingnya ASI harus dijelaskan kepada ibu agar segera setelah bayi lahir, ibu sudah mengerti dan tidak segan untuk menyusui bayinya. Ibu yang menyusui bayinya dapat mencegah terjadinya bendungan payudara yang disebabkan oleh penyempitan duktus laktiferi atau oleh kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna (Walyani, 2015).
- c. Uterus teraba bundar dan keras adalah salah satu tanda terjadi involusi uterus. Bila uterus mengalami kegagalan dalam involusi maka akan terjadi subinvolusi uterus yang ditandai dengan tidak ada perubahan progresif terhadap ukuran uterus, uterus teraba lunak dan kontraksi buruk, perdarahan pervaginam abnormal.

- d. Ibu nifas harus menjaga *personal hygiene* terutama *vulva hygiene* agar pengeluaran lochea dapat berjalan normal. Ibu harus rajin mengganti pembalut agar vagina tidak lembab dan mencegah terjadi infeksi.

#### D. Langkah IV: Tindakan Segera/ Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan segera.

#### E. Langkah V: Rencana/Intervensi

- Diagnosa : Post partum 2 jam yang lalu
- Masalah aktual : Post partum 2 jam yang lalu
- Masalah potensial : Antisipasi terjadi bendungan payudara, subinvolusi, infeksi
- Tujuan : 1. Masa nifas hari pertama berlangsung normal  
2. Ibu dapat beradaptasi dengan kondisi pasca melahirkan
- Kriteria : 1. Masa nifas hari pertama berlangsung normal  
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal  
a. Tekanan Darah : Sistol 90-130 mmHg, diastol 60-90 mmHg  
b. Nadi : 80 – 100 kali/menit  
c. Suhu : 36,5-37,5 C  
d. Pernapasan : 16-24 kali/ menit
3. Kontraksi uterus baik , teraba keras dan bundar
4. TFU turun 1 cm setiap hari
5. Pengeluaran lochea sesuai waktunya

Intervensi tanggal 04 Juli 2018 pukul 09.15

1. Cuci tangan/ pakai *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional: Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi silang

2. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Rasional: Dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengetahui dan mengerti keadaannya

3. Observasi tanda-tanda vital ibu

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan umum ibu

4. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Rasional: TFU merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusio berlangsung normal, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm setiap hari yang teraba keras dan bundar. Dengan mengobservasi kontraksi uterus dapat mencegah terjadinya perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013).

5. Anjurkan ibu selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau setiap lembab untuk menghindari infeksi.

Rasional: Dengan rajin mengganti pembalut, daerah kemaluan ibu tidak akan lembab sehingga menghindarkan ibu dari infeksi.

6. Anjurkan ibu mencuci dan membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan kebelakang, baru kemudian membersihkan daerah disekitar anus hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Rasional: Membersihkan daerah disekitar vulva terlebih dahulu, dari depan kebelakang, baru kemudian membersihkan daerah disekitar anus dapat mencegah kuman dari anu masuk ke vagina sehingga kebersihan alat genitalia dapat terjaga.

7. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Rasional: Dengan menjaga kebersihan diri ibu merasa nyaman, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka yang terdapat pada diri ibu.

8. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Rasional: Mobilisasi dini bertujuan agar sirkulasi darah ke jaringan lancar sehingga mencegah terjadinya tromboflebitis dan mempercepat proses involusio uteri

9. Berikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya istirahat yang cukup

Rasional: Memulihkan kembali tenaga ibu setelah melahirkan.

10. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Rasional: ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. Dengan sesering mungkin menyusui akan memacu semakin banyak pula produksi oksitosin sehingga dapat mempercepat proses involusi uterus pada ibu (Saleha, 2013).

11. Ajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, posisi menyusui serta cara perawatan payudara yang baik dan benar

Rasional: Dengan melakukan perawatan payudara, kebersihan payudara dapat terjaga dan mencegah terjadinya bendungan ASI. Lalu dengan mengetahui teknik dan posisi menyusui yang benar, bayi dapat lebih baik dan mudah menghisap ASI agar payudara ibu tidak lecet.

12. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

Rasional: Makanan yang mengandung gizi seimbang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu terutama untuk mengembalikan stamina ibu.

Gizi pada ibu nifas berkaitan erat dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi.

13. Jelaskan dan anjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan.

Rasional: Saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko saat berhubungan seks. Berhubungan seksual ketika mulut rahim masih terbuka akan mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

14. Beri konseling tentang KB

Rasional: Dengan memberikan konseling dini tentang KB pada ibu sebelum kembali kerumah ibu dapat memikirkan KB apa yang akan dipakai untuk memberikan jarak kehamilan.

15. Jelaskan dan anjurkan ibu untuk meminum obat analgetik dan zat besi yang telah diberikan.

Rasional: Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu, zat besi dibutuhkan karena pada masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013).

16. Anjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Rasional : Dengan mendekatkan diri, ibu akan merasa lebih tenang sehingga ibu dapat menerima kondisinya bahwa semuanya adalah berkah yang diberikan Allah SWT.

F. Langkah VI: Implementasi

Tanggal 04 Juli 2018 pukul 09.15

1. Mencuci tangan/ pakai *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil: Pemeriksa telah memakai *hand sanitizer*

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini.

3. Menganjurkan ibu selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

4. Menganjurkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring ke kanan dan kiri di atas tempat tidur dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih.

7. Memerikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya istirahat yang cukup

Hasil: Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan.

8. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

9. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, posisi menyusui serta cara perawatan payudara yang baik dan benar. Memberitahu ibu sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola dengan air susu ibu (ASI) setelah itu barulah bayi disusui.

Hasil: Ibu mengerti dan sedang mempraktekannya.

10. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

11. Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Memberi konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI.

Hasil: Ibu mengerti dan akan mendiskusikannya dengan suami.

13. Menganjurkan ibu untuk meminum obat yang telah diberikan.

- a. Asam Mafenamat

Sebagai obat analgetik, untuk membantu meredakan rasa sedikit nyeri pada jalan lahir yang dirasakan ibu.

b. Fero Sulfat

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil: Ibu bersedia mengkonsumsi obatnya

14. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, dan berdoa seperti doa Nabi Ibrahim AS yang mendoakan anaknya dalam Q.S Ibrahim/ 14; 40.

Hasil : Ibu mengerti, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, dan berdoa.

G. Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 04 Juli 2018 pukul 09.45 WITA

1. Masa nifas hari pertama berlangsung normal ditandai dengan:

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- c. TFU 1 jari dibawah pusat
- d. Lochea rubra tidak berbau busuk
- e. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1.) Tekanan Darah : 120/70 mmHg

2.) Nadi : 82x/ menit

3.) Suhu : 37°C

4.) Pernapasan : 22x/ menit

f. Ibu telah menyusui bayinya

g. Ibu bersedia mengkonsumsi makan makanan bergizi serta menjaga *personal hygiene*.

h. Ibu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

2. Potensial terjadi salah satu tanda bahaya masa nifas

Tidak ada tanda-tanda bahaya yang ditemukan. Kondisi ibu dalam keadaan normal.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE  
PADA NY “N” DENGAN POST PARTUM NORMAL  
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA  
TANGGAL 04 JULI 2018

No Register : 507xxx  
Tanggal Partus : 04 Juli 2018, Pukul 07.00 WITA  
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 04 Juli 2018, Pukul 09.00 WITA  
Tanggal Pengkajian : 04 Juli 2018, Pukul 09.00 WITA  
Pengkaji : Annisa Nurul Hikmah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny “N” / Tn “A”  
Umur : 18 tahun / 18 tahun  
Nikah/Lamanya : 1 kali / 1 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMP  
Alamat : Jl. Jeruk Kamp. Lette

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ini merupakan anak pertama tidak pernah keguguran sebelumnya
2. Ibu melahirkan tanggal 04 Juli 2018 pukul 07.00 WITA
3. Ibu merasa lelah setelah melahirkan
4. Ibu merasa sedikit nyeri pada jalan lahir
5. Ibu merasa senang atas kelahiran bayinya
6. ASI sudah keluar tapi masih sangat sedikit
7. Ibu sudah BAK namun belum BAB
8. Tidak ada riwayat menderita penyakit jantung, DM, Hepatitis, tumor, hipertensi, PMS, dan TBC.
9. Tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol, dan merokok.
10. Ibu dan keluarga tidak memiliki penyakit turunan maupun menular
11. Ibu belum pernah menjadi akseptor KB

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82x/ menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/ menit

4. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat

b. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

c. Mulut

Inspeksi : Bibir tidak pucat, gigi tidak karies.

d. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis

e. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae livid.

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari dibawah pusat, kandung kemih kosong.

g. Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varises tampak pengeluaran lochea rubra

Palpasi : Tidak ada edema

h. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Tidak ada edema

**ASSESSMENT (A)**

PIA0, Post partum dua jam yang lalu

**PLANNING (P)**

Tanggal 04 Juli 2018 pukul 09.15 WITA

1. Mencuci tangan/ pakai *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil: Pemeriksa telah memakai *hand sanitizer*

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini.

3. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil: Tekanan darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/menit

4. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Hasil: TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik dan teraba keras serta bundar. Pengeluaran lochea rubra, tidak berbau.

5. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi .

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

6. Menganjurkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring ke kanan dan kiri di atas tempat tidur dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih.

9. Memerikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya istirahat yang cukup

Hasil: Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan.

10. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

11. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, posisi menyusui serta cara perawatan payudara yang baik dan benar. Memberitahu ibu sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola dengan air susu ibu (ASI) setelah itu barulah bayi disusui

Hasil: Ibu mengerti dan sedang mempraktekannya.

12. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

13. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

14. Memberi konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI.

Hasil: Ibu mengerti dan akan mendiskusikannya dengan suami.

15. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk meminum obat analgetik dan zat besi yang telah diberikan.

a. Asam Mafenamat

Sebagai obat analgetik, untuk membantu meredakan rasa sedikit nyeri pada jalan lahir yang dirasakan ibu.

b. Fero Sulfat

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil: Ibu bersedia mengkonsumsi obatnya

15. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, dan berdoa seperti doa Nabi Ibrahim AS yang mendoakan anaknya dalam Q.S Ibrahim/ 14; 40.

Hasil : Ibu mengerti, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, dan berdoa.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE  
PADA NY “N” DENGAN POST PARTUM NORMAL  
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA  
TANGGAL 05 JULI 2018

No Register : 507xxx  
Tanggal Partus : 04 Juli 2018, Pukul 07.00 WITA  
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 04 Juli 2018, Pukul 09.00 WITA  
Tanggal Pengkajian : 05 Juli 2018, Pukul 14.00 WITA  
Pengkaji : Annisa Nurul Hikmah

**IDENTITAS ISTRI/SUAMI**

Nama : Ny “N” / Tn “A”  
Umur : 18 tahun / 18 tahun  
Nikah/Lamanya : 1 kali / 1 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMP  
Alamat : Jl. Jeruk Kamp. Lette

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ini mengatakan ASI sudah keluar tapi masih sedikit
2. Ibu sudah BAB setelah diberi obat
3. Ibu mengatakan sudah tidak merasa lelah
4. Ibu mengatakan rasa nyeri sudah tidak terlalu terasa
5. Ibu mengatakan pengeluaran darah tidak sebanyak kemarin

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 82x/ menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/ menit

4. Puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI
5. Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 2 jari dibawah pusat, kandung kemih kosong.
6. Tampak pengeluaran lochea rubra

**ASSESSMENT (A)**

PIA0, Post partum hari kedua

## PLANNING (P)

Tanggal 05 Juli 2018 pukul 14.15 WITA

1. Mencuci tangan/ pakai *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil: Pemeriksa telah memakai *hand sanitizer*

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini.

3. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil: Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/menit

4. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Hasil: TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik dan teraba keras serta bundar. Pengeluaran lochea rubra, tidak berbau.

5. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi .

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

6. Menganjurkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring ke kanan dan kiri di atas tempat tidur dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih.

9. Memerikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya istirahat yang cukup

Hasil: Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan.

10. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

11. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, posisi menyusui serta cara perawatan payudara yang baik dan benar. Memberitahu ibu sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola dengan air susu ibu (ASI) setelah itu barulah bayi disusui

Hasil: Ibu mengerti dan sedang mempraktekannya.

12. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

13. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

14. Memberi konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI.

Hasil: Ibu mengerti dan masih mendiskusikannya dengan suami.

15. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk meminum obat analgetik dan zat besi yang telah diberikan.

- a. Asam Mafenamat

Sebagai obat analgetik, untuk membantu meredakan rasa sedikit nyeri pada jalan lahir yang dirasakan ibu.

- b. Fero Sulfat

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil: Ibu bersedia mengkonsumsi obatnya

16. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang

dapat dilakukan pada saat nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, dan berdoa seperti doa Nabi Ibrahim AS yang mendoakan anaknya dalam Q.S Ibrahim/ 14; 40.

Hasil : Ibu mengerti, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, dan berdoa.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
HARI KE- 3 PADA NY “N” TANGGAL 06 JULI 2018

Hari/tanggal : Jum'at, 06 Juli 2018, Pukul 14.00 WITA

Tempat : Rumah pasien

Pengkaji : Annisa Nurul Hikmah

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan ASI sudah mulai agak banyak
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah mulai fit
3. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran darah pada jalan lahir
4. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui
5. Ibu telah BAB 2 kali pada tanggal 05 Juli 2018 dan pagi ini dan BAK sering.

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 82x/ menit

Suhu : 36,9°C

Pernapasan : 22x/ menit

4. Puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI
5. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 3 jari dibawah pusat.
6. Tampak pengeluaran lochea rubra

### **ASSESSMENT (A)**

Post partum hari ketiga

### **PLANNING (P)**

Tanggal 06 Juli 2018 Pukul 14.15 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.
2. Meobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik  
Hasil: TFU 3 jari dibawah pusat, involusi berjalan normal
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada hari ketiga masih akan berwarna merah seperti yang terjadi pada ibu.  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah tidak khawatir

4. Mengajarkan ibu tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan yang dianjurkan

5. Mengajarkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi .

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

6. Mengajarkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Melakukan perawatan payudara untuk menjaga kebersihan payudara dan menghindari bendungan payudara.

- a. Membersihkan puting terlebih dahulu
- b. Memakai baby oil untuk mempermudah pengurutan
- c. Melakaukan pengurutan payudara

- 1.) Pengurutan yang pertama

Licinkan kedua tangan dengan minyak tempatkan kedua telapaktangan diantara kedua payudara lakukan pengurutan, dimulai

dari arah atas lalu arak sisi samping kiri kemudian kearah kanan, lakukan terus pengurutan kebawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara, ulangi gerakan 20-30 kali untuk setiap satu payudara.

2.) Pengurutan kedua

Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian dua atau tiga jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada puting susu. Lakukan tahap mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi kearah putting susu. Lakukan gerakan 20-30 kali.

3.) Pengurutan ketiga

Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut dan menggenggam dari pangkal menuju ke putting susu. Langkah gerakan 20-30 kali.

d. Mengompres payudara dimulai dari air hangat lalu kemudian dengan air dingin.

Hasil: Perawatan payudara telah dilakukan, ibu mengerti dan dapat mempraktekannya sendiri

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya

10. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

11. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Menanyakan ibu apakah sudah memilih alat kontrasepsi yang ingin digunakan

Hasil : Ibu masih memikirkan metode KB yang akan dia gunakan

13. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu mengerti dan mulai sering berdzikir, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci dan berdoa.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

HARI KE- 6 PADA NY “N” TANGGAL 09 JULI 2018

Hari/tanggal : Senin, 09 Juli 2018, Pukul 15.00 WITA

Tempat : Rumah pasien

Pengkaji : Annisa Nurul Hikmah

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan ASI banyak, lancar, dan ibu rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit
3. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna merah kekuningan
4. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 84x/ menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 20x/ menit

4. Puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI
5. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU pertengahan simpisis dan pusat
6. Tampak pengeluaran lochea sanguilenta

### **ASSESSMENT (A)**

Post partum hari keenam

### **PLANNING (P)**

Tanggal 09 Juli 2018 Pukul 15.15 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.
2. Meobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik  
Hasil: TFU pertengahan pusat- simpisis, involusi berjalan normal
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada hari keenam akan berwarna merah kekuningan yang merupakan cairan berupa darah bercampur lendir disebut dengan lochea sanguilenta seperti yang terjadi pada ibu.  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan yang dianjurkan

5. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

6. Menganjurkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya

9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Menanyakan ibu apakah sudah memilih alat kontrasepsi yang ingin digunakan

Hasil : Ibu mengatakan ingin memakai kb suntik 3 bulan

12. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu mengerti dan sering berdzikir, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci dan berdoa.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

HARI KE- 14 PADA NY “N” TANGGAL 17 JULI 2018

Hari/tanggal : Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 16.00 WITA

Tempat : Rumah pasien

Pengkaji : Annisa Nurul Hikmah

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan ASI banyak, lancar, dan rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit
3. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning kecoklatan
4. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui
5. Ibu mengatakan dia sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 82x/ menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/ menit

4. Payudara banyak mengeluarkan ASI

5. TFU tidak teraba
6. Tampak pengeluaran lochea serosa

### **ASSESSMENT (A)**

Post partum hari keempat belas

### **PLANNING (P)**

Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 16.15 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.
2. Meobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik  
Hasil: TFU tidak teraba, involusi berjalan normal
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada hari keempat belas akan berwarna kecoklatan yang merupakan cairan berupa sedikit darah dan banyak serum.  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
4. Menganjurkan ibu tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat.  
Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan yang dianjurkan
5. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

6. Mengajarkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Mengajarkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya

9. Mengajarkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Menjelaskan dan mengajarkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu mengerti dan sering berdzikir, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, shalawat Nabi dan berdoa.

12. Menganjurkan ibu untuk ke BPM dekat rumah guna memakai kb suntik 3 bulan

Hasil : Ibu mengatakan akan pergi ke BPM



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
HARI KE- 28 PADA NY “N” TANGGAL 31 JULI 2018

Hari/tanggal : Selasa, 31 Juli 2018, Pukul 16.30 WITA

Tempat : Rumah pasien

Pengkaji : Annisa Nurul Hikmah

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan ASI banyak, lancar, dan rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit dan ekspresinya tampak ceria
3. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna seperti keputihan
4. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui
5. Ibu mengatakan dia sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik
6. Ibu mengatakan sudah pergi ke BPM untuk memakai KB suntik 3 bulan pada tanggal 23 Juli 2018
7. Ibu mengatakan setelah memakai KB tidak ada keluhan yang dialaminya

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 82x/ menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/ menit

4. Payudara banyak mengeluarkan ASI
5. TFU tidak teraba
6. Tampak pengeluaran lochea alba

### ASSESSMENT (A)

Post partum hari kedua puluh delapan

### PLANNING (P)

Tanggal 31 Juli 2018 Pukul 16.15 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. Meobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

Hasil: TFU tidak teraba, involusi berjalan normal

3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada lebih dari hari keempat belas akan berwarna putih seperti *cream* atau seperti keputihan karena terdisei atas leukosit da sel-sel desidua (Saleha, 2013)

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan yang dianjurkan

5. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

6. Menganjurkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya

9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu mengerti dan sering berdzikir, mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, shalawat Nabi dan berdoa.

12. Menganjurkan ibu untuk datang kembali ke BPM saat jadwal suntik keduanya tiba yaitu pada tanggal 15 Oktober 2018

Hasil : Ibu bersedia pergi ke BPM

**TABEL KUNJUNGAN**

No.	Tanggal	Masa Nifas	TTV	TFU	Kontraksi Uterus	Lochea	ASI	KB
1.	04 Juli 2018, Pukul 09.00 WITA di kamar nifas	Hari pertama	TD : 120/70 mmHg N : 82x/ menit S : 37°C P : 22x/ menit	TFU 1 jari di bawah pusat	Kontraksi baik, uterus teraba bundar dan keras	Lochea Rubra	ASI sudah keluar tapi masih sangat sedikit	Ibu akan berdiskusi dengan suami
2.	05 Juli 2018, Pukul 14.00 WITA di kamar nifas	Hari kedua	TD : 110/70 mmHg N : 82x/ menit S : 37°C P : 22x/ menit	TFU 2 jari di bawah pusat	Kontraksi baik, uterus teraba bundar dan keras	Lochea Rubra	ASI sudah keluar tapi masih sedikit	Ibu masih berdiskusi dengan suami
3.	06 Juli 2018, Pukul 14.00 WITA di rumah pasien	Hari ketiga	TD : 110/70 mmHg N : 82x/ menit S : 36, 9°C P : 22x/ menit	TFU 3 jari di bawah pusat	Kontraksi baik, uterus teraba bundar dan keras	Lochea Rubra	ASI sudah mulai agak banyak	Ibu masih memikirkan metode KB yang ingin digunakan
4.	09 Juli 2018, Pukul 15.00 WITA di rumah pasien	Hari keenam	TD : 120/70 mmHg N : 84x / menit S : 37°C P : 20x/ menit	TFU pertengahan pusat dan simpisis	Kontraksi baik, uterus teraba bundar dan keras	Lochea Sanguilenta	ASI banyak dan lancar	Ibu mengatakan ingin memakai kb suntik 3 bulan namun belum sekarang
5.	17 Juli 2018, Pukul 16.00 WITA di rumah pasien	Haru keempat belas	TD : 120/80 mmHg N : 82x/ menit S : 37°C P : 22x/ menit	TFU tidak teraba		Lochea Serosa	ASI banyak dan lancar	Ibu mantap ingin memakai kb suntik 3 bulan dan akan ke BPM
6.	31 Juli 2018, Pukul 16.30 WITA di rumah pasien	Hari kedua puluh delapan	TD : 120/80 mmHg N : 82x/ menit S : 37°C P : 22x/ menit	TFU tidak teraba		Lochea Alba	ASI banyak dan lancar	Ibu telah memakai kb suntik 3 bulan pada 23 juli 2018

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pelaksanaan asuhan pada Ny “N” dengan post partum normal yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 2 hari pada tanggal 04 Juli sampai 05 Juli 2018 dan dilakukannya kunjungan rumah sebanyak 4 kali mulai tanggal 06 Juli sampai 31 Juli 2018. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah Varney (2003).

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah Varney (2003).

#### **A. Langkah I: Pengumpulan Data/ Analisa Data Dasar**

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Sedangkan data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat pengumpulan data pada Ny “N”, pasien maupun keluarga serta bidan yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara

terbuka sehingga dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Pengkajian data dasar pada kasus ibu nifas normal dilakukan pertama kali pada saat ibu masuk keruangan nifas. Pengkajian meliputi anamnesis langsung diperoleh dari ibu sendiri. Pengkajian ini berupa identitas ibu dan suami, keluhan utama dan riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, riwayat keluarga berencana, data psikologi, spiritual dan ekonomi serta pola kebiasaan sehari-hari. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik.

Dalam tinjauan pustaka tertera bahwa masa nifas adalah masa yang dimulai sejak kelahiran bayi, plasenta dan selaput yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan dan organ kandungan dan berlangsung kurang lebih 6 minggu. Tujuan pemberian asuhan pada masa nifas yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis, mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, cara dan manfaat menyusui, imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari dan memberikan pelayanan KB . Selain itu, ibu juga dianjurkan untuk banyak berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT agar dimudahkan dalam menjalani masa nifasnya dan harapan agar masa nifas berjalan normal dapat terakumulasi.

Berdasarkan studi kasus pada Ny “N” dengan post partum hari pertama masa nifas ditemukan data ibu baru saja melewati proses persalinan secara normal 2 jam yang lalu, bayi dan plasenta telah lahir. Setelah mendapatkan pengkajian kala IV selama 2 jam di kamar bersalin akhirnya ibu dipindahkan ke kamar nifas untuk dilakukan pengkajian lebih dalam. Dengan demikian, antara tinjauan pustaka dan kasus tidak ditemukan kesenjangan.

#### B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil kajian pada Ny “N” didapatkan data subjektif dan data objektif yang menunjukkan diagnosa terjadinya post partum dua jam yang lalu.

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa masa nifas adalah masa yang dimulai sejak kelahiran bayi, plasenta dan selaput yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan dan organ kandungan dan berlangsung kurang lebih 6 minggu. Salah satu perubahan yang terjadi pada masa nifas yaitu akan terjadi proses involusi uterus. Involusi uterus adalah proses uterus mengalami pengecilan seperti keadaan sebelum hamil. Pada ibu nifas diharapkan TFU mengalami penurunan 1 cm setiap hari. Selain itu ada perubahan *lochea* yaitu eksresi cairan rahim selama masa nifas yang akan berubah setiap waktu. Pada hari pertama sampai ketiga post partum, *lochea* akan berwarna merah yang disebut *lochea rubra*. Pada hari ke-3 sampai ke-7 akan berwarna merah kekuningan yang disebut *lochea sanguilenta*. Hari ke-7 sampai hari ke-14 akan berwarna kekuningan atau

kecoklatan yang disebut *lochea serosa*. Serta hari ke-14 dan seterusnya akan berwarna putih yang disebut *lochea alba*.

Pada kasus Ny “N”, ibu baru saja melahirkan dua jam yang lalu sehingga kasus ibu di diagnosis merupakan masa post partum pada dua jam yang lalu. Pada data subjektif didapatkan bahwa ibu melahirkan secara normal pada tanggal 04 Juli 2018 pukul 07.00 Wita, ibu mengeluh merasa sedikit nyeri pada jalan lahir dan lemas pasca persalinan. Sedangkan pada data objektif ditemukan pada pemeriksaan fisik, tinggi fundus ibu berada 1 jari di bawah pusat, pengeluaran *lochea* berwarna merah segar yang diindikasikan sebagai pengeluaran *lochea rubra*. Dengan demikian, antara tinjauan pustaka dan kasus tidak ditemukan kesenjangan.

### C. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Pada kasus post partum normal masalah yang biasa timbul bisa saja terjadi tanda bahaya nifas seperti bendungan payudara, subinvolusi dan infeksi.

Manajemen kebidanan post partum yang tidak baik, bisa saja menyebabkan ibu mengalami satu ataupun sekian banyak dari tanda bahaya masa nifas. Misalnya ajaran dan anjuran tentang *personal hygiene* yang baik agar pengeluaran *lochea* dapat berjalan normal. Jika tidak dilakukan bisa saja menjadi potensial untuk menyebabkan ibu mengalami infeksi kuman. Ajaran dan anjuran

tentang melakukan perawatan payudara serta menyusui secara *on demand* juga dapat menghindarkan ibu mengalami bendungan payudara, mastitis bahkan abses payudara yang merupakan salah satu tanda bahaya pada masa nifas.

Selain itu, anjuran untuk ibu rajin melakukan mobilisasi dapat membantu sirkulasi darah berjalan lancar sehingga membantu proses involusi berjalan baik. Proses menyusui yang dapat menghasilkan produksi oksitosin juga sangat membantu dalam proses involusi uterus atau pengembalian uterus ke keadaan seperti sebelum hamil. Sehingga masalah potensial seperti subinvolusi atau tidak berlangsungnya proses involusi uterus dengan normal dapat dicegah. Anjurkan ibu untuk selalu berdzikir, berdoa, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan hal lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT agar selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari sakit dalam hal ini dijauhkan dari masalah potensial yang kemungkinan dapat terjadi pada ibu nifas.

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny'N" ,antisipasi masalah potensial yang dapat terjadi pada ibu adalah terjadinya bendungan payudara, subinvolusi dan infeksi. Dengan demikian penerapan teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny "N" tidak ditemukan adanya kesenjangan.

#### D. Langkah IV: Tindakan Emergency/ Kolaborasi

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus post partum, hal emergency yang dapat terjadi

dan membutuhkan kolaborasi dengan dokter adalah terjadinya perdarahan post partum.

Perdarahan post partum adalah keadaan kehilangan darah lebih dari 500 mL selama 24 jam pertama setelah kelahiran bayi dan penyebab penting kasus kehilangan darah serius yang paling sering dijumpai di obstetric (Marni, 2012). Sedangkan pendapat lain mengatakan perdarahan post partum adalah kehilangan darah sebanyak 500 mL setelah persalinan pervaginam atau lebih dari 1000 mL setelah persalinan abdominal (Londok, dkk. Jurnal e-Biomedik. 2013).

Perdarahan post partum terbagi atas dua jenis berdasarkan waktu terjadinya perdarahan, yaitu perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Perdarahan primer adalah perdarahan yang terjadi 24 jam pasca persalinan, akan tetapi lebih banyak pada 2 jam pertama. Penyebab utamanya adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir. Sedangkan perdarahan sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama pasca persalinan. Penyebab utamanya adalah robekan jalan lahir dan sisa plasenta. (Nurjanna, dkk. 2013).

Faktor penyebab perdarahan post partum adalah factor 4T (*Tone, tissue, trauma, trombin*) . Faktor *tone* atau tonus adalah penyebab perdarah yang diakibatkan oleh keadaan gagalnya uterus untuk berkontraksi dan mengecil sesudah janin keluar dari rahim ditandai dengan uterus tetap membesar dan teraba lembek saat dipalpasi. *Tissue* adalah faktor yang bergantung pada keadaan plasenta. Yang dikategorikan faktor ini yaitu apabila terjadi *retensio plasenta* atau

plasenta belum lahir setelah 30 menit setelah janin lahir. Lalu ada *rest plasenta* yaitu suatu bagian dari plasenta, satu atau lebih lobus tertinggal dalam uterus (Saifuddin, 2002 dalam Nadyah 2013).

Setelah itu ada *trauma*, yang termasuk dalam kategori ini yaitu apabila terjadi ruptur uterus, inversi uterus dan perlukaan jalan lahir. Yang terakhir ada *trombin* yang disebabkan oleh adanya gangguan pembekuan darah. Ketika ibu mengalami perdarahan post partum, petugas harus segera melihat faktor apa yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada ibu agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk penanganan kasus tersebut. Dalam menangani tindakan emergency, bidan juga hendaknya harus berusaha dan tetap berdoa kepada Allah SWT agar tindakan yang diberikan kepada ibu dapat menolong ibu dari keadaan emergency.

Pada kasus Ny “N”, ibu tidak mengalami perdarahan post partum. Selama pemantauan, masa nifas ibu berjalan normal dan tidak ada komplikasi yang menyertai sehingga tidak ada tindakan emergency yang harus dilakukan.

#### E. Langkah V: Rencana/ Intervensi

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam suatu rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini di penolong dengan yang ditolong, karena meski penolong yang hanya menyetujuinya maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari yang ditolong.

Adapun sasaran dalam rencana asuhan pada kasus Ny “N” mengacu pada diagnosa pada kasus ibu yaitu post partum normal serta mencegah terjadinya masalah potensial yang bisa terjadi. Untuk mencapai tujuan terjadinya masa nifas yang normal, asuhan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan ibu. Perawatan masa nifas juga dimaksudkan agar saat ibu keluar dari rumah sakit, ibu berada dalam keadaan sehat.

Kasus yang terjadi pada Ny “N” adalah kasus post partum normal. Pada kasus ini hal-hal yang perlu direncanakan untuk diimplementasikan kepada ibu harus sesuai dengan kebutuhan ibu. Pada kasus normal, tanda-tanda vital ibu harus selalu dipantau setiap melakukan kunjungan. Observasi tanda vital berfungsi untuk mengetahui keadaan umum ibu. Selama masa nifas, tanda-tanda vital ibu diharapkan selalu dalam keadaan normal.

Selain observasi tanda- tanda vital, tinggi fundus uteri adalah hal wajib yang harus dipantau pada ibu nifas. Uterus akan mengalami proses involusi. Proses involusi adalah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari (Vivian, Tri Sunarsih, 2013).

Selain dengan tinggi fundus uteri, involusi uterus juga dapat dinilai dari kontraksi uterus. Oleh sebab itu, pemantauan kontraksi uterus juga dilakukan. Kontraksi uterus diperiksa untuk menilai kontraksi dan upaya pencegahan terhadap perdarahan post partum yang disebabkan oleh atonia uteri. Kontraksi

uterus yang teraba keras dan bundar mengisyaratkan involusi berjalan baik (Saleha, 2013).

Observasi pengeluaran *lochea* yang merupakan cairan ekskresi selama nifas juga hal penting yang harus dilakukan. Pengeluaran *lochea* ini menjadi salah satu tanda berjalannya proses involusi uterus. Pengeluaran *lochea* yang normal akan berubah sesuai masanya. Pada hari pertama hingga ketiga *lochea* akan berwarna merah segar karena berisikan sisa darah, sisa desidua, verniks caseosa, sisa mekonium dan disebut dengan *lochea rubra*. Pada hari ke-3 sampai ke-7 *lochea* akan berubah warna menjadi merah kekuningan berisikan darah dan lendir dan disebut *lochea sanguilenta*.

Pada hari ke-7 sampai hari ke-14 *lochea* akan berubah warna menjadi kecoklatan yang terdiri dari sedikit darah dan banyak serum dan disebut dengan *lochea serosa*. Dimulai dari hari ke-14 *lochea* akan berubah menjadi warna putih hingga semakin lama akan menghilang satu atau dua minggu setelahnya dan disebut dengan *lochea alba*.

Semua ibu nifas diharapkan dapat memberikan ASI kepada bayinya. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal. Ibu yang menyusui bayinya dapat mencegah terjadinya bendungan payudara yang disebabkan oleh penyempitan duktus laktiferi atau oleh kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna (Walyani, 2015).

Selain itu, saat menyusui hormon oksitosin akan terangsang sehingga hormon ini juga dapat membantu proses involusi .Oksitosin yang dilepas dari kelenjar hipofisis memperkuat dan mengatur kontraksi uterus sehingga proses involusi atau pengembalian uterus seperti keadaan sebelum hamil akan berjalan dengan lebih baik. Selain menyusui,faktor yang dapat merangsang hormon oksitosin adalah dengan melakukan pijat oksitosin.

Pijat oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan tulang belakang mulai dari nervus ke 5 - 6 sampai scapula yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehingga oksitosin keluar (Khaerani. Jurnal e-Keperawatan. 2012).

Persalinan merupakan proses yang melelahkan, oleh sebab itu ibu disarankan tidak langsung turun ranjang setelah melahirkan dan harus cukup beristirahat, dimana ibu harus tidur selama 8 jam pada malam hari dan 1- 2 jam pada siang hari. Ibu nifas juga harus melakukan mobilisasi dini. Mobilisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersumbatnya pembuluh darah ibu. Ibu diminta untuk melakukan latihan menarik nafas yang dalam serta latihan tungkai yang sederhana, balik badan kekanan dan kekiri secara perlahan, duduk serta mengayunkan tungkai dari tepi ranjang. Setelah itu ibu bias pergi ke kamar mandi. Dengan begitu sirkulasi darah di dalam tubuh akan berjalan dengan baik.

Kondisi tubuh akan cepat pulih jika ibu melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat. Selain itu moilisasi dini dapat melancarkan pengeluaran lochea, mengurangi infeksi, mempercepat involusi uterus, dsb. Ibu nifas juga harus

melakukan *vulva hygiene*. Adanya *lochea* yang merupakan cairan ekskresi cairan rahim selama masa nifas menegaskan pentingnya ibu nifas menjaga kebersihan terutama kebersihan vulva. Ibu dianjurkan untuk rajin mencuci dan membersihkan daerah vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah anus hingga bersih setiap habis BAK dan BAB. Mengganti pembalut minimal 3 kali, atau setiap lembab sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi.

Selain anjuran kepada ibu untuk menjaga kebersihan, yang perlu dilakukan adalah menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi. Pada masa nifas, nutrisi perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan berkaitan dengan produksi air susu. Nutrisi yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein dan banyak mengandung cairan untuk memperlancar produksi ASI juga tidak lupa menganjurkan ibu untuk memakan makanan kaya serat karena dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013).

Selama masa perawatan pasca persalinan ibu perlu diberikan konseling mengenai kontrasepsi. Tujuannya agar ibu dapat memperjarak kehamilannya. Pada kasus Ny "N" konseling KB yang akan diberikan adalah KB yang tidak mengganggu ASI sehingga ibu tetap dapat memberikan anaknya ASI eksklusif minimal hingga usia bayi 6 bulan.

Ibu dianjurkan pula untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka

maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi. Sedangkan dalam islam, larangan ibu nifas sama dengan orang yang haid. Sehingga diharamkan untuk bersenggama hingga dirinya bersih atau suci sesuai dalam Q.S-Al-Baqarah/2;222.

Selain itu, untuk psikologis dan ketenangan batin ibu, ibu dianjurkan sering mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an , berdzikir, berdoa dan hal lain yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang teori katakan memiliki kesamaan dengan kasus yang didapatkan.

#### F. Langkah VI: Implementasi

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi.

Pada kasus Ny "N", implementasi asuhan yang telah direncanakan diberikan sejak ibu masuk di ruang nifas atau 2 jam pasca persalinan. Dimulai dari kunjungan di rumah sakit pada tanggal 04 Juli 2018 dimana pada saat itu ibu mengalami masa nifas sejak 2 jam yang lalu dan pada tanggal 05 Juli 2018 atau masa nifas hari kedua ibu . Hal yang dilaksanakan adalah mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan pengeluaran lochea. Mengajarkan ibu *personal hygiene* terutama *vulva hygiene, health education*, mobilisasi dini, proses laktasi,

konseling KB, anjuran untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dan selalu mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT dengan cara berdzikir, berdoa dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

Semua tindakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik oleh ibu serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang nifas RSUD Syech Yusuf. Penjelasan telah disampaikan bahwa kondisi ibu saat ini baik, hasil didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus ibu baik teraba bundar dan keras, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan postpartum yang diakibatkan dari atonia uteri.

Selain itu hasil observasi tinggi fundus uteri sesuai dengan ketentuan yaitu akan turun 1 cm tiap harinya. Ibu juga telah mengerti dan mau melakukan *personal hygiene* terutama *vulva hygiene* dengan benar dengan selalu mengganti pembalutnya setiap lembab agar pengeluaran *lochea* berjalan normal, membersihkan vulva dari arah depan ke belakang setiap habis BAB maupun BAK, ibu mengerti dan mau melakukan anjuran untuk makan makanan bergizi untuk mempercepat proses penyembuhan dan berkitan dengan produksi air susu, melakukan mobilisasi dan menyusui anaknya agar membantu proses involusi uterus, ibu akan mendiskusikan tentang KB dengan suaminya dan bersedia untuk tidak melakukan hubungan seks hingga 6 minggu dan selalu mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

Setelah dua kali kunjungan di rumah sakit, kunjungan dilanjutkan ke rumah ibu. Kunjungan di rumah ibu dilakukan sebanyak empat kali. Dimulai pada tanggal 06 Juli 2018 yaitu pada saat masa nifas hari ketiga ibu. Pada kunjungan ini, asuhan yang diberikan yaitu tetap memantau tinggi fundus uteri, tanda-tanda vital, kontraksi uterus, pengeluaran ASI, pengeluaran *lochea*. Memberikan konseling tentang *health education* mencakup makanan bergizi, *personal hygiene* dan *vulva hygiene*, mengajarkan dan mempraktekan perawatan payudara agar pengeluaran ASI lancar.

Kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 09 Juli 2018 atau masa nifas hari keenam, kunjungan ketiga dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 atau masa nifas hari keempat belas, dan kunjungan terakhir pada tanggal 31 Juli 2018 atau masa nifas hari kedua puluh delapan. Asuhan yang diberikan yaitu tetap memantau tinggi fundus uteri, tanda-tanda vital, kontraksi uterus, pengeluaran ASI, pengeluaran *lochea*. Memberikan konseling tentang *health education* mencakup makanan bergizi, *personal hygiene* dan *vulva hygiene*, anjuran untuk ber-KB yang akhirnya dilakukan ibu pada tanggal 23 Juli 2018 atas persetujuan suami, ibu memakai KB suntik 3 bulan di BPM Ika serta anjuran untuk tidak melakukan seks selama 6 minggu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan hambatan yang berarti dalam memberikan asuhan kebidanan karena seluruh tindakan yang dilakukan telah mengarah dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Serta pasien dan keluarga dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan pemberian asuhan kebidanan.

### G. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan keefektifan dari asuhan yang telah diberikan kepada ibu meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. Rencana asuhan diaanggap berhasil jika memang benar dalam pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 28 hari yakni pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dengan 6 kali kunjungan yaitu kunjungan pertama 2 jam setelah persalinan yaitu tanggal 04 Juli 2018 di rumah sakit, kunjungan kedua pada hari kedua setelah persalinan tanggal 05 Juli 2018 di rumah sakit, kunjungan ketiga pada tiga hari setelah persalinan yaitu tanggal 06 Juli 2018 di rumah klien, kunjungan keempat pada enam hari setelah persalinan yaitu tanggal 09 Juli 2018 yang dilakukan di rumah klien, kunjungan kelima pada 14 hari setelah persalinan yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 dilakukan di rumah klien, dan kunjungan terakhir pada 28 hari setelah persalinan yaitu tanggal 31 Juli 2018 juga dilakukan di rumah klien.


Pada kasus post partum normal yang dialami Ny "N" ,pada hari pertama masalah yang di atasi adalah memeriksa TTV ibu, memeriksa proses involusi dengan mengecek TFU dan didapatkan tinggi fundus ibu 1 jr di bawah pusat, memeriksa pengeluaran *lochea*, mengajarkan ibu *personal hygiene* terutama rajin mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau setiap lembab untuk menghindari terjadinya infeksi, menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti

miring ke kiri dan ke kanan di atas tempat tidur dan jalan ke kamar mandi untuk berkemih, mengajarkan teknik menyusui yang benar dan menganjurkan ibu menyusui bayinya secara *on demand*, serta pemberian obat analgetik (asam mafenamat) dan table Fe.

Kemudian pada evaluasi kunjungan kedua, keadaan ibu sudah semakin membaik ditandai dengan tanda vital dalam batas normal,TFU turun menjadi 2 jari dibawah pusat, *lochea* masih berwarna merah, bayi menyusui dan ibu rajin mengganti pembalut. Pada kunjungan ketiga, keadaan ibu sudah semakin membaik ditandai dengan tanda vital dalam batas normal, TFU turun menjadi 3 jari di bawah pusat, *lochea* masih berwarna merah, bayi menyusui dan ibu rajin mengganti pembalut. Kunjungan keempat, keadaan ibu sudah fit, TTV normal, proses involusi berjalan dengan baik ditandai dengan TFU yang berada di pertengahan simpisi dan pusat, terdapat pengeluaran *lochea sanguilenta*, bayinya aktif menyusui.

Kunjungan kelima, kondisi ibu baik ditandai tanda vital dalam batas normal, involusi berjalan baik dimana tinggi fundus uterus tidak teraba, terdapat pengeluaran *lochea serosa*, dan ibu mengatakan sudah ingin memakai KB. Kunjungan keenam sekaligus kunjungan terakhir kondisi ibu baik, tanda vital dalam batas normal, pengeluaran *lochea* sudah berwarna putih atau disebut dengan *lochea alba*, ibu sudah memakai KB suntik 3 bulan, tidak ada keluhan yang dirasakan ibu setelah menjadi akseptor KB.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan yang dilakukan mulai dari hari pertama sampai dengan 28 hari setelah persalinan yang dilakukan secara bertahap. Maka Ny “N” dengan post partum normal tidak ada komplikasi yang terjadi sehingga semua berlangsung dengan normal. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan. Hasil baik yang didapatkan pada pemberian asuhan ini juga merupakan kehendak Allah SWT, sehingga hendaknya kita selalu bersyukur dan berdoa kepada-Nya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas dan menguraikan kasus Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa mulai dari pengkajian hingga evaluasi maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data ibu nifas pada Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Hasil dari analisa data didapatkan ny “N”, umur 18 tahun, PIA0 dengan post partum dua jam yang lalu, melahirkan pada tanggal 04 Juli 2018, pukul 07.00 wita.
2. Telah dirumuskan diagnosa/masalah aktual ibu nifas pada Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Hasil dari interpretasi data Ny “N” umur 18 tahun dengan masalah aktual post partum dua jam yang lalu dan berlangsung normal.
3. Telah dirumuskan diagnosa/masalah potensial ibu nifas pada Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Hasil dari interpretasi data Ny “N” post partum 2 jam yang lalu potensial terjadi bendungan payudara, subinvolusi, infeksi.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu nifas pada Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan segera .

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syech Yusuf Gowa berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial seperti pemantauan tinggi fundus uteri, pengeluaran *lochea*, pemberian ASI eksklusif , *personal hygiene*, KB,dsb.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah disusun pada ibu nifas Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu semua perencanaan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan.
7. Telah mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu seluruh asuhan telah diberikan dan tidak ada hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syech Yusuf Gowa dalam bentuk SOAP.
9. Telah dilakukan integrasi menurut islam pada asuhan yang diberikan kepada Ny “N” dengan post partum normal di RSUD Syech Yusuf Gowa dalam bentuk ayat suci Al-Qur’an dan terjemahan serta hadist.

## B. Saran

### 1. Untuk Klien

- a. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar mengkonsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi akan memenuhi kebutuhan energi, juga untuk mempercepat proses penyembuhan dan pengembalian alat reproduksi mendekati keadaan sebelum hamil serta untuk memperbanyak produksi ASI.
- b. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar senantiasa menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genetaliaanya untuk mencegah terjadinya infeksi pada diri ibu.
- c. Diperlukan keterlibatan suami/keluaga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antar pasien dengan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai lanjutan perawatan dirumah.

### 2. Untuk bidan

- a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagai bidan sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari klien

- c. Diharapkan bidan dalam memberikan asuhan kepada klien menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- d. Dalam pandangan Islam dalam memberikan asuhan kepada klien harus menerapkan kaidah agama di dalamnya agar klien dapat mengerti tentang larangan dalam melakukan hubungan badan antara suami istri apabila dalam keadaan haid atau nifas.

### 3. Untuk Institusi Pendidikan


Dengan mengetahui permasalahan yang dapat timbul pada ibu nifas, diharapkan institusi pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta perkembangan sesuai prosedur dalam memberikan asuhan dan dalam pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan dalam memecahkan suatu masalah kebidanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2015. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Asy-Syarbashi Ahmad. 2008. *Yas'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Agama Dan Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Bahiyatun. 2013. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal*. Jakarta: EGC.
- Dahri Nurdeni. 2012. "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan Terhadap, Haid, Nifas, Dan Istihadhah)". *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.11 No. 2.
- Elizabeth, Siwi W dan Endang P. 2015. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Firdayanti. 2012. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Icesmi Sukarni dan Margareth ZH. 2014. *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Khaerani. 2012. "Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Involusi Uterus Pada Ibu Post Partum Di Ruang Post Partum Kelas III RSHS Bandung." *e-journal Keperawatan (e-KP)*, Vol. 1, No.1
- Londok, T.H.M., dkk. 2013. "Karakteristik Perdarahan Antepartum dan Perdarahan PostPartum." *Jurnal e-Biomedik (eBM)*, Vol. 1, No. 1
- Makzizatunnisa dkk. 2015. "Efektivitas Senam Kegel Dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Nyeri Perineum Pada Ibu Post Partum di BPM Prima Boyolali." *e-Journal Keperawatan (e-Kp)* Vol. 3.
- Maritalia Dewi. 2012. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marmi. 2012. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peurperium Care"*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadyah. 2013. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal (Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Kebidanan)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nugroho Taufan dkk. 2014. *Konsep Dasar Masa Nifas*. Yokyakarta: Nuha Medika.

- Nurjanah Siti Nunung dkk. 2013. *Asuhan Kebidanan Postpartum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prasetya Lestari. 2016. “Usia Berpengaruh Dominan terhadap Perilaku Perawatan Luka Perineum pada Ibu Nifas di RSUD Sleman.” e-Journal Ners And Midwifery Indonesia, Vol. 4, No. 2.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Profil Kesehatan Indonesia 2016.
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2016.
- Profil Kesehatan Kabupaten Gowa 2017.
- Roito Juraida dkk. 2013. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi*. Jakarta: EGC
- Saleha. 2013. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Saputra H. Agus Romdlon. 2015, “Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas Dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama”ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo”. *Justitia Islamica*, Vol. 12.
- Setiawati, Dewi. 2013. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Seventina Nurul Hidayah. 2017. “Hubungan Antara Vulva Hygiene Dengan Lama Penyembuhan Luka Perineum Di Bps Ny S Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.” *Jurnal Siklus* Vol. 6, No. 1.
- Shihab, M. Quraish. 2012. “ *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian dalam Al-Qur’an*.” Jakarta: Penerbit Lentera Hati
- Sriani Timbawa,dkk. 2015. “Hubungan Vulva Hygiene Dengan Pencegahan Infeksi Luka Perineum Pada Ibu Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado.” e-journal Keperawatan (e-Kp), Vol. 3, No. 2.
- Sugihantono Anung. 2015. *Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

- Tri Mulyani Ningsih dkk. 2017. “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelancaran ASI Pada Ibu Post Partum Di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar.*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, Vol. 10 No. 1
- Tulas Verby Divini Prety dkk. 2017. “*Hubungan Perawatan Luka Perineum Dengan Perilaku Personal Hygiene Ibu Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado*”. *e-Journal Keperawatan (e-Kp)* Vol. 5, No. 1.
- Varney, Helen dkk. 2003. *Varney's Midwifery*. America: Jones and Bartlett Publishers.
- Vivian Nanny Lia dan Tri Sunarsih. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*. Jakarta: Salemba Medika. 2013
- Walyani, dkk. 2015. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas

Nama : Annisa Nurul Hikmah  
Nim : 70400115042  
TTL : Sungguminasa, 22 November 1997  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Alamat : Btn. Mutiara Permai Blok A/10, Sungguminasa, Gowa  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Munir, Bsc  
Ibu : Suristi Dasrip SP, M. Si

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003- 2009 SD Inpres Mangasa Gowa
2. Tahun 2009- 2013 SMP Negeri 1 Sungguminasa
3. Tahun 2013- 2015 MAN 2 Model Makassar
4. Tahun 2015- 2018 UIN Alauddin Makassar