

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS  
GIZI REMAJA PADA SISWA MADRASAH ALIYAH  
MADANI PAO - PAO KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2010**



*Skripsi*

*Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat  
Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

*Oleh*

**J A H A R U D I N  
70200105049**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## ABSTRAK

Jaharudin “Faktor yang berhubungan Dengan Status Gizi Remaja Pada Siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa” (Dibimbing oleh Andi Zulkifli dan Syarfaini)

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat keseimbangan antara asupan (intake) dengan kebutuhan zat gizi (nutrient). Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih (Almatsier). Gizi kurang dipengaruhi oleh asupan oleh zat-zat gizi yang dikonsumsi setiap hari kurang dari kebutuhan, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan mudah terkena penyakit. Gizi lebih atau obeistas dipengaruhi oleh asupan gizi dan zat-zat gizi yang dikonsumsi setiap hari lebih dari kebutuhan sehingga terjadi kegemukan. Dampak yang dapat ditimbulkan seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis.

Jenis penelitian ini adalah Survey Analitik dengan rancangan *Cross Sectional Study*, yaitu suatu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*).

Tujuan Penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.

Hasil Penelitian untuk menunjukkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi remaja dengan nilai p (8,226), ada hubungan asupan makan dengan status gizi remaja dengan nilai p (6,683), ada hubungan Frekuensi makan dengan status gizi remaja dengan nilai p (4,441), ada hubungan pola makan dengan status gizi remaja dengan status gizi remaja dengan nilai p (3,054) tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi remaja dengan nilai p (0,21).

Disarankan kepada siswa, walaupun tingkat pengetahuannya tentang gizi sudah cukup bagus, tetapi tetap harus memperhatikan pedoman umum gizi seimbang (PUGS) agar tetap sehat, mengkonsumsi makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan zat gizi oleh tubuhnya, mengkonsumsi makanan yang bervariasi untuk meningkatkan kualitas gizi dalam tubuhnya, dan jangan lupa sarapan pagi agar daya tahan tubuh semakin kuat.

Daftar Pustaka : 22 ( 1987 – 2009 )

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi ditandai dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan program paradigma sehat 2010 yaitu perbaikan derajat kesehatan masyarakat agar dapat melanjutkan pembangunan Negara dimasa yang akan datang. Derajat kesehatan merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia disuatu negara, yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, umur harapan hidup dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi hanya dapat dicapai oleh orang yang sehat dan berstatus gizi baik. Dengan kata lain orang yang sehat dan berstatus gizi baik dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang.

Untuk melanjutkan pembangunan dimasa yang akan datang diperlukan remaja yang sehat dan berstatus gizi baik sehingga dapat menjadi tenaga yang memiliki potensial dan produktif yang tinggi, mengingat hal tersebut diatas dimana masa remaja merupakan “masa rawan gizi” karena merupakan periode puncak tumbuh kembang.

Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa merupakan yayasan dari UIN alauddin sendiri yang berorientasi pada Al-quran dan Sunnah Rasulullah, berdasarkan dari hasil study pendahuluan yang dilakukan selama dua hari, didapatkan ada beberapa anak siswa yang secara antropometris berbadan kurus dan satu siswa mengalami berat badan (obesitas).

Masa remaja terjadi pertumbuhan yang pesat dan sangat cepat serta aktifitas yang tinggi sehingga kebutuhan gizi meningkat, sehingga golongan ini umumnya mempunyai nafsu makan yang baik sering mencari makanan tambahan atau jajanan di luar waktu makan.

Dalam beberapa hal remaja tidak puas terhadap keadaan diri sendiri. Urusan *body image* dianggap sebagai perkara besar yang tak henti-hentinya dipikirkan, remaja putra menginginkan dada bidang, bahu lebar dan lengan kuat. Sebaliknya remaja putri menginginkan pinggang, paha dan betis yang lebih kecil. Anoreksia yang serius dapat membahayakan kesehatan atau bahkan kematian, terobesesi oleh citra kelangsingan sehingga terus menerus berdiet sehingga berakibat gizi kurang.

Survey di AS menunjukkan bahwa 65% makanan atau di iklankan melalui TV berwujud minuman dan makanan manis (berkalori tinggi). Selain itu iklan di TV juga menampilkan makanan ringan (snack) yang rendah gizinya, makanan instant yang biasa disajikan cepat, dan aspek lain yang tidak mengandung unsur empat sehat lima sempurna. ([www.Kompas.Co.id](http://www.Kompas.Co.id), diakses tanggal 1 Desember 2008). Khususnya generasi muda yang masih duduk dibangku sekolah menengah umum yang merupakan kelompok anak yang berada pada masa peralihan dari anak ketingkat remaja. Golongan ini dalam masyarakat masih jarang mendapatkan perhatian dalam bidang/program kesehatan gizi.

Di Indonesia prevalensi anemia sebesar 57,1 % diderita oleh remaja putri, 27,9 % diderita oleh Wanita Usia Subur (WUS) dan 40,1 % diderita oleh ibu hamil (Herman, 2006).

Di Indonesia di temukan prevalensi gizi kurang sebesar 17,4% dengan rincian 20,7% pada laki-laki dan 14,1% pada perempuan. Prevalensi kurus lebih tinggi di pedesaan (18,7%) dibanding di perkotaan (15,4%). (SUSENAS 2002).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, 21 propinsi dan 216 kabupaten/kota, prevalensi gizi buruk masih berada diatas rata-rata nasional yakni 5,4%. Pada pengukuran gizi buruk dan gizi kurang, terdapat 19 propinsi dengan tingkat prevalensi (kasus per 100 balita) gizi buruk dan kurang prevalensi nasional 18,4%.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam empat kelompok yaitu rendah (di bawah 10%), sedang (10-19%) dan sangat tinggi (30%), berdasarkan WHO, Indonesia tahun 2004 tergolong negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi karena 5.119.935 (atau 28.47%) dari 17.983.244 balita di Indonesia termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk. Angka ini cenderung meningkat pada tahun 2005-2006.

Sebagian besar Kabupaten/Kota, Data 2004 menunjukkan masalah gizi terjadi di 77,3% Kabupaten dan 56% Kota, dan besarnya angka ini hampir sama jika dilihat menurut persentase keluarga miskin. ([www.gizi.net](http://www.gizi.net), diakses tanggal 29 Mei 2009 ):

- 109 dari 347(31.4%) kabupaten/kota yang diklasifikasikan berisiko tinggi,
- 67(19.3%) kabupaten/kota resiko sedang, dan
- 171 (49.2%) kabupaten/kota resiko rendah

Prevalensi gizi buruk di Indonesia sejak tiga tahun belakang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yakni dari 25,8 % pada 2005 menjadi 18,4 pada 2007. Namun disayangkan angka itu belum merata di semua daerah, masih ada beberapa kawasan yang mengalami kasus gizi buruk dan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan pada umur 12 tahun anak perempuan mempunyai berat dan tinggi badan lebih besar daripada laki-laki, sebaliknya pada umur 13,14 dan 15 tahun anak laki-laki mempunyai tinggi dan berat badan lebih tinggi dari pada anak perempuan,

berat badan anak laki-laki berbeda secara bermakna dengan berat badan anak perempuan, tetapi tinggi badan tidak. (Soetjiningsih) 1998, Bali.

Penelitian yang dilakukan pada siswa di tiga SLTP di Surabaya menunjukkan bahwa pada remaja laki-laki dan perempuan status gizi baik 5%, status gizi pada remaja laki-laki 45,6% sedangkan gizi lebih atau obesitas 10,4%. Masalah ini disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, sosial dan pengetahuan (Arnaningsih).

Menurut penelitian saska, 2003 bahwa siswa yang diasramakan di SMU katolik Rajawali di Makassar terdapat 65,2% yang asupan energinya kurang dan sekitar 34,8% yang asupan energinya cukup, sedangkan sebagian besar responden berstatus gizi kurang sebanyak 86,1% dan sekitar 13,9% yang berstatus gizi baik penelitian terhadap siswa dipesantren pondok madinah putra makassar. (Nasri, 2005)

Umumnya anak sekolah dan khususnya anak SMU berada di sekolah mulai jam 07.30 sampai 13.30 sehingga memungkinkan ada yang tidak sempat sarapan di rumah, disamping itu porsi makan yang terlalu sedikit dan turunnya berat badan (BB) secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional, misalnya takut gemuk seperti ibunya, atau takut dikatakan kurang seksi oleh lawan jenisnya.

Kurang nafsu makan yang berat (anoreksia nervosa) yang biasanya terjadi pada remaja yang berpendidikan dan atau dari golongan kelas menengah keatas, karena dalam jiwanya tertanam rasa kompetisi dan kesempurnaan yang kuat, sehingga melaksanakan diet dengan cara-cara ekstrem, bersamaan dengan ini berkembang rasa malu dan kesepian.

Remaja pada usia seperti inilah sangat membutuhkan makanan yang cukup karena pada masa ini adalah fase dimana seseorang mengalami perkembangan atau peralihan. Apabila persediaan makanan keluarga kurang atau hanya makan sekali atau dua kali sehari,

bahkan ada yang lebih menyukai jajan dari pada makan di rumah, maka kelompok ini sangat rentan terhadap gizi kurang. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dikemukakan rumusan masalah bahwa :

1. Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan pengasuh/orangtua dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa?
2. Apakah ada hubungan asupan makanan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa?
3. Apakah ada hubungan frekuensi makan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa?
4. Apakah ada hubungan pola makan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa?
5. Apakah ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa?



## C. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pengasuh/orangtua dengan status gizi remaja.
- b. Untuk mengetahui hubungan asupan makanan dengan status gizi remaja.
- c. Untuk mengetahui hubungan frekuensi makan dengan status gizi remaja.
- d. Untuk mengetahui hubungan pola makan dengan status gizi remaja.
- e. Untuk mengetahui hubungan penyakit infeksi dengan status gizi remaja

## D. Manfaat

### 1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bacaan bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi fakultas kesehatan dalam bidang penelitian

### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu sumber informasi kesehatan dalam rangka peningkatan status gizi di masa yang akan datang khususnya pada tingkat remaja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi

##### 1. Pengertian Status Gizi

Status Gizi merupakan hasil interaksi antara zat gizi dan manusia. Zat gizi terdiri dari *hidrat arang*, *ptotein* dan lemak, mineral dan air, Status Gizi merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak , status gizi juga didefenisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan nutrisi (Berg, 1990)

Status Gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam variabel tertentu , atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk fariabel tertentu ,( Supariasa, 2002)

Menurut Abu basuni (2000) status gizi adalah keseimbangan asupan (*intake*) dan kebutuhan (*requeirement*) zat gizi , sedangkan menurut guzman at Ali (1988) mengemukakan status gizi adalah zat gizi yang esensial.

Status Gizi baik ( seimbang) bila jumlah asupan zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan, Status gizi yang tidak seimbang dapat dipresentasikan dalam bentuk gizi kurang yaitu jumlah asupan zat gizi yang kurang, status gizi lebih bila asupan zat gizi melebihi dari yang dibutuhkan.

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih (Almatsier, 2003).

Status Gizi baik ( seimbang) bila jumlah asupan zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan, status gizi yang tidak seimbang dapat dipresentasikan dalam bentuk gizi kurang yaitu jumlah asupan zat gizi yang kurang, status gizi lebih bila asupan zat gizi melebihi dari yang dibutuhkan.

Gizi kurang dipengaruhi oleh asupan zat-zat gizi yang dikonsumsi setiap hari kurang dari kebutuhan, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan mudah terkena penyakit.

Gizi lebih atau obesitas dipengaruhi oleh asupan zat-zat gizi yang dikonsumsi setiap hari lebih dari kebutuhan sehingga terjadi kegemukan. Dampak yang dapat ditimbulkan seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis.

Keadaan gizi adalah akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat gizi dalam tubuh, atau keadaan fisiologi akibat dari tersedianya zat gizi seluruh tubuh. (Supriasa, 2002)

## 2. Klasifikasi Status Gizi

Dalam penilaian status gizi harus ada ukuran baku yang sering di sebut *reference Baku antropometri* yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS, dimana dibagi dalam empat klasifikasi yaitu :

- a. *Under Nutrition* (Gizi Kurang) adalah kekurangan konsumsi pangan secara relative atau absolute untuk periode tertentu
- b. *Specific Defisiensi* (Kekurangan gizi Spesifik) adalah kekurangan zat gizi tertentu misalnya kekurangan vitamin A, Yodium, Fe dll, misalnya obesitas atau kegemukan

- c. *Over Nutrition* (Gizi Lebih) Adalah kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu.
- d. *Imbalance* (Ketidak seimbangan) Akibat proporsi zat gizi misalnya kolesterol terjadi karena ketidak seimbangan LDL dan HDL serta VLDL (Depkes, 2003)

### 3. Metode Penilaian Status Gizi

Secara umum metode penilaian status gizi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penilaian status gizi secara langsung meliputi :

1). Antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terikat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh.

2). Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk

suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi.

### 3). Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini umumnya untuk survey klinis secara cepat (rapid clinical surveys). Yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi. Dapat dilihat pada jaringan epitel (superficial epithelial tissues) seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Survey dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan gejala (symptom) atau riwayat penyakit.

### 4). Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat pertumbuhan struktur dari jaringan. Digunakan dalam situasi tertentu seperti pada kejadian buta senja epidemik (epidemic of night blindness). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

## b. Penilaian status gizi secara tidak langsung, meliputi :

### 1). Survey konsumsi makanan

Survey konsumsi makanan dapat dilihat dari jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan

gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survey dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

## 2). Statistik vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur angka kematian dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

## 3). Faktor ekologi

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil intraksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dll. Pengukuran ini sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi disuatu masyarakat.



Bagan Penilaian Status Gizi

#### 4. Penilaian status gizi secara antropometri

##### a. Pengertian antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai cara pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi ketidakseimbangan ini terlihat pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh.

##### b. Keunggulan antropometri

- 1). Prosedurnya sederhana, aman dan dapat digunakan dalam jumlah sampel besar
- 2). Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli
- 3). Alatnya murah, mudah dibawa dan tahan lama
- 4). Metode ini tepat dan akurat karena dapat dibakukan
- 5). Dapat menggambarkan riwayat gizi di masa lampau
- 6). Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, dan gizi buruk, karena sudah ada ambang batas yang jelas.

##### c. Kelemahan antropometri

- 1). Tidak sensitif, artinya metode ini tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu yang singkat, disamping itu tidak membedakan kekurangan zat gizi tertentu seperti kekurangan zink.

- 2). Faktor diluar gizi (penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan energi) dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivikasi pengukuran antropometri.
- 3). Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presesi, akurasi, dan validitas pengukuran.

#### d. Jenis Parameter

Antropometri sebagai indikator status yang dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia.

Menurut Supariasa (2002).

Jenis parameter terbagi atas:

##### 1). Umur

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Menurut puslitbang Gizi bogor (1980). Batasan umur digunakan adalah tahun umur penuh (Completed month). Contoh : 7 tahun 2 bulan, dihitung 7 tahun.

##### 2). Berat badan

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada masa remaja, lemak tubuh cenderung meningkat, dan protein otot menurun.

### 3). Tinggi badan

Tinggi badan merupakan parameter yang paling penting bagi keadaan tubuh yang telah lalu dan keadaan sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat. Disamping itu tinggi badan merupakan ukuran kedua yang penting, karena dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan (Quac Stick), faktor umur dapat dikesampingkan.

### 4). Lingkar lengan atas

Lingkar lengan atas (LLA) dewasa ini merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi, karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat yang sulit diperoleh dengan harga yang lebih murah.

### 5). Lingkar kepala

Lingkar kepala adalah standar pengukuran pada dunia kedokteran anak secara praktis yang biasanya untuk memeriksa keadaan pathologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh yang sering digunakan adalah kepala besar (hidrosefalus) dan kepala kecil (mikrosefalus). Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak.

### 6). Lingkar dada

Pengukuran ini biasanya dilakukan pada anak umur 2 sampai 3 tahun, karena rasio lingkar kepala dan dada pada anak usia 6 bulan sama. Setelah umur ini tulang tengkorak tumbuh lebih lambat dibandingkan lingkar dada lebih cepat. Umur antar 6 bulan dan 5 tahun rasio lingkar kepala dan dada adalah kurang dari satu tahun, hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan

pertumbuhan, atau kelemahan sebagai indikator dalam menentukan KEP pada anak balita.

7). Tebal lemak bawah kulit

Otak, hati, jantung dan organ dalam lainnya merupakan bagian yang cukup besar dari berat badan, tetapi relatif tidak berubah pada anak malnutrisi. Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang sangat bervariasi pada penderita KEP dalam survey berskala besar disarankan bahwa total lemak dalam tubuh dapat diukur dari pengukuran beberapa tempat seperti pada trisep, bisep dan subskapular serta suprailiaka.

e. Indeks Antropometri

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi dari beberapa parameter disebut indeks antropometri. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan sebagai berikut :

1. Berat badan menurut ini adalah :

a. Kelebihan indeks ini adalah :

1. Lebih mudah dan lebih dimengerti oleh masyarakat umum
2. Baik untuk mengukur status gizi akut dan kronis
3. Berat badan dapat berfluktuasi
4. Sangat sensitive terhadap perubahan-perubahan kecil
5. Dapat mendeteksi kegemukan

b. Kekurangan indeks ini adalah :

1. Sulit menentukan umur seseorang terutama didaerah pedesaan
2. Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah usia lima tahun
3. Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat

2. Tinggi badan menurut umur (TB/U)

a. Kelebihan dari indeks ini adalah :

1. Baik untuk menilai status gizi masa lampau
2. Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa

b. Kekurangan dari indeks ini adalah :

1. Tinggi badan tidak cepat naik, bahwa tidak mungkin turun
2. Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga diperlukan dua orang untuk melakukannya
3. Ketetapan umur sulit didapat

3. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

a. Keuntungan indeks ini adalah :

1. Tidak menemukan data umur
2. Dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus)

b. Kelemahan indeks ini adalah :

1. Tidak dapat memberikan gambaran, apakah anak tersebut pendek atau cukup tinggi

2. Membutuhkan dua alat ukur
3. Pengukuran relative lama
4. Lingkar lengan menurut umur (LL/U)
  - a. Keuntungan indeks ini adalah :
    1. Indikator yang baik untuk menilai KEP berat
    2. Alat ukur murah, sangat ringan, dan dapat dibuat sendiri
  - b. Kelemahan indeks ini adalah :
    1. Hanya dapat mengidentifikasi anak dengan KEP berat
    2. Sulit menentukan ambang batas
    3. Sulit digunakan untuk melihat pertumbuhan anak terutama anak 2 sampai 5 tahun yang perubahannya tidak nampak nyata.
5. Indeks massa tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan.
6. Tebal lemak bawah kulit menurut umur

Lemak tubuh dapat diukur secara absolut dinyatakan dalam kilogram maupun secara relatif dinyatakan dalam persen terhadap berat tubuh total. Jumlah lemak tergantung dari jenis kelamin dan umur. Umumnya lemak bawah kulit pria 3,1 kg dan pada wanita 5,1 kg.
7. Rasio Lingkar Pinggang dengan Pinggul

Pengukuran lingkar pinggang dan pinggul harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan posisi pengukuran harus tepat. Perbedaan posisi pengukuran akan

memberikan hasil yang berbeda. Rasio lingkaran pinggang dan pinggul untuk perempuan adalah 0,77 dan 0,90 untuk laki-laki.

#### f. Penggunaan Indeks Antropometri

Indeks antropometri yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Indeks (BMI) yang merupakan salah satu alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Berat badan kurang dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit infeksi, sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan risiko terhadap penyakit degeneratif. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang. (Nasri 2004)

Dengan menggunakan rumus IMT dapat diketahui apakah berat badan seseorang dapat dinyatakan normal, kurus, atau gemuk. Penggunaan rumus ini hanya untuk orang dewasa berumur > 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, olahragawan.

Akan tetapi menurut subdit gizi klinis Depkes RI yang dipublikasikan lewat WWW. Gizi .net (tanggal akses 12 Desember 2008) menjelaskan bahwa saat ini IMT sudah dapat digunakan untuk menentukan status gizi anak mulai usia 2 tahun s/d 20 tahun. (Nasri 2004).

Untuk mengetahui nilai IMT, dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan FAO/WHO, yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Disebutkan bahwa batas ambang normal untuk laki-laki adalah : 20,1 - 25,0 dan untuk perempuan adalah : 18,7 – 23,8, untuk kepentingan pemantauan dan tingkat defisiensi kalori ataupun tingkat kegemukan, FAO/WHO menyarankan menggunakan satu batas ambang antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan ambang batas pada perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat.

Untuk kepentingan Indonesia, batas ambang dimodifikasi lagi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di beberapa Negara berkembang pada akhirnya diambil kesimpulan, bahwa batas ambang IMT untuk Indonesia adalah sebagai berikut :

	Kategori	IMT
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	< 17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0 – 18,4
Normal	Ideal	18,5 – 25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	25,1 – 27,0
Obes	Kelebihan berat badan tingkat berat	> 27,0

**Departemen Kesehatan RI**  
Jakarta, September 2004

## B. Tinjauan Umum Tentang Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa remaja meliputi semua perkembangannya yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.

Berkenaan dengan masa remaja, dalam QS Al-Hajj, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ  
مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ  
وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا  
ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ  
الْعُمُرِ لِيَكِيلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا  
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya: " Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian( dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya....." (Departemen Agama RI: (22): 5 hal: 265)

Dalam ayat diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia tidak sekaligus, melainkan secara berevolusi (bertahap), mulai dari saripati tanah, nuthfah, ‘alaqah, daging akhirnya menjadi manusia yang utuh secara fisik, setelah itu baru ditiupkan ruh. Kesimpulan ini didukung oleh QS Nuh:

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

Terjemahnya: "Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu secara bertahap".

(Departemen Agama RI:( 71): 14 hal: 455)

Dalam ayat ini kaum Nuh diingatkan lagi akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Agar mereka melihat kepada diri sendiri. Mereka selaku manusia mengalami tahap-tahap kejadian. Mula-mula dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Setelah sempurna kejadian mereka, merekapun dilahirkan. Mulai dari seorang bayi yang tidak tahu sesuatupun sampai menjadi manusia yang dewasa, kemudian menurunkan keturunan. Akhirnya mereka meninggal dunia.

Mengenai tahap-tahap kejadian manusia ini diterangkan pula dalam firman Allah swt.

Demikian juga Firman Allah QS Al-mukminun :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (berasal) dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati tanah itu menjadi nuthfah yang tersimpan di

*dalam tempat yang paling kokoh (rahim). Setelah itu nuthfah tersebut Kami jadikan segumpal darah (sesuatu yang bergantung). Selanjutnya darah itu Kami jadikan segumpal daging. Terus segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu Kami bungkus dengan otot. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbeda darimakhluk-makhluk) lain (karena diberi ruh, akal, dan sebagainya). Maha Suci Allah selaku Pencipta yang paling baik”.(Departemen Agama RI :(23)12-14 hal: 273)*

Ciri-ciri remaja menurut WHO, 1995: pada masa remaja terjadi perubahan fostur tubuh dan peningkatan tinggi badan secara cepat, usia remaja 10-19 tahun, perempuan umur 10-18 tahun, laki-laki 12-20 tahun (Nancy pardede, 2002), umur 21 tahun dan belum menikah (UUNo.4, 1979), umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal sendiri (UU perburuhan anak), perempuan umur 16 tahun, laki-laki 19 taahun (UU perkawinan No. 1 1974), umur 18 tahun yang sesuai dengan saat lulus dari sekolah menengah (Depdikbud), diantaranya pertumbuhan payudara 10,6 tahun, puncak peningkatan TB 11,7 tahun, haid pertama 12,8 tahun. ([www.Gizi.net](http://www.Gizi.net), diakses tanggal 1 Desember 2008).

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih konseptual dengan adanya tiga kriteria yaitu pertama kriteria biologik, dengan ciri individu berkembang mulai saat pertama kali ia manginjakkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ketiga, pada kriteria sosial ekonomi, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang terjadi relatif lebih mandiri.

Berangkat dari masalah kesehatan, terutama kesehatan remaja, WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja dan membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun.

Berdasarkan hasil kerja untuk Pediatrik sosial di Jakarta, Oktober 1986, (Nasri, 2004) masa remaja dibagi atas :

1. Masa remaja dini : Remaja putri usia 12-13 tahun  
Remaja putra usia 10-15 tahun
2. Masa remaja lanjut : Remaja putri usia 13-18 tahun  
Remaja putra usia 15-20 tahun

Untuk pertumbuhan remaja yang optimal memerlukan zat gizi yang cukup dalam makanan sehari-hari. Namun remaja saat ini sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Dimana pola konsumsi remaja banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup modern yang instan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tingkat Pengetahuan Pengasuh/orangtua**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poedarminta, 1985) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui sesudah melihat dan menyaksikan, mengalami, atau ajar. Jadi pengetahuan adalah apa yang telah diketahui dan mampu diingat oleh setiap orang setelah menyaksikan, mengalami atau diajarkan

Pengetahuan seseorang Bloom mengemukakan sebagai berikut:

- a. Tahu (*knowledge*) yang diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah diajari, termasuk mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

- b. Memahami (*comprehension*) diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat mengubah bentuk dan dapat menginterpretasikan atau menerangkan apa yang telah dipelajari
- c. Analisis (*analysis*) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi yang dapat dilihat dari cara menggambarkan, menyimpulkan materi yang diberikan. pada tingkat ini seseorang cenderung mampu menerangkan bagian-bagian dan menghubungkan satu dengan yang lainnya.
- d. Evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi. Penilaian ini berdasarkan suatu materi yang telah ditentukan. dan dapat dikatakan pada tingkat ini seseorang telah dapat dianggap tahu.

Dan mampu menilai sesuatu

(Ngatimin, dalam disertasinya 1987)

Pengetahuan pada dasarnya diperoleh dari proses pendidikan baik dalam bentuk formal maupun informal, seperti yang telah dikemukakan di bagian pendidikan bahwa pengetahuan menghasilkan persepsi, sikap, dan tindakan untuk berperilaku (Depkes, 2002)

Pengetahuan saja belum mampu membuat seseorang mengubah perilakunya, karena masih diperlukan motivasi dan perhatian agar individu mau mengubah pola hidupnya. Orang yang mempunyai pengetahuan mengenai zat gizi dan bahan makanan bergizi, namun tidak diterapkan dalam memilih hidangan untuk keluarganya, maka pengetahuan itu tidak bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatannya termasuk status gizi Balita (Suhardjo (2004)

Pengetahuan gizi pada umumnya mengenai kandungan zat gizi dalam pangan, dimana pengetahuan gizi yang baik dapat memengaruhi sikap dan tindakan seseorang dalam memilih makanan yang dikonsumsi, pengetahuan gizi ibu rumah tangga dalam memilih bahan makanan serta mengolah pangan sangat penting karena dapat menentukan tentang pentingnya keragaman pangan serta mencegah kehilangan zat gizi dalam preparasi dan mengolah pangan kesemuanya itu untuk mencegah ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu untuk mengendalikan zat gizi dalam suatu olahan. (Khonsam,2006)

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan**

##### **1. Pengertian Asupan Makanan**

Asupan makanan adalah kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi jumlah makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi dalam waktu yang cukup lama.

Pada anak remaja kudapan berkontribusi 30 % atau lebih dari total asupan kalori remaja setiap hari. Tetapi kudapan ini sering mengandung tinggi lemak, gula dan natrium dan dapat meningkatkan resiko kegemukan dan karies gigi. Oleh karena itu, remaja harus didorong untuk lebih memilih kudapan yang sehat. Bagi remaja, makanan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Kekurangan konsumsi makanan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, akan menyebabkan metabolisme tubuh terganggu.

Kecukupan gizi merupakan kesesuaian baik dalam hal kualitas maupun kuantitas zat-zat gizi sesuai dengan kebutuhan faali tubuh.

Kebutuhan energi diperlukan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk proses metabolisme tubuh. Cara sederhana untuk mengetahui kecukupan energi dapat dilihat dari berat badan seseorang. Asupan gizi adalah banyaknya gizi makanan yang dikonsumsi oleh Remaja dalam sehari (3x waktu makan) yaitu pagi, siang dan malam berdasarkan jumlah yang dianjurkan (AKG ) bahwa banyaknya zat gizi yang di butuhkan. Pada remaja perempuan 10-12 tahun kebutuhannya 50-60 kal/kg BB/ hari dan usia 13-18 tahun sebesar 40-50 kal/ kg BB/ hari.

Kebutuhan protein meningkat karena proses tumbuh kembang berlangsung cepat. Apabila asupan energi terbatas/ kurang, protein akan dipergunakan sebagai energi. Kebutuhan protein usia 10-12 tahun adalah 50 g/ hari, 13-15 tahun sebesar 57 g/ hari dan usia 16-18 tahun adalah 55 g/ hari. Sumber protein terdapat dalam daging, jeroan, ikan, keju, kerang dan udang (hewani). Sedangkan protein nabati pada kacang-kacangan, tempe dan tahu.

Lemak dapat diperoleh dari daging berlemak, jeroan dan sebagainya. Kelebihan lemak akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak tubuh yang sewaktu-waktu diperlukan. Departemen Kesehatan RI menganjurkan konsumsi lemak dibatasi tidak melebihi 25 % dari total energi per hari, atau paling banyak 3 sendok makan minyak goreng untuk memasak makanan sehari. Asupan lemak yang terlalu rendah juga mengakibatkan energi yang dikonsumsi tidak mencukupi, karena 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Pembatasan lemak hewani dapat mengakibatkan asupan Fe dan Zn juga rendah.

Kebutuhan vitamin dan mineral pada saat ini juga meningkat. Golongan vitamin B yaitu vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin) maupun niasin

diperlukan dalam metabolisme energi. Zat gizi yang berperan dalam metabolisme asam nukleat yaitu asam folat dan vitamin B12. Vitamin D diperlukan dalam pertumbuhan kerangka tubuh/ tulang. Selain itu, agar sel dan jaringan baru terpelihara dengan baik, maka kebutuhan vitamin A, C dan E juga diperlukan.

Kekurangan Fe/ zat besi dalam makanan sehari-hari dapat menimbulkan kekurangan darah yang dikenal dengan anemia gizi besi (AGB). Makanan sumber zat besi adalah sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, hati, telur dan daging. Fe lebih baik dikonsumsi bersama dengan vitamin C, karena akan lebih mudah terabsorpsi.

Status gizi seseorang dapat memberi petunjuk apakah seseorang itu menderita gizi kurang atau tidak. Status gizi seseorang ditentukan oleh tingkat konsumsi (asupan kalori), yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan. Kualitas makanan berarti adanya semua zat gizi dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh. Bila susunan makanan memenuhi kualitas dan kuantitasnya, maka akan memperoleh kondisi kesehatan yang baik pada akhirnya akan menghasilkan suatu status gizi yang baik pula. Apabila konsumsi baik kualitas maupun kuantitasnya lebih dari kebutuhan disebut konsumsi berlebih yang mengakibatkan status gizi lebih (Overnutritional state) jika sebaliknya akan terjadi gizi kurang (Under nutritional state). Dari sejarah perkembangan ilmu gizi makin banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara apa yang kita makan dengan kesehatan penyakit. Peribahasa kuno mengatakan bahwa " You are what you eat " yang berarti kamu adalah apa yang kamu makan. Sering dikutip tetapi tidak direnungkan dengan lebih dalam apa yang dimaksud peribahasa tersebut. Makanan meskipun enak dan mahal tidak selalu menjadikan

tubuh lebih sehat dan produktif, bahkan dapat sebaliknya menimbulkan penyakit. Misalnya apabila sering makan makanan berlemak dan manis-manis yang menghasilkan energi tinggi tidak diimbangi dengan kegiatan fisik yang memadai, mendorong orang menjadi gemuk, apabila kegemukan ini berlanjut dapat berakibat pada berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, hipertensi dan sebagainya. Sebaliknya makanan yang sederhana dan murah tetapi menyehatkan pengaruh makanan terhadap kesehatan dan penampilan seseorang paling mudah diamati pada wanita hamil, wanita menyusui, bayi, anak balita dan anak remaja.

## 2. Metode Pengukuran Konsumsi Untuk Individu

### a. Metode food recall 24 jam

Metode recall 24 jam adalah untuk memperoleh data mengenai jumlah kalori (energi) pada konsumsi makanan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu.

### b. Estimated food records

Metode ini juga disebutkan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode ini responden diminta untuk mencatat semua yang ia makan dan minum setiap kali sebelum makan dalam Ukuran Rumah Tangga (URT) atau menimbang dalam ukuran berat (gram) dalam periode tetapi (2-4 hari berturut-turut), termasuk cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut.

### c. Penimbangan makanan (food weighing)

Pada metode penimbangan makanan, responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi responden selama 1 hari.

Penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari tujuan, dana penelitian dan tenaga yang tersedia.

d. Metode riwayat makanan (dientany history method)

Metode ini bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan pengamatan dalam waktu yang cukup lama (seminggu, sebulan, bahkan setahun). Burke (1947) menyatakan bahwa metode ini terdiri dari tiga komponen yaitu : komponen yang pertama adalah wawancara (termasuk recall 24 jam), yang mengumpulkan data tentang apa saja yang dimakan responden selama 24 jam terakhir, komponen kedua adalah tentang frekuensi penggunaan dari sejumlah bahan makanan dengan memberikan daftar (checklist) yang sudah disiapkan, untuk mengecek kebenaran dari recall 24 jam, komponen yang ketiga adalah pencatatan konsumsi selama 2-3 hari sebagai cek ulang.

e. Metode Frekuensi Makanan (food frequency)

Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan jadi selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun.

Selain itu dengan metode frekuensi makanan dapat memperoleh gambaran pola konsumsi bahan makanan secara kualitatif, tetapi karena periode pengamatannya lebih lama dan dapat membedakan individu berdasarkan ranking tingkat konsumsi zat gizi, maka cara ini paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi.

### 3. Pemilihan Metode Pengukuran Konsumsi Makanan

Penelitian ini untuk mengetahui asupan makanan memakai metode food recall 24 jam. Prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak ia bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur kebelakang sampai 24 jam penuh. Misalnya petugas datang pada pukul 07.00 kerumah responden, maka konsumsi yang ditanyakan adalah mulai pukul 07.00 (saat itu) dan mundur kebelakang sampai pukul 07.00 pagi hari sebelumnya. Wawancara dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Langka-langkah pelaksanaan recall 24 jam :

- a. Membagikan kuesioner kepada responden semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam Ukuran Rumah Tangga (URT).
- b. Menganalisis bahan makanan kedalam zat gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).Membandingkan dengan Daftar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (DKGA) atau Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk Indonesia.
- c. Metode pengukuran konsumsi makanan untuk individu pada recall 24 jam.

Penentuan asupan makanan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Menghitung BBM (berdasarkan Bahan Makanan) dengan rumus

$$\text{BBM} = \frac{\text{BBM}}{\text{BYDD}} \times 100$$

2. Menghitung BK (Berat Kalori) makanan dengan rumus :

$$BK = \frac{BBM}{BYDD} \times 100$$

3. Menghitung kalori (Energi) setiap bahan makanan dengan rumus :

$$Cal = \frac{BB \times Cal . \text{ bahan makanan}}{100}$$

4. Menghitung BB (Berat Badan) dengan rumus :

$$BB = \frac{BK}{100} \times BYDD$$

5. Untuk menghitung E Recall 24 jam dengan rumus :

E Recall 24 jam = jumlah Cal makan pagi + jumlah Recall makan siang +  
jumlah Recall makan malam. AKG individu :

$$\frac{BB/U \text{ (Pada Saat Perkembangan)} \times E \text{ (AKG)}}{AKG \text{ individu}} \times 100$$

Selanjutnya pencapaian AKG ( tingkat konsumsi energi ) untuk individu tersebut adalah

$$: \frac{E \text{ Recall 24 Jam}}{AKG \text{ individu}} \times 100$$

Dengan klasifikasi penentuan asupan makanan :

Baik = > 80%

Sedang = 60%-70%

Kurang = 50-60%

Defisit = < 50%

## E. Tinjauan Umum Tentang Frekuensi Makan

Frekuensi makan adalah jumlah dan macam makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok tertentu.

Nabi memberi petunjuk agar kita mencegah "over dosis" dan makan secara berlebihan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam *Musnad* dan lainnya diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda :

*Artinya; "Tidak ada 'bencana' yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman dan sepertiga sisanya untuk nafas".*

*(HR. Ahad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim)*

Dibeberapa daerah pedesaan di Asia tenggara umumnya makan satu dua kali sehari. Kalau hanya satu kali makan setiap hari, maka konsumsi pangan terutama bagi anak-anak, mungkin sekali kurang dan dapat berakibat buruk pada status gizinya. Kebiasaan makan dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik (lingkungan alam, ekonomi, sosial budaya dan agama) dan faktor instrinsik (emosional, jasmaniah serta penilaian terhadap makanan).

Keadaan ekonomi pangan merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap status gizi individu, keluarga serta masyarakat. Kebiasaan makan (food habits) adalah pengembangan bentuk pengalaman makan yang dimulai masa kanak-kanak sampai masa remaja. Sehingga membentuk pola makan yang bersifat tetap, keadaan ini

di pengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. (Nizel Abraham E, 1981)

Ada beberapa alasan mengapa zat-zat gizi dibutuhkan oleh remaja, antara lain :

1. Secara fisik terjadi pertumbuhan yang sangat cepat ditandai dengan peningkatan berat badan. Pertumbuhan yang sangat cepat dimulai pada usia 10-11 tahun pada cewek, mereka akan mengalami kenaikan berat badan sebesar 16 Kg dan tinggi badan 16 cm. Sebaliknya pada cowok, peningkatan berat dan tinggi badan terjadi pada usia 12-13 tahun, yaitu 20 Kg dan 20 cm.
  2. Mulai berfungsi dan berkembangnya organ-organ reproduksi, misalnya tumbuhnya payudara, berkembangnya vagina, penis, bulu-bulu disekitar kemaluan dan ketiak, dan menstruasi pada cewek. Kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan gizi, maka akan merugikan perkembangan selanjutnya. Terutama pada cewek karena nantinya akan menyebabkan menstruasi tidak lancar, gangguan kesuburan, rongga panggul tidak berkembang sehingga sulit ketika melahirkan, kesulitan pada saat hamil dan ngidam, serta air susu ibu (ASI) tidak bagus.
  3. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan yang mempengaruhi jumlah konsumsi makanan dan zat-zat gizi.
- Faktor lain adalah kesehatan yang bersangkutan, rendahnya konsumsi mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan organ dan jaringan tubuh, lemahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit serta menurunnya aktifitas dan produktifitas kerja yang di inginkan. (Syarif Hidayat, 1992)

## F. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2001). Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan makan secara sehat. Sedangkan yang dimaksud pola makan sehat dalam penelitian ini adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Pola makan sehari-hari merupakan pola makan seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan makan setiap harinya, pengertian pola makan seperti dijelaskan diatas pada dasarnya mendekati definisi diet dalam ilmu gizi.

Diet diartikan sebagai pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan agar seseorang tetap sehat. Untuk mencapai tujuan diet / pola makan sehat tersebut tidak terlepas dari masukan gizi yang merupakan proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ-organ, serta menghasilkan energi. (Akbar, 2004)

Berkenaan dengan pola makan, dalam QS al-Baqarah Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena

*sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Departemen Agama RI, 2:168 hal :20)*

Setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada tuhan melainkan Dia, maka Dia menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. (Itafsir Ibnu Katsir)

Khumadi (1994) mengemukakan bahwa pola makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaan serta pemeliharaan makanan. Menurut Koentjraningrat (1984) yang dikutip Nasri (2005) bahwa kebiasaan makan individu, keluarga dan masyarakat dipengaruhi oleh :

1. Faktor perilaku disini adalah cara berfikir, berperasaan, berpandangan tentang makanan, kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan makan dan memilih makanan.
2. Faktor lingkungan sosial, segi kependudukan dengan susunan tingkat dan sifatnya.
3. Faktor lingkungan ekonomi, daya beli, ketersediaan uang
4. Lingkungan skologi, kondisi tanah, lingkungan biologi, sistem usaha tani, sistem pasar, dan sebagainya.
5. Faktor kesediaan bahan makanan, dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat hasil karya manusia seperti sistem tani dan lain-lain.

6. Faktor perkembangan teknologi seperti bioteknologi dan menghasilkan jenis-jenis bahan makanan yang lebih praktis dan lebih bergizi, menarik, awet dan lainnya.

Setiap manusia memiliki kebiasaan makan dalam keseharian, meski rata-rata orang memiliki pola makan yang hampir biasa dikatakan sama, tapi pada kenyataannya belum tentu sama dalam jumlah yang dikonsumsi.

Pola makan yang baik harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan sehat, yaitu hidangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengingat bahwa fungsi makanan bagi tubuh adalah untuk menyediakan tenaga, keperluan pertumbuhan, pemeliharaan, dan pengganti jaringan yang rusak. Namun dewasa ini, keputusan memilih makanan pada kebanyakan orang bukanlah karena nilai gizinya, melainkan cita rasa, budaya dan ketersediaan makanan itu sendiri.

Pemilihan bahan makanan dengan alasan yang beragam dialami pula oleh remaja. Perkembangan dari seorang anak menjadi dewasa pasti melalui fase remaja. Pada fase ini seseorang terus berkembang, demikian pula aspek sosial maupun psikologinya. Perubahan ini terkecuali pengalaman dalam menentukan makanan apa yang dikonsumsi.

## A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti : bakteri, virus, rickettsia, jamur, cacing dsb (Entjang, 2000).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya (metode pengobatan Nabi) mengatakan penyakit ada dua macam, penyakit material dan penyakit non material. Penyakit material adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan materi dalam tubuh sehingga membahayakan aktivitas tubuh itu sehari-hari. Ini adalah penyakit umum dalam masyarakat.

Penyebabnya adalah mengkonsumsi makanan lain sebelum makanan dalam tubuh tercerna dengan sempurna. Atau mengkonsumsi makan secara berlebihan dari kebutuhan tubuh itu sendiri, mengkonsumsi makanan yang kurang berguna, mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna. Kalau seseorang terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu dan terbiasa mengkonsumsinya, ia bisa terkena berbagai macam penyakit. Kalau seseorang mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bervariasi yaitu hanya mengkonsumsi sesuai kebutuhan tubuh seimbang dalam porsi dan kualitasnya, tubuh akan dapat mengambil manfaat dari semua makanan tersebut lebih banyak daripada makanan yang banyak jumlahnya.

Jellife (1990) dalam hasriani (2004) mengemukakan bahwa penyakit infeksi mempunyai efek terhadap status gizi untuk semua umur, tetapi lebih nyata pada kelompok anak dan remaja, infeksi juga mempunyai kontribusi terhadap desinfektan kalori, protein dan zat lainnya, karena menurunnya nafsu makan sehingga asupan makanan berkurang. Kebutuhan energi pada saat infeksi biasa mencapai dua kali kebutuhan normal karena meningkatnya metabolisme dalam tubuh.

Status gizi yang jelek dapat juga memicu timbulnya infeksi oleh karena daya tahan tubuh yang rendah. Immunoglobulin dapat terbentuk jika terdapat protein di dalam tubuh, demikian pula sebaliknya, sehingga hal tersebut bagaikan lingkaran setan yang tiada akhirnya. Olenya itu, dalam pemeliharaan kesehatan anak, pemenuhan gizi berpengaruh terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh anak. Kalau gizi anak, resiko terkena penyakit infeksi berkurang. Dari hasil penelitian Lubis, dkk (1997) ditemukan adanya hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi (diare dan batuk) dengan status gizi anak.

## 1. Penyakit Diare

### a. Pengertian

Diare adalah berak encer (biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari) yang kadang-kadang disertai : muntah, badan lesu atau lemah, panas dan tidak nafsu makan, terdapat darah dan lendir dalam kotoran (Dinkes DKI, 2003).

Mengenai diare, Fegin dan Stoller (1993) mendefinisikan sebagai peningkatan frekuensi, keenceran dan volume tinja, bisa terdapat darah dalam feses, feses warna hijau, atau mengandung makanan yang tak dicerna, muntah tetapi tidak harus selalu ada. Anak nampak lemah dan gelisah, selain itu bisa dehidrasi dan demam (Bahar, 2002).

### b. Jenis Diare

Jenis – jenis diare yaitu :

1. Diare akut adalah diare yang terjadi sewaktu-waktu tetap gejalanya dapat berat
2. Diare kronis atau persisten adalah diare yang kejadiannya lebih kompleks (Widjaja, 2003)

c. Penyebab dan akibat diare

Diare menyebabkan keadaan gizi anak menjadi buruk bahkan kematian, hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu :

1. Faktor infeksi

Infeksi pada saluran pencernaan merupakan penyebab utama diare pada anak.

Jenis-jenis infeksi yang umumnya menyerang sebagai berikut :

- a. Infeksi bakteri oehkuman E.coli, salmonella, vibrio cholera (kolera), dan serangan bakteri lain yang jumlahnya toa berlebihan dan patogenik (memanfaatkan kesempatan ketika kondisi tubuh lemah) seperti pseudomonas
- b. Infeksi basil
- c. Infeksi virus enterovirus dan adenovirus
- d. Infeksi parasit oleh cacing (askaris)
- e. Infeksi jamur (candidiasis)
- f. Infeksi akibat organ lain, seperti radang tonsil, bronchitis dan radang tenggorokan.
- g. Keracunan makanan (Widjaja, 2003)

2. Faktor malabsorpsi yaitu :

- a. Malabsorpsi karbohidrat

Pada bayi kepekaan terhadap lactoglobulin dalam suatu formula menyebabkan diare. Gejalanya berupa diare berat, tinja berbau sangat asam sakit di daerah perut. Jika sering terkena diare ini, maka pertumbuhan anak akan terganggu.

b. Malabsorpsi lemak

Dalam makanan terdapat lemak yang disebut triglyserida, dengan bantuan kelenjar lipase, mengubah lemak menjadi micelles siap diabsorpsi. Jika tidak ada lipase dan terjadi kerusakan mukosa usus, diare dapat jadi muncul karena lemak tidak terserap dengan baik. Gealanya adalah tinja mengandung lemak (Widjaja, 2003)

3. Faktor makanan

Makanan yang mengakibatkan diare adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah (sayuran), dan kurang matang.

4. Faktor psikologi

Rasa takut, cemas, dan tegang, jika terjadi pada anak dapat menyebabkan diare kronis

d. Akibat diare yang dapat timbul pada anak yaitu :

a. Dehidrasi

Keadaan yang harus dihindari pada waktu menderita diare adalah dehidrasi yang terjadi bila tubuh kekurangan cairan dan dapat berakibat kepada kematian, utamanya pada bayi atau anak-anak apabila tidak segera diatasi (Widjaja, 2003).

Dehidrasi akan menyebabkan gangguan keseimbangan metabolisme tubuh. Gangguan ini dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Kematian ini lebih disebabkan bayi kehabisan cairan tubuh. Karena asupan cairan tidak seimbang dengan pengeluaran melalui muntah dan berak, meskipun berlangsung sedikit demi sedikit. Banyak orang menganggap bahwa pengeluaran

cairan seperti ini adalah hal biasa dalam diare, namun, akibatnya sesungguhnya berbahaya.

Presentase kehilangan cairan tidak harus banyak baru menyebabkan kematian. Kehilangan cairan tubuh sebanyak 10% saja sudah membahayakan jiwa. Pada bayi, keadaan ini dapat mengakibatkan kematian setelah sakit selama 2-3 hari (Widjaja,2003).

b. Gangguan Pertumbuhan

Gangguan ini terjadi karena asupan makanan terhenti sementara pengeluaran zat gizi terus berjalan. Jika tidak ditangani dengan benar diare akan menjadi kronis. Pada kondisi ini obat-obatan yang diberikan tidak serta-merta dapat menyembuhkan diare. Jika diare dapat disembuhkan tetapi sering terjadi lagi, akan menyebabkan berat badan anak terus merosot. Akibatnya anak akan kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan fisik dan jaringan otaknya (Widjaja,2003).

Menurut husaini dan anwar (2001) dalam hasriani (2004) bahwa anak yang berumur dibawah 6 bulan yang menderita diare, umumnya mempunyai resiko paling besar. Bagi yang berumur diatas 6 bulan berada dan pada tingkat keadaan gizi baik, apabila diare mereka jarang membawa akibat yang serius. Tapi bila tingkat keamanan gizinya rendah, maka bahaya akan lebih besar. Dan anak yang menyusui pada ibunya sampai 6 bulan jarang sekali terjadi diare. Hanya anak yang pada umur tersebut, yang diberikan susu botol, kadang menderita diare. Kejadian diare akan lebih sering terjadi pada anak yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun.

## 2. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA merupakan singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut, istilah ini diadaptasi dari istilah bahasa Inggris Acute Respiratory Infections (ARI), istilah ISPA meliputi tiga unsure yaitu infeksi, saluran pernafasan dan akut dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang baik sehingga menimbulkan gejala penyakit.
- b. Saluran pernafasan adalah organ mulai hidung hingga alveoli beserta organ telinga dan pleura. Secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian atas, saluran pernafasan bawah (termasuk jaringan paru-paru).
- c. Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. Batas 14 hari ini menunjukkan proses akut.

Adapun gejala ISPA beberapa diantaranya adalah anak bersin-bersin, beringsus, batuk, bias ditemukan sakit tenggorokan, bias demam dan menggigil. ISPA menjadi berat bila disertai dengan bernafas cepat, demam kian tinggi, anak tidak mampu minum apapun, kesemua hal tersebut diatas dapat mengakibatkan menurunnya nafsu makan, malabsorpsi, gangguan metabolisme yang akhirnya menyebabkan status gizi anak menjadi turun (Sayogo, 1996).

Mawar (1999) dalam Hasriani (2004) mengungkapkan bahwa infeksi saluran pernapasan merupakan penyebab utama dari kematian anak-anak diseluruh dunia. Di Negara-negara sedang berkembang, frekuensi infeksi lebih tinggi pada anak kecil dan menyebabkan angka mortalitas yang tinggi. Keadaan ini mungkin ada hubungannya

dengan bahaya yang besar dari penyakit itu karena radang yang ditimbulkan menyebabkan sumbatan pada saluran nafas.

Macam-macam infeksi saluran pernafasan :

a. Pneumonia

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Terjadinya pneumonia pada anak seringkali bersamaan dengan proses akut pada bronkitis. Gejala penyakit ini berupa nafas cepat dan nafas sesak, karena paru meradang secara mendadak. Serangan pneumonia sangat rentan terhadap bayi berumur dibawah dua bulan, berjenis kelamin laki-laki, gizi kurang, berat badan lahir rendah, tidak mendapat ASI memadai, polusi udara, kepadatan tempat tinggal, imunisasi yang tidak memadai dan defisiensi vitamin A.

Sedangkan faktor-faktor yang meningkatkan resiko kematian akibat pneumonia adalah umur di bawah dua bulan, rendahnya tingkat sosio-ekonomi, tingkat pendidikan ibu rendah , serta rendahnya tingkat pelayanan / jangkauan pada pelayanan kesehatan (pedoman program pemberantasan penyakit ISPA untuk penanggulangan Pneumonia pada balita, 2004)

b. Bronkhitis

Bronkhitis adalah suatu radang jaringan paru-paru yang biasanya didahului oleh pilek yang kurang mendapat perawatan semestinya. Jalannya penyakit ini biasanya ringan. Gejalanya seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk-batuk, menggigil dan napas bunyi. Bronkhitis ringan biasanya tidak panas hanya tidak ada nafsu makan dan sedikit batuk-batuk.

c. Asma (bengek)

Asma adalah suatu penyakit sesak napas yang timbul secara tiba-tiba. Anak yang sering terkena asma umumnya pada umur 2-3 tahun dan kebanyakan anak yang menderita akan sembuh dengan sendirinya bila telah akil-baliq, tetapi adapula yang tidak sembuh sampai dewasa bahkan seumur hidup.



## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Konsep Pemikiran Variabel Yang Di Teliti**

Status gizi merupakan suatu hal yang paling penting dalam menentukan status kesehatan seseorang, semakin baik status gizi seseorang, status kesehatannya juga akan membaik. Status gizi juga berperan dalam dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Besarnya kebutuhan tubuh terhadap zat-zat gizi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, aktifitas dll.

Masa remaja merupakan perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan yang sangat menabjubkan pada diri kita, baik secara fisik, mental maupun sosial. Perubahan ini perlu ditunjang oleh kebutuhan makanan (zat-zat gizi) yang tepat dan memadai. Karena masa remaja merupakan masa "Rawan Gizi" karena kebutuhan akan gizi sedang tinggi-tingginya. Pada usia ini kita tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi dan sering tidak mau memenuhinya karena takut gemuk.

#### **1. Tingkat Pengetahuan**

Tingkat pengetahuan merupakan hasil tahu dari setiap individu yang diperoleh melalui pengamatan terhadap objek dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan kesehatan siswa pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan adanya pesan tersebut maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku.

## 2. Asupan Makanan

Asupan makanan adalah kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi jumlah makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi dalam waktu yang cukup lama.

## 3. Frekuensi Makan

Frekuensi makan adalah jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok tertentu.

Kebiasaan makan (food habits) adalah pengembangan bentuk pengalaman makan yang dimulai masa kanak-kanak sampai masa remaja. Sehingga membentuk pola makan yang bersifat tetap, keadaan ini di pengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. (Nizel Abraham E, 1981)


## 4. Pola Makan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2001). Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan makan secara sehat, yang dikenal dengan mengkonsumsi makanan empat sehat lima sempurna. Sedangkan yang dimaksud pola makan sehat dalam penelitian ini adalah suatu cara atau usaha dalam mengkonsumsi makanan empat sehat lima sempurna, pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit.

Pemilihan makanan remaja tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi tetapi sekedar bersosialisasi untuk kesenangan. Pola makan yang salah dapat berakibat buruk pada status gizi remaja.

#### 5. Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti : bakteri, virus, rickettsia, jamur, cacing dsb (Entjang, 2000). Jellife (1990) dalam hasriani (2004) mengemukakan bahwa penyakit infeksi mempunyai efek terhadap status gizi untuk semua umur, tetapi lebih nyata pada kelompok anak, infeksi juga mempunyai kontribusi terhadap desinfektan kalori, protein dan zat lainnya, karena menurunnya nafsu makan sehingga asupan makanan berkurang.




## B. Alur Pemikiran Variabel Penelitian

Pada penelitian ini secara umum di bagi atas 2 variabel, yaitu :


1. Variabel Dependent : Status Gizi
2. Variabel Independet : Tingkat Pengetahuan, Asupan Makanan, Frekuensi Makan, pola makan dan Penyakit Infeksi.


Bagan Kerangka Konsep



Gambar 1 : Bagan Kerangka Konsep

Keterangan :

 : Variabel yang diteliti

 : Variabel yang tidak diteliti

## C. Definisi Operasional Dan Kriteria Obyektif

### 1. Status Gizi

Definisi operasional

Keadaan dimana gizi seseorang yang ditentukan setelah pengukuran secara Antropometri dengan menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT).

Kriteria Obyektif

1. Normal : jika  $IMT \geq 18,5 - 25,0$
2. Kurang : jika  $IMT < 18,4$

### 2. Tingkat Pengetahuan

Definisi Operasional

Apa yang diketahui responden tentang pengertian, manfaat dan sumber Zat Gizi

Kriteria Obyektif :

1. cukup : bila jawaban responden mengenai pengetahuan mendapat nilai  $\geq 50\%$  dari total nilai jawaban dari seluruh pertanyaan yang disusun dan diberi bobot.
2. kurang : bila jawaban responden  $< 50\%$  dari nilai jawaban pertanyaan.

### 3. Asupan Makanan

Definisi Operasional

Asupan gizi adalah banyaknya gizi makanan yang dikonsumsi oleh Remaja dalam sehari (3x waktu makan) yaitu pagi, siang dan malam berdasarkan jumlah yang dianjurkan (AKG) bahwa banyaknya zat gizi yang dibutuhkan.

Pada remaja perempuan 10-12 tahun kebutuhannya energi 50-60 kal/kg BB/ hari dan usia 13-18 tahun sebesar 40-50 kal/ kg BB/ hari. protein usia 10-12 tahun adalah

50 g/ hari, 13-15 tahun sebesar 57 g/ hari dan usia 16-18 tahun adalah 55 g/ hari.

Penentuan ini berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2004 (AKG,2004).

Dalam penelitian ini asupan makanan memakai metode food recall 24 jam.

Kriteri obyektif :

Cukup : Apabila Konsumsi Asupan Gizi 80 - 110 % AKG

Kurang : Apabila konsumsi Asupan Gizi < 80 % AKG

#### 4. Frekuensi Makan

Definisi Operasional

Adalah kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari ditinjau dari jumlah atau beberapa kali makan dalam sehari untuk memenuhi berbagai zat gizi lainnya.

Kriteria Obyektif :

1. cukup : 3 kali sehari
2. kurang : < 3 kali sehari

#### 5. Pola Makan

Definisi Operasional

Pola makan dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan makan secara sehat memenuhi empat sehat lima sempurna.

Kriteria Obyektif :

1. Cukup : memenuhi empat sehat lima sempurna
2. kurang : tidak memenuhi empat sehat lima sempurna

## 6. Penyakit Infeksi (Diare dan Ispa)

### Definisi Operasional

Penyakit Diare adalah penyakit infeksi yang diderita oleh penderita yang ditandai dengan buang air besar tiga kali atau lebih dalam sehari, dan konsentrasi berubah cair atau satu kali disertai dengan darah dalam satu bulan terakhir.

### Kriteria Obyektif :

Ya : apabila penderita, menderita diare dengan gejala dan kriteria di atas

Tidak : apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas

### a. Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

#### Definisi Operasional

ISPA adalah penyakit infeksi yang diderita oleh penderita ditandai dengan batuk, pilek (ingusan), kesulitan bernafas atau tanpa panas (demam atau tanda berat lainnya) dalam satu bulan terakhir ini (Sayogo,1996).

### Kriteria Obyektif :

Ya :apabila penderita, menderita salah satu atau lebih gejala penyakit tersebut.

Tidak : apabila tidak sesuai dengan kriteria diatas

#### **D. Hipotesis Penelitian**

1. Hipotesis Null ( $H_0$ )

- a. Tidak Ada hubungan tingkat pengetahuan pengasuh/orangtua dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.
- b. Tidak Ada hubungan asupan makanan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.
- c. Tidak Ada hubungan frekuensi makan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.
- d. Tidak Ada hubungan pola makna dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

- a. Ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
- b. Ada hubungan asupan makanan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
- c. Ada hubungan frekuensi makan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
- d. Ada hubungan pola makan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

## **BAB IV**

### **MOTODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Survey Analitik dengan rancangan *Cross Sectional Study*, yaitu suatu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*), yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

#### **C. Populasi Dan Sampel**

Adalah semua siswa kelas I, II dan kelas III, sebanyak 70 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa, dengan menggunakan teknik total sampling (*axhaustic sampling*) yaitu semua populasi menjadi unit analisis.

## D. Pengumpulan Data

Sumber Data :

1. Kepustakaan (*library research*) dan Lapangan (*field research*)
  - a. Kepustakaan (*library research*) adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku dan referensi di perpustakaan.
  - b. Lapangan (*field research*) adalah sumber data yang diperoleh dilapangan yaitu populasi dan sampel.
- 2.. Data primer

Data ini di peroleh dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sedangkan data tentang status gizi diperoleh dengan cara pengukuran Indeks Massa Tubuh terhadap siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa.

a. Cara Pengukuran BB

1. menyiapkan alat penimbangan, alat yang digunakan adalah timbangan injak dengan tingkat ketelitian 0,1 Kg
2. siswa melepaskan alas kaki keatas serta isi kantong dikeluarkan
3. kemudian siswa naik keatas timbangan keadaan lengan bergantung bebas disamping badan dengan telapak tangan menghadap kepaha selanjutnya lihat beratnya

b. Cara Pengukuran TB

1. Menyiapkan alat pengukur tinggi badan dengan menggunakan alat mikrotise yang berbentuk siku-siku dengan tingkat ketelitian 0,1 cm

2. Siswa diharapkan melepaskan alas kaki
3. Selanjutnya siswa berdiri tegak lurus pada lantai yang datar, kaki sejajar dengan alat pengukur dengan tumt, bokong, kepala bagian belakang menempel pada dinding dalam sikap tegak pandangan kedepan, kedua tangan berada disamping, dalam keadaan bebas.

c. Umur dihitung dengan melihat data kelahiran (umur, bulan, dan tahun) dihitung dengan satuan bulan penuh.

3. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao KabupatenGowa.

**E. Pengolahan Dan Penyajian Data**

Pengolahan data dilakukan dengan komputer program SPSS For Windows, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk table distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan

Tabel 1  
Contoh table analisis statistik Chi Square :

Variabel	Variabel	Dependent	JML	X <sup>2</sup> (p)
	Kategori I	Kategori II		
Kategori I	a	c	a + b	
Kategori II	b	d	b + c	
Jumlah	a + b	c + d	a + b + c + d	

Analisis data dilakukan dengan menguji Hipotesis Nol dengan menggunakan rumus Chi Square ( X<sup>2</sup>).

$$X^2 : \frac{\sum (o - E)^2}{E}$$

Dimana :

$X^2$  : Hasil perhitungan yang konfirmasi dengan table chi square

O : Observasi


E : Frekuensi yang diharapkan, diperoleh dari hasil perkalian jumlah kolom dan jumlah baris dengan semua observasi

df : tingkat kebebasan adalah 95 % (0,05)

K : jumlah kolom

B : jumlah baris

Interpretasi : Hipotesis nol ( $H_0$ ) di tolak apabila  $X^2$  hitung lebih besar dari  $X^2$  tabel dengan  $\alpha : 0,05$ .



**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa selama 5 hari mulai tanggal 30 juli sampai 3 agustus 2009, dengan populasi sebanyak 70 siswa. Data diolah dan dianalisis disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil analisa data disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Analisa Univariat
  - a. Jenis Kelamin

Tabel 2  
Distribusi Jenis Kelamin Siswa madrasah Aliyah Madani Pao-pao  
Kabupaten Gowa tahun 2009

Jenis Kelamin	n	%
Laki-Laki	19	27,15
Perempuan	51	72,85
Jumlah	70	100,0

Sumber: Data Primer, 2009

Tabel 2 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27,15% dan perempuan sebanyak 72,85%.

b. Umur

Tabel 3  
Distirbusi Umur siswa Madrasah Aliyah Madani pao-pao  
Kabupaten Gowa tahun 2009

Umur	n	%
13-15	28	40,0
16-18	42	60,0
Jumlah	70	100,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 3 menunjukkan bahwa kelompok umur 13-15 tahun siswa Madrasah Aliyah Madani pao-pao sebanyak 40,0% dan kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 60,0%.

c. Tingkat Pengetahuan

Tabel 4  
Distirbusi Tingkat Pegetahuan siswa Madrasah Aliyah Madani pao-pao  
Kabupaten Gowa tahun 2009

Tingkat Pengetahuan	n	%
Cukup	37	52,86
Kurang	33	47,14
Jumlah	70	100,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 4 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 52,86% dan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 47,14%.

d. Asupan Makanan

Tabel 5  
Distribusi Asupan Makanan siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao  
Kabupaten Gowa Tahun 2009

Asupan Makan	n	%
Cukup	41	58,58
Kurang	29	41,42
Jumlah	70	100,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 5 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang memiliki asupan makanan cukup sebanyak 58,58% dan asupan makanan kurang sebanyak 41,42%.

d. Frekuensi Makan

Tabel 6  
Distribusi Frekuensi Makan siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao  
Kabupaten Gowa Tahun 2009

Frekuensi Makan	n	%
Cukup	54	77,15
Kurang	16	22,85
Jumlah	70	100,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 6 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang memiliki frekuensi makan cukup sebanyak 77,15% dan frekuensi makan kurang sebanyak 22,85%.

e. Pola Makan

Tabel 7  
Distribusi Pola Makan siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten  
Gowa Tahun 2009

Pola Makan	n	%
Cukup	42	60,0
Kurang	28	40,0
Jumlah	70	100,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 7 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang memiliki pola makan cukup sebanyak 60,0% dan pola makan kurang sebanyak 40,0%.

e. Penyakit Infeksi

Tabel 8  
Distribusi Penyakit Infeksi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao  
Kabupaten Gowa Tahun 2009

Penyakit Infeksi	n	%
Ya	30	42,86
Tidak	40	57,14
Jumlah	70	100,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 8 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang menderita penyakit infeksi sebanyak 42,86% dan yang tidak menderita penyakit infeksi sebanyak 57,14%.

Tabel 9  
Distribusi Penyakit Ispa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten  
Gowa Tahun 2009

Penyakit	n	%
Ispa		
Ya	15	21,43
Tidak	20	28,57
Jumlah	35	50,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 9 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang menderita penyakit ispa sebanyak 21,43 % dan yang tidak menderita penyakit infeksi sebanyak 28,57 %.

Tabel 10  
Distribusi Penyakit Diare siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten  
Gowa Tahun 2009

Penyakit	n	%
Diare		
Ya	15	21,43
Tidak	20	28,57
Jumlah	35	50,0

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 11 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang menderita penyakit diare sebanyak 21,43% dan yang tidak menderita penyakit infeksi sebanyak 28,57%

e. Status Gizi

Tabel 12  
Distribusi Status Gizi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa Tahun 2009

Status Gizi	n	%
Normal	46	65,72
Kurang	24	34,28
Jumlah	70	100

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 12 menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao kabupaten Gowa yang memiliki status gizi normal sebanyak 65,72% dan status gizi kurang sebanyak 34,28%.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Status Gizi

Tabel 13  
Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Status Gizi remaja Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa Tahun 2009

Tingkat Pengetahuan	Status Gizi				Jumlah	X <sup>2</sup> (P)
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%		
Cukup	30	81,1	7	18,9	37	8,226 (0,004)
Kurang	16	48,5	17	51,5	33	
Jumlah	46	34,3	24	65,7	70	

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 37 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup terdapat 81,1% siswa yang memiliki status gizi Baik. dan dari 33 siswa yang memiliki

tingkat pengetahuan Kurang terdapat 48,5% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (8,226)  $> X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,004) < 0.05$  ini berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan status gizi.

b. Hubungan Asupan Makan Dengan Status Gizi

Tabel 14  
Hubungan Asupan Makanan Dengan Status Gizi remaja Madrasah Aliyah  
Madani Pao-pao Kabupaten Gowa Tahun 2009

Asupan Makan	Status Gizi				Jumlah	$X^2$ (P)
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%		
Cukup	32	78,0	9	22,0	41	6,683
Kurang	14	48,3	15	51,7	29	(0,010)
Jumlah	24	65,7	46	34,3	70	

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 14 menunjukkan bahwa dari 41 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki asupan makan cukup terdapat 78,0% siswa yang memiliki status gizi Baik, dan dari 29 siswa yang memiliki asupan makan Kurang terdapat 48,3% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (6,683)  $> X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,010) < 0.05$  ini berarti ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi.

b. Hubungan Frekuensi Makan Dengan Status Gizi

Tabel 15  
Hubungan Frekuensi Makan Dengan Status Gizi remaja Madrasah Aliyah  
Madani Pao-pao Kabupaten Gowa Tahun 2009

Frekuensi Makan	Status Gizi				Jumlah	X <sup>2</sup> (P)
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%		
Baik	39	56,3	15	43,8	54	4,441 (0,035)
Kurang	7	27,8	9	72,2	16	
Jumlah	46	65,7	24	34,3	70	

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 15 menunjukkan bahwa dari 54 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki frekuensi makan cukup terdapat 56,3% yang memiliki status gizi Baik. dan dari 16 siswa yang memiliki frekuensi makan kurang terdapat 27,8% yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai X<sup>2</sup> hitung (4,4411) > X<sup>2</sup> tabel (3,84) atau nilai p(0,035) < 0.05 ini berarti ada hubungan antara frekuensi makan dengan status gizi.

b. Hubungan Pola Makan Dengan Status Gizi

Tabel 16  
Hubungan Pola Makan Dengan Status Gizi remaja Madrasah Aliyah Madani  
Pao-pao Kabupaten Gowa Tahun 2009

Pola Makan	Status Gizi				Jumlah	X <sup>2</sup> (P)
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%		
Cukup	29	87,9	4	12,1	33	3,054 (0,081)
Kurang	17	45,9	20	54,1	37	
Jumlah	46	65,7	24	34,3	70	

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 16 menunjukkan bahwa dari 29 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki pola makan cukup terdapat 87,9% siswa yang memiliki status gizi Baik. dan dari 17 siswa yang memiliki pola makan Kurang terdapat 45,9% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (3,054)  $> X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,081) < 0.005$  ini berarti ada hubungan antara pola makan dengan status gizi.

b. Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi

Tabel 17  
Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi remaja Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa Tahun 2009

Penyakit Infeksi	Status Gizi				Jumlah	$X^2$ (P)
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%		
Ya	26	65,0	14	35,0	40	0,21 (0,884)
Tidak	20	66,7	10	33,3		
Jumlah	46	65,7	24	34,3	70	

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 17 menunjukkan bahwa dari 40 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang menderita penyakit infeksi terdapat 65,0% siswa yang memiliki status gizi Baik. Dan dari 30 siswa yang tidak menderita penyakit infeksi terdapat 66,7% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (0,21)  $< X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,884) > 0.005$  ini berarti tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi.

## B. Pembahasan

### 1. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Status Gizi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

Pengetahuan siswa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi dalam satu rumah tangga. Siswa yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan mempunyai kemampuan dalam pemilihan bahan makanan serta dapat mengolah bahan makanan dan penyajian makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai standar Angka Kecukupan Gizi. Tingkat pengetahuan gizi umumnya berhubungan dengan masalah pemilihan dan proses persiapan serta dalam hal penyajian. Peranan siswa dalam keluarga adalah cenderung memilih makanan sendiri dan siswa terkadang menyampaikan apa yang dia ketahui.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 37 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup terdapat 81,1% siswa yang memiliki status gizi Baik. dan dari 33 siswa yang memiliki tingkat pengetahuan Kurang terdapat 48,5% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (8,226) >  $X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,004) < 0,05$  ini berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan status gizi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam memilih bahan makanan yang mengandung zat - zat gizi yang memenuhi kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya sebagai upaya mencegah terjadinya gizi kurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Suhardjo (2004) bahwa, pengetahuan saja belum mampu membuat seseorang mengubah perilakunya, karena masih diperlukan motivasi dan perhatian agar individu mau mengubah pola hidupnya. Orang yang mempunyai pengetahuan mengenai zat gizi dan bahan makanan bergizi, namun tidak diterapkan dalam memilih hidangan untuk keluarganya, maka pengetahuan itu tidak bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatannya termasuk status gizi anak remaja.

## 2. Hubungan Asupan Makanan Dengan Status Gizi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

Asupan makanan adalah kebiasaan seseorang dalam mengonsumsi jumlah makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi dalam waktu yang cukup lama. Status gizi seseorang dapat memberi petunjuk apakah seseorang itu menderita gizi kurang atau tidak. Status gizi seseorang ditentukan oleh tingkat konsumsi (asupan kalori), yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan

Pada usia remaja adalah usia yang merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga memerlukan zat-zat gizi yang relatif lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Hasil pertumbuhan setelah menjadi manusia dewasa sangat tergantung dari kondisi gizi sewaktu remaja ( Djaeni, Ahmad, 1985 )

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 41 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki asupan makan cukup terdapat

78,0% siswa yang memiliki status gizi Baik. dan dari 29 siswa yang memiliki asupan makan Kurang terdapat 48,3% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (39,206) >  $X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,0010) < 0,05$  ini berarti ada hubungan antara asupan makan dengan status gizi.

Asupan gizi dapat berbeda-beda setiap individu karena asupan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kebiasaan makan, jenis bahan yang digunakan, jenis masakan, cara pengolahan, cara penyajian. Sedangkan asupan gizi makanan akan berdampak pada status gizi seseorang. Asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai yang dianjurkan (recommended dietary allowance) akan mewujudkan status gizi yang sebaik-baiknya atau optimal dan status gizi seseorang sangat ditentukan oleh tingkat konsumsinya, sedangkan tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas hidangan.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Rukman (2001) dari 36 siswa santri pondok pesantren putra DDI Mangkoso, sebanyak 4 orang (11,1%) yang memiliki asupan Makan baik 32 orang (88,9%) yang memiliki asupan Makan kurang. Dimana dikemukakan bahwa ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi.

### 3. Hubungan Frekuensi Makan Dengan Status Gizi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

Frekuensi makan adalah jumlah dan macam makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok tertentu.

Nabi memberi petunjuk agar kita mencegah "over dosis" dan makan secara berlebihan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam *Musnad* dan lainnya diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda :

*Artinya; "Tidak ada 'bencana' yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukupilah seseorang itu mengkonsumsi beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman dan sepertiga sisanya untuk nafas".*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 54 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki frekuensi makan cukup terdapat 56,3% yang memiliki status gizi Baik. dan dari 16 siswa yang memiliki frekuensi makan kurang terdapat 27,8% yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (4,441) >  $X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,0035) < 0,05$  ini berarti ada hubungan antara frekuensi makan dengan status gizi.

Frekuensi makan pada siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao cukup baik karena pada umumnya siswa mengkonsumsi makanan sebanyak 3 kali sehari pagi, siang dan malam.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Rukman Saleh "Gambaran pola konsumsi, tingkat asupan dan status gizi santri putra DDI Mangkoso Barru" Bahwa ada hubungan antara frekuensi makan dengan status gizi.

#### 4. Hubungan Pola Makan Dengan Status Gizi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2001). Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan makan secara sehat.

Berkenaan dengan pola makan, dalam QS al-Baqarah Allah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".  
(Departemen Agama RI( 2):168 hal:20)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang memiliki pola makan cukup terdapat 87,9% siswa yang memiliki status gizi Baik. dan dari 17 siswa yang memiliki pola makan Kurang terdapat 45,9% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung (3,054) >  $X^2$  tabel (3,84) atau nilai  $p(0,0081) < 0,05$  ini berarti ada hubungan antara pola makan dengan status gizi.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nasri " Gambaran status gizi remaja di pesantren pondok madinah putra makassar tahun 2005" bahwa ada hubungan antara pola makan dengan status gizi.

## 5. Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti : bakteri, virus, rickettsia, jamur, cacing dsb (Entjang, 2000).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya (metode pengobatan Nabi) mengatakan penyakit ada dua macam, penyakit material dan penyakit non material. Penyakit material adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan materi dalam tubuh sehingga membahayakan aktivitas tubuh itu sehari-hari. Ini adalah penyakit umum dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa yang menderita penyakit infeksi terdapat 65,0% siswa yang memiliki status gizi Baik. Dan dari 30 siswa yang tidak menderita penyakit infeksi terdapat 66,7% siswa yang memiliki status gizi Baik.

Hasil analisis statistik diperoleh nilai  $X^2$  hitung  $(0,21) < X^2$  tabel  $(3,84)$  atau nilai  $p(0,0884) > 0,05$  ini berarti tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi.

Jumlah penyakit infeksi yang tidak diderita oleh siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao cukup baik, karena pada umumnya siswa tinggal di daerah kompleks yang cenderung berperilaku hidup bersih dan sehat dan selalu menjaga sanitasi lingkungan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Haspira ” Faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa SMUN I Bangkala Barat

Kabupaten Jeneponto tahun 2006” bahwa tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat pengetahuan berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Alyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
2. Asupan makan berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Alyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
3. Frekuensi makan berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Alyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
4. Pola makan berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Alyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa
5. Penyakit Infeksi tidak berhubungan dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah Alyah Madani Pao-pao Kabupaten Gowa


#### **B. Saran**

##### **a. Khusus**

1. Hendaknya siswa lebih meningkatkan pengetahuannya tentang gizi sehingga tidak berdampak pada status gizinya.
2. Hendaknya siswa agar makanan yang dikonsumsi setiap hari harus dapat memenuhi kebutuhan tubuh.
3. Hendaknya siswa mengkonsumsi makan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.

## **b. Umum**

1. Banyak hal yang harus diperkuat untuk melaksanakan program perbaikan gizi, mulai dari ketersediaan data dan informasi secara periodik untuk dapat digunakan dalam perencanaan program yang benar dan efektif. Kajian strategi program yang efisien untuk masa yang datang mutlak diperlukan, mulai dari tingkat nasional sampai dengan kabupaten.
2. Melakukan penanggulangan program perbaikan gizi dan kesehatan yang bersifat preventif untuk jangka panjang, sementara kuratif dapat diberikan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bentuk program efektif seperti perbaikan perilaku kesehatan dan gizi tingkat keluarga dilakukan secara professional mulai dipikirkan, dan tentunya dengan ketentuan atau kriteria yang spesifik lokal.
3. Melakukan strategi program khusus untuk penanggulangan kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dalam bentuk strategi pemberdayaan keluarga dan menciptakan kerja sama yang baik dengan swasta.
4. Secara bertahap melakukan peningkatan pendidikan, strategi ini merupakan strategi jangka panjang yang dapat mengangkat Indonesia dari berbagai masalah gizi dan kesehatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R