


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY”H”
DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 05 JULI- 12 AGUSTUS TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan D III Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**



Oleh:

NUR HAERATI
NIM : 70400114040

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur haerati
Nim : 70400114040
Tempat,Tanggal Lahir : Sungguminasa, 15 Juli 1996
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma
Alamat : Jl. Dirgantara
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada
Ny “H” Dengan Bendungan Payudara Di RSUD
Syech Yusuf Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 21 Agustus 2018

Penyusun

Nur haeratih

70400114040

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny "H" Dengan Bendungan Payudara di RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 05 Juli- 12 Agustus Tahun 2018, yang disusun oleh NUR HAERATI NIM: 70400114040, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 20 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 Agustus 2018 M
08 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT., SKM., M.Keb. (.....)

Pembimbing I : Firdayanti., S.SiT., M.Keb. (.....)

Pembimbing II : dr. Andi Tihardimanto., M.Kes. (.....)

Penguji I : Anieq Mumtiah Alkautsar, S.SiT., M.Keb. (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin., M.Hi. (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny ”H” Dengan Bendungan Payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa”** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Sehingga penulis dapat mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai kado terindah dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuanya yaitu bapak Muh Kasim Ilyas dan ibu Nur Tini Dahlan S.Ipem yang tidak pernah bosan untuk memberikan doa serta dukungan moril maupun moral meskipun penulis mengetahui bahwa karya tulis ini tidak bisa membalas kedua orang tuanya namun setidaknya karya tulis ini bisa membuat orang tuanya menjadi bangga dan tersenyum bahagia.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan
4. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.keb selaku sekertaris jurusan prodi kebidanan sekaligus sebagai pembimbing I yang senang tiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak dr. Andi Tihardimanto., M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbingku dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda Anieq Mumti'ah Alkautsar, S.ST., M.keb selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak DR.H Supardin., M.Hi selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar.

9. Direktur RSUD Syech Yusuf Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Kakak-kakak saya yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
11. Teman-teman saya yang rasa saudara Geni liskantari, Ratika, Nirwana, Nur hikmah, Sunarti , Hasrianah yang selalu memberikan support dan masukan.
12. Kepada seluruh teman-teman serta adik-adik kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih.

Namun bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semaunya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarangan mempergunakan ilmu dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipelajari dengan niat baik dan tulus untuk diamalkan di jalan Allah SWT melalui kehidupan umat manusia sebagai perantaranya.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’maalu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih


semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penyusun,

Nur Haerati

NIM: 70400114040



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN NIVERSITAS ISLAM NEGERI	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang lingkup penulisan.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
1. Tujuan Umum	5
2. Tujuan Khusus	5
D. Manfaat Penulisan	6
1. Manfaat Praktis	6
2. Manfaat Ilmiah.....	6

3. Manfaat Institusi	7
4. Manfaat Bagi Penulis	7
E. Metode Penulisan	7
1. Studi Kepustakaan	7
2. Studi Kasus	7
3. Studi Dokumentasi	8
4. Diskusi	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Masa Nifas	10
1. Pengertian Masa Nifas	10
2. Tahapan Masa Nifas	10
3. Tujuan Asuhan Masa Nifas	11
4. Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas	12
5. Tanda Bahaya Masa Nifas	13
6. Perubahan-Perubahan Dalam Masa Nifas	14
7. Standar Pemberian Asuhan Kebidanan Masa Nifas	20
B. Tinjauan Khusus tentang Bendungan Payudara	22
1. Pengertian Bendungan Payudara	22
2. Etiologi	22
3. Faktor-faktor Penyebab Bendungan Payudara	24

4.	Cara Mencegah Bendungan Payudara.....	25
5.	Cara Mengatasi Bendungan Payudara.....	26
6.	Penatalaksanaan Bendungan Payudara	26
C.	Tinjauan Islam tentang Bendungan Payudara	33
D.	Proses Manajemen Kebidanan	36
1.	Pengertian Manajemen Kebidanan.....	36
2.	Langkah-Langkah Manajemen Asuhan Kebidanan	36
3.	Pendokumentasian Asuhan Kebidanan	39
BAB III TINJAUAN KASUS		
Langkah I	Identifikasi Data Dasar.....	41
Langkah II	Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual.....	48
Langkah III	Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial.....	49
Langkah IV	Tindakan Segera (Emergency) / Kolaborasi	49
Langkah V	Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan / Intervensi.....	50
Langkah VI	Implementasi Asuhan Kebidanan.....	54
Langkah VII	Evaluasi Asuhan Kebidanan	56
	Pendokumentasian Asuhan Kebidanan	57
BAB IV PEMBAHASAN.....		84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk Putting susu.....	24
Gambar 2.2 Teknik Menyusui yang Benar	32
Gambar 2.3 Perlekatan putting susu yg benar.....	32
Gambar 2.4 Cara melepaskan isapan bayi	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Bupati Kabupaten Gowa Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga.
- Lampiran III : Surat izin rekomendasi penelitian dari Bupati Kabupaten Gowa/Kepala Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga kepada Pemerintahan Kabupaten Gowa Dinas Kesehatan dan kepada RSUD Syech Yusuf Gowa
- Lampiran IV : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syech Yusuf Gowa
- Lampiran V : Daftar riwayat hidup

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 21, 2018

Nur Haerati

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Andi Tihardimanto

“The Postnatal Care Obstetric Management on Mrs. “H” with Breast Congestion at Syech Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018”

Breast congestion is a breast swelling due to the increased flow of veins and lymph causing the breast congestion and sore accompanied by an increase in body temperature. Breast Congestion occurs because the incomplete breast emptying, the inactive inhalation of the baby, the improper nose position, and the abnormal nipple. Swollen breasts usually occur at the second or third day after the delivery.

This Scientific Paper presents the implementation of Postnatal Care Obstetric Management on Mrs. "H" with Breast Congestion at Syech Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 in accordance with the Varney's 7 steps and SOAP.

The diagnosis of the Breast Congestion is confirmed by the subjective data on the feeling of swollen, hot and painful breast, and the objective data were in the form of both breasts appearing swollen, feeling hard and hot, as well as increasing in the mother's body temperature. Administering the analgesic and anti-pain drugs such as 500mg paracetamol taken 3 times a day, teaching the breast care and the proper breastfeeding techniques were applied to the mother.

The conclusions of this study are that the subjective and objective data support the establishment of the breast congestion diagnosis and no complications identified on the first-time visit and the 5 times home visit.

Keywords: Breast Milk, Postpartum, Breast Congestion, Varney's Seven Steps



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, 21 AGUSTUS 2018

Nur Haerati

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Andi Tihardimanto

“Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care Pada Ny “H” dengan Bendungan Payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2018”

Bendungan payudara adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri di disertai kenaikan suhu badan. Bendungan Payudara terjadi dikarenakan Pengosongan mammae tidak sempurna, hisapan bayi yang tidak aktif, posisi menyusui yang tidak benar dan kelainan pada puting. Payudara yang membengkak biasanya terjadi pada hari kedua atau ketiga sesudah melahirkan.

Karya Tulis Ilmiah ini memaparkan aplikasi Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal care pada Ny. “H” dengan Bendungan Payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Diagnosis Bendungan ASI ditegakkan dengan data subjektif payudara terasa bengkak, nyeri dan panas dan data objektif berupa kedua payudara yang tampak bengkak, teraba keras, dan panas serta peningkatan suhu tubuh ibu. Asuhan yang dilakukan adalah pemberian obat analgetik dan anti nyeri yaitu obat paracetamol 500 mg diminum 3x sehari, Mengajarkan perawatan payudara dan teknik menyusui dengan benar.

Kesimpulan dari studi ini adalah data subjektif dan objektif mendukung ditegakkannya diagnosis bendungan payudara dan pada kunjungan yang dilakukan di RS sebanyak 1 kali dan kunjungan rumah sebanyak 5 kali tidak ditemukannya komplikasi.

Kata kunci: ASI, Masa Nifas, Bendungan Payudara, Tujuh Langkah Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa nifas (*puerperium*) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas atau *puerperium* dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Dalam bahasa latin, waktu mulai tertentu setelah melahirkan anak ini disebut *puerperium* yaitu kata *puer* yang artinya bayi dan *parous* yang berarti melahirkan. Jadi *puerperium* berarti masa setelah melahirkan bayi. Sekitar 50% kematian ibu terjadi dalam 24 jam pertama *postpartum* sehingga pelayanan pasca persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi (Pitriani,2013:1).

Perawatan masa nifas merupakan tindakan lanjutan bagi wanita sesudah melahirkan. Perawatan *postpartum* bersifat kritis tetapi sering diabaikan dalam komponen perawatan diri ibu nifas. Resiko sering terjadi ketika satu minggu pertama *postpartum* (*Early postpartum*) karena hampir seluruh sistem tubuh mengalami perubahan secara drastis, sehingga pada masa *early postpartum* pemulihan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi ibu. Di negara berkembang sekitar 70 % ibu nifas tidak mendapatkan perawatan nifas. Kebanyakan perawatan nifas diterima ketika ada resiko kematian pada ibu dan banyak dari kematian ibu terjadi pada wanita yang berada di rumah dengan perawatan minimal selama periode *postpartum* yaitu antara 11% - 17% dari kematian tersebut terjadi saat melahirkan dan 50% - 71% pada periode *postpartum* (Mardiatun, 2015).

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui Air Susu Ibu (ASI) selama paling sedikit 6 bulan. Beberapa penelitian epidemologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari infeksi misalnya diare dan infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah (Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Menurut data *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 2013 disimpulkan bahwa presentase cakupan kasus bendungan ASI pada ibu nifas tercatat 107.654 ibu nifas, pada tahun 2014 terdapat ibu nifas yang mengalami bendungan ASI sebanyak 95.698 (66,87%) ibu nifas, serta pada tahun 2015 ibu yang mengalami bendungan ASI sebanyak 76.543 (71,10%) (Depkes RI, 2014).

Jumlah bayi 0-6 bulan di Sulawesi Selatan mendapat ASI eksklusif yang diberi ASI saja tanpa makanan lain atau cairan lain berdasarkan *recall* 24 jam, dari pelaporan Kabupaten/Kota yaitu 71,5% dan belum mencapai angka yang ditargetkan (80%), namun bila dibandingkan dengan cakupan tahun sebelumnya presentase cakupan untuk indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan yaitu 67,2% di tahun 2012, 65,1 di tahun 2013, 68,45 di tahun 2014 (Profil Kesehatan Sulsel, 2015). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, jumlah presentase bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif mengalami peningkatan dan penurunan yaitu pada tahun 2012 berjumlah 19,3%, 2013 berjumlah 23,6%, 2014 berjumlah 20,5% (Profil Kesehatan Gowa, 2015).

Menyusui merupakan standar emas untuk sebagai makanan bagi bayi dan anak. Meningkatnya tingkat menyusui dapat mengurangi *morbiditas* dan *mortalitas* baik untuk anak dan ibu. Selain itu, anak-anak yang mendapatkan ASI mampu lebih baik dalam perkembangan kognitif dan berlanjut sampai kehidupan selanjutnya (Yang dkk, 2016). Menyusui merupakan salah satu yang terbaik untuk bayi karena dengan menyusui, kebutuhan gizi bayi akan terpenuhi. Menyusui merupakan suatu cara yang tidak ada duanya dalam memberikan makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Selain itu, mempunyai pengaruh biologis serta kejiwaan yang unik terhadap kesehatan ibu dan bayi (Yanti, 2013)

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan *protein*, *laktosa* dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar *mammae* ibu, yang berguna sebagai makanan bayinya. ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik pada bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal (Walyani, 2015: 167).

Bendungan payudara adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri di sertai kenaikan suhu badan (Maryunani, 2015: 13). Tanda gejala bendungan ASI berupa payudara bengkak, keras, terasa panas sampai suhu badan naik sehingga menyebabkan air susu tidak lancar atau keluar sedikit. Pada kasus bendungan ASI

bahaya yang terjadi jika tidak tertangani akan terjadi peradangan pada payudara yang biasa disebut mastitis (Suryani, dkk, 2016).

Bendungan air susu dapat terjadi pada hari ke-2 atau ke-3 ketika payudara telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi yang kurang baik, dan dapat pula terjadi akibat pembatasan waktu menyusui (Suryani, 2016: 13). *Mastitis* sebagai salah satu infeksi masa nifas yang sering terjadi sebagai akibat terjadinya bendungan payudara. Adanya bendungan payudara sebagai dampak dari ibu nifas yang tidak menyusui (Achyar dan Rofiqoh, 2016).

Dampak yang akan ditimbulkan jika bendungan ASI tidak teratasi yaitu akan terjadi mastitis dan abses payudara. Mastitis merupakan inflamasi atau infeksi payudara dimana gejalanya yaitu payudara keras, memerah, dan nyeri, dapat disertai demam $>38^{\circ}\text{C}$ (Kemenkes RI, 2013: 223) sedangkan abses payudara merupakan komplikasi lanjutan setelah terjadinya mastitis dimana terjadi penimbunan nanah didalam payudara (Rukiyah, 2012: 27). Selain berdampak pada ibu, bendungan ASI juga berdampak pada bayi dimana kebutuhan nutrisi bayi akan kurang terpenuhi karena kurangnya asupan yang didapatkan oleh bayi.

Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian asuhan postpartum. Asuhan kebidanan pada masa nifas merupakan hal yang sangat penting, karena periode ini merupakan masa kritis bagi ibu maupun bayinya. Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas yaitu, mendorong ibu untuk menyusui

bayinya secara *on demand* selama kurang lebih dua tahun agar meningkatkan rasa nyaman serta tali kasih dan mencegah terjadinya bendungan asi yang bisa menimbulkan bahaya bagi ibu (Marmi, 2012:12)

Menurut hasil survei di RSUD Syech Yusuf Gowa pada bulan Juli 2017-januari 2018, jumlah ibu nifas sebanyak 721 orang dan yang mengalami bendungan Payudara sebanyak 12 orang.

Dari uraian di atas, bendungan ASI pada masa nifas merupakan masalah yang penting karena dapat berlanjut menjadi mastitis yang dapat meningkatkan angka kesakitan ibu dan bayi. Maka dari itu penulis tertarik menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dengan Bendungan ASI di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis ini adalah Penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu *Post Partum* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis ini tujuan yang di harapkan adalah sebagai Berikut :

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan *Postnatal Care* pada Ny;’H” dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan pengkajian Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- c. Merumuskan diagnosa/masalah potensial Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- d. Mengidentifikasi tindakan segera dan kolaborasi Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- e. Merencanakan asuhan kebidanan Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- f. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- g. Mengevaluasikan hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa
- h. Melakukan pendokumentasian semua hasil asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan Pada Ibu *Postnatal Care* dengan Bendungan Payudara di RSUD syech yusuf Gowa.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan Karya Tulis ini dapat memperluas pola pikir dan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan inspirasi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan atau pedoman bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga penerapan Manajemen Asuhan kebidanan khususnya pada Ibu Postnatal Care

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, berdasarkan teori Ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam pemecahan masalah. Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku/literatur dan data internet yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai dasar teori yang digunakan dalam pembahasan Karya Tulis ilmiah ini.

2. Studi Kasus

Yaitu melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang meliputi pengkajian analisa, perumusan diagnosa masalah aktual dan potensial, merencanakan tindakan segera dan kolaborasi. menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi serta mendokumentasikan asuhan kebidanan Untuk memperoleh data/informasi akurat, penulis menggunakan teknik:

a) Anamnese

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, suami, dan keluarga yang terlibat langsung guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

b) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai kaki (*head to toe*) meliputi *inspeksi palpasi, auskultasi, perkusi* dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan diagnostik lainnya dengan menggunakan format yang telah di susun sebelumnya.

c) Pengkajian Psikososial

Pengkajian status emosional, Respon terhadap kondisi serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, lingkungan, serta pengetahuan tentang kesehatan.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, pegawai, petugas laboratorium. Dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan Karya Tulis ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan bidan yang menangani langsung klien tersebut serta mengadakan diskusi dengan dosen pengasuh pembimbing Karya Tulis ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada bab I ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan yang terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.


Pada bab II penulis membahas mengenai tinjauan umum postpartum, tinjauan umum postnatal dan bendungan payudara pada ibu postpartum, serta proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan. Pada bab II penulis membahas tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab III ini terdiri dari langkah I (pengumpulan data dasar), Langkah II (Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual), Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial), Langkah IV (Tindakan Segera/Kolaborasi Asuhan Kebidanan), Langkah V (Rencana Asuhan Kebidanan), Langkah VI (Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan), Langkah VII (Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan Mendokumentasikan Hasil Asuhan Kebidanan).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang kesenjangan antara teori dan pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan yang dibahas secara sistematis mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi .

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar *literature* ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian masa nifas

- a. Masa nifas atau masa *puerperium* adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut *invulasi* (Maritalia,2012:11)
- b. Masa nifas (*pueperium*) adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamildan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari (walyani,2015:1)
- c. Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan (Taufan Nugroho,2014:1)

2. Tahapan Masa Nifas

- a. *Peurperium* dini Merupakan masa pemulihan awal dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Ibu yang melahirkan per vagina tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala IV dianjurkan untuk mobilisasi segera.
- b. *Peurperium intermedial* Suatu masa pemulihan dimana organ-organ reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama kurang lebih enam minggu atau 42 hari.

c. *Remote puerperium* Waktu yang diperlukan untuk sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Rentang waktu remote puerperium berbeda untuk setiap ibu, tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama hamil atau persalinan. (Dewi Maritalia,2012:12)

3. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Masa neonatus merupakan masa kritis bagi kehidupan bayi, 2/3 kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60% kematian BBL terjadi dalam waktu 7 hari setelah lahir. Dengan pemantauan melekat dan asuhan pada ibu dan bayi pada masa nifas dapat mencegah beberapa kematian ini.

Tujuan asuhan masa nifas normal dibagi 2, yaitu:

a. Tujuan umum:

Membantu ibu dan pasangannya selama masa transisi awal mengasuh anak.

b. Tujuan khusus:

- 1) Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis.
- 2) Melaksanakan skrining yang komprehensif.
- 3) Mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan bayinya.

- 4) Memberikan pendidikan kesehatan, tenaga perawatan kesehatandiri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi dan perawatan bayi sehat.
- 5) Memberikan pelayanan KB. (walyani,2015:4)

4. Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas.

- a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- b. Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga.
- c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- d. Membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi.
- e. Mendeteksi komplikasi dan perlukanya rujukan.
- f. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya , menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman.
- g. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta pelaksanaan untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.
- h. Memberikan asuhan secara professional. (Taufan Nugroho,2014:2)

5. Tanda Bahaya Masa Nifas

Menurut Saleha(2009) Masa nifas merupakan masa yang rawan bagi ibu, sekitar 60% kematian terjadi setelah melahirkan dan hampir 40% dari kematian terjadi 24 jam pertama setelah persalinan, diantaranya disebabkan komplikasi kehamilan pada masa nifas. Selama ini perdarahan pasca-persalinan merupakan penyebab kematian ibu, namun dengan meningkatnya persediaan darah dan sistem rujukan, maka infeksi menjadi lebih menonjol sebagai penyebab kematian dan morbiditas ibu.

Ibu nifas dan keluarga harus mendatangi tenaga kesehatan jika ditemukan tanda-tanda bahaya masa nifas seperti berikut ini:

- a. Perdarahan pervaginam
- b. Sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur
- c. Pembengkakan diwajah atau ekstremitas
- d. Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih
- e. Payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit
- f. Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama
- g. Rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di kaki
- h. Merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya dan dirinya sendiri

(Nurjannah dkk,2013).

6. Perubahan-perubahan dalam masa nifas

a. Perubahan uterus

Involusi uteri adalah proses uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. Uterus biasanya berada di organ *pelvik* pada hari ke-10 setelah persalinan. Involusi uteri lebih lambat pada multipara. Penurunan ukuran uterus dipengaruhi oleh proses *autolisis* protein dan *sitoplasma miometrium*. Hasil dari menurunkan ukuran uterus harus kehilangan sel-sel dalam jumlah besar.

Selama beberapa hari pertama setelah melahirkan *endometrium* dan *miometrium* pada tempat plasenta diserap oleh sel-sel granulosa

sehingga selaput basal endometrium kembali dibentuk (Heryani, 2012: 5).

Tabel 2.1
Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusio

Involusi	TFU	Berat Uterus
Bayi lahir	Setinggi pusat,	1000 gr
Plasenta lahir	2 jari dibawah pusat	750 gr
1 minggu	Pertengahan pusat-simpisis	500 gr
2 minggu	Tidak teraba diatas simpisis	350 gr
6 minggu	Normal	50 gr
8 minggu	Normal seperti sebelum hamil	30 gr

Sumber: Astutik, 2015: 5

b. Pengeluaran lokia

Lokia adalah cairan atau sekret yang berasal dari cavum uteri dan vagina selama masa nifas. Macam-macam lokia:

- 1) *Lokia rubra (crueanta)*: Berwanrna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, set-set desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekoneum selama 2 hari pasca persalinan
- 2) *Lokia sanguilenta*: Berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan.
- 3) *Lokia serosa*: Locha ini bebrbentuk serum dan berwarna merah jambu kemudian kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca persalinan.
- 4) *Lokia alba*: Dimulai dari hari ke-14, berbentuk seperti cairan putih serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua.

Selain lokia diatas, ada jenis *lochia* yang tidak normal, yaitu:

- a) *Lokia purulenta*: Ini terjadi karena infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk.
- b) *Lochiastasis*: *Lokia* tidak lancar keluarnya (Astutik, 2015: 59)

c. Serviks

Serviks mengalami involusi bersama-sama uterus. Setelah persalinan, ostium uteri eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tangan, setelah 6 minggu persalinan serviks akan menutup (Astutik, 2015: 59)

d. Vulva dan vagina

- 1) Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur.

- 2) Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil.
- 3) Setelah 3 minggu vulva dan vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali sementara labia menjadi lebih menonjol (Astutik, 2015: 60).

e. Perineum

- 1) Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju.
- 2) Pada masa nifas hari ke 5, tonus otot perineum sudah kembali seperti keadaan sebelum hamil, walaupun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan. Untuk mengembalikan tonus otot perineum, maka pada masa nifas perlu dilakukan senam kegel (Astutik, 2015: 60)

f. Payudara/*Laktasi*

Payudara atau *mammae* adalah kelenjar yang terletak dibawah kulit, diatas otot dada. Secara makroskopis, struktur payudara terdiri dari korpus (badan), areola dan papilla atau puting. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu (air susu ibu) sebagai nutrisi bagi bayi.

Sejak kehamilan trimester pertama kelenjar *mammae* sudah dipersiapkan baik untuk menghadapi masa *laktasi*. Perubahan yang terjadi pada kelenjar *mammae* selama kehamilan adalah:

- 1) Proliferasi jaringan atau pembesaran payudara. Terjadi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang meningkat selama hamil, merangsang duktus dan alveoli kelenjar *mammae* untuk persiapan produksi ASI.

- 2) Terdapat cairan yang berwarna kuning (*kolostrum*) pada *duktus laktiferus*. Cairan ini kadang-kadang dapat dikeluarkan atau keluar sendiri melalui puting susu saat usia kehamilan memasuki trimester ketiga.
- 3) Terdapat hipervaskularisasi pada permukaan maupun bagian dalam kelenjar *mammae* (Maritalia, 2014 : 21-22)

Setelah persalinan, estrogen dan progesteron menurun drastis sehingga dikeluarkan prolaktin untuk merangsang produksi ASI. ASI kemudian dikeluarkan oleh sel otot halus disekitar kelenjar payudara yang mengkerut dan memeras ASI keluar, hormon oksitosin yang membuat otot-otot itu mengkerut (Heryani, 2012: 6).

Selama kehamilan hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI belum keluar karena pengaruh hormon estrogen yang masih tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada hari-hari pertama ASI mengandung banyak kolostrum, yaitu cairan agak berwarna kuning dan sedikit lebih kental dari ASI yang disekresi setelah hari ketiga postpartum (Maritalia, 2014: 22).

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. *Laktasi* merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa *laktasi* mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami (Mulyani, 2013: 93)

Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI.

1) Produksi ASI (Prolaktin)

Payudara mulai dibentuk sejak embrio berumur 18-19 minggu. Pembentukan tersebut selesai ketika mulai menstruasi dengan terbentuknya hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk maturasi alveolus. Sementara itu, hormon prolaktin berfungsi untuk produksi ASI selain hormon lain seperti insulin, tiroksin, dan lain-lain.

Selama hamil hormon prolaktin dari plasenta meningkat, tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan saat itu sekresi ASI semakin lancar. Terdapat dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses *laktasi*, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi (Yanti, Sundawati, 2014: 7-8).

Refleks prolaktin, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, puting susu berisi banyak ujung saraf sensoris. Bila saraf tersebut dirangsang, timbul impuls yang menuju hipotalamus, yaitu selanjutnya ke kelenjar hipofisis anterior sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon tersebut yang berperan dalam produksi ASI di tingkat alveoli. Refleks prolaktin muncul setelah menyusui dan menghasilkan susu untuk proses menyusui berikutnya. Prolaktin lebih banyak dihasilkan pada

malam hari dan dipahami bahwa makin sering rangsangan penyusuan, makin banyak ASI yang dihasilkan

Refleks aliran (*let down reflex*) bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh hipofisis anterior, rangsangan yang berasal dari isapan bayi dilanjutkan ke hipofisis posterior yang kemudian dikeluarkan oksitosin. Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah terbuat, keluar dari alveoli dan masuk ke sistem duktus dan selanjutnya mengalir melalui duktus laktiferus masuk ke mulut bayi.

Faktor-faktor yang meningkatkan *let down* adalah dengan melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi, memikirkan untuk menyusui bayi. Faktor-faktor yang menghambat refleks *let down* adalah stress, seperti keadaan bingung/pikiran kacau, takut dan cemas (Yanti, Sundawati, 2014: 9).

2) Pengeluaran ASI (Oksitosin)

Rangsangan puting susu tidak hanya diteruskan sampai ke kelenjar hipofisis posterior yang mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon itu berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan dinding saluran, sehingga ASI di pompa keluar. Refleks oksitosin bekerja sebelum atau setelah menyusui untuk menghasilkan aliran air susu dan menyebabkan kontraksi uterus. Semakin sering menyusui, semakin baik pengosongan alveolus dan saluran sehingga semakin kecil kemungkinan terjadi bendungan susu sehingga proses menyusui makin lancar. Saluran ASI yang mengalami bendungan tidak hanya mengganggu penyusuan, tetapi menyebabkan kerentanan terhadap infeksi.

Oksitosin juga memacu kontraksi otot rahim sehingga involusi rahim semakin cepat dan baik. Tidak jarang, perut ibu terasa sangat mules pada hari-hari pertama menyusui dan hal ini merupakan mekanisme alamiah untuk rahim kembali ke bentuk semula (Roito Juraida, dkk, 2013: 10-11).

g. Perubahan lain

Suhu badan wanita inpartu tidak lebih $37,5^{\circ}\text{C}$ sesudah partus dapat naik $0,5^{\circ}\text{C}$ dari keadaan normal tetapi tidak melebihi 38°C , sesudah 12 jam pertama melahirkan umumnya suhu badan akan kembali normal. Bila suhu badan $>38^{\circ}\text{C}$ mungkin ada infeksi.

Mules-mules sesudah partus akibat kontraksi uterus kadang-kadang sangat mengganggu selama 2-3 hari postpartum, perasaan ini lebih terasa bila wanita tersebut sedang menyusui, perasaan sakit pun timbul masih terdapat sisa-sisa plasenta atau gumpalan darah dalam kavum uteri. Nadi berkisar umumnya 60-80 kali/menit, setelah melahirkan akan terjadi bradikardi. Bila terdapat takikardi sedangkan badan tidak panas mungkin ada perdarahan berlebihan. Pada masa nifas umumnya denyut nadi lebih labil dibanding suhu badan (Heryani, 2012: 7).

7. Standar Pemberian Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas

Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas di lakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani Masalah-masalah yang terjadi (Roito Juraida, dkk. 2013. Hal: 2-4)

Tabel 2.2 Program dan kebijakan teknis masa nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri - Mendeteksi dan merawat penyebablain perdarahanrujukbila perdarahan berlanjut. - Memberi konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena anaiomi Uteri - Pemberian ASI awal - Melakukan hubungan antar ibu dan bayi baru lahir - Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan involusio uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau. - Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal - Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat - Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit - Membenkan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tadi pusat. menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari
3	2 minggu setelah persalinan	Sama seperti diatas (6 hari setelah persalinan)
4	6 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> - Menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ia mau bayi alami - Memberikan konseling untuk KB secara dini

Sumber : Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Deteksi Dini Komplikasi

B. Tinjauan Khusus Tentang Bendungan Payudara

1. Pengertian Bendungan Payudara

- a. Bendungan payudara adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri di sertai kenaikan suhu badan (Maryunani, 2015: 13).
- b. Bendungan air susu ibu adalah pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan (Yanti, 2017).
- c. Bendungan ASI (Bendungan Payudara) adalah peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk *laktasi*. Hal ini bukan disebabkan overdistensi dari saluran sistem *laktasi* (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 160)


2. Etiologi

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bendungan Payudara, yaitu:

- a. Pengosongan *mammae* yang tidak sempurna (dalam masa *laktasi*, terjadi peningkatan produksi ASI pada ibu yang produksi ASI-nya berlebihan. Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusui payudara tidak dikosongkan, maka masih terdapat sisa ASI didalam payudara. Sisa ASI tersebut jika tidak dikeluarkan dapat menimbulkan bendungan ASI).

- b. Faktor hisapan bayi yang tidak aktif (pada masa *laktasi*, bila ibu tidak menyusukan bayinya sesering mungkin atau jika bayi tidak aktif menghisap, maka akan menimbulkan bendungan ASI).
- c. Faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar (teknik yang salah dalam menyusui dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan menimbulkan rasa nyeri pada saat bayi menyusui. Akibatnya, ibu tidak mau menyusui bayinya dan terjadi bendungan ASI).
- d. Puting susu terbenam (puting susu terbenam akan menyulitkan bayi dalam menyusui. Karena bayi tidak dapat menghisap puting dan areola, bayi tidak mau menyusui dan akibatnya terjadi bendungan ASI).
- e. Puting susu terlalu panjang (puting susu yang panjang menimbulkan kesulitan pada saat bayi menyusui karena bayi tidak dapat menghisap areola dan merangsang sinus laktiferus untuk mengeluarkan ASI. Akibatnya, ASI tertahan dan menimbulkan bendungan ASI) (Rukiyah, Yulianti, 2012: 20)

Gambar 2.1 Bentuk puting susu



Sumber: <https://sweetysmiler.wordpress.com/2011/03/15/anatomi-fisiologi-payudara-dan-proses-laktasi>

3. Faktor-Faktor Penyebab Bendungan Payudara

Bendungan Payudara disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi (*bonding*) kurang baik, dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui, yaitu:

a. Faktor frekuensi menyusui

Bahwa insiden bendungan payudara dapat dikurangi hingga setengahnya bila bayi disusui tanpa batas. Sejumlah penelitian lainnya mengamati bahwa bila waktu untuk menyusui dijadwal lebih sering, maka dapat terjadi bendungan yang sering diikuti dengan mastitis dan kegagalan *laktasi*. Menyusui yang dijadwal akan berakibat kurang baik karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan ASI selanjutnya.

b. Menyusu Yang Buruk

Pentingnya isapan bayi yang baik pada payudara untuk mengeluarkan ASI yang efektif. Isapan yang buruk sebagai penyebab pengeluaran ASI yang tidak efisien saat ini dianggap sebagai faktor predisposisi utama mastitis. Selain itu, nyeri puting susu akan menyebabkan ibu menghindar untuk menyusui pada payudara yang sakit dan karena itulah terbentuknya statis ASI dan bendungan ASI.

c. Perlekatan kurang baik

Banyak ibu merasa lebih mudah untuk menyusui bayinya pada satu sisi payudara dibandingkan dengan payudara yang lain.

d. Produksi ASI yang meningkat

Apabila ASI berlebihan, sampai keluar memancar maka sebelum menyusui sebaiknya ASI dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari bayi tersedak dan menghilangkan bendungan atau memacu produksi ASI saat ibu sakit dan tidak dapat langsung menyusui bayinya.

e. Payudara yang tidak dikosongkan seluruhnya

Bila tidak dikeluarkan saat ASI terbentuk, maka volume ASI dalam payudara akan melebihi kapasitas *alveoli* untuk penyimpanannya sehingga bila situasi ini tidak di atasi, maka akan menyebabkan bendungan dan mastitis dalam waktu singkat, dan mempengaruhi kelanjutan produksi ASI dalam jangka panjang.

f. Pakaian yang ketat BH

Pakaian yang ketat BH yang ketat juga bias menyebabkan *segmental engorgement*. Selama masa menyusui sebaiknya ibu menggunakan kutang (BH) yang dapat menyangga payudara, tetapi tidak terlalu ketat (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

4. Cara Mencegah Bendungan Payudara

Adapun cara mencegah bendungan ASI adalah:

- a. Untuk mencegah diperlukan menyusui dini, perlekatan yang baik, menyusui secara *on demand*. Bayi harus sering disusui. Apabila terlalu tegang, atau bayi tidak dapat menyusu sebaiknya ASI dikeluarkan dahulu, agar ketegangan menurun.
- b. Untuk merangsang reflek oksitosin maka dilakukan :
 - 1) kompres untuk mengurangi rasa sakit

- 2) Ibu harus rileks
- 3) Pijat punggung belakang (sejajar daerah payudara)
- 4) Pijat ringan pada payudara yang bengkak (pijat pelan – pelan kearah tengah)
- 5) Stimulasi payudara dan puting
- 6) Kompres dingin pasca menyusui, untuk mengurangi *oedema*.
- 7) Pakailah BH yang sesuai.
- 8) Bila terlalu sakit dapat diberikan obat analgetik (Dewi dan Dwi Sunar, 2011).

5. Cara Mengatasi Bendungan Payudara

- a. Susui bayinya semau dia sesering mungkin tanpa jadwal dan tanpa batas waktu.
- b. Bila bayi sukar menghisap, keluarkan ASI dengan bantuan tangan atau pompa ASI yang efektif.
- c. Sebelum menyusui untuk merangsang reflek oksitosin dapat dilakukan kompres hangat untuk mengurangi rasa sakit, masase payudara, masase leher dan punggung.
- d. Setelah menyusui, kompres air dingin untuk mengurangi *oedema* (Dewi dan Dwi Sunar, 2011).

6. Penatalaksanaan Bendungan Payudara

Penanganan yang dilakukan yang paling penting adalah dengan mencegah terjadinya payudara bengkak yaitu :

- a. Bila ibu menyusui

Suskan sesering mungkin bila memungkinkan pada kedua payudara sebelum di susukan kompres hangat payudara. Keluarkan sedikit ASI sebelum menyusui agar

payudara lembek, sehingga lebih mudah memasukkannya ke dalam mulut bayi. Bila bayi belum dapat menyusui, ASI dikeluarkan dengan tangan atau pompa dan diberikan pada bayi dengan cangkir atau sendok. Tetap mengeluarkan ASI sesering yang diperlukan sampai bendungan teratasi. Untuk mengurangi rasa sakit dapat diberikan kompres hangat dan dingin. Bila ibu demam dapat diberikan obat penurun demam dan pengurang sakit. Pada saat menyusui sebaiknya ibu tetap rileks. Makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan perbanyak minum (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 161).

b. Bila ibu tidak menyusui

Sangga payudara terlebih dahulu, lalu kompres hangat dan dingin secara bergantian pada payudara untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit kemudian gunakan pompa ASI untuk mengeluarkan air susu dan masukkan ke dalam botol susu (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 161-162).

c. Perawatan Payudara

Menurut Walyani dan Purwoastuti 2015 : Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa nifas untuk memperlancar pengeluaran ASI.

1) Tujuan Perawatan Payudara

Memelihara *hygiene* payudara, melenturkan dan menguatkan puting susu. payudara yang terawat akan memproduksi ASI cukup untuk kebutuhan bayi, dengan perawatan payudara yang baik ibu tidak perlu khawatir bentuk payudaranya akan

cepat berubah sehingga kurang menarik, dengan perawatan payudara yang baik puting susu tidak akan lecet sewaktu dihisap oleh bayi dan melancarkan aliran ASI.

2) Waktu Pelaksanaan Perawatan Payudara

Perawatan payudara dilakukan pertama kali pada hari kedua setelah melahirkan dan dilakukan minimal dua kali sehari.

3) Pelaksanaan Perawatan Payudara

Perawatan payudara pasca persalinan dimulai sedini mungkin yaitu 1-2 hari sesudah bayi lahir, hal tersebut dilakukan 2 kali sehari.

Persiapan alat:

- a) *Baby oil* secukupnya.
- b) Kertas secukupnya.
- c) Waslap 2 buah.
- d) Handuk bersih 2 buah.
- e) 2 baskom berisi air (hangat dan dingin).
- f) BH yang bersih untuk menyokong payudara dan terbuat dari bahan katun.

Persiapan Ibu:

- a) Cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan dengan handuk.
- b) Baju ibu bagian depan dibuka.
- c) Pasang handuk.

Dalam pelaksanaan perawatan payudara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perawatan payudara pasca persalinan, yaitu :

- 1) Puting susu dikompres dengan kasa yang sudah diberi *baby oil* selama 3- 4 menit, kemudian bersihkan dengan kasa yang sudah diberi *baby oil* tadi.
- 2) Pengenyalan yaitu puting susu dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk diputar ke dalam 20 kali dan keluar 20 kali.
- 3) Penonjolan puting susu yaitu:
 - a) Puting susu cukup ditarik sebanyak 20 kali.
 - b) Dirangsang dengan menggunakan ujung waslap.
- 4) Pengurutan Payudara
 - a) Pengurutan yang pertama

Licinkan kedua tangan dengan *baby oil* tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara lakukan pengurutan, dimulai dari arah atas lalu arah sisi samping kiri kemudian kearah kanan, lakukan terus pengurutan kebawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara, ulangi gerakan 20-30 kali untuk setiap satu payudara.

- b) Pengurutan yang kedua

Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian dua atau tiga jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada puting susu. Lakukan tahap mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi kearah puting susu. Lakukan gerakan 20-30 kali.

- c) Pengurutan yang ketiga

Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut dan menggenggam dari pangkal menuju ke puting susu. Langkah gerakan 20-30 kali.

Setelah selesai pengurutan, payudara dikompres dengan air hangat dan air dingin secara bergantian selama kurang lebih 5 menit (air hangat dahulu kemudian air dingin) kemudian keringkan dengan handuk dan pakailah BH yang menyangga payudara (Istiqomah, 2016)

d. Teknik Menyusui dengan Benar

Menurut Astutik, 2015 : teknik menyusui yang benar diperlukan agar bayi dan ibu merasa nyaman dan bayi memperoleh manfaat terbesar dari menyusui.

Langkah-langkah menyusui yang benar :

- 1) Cuci tangan sebelum dan sesudah menyusui dengan sabun dan air mengalir.
 - 2) *Masase* payudara mulai dari *corpus* menuju *areola* sampai teraba lemas atau lunak.
 - 3) ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan *areola*.
 - 4) Bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara.
- a) Ibu duduk atau berbaring santai.
 - b) Bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan.
 - c) Satu tangan bayi diletakkan dibelakang badan ibu dan yang satu di depan.
 - d) Perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap payudara.
 - e) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.
 - f) Ibu menatap bayi dengan kasih sayang.

Gambar 2.2 Teknik Menyusui yang Benar



Sumber : Astutik, 2015

- 5) Setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian oleskan pada puting susu dan *areola*, dan biarkan kering untuk menghindari puting lecet ataupun pecah-pecah.
- 6) Sendawakan bayi dengan cara menggendong bayi tegak dengan bersandar pada bahu ibu kemudian punggung bayi ditepuk perlahan-lahan atau bayi ditidurkan tengkurap di pangkuan ibu kemudian punggung bayi ditepuk perlahan-lahan.
- 7) Periksa keadaan payudara, adakah perlukaan atau pecah-pecah atau terbandung.

Gambar 2.3 Perlekatan puting susu yg benar



Sumber : Lindakadewi-WordPress.com

Untuk mengetahui bayi telah disusui dengan teknik yang benar dan tepat.

Dapat dilihat dari :

Bayi tampak senang, badan bayi menempel dengan perut ibu, mulut bayi membuka dengan lebar, sebagian *areola* masuk ke dalam mulut bayi, bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan, puting susu ibu tidak terasa nyeri, telinga dan lengan sejajar terletak pada garis lurus, kepala tidak menengadah, bayi tidak melepaskan isapannya, setelah menyusui pada satu payudara sampai kosong sebaiknya ganti payudara yang lain.

Untuk melepaskan isapan bayi ada beberapa langkah, yaitu : Jari kelingking ibu dimasukan kemulut bayi melalui sudut mulut, dagu bayi ditekan kebawah, setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan *areola* sekitar. Biarkan kering dengan sendirinya (Istiqomah, 2016: 13).

Gambar 2.4 Cara melepaskan isapan bayi



Sumber : Lindakadewi-WordPress.com

C. Tinjauan Islam tentang Bendungan Payudara

Semenjak sekitar 1400 tahun yang lalu islam telah menegaskan pemberian ASI di dalam Al-Qur'an, yaitu yang disebutkan pada firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah (2): 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan Al-Baqarah [2] : 233).

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Kata *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan

terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenang sebab, menurut penelitian ilmunya, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain (Shihab Quraisy,2012 : 609).

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusukannya (Shihab Quraisy,2012 : 609)

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan,bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan (Shihab Quraisy,2012 : 609).

Tentu saja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikanya secara *ba'in* bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *ray'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar (Shihab Quraisy,2012 : 610).

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya (Shihab Quraisy,2012 : 610).

Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap

diperolehnya, walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak (Shihab Quraisy,2012 : 610).

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapih* sebelum dua tahun *dengan kerelaan keduanya*, bukan akibat paksaan dari siapa pun, *dan dengan permusyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu (Shihab Quraisy,2012 : 611).

Dan sini, dipahami adanya tingkat penyusuan; *pertama*, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; *kedua*, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat *ketiga*, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan---misalnya karena sakit---maupun alasan yang dapat menimbulkan kecemasan---misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar---maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah

yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu*, wahai para ayah, *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah *menurut yang patut* (Shihab Quraisy,2012 : 611).

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu*, yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa karena, ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya (Shihab Quraisy,2012 : 611).

Susu merupakan makanan terpenting dan sumber kehidupan satu-satunya bayi di bulan-bulan pertama usianya. Susu terbaik untuk anak adalah air susu ibu karena dengan menyusui terjadilah kontak cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak,kecerdasan pada anak,system kekebalan tubuh untuk anak. Selain itu ibu yang menyusui bayinya akan mempercepat proses pemulihan rahim keukuran seperti sebelum hamil, sebagai metode kontrasepsi alamiah pada ibu yang menyusui secara eksklusif,tidak memerlukan biaya,mencegah ibu terkena masalah seperti bendungan payudara yang akan berdampak pada ibu yang membuat ibu demam,payudara bengkak,keras,panas dan nyeri tekan.Ibu adalah orang yang paling mampu memberikan cinta dan kehangatan yang sesungguhnya kepada anaknya dengan naluri kaibuanya yang diberikan allah kepadanya.

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat (Mufdillah, dkk,2012: 22).

2. Langkah-Langkah Manajemen Asuhan Kebidanan

Adapun dalam tahapan Manajemen Kebidanan yaitu :

a. Langkah I. Identifikasi data dasar

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien untuk memperoleh data dilakukan dengan cara : Pertama yaitu anamnesis, dimana akan didapatkan data subjektif dari pasien seperti ibu akan mengeluhkan payudara bengkak, terasa keras, ibu merasa demam dan dirasakan setelah persalinan.

Kedua, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya , pada pemeriksaan fisik ini akan dilakukan inspeksi dan palpasi pada payudara dan akan didapatkan hasil pemeriksaan payudara warnanya kemerahan, payudara bengkak, keras dan nyeri bila ditekan.

Ketiga yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pada kasus ini memungkinkan akan didapatkan hasil pemeriksaan dimana suhu tubuh bisa mencapai 38⁰C.

b. Langkah II. Identifikasi diagnosa/Masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien beradarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah

dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Diagnosis bendungan Payudara ditegakkan berdasarkan data subjektif dari pasien dan data objektif yang telah didapatkan, serta pada pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Bendungan Payudara ditegakkan jika didapatkan payudara warnanya kemerahan, payudara bengkak, keras, nyeri bila ditekan, suhu tubuh bisa mencapai 38°C dan terjadi pada hari ke 3-5 setelah persalinan.

Jika ibu mengalami bendungan payudara, ASI nya tidak keluar atau belum lancar, maka kemungkinan disebabkan oleh pengosongan *mammae* yang tidak sempurna, hisapan bayi yang tidak aktif, posisi menyusui bayi yang tidak benar, puting susu terbenam, dan puting susu terlalu panjang.

c. Langkah III. Antisipasi diagnosa/Masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada kasus Bendungan Payudara, maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya mastitis karena pada kasus ini, Bendungan Payudara merupakan gejala awal akan

terjadinya mastitis dan jika tidak ditangani dengan baik kemungkinan akan terjadi mastitis, sehingga perlu untuk dilakukan antisipasi.

d. Langkah IV. Tindakan segera/Kolaborasi

Pada langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain berdasarkan kondisi klien, pada langkah ini bidan juga harus merumuskan tindakan emergency untuk menyelamatkan ibu, yang mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan.

e. Langkah V. Rencana asuhan kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif (Jannah, 2012: 208-209).

Rencana asuhan yang akan dilakukan yaitu lakukan perawatan payudara, ajarkan teknik menyusui yang baik dan benar, sanggah payudara ibu dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju putting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga putting menjadi lunak, susukan bayi 2-3 jam sekali sesuai keinginan bayi (*on demand feeding*) dan pastikan bahwa perlekatan bayi dan payudara ibu sudah benar, pada masa-masa awal atau bila bayi yang menyusui tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan pompa atau pengeluaran ASI

secara manual dari payudara, kompres dingin dengan es pada payudara setelah menyusui atau setelah payudara dipompa, bila perlu, berikan parasetamol 3 X 500 mg per oral untuk mengurangi nyeri., lakukan evaluasi setelah 3 hari.

f. Langkah VI. Implementasi asuhan kebidanan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien (Jannah, 2012: 211).

g. Langkah VII. Evaluasi kebidanan

Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien. Pada tahap evaluasi ini bidan harus melakukan pengamatan dan observasi terhadap masalah yang dihadapi klien, apakah masalah diatasi seluruhnya, sebagian telah dipecahkan atau mungkin timbul masalah baru. Pada prinsipnya tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tercapainya rencana yang dilakukan.

3. Pendokumentasian asuhan kebidanan

Pendokumentasian adalah catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan yang mencatat tentang hasil pemeriksaan, prosedur pengobatan pada pasien dan pendidikan kepada pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Alur berfikir bidan dalam menghadapi klien

meliputi 7 langkah. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berfikir sistematis di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu :

a. S: Subjektif

Menggambarkan dokumentasi hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney.

b. O: Objektif

Menggambarkan dokumentasi hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan uji diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney.

c. A: Assesment

Menggambarkan dokumentasi hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

- 1) Diagnosis/Masalah
- 2) Antisipasi diagnosis/ Kemungkinan Masalah
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi, dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 varney

d. P: Planning

Menggambarkan dokumentasi tingkatan (I) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan pengakjian langkah 5, 6, dan 7 Varney.

SOAP ini dilakukan pada asuhan tahap berikutnya, dan atau pada evaluasi hari berikutnya. Karena pada kasus ini memerlukan asuhan yang diberikan setiap harinya sampai ibu benar-benar sembuh.

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA NY”H”
DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 05 JULI 2018**

No. Register : 50xxxx
Tanggal partus : 03 Juli 2018 , pukul 12.05 wita
Tanggal pengkajian : 05 Juli 2018 , pukul 09.00 wita
Nama pengkaji : Nur Haerati

Langakah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”H” / Tn. “H”
Umur : 21 Tahun / 20 Tahun
Nikah/lamanya: 1 kali / ±1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Palompong Bajeng

A. Keluhan Utama dan Riwayat Keluhan utama**1. Keluhan utama**

Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, keras, nyeri dan terasa keras

2. Riwayat Keluhan Utama

Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri dan terasa keras sejak tanggal 04 juli 2018 pukul 20.30 wita, ibu mengatakan suhu badannya terasa panas, bayinya malas menyusu dan ibu merasa cemas dan tidak nyaman dengan keadaannya.

B. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas

1. Ini merupakan persalinan pertama ibu dan tidak pernah keguguran.
2. Ibu melahirkan tanggal 03 Juli 2018 pukul 12.05 wita , dengan jenis kelamin laki- laki, berat badan lahir 2900 gram, dan ditolong oleh bidan dan dokter di RSUD Syech Yusuf Gowa

C. Riwayat kesehatan/ penyakit yang lalu dan sekarang

1. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun
2. Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius
3. Ibu tidak sedang menderita penyakit apapun
4. Ibu tidak memiliki alergi terhadap obat dan juga makanan

D. Riwayat reproduksi

Menarche : 14 tahun
siklus : 28-30 hari
lamanya : 5-7
Disminorhea : Tidak ada

E. Riwayat keluarga berencanap

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB

F. Pola Kebiasaan sehari-hari

1. Nutrisi

Selama hamil:

Ibu mengatakan makan 2-3 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang makan buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan teh.

Selama nifas:

Ibu mengatakan makan 1-2 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang makan buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan teh.

2. Personal *hygiene*

Selama hamil:

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, keramas 2x seminggu dan ganti baju 2x sehari.

Selama nifas:

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, ganti baju 2x sehari dan ganti pembalut tiap 2x sehari.

3. Eliminasi

Selama hamil:

BAB: ibu BAB 1-2x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada keluhan.

BAK: ibu BAK 5-6x sehari, warna urine kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada nyeri saat BAK.

Selama nifas:

BAB: ibu BAB 1x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada keluhan.

BAK: ibu BAK 4-5x sehari, warna kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada rasa nyeri saat BAK.

4. Istirahat

Selama hamil:

Ibu mengatakan tidur siang 2-4 jam dan tidur malam 8 jam.

Selama nifas:

Ibu mengatakan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 5-6 jam.

5. Keadaan psikologis

Ibu mengatakan merasa bahagia dan sangat senang dengan kelahiran anaknya yang pertama dan dalam keadaan sehat.

6. Spiritual

Selama hamil:

Ibu mengatakan sering melewatkan salat 5 waktu, ibu sesekali membaca Al-Qur'an.

Selama nifas:

Ibu mengetahui bahwa selama 40 hari masa nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dan setelah 40 hari ibu harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah.

G. Riwayat psikososal, ekonomi, dan spiritual

1. Suami maupun keluarga merasa senang dengan kelahiran anak pertamanya
2. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
3. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga dibantu oleh keluarga
4. Ibu dan keluarga beragama islam dan taat menjalankan ibadah
5. Hubungan keluarga dan tetangga baik
6. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

H. Pemeriksaan fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum : baik
- b. Kesadaran : *composmentis*

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 120/ 80 mmHg
- b. Nadi : 80x/ menit dengan teratur
- c. Suhu badan : 38,7 °C di bawah *axilar*
- d. Pernapasan : 22x/ menit

3. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Payudara

Pada kedua payudara ibu tampak merah, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tampak bengkak, keras, panas dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi.

b. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak *striae alba*, *linea nigra*, TFU (Tinggi Fundus Uteri) 2 jari bawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

c. Genitalia

Tampak pengeluaran *lochea rubra*, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis, dan tidak ada *varices*

d. Ekstremitas

Tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada *varises*.

LANGKAH II. Merumuskan Diagnosa/ Masalah Aktual

Diagnosa: Ny “H” post partum hari kedua

Masalah aktual: Bendungan ASI

1. Post partum Hari Kedua

Data subjektif:

Ibu mengatakan melahirkan tanggal 03 Juli 2018 pukul 12.05 wita

Data objektif:

Pada pemeriksaan fisik didapatkan TFU 2 jrbpst, tampak pengeluaran *lochia* rubra.

Analisa dan interpretasi data:

Tinggi fundus uteri pada masa nifas yaitu, hari pertama fundus setinggi pusat (*umbilicus/pusar*), hari kedua fundus uteri berada 2 jari dibawah pusat, hari ketiga fundus uteri berada 3 jari dibawah pusat, hari ketujuh fundus uteri berada pada pertengahan antara pusat dan simphisis, hari kesepuluh fundus utri berada pada simphisis dan setelah hari ke 10 biasanya sudah sulit untuk dilakukan palpasi.

Lochia adalah cairan atau sekret yang berasal dari cavum uteri dan vagina selama masa nifas, *Lochia* rubra berwarna merah kehitaman berisi sel desidua, verniks caseosa, rambut lanugo, sisa mekoneum dan sisa darah yang keluar pada hari ke-1 sampai ke-3 pasca persalinan.

2. Bendungan ASI

Data subjektif:

Ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri dan keras sejak tanggal 04 juli 2018, pukul 20.30 wita, ibu mengatakan merasa demam.

Data objektif:

Dari pemeriksaan fisik, payudara tampak merah, bengkak, teraba keras pada saat palpasi, dan terdapat nyeri tekan. Dari pemeriksaan suhu tubuh didapatkan hasil 38,7⁰C.

Analisa dan interpretasi data dasar:

Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Bendungan ASI terjadi pada hari ke 3-5 setelah persalinan. Gejala dari bendungan ASI yaitu payudara bengkak, keras, nyeri bila ditekan, warnanya kemerahan, suhu tubuh sampai 38⁰C.

LANGKAH III. Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Diagnosa/masalah potensial yang dapat terjadi pada ibu adalah Mastitis

LANGKAH IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera dan Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung perlunya dilakukan tindakan segera.

LANGKAH V. Rencana Asuhan Kebidanan

1. Tujuan

- a. Bendungan Payudara dapat teratasi
- b. Bayinya dapat menyusui pada ibunya dengan baik
- c. Tidak terjadi mastitis

2. Kriteria keberhasilan

- a. Bendungan Payudara telah teratasi
- b. Payudara ibu tidak bengkak, dan sakit lagi
- c. Ibu dapat menyusui bayinya secara *on demand*
- d. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah : sistole 100- 130 mmHg
Diastole 70- 90 mmHg
 - 2) Nadi : 80- 90x/ menit dengan teratur
 - 3) Suhu : 36- 37°C di bawah *axilar*
 - 4) Pernapasan : 16- 20x/ menit dengan teratur

3. Rencana asuhan

Tanggal 05 juli 2018

- a. Sampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI.

Rasional : dengan menjelaskan mengenai keadaan yang dialaminya maka ibu akan mengerti sehingga ibu akan bersifat kooperatif terhadap tindakan dan anjuran petugas kesehatan.

b. Observasi tanda-tanda vital

Rasional: tanda-tanda vital dapat memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya.

c. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand*.

Rasional: agar nutrisi bayi dapat tercukupi dan tidak terjadi penampungan ASI yang berlebihan.

d. Berikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- 1) Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
- 2) Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit
- 3) Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- 4) Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Rasional : dengan menjelaskan cara mengatasi keluhan kepada ibu, ibu akan tidak terlalu merasakan keluhan yang dialami dan akan membantu petugas kesehatan dalam proses penyembuhannya.

e. Ajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

- 1) Tempatkan kedua tangan diantara kedua payudara kemudian urut ke atas lalu ke samping kemudian urut ke bawah hingga tangan menyanggah payudara kemudian sentakkan ke bawah payudara secara perlahan.
- 2) Telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan saling dirapatkan, kemudian sisi keliling tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting, demikian pula payudara kanan

- 3) Telapak tangan menopang payudara pada cara ke-2 kemudian jari tangan kanan dikepalkan lalu buku-buku jari tangan kanan mengurut dari pangkal ke arah puting.

Rasional: dengan melakukan perawatan payudara dapat meningkatkan produksi ASI dan dapat mempercepat proses pengosongan saluran dan kelenjar susu sehingga ASI menjadi lancar.

- f. Ajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar, yaitu:
 - 1) Usahakan pada saat menyusui ibu dalam keadaan tenang
 - 2) Memasukkan semua areolla *mammae* ke dalam mulut bayi
 - 3) Ibu dapat menyusui dengan cara duduk atau berbaring sesuai kenyamanan dengan santai dan dapat menggunakan sandaran (bantal) pada punggung
 - 4) Payudara dipegang dengan ibu jari di atas, jari yang lain menopang di bawah payudara.
 - 5) Berikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand*. Setelah salah satu payudara mulai terasa kosong, sebaiknya ganti pada payudara yang satunya.
 - 6) Setelah selesai menyusui oleskan ASI ke payudara, biarkan kering sebelum kembali memakai bra, langkah ini berguna untuk mencegah lecet pada puting.
 - 7) Sendawakan bayi tiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara dari lambung bayi agar bayi tidak kembung dan muntah.

Rasional: bayi akan tampak tenang karena mudah menghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri.

- g. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Rasional: dengan mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi akan dapat memperbanyak dan memperlancar ASI misalnya daun katub, bayam dan lain lain.

- h. Berikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral dan diberhentikan apabila demam telah turun.

Rasional: Paracetamol adalah salah satu obat yang masuk ke dalam golongan analgesik (peredam nyeri) dan antipiretik (penurun demam).

- i. Anjurkan ibu untuk menjaga personal *hygienya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Rasional : dengan rajin mencuci tangan dan membersihkan payudaranya, hal itu akan membuat payudara ibu terhindar dari invasi bakteri yang dapat menyebabkan mastitis.

- j. Anjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI.

Rasional : dengan rutin dipompa, proses pengeluaran ASI lebih teratur sehingga menyebabkan berkurangnya gejala dari bendungan ASI berupa payudara bengkak.

- k. Menasehati ibu tentang tuntunan agama mengenai pemberian ASI dan masa penyapihan yang baik

Rasional : dengan diberikannya pengetahuan agama pada ibu tentang pemberian ASI, diharapkan ibu akan memberikan ASI pada bayinya secara *on demand* hingga bayinya berusia 2 tahun

- l. Lakukan pendokumentasian

Rasional: pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan petugas jika terjadi sesuatu pada pasien.

LANGKAH VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 05 juli 2018, Jam 09.00 Wita

- a. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan payudara

Hasil: ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

- b. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 38⁰C, pernapasan 22x/menit.

- c. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

- d. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- 1) Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
- 2) Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit
- 3) Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- 4) Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: ibu bersedia melakukannya

- e. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- f. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- g. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

- h. Memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral

Hasil: obat telah diberikan

- i. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian

LANGKAH VII. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Tanggal 05 juli 2018

- a. Bendungan Payudara telah teratasi
- b. Bayi menyusui pada ibunya dengan baik
- c. ibu dalam keadaan baik
- d. Tanda-tanda vital dalam batas normal



**PENDOKUMETASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA
NY”H’ DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF
GOWA
TANGGAL 05 JULI 2018**

No. Register : 50XXXX
 Tanggal partus : 03 Juli 2018 , pukul 12.05 wita
 Tanggal pengkajian : 05 Juli 2018 , pukul 09.00 wita
 Nama pengkaji : Nur Haerati

Langakh I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”H” / Tn. “H”
 Umur : 21 Tahun / 20 Tahun
 Nikah/Lamanya: 1 kali / ±1 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Palompong Bajeng

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri dan terasa keras sejak tanggal 04 Juli 2018 pukul 20.30wita.
2. Ibu mengatakan suhu badannya terasa panas

3. Ibu melahirkan pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 12.05 wita
4. Ibu mengatakan bayinya malas menyusui
5. Ibu mengatakan merasa cemas dan tidak nyaman dengan keadaanya

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 80 mmHg

Nadi : 86x/menit dengan teratur

Suhu : 38,7⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Payudara

Kedua payudara ibu tampak merah, puting susu menonjol, hiperpigmentasi *areola mammae*, tampak membesar, bengkak, panas dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi.

- b. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak *striae alba*, *linea nigra*, TFU (Tinggi Fundus Uteri) 2 jari bawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

c. Genetalia

Tampak pengeluaran lochea rubra, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis dan tidak ada varices.

d. Ekstremitas

Tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varises

Assesment (A)

Ny "H" P1 A0 post partum hari kedua dengan bendungan payudara

Planning (P)

Tanggal 05 juli 2018, Jam 09.00 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI.

Hasil: ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 86x/menit, suhu 38,7⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Mengajarkan ibu untuk menjaga personal *hygienenya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : ibu akan melakukannya

5. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
- b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah / hangat selama 5 menit
- c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

8. Mengajarkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

9. Memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral.

Hasil: obat telah diberikan

10. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian



**PENDOKUMETASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA
NY”H” DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF
GOWA
TANGGAL 06 JULI 2018**

Tanggal pengkajian : 06 Juli 2018 , pukul 09.00 wita

Nama pengkaji : Nur Haerati

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”H”	/	Tn. “H”
Umur	: 21 Tahun	/	20 Tahun
Nikah/Lamanya:	1 kali	/	±1 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMA	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Palompong Bajeng		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya masih terasa bengkak dan nyeri
2. Ibu mengatakan suhu badannya yang panas sudah berkurang
3. Ibu mengatakan bayinya masih malas menyusui
4. Ibu mengatakan masih cemas dengan keadaannya

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah : 120/ 70 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 38⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Payudara

Kedua payudara masih tampak merah, bengkak, dan masih nyeri saat palpasi, pengeluaran ASI masih sedikit

5. Abdomen

TFU 3 jrbpst, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

6. Genetalia

Tampak pengeluaran *lochia* rubra, vagina tidak berbau amis

Assesment (A)

Ny "H" post partum hari ketiga dengan bendungan payudara

Planning (P)

Tanggal 06 Juli 2018

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu masih mengalami bendungan ASI

Hasil: ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 38⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal *hygienenya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : ibu akan melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap meminum obat yang telah diberikan

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian



**PENDOKUMETASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA
NY”H” DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF
GOWA
TANGGAL 07 JULI 2018**

Tanggal pengkajian : 07 Juli 2018 , pukul 09.00 wita

Nama pengkaji : Nur Haerati

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”H”	/	Tn. “H”
Umur	: 21 Tahun	/	20 Tahun
Nikah/Lamanya:	1 kali	/	±1 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMA	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Palompong Bajeng		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bengkak dan nyeri pada payudaranya sudah berkurang
2. Ibu mengatakan suhu badannya sudah tidak panas lagi
3. Ibu mengatakan bayinya sudah mulai menyusu
4. Ibu mengatakan ASI nya sudah keluar tetapi belum lancar

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 82x/menit dengan teratur

Suhu : 37,5⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 22x/menit dengan teratur

4. Payudara

Kedua payudara tidak tampak merah lagi, pembengkakan sudah berkurang, dan masih sedikit nyeri bila dipalpasi, pengeluaran ASI belum terlalu banyak.

5. Abdomen

TFU 3 jrbpst, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

6. Genetalia

Tampak pengeluaran *lochia* sanguinolenta, vagina tidak berbau amis

Assesment (A)

Ny "H" post partum hari keempat dengan bendungan payudara

Planning (P)

Tanggal 07 Juli 2018, Jam 09.00 Wita

1. Memberitahu ibu bahwa kondisinya sudah mulai membaik

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal *hygienenya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : ibu akan melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

7. Melakukan pendokumentasian

Hasil: ibu bersedia melakukannya

**PENDOKUMETASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA
NY”H” DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF
GOWA
TANGGAL 08 JULI 2018**

Tanggal pengkajian : 08 Juli 2018 , pukul 09.00 wita

Nama pengkaji : Nur Haerati

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”H” / Tn. “H”
 Umur : 21 Tahun / 20 Tahun
 Nikah/Lamanya: 1 kali / ±1 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Palompong , Bajeng

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bengkak dan nyeri pada payudaranya sudah berkurang
2. Ibu mengatakan suhu badannya sudah tidak panas lagi
3. Ibu mengatakan bayinya sudah mulai menyusu
4. Ibu mengatakan ASI nya sudah keluar dan mulai lancar

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/70 mmHg

Nadi : 86x/menit dengan teratur

Suhu : 36,9⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 22x/menit dengan teratur

4. Payudara

Kedua payudara tidak tampak merah lagi, pembengkakan sudah berkurang, dan masih sedikit nyeri bila dipalpasi, pengeluaran ASI belum terlalu banyak.

5. Abdomen

TFU pertengahan pusat-symphisis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

6. Genetalia

Tampak pengeluaran *lochia* sanguinolenta, vagina tidak berbau amis

Assesment (A)

Ny "H" post partum hari kelima dengan bendungan payudara

Planning (P)

Tanggal 08 Juli 2018, Jam 09.00 Wita

1. Memberitahu ibu bahwa kondisinya sudah mulai membaik

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian

Hasil: ibu bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal *hygienenya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : ibu akan melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

7. Melakukan pendokumentasian

Hasil: ibu bersedia melakukannya

**PENDOKUMETASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA
NY”H” DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF
GOWA
TANGGAL 09 JULI 2018**

Tanggal pengkajian : 09 Juli 2018 , pukul 09.00 wita

Nama pengkaji : Nur Haerati

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”H”	/	Tn. “H”
Umur	: 21 Tahun	/	20 Tahun
Nikah/Lamanya:	1 kali	/	±1 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMA	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Palompong Bajeng		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya sudah tidak bengkak dan nyeri lagi
2. Ibu mengatakan bayinya sudah aktif menyusui
3. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar keluar

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*

3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 85x/menit dengan teratur

Suhu : 36,7⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 20x/menit

4. Payudara

Kedua payudara tidak tampak bengkak lagi, tidak ada nyeri tekan saat palpasi, pengeluaran ASI lancar.

5. Abdomen

TFU pertengahan pusat-symphisis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

6. Genetalia

Tampak pengeluaran *lochia* sanguinolenta, vagina tidak berbau amis

Assesment (A)

Ny "H" post partum hari keenam dengan riwayat bendungan payudara

Planning (P)

Tanggal 09 Juli 2018

1. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah membaik dan keadaan payudaranya sudah sembuh.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang

2. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan.

hasil: ibu bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal *hygienenya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : ibu akan melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE PADA
NY”H” DENGAN BENDUNGAN PAYUDARA DI RSUD SYECH YUSUF
GOWA
TANGGAL 12 AGUSTUS 2018**

Tanggal pengkajian : 12 Agustus 2018 , pukul 09.00 wita

Nama pengkaji : Nur Haerati

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”H” / Tn. “H”
 Umur : 21 Tahun / 20 Tahun
 Nikah/Lamanya: 1 kali / ±1 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Palompong Bajeng

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya sudah tidak bengkak dan nyeri lagi
2. Ibu mengatakan bayinya sudah aktif menyusui
3. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar keluar

Objektif (O)

4. Keadaan umum ibu baik
5. Kesadaran *composmentis*

6. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 36,8⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 22x/menit

7. Payudara

Pengeluaran ASI lancar.

8. Abdomen

Tinggi fundus uteri tidak teraba

9. Genetalia

Tampak pengeluaran *lochia* alba, tidak terdapat tanda infeksi

Assesment (A)

Ny "H" post partum minggu ke-6 dengan riwayat bendungan Payudara

Planning (P)

Tanggal 12 Agustus 2018, Jam 09.00 Wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Hasil :

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 36,8⁰C di bawah *axilar*

Pernapasan : 22x/menit

TFU : Tidak Teraba

Kontraksi uterus : Tidak ada

ASI : lancar

2. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah membaik dan keadaan payudaranya sudah sembuh.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang

3. Mengingatkan ibu kembali untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan tanpa pendamping ASI apapun.

hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal *hygienenya* dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : ibu akan melakukannya

5. Memberitahu ibu dan suami bahwa pada hari ke 40 masa nifas sudah boleh melakukan hubungan seksual

Hasil: ibu dan suami sudah mengerti dan mengetahui bahwa sudah boleh melakukan hubungan seksual

6. Menjelaskan Imunisasi Dasar Lengkap Wajib Diberikan Sebelum Bayi Berusia 1 Tahun

- a. Umur bayi <7 hari jenis imunisasi Hepatitis B (HB) 0 untuk mencegah penularan hepatitis B dan kerusakan hati

- b. Umur bayi 1 Bulan jenis imunisasi BCG Polio 1 untuk mencegah penularan tuberculosis dan polio
- c. Umur bayi 2 Bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 1 Polio 2 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- d. Umur bayi 3 Bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 2 Polio 3 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- e. Umur bayi 4 Bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 3 Polio 4 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- f. Umur bayi 9 Bulan jenis imunisasi Campak untuk mencegah campak

Hasil : ibu mengerti

7. Menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi

a. Cara alami

Keluarga berencana secara alami dilakukan dengan menghindari hubungan seksual saat wanita sedang dalam masa paling subur. Mendeteksi masa subur dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perhitungan kalender, memeriksa suhu tubuh, serta perubahan cairan vagina.

Kelebihan: tidak butuh biaya, alat, maupun obat apa pun.

Kekurangan:

Membatasi hubungan seksual yang dilakukan secara spontan.

Kesalahan perhitungan dapat mengakibatkan seperempat orang yang menerapkan cara ini mengalami kehamilan.

b. Pil KB

Merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan dan mengandung hormon progesterin dan estrogen untuk mencegah ovulasi. Pil ini dikenal dalam dua jenis utama, dari yang mengandung progesteron saja dan pil kombinasi.

Kelebihan:

Sangat efektif. Tingkat kegagalan hanya 8%.

Melancarkan haid dan mengurangi kram saat haid, dapat juga menghentikan haid, tergantung jenisnya.

Kekurangan

Tidak melindungi pengguna dari penyakit menular seksual.

Dapat mendatangkan risiko seperti meningkatnya tekanan darah, pembekuan darah, bercak darah, dan payudara mengeras.

Beberapa wanita dianjurkan tidak mengonsumsi pil KB, misalnya: yang memiliki riwayat penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara atau rahim, migrain, hingga tekanan darah tinggi.

c. Kondom

Kondom mencegah kehamilan dengan menghalangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita.

Kelebihan:

Tidak mahal.

Melindungi pengguna dari sebagian besar penyakit menular seksual.

Mudah didapatkan.

Kekurangan:

Tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika kondom tidak digunakan dengan tepat.

Sekali pakai.

d. Suntik KB

Terdapat dua jenis suntik KB. Suntik KB yang bekerja selama tiga bulan untuk mencegah kehamilan, dan suntik KB yang bekerja selama 1 bulan.

Kelebihan: Lebih efektif dan praktis dari pil KB, dengan tingkat kegagalan 3%.

Jika digunakan dengan benar, tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan lebih rendah yaitu kurang dari 1%.

Kekurangan:

Suntik KB bulanan perlu memerlukan waktu kunjungan rutin per bulan ke dokter atau bidan.

Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual.

Dapat menyebabkan efek samping seperti bercak darah.

Beberapa wanita tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi ini dalam beberapa kondisi, misalnya: memiliki riwayat migrain, diabetes, sirosis hati, maupun stroke dan serangan jantung. Selain itu, tidak disarankan juga untuk wanita yang ingin mempertahankan haid secara rutin.

e. Implan

Kontrasepsi ini berupa benda kecil seukuran dan berbentuk seperti batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas.

Implan ini secara perlahan mengeluarkan hormon progesterin yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun.

Kelebihan:

Sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%.

Dapat bertahan hingga 3 tahun.

Kekurangan:

Dapat menyebabkan efek samping seperti haid tidak teratur.

Dapat menyebabkan memar dan bengkak di awal pemasangan.

Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual.

f. IUD

IUD adalah singkatan dari *intrauterine device*. IUD adalah plastik berbentuk huruf T yang diletakkan di dalam rahim yang berguna untuk menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis utama IUD:

Kelebihan:

Tidak memerlukan perawatan rumit dan tahan lama.

Kekurangan:

Dapat lepas.

Biaya mahal di awal.

g. Coitus interruptus

Kehamilan dapat dicegah secara alami dengan menarik penis keluar sebelum terjadi ejakulasi.

Kelebihan:

Tidak membutuhkan biaya, alat, ataupun hormon , Tingkat kegagalan 4%.

Kekurangan:

Kadang tidak dapat dilakukan dengan tepat.

Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual.

Hasil. Ibu mengerti

8. Menganjurkan ibu untuk memilih salah satu jenis kontrasepsi yang digunakan

Hasil ibu memilih kontrasepsi suntik

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian

Hasil Kunjungan

No	Observasi	Tanggal/Bulan					
		Postpartum hari ke-2 05-7-2018	Postpartum hari ke-3 06-7-2018	Postpartum hari ke-4 07-7-2018	Postpartum hari ke-5 08-7-2018	Postpartum hari ke-6 09-7-2018	Postpartum minggu ke-6 12-8-2018
1.	TD(mmHg)	120/80	120/70	110/70	120/70	120/80	120/60
2.	TFU	2 jrbpst	3 jrbpst	3 jrbpst	Pertengahan pusat-sympisis	Pertengahan pusat-sympisis	Tidak teraba
3.	Suhu	38,7°C	38°C	37,5°C	36,9°C	36,7°C	36,7°C
4.	Pengeluaran ASI	sedikit	sedikit	Belum terlalu banyak	Belum terlalu banyak	lancar	lancar
5.	Keadaan Payudara	Tampak merah dan membesar, bengkak, panas	Tampak merah, bengkak,	Tidak tampak merah lagi, pembengkakan berkurang	Tidak tampak merah lagi, pembengkakan berkurang	normal	normal
6.	Nyeri Tekan Pada Payudara	Ada nyeri	Ada nyeri	Sedikit nyeri	Sedikit nyeri	Tidak ada nyeri	Tidak ada nyeri
7.	Lochia	Rubra	Rubra	sanguilenta	sanguilenta	sanguilenta	alba

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan tentang manajemen asuhan kebidanan postnatal care pada Ny “H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa. Asuhan ini dilakukan selama sebanyak satu kali asuhan di ruangan postnatal care dan asuhan yang dilanjutkan di rumah klien selama lima kali.

Dalam hal ini, pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik (Nurhayati, dkk, 2013). Pengkajian data dasar pada kasus bendungan ASI dilakukan pada saat pengamatan pertama kali di ruangan postnatal care. Pengkajian meliputi anamnesis langsung oleh pasien. Pengkajian ini berupa

identitas pasien, keluhan pasien, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas ibu, riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat keluarga berencana, dan riwayat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Pengkajian pada kasus ini dilanjutkan pada pendokumentasian asuhan kebidanan.

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar atau pengkajian data awal yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi Ny “H” baik keluarga, bidan maupun dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan pengkaji untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan apakah sesuai dengan permasalahan yang diangkat atau tidak. Data yang diambil dari studi kasus Ny “H” dengan bendungan ASI selama klien di RSUD dan pada saat di rumah klien meliputi:

Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri, panas dan terasa keras sejak tanggal 04 Juli 2018 pukul 20.30 wita, ibu mengatakan suhu badannya terasa panas dan ibu mengatakan bayinya malas menyusu. Ini merupakan persalinan pertama ibu dan tidak pernah keguguran. Ibu melahirkan di rumah sakit pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 12.05 wita, dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan lahir 2900 gram, dan ditolong oleh bidan dan dokter. Ibu tidak ada riwayat penyakit menular, menurun ataupun menurun.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 38,7⁰C, penapasan 22x/menit.

Bendungan air susu ibu adalah pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan (Yanti, 2017). Bendungan payudara adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri di sertai kenaikan suhu badan (Maryunani, 2015: 13)

Faktor-faktor yang dirasakan pada ibu Pengosongan *mammae* yang tidak sempurna, faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar, tidak dilakukan IMD dan bayi tidak menyusui segera setelah lahir (Rukiyah dkk., 2012: 16-17).Tanda dan gejala yang dialami pada ibu dengan bendungan ASI adalah payudara bengkak, keras, nyeri bila ditekan, warnanya kemerahan, suhu tubuh sampai 38⁰C (Rukiyah, Yulianti 2012: 22).

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus bendungan ASI. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah

yang spesifik (Nurhayati, dkk, 2013). Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis Ny “H” Post Partum Hari kedua dengan masalah aktual Bendungan ASI.

Ibu melahirkan pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 12.05 wita. Pada pemeriksaan fisik ditemukan TFU 2 jari bawah pusat, tampak pengeluaran *lochia* rubra pada jalan lahir ibu.

Berdasarkan teori Maryunani, Setelah proses persalinan berakhir terjadi proses involusi uteri yang ditandai dengan penurunan tinggi fundus uteri yang terjadi berangsur-angsur, uterus ibu yang baru melahirkan masih membesar, jika diraba dari luar tinggi fundus uteri kira – kira 1 jari bawah pusat. Pada hari ketiga, kira – kira 2 atau 3 jari bawah pusat. Hari kelima, pada pertengahan antara pusat dan symphysis. Hari kesembilan, kira – kira 1 jari di atas symphysis dan setelah hari kesepuluh, biasanya uterus tersebut dari luar tidak teraba lagi (Maryunani, 2009: 46). Menurut Astutik, *lochia* rubra berwarna kemerah merahan berisi darah dan *vernix caseosa* yang keluar pada hari ke-2 sampai ke-3 pasca persalinan (Astutik, 2015: 59).

Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri dan terasa keras sejak tanggal 04 juli 2018 pukul 20.30 wita, suhu badannya terasa panas dan bayinya malas menyusui. Pada pemeriksaan fisik ditemukan payudara ibu tampak merah, bengkak, keras, panas dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi. Berdasarkan teori menurut Rukiyah dan Yulianti, tanda dan gejala yang muncul pada ibu dengan

bendungan ASI adalah payudara bengkak, keras, nyeri bila ditekan, warnanya kemerahan, suhu tubuh sampai 38°C (Rukiyah, Yulianti 2012: 22).

Demam yang dialami oleh ibu merupakan gejala yang berasal dari gejala bendungan ASI saja karena pada saat dilakukan pemeriksaan fisik (*head to toe*) tidak ditemukan suatu masalah lain yang dapat menimbulkan demam pada ibu. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian data tidak ada perbedaan dengan tinjauan kepustakaan yang ditemukan pada kasus.

Langkah III: Identifikasi Diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Mangkuji, dkk, 2014). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Bendungan ASI disebabkan oleh pengeluaran susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi (*bonding*) kurang baik, dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui. *Engorgement* (Bendungan ASI) kebanyakan terjadi pada hari kedua sampai hari keempat postpartum. Terjadinya pembengkakan payudara dan secara palpasi teraba keras, kadang terasa nyeri serta seringkali disertai

peningkatan suhu badan ibu. Bendungan ASI yang tidak disusukan secara adekuat akhirnya terjadi mastitis. (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

Dampak dari Bendungan Asi adalah Mastitis. Mastitis adalah peradangan pada payudara. Payudara menjadi merah, bengkak kadangkala diikuti rasa nyeri dan panas, suhu tubuh meningkat. Didalam terasa ada massa padat (lump), dan diluarnya kulit menjadi merah. Kejadian masa nifas 1-3 minggu setelah persalinan diakibatkan oleh sumbatan aliran susu yang berlanjut. Dapat juga karena kebiasaan menekan payudara dengan jari atau karena tekanan baju. Dampak yang lain adalah abses payudara, bilamana penanganan mastitis tidak sempurna, maka infeksi akan makin berat sehingga terjadi abses. Ditandai dengan payudara lebih berwarna merah mengkilat dari sebelumnya saat baru terjadi radang, ibu merasa lebih sakit, benjolan lebih lunak karena berisi nanah. Jika sudah terjadi abses maka payudara tidak boleh disusukan. (Indasari, 2017: 184)

Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi

Tindakan segera atau kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Berdasarkan kasus ini, tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.

Langkah V: Perencanaan Asuhan Kebidanan

Langkah ini merupakan lanjutan manajemen asuhan kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana

tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar lebih efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan dan terdapat sasaran target serta hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus (Nurhayati, dkk, 2013).

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dengan penanganan yang cepat dan tepat serta payudara ibu kembali normal. Bila diagnosis bendungan ASI ditegakkan rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu hasil pemeriksaan, diskusikan penyebab dan penatalaksanaannya, rekomendasikan untuk segera diintervensi.

Pada tempat pengambilan kasus yaitu di RSUD Syech Yusuf Gowa, ibu nifas diberikan penjelasan mengenai pentingnya perawatan payudara, teknik menyusui yang baik dan benar dan menyusui bayinya secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian untuk mencegah terjadinya bendungan ASI.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua

payudaranya secara bergantian, memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti; menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat dan kain dingin secara bergantian selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi, memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral dan diberhentikan apabila demam ibu telah turun.

Perawatan payudara merupakan upaya untuk merangsang sekresi hormon oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini mungkin dan memegang peranan penting dalam menghadapi masalah menyusui. Teknik pemijatan dan rangsangan pada puting susu yang dilakukan pada perawatan payudara merupakan latihan semacam efek hisapan bayi sebagai pemicu pengeluaran ASI (Sari, 2014: 6).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Rosita dapat diketahui bahwa dari 34 responden hampir seluruhnya dari responden melakukan perawatan payudara sejumlah 26 orang (76,4%). Menurut peneliti bahwa responden ditempat penelitian sebagian besar melakukan perawatan payudara. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari dan mengerti tentang pentingnya perawatan payudara. Perawatan payudara ini dilakukan untuk mencegah tersumbatnya saluran susu dan memperlancar pengeluaran Asi sehingga kebutuhan Asi bayi dapat tercukupi (Rosita, 2017 : 3)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Kurniawati yaitu sebanyak 33 responden, responden yang melakukan cara menyusui kurang benar diantaranya 9 responden (81,8%) telah mengalami payudara bengkak dan 2 responden (18,2%) tidak mengalami payudara bengkak sedangkan responden yang melakukan cara menyusui dengan benar 20 responden (90,9%) tidak mengalami payudara bengkak dan 2 responden (9,1%) yang mengalami payudara bengkak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang melakukan cara menyusui yang kurang benar lebih banyak yang mengalami payudara bengkak (Astuti dan Kurniawati, 2012).

Pembengkakan payudara terjadi karena ASI tidak disusu dengan adekuat dan posisi bayi pada payudara saat menyusu salah. Sehingga hal ini akan menyebabkan puting susu lecet dan ASI tidak keluar optimal sehingga terjadi pembendungan air susu pada payudara yang selanjutnya dapat menyebabkan pembengkakan.

Penatalaksanaan yang dilakukan pada ibu dengan bendungan ASI menurut kemenkes RI, sanggah payudara ibu dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat dan kain dingin secara bergantian selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, susukan bayi 2-3 jam sekali sesuai keinginan bayi (*on demand feeding*) dan pastikan bahwa perlekatan bayi dan payudara ibu sudah benar, pada masa-masa awal atau bila bayi yang menyusu tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan pompa atau pengeluaran ASI secara manual dari payudara, letakkan kain dingin/kompres dingin dengan es dan kompres kain hangat secara bergantian pada payudara setelah menyusui atau setelah

payudara dipompa, bila perlu berikan parasetamol 3x1 500 mg per oral untuk mengurangi nyeri dan penurun demam, lakukan evaluasi setelah 3 hari (Kemenkes RI, 2013: 227-228).

Karena stasis susu sering merupakan faktor awal mastitis. Langkah manajemen yang paling penting dan efektif untuk mengeluarkan susu yaitu: Ibu harus didorong untuk menyusui lebih sering mulai pada payudara yang sakit. Jika nyeri mengganggu proses menyusui, pemberian susu bisa dimulai pada payudara yang tidak terpengaruh dengan gejala bendungan ASI, kemudian beralih ke payudara yang terkena bendungan ASI segera setelah proses menyusui pada payudara yang satu selesai. Memposisikan bayi sesuai dengan posisi menyusui yang benar dapat membantu pengeluaran ASI. Memijat payudara selama menyusui dengan minyak goreng atau baby oil pada tangan juga bisa membantu untuk memudahkan pengeluaran ASI, dapat dilakukan oleh ibu atau orang lain yang dapat membantu, harus dimulai dari area yang tersumbat atau terkena bendungan payudara hingga menuju puting susu. Setelah menyusui, keluarkan susu dengan pompa dapat meningkatkan aliran ASI dan mempercepat penyembuhan bendungan ASI (Lisa dan Amir, 2014).

Durasi pemberian ASI mempunyai peranan terhadap terjadinya bendungan ASI karena durasi menyusui berkaitan dengan refleksi prolaktin yang merupakan hormon laktogenik yang penting untuk memulai dan mempertahankan sekresi ASI. Stimulasi isapan bayi akan mengirim pesan ke *hipotalamus* yang merangsang *hipofisis anterior* untuk melepas prolaktin, suatu hormon yang meningkatkan

produksi ASI oleh sel-sel *alveolus* kelenjar mamaria. Jumlah prolaktin yang disekresikan dan jumlah ASI yang diproduksi berkaitan dengan besarnya stimulasi isapan yaitu frekuensi, intensitas dan lama bayi menghisap (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

Bendungan Payudara pada ibu nifas dapat terjadi jika air susu yang diproduksi oleh payudara tidak segera diberikan pada bayi atau tidak segera dikosongkan. Untuk mencegah terjadinya bendungan ASI pada ibu nifas yaitu dengan menyusui bayi secara teratur tanpa jadwal (*on demand*), tidak membatasi waktu pemberian ASI dan perawatan payudara secara teratur (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

Seorang bidan harus mempunyai pengetahuan yang baik dan benar agar dapat melaksanakan pencegahan atau penanganan segera pada ibu post partum sesuai kebijakan dan prosedur tetap serta menyempurnakan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan khususnya pada ibu dengan bendungan ASI. Uraian tersebut tampak adanya persamaan antara teori dengan rencana tindakan yang dilakukan pada kasus Ny "H".

Langkah VI: Implementasi

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Mangkuji, dkk, 2014).

Pada studi kasus Ny “H” dengan bendungan payudara, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Pemantauan pertama yang dilakukan di RSUD Syech Yusuf Gowa, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, menjelaskan pada ibu cara mengatasi keluhannya seperti; menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan air hangat dan dingin secara bergantian selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi serta memberikan terapi obat seperti paracetamol 500 mg 3x1 per oral dan dihentikan apabila demam ibu telah turun.

Pada pemantauan kedua yang dilakukan dirumah ibu, asuhan yang diberikan mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan bergizi, menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

Pemantauan ketiga yang dilakukan dirumah ibu, asuhan yang diberikan menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, ibu mengerti dengan yang dijelaskan dan akan melakukan apa yang dianjurkan.

Dalam tahap ini penulis melakukan asuhan kebidanan selama 1 hari di RSUD Syech Yusuf dan 4 kali kunjungan dirumah klien. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun sesuai kebutuhan klien, sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan kasus yang ada.

Langkah VII: Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan selama 1 hari di RSUD Syech Yusuf dan 5 kali kunjungan dirumah klien. Ibu tidak mengalami komplikasi, bendungan ASI telah teratasi yang ditandai dengan keadaan payudara ibu telah normal dan bayi telah menyusu dengan baik.

Keberhasilan asuhan ini juga ditandai dengan pemahaman ibu mengenai cara dan teknik menyusui yang baik dan benar, cara melakukan perawatan payudara serta menyusui bayinya secara *on demand*. Kondisi kesehatan ibu yang sudah membaik dimana bendungan payudara tidak menjadi mastitis. Semua data hingga penatalaksanaan didokumentasikan oleh puskesmas dan peneliti.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses Manajemen Asuhan Kebidanan yang diterapkan pada Ny “H” Post Partum Hari Kedua dengan bendungan payudara cukup berhasil dan efektif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui kasus Ny “H” dengan post partum hari kedua di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny”H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018. Pada kasus Ny”H” didapatkan data dasar dengan Pada kedua payudara ibu tampak merah, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tampak bengkak, keras, panas dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi.
2. Telah dilakukan perumusan diagnosa / masalah aktual pada Ny”H” di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018 dengan pengumpulan baik dari data subjektif, data objektif dan pemeriksaan penunjang / laboratorium sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “H” dengan bendungan ASI.
3. Telah dilakukan perumusan diagnosa / masalah potensial pada Ny”H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018 mengantisipasi terjadinya Mastitis dan Abses Payudara dengan hasil tidak ada masalah potensial yang terjadi pada ibu karena diberikannya penanganan yang tepat.

4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut.
5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny”H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018. Adapun Intervensiyang diberikan yaitu melakukan perawatan payudara, teknik menyusui yang baik dan benar dan menyusui bayinya secara teratur dengan cara *on demand* dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa / masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny”H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan Evaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny”H” dengan bendungan payudara di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan yang tampak pada payudara ibu tidak bengkak lagi dan ibu menyusui bayinya secara *on demand*.

8. Telah merumuskan integrasi keIslaman pada Ny”H” dengan bendungan payudaradi RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil yaitu menjelaskan kepada ibu pandangan islam tentang pemberian ASI agar ibu mau menyusui anaknya selama 2 tahun penuh.

B. SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Untuk Ibu

- a. Mengajarkan kepada ibu agar mengkomsumsi makanan yang bergizi di samping selalu melakukan perawatan payudara untuk mencegah terjadinya bendungan ASI
- b. Mengajarkan agar setiap ibu post partum selalu menyusui bayinya secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian
- c. Mengajarkan ibu setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan.

2. Untuk bidan

- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, K & Rofiqoh, I. *Pengaruh Nifas Terhadap Komplikasi Masa Nifas Di Wilayah Puskesmas Soekarja 1 Kabupaten Banyumas*. Jurnal Medisains, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2016. Diakses Tanggal 02/07/2017 (link:<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/medisains/article/view/1056/979>).
- Aisyah, sitti, Al-Masruroh. "Asuhan Kebidanan Pada Ny." "I" P 1 Post Partum Hari Ke-14 Dengan Sub Involusi Uteri". *Jurnal Midpro*. Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Astuti, Kurniawati. *Analisa Hubungan Pengaruh Cara Menyusui Dengan Kejadian Payudara Bengkak Pada Ibu Post Partum*. Jurnal Kebidanan Vol.3 No.1, Juni 2012. Diakses tanggal 14 November 2017 (link: <http://3A%2F%2Fjournal.stikeseub.ac.id%2Findex.php%2Fjkeb%2Farticle%2Fvi.pdf>)
- Astutik, RY. *Buku ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Jakarta: CV Trans Info Media. 2015
- Buhari, Ita Sasmita, dkk. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Mobilisasi Dini
- Cullinane, M, dkk. *Determinants of mastitis in women in the CASTLE study: a cohort study*. *Journal Bio Med Central Family Practice Volume 18*. Published 16 December 2015. Diakses Tanggal 30 Oktober 2017 (link: <https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-015-0396-5>).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2014
- Dewi & Dwi Sunar. *Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, 2011
- Dwi, VNL & Sunarsih, T. *Asuhan Kebidanan Pada IBU NIFAS*. Jakarta: Salemba Medika. 2014.
- Hamdani, M. *Buku Pendidikan Agama Islam "Islam Dalam Kebidanan"*. Jakarta: CV Trans Info Media. 2012.
- Heryani Reni. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Media. 2012.

- Indasari & chotimah : *Hubungan tingkat pengetahuan ibu nifas tentang perawatan payudara dengan kejadian bendungan Asi Di RB Suko Asih Sukoharjo*, journal on medical science, vol.4, No. 2, 2017.
- Istiqomah Annisa, *Asuhan kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Media. 2012
- Jannah Nurul. *Asuhan Kebidanan Ibunifas*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*
- Kemenkes RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Edisi pertama. 2013.*
- Mangkuji, B, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC. 2014.
- Marni. *Asuhan kebidanan pada masa nifas" peurperium care"*. Yogyakarta: Pustakapelajar. 2012
- Maritalia, D. *Buku Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Maritalia Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Maryunani, A. *Buku Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi*. Jakarta: CV. Trans Info Media. 2012.
- Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Muha medika, 2012
- Mulyani Nina Siti. *ASI dan Panduan Ibu Menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- NugrohoTaufan, dkk. *Buku Ajar Asuhan kebidanan 3 nifas*. Yogyakarta: Nuhamedika. 2014
- Nurjannahnung, dkk. *Asuhan kebidanan Postpartum*. Bandung: PT RefikaAditama. 2013
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013
- Pitrianirisa. *Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Normal*. Yogyakarta: CV Budi utama. 2014

- Pada Ibu Nifas Di Puskesmas Likupang Timur Kecamatan Likupang Timur". E-journal keperawatan. Vol. 1, No. 3, Februari 2015.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Situasi dan Analisis ASI Eksklusif*. 2014. Diakses tanggal 28/06/2017 (link: <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-asi.pdf>).
- Profil Kesehatan Kabupaten Gowa. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2015.
- Rukiyah. *Asuhan Kebidanan III (Nifas)*. Jakarta : TIM. 2012.
- Roito H, J, dkk. *Buku Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi*. Jakarta: EGC. 2013.
- Rosita Evi, *hubungan perawatan payudara ibu nifas dengan Bendungan Asi*, journal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang, Vol. 12, No.1, 2017
- Sari Mustika Surya. *Hubungan Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Breast Care Dengan Kejadian Bendungan ASI Pada Ibu Post Partum*. Jurnal Keperawatan & Kebidanan - Stikes Dian Husada Mojokerto Vol.6 No 1 (2014). Diakses tanggal 14 November 2017 (link : <http://3A%2F%2Fjurnalonline.lppmdianhusada.ac.id%2Findex.php>).
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Suryani, I. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Bendungan ASI Di Ruang VII (Nifas) RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya*. 2016. Jurnal Kebidanan. Diakses Tanggal 02/07/2017 (link: http://repo.stikesmucis.ac.id/ejurnal/file.php?file=preview_mahasiswa&id=1064&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=13DB277065.pdf).
- Sutarni & Pertiwi H.W. *Hubungan Antara Postnatal Breast Care Dengan Terjadinya Bendungan ASI Di Bidan Praktek Swasta (BPS) Wilayah Kerja Puskesmas Wuryantoro Wonogiri*. Jurnal Kebidanan. Volume 6, Nomor 1. Juni 2014. Diakses Tanggal 02/07/2017 (link: <http://journal.stikeseub.ac.id/index.php/jkeb/article/view/130/129>).
- Walyani, siwi. *Asuhan Kebidanan Masa Nifa sdan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka barupress.2015
- Walyani, E.S & Purwoastuti, T.E. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

Yanti, D & Sundawati, D. *Buku Asuhan Kebidanan Masa Nifas “Belajar Menjadi Bidan Profesional”*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013.

Yang, Z, dkk. *Breastfeeding rates in China: a cross-sectionsl survey and estimate of benefits of improvement. Journal of National Institute for Nutrition and Health Published 30 October 2016*. Diakses Tanggal 02/07/2017 (link: [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(16\)31974-2.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31974-2.pdf)).



RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : Nur Haerati
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat Tanggal Lahir : Sungguminasa, 15 juli 1996
- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat : Jln Dirgantara No.8
- Email : nurhaeratihaslan@yahoo.com
- No.Hp : 082311611064
- Ipk : 3,32
- Gelar Sarjana : Ahlimadya kebidanan (Amd.keb)
2. Nama orang Tua
- Ayah : Muh Kasimm Ilyas
- Ibu : Nur Tini Dahlan S.Ipem

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Idhata Cambaya : Tahun 2002 - 2003
- SD Inpres Tetebatu 1 : Tahun 2003 - 2008
- SMPN 1 Pallangga : Tahun 2008 - 2011
- SMAN 1 Pallangga : Tahun 2011 - 2014
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Tahun 2014 - 2018