

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY”P”
RIWAYAT PARITAS TINGGI DENGAN PERDARAHAN
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 24 AGUSTUS 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma pada Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**NUR AFNI PRATIWI
NIM: 70400115064**

**PRODI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Afni Pratiwi
Nim : 70400115064
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 05 Juni 1997
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma
Alamat : Perumahan Citra Garden Blok F1 No.9
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny
“P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di
RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2018
Penyusun

Nur Afni Pratiwi
70400115064

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Afni Pratiwi

NIM : 70400115064

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "P" Riwayat Paritas
Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk
dijadikan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.

Samata, November 2018

Pembimbing I



Endangani, S.Si.T., M. Keb
NIP: 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



dr. Andi Tihar Dimanto, M.Kes
NIP: 19851030 200912 1 002

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intramatal Pada Ny "P" Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 24 Agustus 2018, yang disusun oleh Nur Afni Pratiwi, NIM: 70400115064, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UTN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 05 November 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Semesta, 05 November 2018.

27 Safar 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	Dr. Hj. Siti Saleha S.SiT, SKM, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	Firdayanti S.SiT, M.Keb	(.....)
Pembimbing II	dr. Andi Tibar Dimanto, M.Kes	(.....)
Penguji I	dr. Nadyah M.Kes	(.....)
Penguji II	Des. Hj. Hartini, M.Hi	(.....)

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203-198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf Gowa” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Terselesainya Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb, selaku ketua Prodi Kebidanan.
4. Ibu Firdayanti S.SiT, M.Keb, selaku pembimbing I yang senantiasa dengan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan support untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. dr. Andi Tihar Dimanto, M.Kes, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
6. dr. Nadyah, M.kes, selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak Dra. Hj. Hartini, M.Hi selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan mendidik penulis semasa pendidikan.
9. Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa dan jajarannya atas bantuan dan perizinan yang diberikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.

10. Yang tercinta kedua orang tua saya, ayahanda Basri dan Ibunda Nurhayati serta saudara-saudara saya, Fajri, Fika, dan Fauzan yang selalu memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis.

11. Teman-teman Kebidanan terkhusus angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan berupa semangat dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Allahumma Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Samata, November 2018


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN TEORI	8
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan.....	8
1. Definisi Persalinan	8
2. Jenis Persalinan.....	9
3. Istilah Persalinan.....	9
4. Tanda Mulainya Persalinan.....	10
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persalinan.....	13

6. Tahapan Persalinan	16
7. Mekanisme Persalinan Normal	26
8. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan.....	30
9. Partograf	39
B. Tinjauan Khusus tentang Paritas.....	47
1. Pengertian Paritas.....	47
2. Klasifikasi Jumlah Paritas	47
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Paritas	48
4. Faktor Resiko Paritas Tinggi Terhadap Ibu	50
5. Faktor Resiko Paritas Tinggi Terhadap Bayi	52
C. Teori Manajemen Asuhan Kebidanan.....	53
1. Pengertian Manajemen Kebidanan	53
2. Tahapan dalam Manajemen Kebidanan	53
3. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP).....	62
D. Ayat-ayat Tentang Manajemen Asuhan Kebidanan.....	63
BAB III STUDI KASUS.....	69
A. Kala I.....	69
B. Kala II.....	97
C. Kala III	113
D. Kala IV	119

BAB IV PEMBAHASAN.....	130
A. Kala I.....	130
B. Kala II.....	142
C. Kala III	147
D. Kala IV	151
BAB V PENUTUP.....	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	163



DAFTAR TABEL

Tabel 3 : 1 Riwayat Kehamilan dan Persalinan

Tabel 3 : 2 Observasi His dan DJJ

Tabel 3 : 3 Apgar Score

Table 3 : 4 Pemantauan Kala IV



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
Lampiran II	: Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kepada Bupati Gowa
Lampiran III	: Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Gowa kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa
Lampiran IV	: Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran V	: Riwayat hidup



ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH,
OKTOBER 2018**

Nur Afni Pratiwi, 70400115064

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : dr. Andi Tihardimanto

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny.P Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 24 Agustus 2018”

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan uri yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan. Faktor resiko dari persalinan dengan paritas tinggi adalah perdarahan.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny. “P” riwayat paritas tinggi dengan perdarahan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP. Yaitu langkah I pengkajian data dasar , langkah II diagnose masalah aktual, langkah III diagnosa masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny. “P” riwayat paritas tinggi dengan perdarahan, tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny”P” ini yaitu dengan melakukan masase uterus, pemberian drip dengan 1 ampul oksitosin 10 IU pada infus RL, pemasangan infus 2 jalur, injeksi metergin, amoxsan dan kompresi bimanual internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan penanganan di RS perdarahan dapat teratasi. Telah dilakukan pendokumentasian semua dan tindakan yang telah dilakukan pada ibu.

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER,
OCTOBER 2018

Nur Afni Pratiwi, 70400115064

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : dr. Andi Tihardimanto

"The Intranatal Obstetric Care Management on Mrs. "P" of the High Parity History with Bleeding at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital on August 24, 2018"

Childbirth is an excretion process of the results of the fetus and placenta conceptions that have sufficient months or can live outside the womb through the birth canal with or without assistances. The risk factor for labor with high parity is bleeding.

The study was aimed at implementing the Intranatal Obstetric Care Management on Mrs. "P" of the high parity history with bleeding at Syekh Yusuf Regional Public Hospital in 2018 based on the 7 steps of Varney and SOAP. The first until the seventh stages were assessing the basic data, diagnosing the actual problems, diagnosing the potential problems, conducting the immediate action/collaboration, developing a comprehensive care plan, implementation, and evaluation.

The results of the case study conducted on Mrs. "P" of the high parity history with bleeding were no obstacles observed at the time of managing the case. The treatments carried out on Mrs. "P" were performing uterine massage, providing drip with 1 ampule of 10 IU oxytocin on RL infusion, 2-way infusion, injecting the methergine, amoxsan and internal bimanual compression.

The results of the study indicated that after the treatment at the hospital, the bleeding could be resolved. All actions carried out on the mother had been documented.

Keywords: High Parity, Bleeding, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Icesmi Sukarni, dkk, 2013: 185).

Persalinan merupakan hal yang paling diimpikan oleh para ibu hamil, yang merupakan waktu yang menyenangkan, namun di sisi lain merupakan hal yang paling mendebarkan. Persalinan normal adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan aterm (bukan *prematum* atau *postmatum*), mempunyai onset yang spontan (tidak diinduksi), selesai setelah 4 jam dan sebelum 24 jam sejak saat awitannya (bukan partus presipitatus atau partus lama) mempunyai janin (tunggal) dengan presentasi *verteks* (puncak kepala) dan oksiput pada bagian *anteriorpelvis*, terlaksana tanpa bantuan *artificial* (seperti *forsep*), tidak mencakup komplikasi (seperti perdarahan hebat dan mencakup kelahiran palsenta yang normal (Ina Kuswanti, dkk, 2014: 1).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan suatu indikator penilaian status kesehatan. AKI menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. Diseluruh dunia diperkirakan 216 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH), tercatat hanya 93 negara yang

dilaporkan mengalami kemajuan signifikan. Namun badan kesehatan dunia juga mengungkapkan total hanya 9 negara saja yang benar-benar mencapai target perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yaitu sedikitnya 75% yaitu Bhutan, Rwanda, Cabo, Verde, Kamboja, Iran, Laos, Mongolia, dan Timor Leste (WHO, 2015).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2014, yaitu Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup, Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup, dan Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia Tenggara yaitu 2114 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil *Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS)* di Indonesia AKI mengalami penurunan dari 359/100.000 KH tahun 2012 menjadi 305/100.000 KH pada tahun 2015. Penyebab kematian ibu yakni perdarahan (35,2%), hipertensi (27,1%), infeksi (7,3%), partus lama/macet (1,8%), dan abortus (4,7%) (Profil Kesehatan Indonesia, 2016).

Angka kematian ibu pada tahun 2015 berjumlah 4.999 kasus, sedangkan di tahun 2016 menjadi 4.912 kasus. Di tahun 2017 (semester 1) angkanya menurun lagi menjadi 1712 kasus. Selama tiga tahun, angka kematian ibu melahirkan menurun sekitar 3287 kasus (WHO, 2017).

Berdasarkan Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, AKI mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu 138/100.000 KH atau (93,20%) meningkat menjadi 149/100.000 KH atau (93,38%) tahun 2015. Penyebab terbesar kematian ibu masih tetap sama yaitu perdarahan (42%), eklampsi/ preeklampsi (13%),

abortus (11%), infeksi (10%), persalinan lama/persalinan macet (9%), penyebab lain (15%). Yang dimaksud penyebab lain adalah penyebab kematian ibu secara tidak langsung, seperti kondisi penyakit kanker, ginjal, jantung, tuberkolosis atau penyakit lain yang diderita ibu (Profil Kesehatan Sulsel, 2015).

Angka kematian ibu di tahun 2017 berkurang 41 kasus, dibanding tahun 2016. Penurunannya sebesar 26% dari 156 kasus menjadi 115 kasus dan 64 % kematian ibu 2016-2017 disebabkan oleh perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan (Profil Kesehatan Sulsel, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh, persalinan merupakan masalah yang sangat mempengaruhi tingkat kematian pada ibu yang masih sangat tinggi. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh komplikasi yang terjadi pada saat persalinan, komplikasi terjadi karena adanya beberapa faktor yang terkait seperti paritas tinggi. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan janin dengan riwayat paritas tinggi salah satunya yaitu kemungkinan terjadinya perdarahan, *preeklamsi*, berat badan lahir rendah (BBLR), ketuban pecah dini.

Paritas merupakan suatu istilah untuk menunjukkan jumlah kehamilan bagi seorang wanita yang melahirkan bayi yang dapat hidup pada setiap kehamilan. Paritas memiliki peran penting terhadap terjadinya perdarahan postpartum.

Seseorang dengan multiparitas mempunyai keadaan uterus yang cenderung bekerja tidak efisien dalam semua kala, dalam arti mengalami penurunan dalam kemampuan berkontraksi untuk melakukan penekanan pada pembuluh darah yang terbuka setelah terlepasnya plasenta, sehingga dengan hal tersebut dapat

menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum, hal ini disebabkan karena pada setiap kehamilan akan terjadi perubahan serabut otot menjadi jaringan ikat pada uterus.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah mencakup penerapan asuhan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf dengan pendekatan manajemen asuhan sesuai standar dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisis data pada Ny “P” Riwayat ParitasTinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf.
- d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syek Yusuf.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf.
- g. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ny “P” Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan di RSUD Syekh Yusuf.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang Pendidikan DIII Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
- b. Memperoleh pengalaman berharga dan menambah pengetahuan dalam penerapan asuhan kebidanan dengan riwayat paritas tinggi dengan perdarahan sehingga dapat mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari.

2. Bagi Institusi

Sebagai literatur dan referensi bagi mahasiswa kebidanan dalam rangka peningkatan pengetahuan.

3. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi supaya dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas pada persalinan dan memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada klien dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan dengan riwayat paritas tinggi dengan perdarahan.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

- a. Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan intranatal care khususnya pada Asuhan Persalinan Riwayat Paritas Tinggi dengan Perdarahan.
- b. Jurnal penelitian terbaru terkait dengan penanganan kegawatdaruratan.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Verney, dengan & langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/ masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

3. Studi Dokumentasi

Penulis mempelajari buku status pasien mengenai asuhan dan tindakan apa saja yang dilakukan pada ibu dengan perdarahan.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari BAB I-BAB V yang membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II penulis membahas mengenai tinjauan umum persalinan, tinjauan khusus riwayat paritas tinggi dengan perdarahan. Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV menjelaskan makna hasil penelitian. Pembahasan membahas ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN TOERI

A. *Tinjauan Umum Tentang Persalinan Normal*

1. Definisi Persalinan

- a. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir (Icesmi, 2013).
- b. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Ekapuspita, dkk, 2014).
- c. Persalinan adalah kontraksi uterus yang teratur yang menyebabkan dilatasi serviks dan mendorong janin melalui jalan lahir (Jenny, dkk, 2013).
- d. Persalinan merupakan suatu diagnosis klinis yang terdiri dari dua unsur yaitu kontraksi uterus yang frekuensi dan intensitasnya semakin meningkat, serta dilatasi dan pembukaan *serviks* secara *progresif* (Errol, dkk, 2007).
- e. Persalinan normal menurut World Health Organization (WHO) adalah persalinan yang dimulai secara spontan, beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama proses persalinan, bayi dilahirkan secara spontan dalam presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37-42 minggu lengkap. Setelah persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi baik (Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Panduan Peserta, hal 1.3)

- f. Persalinan normal menurut IBI adalah persalinan dengan presentasi janin belakang kepala yang berlangsung secara spontan dengan lama persalinan dalam batas normal, tanpa intervensi (penggunaan narkotik, epidural, oksitosin, percepatan persalinan, memecahkan ketuban dan episiotomy), beresiko rendah sejak persalinan hingga partus dengan masa gestasi 37-42 minggu.
- g. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi pada ibu maupun pada janin (Ai Yeyeh, dkk, 2014).

2. Jenis Persalinan

- a. Persalinan Spontan, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir.
- b. Persalinan buatan, yaitu persalinan yang dibantu dari luar misalnya *vacum ekstraksi, forceps, SC*.
- c. Persalinan anjuran, yaitu terjadi bila bayi sudah cukup besar untuk hidup di luar, tetapi tidak sedemikian besarnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam persalinan, misal dengan induksi persalinan (Ina Kuswanti, dkk, 2014).

3. Istilah Persalinan

- a. Partus immaturus yaitu partus di mana umur kehamilan kurang dari 28 minggu dan lebih dari 20 minggu dengan berat janin antara 500-1000 gram.

- b. Partus prematurus yaitu suatu partus dari hasil konsepsi yang dapat hidup tetapi belum aterm (cukup bulan). Berat janin antara 1000-2500 gram atau tua kehamilan antara 28 minggu sampai 36 minggu.
- c. Partus postmaturus (serotinus) yaitu partus yang terjadi 2 minggu atau lebih dari waktu partus yang diperkirakan.
- d. Para yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup (*viable*).
- e. Inpartu yaitu seorang wanita yang sedang dalam keadaan persalinan (Ina kuswanti, dkk, 2014) .

4. Tanda Mulainya Persalinan

- a. Terdapat beberapa teori terjadinya persalinan yaitu :

- 1) Teori Penurunan *Progesteron*

Kadar hormon progesteron akan mulai menurun pada kira-kira 1-2 minggu sebelum persalinan dimulai. Terjadinya kontraksi otot polos uterus pada persalinan akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat yang belum diketahui secara pasti penyebabnya, tetapi terdapat beberapa kemungkinan yaitu :

- a) Hipoksia pada miometrium yang sedang berkontraksi.
- b) Adanya penekanan gaglia saraf di serviks dan uterus bagian bawah otot-otot yang saling bertautan.
- c) Peregangan serviks pada saat dilatasi atau pendataran serviks, yaitu pemendekan saluran serviks dari panjang sekitar 2 cm menjadi hanya berupa muara melingkar dengan tepi hampir setipis kertas.

d) Peritoneum yang berada di atas fundus mengalami peregangan.

2) Teori keregangan

Ukuran uterus yang makin membesar dan mengalami penengangan akan mengakibatkan otot-otot uterus mengalami iskemia sehingga mungkin dapat menjadi faktor yang dapat mengganggu sirkulasi uteroplasenta yang pada akhirnya membuat plasenta mengalami degenerasi. Ketika uterus berkontraksi dan menimbulkan tekanan pada selaput ketuban, tekanan hidrostatis kantong amnion akan melebarkan saluran serviks.

3) Teori Oksitosin Interna

Hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin. Adanya perubahan keseimbangan antara estrogen dan progesteron dapat mengubah tingkat sensitivitas otot rahim dan akan mengakibatkan terjadinya kontraksi uterus yang disebut *Braxton Hicks*. Penurunan kadar *progesteron* karena usia kehamilan yang sudah tua akan mengakibatkan aktivitas *oksitosin* meningkat (Jenny, dkk, 2013)

4) Pengaruh janin/*fetal cortisol*

Hypofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan, oleh karena itu pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasa.

5) Teori prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua, disangka menjadi salah satu penyebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan

menunjukkan bahwa prostaglandin F₂ atau E₂ yang diberikan secara intravena, intra dan ekstra amnial menimbulkan kontraksi myometrium pada setiap umur kehamilan. Hal ini juga disokong dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah perifer pada ibu-ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan (Ina Kuswanti, dkk, 2014).

b. Tanda tanda persalinan

1. Kala pendahuluan persalinan (*preparatory stage of labor*) dapat di duga ketika ditemui:
 - a) *Lightening*(setting atau dropping) yang merupakan penurunan kepalamemasuki pintu atas panggul
 - b) Sering miksi atau sulit berkemih
 - c) Serviks mulai lembek dan mendatar
 - d) Adanya his permulaan atau his palsu (rasa nyeri bagian bawah, datang tidak teratur, durasi pendek, hilang saat istirahat)
2. Karakteristik/tanda persalinan sesungguhnya adalah:
 - a) Pengeluaran lendir bercampur darah
 - b) Serviks menipis dan membuka
 - c) Interval antara rasa nyeri yang secara perlahan semakin pendek
 - d) Waktudan kekuatan kontraksi semakin bertambah (Eniyati, dkk, 2012).

5. Faktor- faktor yang mempengaruhi Persalinan

Keberhasilan proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ibu (*power, passage, psikologis*), faktor janin, plasenta dan air ketuban (*passenger*), dan faktor penolong persalinan. Hal ini sangat penting, mengingat beberapa kasus kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh tidak terdeteksinya secara dini adanya salah satu dari faktor-faktor tersebut.

a. *Power* (Tenaga Kekuatan)

1. His (kontraksi Uterus)

Merupakan kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos Rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus dominal, terkordinasi dan relaksasi. Kontraksi ini bersifat involunter karena berada dibawah saraf intrinsic.

2. Tenaga mendedan

Setelah pembukaan lengkap dan ketuban pecah atau dipecahkan, serta sebagian presentasi sudah berada di dasar panggul, sifat kontraksinya berubah, yakni bersifat mendorong keluar dibantu dengan keinginan ibu untuk mendedan atau usaha *volunteer*. Keinginan mendedan ini disebabkan karena, kontraksi otot-otot dinding perut yang mengakibatkan peninggian tekanan intra *abdominal* dan tekanan ini menekan uterus pada semua sisi dan menambah kekuatan untuk mendorong keluar, tenaga ini serupa dengan tenaga mendedan sewaktu buang air besar (BAB) tapi jauh lebih kuat, saat kepala sampai kedasar panggul timbul *reflex* yang mengakibatkan ibu menutup *glotisnya*,

mengkontraksikan otot-otot perut dan menekan diafragmanya kebawah, tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil bila pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu ada his dan tanpa tenaga mengedan bayi tidak akan lahir (Ai Nursiah, dkk, 2014: 31-32).

b. *Passage* (Jalan Lahir)

Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal (Widia, 2015: 16).

c. *Passenger* (Janin, Plasenta, dan Air Ketuban)

1. Janin

Passenger atau janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin (Ai Nursiah, dkk, 2014: 39).

2. Plasenta

Plasenta juga harus melewati jalan lahir maka dia dianggap sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin. Namun plasenta jarang menghambat proses persalinan normal (Widia, 2015: 29).

3. Air ketuban

Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu membrane yang kuat dan ulet tetapi lentur. Amnion adalah jaringan yang menemukan hamper semua kekuatan regangan membrane janin, dengan demikian pembentukan komponen amnion yang mencegah ruptur atau robekan.

Penurunan ini terjadi atas 3 kekuatan yaitu salah satunya adalah tekanan dari cairan amnion dan juga saat terjadinya dilatasi serviks atau pelebaran muara dan saluran serviks yang terjadi di awal persalinan, dapat juga karena tekanan yang ditimbulkan oleh cairan amnion selama ketuban masih utuh (Widia, 2015: 29).

d. Faktor Psikis (Psikologi)

Perasaan positif berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-benar terjadi realitas, kewanitaan sejati yaitu munculnya rasa bangga bias melahirkan atau memproduksi anak.

1. Psikologis meliputi: kondisi psikologis ibu sendiri, emosi dan persiapan intelektual, pengalaman melahirkan bayi sebelumnya, kebiasaan adat, dan dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu.
2. Sikap negatif terhadap persalinan di pengaruhi oleh: Persalinan semacam ancaman terhadap keamanan, persalinan semacam ancaman pada self image, medikasi persalinan, dan nyeri persalinan dan kelahiran (Widia, 2015: 29-30).

e. *Physician* (Penolong)

Peran dari penolong persalinan dalam hal ini adalah bidan, yang mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin (Widia, 2015: 30). Tidak hanya aspek tindakan yang diberikan, tetapi aspek konseling dan memberikan informasi yang jelas dibutuhkan oleh ibu bersalin untuk mengurangi tingkat kecemasan ibu dan keluarga (Ai Nursiah, dkk, 2014: 48).

6. Tahapan Persalinan

Tahapan dari persalinan terdiri atas kala I (kala pembukaan), kala II (kala pengeluaran janin), kala III (pelepasan plasenta), dan kala IV (kala pengawasan/ observasi/ pemulihan)

a. Kala I (Pembukaan)

1. Pengertian Kala I

Kala I dimulai dari saat persalinan mulai (pembukaan nol) sampai pembukaan lengkap (10cm). Proses ini terbagi dalam 2 fase, yaitu :

- a) Fase Laten: berlangsung selama 8 jam, serviks membuka sampai 3 cm.
- b) Fase Aktif: berlangsung selama 7 jam, serviks membuka dari 4 cm sampai 10 cm, kontraksi lebih kuat dan sering, dibagi dalam 3 fase:
 - c) Fase alselarasi: dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.
 - d) Fase dilatasi maksimal: dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm.
 - e) Fase deselarasi: pembukaan menjadi lambat sekali, dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap.

Proses di atas terjadi pada primigravida ataupun multigravida, tetapi pada multigravida memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Pada primigravida, kala I berlangsung kurang lebih 12 jam, sedangkan pada multigravida kurang lebih 8 jam.

2. Masalah dan penyulit kala I

Indikasi-indikasi untuk melakukan tindakan dan atau rujukan segera selama kala I persalinan:

- a. Perdarahan pervaginam selain dari lendir bercampur darah (*show*)
- b. Ketuban pecah bercampur dengan sedikit meconium disertai tanda-tanda gawat janin.
- c. Ketuban telah pecah (lebih dari 24 jam) atau ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan kurang dari 37 minggu).
- d. Tanda-tanda atau gejala-gejala infeksi: temperature tinggi $>38^{\circ}\text{C}$ menggigil, nyeri *abdomen*, cairan ketuban yang berbau.
- e. Tekanan darah $>160/100$ dan atau terdapat protein urin.
- f. DJJ <100 atau >180 x/ menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit.
- g. Primipara dalam persalinan fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5.
- h. Presentasi ganda/ majemuk (adanya bagian janin, seperti lengan atau tangan, bersamaan dengan presentasi belakang kepala).
- i. Tali pusat menubung (jika tali pusat masih berdenyut)
- j. Tanda dan gejala syok: Nadi cepat, lemah (lebih dari 110 x/menit), takanan darahnya rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg), pucat, berkeringat atau kulit lembab, dingin, napas cepat (lebih dari 30 x/menit), cemas, bingung atau tidak sadar, dan produksi urin sedikit (kurang dari 30 ml/ jam).
- k. Tanda dan gejala persalinan dengan fase laten yang memanjang dimana pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam, dan kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10 menit).

1. Tanda dan gejala inpartu yaitu, kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit, berlangsung kurang dari 20 detik, tidak ada perubahan serviks dalam waktu satu sampai dua jam.

Tanda dan gejala *partus* lama yaitu, pembukaan *serviks* mengarah ke sebelah kanan garis waspada, pembukaan serviks kurang 1 cm per jam, dan kurang dari dua kontraksi dalam waktu 10 menit, masing-masing berlangsung kurang 40 detik (Ibnu Pranoto, dkk 2014: 77).

b. **Kala II (Kala Pengeluaran)**

1. Pengertian kala II

Kala II persalinan disebut juga kala pengeluaran yang merupakan peristiwa terpenting dalam proses persalinan karena objek yang dikeluarkan adalah objek utama yaitu bayi (Widia, 2015: 128).

2. Tanda Dan Gejala Kala II

Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II adalah :

- a) Adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir portio), initerjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga portio membuka secara perlahan.
- b) *His* yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mencedan.

- c) Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, disebabkan oleh adanya robekan serviks yang meregang.
- d) Pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam uterus dan diluar uterus sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi uterus akhirnya kantung ketuban pecah.
- e) Anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga menekan rectum dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka.
- f) *Vulva* terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk ke Pintu Bawah Panggul (PBP) dan ditambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastis.
- g) Bagian terdepan anak kelihatan pada *vulva*, karena labia membuka, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat di vulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130).

c. Kala III (Kala Uri)

1. Pengertian Kala III

Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah

kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Oleh karena tempat perlekatan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199).

2. Tanda – Tanda Lepasnya Plasenta

a. Berubahan Bentuk dan Tinggi Fundus

Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus berbentuk segi tiga, atau seperti buah pir atau alpukat dan fundus berada diatas pusat (sering kali mengarah ke sisi kanan).

b. Tali pusat memanjang

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva (tanda *ahfeld*)

c. Semburan darah yang mendadak dan singkat.

Darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (*retroplacenta pooling*) dalam ruang daintara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya, darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang lepas (Ai Nursiah, dkk 2014: 154-155).

3. Metode Pelepasan Plasenta

a. Metode *Scultze*

Metode yang lebih umum terjadi adalah plasenta terlepas dari satu titik dan merosot ke vagina melalui lubang dalam kanton amnion, permukaan fetal plasenta muncul pada vulva dengan selaput ketuban yang mengikuti dibelakang seperti payung terbalik saat terkelupas dari dinding uterus.

b. Metode *Matthews Duncan*

Plasenta turun melalui bagian samping dan masuk ke vulva dengan pembatas lateral terlebih dahulu seperti kancing yang memasuki lubang baju, sehingga sebagian plasenta tidak berada dalam kantong. Walaupun demikian sebagian selaput ketuban berpotensi tertinggal dengan metode ini karena selaput ketuban tidak terkelupas semua selengkap metode *Schultze*. Metode ini berkaitan dengan plasenta letak rendah didalam uterus. Proses pelepasan berlangsung lebih lam dan darah yang hilang sangat banyak karena hanya sedikit serat oblik dibagian bawah segmen (Nurul Jannah, 2017: 144-145).

c. Pengeluaran Plasenta

Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melalui serviks, vagina dan dikeluarkan ke introitus vagina (Ina Kuswanti, dkk 2014).

Dari tempat ini plasenta di dorong keluar oleh tenaga mengejan, 20% secara spontan dan selebihnya memerlukan pertolongan. Plasenta dikeluarkan dengan melakukan tindakan manual apabila : Perdarahan lebih dari 400 sampai 500 cc, terjadi restensio plasenta, bersamaan dengan tindakan yang di sertai narkosa, dari anamnese terdapat perdarahan hibitualis.

Lahirnya plasenta lebih baik dengan bantuan penolong dengan sedikit tekanan pada fundus uteri setelah plasenta lepas. Tetapi pengeluaran plasenta jangan dipaksakan sebelum terjadi pelepasan karena di khawatirkan menyebabkan inversio uteri. Traksi pada tali pusat tidak boleh digunakan untuk menarik plasenta keluar dari 55 uterus. Pada saat korpus di tekan, tali pusat tetap di regangkan. Maneuver ini diulangi sampai plasenta mencapai introitus, setelah introitus penekanan dilepaskan.

Tindakan hati-hati diperlukan untuk mencegah membran tidak terputus dan tertinggal jika membrane robek pegang robekan tersebut dengan klem dan tarik perlahan. Periksa plasenta secara hati-hati untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal (Ai Nursiah, 2014: 157-158).

d. Pemeriksaan Plasenta

Pemeriksaan plasenta meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Selaput ketuban utuh atau tidak

- 2) Plasenta (ukuran plasenta) yang terdiri atas : Bagian maternal, jumlah kotiledon, keutuhan pinggir kotiledon, bagian fetal, utuh atau tidak.
- 3) Tali pusat, meliputi : Jumlah arteri dan vena, adakah arteri atau vena yang terputus untuk mendeteksi plasenta suksenturia, dan insersi tali pusat apakah sentral, marginal, panjang tali pusat (Nurul Jannah, 2017: 149).

d. Kala IV (Kala Pemantauan)

Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi anita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam post partum). Dengan cara ini kejadiankejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri, dkk 2012: 95).

Setelah kelahiran plasenta, periksa kelengkapan dari plasenta dan selaput ketuban. Jika masih ada sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dalam uterus akan mengganggu kontraksi uterus sehingga menyebabkan perdarahan. Jika dalam waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka akan terjadi atonia uteri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan rangsangan taktil (masase) fundus uteri, dan bila perlu dilakukan kompresi bimanual (Widia, 2014: 226).

1. Pemeriksaan Serviks, Vagina dan Perineum

Untuk mengetahui apakah ada tidaknya robekan jalan lahir, periksa darah *perineum*, vagina dan *vulva*. Setelah bayi lahir, vagina akan mengalami peregangan, oleh kemungkinan edema dan lecet. Introitus vagina juga akan tampak terluka dan terbuka. Sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak dan mengalami lecet (Ai Nursiah, dkk 2014: 181).

2. Pemantauan dan Evaluasi Lanjut

Sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan. Kematian ini disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklampsia. Oleh karena itu pemantauan selama dua jam pertama persalinan postpartum sangat penting (Ai Nursiah, dkk 2014: 182).

Pemantauan dan evaluasi lanjut dapat berupa :

a. Tanda Vital

Pemantauan dan evaluasi lanjut tanda vital meliputi usaha untuk memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik, tidak terjadi perdarahan vagina atau alat genitalia lainnya, plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap, kandung kemih kosong, luka pada perineum terawat baik dan tidak terjadi hematoma. Selain itu ibu dan bayi berada dalam keadaan baik.

Tanda syok pada ibu harus diperhatikan seperti nadi cepat dan lemah (110 kali/menit), tekanan darah rendah sistolik kurang dari 90

mmHg, pucat, berkeringat, dingin kulit lembab, napas cepat, kesadaran menurun, dan protein urin sangat sedikit. Perhatikan pula tanda dehidrasi, gejala infeksi, gejala preeklamsi hingga eklamsi dan pemantauan suhu tubuh untuk mencurigai terjadinya infeksi.

b. Kontraksi Uterus

Kontraksi uterus yang baik pada uterus adalah bahwa uterus teraba keras dan tidak lembek dan tinggi fundus uteri berada 1-2 jari dibawah pusat setelah melahirkan. Pemeriksaan kontraksi dilakukan 15 menit pada satu jam pertama pascapartum, dan 30 menit satu jam kedua pasca post partum.

c. Lokea

Selama beberapa hari persalinan, lokea tampak merah kerana ditemukan eritrosit atau disebut juga lokea rubra. Setelah 3 sampai 4 hari, lokea menjadi pucat atau lokea serosa, dan hari ke 10, lokea tampak putih atau putih kekuning-kuningan atau lokea alba. Lokea yang berbau busuk menjadi indikasi dugaan endometrosis.

d. Kandung Kemih

Kandung kemih harus terus dipertahankan dalam keadaan kosong, kandung kemih yang penuh dapat menghalangi kontraksi maksimal sehingga perdarahan dapat terjadi. Pemantauan kontraksi selama satu jam pertama dilakukan empat kali dalam 15 menit dan pada jam kedua, dua kali dalam 30 detik.

e. Perineum

Setelah persalinan, keadaan perineum harus juga menjadi perhatian. Apabila terjadi luka jahit, perlu diperhatikan tanda-tanda infeksi, menjaga kebersihan area luka jahitan. Kebersihan luka yang tidak terjaga dapat memicu infeksi (Nurul Janna, 2017: 169-171).

3. Tanda Bahaya Kala IV

Selama kala IV, bidan harus memberitahu ibu dan keluarga tentang tanda bahaya : Demam, perdarahan aktif, pembekuan darah banyak, bau busuk dari vagina, pusing, lemas luar biasa, kesulitan dalam menyusui, nyeri panggul atau abdomen yang lebih dari kram uterus biasa (Widia, 2015: 239).

7. Mekanisme Persalinan Normal

Pada akhir kala 1, *segmen uterus*, *serviks*, dasar panggul, dan pintu keluar vulva membentuk satu jalan lahir yang continue. Gaya yang diperlukan untuk mengeluarkan janin berasal dari aktifitas otot uterus dan dari otot abdomen sekunder dan diafragma, yang memperkuat kontraksi sewaktu kepala janin melewati panggul, kepala bayi akan melakukan gerakan-gerakan utama meliputi :

a) Turunnya kepala

Turunnya kepala di bagian dalam :

1) Masuknya kepala dalam Pintu Atas Panggul (PAP)/Engagement

Masuknya kepala kedalam PAP pada primigravida terjadi di bulan akhir kehamilan sedangkan pada multigravida biasanya terjadi

pada awal persalinan. Kepala masuk ke PAP biasanya dengan sutura sagitalis melintang dan dengan flexi yang ringan. Masuknya kepala melintasi PAP dalam kuadran *syinclitismus*, yaitu arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP atau sutura sagitalis terdapat ditengah-tengah jalan lahir/ tepat diantara simpisis dan promotorium sehingga, dari parietal depan dan belakang sama tingginya.

Kepala yang masuk dengan keadaan *asyinclitismus* yaitu arah kepala janin miring dengan bidang PAP atau sutura sagitalis agak kedepan mendekati simpisis/agak kebelakang mendekati promotorium. Asyinclitismus posterior bila sutura sagitalis mendekati simpisis dari parietal biasa lebih rendah dari parietal depan, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip kebelakang dengan PAP. Asyinclitismus anterior yaitu bila sutura sagitalis mendekati promontorium sehingga parietal depan lebih rendah dari parietal belakang, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan PAP.

2) Majunya kepala

Pada primigravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk kerongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II. Pada multipara majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi secara bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan fleksi, putaran faksi dalam, dan extensi. Penyebab majunya kepala : Meningkatnya cairan intra uterin, tekanan langsung oleh

fundus pada bokong, kekuatan mengedan, melurusnya badan anak oleh pelurusan bentuk rahim.

3) *Flexi*

Dengan majunya kepala, biasanya *flexi* juga bertambah hingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Keuntungan dari bertambahnya *flexi* ialah bahwa ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir : diameter *sub occipito bregmatika* (9,5 cm) menggantikan *sub occipito frontalis* (11 cm).

Penyebab *flexi* yaitu dikarenakan anak didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir pintu atas panggul, *serviks*, dinding panggul atau dasar panggul, akibat sumbu kepala janin yang eksentrik atau tidak simetris dengan sumbu mendekati sub occiput, tahanan oleh jaringan dibawahnya terhadap kepala anak akan menurun/ menurut hukum *Koppel*.

4) Putaran paksi dalam

Yang dimaksud putaran paksi dalam ialah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar kedepan kebawah *symfisis*. Pada presentasi belakang kepala bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil dan bagian inilah yang memutar kedepan kebawah *symfisis*.

Putaran paksi dalam mutlak perlu untuk kelahiran kepala karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dan bentuk jalan lahir khususnya bentuk bidang tengah

dan pintu bawah panggul. Putaran paksi dalam tidak terjadi tersendiri, tetapi selalu bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai hodge III, kadang-kadang baru setelah kepala sampai didasar panggul.

Penyebab putaran paksi dalam yaitu dikarenakan, pada letak fleksi bagian belakang kepala merupakan bagian terendah dari kepala, bagian terendah dari kepala ini mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat hiatus genitalis, levator ani kiri dan kanandan ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter *anteroposterior*.

5) *Ekstensi*

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah *extensi* atau *defleksi* dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah kedepan dan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Pada kepala terjadi dua kekuatan, yang satu mendesaknya kebawah dan satunya disebabkan tahanan dasar panggul yang menolaknya keatas. Resultannya ialah kekuatan kearah depan atas.

Setelah *subociput* tertahan pada pinggir bawah *symfisis* maka yang dapat maju karena kekuatan tersebut diatas bagian yang berhadapan dengan *subociput*, maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi hidung, mulut dan

akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. *Subociput* yang menjadi pusat pemutaran disebut *hypomochilion*.

6) Putaran Paksi Luar

Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran *retribusi* (putaran balasan). Selanjutnya putaran dilanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan *tuber ischiadicum* sepihak (disisi kiri). Gerakan yang terakhir ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul.

7) Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar bahu depan sampai dibawah *symphysis* dan menjadi *hypomochilion* dan kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir (Ai Nurasih, dkk 2014: 144).

8. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan

a. Mengenali Gejala dan Tanda Kala II

1) Mendengar dan melihat tanda gejala kala II

- a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran (doran)
- b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina (teknus)
- c) Perineum tampak menonjol (perjol)

- d) Vulva dan singter ani membuka (vulka)
- b. Menyiapkan Pertolongan Persalinan
- 2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksanakan komplikasi ibu dan BBL.
 - 3) Pakai celemek palastik
 - 4) Mencuci tangan (sekitar 15 detik) dan keringkan dengan tissue/handuk.
 - 5) Pakai sarung tangan DDT pada tangan yang digunakan untuk PD.
 - 6) Masukkan oksitosin kedalam spuit (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT/steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada spuit).
- c. Memastikan Pembukaan Lengkap Dan Keadaan Janin Baik
- 7) Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas DTT.
 - 8) Lakukan pemeriksaan dalam (PD) untuk memastikan pembukaan lengkap (bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan *amniotomi*).
 - 9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
 - 10) Periksa DJJ setelah kontraksi/ saat relaksasi uterus bahwa DJJ dalam batas normal (120-160x/menit).
- d. Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Membantu Proses Bimbingan Meneran.

- 11) Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
- 12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu keposisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).
- 13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran
 - a) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif.
 - b) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai.
 - c) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi terlentang dalam waktu yang lama; Anjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi;
 - d) Anjurkan keluarga memberi dukungandan semangat untuk ibu; Berikan asupan peroral yang cukup;
 - e) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai; Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit meneran (primigravida) atau 60 menit meneran (multigravida).
- 14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

e. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi

- 15) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka *vulva* dengan diameter 5-6 cm.
- 16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.
- 17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.
- 18) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

f. Pertolongan Kelahiran Bayi

Lahirnya Kepala Bayi

- 19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka *vulva*, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering.
- 20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.
- 21) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Lahirnya Bahu

- 22) setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal.

Lahirnya Badan dan Tungkai

- 23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah *perineum* ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut kepinggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

g. Penanganan Bayi Baru Lahir

25) Lakukan penilaian selintas

a) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan ?

b) Apakah bayi bergerak aktif ?

Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau menggap-mengap lakukan langkah resusitasi (lanjut kelangkah resusitasi pada asfiksia BBL).

26) Keringkan tubuh bayi keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering. Biarkan bayi di atas perut ibu.

27) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus (hamil tunggal)

28) Beritahu ibu bahwa ia akan di suntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian *distal lateral* (lakukan aspirasi sebelum menuntikkan oksitosin).

30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong tali pusat kearah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat.

- a) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perubayi) dan lakukan pengguntikan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
- b) Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci dengan sisi lainnya.
- c) Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan.

32) Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu.

33) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi dikepala bayi.

h. Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala III

34) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari *vulva*.

35) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas *simpisis*, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat.

36) Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (*dorso cranial*) secara hati-hati (untuk mencegah *inversion uteri*).

- a) Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregang tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur diatas.

- b) Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.

Mengeluarkan Plasenta

37) Lakukan penegangan tali pusat dan dorongan dorso carnial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti proses jalan lahir (tetap melakukan tekanan *dorso cranial*)

- a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta.

b) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :

- (1) Beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM
- (2) Lakukan kateterisasi (aseptic) jika kandung kemih parah.
- (3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan
- (4) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya.
- (5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan segera lakukan plasenta manual.

38) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT/steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal.

Rangsangan Taktil (Masase) Uterus

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di undus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras).

i. Menilai Perdarahan.

40) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik dan tempat khusus.

41) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menimbulkan perdarahan aktif segera lakukan penjahitan.

j. Melakukan prosedur pasca persalinan.

42) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

43) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit 1 jam.

44) Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotic profilaksis dan vitamin K 1 mg IM di paha kiri antero lateral.

45) Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi Hepatitis B dipaha kanan antero lateral.

k. Evaluasi

- 46) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam
- 47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
- 48) Evaluasi dan estimulasi jumlah kehilangan darah.
- 49) Memeriksa nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.
- 50) Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik (40-60 x/menit) serta suhu tubuh normal (36,5-37,50 C)

l. Kebersihan dan Keamanan

- 51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan clorin 0,5 % untuk dekontaminasi.
- 52) Buang bahan – bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai.
- 53) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
- 54) Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan.
- 55) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5 %

56) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5 %, balik bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit.

57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.

m. Dokumentasi

58) Lengkapi partograf (halaman delapan dan belakang), periksa tanda-tanda vital dan asuhan kala IV (Widia, 2015: 152-161).

9. Partograf

Partograf adalah alat untuk mencatat informasi berdasarkan observasi, anamnesis, dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan, dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan.

Tujuan utama penggunaan partograf adalah mengamati dan mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam dan menentukan normal atau tidaknya persalinan serta mendeteksi dini persalinan lama sehingga bidan dapat membuat deteksi mengenai kemungkinan persalinan lama. Partograf dapat digunakan untuk semua ibu selama fase aktif kala I persalinan ; selama persalinan dan kelahiran di semua tempat seperti rumah, puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit dll.

a. Bagian Partograf

Partograf berisi ruang untuk mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan selama kala I persalinan yang mencakup kemajuan persalinan, keadaan janin, dan keadaan ibu.

1) Kemajuan Persalinan

Kemajuan persalinan yang dicatat dalam partograf meliputi pembukaan serviks, penurunan kepala janin, dan kontraksi uterus.

2) Pencatatan Selama Fase Laten Dan Fase Aktif Persalinan

a) Pencatatan Selama Fase Laten

Fase laten ditandai dengan pembukaan serviks 1-3 cm. Selama fase laten persalinan, semua asuhan, pengamatan dan pemeriksaan harus dicatat terpisah dari partograf, yaitu pada catatan atau Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil. Tanggal dan waktu harus dituliskan setiap kali membuat catatan selama fase laten persalinan dan semua asuhan serta intervensi harus dicatat. Waktu penilaian, kondisi ibu, dan kondisi janin pada fase laten meliputi : Denyut jantung janin, frekuensi dan lama kontraksi uterus, nadi setiap 1 jam, pembukaan serviks, penurunan kepala, tekanan darah, dan suhu setiap 2 sampai 4 jam dan apabila di temui tanda penyulit, penilaian kondisi ibu dan bayi harus lebih sering dilakukan.

b) Pencatatan dan Temuan Pada Partograf Selama Fase Aktif

Dilengkapi pada bagian awal (atas) partograf, saat memulai asuhan persalinan.

c) Kesehatan dan Kenyamanan Janin

Menilai dan mencatat setiap 30 menit (lebih sering, jika ada tanda gawat janin). Setiap kotak pada bagian tersebut menunjukkan waktu 30 menit, kisaran normal DJJ terpanjang pada partograf di

antara garis tebal angka 180 dan 100. Akan tetapi, penolong harus sudah waspada bila DJJ dibawah 120 atau diatas 160.

3) Warna dan Adanya Ketuban

Warna ketuban dinilai setiap melakukan pemeriksaan dalam, selain warna air ketuban, jika pecah. Catat temuan dalam kontak yang sesuai di bawah lajur DJJ dan gunakan lambang berikut.

U = Ketuban utuh (belum pecah)

J = Ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih

M = Ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium

D = Ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah

K = Ketuban sudah pecah dan tidak ada air ketuban (kering)

Mekonium dalam air ketuban tidak selalu menunjukkan gawat janin. Apabila terdapat mekonium, pantau DJJ secara seksama untuk mengenali tanda gawat janin (DJJ 180 kali per menit) selama proses persalinan.

4) Molase (Penyusupan Kepala Janin)

Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa jauh bayi dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu. Tulang kepala yang saling menyusup menunjukkan kemungkinan adanya disproporsi tulang panggul (*Cephalopelvic disproportionate*) CPD. Setiap kali melakukan pemeriksaan dalam, nilai penyusupan kepala janin dan catat temuan dibawah lajur air ketuban dengan menggunakan lambang berikut ini.

0 = Tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpsi

1 = Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan

2 = Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, namun masih dapat dipisahkan

3 = Tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan.

5) Kemajuan Persalinan

Kolom dan lajur pada partograf adalah pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0-10 pada tepi kolom paling kiri adalah besarnya dilatasi serviks. Skala angka 1- 5 juga menunjukkan seberapa jauh penurunan janin. Masing-masing kotak di bagian ini menyatakan waktu 30 menit.

6) Pembukaan Serviks

Penilaian dan pencatatan pembukaan serviks dilakukan setiap 4 jam (lebih sering, jika terdapat tanda penyulit). Tanda "X" harus ditulis di garis waktu yang sesuai dengan laju besarnya pembukaan serviks. Beri tanda untuk temuan pemeriksaan dalam yang dilakukan pertama kali selama fase aktif persalinan di garis waspada. Hubungkan tanda "X" dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh (tidak terputus).

7) Penurunan Bagian Terbawah Atau Presentasi Janin

Setiap melakukan pemeriksaan dalam (4 jam atau lebih), jika terdapat tanda penyulit, catat dan nilai penurunan bagian terbawah atau presentasi janin. Kemajuan pembukaan serviks umumnya diikuti dengan

penurunan bagian terbawah atau presentasi janin pada persalinan normal. Akan tetapi, penurunan bagian terbawah janin terkadang baru terjadi setelah pembukaan serviks 7 cm. Penurunan kepala bayi harus selalu diperiksa dengan memeriksa perut ibu sesaat sebelum pemeriksaan dalam dengan ukuran perlimaan diatas Pintu Atas Pangul (PAP). Beri tanda “o” pada garis waktu yang sesuai dengan garis tidak terputus 31 0-5 yang tertera di sisi yang samadengan pembukaan serviks. Hubungkan tanda “o” dari setiap pemeriksaan dengan garis tidak terputus.

8) Garis Waspada dan Garis Bertindak

Garis waspada dimulai pada pembukaan *serviks* 4 cm dan berakhir pada titik dengan pembukaan lengkap yang diharapkan terjadi jika laju pembukaan 1 cm per jam. Pencatatan selama fase aktif persalinan harus dimulai di garis waspadah. Apabila pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, penyulit yang ada harus di pertimbngkan (misalnya fase aktif memanjang, macet dll).

9) Jam dan Waktu

Waktu dimulai fase aktif persalinan, Bagian bawah partograf (pembukaan serviks dan penurunan kepala janin) tertera kotak-kotak yang diberi angka 1-16. Setiap kotak menanyakan waktu satu jam sejak dimulai fase aktif persalinan. Waktu actual saat pemeriksaan dilakukan. Setiap kotak menyatakan satu jam penuh dan berkaitan dengan dua kotak waktu tiga puluh menit pada lajur kotak diatasnya atau lajur kontraksi dibawahnya. Saat ibu masuk dalam fase aktif persalinan,

catatkan pembukaan serviks di garis waspada, lalu catatkan waktu aktual pemeriksaan tersebut dikotak yang sesuai.

10) Kontraksi Uterus

Terdapat lima lajur dengan tulisan “ kontraksi setiap 10 menit “ di sebelah luar kolom paling kiri dibawah lajur waktu partograf. Setiap kotak menyatakan satu kontraksi. Tiap 30 menit, raba dan catat jumlah kontraksi dalam 10 menit dan lama satuan detik >40 detik. 32

11) Obat dan Cairan yang Diberikan

- (a) Oksitosin Apabila tetesan (drips) oksitosin telah dimulai, dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan intra vena dan satuan tetesan per menit.
- (b) Obat lain dan cairan intra vena Catat semua pemberian obat tambahan dan atau cairan intravena dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya.

12) Kesehatan dan Kenyamanan Ibu

Bagian terakhir pada lembar depan partograf berkaitan dengan kesehatan ibu meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Nadi, tekanan darah, dan temperature tubuh. Catat dan nilai nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan (lebih sering jika dicurigai terdapat penyulit). Beri tanda titik (.) pada kolom pada waktu yang sesuai. Nilai tekanan darah ibu dan catat setiap 4 jam selama fase aktif persalinan (lebih sering jika dicurigai terdapat

penyulit). Beri tanda panah dalam kolom waktu yang sesuai pada partograf. Nilai dan catat juga temperature tubuh ibu setiap 2 jam dan catat temperature tubuh dalam kotak yang selesai.

b) *Volume urine, protein* dan *aseton*. Ukuran catat jumlah produksi urine ibu sedikitnya setiap 2 jam. Apabila memungkinkan, setiap kali ibu berkemih, lakukan pemeriksaan aseton atau protein dalam urine.

13) Asuhan, Pengamatan Dan Keputusan Klinik Lainnya.

Catatan semua asuhan lain, hasil pengamatan, dan keputusan klinik di sisi luar kolom partograf, atau buat catatan terpisah tentang kemajuan persalinan. Cantumkan juga tanggal dan waktu saat membuat catatan persalinan. Asuhan pengamatan, dan/ atau keputusan klinik mencakup jumlah cairan oral yang diberikan, seperti keluhan sakit kepala atau penglihatan kabur, konsultasi dengan penolong persalinan lainnya (dokter *obgin*, bidan, dokter umum), persiapan sebelum melakukan rujukan dan upaya rujukan.

14) Pencatatan Pada Lembar Belakang Partograf

a) Data Dasar

Data dasar terdiri atas tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan, catatan alasan merujuk, tempat rujukan, dan pendamping saat merujuk.

(1) Kala I

Data kala I terdiri atas pertanyaan tentang partograf saat melewati garis waspada, masalah yang dihadapi, penatalaksanaan dan hasil penatalaksanaan tersebut.

(2) Kala II

Data kala II terdiri atas episiotomy, pendamping persalinan, gawat janin, distosia bahu, masalah penyerta, penatalaksanaan, dan hasilnya. Jawaban diberi tanda “√” pada kotak di samping jawaban yang sesuai.

(3) Kala III

Data kala III terdiri atas lama kala III, pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, *masase uterus*, plasenta lahir lengkap, plasenta tidak lahir >30 menit, laserasi, atonia uteri, jumlah perdarahan, masalah penyerta, penatalaksanaan dan hasilnya.

(4) Kala IV

Data kala IV terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Pemantauan kala IV sangat penting untuk menilai resiko atau terjadi perdarahan pasca persalinan. Pemantauan kala IV dilakukan setiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah melahirkan dan setiap 30 menit pada 1 jam berikutnya.

(5) Bayi Baru Lahir

Data bayi baru lahir tersiri dari berat dan panjang badan, jenis kelamin, penilaian kondisi bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu (ASI), masalah penyerta, penatalaksanaan terpilih, dan hasilnya (Nurul, 2017: 60-74).

B. Tinjauan Khusus tentang Paritas

1. Pengertian Paritas

Paritas merupakan jumlah anak yang dilahirkan baik lahir hidup maupun meninggal. *Paritas* lebih dari empat kali mempunyai resiko yang lebih besar unruk terjadi perdarahan, demikian dengan ibu yang terlalu sering hamil menyebabkan resiko untuk sakit, kematian dan juga anaknya (Depkes RI, 2008).

Paritas adalah jumlah kehamilan yang dilahirkan atau jumlah anak yang dimiliki baik dari hasil perkawinan sekarang atau sebelumnya. Paritas merupakan jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup diluar Rahim dengan usia kehamilan 28 minggu (JHPIEGO, 2008)

2. Klasifikasi Jumlah Paritas

Berdasarkan jumlahnya maka paritas perempuan di bagi menjadi :

a. Nullipara

Nullipara adalah perempuan yang belum pernah melahirkan anak samasekali

b. *Primipara*

Primipara adalah perempuan yang telah melahirkan seorang anak yang cukup besar untuk hidup di dunia luar atau Primipara adalah perempuan yang telah melahirkan sebanyak satu kali.

c. *Multipara*

Multipara adalah perempuan yang telah melahirkan seorang anak lebih dari satu kali atau melahirkan dua hingga empat kali.

d. *Grandemultipara*

Grandemultipara adalah perempuan yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Paritas

a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin mudah dalam memperoleh menerima informasi, sehingga kemampuan ibu dalam berpikir lebih rasional, ibu yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih berpikir rasional bahwa jumlah anak yang ideal adalah 2 orang.

b. Pekerjaan

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-

masing. Beberapa segi positif menurut (Jacinta F. Rini, 2002) adalah mendukung ekonomi rumah tangga. Pekerjaan jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik untuk keluarga dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang diinginkan. Banyak anggapan bahwa status pekerjaan seseorang yang tinggi, maka boleh mempunyai anak banyak karena mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Keadaan ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang tinggi mendorong ibu untuk mempunyai anak lebih karena keluarga merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

d. Latar Belakang Budaya

Kultur universal adalah unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, semua kebudayaan di dunia, seperti pengetahuan bahasa dan khsanah dasar, cara pergaulan social, adat istiadat, penilaian umum. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap terhadap berbagai masalah.

Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pulahlah yang memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. Hanya kepercayaan individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat memudahkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.

Latar belakang budaya yang mempengaruhi paritas antara lain adanya anggapan bahwa semakin banyak jumlah anak, maka semakin banyak rejeki.

e. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan domain dari perilaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka perilaku akan lebih bersifat langgeng. Dengan kata lain ibu yang tahu dan paham tentang jumlah anak yang ideal, maka ibu akan berperilaku sesuai dengan apa yang ia ketahui (Friedman, 2005)

4. Faktor resiko pada paritas tinggi terhadap ibu

Paritas merupakan faktor resiko komplikasi *obstetric*, maka dari itu ibu hamil dengan paritas tinggi cenderung mengalami perdarahan *postpartum*, perdarahan tersebut biasanya terjadi karena atonia uteri atau retensio plasenta. Ibu yang pertama kali hamil sangat termotivasi dalam hal peningkatan kesehatan kehamilannya, sebaliknya ibu yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu orang mempunyai anggapan bahwa ia sudah berpengalaman.

a. Perdarahan

Perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan yang berlebihan setelah melahirkan janin dan dapat terjadi sebelum atau setelah plasenta lahir dengan jumlah kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan spontan dan 1000 ml pada persalinan seksio caesarea. Perdarahan pasca persalinan yaitu : perdarahan pasca persalinan primer

yaitu yang terjadi kala tiga atau dalam waktu 24 jam pertama setelah melahirkan biasanya disebabkan *atonia uteri*, robekan jalan lahir dan sisa sebagian plasenta. Sedangkan perdarahan pasca persalinan sekunder yaitu yang terjadi setelah 24 jam atau perdarahan yang berlebihan antara 24 jam, 6 minggu sampai dengan 12 minggu setelah melahirkan.

Salah satu faktor penyebab perdarahan pada ibu riwayat paritas tinggi yaitu atonia uteri. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi Rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir dan seorang ibu yang berulang kali melahirkan maka uterus juga akan berulang kali teregang. Hal ini akan menurunkan kemampuan berkontraksi dari uterus segera setelah plasenta lahir. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya perdarahan yang disebabkan oleh *atonia uteri*.

b. Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban pecah dini merupakan keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan, kehamilan yang terlalu sering mempengaruhi proses embrogenesis, selaput ketuban lebih tipis sehingga mudah pecah sebelum waktunya. Pernyataan teori dari menyatakan semakin banyak paritas semakin mudah terjadi infeksi amnion karena rusaknya struktur servik pada persalinan sebelumnya. KPD lebih sering terjadi pada multipara karena penurunan fungsi reproduksi, berkurangnya jaringan

ikat vaskularisasi dan *serviks* yang sudah membuka satu cm akibat persalinan yang lalu (Sumadi, dkk, 2013: 36-37)

5. Faktor resiko pada paritas tinggi terhadap bayi

a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 g. Bayi dengan berat badan lahir rendah umumnya mengalami proses *hi dup* jangka panjang yang kurang baik. Faktor resiko paritas tinggi akan mempengaruhi perkembangan janin yang dikandungnya hal tersebut disebabkan adanya gangguan plasenta dan sirkulasi darah ke janin, sehingga pertumbuhan janin terhambat, jika keadaan tersebut berlangsung lama akan mempengaruhi berat badan lahir bayi (Sagung, dkk, 2013).

b. Letak Sungsang

Letak sungsang adalah janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah kavum uteri. Ibu dengan paritas tinggi memiliki resiko terjadinya letak sungsang karena ibu yang telah melahirkan banyak anak sehingga rahimnya sudah sangat elastis dan membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya yang akhirnya menimbulkan kelainan letak sungsang.

Pada *grandemultipara* sering didapatkan perut gantung, akibat regangan uterus yang berulang-ulang karena kehamilan dan longgarnya ligamentum yang memfiksasi uterus, sehingga uterus menjadi jatuh ke depan, disebut perut gantung. Perut gantung dapat mengakibatkan

terjadinya gangguan his karena posisi uterus yang menggantung ke depan sehingga bagian bawah janin tidak dapat menekan dan berhubungan langsung serta rapat dengan segmen bawah rahim. Akhirnya janin dapat mengalami kelainan letak seperti letak sungsang (Supartini dan Siti Mudzolibah, 2012: 34)

C. Teori Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan (*Midwifery Management*) adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi (Mudillah dkk, 2012: 110).

2. Tahapan dalam Manajemen kebidanan

Langkah – langkah asuhan kebidanan menurut varney (1997), yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu, Observasi, wawancara dan pemeriksaan. Secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subyektif dan data obyektif.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara, anamnesa dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data meliputi : umur,

riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat haid, riwayat kehamilan, riwayat *obstetric* pada persalinan sebelumnya, riwayat nifas, jarak pada setiap persalinan, riwayat kondisi janin pada setiap persalinan, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi. Dan pemeriksaan fisik, yang meliputi keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

Pada persalinan kala I umumnya *klien* akan mengeluh tentang keadaannya dimana klien merasakan mules pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, dan klien juga mengatakan bahwa terdapat pengeluaran lender bercampur dengan darah, serta sifat nyeri yang dirasakan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat.

Pada persalinan kala II umumnya ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran, adanya tekanan pada anus dan tampak *perineum* menonjol, *vulva*, dan *spingter ani* membuka. Pada persalinan kala III akan tampak pengeluaran plasenta dimana tali pusat akan

bertambah panjang yang disertai dengan adanya semburan darah dan terjadi perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Serta pada persalinan kala IV atau kala observasi akan ditandai dengan kontraksi uterus yang baik, dan tanda-tanda vital dalam batas normal pada 2 jam post partum, dengan pemantauan 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua post partum.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnose yang spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah/diagnose kebidanan adalah pengolahan/analisa data yang menggabungkan dan menghubungkan satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta (Mufdillah, dkk 2012: 113).

Masalah pada ibu dengan riwayat *paritas* tinggi ditetapkan berdasarkan interpretasi data dasar yang dikumpulkan bahwa ibu dengan multigravida dapat mengalami komplikasi pada persalinan.

Pada kala I persalinan, lama pembukaan yang berlangsung pada primigravida yaitu berlangsung selama 12 jam sedangkan pada multigravida berlangsung selama 8 jam yang dimulai dari pembukaan 0 cm sampai pembukaan 10 cm. Pada fase laten persalinan yang dimulai sejak awal kontraksi menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks

secara bertahap yang berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm yang umumnya berlangsung selama 8 jam.

Kemudian pada fase aktif persalinan frekuensi dan kontraksi uterus meningkat secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi tiga kali atau lebih dalam 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih), dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan 10 cm dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam pada *multigravida* dan *primigravida*, atau lebih dari 1 sampai 2 cm *multigravida*. Pada kala I persalinan juga perlu adanya pemeriksaan tanda-tanda vital sekitar 2 atau 3 jam dan memperhatikan agar kandung kemih selalu kosong, serta pemantauan denyut jantung janin $\frac{1}{2}$ jam sampai 1 jam.

Pada kala II persalinan, dimulai dari pembukaan serviks sudah lengkap (10cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi, pada kala II his menjadi lebih kuat, lebih sering dan semakin lama. Proses ini berlangsung selama $\pm 1,5$ jam pada primigravida dan $\pm 0,5$ jam pada multigravida. Ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran bersama dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus dan tampak perineum menonjol, vulva dan sfingter ani membuka, serta meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur darah. tanda pasti kala II ditentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui *introitus* vagina.

Pada kala III persalinan, dimulai sejak lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit setelah

penyuntikan oksitosin. Pada manajemen aktif kala III ini bertujuan untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga mencegah terjadinya perdarahan dan mengurangi kehilangan darah. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu terjadinya perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat memanjang, dan terjadinya semburan darah secara mendadak dan singkat.

Pada kala IV persalinan, dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum, dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital pasien, kontraksi uterus, perdarahan dan kandung kemih pada 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua post partum.

c. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosa Atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnose yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi (Mufdillah, dkk 2012: 117).

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan

bersiap-siap bila diagnose/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman.

Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul, masalah yang kemungkinan akan muncul pada ibu dengan riwayat paritas tinggi diantaranya:

Pada kala I yaitu dapat terjadinya kala I lama, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali/menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lender dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan *mekonium* kental yang disertai dengan tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta tidak ditemukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang di sertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan.

Pada manajemen aktif Kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan *pervaginam* dikarenakan terjadinya laserasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang

tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Dan pada Kala IV persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melawati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi uterus yang tidak baik.

d. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan Yang Memerlukan Penanganan Segera.

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan (Mufdillah, dkk 2012: 117-178).

Dalam persalinan tindakan yang memerlukan penanganan segera diantaranya: Pada kala I persalinan yaitu terjadinya kala I lama yang mengakibatkan tanda gawat janin, ketuban pecah yang bercampur meconium kental, dan kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung dari 20 detik serta tidak ditemukan perubahan serviks dalam 1-2 jam atau pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan. Pada manajemen aktif Kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan pervaginam dikarenakan terjadinya laserasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Dan pada Kala IV persalinan masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melewati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi uterus yang tidak baik.

e. Langkah V : Merencanakan Asuhan Yang Komprehensif/Menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnose atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi (Mufdillah, dkk 2012).

Merencanakan pemantauan DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal(120-160 kali per menit), Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat. Perencanaan asuhan persalinan normal sesuai dengan APN. Jika didapatkan persalinan dengan ibu riwayat paritas tinggi untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan

dilakukan pemasangan infus RL, anjurkan ibu untuk tetap berzikir dan berdoa kepada Allah SWT.

Adapun penatalaksanaan pada klien dengan paritas tinggi yaitu dengan memberikan penjelasan kepada klien bahwa wanita yang telah melahirkan berkali-kali memiliki resiko terjadinya komplikasi disaat persalinannya atau pasca persalinannya. Karena pada setiap kehamilan dan persalinan akan terjadi perubahan serabut otot menjadi jaringan ikat pada uterus, hal tersebut dapat menurunkan kemampuan uterus untuk berkontraksi sehingga sulit melakukan penekanan pada pembuluh-pembuluh darah yang terbuka setelah lepasnya plasenta (Ibnu Pronoto, dkk, 2013: 171).

Perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan juga dapat berupa, pemantauan terus menerus kemajuan persalinan menggunakan partograf, pemantauan TTV ibu dan keadaan janin, memenuhi kebutuhan nutrisi dan dehidrasi ibu, menganjurkan ibu perubahan ambulasi dan posisi ibu, menganjurkan tindakan yang memberikan pada rasa nyaman, serta menganjurkan keluarga memberi dukungan. Tetap mengingat Allah setiap melakukan tindakan. Setelah persalinan perlu dilakukan kembali pemantauan pada kala IV dan memantau sesuai dengan yang ditetapkan partograf.

f. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien dan aman.

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar – benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedangkan sebagian belum efektif (Mufdillah, dkk 2012: 118-119)

3. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif yang meliputi diagnosis, antisipasi diagnosis atau masalah potensial serta konseling untuk tindak lanjut.

a. Subjektif

Merupakan data yang berisi informasi dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.

b. Objektif

Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan laboratorium, USG, dll. Apa yang dapat diobservasi

oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnose yang akan ditegakkan.

c. Assessment

Merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan.

d. Planning/Perencanaan

Merupakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan kesimpulan yang dibuat (Ai Nursiah, 2014: 234).

D. Ayat-ayat tentang Manajemen Asuhan Kebidanan

Persalinan merupakan masa yang sangat penting bagi seorang ibu. Dalam proses persalinan tersebut, seorang ibu bersalin akan mengeluarkan banyak energy dan mengalami perubahan-perubahan, baik secara fisiologis maupun psikologis secara alamiah.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْتَابَا حَمَلٌ خَفِيْفٌ فَصَلَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ قَالَتْ دَعُوا رَبَّهُمَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكْرِيَنَ

Terjemahnya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan bersyukur” (QS. Al-A’raf/7: 189)

Allah mengingatkan bahwa Dia telah menciptakan umat manusia ini secara keseluruhan dari diri Adam AS. Dan darinya pula Allah menciptakan isterinya, Hawa. Kemudian dari keduanya, bermunculah umat manusia, agar ia

merasa senang dan tenang dengannya. Dengan demikian, tidak ada ikatan antara dua ruh yang lebih agung daripada ikatan antara suami isteri. Oleh karena itu, Allah menyebutkan, mungkin saja seorang penyihir melalui sihirnya dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. *Fa lammaa taghasy-syaaHaa* (“Maka setelah dicampuri.”) Artinya, setelah digaulinya; hamalat hamlan khafiifan (“Isterinya itu mengandung kandungan yang ringan.”) Yaitu awal kehamilan, pada saat itu seorang wanita tidak merasakan sakit, karena kehamilan itu baru berupa nuthfah lalu menjadi segumpal darah dan kemudian berubah menjadi segumpal daging. Dan firman-Nya: *fa marrat biHii* (“Dan teruslah dia merasa ringan [beberapa waktu]”) Mujahid mengatakan: “Ia melanjutkan kehamilannya itu.” Dari Ibnu Abbas, “Lalu ia meneruskan masa kehamilannya itu, sehingga ia ragu, apakah ia hamil atau tidak. ” *Fa lammaa atsqalat* (“Kemudian tatkala dia merasa berat, ”) maksudnya, ia merasa berat dengan kehamilannya itu. As-Suddi mengatakan: “Maksudnya, anak itu semakin membesar dalam perutnya. ” *Da’awallaaHa rabba Humaa la-in aataitanaa shaalihan* (“Keduanya [suami isteri] bermohon kepada Allah, Rabb keduanya seraya berkata: ‘Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna.’”) yaitu seorang anak yang normal, sebagaimana dikatakan adh-Dhahhak. Dari Ibnu ‘Abbas, “Keduanya merasa takut jika kandungannya itu berupa binatang.” Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Bukhturi dan Abu Malik, “Kedua orang tuanya itu khawatir kandungannya itu tidak berupa manusia.”

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses persalinan, sebagaimana setiap wanita akan mengalami masa sulit saat persalinan. Diantaranya, Al-Qur’an surah Al-Ahqaf ayat 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِطْرَتُهُ إِلَّا نَوْنًا ثَلَاثُونَ نَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ طَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّيْتُكَ إِلِيكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُمِيسِينَ

Terjemahnya:

“(15) Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim” (Q.S. Al-Ahqaf ayat 15)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita terutama kepada ibu. Ibu yang sudah mengandung selama sembilan bulan tidaklah mudah, banyak rintangan yang ia lalui bahkan dapat mengancam hidupnya. Bukan hanya mengandung saja, akan tetapi ia juga melahirkan kita dari rahimnya itu sudah susah payah, apalagi jika ibu mengalami komplikasi-komplikasi selama persalinannya yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan bayinya.

Ayat di atas bagaikan menyatakan: Sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia—siapapun manusia itu—selama dia benar-benar manusia agar taat kepada Kami sepanjang hidup mereka dan Kami telah mewasiatkan, yakni memerintahkan dan berpesan, kepada manusia itu juga dengan wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua

orangtuanya siapa pun dan apa pun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orangtuanya. Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang ayah mencampakkan sperma ke dalam rahim *ibunya*, sang ibu *mengandungnya dengan susah payah*, sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, *dan melahirkannya dengan susah payah* setelah berlalu masa kehamilan. Masa kandungan dalam perut ibu dan penyapihannya paling sempurna adalah tiga puluh bulan sehingga apabila ia, yakni sang anak, telah dewasa, yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orangtuanya dan kebaktiannya berlanjut sampai ia mencapai usia empat puluh tahun, yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orangtuanya semakin bertambah (Sihab, 2011: 402)

Terdapat banyak cara yang tercantum dalam al-qur'an untuk memperlancar proses persalinan, misalnya dengan melakukan gerakan sholat dapat memperkuat otot-otot, berdzikir dengan memuji Allah dan berdoa untuk dilancarkan persalinannya, dan juga senantiasa sabar, bersyukur, dan ikhlas dalam segala yang telah Allah berikan.

E. Standar Operasional Pelayanan (SOP) RSUD. Syekh Yusuf Gowa

1. Pengertian

Memberikan pertolongan pada perdarahan per vaginam setelah melahirkan lebih dari 500 cc atau perdarahan disertai dengan gejala dan tanda-tanda syok.

2. Tujuan

- a. Penanganan pasien perdarahan pasca persalinan
- b. Menyegah terjadinya komplikasi

3. Prosedur

a. Persiapan pasien

Pasien diberitahu maksud dan tujuan serta tindakan yang akan dilakukan

b. Persiapan alat

Alat pelindung diri, obat emergency, obat-obatan anti perdarahan, cairan infuse.

4. Pelaksanaan prosedur

- a. Petugas mengucapkan salam
- b. Petugas melakukan identifikasi
- c. Lakukan cuci tangan
- d. Pakai handscoon
- e. Periksa vital sing pasien setelah pasien bersalin
- f. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban dilahirkan, lakukan masase uterus supaya berkontraksi

- g. Jika perdarahan terus terjadi dan uterus teraba berkontraksi baik, berikan 10 IU
- h. Jika uterus mengalami atonia atau perdarahan terus terjadi lakukan masase uterus untuk mengeluarkan gumpalan darah
- i. Lakukan kompresi bimanual internal maksimal 5 menit atau hingga perdarahan bisa dikendalikan dan uterus berkontraksi dengan baik
- j. Jika tidak ada hipertensi pada ibu, berikan metergin 0,2 mg IM
- k. Jika uterus tetap atoni dan atau perdarahan terus berlangsung
- l. Ulangi kompresi bimanual internal
- m. Jika uterus berkontraksi, lepaskan tangan anda perlahan-lahan dan pantau kala 4 persalinan dengan baik.
- n. Petugas kolaborasi dengan dokter Obgyn
- o. Lepas handscoen dan cuci tangan
- p. Petugas mencatat semua hasil tindakan dalam rekam medis.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY.P

RIWAYA PARITAS TINGGI DENGAN PERDARAHAN

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

No. Register : 511xxx
Tanggal Masuk : 24 Agustus 2018 : jam 11.35 wita
Tanggal Pengkajian : 24 Agustus 2018 : jam 11.35 wita
Tanggal Partus : 24 Agustus 2018 : jam 13.50 wita
Nama Pengkaji : Nur Afni Pratiwi

KALA I

A. LANGKAH IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Isteri/Suami

Nama : Ny P / Tn S
Umur : 39 th / 47 th
Nikah/Lamanya : 1 kali / ±19 Tahun
Suku : Jawa / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Pakatto

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Keluhan Utama

Perut tersasa mules disertai pengeluaran lendir dan darah

b. Riwayat Keluhan Utama

Ibu merasakan perut mules sejak tanggal 24 Agustus 2018 Pukul 06.00 wita dan terdapat pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 24 Agustus 2018 pukul 06.00. Sifat nyeri yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan tidak ada pengeluaran air dari jalan lahir. Usaha klien untuk mengatasi keluhannya adalah dengan mengelus-ngelus perut dan pinggangnya.

c. Riwayat Menstruasi

1. Menarche : 14 Tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 5-7 hari
4. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari
5. Disminorhe : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1 kali dengan Tn "S" pada tahun 1999, saat Ny "P" berusia 20 tahun dan Tn "S" berusia 28 tahun.

e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

Tabel 1.1 : Riwayat Kehamilan dan Persalinan

No	Tahun	Jenis partu	Jenis kelamin	BBL	PBL	Penolong	Tempat Partus	Keadaan
1.	2000	Spontan	Perempuan	2700 gr	48 cm	Dukun	Dukun	Hidup
2.	2007	Spontan	Perempuan	2700 gr	47 cm	Dukun	Dukun	Hidup
3.	2011	Spontan	Perempuan	2800 gr	48 cm	Bidan	Puskesmas	Hidup
4.	2012	Spontan	Perempuan	2700 gr	48 cm	Bidan	Puskesmas	Hidup
5.	2015	Spontan	Laki-laki	3300 gr	49 cm	Bidan	Rumah sakit	Hidup

Sumber : data primer

f. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas seperti cairan yang keluar berbau busuk, pengeluaran air Asi lancar, ibu menyusui anaknya hingga usia 6 bulan dan memberikan makanan pendamping Asi sejak usia diatas 6 bulan.

g. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 20 November 2017
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 27 Agustus 2018
- 3) Umur kehamilan 39 Minggu 4 Hari
- 4) Menurut ibu kehamilannya 9 bulan

- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang
- 6) Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali di puskesmas
 - Trimester I : 2 kali
 - Trimester II : 2 kali
 - Trimester III : 3 kali
- 7) Ibu mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 15 februari 2018
- 8) Keluhan-keluhan
 - Trimester I : tidak ada keluhan
 - Trimester II : tidak ada keluhan
 - Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah
- 9) Penyuluhan
 - Ibu tidak pernah mendapat penyuluhan apapun
- h. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu
 - 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
 - 2) tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hipertensi, dan penyakit menular seksual
 - 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.
 - 4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.

i. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma, dan penyakit keturunan lainnya.

j. Riwayat sosial ekonomi, psikososial dan spiritual

1) Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.

2) Hubungan ibu dan suami, keluarga maupun tetangga baik.

3) pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

k. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB

l. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Riwayat nutrisi

Kebiasaan

a) Pola makan : nasi, sayur, lauk

b) Frekuensi : 3 kali sehari

c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas perhari

Selama Inpartu :

a) Ibu makan, tetap hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan Eliminasi

Kebiasaan :

a) BAK : ± 7 kali sehari

b) BAB : satu kali sehari

Selama inpartu:

- a) BAK : ± 5 kali
- b) BAB : tidak pernah

3) Personal Hygiene

Kebiasaan

- a) Mandi, 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi, 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- c) Keramas, 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian 2 kali sehari

Selama inpartu

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan

- a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu

- a) Ibu belum pernah tidur

3. Pemeriksaan Fisik (Data Objektif)

- a. Keadaan umum baik
- b. Kesadaran composmentis

c. Tanda-tanda vital

TD : 90/60 mmHg

Nadi : 86x/i

Suhu : 36,2°C

Pernapasan : 18x/i

d. Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi

1) Kepala

Inspeksi : Rambut hitam, panjang, lurus, kulit kepala bersih, tidak ada ketombe

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : Tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan

3) Mata

Inspeksi : Simetris, konjungtiva merah muda, dan sklera putih

4) Leher

Inspeksi : Tidak pembesaran kelenjar tiroid dan limfe

Palpasi : Tidak ada pembesaran vena jugularis

5) Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menjol

Palpasi : Tidak ada benjolan, nyeri tekan dan terdapat kolostrum apabila puting susu dipencet

6) Abdomen

Inspeksi : Tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra dan striae alba

Palpasi : Pemeriksaan Leopold

Leopold I : 2 jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung Kanan

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

Lingkar perut : 79 cm

Tafsiran berat janin : $31 \times 79 = 2449$ gram

HIS : 3 x dalam 10 menit (30-35 detik)

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu dengan frekuensi 136x/i

7) Genetalia

Inspeksi : Keadaan genetalia bersih, tidak ada varises, tampak pengeluaran lendir dan darah

Palpasi : Tidak ada oedema, tidak ada pembesaran kelenjar Bartholini

Pemeriksaan dalam tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35 wita

a) Keadaan vulva dan vagina : Normal

b) Portio : Tipis

c) Pembukaan : 6 cm

d) Ketuban : Utuh

- e) Presentase : uuk kanan lintang
- f) Penurunan : Hodge III
- g) Molase : 0
- h) Penumbungan : -
- i) Kesan panggul : Normal
- j) Pelepasan : Lendir dan darah

8) Ekstremitas

Inspeksi : Kaki dan tangan lengkap, simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : Tidak oedema pada tungkai, tidak ada nyeri tekan.

Perkusi : Terdapat refleks patella kiri dan kanan

B. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH AKTUAL

GVIPVA0, gestasi 39 minggu 4 hari, presentase kepala, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, Keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif.

1. GVIPVA0

Data Dasar

DS : Ibu mengatakan ini kehamilannya yang keenam, dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu merasakan pergerakan janin pada usia kehamilan 5 bulan.

DO : Tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra, striae alba, terdapat denyut jantung janin, dan pada pemeriksaan Leopold didapatkan hasil :

Leopold I : 2 jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 136x/i

Analisis dan interpretasi data

Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot sudah kendur.

terdapat denyut jantung janin dan teraba bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu tanda pasti kehamilan (Prawirahardjo,2014:179).

2. Gestasi 39 Minggu 4 Hari

Data Dasar

DS : HPHT Tanggal 20 November 2017

DO : Pemeriksaan leopold I, tinggi fundus uteri 31 cm

Analisis dan interpretasi data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus negle mulai dari HPHT tanggal 20 November 2017 sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 39 minggu 4 hari (Prawirahardjo, 2014).

3. Intrauterin

Data Dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janinnya bergerak dengan kuat dan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

DO : Ibu tidak merasakan nyeri perut ketika di palpasi, TFU sesuai umur kehamilan, dan pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian janin yaitu:

Leopold I : 2 jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP

Analisis interpretasi data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah *kavum uteri* dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan *intrauterine*.

4. Situs Memanjang

Data Dasar

DS : Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat pada bagian sebelah kiri perut ibu

DO : Pada palpasi Leopold didapatkan hasil:

Leopold I : 2 jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP

DJJ :136x/i

Analisis interpretasi data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong di fundus dan kepala berada di bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran kanan bawah dan gerakan janin yang dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohardjo, 2014).

5. Tunggal

Data Dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat pada salah satu sisi perut ibu yaitu sisi bagian sebelah kiri

DO : Pada palpasi abdomen didapatkan hasil leopold dimana pada

Leopold I : 2 jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III : Kepala

Pada auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut bawah perut ibu dengan frekuensi, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisis dan Interpretasi data

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu.

6. Hidup

Data dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif, dan kuat pada usia kehamilan 5 bulan sampai sekarang, dan ibu merasakan pergerakan janinnya lebih dari 12 kali sehari.

DO : Pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat, teratur pada kuadran kanan perut ibu dengan frekuensi 136x/i

Analisis dan interpretasi data

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tandab bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan berkembang (Prawirohardjo, 2014).

7. Keadaan ibu baik

Data Dasar

DS : Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, asma, diabetes sebelum dan selama hamil.

DO : Tanda-tanda vital dalam batas normal, dengan konjungtiva merah muda dan sclera putih, serta tidak ada oedema pada wajah dan tungkai.

Analisis dan interpretasi data

Pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan dimana tidak adanya tanda-tanda preeklampsia atau eklamsi, anemia, dimana TTV dalam batas normal, konjungtiva merah muda, tidak ada oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

8. Keadaan janin baik

Data Dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dan biasanya bergerak lebih dari 12 kali dalam sehari.

DO : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 kali per menit.

Analisis dan interpretasi data dasar

Pergerakan janin yang kuat dan sering serta denyut jantung janin yang terdengar jelas, kuat, dan teratur dengan frekuensi 138 kali per menit

menandakan bahwa keadaan janin baik, dimana dinilai dari DJJ normal yaitu 120-160 kali per menit.

9. Inpartu kala I fase aktif

Data Dasar

DS : Ibu mengatakan nyeri perut tembus kebelakang disertai pelepasan lendir dan darah

DO : Tampak pengeluaran lendir dan darah, kontraksi uterus 3 × dalam 10 menit dengan durasi 30 – 35 detik.

Hasil pemeriksaan dalam (VT) tanggal 24 Agustus pukul 11.35 wita

- a. Portio : Tipis
- b. Pembukaan : 6 cm
- c. Presentase : ubun-ubun kecil kanan lintang
- d. Penurunan : Hodge III
- e. Pelepasan : Lendir, darah

Analisis dan Interpretasi Data

Nyeri perut yang terjadi karena terbukanya mulut Rahim disertai peregangan otot polos Rahim yang menimbulkan nyeri karena adanya penekanan pada ujung syaraf sewaktu uterus berkontraksi. Kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan teraba portio tipis serta pembukaan 6 cm merupakan inpartu kala I fase aktif yang dimulai dari pembukaan 4-10 cm.

C. LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadinya infeksi jalan lahir

DS : ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah

DO : tampak pelepasan lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data

Dikarenakan adanya pelepasan lendir dan darah, serta adanya pembukaan pada jalan lahir maka meningkatkan kemungkinan masuknya mikroorganisme patologis yang merupakan penyebab infeksi jalan lahir.

D. LANGKAH IV. IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

1. Mandiri : Tidak ada
2. Kolaborasi : Tidak ada
3. Murujuk : Tidak ada

E. LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Tujuan : - Kala I berlangsung normal
- Potensial infeksi jalan lahir tidak terjadi

Kriteria :

1. Kontraksi uterus adekuat
2. Fase aktif tidak lebih dari 12 jam
3. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital normal
5. Tidak ada tanda-tanda infeksi

Tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.40 wita

1. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janinnya baik.

Rasional :Agar ibu dan keluarga mengetahui keadaan ibu dan janinnya,ibudan keluarga merasa tenang dalam menghadapi proses persalinannya dan kecemasan ibu berkurang, serta keluarga dapatmemberikan dukungan psikologis yang dapat mengurangikecemasan ibu dan siap menghadapi persalinan.

2. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdzikir mengingat Allah swt., dan juga berdoa agar dilancarkan proses persalinannya

Rasional : Dengan berdzikir dan berdoa dapat memberikan semangat spiritual agar ibu lebih optimis menghadapi persalinan

3. Observasi tanda-tanda vital, dan VT setiap 2-4 jam (kecuali nadi tiap 30 menit).

Rasional : observasi tanda-tanda vital dan VT untuk memantau keadaanibudan kemajuan persalinan, serta mempermudah dalam melakukan tindakan.

4. Observasi DJJ setiap 30 menit

Rasional : saat ada kontraksi, DJJ bisa berubah sesaat, sehingga apabila adaperubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

5. Observasi His/Kontraksi setiap 30 menit

Rasional: karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks.

6. Ajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, ibu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi.

Rasional : teknik relaksasi memberikan ibu rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri dan memberikan suplai oksigen yang cukup ke janin

7. Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin selama persalinan.

Rasional: kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar, dan menghalangi penurunan kepala bayi.

8. Memberikan intake minuman kepada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran.

9. Mengajarkan pada ibu cara mengedan yaitu dengan cara mengambil nafas yang panjang kemudian berkuat seperti sedang BAB.

Rasional : apabila ibu dapat mengedan dengan baik dan benar maka dapat mempercepat proses kelahiran bayi, mengurangi terjadinya tindakan episiotomi dan mencegah trauma pada bayi.

10. Persiapan perlengkapan, bahan-bahan, obat-obatan yang diperlukan untuk menolong persalinan serta tempat penerangan dan lingkungan BBL

Rasional : agar penolong lebih mudah dalam mengambil dan menggunakan alat saat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menolong persalinan.

11. Mendokumentasikan hasil pemantauan Kala I ke partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

12. Observasi tanda dan gejala kala II

Rasional : Untuk mengetahui kapan ibu memasuki tahap kala II persalinan.

F. LANGKAH VI. PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.40 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga
2. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdzikir mengingat Allah swt., dan juga berdoa agar dilancarkan proses persalinannya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia

3. Mengobservasi DJJ, Nadi, dan His setiap 30 menit

Hasil :

Tabel 1.2: Observasi His dan DJJ

WAKTU	DJJ	Nadi	HIS
12.05 wita	138x/menit	82x/menit	4 x dalam 10 menit (30-35 detik)
12.35 wita	142x/menit	80x/menit	4 x dalam 10 menit (30-35 detik)
13.05 wita	140x/menit	80x/menit	5 x dalam 10 menit (40-45 detik)
13.35 wita	142x/menit	80x/menit	5 x dalam 10 menit (40-45 detik)

4. Mengobservasi tanda-tanda vital dan Pemeriksaan dalam tiap 4 jam atau jika ada indikasi

Hasil : pemeriksaan dalam (VT) pukul 13.35 wita

Vulva dan vagina : Normal

Portio : Melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah

Presentase : uuk kanan depan

Penurunan : Hodge IV

Moulage : 0

Penumbungan : -

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir dan darah air ketuban

5. Mengajarkan ibu tekhnik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, ibu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi.

Hasil : ibu mengerti

6. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin selama persalinan.

Hasil : ibu mengerti

7. Memberikan intake minuman dan makanan pada ibu

Hasil : ibu makan sedikit dan minum banyak

8. Mengajarkan pada ibu cara mengedan yang benar yaitu dengan cara menarik nafas dalam-dalam kemudian berkuat seperti sedang BAB

Hasil : Ibu mengerti

9. Persiapan perlengkapan, baham-bahan, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menolong persalinan serta tempat penerangan dan lingkungan BBL, meliputi :

- a) Alat Perlindungan Diri (APD) : penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*)
- b) Partus Set : *Handschone* steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, kasa steril, pengisap lendir (*deele*), dan penjepit tali pusat.
- c) On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.
- d) Hecting Set : 1 buah pinset anatomi, 1 buah pinset *cyrurghi*, *Naald Fooder*, Jarum, gunting benang, benang *chromic*, sarung tangan steril.
- e) Obat-obatan esensial : Lidocain 1 ampul, oksitosin 10 IU 1 ampul, cairan RL, infus set, spoit 3 cc, *abocath* 20.
- f) Peralatan lain : larutan klorin 0,5% air DTT, kantong plastik, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, waslap, dan tempat placenta.

- g) Menyiapkan tempat dan penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir, meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.

10. Mendokumentasikan hasil pemantauan kala I ke partograf

Hasil : terlaksana

11. Mengobservasi tanda dan gejala Kala II

- a) Ibu merasakan dorongan untuk meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi.
- b) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rectum dan vaginanya.
- c) Perineum menonjol
- d) Vulva dan vagina membuka, *sfincter ani* membuka.
- e) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur dengan darah.
- f) Tampak rambut bayi pada vulva

G. LANGKAH VII. EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.40 wita

1. Ibu mengerti bahwa keadaanya dan janinnya saat ini dalam keadaan baik, sehingga ibu lebih tenang dan kecemasan ibu berkurang.
2. Keadaan ibu dan janin baik yang ditandai dengan :
 - a) Tanda-tanda vital dalam batas normal :

TD	: 90/60 mmHg	S	: 36,6°C
N	: 80x/menit	P	: 20x/menit

- b) DJJ 136x/ menit, yang terdengar jelas, kuat dan teratur
 - c) Ibu sudah makan satu suap dan minum air putih
 - d) Ibu tidak ingin berkemih dan kandung kemih kosong
3. Peralatan, bahan-bahan, obat-obatan sudah disiapkan, tempat serta penerangan untuk bayi telah disiapkan.
 4. Tidak ada tanda-tanda infeksi
 5. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan ke Partograf.

SOAP KALA I

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah tembus belakang terasa sejak tanggal 24 Agustus 2018 pukul 06.00 pagi.
2. Sifat nyeri bersifat hilang timbul dan semakin lama semakin sering.
3. Pelepasan lendir dan darah sudah ada sejak tanggal 24 Agustus 2018 pukul 06.00 pagi.
4. Ini merupakan kehamilan keenam dan tidak pernah keguguran
5. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 20 November 2017
6. Ibu pertama kali haid pada usia 14 tahun, siklus haid 28-30 hari, dan lamanya 6-8 hari.
7. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada sebelah kiri
8. Ibu tidak memiliki riwayat asma, jantung, hipertensi, penyakit menular seksual
9. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB

10. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh suami

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. HTP 27 Agustus 2018
4. Gestasi 39 minggu 4 hari
5. TTV

TD : 90/60 mmHg S : 36,6°C
 N : 80x/menit P : 20x/menit

6. Melakukan pemeriksaan fisik

- a. Wajah

Ekspresi wajah meringis saat ada his , tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada nyeri tekan, massa, dan benjolan

- b. Payudara

Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

- c. Abdomen

Tidak ada luka bekas operasi, tampak *striae livide* dan *linea nigra*.

Leopold I : 2jrbpst, 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung Kanan

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

LP : 79 cm
 TBJ : TFU (31 cm) x TBJ (79 cm) : 2.449 gr
 His : 3 x dalam 10 menit (30 -35 detik)

DJJ terdengar jelas kuat, jelas, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136x/menit.

d. Genetalia

Tidak ada varices, tampak pengeluaran lendir dan darah.

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35

wita

Vulva dan vagina : normal

Portio : lunak, tipis

Pembukaan : 6 cm

Ketuban : utuh

Presentase : uuk kanan lintang

Penurunan : Hodge III

Moulage : 0

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah

e. Anus

Tidak ada hemorrhoid

f. Ekstrimitas

Tidak ad avarices, oedema, refleks patella positif

ASSESSMENT

GIPOAO, Gestasi 38 minggu 5 hari, situs memanjang, intrauterine, hidup, tunggal, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif.

PLANNING

Tanggal 24 Agustus 2018

1. Memberitahukan ibu dan keluarga hasil pemeriksaan

Hasil : terlaksana

2. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang dirasakan bahwa nyeri terjadi akibat kontraksi pada otot perut yang mengakibatkan jalan lahir tertekan oleh bagian terendah janin

Hasil : ibu mengerti

3. Mengajarkan ibu tehnik relaksasi pada saat ada his

Hasil : terlaksana

4. Menganjurkan ibu untuk tidur miring

Hasil : ibu tidur miring

5. Mongobservasi his dan DJJ tiap 30 menit serta melakukan VT tiap 4 jam

Hasil :

Tabel 1.2: Observasi His dan DJJ

WAKTU	DJJ	Nadi	HIS
12.05 wita	138x/menit	82x/menit	4 x dalam 10 menit (30-35 detik)
12.35 wita	142x/menit	80x/menit	4 x dalam 10 menit (30-35 detik)
13.05 wita	140x/menit	80x/menit	5 x dalam 10 menit (40-45 detik)
13.35 wita	142x/menit	80x/menit	5 x dalam 10 menit (40-45 detik)

Pemeriksaan dalam pukul 13.35 wita

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : pecah

Presentase : uuk kanan depan

Penurunan : Hodge IV

Moulage : 0

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

6. Memberikan intake minuman dan makanan pada ibu

Hasil : ibu makan sesuap nasi dan minum

7. Mengajarkan pada ibu cara mengedan yang benar yaitu dengan cara menarik nafas dalam-dalam kemudian berkuat seperti sedang BAB

Hasil : ibu mengerti

8. Persiapan perlengkapan, baham-bahan, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menolong persalinan serta tempat penerangan dan lingkungan BBL.

Hasil :

a) Alat Perlindungan Diri (APD) : penutup kepala, masker, kacamata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*)

- b) Partus Set : *Handschone* steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, kasa steril, pengisap lendir (*deele*), dan penjepit tali pusat.
 - c) On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.
 - d) Hecting Set : 1 buah pinset anatomi, 1 buah pinset *cyrurghi*, *Naald Foeder*, Jarum, gunting benang, benang *chromic*, sarung tangan steril.
 - e) Obat-obatan esensial : Lidocain 1 ampul, oksitosin 10 IU 1 ampul, cairan RL, infus set, spoit 3 cc, *abocath* 20.
 - f) Peralatan lain : larutan klorin 0,5% air DTT, kantong plastik, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, waslap, dan tempat placenta.
 - g) Menyiapkan tempat dan penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir, meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.
9. Mendokumentasikan hasil pemantauan kala I ke partograf.

Hasil : Terlaksana

KALA II

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS : - Ibu mengatakan sakit perut tembus ke belakang

- Ibu mengatakan ingin BAB

- Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran

- Ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah

DO :

1. Kontraksi uterus 5 x dalam 10 menit durasi 40-45 detik
2. DJJ 136x/menit
3. Tampak pelepasan lendir dan darah
4. Hasil Pemeriksaan dalam (VT) pukul 13.30 wita didapatkan pembukaan 10 cm.
5. Tanda-tanda vital

TD : 90/60 mmHg

S : 36,6°C

N : 80x/menit

P : 20x/menit

6. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) pukul 13.35 wita

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk depan

Penurunan : hodge III-IV

Moulage : 0

Penumbungan : tidak ada
 Kesan panggul : normal
 Pelepasan : lendir, darah, ketuban

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

Masalah Aktual : Nyeri akibat kontraksi

DS : - Ibu mengatakan adanya dorongan yang kuat untuk mendedan

- Ibu merasakan sakit perut tembus ke belakang
- Ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah
- Ibu merasa ingin BAB

DO : - Kontraksi uterus 5 x dalm 10 menit durasi 40-45 detik

- DJJ 138x/menit
- Perineum menonjol
- Ketuban Jernih
- Presentase kepala
- Hodge III-IV
- Moulage 0
- Tidak ada penumbungan
- Kesan panggul normal
- Pelepasan ketuban jernih

Analisa dan Interpretasi Data

- Keinginan mendedan ini merupakan refleks yang ditimbulkan oleh penekanan kepala bayi pada dinding vagina

- Hormon oksitosin sintetik merangsang otot polos uterus, meningkatkan eksitabilitas sel-sel otot yang meningkatkan kekuatan kontraksi.

LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

tidak ada data yang menunjang

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : Tidak ada indikasi

Masalah potensial : Tidak ada penunjang

Tujuan : Kala II berlangsung normal

Bayi lahir normal tanpa ada penyulit

Kriteria : Kala II berlangsung \pm 15 menit tanpa ada penyulit

Bayi lahir spontan, segera menangis, bernafas tanpa ada kesulitan dan bergerak dengan aktif.

Intervensi

1. Melakukan Informed consent

Rasional : Untuk memudahkan dalam melakukan tindakan dan sebagai perlindungan hukum

2. Melihat tanda gejala kala II

Rasional : Dapat mengetahui mulainya persalinan

3. Menyiapkan peralatan

Rasional : Agar pertolongan persalinan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

4. Memakai celemek

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang dan menghindari percikan darah

5. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Rasional : Mencegah Infeksi silang

6. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi

Rasional : Mencegah Infeksi silang

7. Membersihkan vulva dan perineum

Rasional : Membersihkan jalan lahir dan mencegah infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap (VT)

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencilupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5 % dan buka sarung tangan dengan tehnik terbalik

Rasional : Mencegah Infeksi silang

10. Memeriksa DJJ

Rasional : Mengetahui keadaan janin

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik

Rasional : Agar ibu mengetahui kemajuan persalinannya serta keadaan bayinya dan siap untuk mendedan

12. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu dalam posisi mendedan

Rasional : Dengan meminta bantuan keluarga dapat membantu proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mendedan

Rasional : Memperlancar berlangsungnya proses persalinan

14. Memasang handuk bersih di atas perut ibu

Rasional : Mengeringkan badan bayi dari lendir dan darah agar bayi tidak hipotermi

15. Memasang kain bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Rasional : Digunakan untuk menyokong bayi

16. Membuka partus set

Rasional : Untuk memudahkan mengambil sarung tangan dan peralatan lainnya

17. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan

Rasional : Mencegah Infeksi silang

18. Memimpin persalinan dan sokong perineum

Rasional : Membantu ibu dalam meneran dan mencegah agar perineum tidakruptur

19. Membersihkan mulut, hidung, dan wajah bayi dengan kasa steril

Rasional : Mengupayakan agar lendir dan air ketuban yang tehisap oleh bayi tidak tertelan

20. Memeriksa lilitan tali pusat

Rasional : Mencegah terjadinya Asfiksia pada bayi

21. Menunggu putaran paksi luar secara spontan

Rasional : Menghindari terjadinya distosia pada leher dan punggung bayi

22. Melahirkan bahu depan dan kemudian belakang

Rasional : Membantu kelahiran bahu bayi agar tidak terjadi ruptur perineum

23. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Rasional : Membantu kelahiran badan bayi agar tidak terjadi ruptur perineum

24. Menyusuri badan bayi, bahu hingga kaki

Rasional : Membantu mengangah badan bayi agar tidak terjatuh

25. Memperhatikan kondisi bayi

Rasional : Untuk menilai Apgar Score

26. Mengeringkan dan bungkus badan bayi

Rasional : Agar bayi tidak kedinginan oleh suhu lingkungan

27. Menjepit tali pusat dengan 2 klem

Rasional : Menghentikan darah yang berasal dari plasenta dan badan bayi

28. Menggunting tali pusat

Rasional : Memisahkan bayi dengan plasenta dan membantu proses pernafasan serta sirkulasi bayi

29. Membungkus bayi dengan kain kering

Rasional : Memberikan kenyamanan dan kehangatan pada bayi

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.30 wita

1. Melakukan Informed consent

Hasil : Ibu dan keluarga bersedia atas segala tindakan yang dilakukan.

2. Melihat tanda gejala kala II

Hasil : adanya dorongan untuk meneran dan adanya tekanan pada anus

3. Menyiapkan peralatan

a. Partus set steril

- 2 buah klem
- 1 buah gunting tali pusat
- ½ kocher
- 1 pasang handscone steril
- Penjepit tali pusat

b. Bak hecting steril

- Naald fooder
- Gunting
- Kom berisi betadine
- Jarum dan cat gut
- Ember larutan klorin
- Ember larutan DTT
- Kantong plastic
- Neerbeck
- Pakaian bersih ibu dan bayi

4. Memakai celemek

Hasil : terlaksana

5. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Hasil : terlaksana

6. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi

Hasil : terlaksana

7. Mengisi spuit dengan oxytocin 10 unit dengan satu tangan

Hasil : terlaksana

8. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon

Hasil : terlaksana

9. Hasil dari pemeriksaan dalam (VT) untuk memastikan pembukaan lengkap

Hasil : VT pukul 13.30

Vulva dan vagina : normal

Portio : melelap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : pecah. jernih

Presentase : uuk depan

Penurunan : hodge III-IV

Moulage : 0

Penumbungan : 0

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lender, darah, ketuban

10. Mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5 % dan buka sarung tangan dengan tehnik terbalik

Hasil : terlaksana

11. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu dalam posisi mendedan

Hasil : terlaksana

12. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mendedan

Hasil : pimpinan meneran telah dilakukan selama 30 menit, akan tetapi tidakada kemajuan penurunan kepala bayi. Jadi, dilakukan pemasanganinfus dan drips oxytosin untuk memperbaiki kontraksi ibu.

13. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) pukul 13.35 wita

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk depan

Penurunan : hodge III-IV

Moulage : 0

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, ketuban

14. Memasang handuk bersih di atas perut ibu

Hasil : terlaksana

15. Memasang handuk bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Hasi; : terlaksana

16. Membuka partus set

Hasil : alat dan bahan sudah lengkap

17. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan

Hasil : terlaksana

18. Memimpin persalinan dan sokong perineum

Hasil : terlaksana

19. Membersihkan mulut, hidung, dan wajah bayi dengan kasa steril

Hasil : terlaksana

20. Memeriksa lilitan tali pusat

Hasil : tidak ada lilitan tali pusat

21. Menunggu putaran paksi luar secara spontan

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar secara spontan

22. Melahirkan bahu depan dan kemudian belakang

Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Hasil : Bayi lahir spontan tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.50 wita

dengan jenis kelamin perempuan, BBL: 2900 gr, PBL: 49 cm, A/S :
8/10

24. Memerhatikan kondisi bayi dan melakukan penilaian sepintas pada bayi

Hasil : terdapat lubang anus dan tidak ada cacat bawaan

Tabel 1.3: Apgar Score

Yang dinilai	Nilai			Menit	
	0	1	2	1	5
Appearance	Pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh tubuh merah	1	2
Pulse	Tidak ada	<100 kali per menit	>100 kali per menit	2	2
Grimace	Tidak ada	Meringis lemah	Batuk, bersin	1	2
Activity	Tidak ada	Sedikit gerakan	Gerakan aktif	2	2
Respiration	Tidak ada	Lemah, tidak teratur	Menangis kuat	2	2
Hasil				8/10	

Sumber: data primer

25. Meringkikan dan bungkus badan bayi

Hasil : terlaksana

26. Menjepit tali pusat dengan 2 klem

Hasil : terlaksana

27. Menggantung tali pusat

Hasil : terlaksana

28. Membungkus bayi dengan kain kering

Hasil : terlaksana

LANGKAH VII. EVALUASI

Evaluasi tanggal 24 Agustus 2018 pukul wita 13.50 wita

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan tanggal 24 Agustus 2018, jam 13.50 wita, menangis kuat dan bernapas tanpa ada bantuan, bayi bergerak aktif, dan APGAR score 8/10
3. Perdarahan \pm 250
4. Terjadi rupture tingkat II

SOAP KALA II**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran
2. Ibu merasakan sakit perut tembus ke belakang
3. Ibu merasa ingin BAB
4. Ibu merasa lelah

DATA OBJEKTIF

1. Tanda-tanda vital
2. DJJ 138x/menit
3. Perineum menonjol
4. Anus membuka
5. Nampak pelepasan lendir dan darah
6. Pembukaan lengkap

ASSESSMENT

Perlangsungan kala II

PLANNING

1. Melakukan informed consent
2. Melihat tanda gejala kala II

Hasil : adanya dorongan mengedan, adanya tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan anus membuka.

3. Menyiapkan peralatan
 - a. Partus set steril
 - 1) 2 buah klem

- 2) 1 buah gunting tali pusat
 - 3) 1 buah $\frac{1}{2}$ kocher
 - 4) 1 pasang handschone steril
 - 5) Penjepit tali pusat
- b. Bak hecing sterilik
- 1) *Naald fooder*
 - 2) Gunting
 - 3) Kom berisi betadine
 - 4) Jarum dan *Cat gut*
- c. Ember yang berisi larutan klorin 0,5%
- d. Ember yang berisi larutan DTT
- e. Ember pakaian kotote
- f. Kantong plastic
- g. *Nierbeck*
- h. Pakaian bersih ibu dan bayi
4. Memakai celemek
- Hasil : celemek telah dipakai
5. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- Hasil : terlaksana
6. Memakai sarung tangan DTT
- Hasil : terlaksana
7. Mengisi spoit dengan oxytosin 10 unit dengan 1 tangan
- Hasil : terlaksana

8. Membersihkan vulva dan perineum

Hasil : terlaksana

9. Hasil pemeriksaan dalam (VT) pembukaan lengkap

Hasil : hasil pemeriksaan dalam tanggal 24 Agustus 2018 jam 13.30

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : pecah, jernih

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge III

Moulage : 0

Penumbungan : -

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, dan ketuban

10. Mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan buka sarung tangan secara terbalik

Hasil : terlaksana

11. Memeriksa DJJ setelah kontraksi uterus

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit

12. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Hasil : terlaksana

13. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu dalam posisi meneran

Hasil : terlaksana

14. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mendedan

Hasil : melakukan pimpinan meneran selama 30 menit akan tetapi tidak ada penurunan kepala janin.

15. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Hasil : ibu tetap dalam posisi setengah duduk karena

16. Memasang handuk bersih di atas perut ibu

Hasil : terlaksana

17. Memasang handuk bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Hasil : terlaksana

18. Membuka partus set dan memastikan kelengkapan alat

Hasil : alat lengkap

19. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan

Hasil : terlaksana

20. Memimpin persalinan dan menyokong perineum

Hasil : terlaksana

21. Membersihkan mulut, hidung, dan wajah bayi dengan kasa steril

Hasil : terlaksana

22. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi

Hasil : tidak ada lilitan tali pusat

23. Menunggu putaran paksi luar secara spontan

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

24. Melahirkan bahu depan dan kemudian belakang

Hasil : kedua bahu telah lahir

25. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Hasil : badan bayi telah lahir

26. Memerhatikan kondisi bayi

Hasil : bayi bergerak aktif dan bayi bernafas dengan baik

27. Mengeringkan dan bungkus badan bayi

Hasil : bayi telah dikeringkan

28. Menjepit tali pusat dengan 2 klem

Hasil : terlaksana

29. Menggantung tali pusat

Hasil : tali pusat telah digantung

30. Membungkus bayi dengan kain kering

Hasil : bayi telah dibungkus dengan kain kering

KALA III

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS : - Ibu Lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah

- DO : - Bayi lahir spontan tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.50 wita, JK perempuan, A/S : 8/10
- BBL/PBL : 2900 gram/49 cm
 - Kontraksi uterus tidak baik teraba lembek
 - TFU 1 jari di atas pusat
 - Darah yang keluar ± 250 cc
 - Placenta belum lahir

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

DS : - Ibu Lelah setelah melahirkan

- DO : - Bayi lahir spontan tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.50 wita, JK perempuan, A/S : 8/10
- BBL/PBL : 2900 gr/49 cm
 - Terdapat lubang anus dan tidak ada cacat bawaan
 - Kontraksi uterus tidak baik teraba lembek
 - TFU 2 jari di atas pusat
 - Darah yang keluar ± 250 cc
 - Plasenta belum lahir

Analisa dan Interpretasi Data

- Kala III dimulai sejak bayi lahir seluruhnya dan berakhir sampai plasenta lahir lengkap.

- Pada waktu kala III volume uterus sudah berkurang dapat teraba TFU setinggi pusat pada saat uterus berkontraksi memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba bulat dan keras.

LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadinya retensio placenta

DS : Ibu merasa lelah setelah melahirkan

DO : - TFU 1 jari di atas pusat

- Kontraksi uterus tidak baik dan lembek

Analisa dan Interpretasi Data

Plasenta yang sudah terlepas dari dinding uterus tapi belum keluar disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau karena salah penanganan kala III sehingga terjadi lingkungan konstiksi pada bagian bawah uterus yang menghalangi keluarnya plasenta.

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

Tidak ada indikasi

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Perlangsungan Kala III

Masalah aktual : -

Masalah potensial : -

Tujuan : Kala III berlangsung normal

Retensio placenta tidak terjadi

Kriteria : - Perdarahan tidak lebih dari 500 cc

- Lama kala III \leq 30 menit

- Placenta dan selaput lahir lengkap
- Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar

Intervensi

1. Periksa fundus uteri

Rasional: untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

2. Beritahu ibu akan disuntikkan oksitosin

Rasional: oksitosin dapat memicu kontraksi uterus dalam terlepasnya plasenta dari dinding Rahim.

3. Suntikkan oksitosin 0,5 unit intramuscular (IM) dan lakukan PTT

Rasional: Suntikan oksitosin dapat membantu kontraksi uterus dan Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT) akan memudahkan keluarnya placenta

4. Pindahkan klem tali pusat 5-10 cm dari vulva

Rasional : Memudahkan melakukan peregangan tali pusat

5. Letakkan satu tangan di atas symphysis (*dorso cranial*) regangkan tali pusat saat berkontraksi

Rasional: Dengan PTT akan memudahkan plasenta terlepas dan tangan diletakkan diatas simpisis untuk mencegah terjadinya Rest Plasenta.

6. Keluarkan plasenta dengan menarik ke bawah dan ke atas

Rasional: Untuk membantu pengeluaran plasenta

7. Jemput placenta dengan kedua tangan dan putar searah jarum jam

Rasional: Mencegah robekan plasenta dan selaput ketuban serta menghindariteringgalnya sisa-sisa plasenta.

8. Lakukan massase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Rasional: Merangsang kontraksi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan.

9. Periksa plasenta dan selaput ketuban, jumlah kotiledon, inersi tali pusat

Rasional: Dengan adanya sisa plasenta dan ketuban yang tertinggal akan menyebabkan perdarahan

40. Memasukkan placenta ke dalam kantong plastic

Rasional: Mencegah terjadinya infeksi silang.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Diagnosa : Perlangungan Kala III

Masalah Aktual : -

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya Retensio placenta

Implementasi tanggal 24 Agustus 2018 jam 13.50 wita

1. Memeriksa fundus uteri

Hasil : janin tunggal

2. Memberitahu ibu akan disuntik *oxytocin*

Hasil : ibu bersedia

3. Menyuntikkan *oxytocin* 0,5 unit IM dan lakukan PTT

Hasil : terlaksana

4. Memindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm di depan vulva

Hasil : terlaksana

5. Meletakkan satu tangan di atas simpisis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi

Hasil : terlaksana

6. Mengeluarkan plasenta dengan menarik ke atas dan ke bawah

Hasil : terlaksana

7. Menjemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam

Hasil : terlaksana

8. Melakukan massase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Hasil : Placenta lahir lengkap

9. Memeriksa plasenta dan selaput ketuban (lengkap)

Hasil : selaput ketuban utuh, jumlah kotiledon lengkap

10. Memasukkan plasenta kedalam kantung plastik.

Hasil : terlaksana

LANGKAH VII. EVALUASI

Diagnosa : Perlangungan Kala III berlangsung 25 menit

Masalah aktual : -

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya Retensio Placenta

Evaluasi tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.55 wita

1. Kala III berlangsung 25 menit
2. Plasenta lahir lengkap dengan selaput dan kotiledon
3. Kontraksi tidak baik (teraba lembek)

4. TFU 1 jari di atas pusat
5. Perdarahan \pm 550 cc

SOAP KALA III

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu merasa lemas
2. Nyeri pada bagian perut

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu lemas
2. Bayi lahir tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.50 wita dengan jenis kelamin perempuan, Apgar score 8/10
3. Kontraksi uterus tidak baik dan teraba lembek
4. Kandung kemih kosong
5. Plasenta belum lahir

ASSESSMENT

Perlangsungan Kala III antisipasi terjadinya retensio plasenta

PLANNING

31. Memeriksa fundus uteri
Hasil : janin tunggal
32. Memberitahu ibu akan disuntik *oxytocin*
Hasil : ibu bersedia
33. Menyuntikkan *oxytocin* 0,5 unit IM dan lakukan PTT
Hasil : terlaksana

34. Memindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm di depan vulva

Hasil : terlaksana

35. Meletakkan satu tangan di atas simpisis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi

Hasil : terlaksana

36. Mengeluarkan plasenta dengan menarik ke atas dan ke bawah

Hasil : terlaksana

37. Menjemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam

Hasil : plasenta telah lahir pukul 14.15 wita

38. Melakukan massase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Hasil : terlaksana

39. Memeriksa plasenta dan selaput ketuban (lengkap)

Hasil : selaput ketuban utuh, jumlah kotiledon lengkap, inersio sentralis.

40. Memasukkan plasenta kedalam kantong plastic

Hasil : terlaksana

KALA IV

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

Ibu

DO : - Kala III berlangsung 25 menit

- Plasenta, selaput, dan kotiledon lahir lengkap

- Kontraksi tidak baik teraba lunak

- TFU 1 jari di atas pusat
- Perdarahan ± 550 cc
- Laserasi pada perineum derajat II
- Hb : 7,5 g/dl

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perdarahan

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 25 menit

- Plasenta, selaput, dan kotiledon lahir lengkap
- Kontraksi tidak baik teraba lunak
- TFU 1 jari di atas pusat
- Perdarahan ± 550 cc
- Laserasi pada perineum derajat II
- Hb : 7,5 g/dl

Analisa dan Interpretasi data

Setelah plasenta lahir maka otot uterus berkontraksi sehingga dapat menutup pembuluh darah pada dinding uterus yang bermuara pada bekas implantasi plasenta.

LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya syok

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 25 menit

- Plasenta, selaput, dan kotiledon lahir lengkap

- Kontraksi uterus tidak baik teraba lunak
- TFU 1 jari di atas pusat
- Perdarahan ± 550 cc
- Laserasi pada perineum derajat II
- Hb : 7,5 g/dl

Analisa dan Interpretasi data

- Kelelahan yang dialami setelah persalinan menyebabkan kontraksi uterus tidak baik sehingga dapat menyebabkan perdarahan.
- Kala IV merupakan kala pengawasan yang memungkinkan terjadi perdarahan karena atonia uteri atau rest plasenta.

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

1. Masase uterus
2. Berikan drip dengan 1 ampul oksitosin 10 IU pada infus RL sesuai kebutuhan sampai kontraksi menjadi baik
3. Pasang infus 2 jalur
4. Melakukan transfusi darah
5. Injeksi metergin 2x1 ampul untuk menghentikan perdarahan
6. Injeksi amoxsan untuk antibiotic
7. Melakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Perdarahan

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya syok

- Tujuan : Kala IV berlangsung normal
- Kriteria : - Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
 - Perdarahan tidak terjadi
 - Tanda-tanda vital dalam batas normal

Intervensi tanggal 24 Agustus 2018 pukul 14.20 wita

1. Memeriksa adanya robekan jalan lahir
 Rasional : Mengantisipasi terjadinya perdarahan jalan lahir
2. Melakukan evaluasi kontraksi uterus
 Rasional : Mengantisipasi terjadinya perdarahan akibat kontraksi uterus yang kurang baik
3. Membiarkan bayi melakukan kontak *skin to skin* dengan ibunya selama satu jam
 Rasional : agar terjadi ikatan batin
4. Melakukan penimbangan setelah satu jam kontak dengan ibu
 Rasional : Untuk mengetahui pertumbuhan bayi
5. Memberikan suntikan imunisasi HB0 pada paha kanan bayi
 Rasional : agar bayi terhindar dari infeksi
6. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus
 Rasional : Agar tidak terjadi perdarahan
7. Mengajarkan ibu *massase* uterus
 Rasional : Agar kontraksi uterus baik
8. Mengevaluasi estimasi perdarahan
 Rasional : Agar tidak terjadi anemia

9. Memeriksa tanda-tanda vital dan kandung kemih

Rasional : sebagai indikator mengantisipasi terjadinya perdarahan postpartum

10. Memeriksa kembali kondisi bayi

Rasional : Agar bayi dalam kondisi baik-baik saja

11. Menempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang

12. Membuang sampah yang terkontaminasi

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang

13. Membersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, darah, dan lendir

Rasional : Agar ibu merasa nyaman

14. Memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan ASI

Rasional : Agar produksi ASI lancar

15. Mendekontaminasi tempat bersalin

Rasional : Agar tidak terjadi infeksi

16. Mencelupkan handschone dan merendamnya dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5%

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang.

17. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Rasional : Agar tidak terjadi infeksi.

18. Melengkapi partograf

Rasional : Sebagai lembar pertanggung jawaban hasil pertolongan persalinan

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Diagnosa	: Perdarahan
Masalah Aktual	: Kelelahan
Masalah Potensial	: Antisipasi terjadinya syok
Tujuan	: Kala IV berlangsung normal
Kriteria	: - Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar - Perdarahan tidak terjadi - Tanda-tanda vital dalam batas normal

Intervensi tanggal 24 Agustus 2018 pukul 14.20 wita

1. Periksa adanya robekan jalan lahir
Hasil : Ruptur tk. II dan telah dijahit
2. Melakukan evaluasi kontraksi uterus
Hasil : Kontraksi uterus tidak baik
3. Membiarkan bayi melakukan kontak skin to skin dengan ibunya selama satu jam.
Hasil : Terlaksana
4. Melakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan setelah satu jam kontak dengan ibu
Hasil : BB : 2900 gram, PB : 49 cm
5. Memberikan suntikan imunisasi HB0 pada paha kanan bayi
Hasil : Imunisasi HB0 telah diberikan.
6. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus
Hasil : kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar

7. Mengajarkan ibu massase uterus

Hasil : Terlaksana

8. Mengevaluasi estimasi perdarahan

Hasil : Perdarahan 550 cc

9. Melakukan Pemeriksaan tanda-tanda vital, kontraksi uterus, TFU, kandung kemih dan perdarah tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua

Tabel 1.4: Pemantauan Kala IV

Waktu	TD	N	S	Kontraksi	TFU	Kandung kemih	Perdarahan
14.20	90/60	86	37	Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 200 cc
14.35	90/60	84		Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 100 cc
14.50	90/70	82		Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 75 cc
15.05	100/70	82		Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 75 cc
15.35	100/70	80	37	Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 50 cc
16.05	100/70	80		Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 50 cc

Sumber: data primer

10. Memeriksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh normal

Hasil : Terlaksana

11. Menempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

12. Membuang sampah yang terkontaminasi

Hasil : Terlaksana

13. Membersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, darah, dan lendir

Hasil : Terlaksana

14. Memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan ASI

Hasil : Terlaksana

15. Mendekontaminasi tempat bersalin

Hasil : Terlaksana

16. Mencilupkan handschone dan merendamnya dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

17. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Hasil : Terlaksana

18. Melengkapi partograf

Hasil : Partograf telah lengkap

LANGKAH VII. EVALUASI

1. Kontraksi uteru tidak baik teraba lunak, TFU 1 jari di atas pusat
2. Jumlah perdarahan \pm 550 cc
3. Tidak terjadi syok
4. Keadaan umum lemas, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal

TD : 90/60 mmHg

S : 37°

N : 80x/menit

P : 20x/menit

5. Keadaan bayi baik, pernapasan: 46x/menit, suhu: 36,8°C

SOAP KALA IV**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu merasa lelah
2. Ibu merasa sedikit mules

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan ibu masih lemas
2. Kandung kemih kosong
3. Kontraksi uterus tidak baik teraba lunak
4. TFU 1 jari di atas pusat
5. Perdarahan ± 550 cc
6. Hb : 7,5 g/dl

ASSESSMENT

Perdarahan pasca persalinan primer

PLANNING

41. Periksa adanya robekan jalan lahir
Hasil : Ruptur tk. II dan telah dijahit
42. Melakukan evaluasi kontraksi uterus
Hasil : Kontraksi uterus baik
43. Membiarkan bayi melakukan kontak skin to skin dengan ibunya selama satu jam.
Hasil : Terlaksana

44. Melakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan setelah satu jam kontak dengan ibu

Hasil : BB : 2900 gram, PB : 49 cm

45. Memberikan suntikan imunisasi HB0 pada paha kanan bayi

Hasil : Imunisasi HB0 telah diberikan.

46. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus

Hasil : kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar

47. Mengajarkan ibu massase uterus

Hasil : Terlaksana

48. Mengevaluasi estimasi perdarahan

Hasil : Perdarahan 550 cc

49. Melakukan Pemeriksaan tanda-tanda vital, kontraksi uterus, TFU, kandung kemih dan perdarah tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua

Hasil :

Waktu	TD	N	S	Kontraksi	TFU	Kandung kemih	Perdarahan
14.20	90/60	86	37	Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 200 cc
14.35	90/60	84		Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 100 cc
14.50	90/70	82		Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 75 cc
15.05	100/70	82		Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 75 cc
15.35	100/70	80	37	Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 50 cc
16.05	100/70	80		Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 50 cc

Sumber: data primer

50. Memeriksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh normal

Hasil : Terlaksana

51. Menempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

52. Membuang sampah yang terkontaminasi

Hasil : Terlaksana

53. Membersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, darah, dan lendir

Hasil : Terlaksana

54. Memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan ASI

Hasil : Terlaksana

55. Mendekontaminasi tempat bersalin

Hasil : Terlaksana

56. Mencelupkan handschone dan merendamnya dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

57. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Hasil : Terlaksana

58. Melengkapi partograf

Hasil : Partograf telah lengkap

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang kesenjangan antara teori hasil studi pada pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan pada klien Ny. “P” dengan kasus kala II lama di ruang intranatal (INC) di RSUD. Syekh Yusuf Gowa tanggal 24 Agustus 2018. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus. Untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan yang direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis yang dimulai dari pengkajian data, interpretasi data, analisa data, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan kebidanan untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

KALA I

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap.

Kegiatan pengumpulan data dimulai dari saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi yang paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil

mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang disebut dengan sumber data primer.

Tindakan yang pertama kali dilakukan di RSUD. Syekh Yusuf Gowa yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk ke Rumah Sakit. Riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat pernikahan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat social ekonomi, psikosial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data secara objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan dalam.

Ny."P" usia 39 tahun, GVIPVA0 datang ke Rumah Sakit pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35 wita dengan keluhan perut mules disertai pengeluaran lendir dan darah sejak pukul 06.00 subuh sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan keenam dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 20 November 2017, ibu mengatakan usia kehamilannya ± 9 bulan, pergerakan janinnya kuat di sebelah kiri perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 kali di Puskesmas dan Bidan Praktek Klinik dan mendapatkan suntikan TT sebanyak 1 kali. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, dan diabetes, serta penyakit menular seksual.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi 80x/menit, suhu 36,6°C, pernapasan 20x/menit. Ekspresi wajah ibu tampak cemas, tidak tenang, dan meringis menahan sakit serta tidak ada oedema dan pembengkakan pada wajah. Selanjutnya konjungtiva tidak anemis dan tidak ikterik, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol. Pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I tftu 2 jari di bawah prosesus Xyphoideus, 31 cm, teraba bokong, Leopold II Punggung kanan, Leopold III kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 3/5. Keadaan janin baik ditandai dengan djf dalam batas normal (120-160x/menit), Lingkar perut 79 cm, taksiran berat janin 2449 gram, his 4 kali dalam 10 menit (30-35 detik).

Pada pemeriksaan dalam pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35 wita didapatkan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tipis, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentase uku kanan depan, penurunan hodge III, moulage 0, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, dan adanya pelepasan lendir dan darah. Pemeriksaan dalam kedua tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.35 wita didapatkan hasil tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio tipis, terdapat pembukaan 10 cm, ketuban pecah, presentase uku lintang, penurunan hodge IV, tidak ada moulage dan penumbungan, serta kesan panggul normal.

Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal 20 November 2017 sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 39 minggu 4 hari (Prawirohardjo, 2014). Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan bahwa ini kehamilan keenam, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan.

Pada pemeriksaan leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada saat uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita meter dari tepi atas simphisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentase janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran, dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dikatakan sebagai presentase bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentase kepala.

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas simphisis dan dapat diukur dengan lima jari tangan (perlimaan), bagian diatas symphisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP)

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu, adanya gerakan janin dan denyut jantung janin merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh.

Pada persalinan kala I yang ditandai dengan adanya his atau kontraksi dimana mempunyai ciri seperti, pinggang terasa sakit menjalar kedepan, his yang bersifat teratur, interval semakin pendek dan kekuatannya semakin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Selain his, persalinan juga ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis karena terjadi pembukaan dan pengeluaran darah dikarenakan kapiler pembuluh darah pecah.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan teori dengan gejala yang timbul pada kala I persalinan normal. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kasus.

Berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis inpartu kala I fase aktif dimana pasien datang pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35 wita, dengan keluhan perut mules pada jam 06.00 dini hari dan disertai adanya pelepasan lendir dan darah sejak puku 06.00 pagi. Rasa nyeri yang dirasakan ibu hilang timbul dan semakin lama

semakin sering. Kehamilan ibu adalah kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang sudah mencapai ± 9 bulan.

Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 2 jadi di bawah *processus xyphoideus* dan 31 cm sesuai usia kehamilan 39 minggu 4 hari, punggung kanan, presentase kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP), terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 136x/menit, janin intrauterine, tunggal, dan hidup. Pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan, keadaan portio tebal, terdapat pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil kanan lintang, penurunan Hodge III, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa persalinan normal merupakan proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentase belakang kepala. Tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Icesmi dan Margareth, 2013)

Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya *linea nigra* dan *striae alba* yang menandakan kehamilan keenam, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung. Sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu. Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014).

Berdasarkan uraian di atas maka diagnosis pada kala I tersebut adalah GVIPVA0, gestasi 38-40 minggu, presentase kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP), intrauterin, tunggal, hidup, dengan kala I fase aktif.

Dalam merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan membahayakan klien. Bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dapat dilakukan asuhan yang aman.

Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat mangantisipasi bila masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I yaitu

terjadinya, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 160 kali per menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lendir dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan mekonium kental yang disertai dengan tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta tidak ditemukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf, dan dapat mengakibatkan terjadinya infeksi jalan lahir dikarenakan jalan lahir terbuka, maka mikroorganisme patologi lebih mudah masuk.

Dan berdasarkan pengkajian hasil asuhan kebidanan pada Ny. "P" dapat dirumuskan masalah potensial terjadinya KPD. Resiko KPD banyak terjadi pada multipara dan grandemultipara disebabkan motilitas uterus berlebih, kelenturan leher Rahim yang berkurang sehingga dapat terjadi pembukaan dini pada serviks (Maharani Dkk, 2017:103).

Langkah IV Bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan berdasarkan kebutuhan klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses terus menerus ini menghasilkan hal baru yang segera dinilai, data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak untuk menyelamatkan klien dengan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny. "P" tidak ada tindakan segera yang perlu dilakukan karena dalam pemantauan persalinan tidak ada tindakan yang membutuhkan penanganan segera.

Langkah VDirencanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan secara efektif. Pada persalinan normal rencana tindakan yang diberikan adalah tirah baring, pemantauan dengan partograf, observasi his, nadi, djj dan memberikan motivasi pada klien.

Pada kasus Ny. "P" pada saat pembukaan 6 cm hal yang dilakukan adalah melakukan pemantauan TTV, mengobservasi his, nadi, serta DJJ. Menilai keadaan ketuban apakah ketuban masih utuh atau sudah pecah. Memberikan motivasi pada ibu agar ibu lebih bersemangat. Memberitahu ibu agar selalu berdoa dan berdzikir dalam hati agar dimudahkan dan diperlancar proses persalinannya.

Selanjutnya, melakukan observasi his, djj, dan nadi tiap 30 menit. Dan melakukan pemeriksaan dalam tiap 4 jam. Hasil pemeriksaan dalam (VT) kedua pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.35 wita didapatkan hasil tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, ketuban pecah, pembukaan 10 cm, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan hodge IV, tidak ada moulage dan penumbungan serta kesan panggul normal.

Rencana tindakan dalam pemantauan kala I adalah memantau kemajuan persalinan dengan mengobservasi his dan pembukaan serviks. Rencana yang akan diberikan yaitu sebelum dan sesudah melakukan tindakan, memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa pembukaan telah lengkap dan ketuban sudah pecah, menjelaskan penyebab nyeri, cara meminimalisir rasa nyeri, mendampingi ibu selama persalinan, menganjurkan ibu untuk miring ke salah satu sisi untuk teknik relaksasi, mengajarkan ibu teknik relaksasi dengan menarik napas lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut, mengajarkan ibu cara mendedan dengan benar, menganjurkan keluarga untuk memberikan *intake*, dan menyiapkan peralatan persalinan.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Ny. "P" pelaksanaan asuhan yang dilakukan berdasarkan rencana tindakan yang telah dibuat. Yaitu melaksanakan Rencana tindakan dalam pemantauan kala I adalah memantau kemajuan persalinan dengan mengobservasi his dan pembukaan serviks. Rencana yang akan diberikan yaitu sebelum dan sesudah melakukan tindakan, memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa pembukaan telah lengkap dan ketuban sudah pecah, menjelaskan penyebab nyeri, cara meminimalisir rasa nyeri, mendampingi ibu selama persalinan, menganjurkan ibu untuk miring ke salah satu sisi untuk teknik relaksasi, mengajarkan ibu teknik relaksasi dengan menarik napas lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut, mengajarkan ibu cara mendedan dengan benar, menganjurkan keluarga untuk memberikan *intake*, dan menyiapkan peralatan persalinan.

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny. "P" di RSUD. Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 24 Agustus 2018 yaitu pada kala I tidak lebih dari 7 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi terjadi pada ibu dan bayi.

Pendokumentasian SOAP

Pendokumentaasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "P" didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35 wita dengan keluhan perut mules disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 24 Agustus 2018 pukul 06.00 wita sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan keenam dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 20 November 2017, ibu mengatakan usia kehamilan sekarang \pm 9 bulan, pergerakan janin kuat terasa pada sebelah kiri perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 kali di Puskesmas dan BPS dan sudah mendapat suntikan suntik TT sebanyak 1 kali, tidak pernah dan tidak sedang mengalami penyakit menular dan menurun dalam keluarganya.

Data objektif yang meliputi data yang didapatkan dari pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "P" didapatkan bahwa keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold

I tfu 2 jrbpx, 31 cm, teraba bokong, Leopold II puka, Leopold III kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 3/5. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ dalam batas normal, lingkaran perut 79 cm, taksiran berat janin 2.449 gram, his 2 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 11.35 wita didapatkan keadaan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tipis, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentasi uku kanan lintang, penurunan Hodge III, moulage 0, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah.

Assessment yaitu hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "P" ditegakkan diagnosa GVI PV A0, gestasi 38-40 minggu situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu baik, kala I fase aktif.

Planning menggambarkan pendokumentasian untuk rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "P" telah dilakukan intervensi dan implementasi sesuai dengan teori dengan hasil evaluasi inpartu kala I fase aktif dan pembukaan 10 cm pada pukul 13.35 wita, ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB dengan his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, djj dalam batas normal, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

KALA II

Langkah I, Berdasarkan hasil asuhan kebidanan pada Ny “P” didapatkan data subjektif, ibu merasakan ada dorongan kuat untuk menera, sakitnya dating semakin kuat dan sering.dan berdasarkan data objektif didapatkan perineum menonjol, vulva dan vagina membuka. DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136x/menit, his 5 kali dalam 10 menit dan durasi 40-45 detik, pemeriksaan dalam pada jam 13.35 WITA didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban pecah, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, molase dan penumbungan tidak ada.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi di introitus vagina merupakan tanda pasti masuk kala II. Sedangkan teori mengatakan bahwa kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahir bayi, tanda dan gejala kala II yaitu kontraksi uterus semakin kuat dan sering timbul rasa ingin mendedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat di vulva karena ada his dan tenaga mendedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Aini Oktariana, 2012).

Berdasarkan pengkajian pada kala II pada kasus Ny”P” didapatkan data subjektif ibu merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran. Sedangkan data objektif didapatkan tampak perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks telah lengka.

Berdasarkan teori intervensi yang dilakukan terhadap pertolongan persalinan pada kala II yaitu: melihat tanda dan gejala kala II, siapkan alat dan

bahan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih di atas perut ibu dan di bawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala bayi sampai melakukan putaran paksi luar kemudian lanjutkan melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu bayi lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir bebaskan jalan napas, keringkan dan lakukan penilaian sepiantas, jepit dan potong tali pusat. Bayi IMD dengan posisi tengkurap agar bayi tidak kehilangan suhu tubuh.

Pada kala II ditandai dengan ibu merasakan nyeri perut yang semakin kuat dan sering, ada dorongan untuk meneran, dan merasa ingin BAB, perineum menonjol dan vulva membuka, didapatkan pembukaan sudah lengkap saat dilakukan pemeriksaan dalam pada jam 13.35 WITA. Asuhan yang diberikan adalah melakukan pimpinan meneran saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran pada jam 13.35 WITA, pimpinan meneran dilakukan selama ± 10 menit.

Diagnose kala II dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina atau kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.

Langkah III, Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Ny. "P" didapatkan potensial terjadinya kala II lama karena semakin sering ibu hamil dan melahirkan, semakin dekat jarak kehamilan dan kelahiran, elastisitas uterus semakin terganggu. Akibatnya uterus tidak berkontraksi secara sempurna.

Kelainan his yang dapat mempengaruhi lama persalinan kala II antara lain *Inersia uteri* dan *Incoordinate uterine action*. Inersia uteri merupakan keadaan dimana kontraksi uterus berlangsung lebih lemah, singkat dan jarang daripada biasanya. Incoordinate uterine action merupakan keadaan dimana sifat his berubah. Kontraksi uterus tidak berlangsung seperti biasanya karena tidak ada sinkronisasi kontraksi bagian-bagiannya. Tidak adak koordinasi antara kontraksi bagian atas, tengah dan bawah (Prawirohardjo, 2008).

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Shane dan Phips (cit Sari, 2010), yang menyatakan paritas yang beresiko untuk tidak adekuatnya kontraksi adalah ibu dengan paritas lebih dari empat. Hal ini dikarenakan pada ibu paritas lebih dari empat, mempunyai struktur anatomi otot dan serat uterus yang kurang elastic, sehingga merupakan faktor predisposisi kurang baiknya kontraksi uterus pada persalinan.

Dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses kala II berlangsung normal dengan bayi lahir lengkap pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.50 wita berjenis kelamin perempuan dengan apgar score 8/10.

Langkah IV, Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “P” tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan. Dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa perlangsungan kala II berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

Berdasarkan kasus Ny. “P” tidak ditemukan adanya data yang menunjang untuk melakukan tindakan emergency atau segera pada kala II.

Pada langkah ini berdasarkan teori intervensi yang dilakukan pada kala II, yaitu lihat tanda gejala kala II, siapkan alat pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih di atas perut ibu dan di bawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, lindungi perineum dan menahan kepala bayi sampai melakukan putaran paksi luar, kemudian lanjutkan melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir jeput dan potong tali pusat, lakukan penilaian spintas dan lakukan persalinan ballard score oleh bidan.

Pada kasus Ny. "P" intervensi sesuai dengan teori yang ada hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus ini pembukaan sudah lengkap pada jam 13.35 wita, ketuban pecah, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, molase tidak ada, pelepasan lendir dan darah serta air ketuban. Alat dan bahan persalinan telah disiapkan dan pimpinan persalinan dilakukan pada pukul 13.35 wita, bayi lahir pada tanggal 24 Agustus 2018 jam 13.50 wita, segera menangis, dan bergerak aktif. Bayi lahir perempuan dengan berat badan lahir 2900 gram, Panjang 49 cm.

Hasil evaluasi Pada kasus Ny. "P" kala II berlangsung normal yaitu bayi bayi lahir spontan pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.50 wita segera menangis bergerak aktif dengan berat badan lahir 2900 gram, Panjang badan 49 cm. dengan apgar score 8/10.

Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari subjektif yang mencakup data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “P” didapatkan bahwa ibu merasa adanya dorongan untuk meneran, sakit perut tembus belakang terasa semakin kuat dan perasaan ingin BAB.

Data objektif mencakup data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “P” didapatkan kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit durasi 40-55 detik, djj dalam batas normal, pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada pukul 13:35 wita didapatkan pembukaan lengkap, ketuban pecah jernih, presentasi uuk depan penurunan hodge IV, moulage tidak ada, pelepasan air ketuban dan darah. Assesment didapatkan dari hasil Analisa dan interpretasi data dari subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnose/masalah yang terjadi, antisipasi diagnose/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap kasus Ny”P” maka diagnose yang ditegakkan adalah perlangsungan kala II, diagnose potensial yang didapatkan yaitu antisipasi terjadinya partus lama, gawat janin, infeksi maternal.

Planning meliputi tindakan asuhan atau implementasi dan evaluasi dari tindakan yang diberikan berdasarkan assesment yang ditegakkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “P” tindakan asuhan yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi didapatkan kala II berlangsung normal

yaitu bayi lahir spontan segera menangis pada tanggal 24 Agustus 2018 jam 13.50 wita dengan jenis kelamin perempuan, BB : 2900 gram, PB : 49 cm dan A/S : 8/10, tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat.

KALA III

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan, perlangsungan kala III pada kasus Ny. "P" didapatkan data subjektif ibu merasa senang dan kelelahan dan juga merasakan nyeri pada perut bagian bawah. Data objektif yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu kala II berlangsung \pm 20 menit, bayi lahir spontan tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.35 wita, jenis kelamin perempuan, BBL: 2900 gr, PBL: 49 cm, Apgar score 8/10, kontraksi uterus tidak baik teraba lembek, tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat, perdarahan \pm 250 cc, dan plasenta belum lahir.

Pada teori menjelaskan bahwa kala III persalinan disebut juga dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Kala III dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda yaitu perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uteri, tali pusat bertambah panjang, dan terjadi semburan darah secara tiba-tiba (Rohani dkk, 2011)

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny. "P" di kala III tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan kasus nyata.

Berdasarkan teori kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban dan tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan bundar.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny. "P" berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan plasenta lahir dalam waktu 25 menit, uterus teraba lembek, tinggi fundus 1 jari di atas pusat. Maka ditegakkan diagnosis perlangsungan kala III.

Pada manajemen aktif kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam yang disebabkan karena laserasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Dan berdasarkan hasil asuhan kebidanan pada Ny."P" dapat dirumuskan masalah potensial yang dapat terjadi pada ibu paritas tinggi yaitu retensio plasenta karena ibu yang melahirkan 5 kali atau lebih, memiliki rahim yang teregang berlebihan sehingga menciptakan banyak ruangan kosong yang beresiko terjadi kelainan plasenta.

Pada kasus Ny. "P" tidak terdapat data yang menunjang terjadinya diagnosa potensial tersebut dimana didapatkan data objektif yaitu plasenta lahir ± 25 menit setelah bayi lahir pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 13.35 wita tanpa ada penyulit, kontraksi uterus tidak baik teraba lembek, tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat, perdarahan ± 250 cc.

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny. "P" tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera ataupun kolaborasi. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta dapat berlangsung normal.

Berdasarkan diagnosis pada kasus Ny. "P" tindakan yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali dan massase uterus.

Pemberian oksitosin dilakukan pada saat satu menit setelah bayi lahir, namun sebelum pemberian oksitosin hal yang harus diperhatikan adalah memastikan tidak ada bayi lain didalam uterus. Setelah itu suntikkan oxytosin di 1/3 lateral paha ibu secara IM yang bertujuan untuk membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah.

Pada kasus Ny. "P" pemberian oksitosin diberikan sebanyak dua kali yaitu pada menit pertama setelah melahirkan dan menit ke 16 , karena kontraksi teraba lembek dan plasenta tidak lahir dalam 15 menit pertama, sehingga dalam indikasi pemberian oksitosin diberikan sebanyak 2 kali ketika plasenta tidak lahir dalam 15 menit pertama.

Pada kasus Ny. "P" dilakukan implementasi berdasarkan dengan teori yaitu melakukan pemberian oksitosin secara IM, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta, dan selanjutnya setelah plasenta lahir dilakukan massase uterus. Proses pelepasan dan

pengeluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit, dimana plasenta lahir 25 menit setelah bayi lahir yaitu pukul 13.35 wita, plasenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput ketuban utuh, perdarahan \pm 250 cc.

Dari implementasi yang telah dilakukan pada kasus Ny. "P" didapatkan hasil pemeriksaan uterus teraba lembek, tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal dan tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus yang dilakukan.

Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif, pendokumentasian hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesis, pada kasus Ny "P" didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

Objektif yaitu dari hasil pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny "P" didapatkan hasil pemeriksaan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus tidak baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

Assesment merupakan hasil analisis data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi diagnosa/masalah, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perluanya tindakan segera, pada kasus Ny "P" didapatkan assesment perlangsungan kala III.

Planning merupakan hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Pada kasus Ny "P" telah dilakukan tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, plasenta lahir lengkap pada pukul 14.15 wita, kontraksi tidak baik dan teraba lembek, TFU 1 jari di atas pusat, dengan perdarahan kurang lebih 250 cc.

KALA IV

1. Langkah I

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Sedangkan data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada kasus Ny. "P" didapatkan data subjektif ibu mengatakan ini adalah persalinan yang keenam, lelah setelah persalinan dan merasa pusing dan merasa banyak darah yang keluar. Pada data objektif di dapatkan TD: 90/60 mmHg, kontraksi uterus tidak baik, teraba lembek, TFU 1 jari di atas pusat, perdarahan ± 550 ml, laserasi pada perineum derajat II. Berdasarkan data penunjang pemeriksaan lab Hb 7,5 g/dl.

Berdasarkan hasil penelitian paritas yang lebih dari 4 memiliki resiko lebih besar mengalami perdarahan dari pada paritas 2-3, karena semakin ibu sering melahirkan maka elastisitas uterus semakin terganggu, akibatnya uterus tidak berkontraksi dengan baik dan dapat mengakibatkan perdarahan (Nurul Ummah, dkk, 2018)

Perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan yang berlebihan setelah melahirkan janin dan dapat terjadi sebelum atau setelah plasenta lahir dengan jumlah kehilangan darah lebih dari 500ml setelah persalinan

spontan dan 1000 ml pada persalinan seksio caesarea. Perdarahan terbagi dua yaitu primer dan sekunder. Perdarahan primer yaitu yang terjadi pada kala tiga atau dalam waktu 24 jam pertama setelah melahirkan, sedangkan perdarahan sekunder yaitu yang terjadi setelah 24 jam atau perdarahan yang berlebihan antara 24 jam, 6 minggu sampai dengan 12 minggu setelah melahirkan.

Seperti teori di atas dikatakan perdarahan pasca persalinan jika pengeluaran darah sudah melebihi 500 ml. Berdasarkan data objektif perdarahan tersebut disebabkan oleh atonia uteri, karena uterus yang tidak berkontraksi dengan baik dan terasa lembek.

2. Langkah II

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan. Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny. "P" menunjukan diagnosa terjadinya perdarahan karena atonia uteri.

Salah satu faktor penyebab perdarahan pada ibu riwayat paritas tinggi yaitu atonia uteri. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir dan seorang ibu yang berulang kali melahirkan maka uterus juga akan berulang kali teregang. Hal tersebut akan menurunkan

kemampuan berkontraksi dari uterus segera setelah plasenta lahir. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri.

Menurut teori kala IV merupakan kala pengawasan yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Pemantauan pada kala IV ini sangat penting terutama untuk menilai apakah terdapat resiko atau terjadi perdarahan pasca persalinan. Perdarahan biasanya terjadi karena lemahnya kontraksi Rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan setelah bayi dan plasenta lahir, selain itu adanya ruptur di jalan lahir, dan tidak normalnya proses pembekuan darah juga salah satu penyebab perdarahan postpartum.

3. Langkah III

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Pada kasus perdarahan atonia uteri masalah yang dapat timbul bisa saja terjadi syok hipovolemik.

Berdasarkan studi kasus pada Ny”P” dengan kasus perdarahan primer karena atonia uteri apabila tidak ditangani dengan benar maka akan muncul diagnose potensial dalam kasus ini yaitu syok . Hal tersebut terjadi karena syok merupakan yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Syok ini dapat terjadi akibat perdarahan hebat

(hemoragik), trauma yang menyebabkan perpindahan cairan (ekstravasasi) ke ruang tubuh non fungsional (Hardisman, 2013).

Pada kasus Ny. "P" didapatkan ibu tampak merasa lelah. Kelelahan ini terjadi karena pengeluaran darah yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan studi kasus.

4. Langkah IV

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus Ny" P" hal yang memerlukan tindakan segera yaitu terjadinya perdarahan.

Pada kasus ini untuk mengantisipasi terjadinya syok dilakukan masase uterus, pemansangan infus 2 jalur, pemantauan tanda-tanda vital ibu dan mengobservasi perdarahan, kontraksi uterus dan transfusi. Pada langkah ini menunjukkan tidak ada kesenjangan teori dengan studi kasus.

5. Langkah V

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam suatu rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini di penolong dengan yang ditolong, karena meski penolong yang hanya menyetujuinya maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari yang ditolong.

Rencana tindakan yang dilakukan pada perdarahan pasca persalinan yaitu, melakukan pemberian antibiotik, uterotonic, oksitosin atau matergin, lakukan pemenuhan cairan, berikan transfusi darah jika diperlukan. Merencanakan pendekatan kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak dzikir, istigfar, mendengarkan lantunan ayat suci al-qur'an agar ibu tenang dan tidak terlalu memikirkan kondisinya saat ini.

Pada kasus Ny^{"P"} dengan perdarahan pasca persalinan rencana tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan masese uterus, pemberian drip dengan 1 ampul oksitosin 10 IU pada infus RL sesuai kebutuhan sampai kontraksi menjadi baik, pasang infus 2 jalur, injeksi matergin 2x1 ampul untuk menghentikan perdarahan, injeksi amoxsan 2x1 gram untuk antibiotik, melakukan kompresi bimanual interna selama 5 menit, pemantauan perdarahan dan tanda-tanda vital ibu.

6. Langkah VI

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnose yang telah diidentifikasi atau diantisipasi.

Setelah intervensi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny. "P" implementasi yang dilakukan adalah memasang infus 2

jalur yaitu ekstremitas kanan infus ringer laktat kemasan 500 ml dengan oksitosin 1 ampul 10 UI, ekstremitas kiri infus dektrosa 5% berisi glukosa 50gr/l kemasan 500 ml, sesuai kebutuhan pasien, melakukan transfusi darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan setelah melakukan transfusi Hb meningkat menjadi 10,0 gr/dl. Memberitahukan ibu bahwa saat ini ibu sedang mengalami perdarahan primer. Perdarahan primer adalah perdarahan lebih dari 500 ml yang terjadi selama 24 jam setelah melahirkan yang disebabkan tidak berkontraksinya uterus dengan baik. Memberikan support pada ibu dan keluarga agar tidak merasa cemas dan tenang karena keadaan dapat teratasi. Dan terus memantau keadaan umum ibu. Memantau tanda-tanda vital ibu setiap 15 menit pada jam 14.20 wita sampai 15.05 wita dimana tanda-tanda vital, kontraksi uterus tidak baik, kandung kemih kosong serta perdarahan ± 550 cc, selanjutnya melakukan pemantauan setiap 30 menit pada jam 15.35 dan 16.05 wita dimana tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat, kandung kemih kosong, dan perdarahan ± 100 cc. Selanjutnya mendokumentasikan hasil pemantauan ke dalam partograf dan ibu dipindahkan ke ruangan nifas.

7. Langkah VII

Dilakukan pengevaluasian keefektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan teori yang ada. Beberapa hal yang dievaluasi, yaitu: apa ibu sudah mengerti penjelasan yang diberikan, apa ibu sudah melakukan apa

yang telah dianjurkan dan telah diajarkan, bagaimana keadaan umum ibu, mengukur tanda-tanda vital ibu untuk memantau ibu, apa kecemasan ibu dapat teratasi, apa perdarahan pada kal IV dapat teratasi.

Asuhan kebidanan pada Ny”P” dengan perdarahan primer yang dimulai dari pengkajian sampai implementasi, keadaan yang dialami secara berangsur-angsur membaik dari hasil yang didapatkan bahwa masalah dan kebutuhan dapat diatasi dengan baik. Dapat dilihat pada pasien Ny”P” yang semula mengalami perdarahan setelah dilakukan perawatan dan pengobatan pada tanggal 24 Agustus 2018 keadaannya berangsur membaik karena mendapat tindakan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada.

Hasil evaluasi yang dilakukan yaitu, ibu mengerti dengan keadaannya saat ini dan berangsur-angsur membaik, observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital sudah dilakukan, injeksi untuk antibiotic dan penghentian perdarahan sudah dilakukan. Hasil dari pemantauan kala IV sebagai berikut :

Waktu	TD	N	S	Kontraksi	TFU	Kandung kemih	Perdarahan
14.20	90/60	86	37	Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 200 cc
14.35	90/60	84		Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 100 cc
14.50	90/70	82		Teraba lembek	1 jari di atas pusat	Kosong	± 75 cc
15.05	100/70	82		Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 75 cc
15.35	100/70	80	37	Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 50 cc
16.05	100/70	80		Teraba keras	1 jari di atas pusat	Kosong	± 50 cc

Sumber: data primer

8. Pendokumentasian SOAP.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis, berdasarkan kasus Ny "P" didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinannya.

Objektif merupakan hasil dari pemeriksaan fisik dari hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan, didapatkan data kala III berlangsung normal berlangsung kurang lebih 25 menit, plasenta dengan kotiledon dengan selaput ketuban utuh, kontraksi uterus tidak baik teraba lembek, tinggi fundus 1 jari di atas pusat dengan perdarahan ± 550 ml.

Assesment hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis / masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kalaborasi, berdasarkan kasus Ny "P" maka assesment yang ditegakan adalah perlangsungan kala IV dengan perdarahan primer.

Planning meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implemantasi yang dilakukan sesuai dengan teori yaitu penatalaksanaan kasus perdarahan yaitu dengan memantau perdarahan, kontraksi dan tanda-tanda vital, pemberian antibiotik dan melakukan bimanual interna.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep, dan prinsip-prinsip asuhan pada kasus kala I dengan perdarahan dan pengalaman langsung di lahan praktek studi kasus Ny. "P" dengan perdarahan primer maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada Ny. "P" langkah I didapatkan ibu dengan riwayat paritas tinggi yaitu GVIPVA0, pada kala I didapatkan bahwa terdapat nyeri perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah. Pada kala IV adanya perdarahan segera setelah plasenta lahir, kontraksi uterus lembek, tidak ditemukan adanya perlukaan jalan lahir.
2. Diagnosa Ny. "P" ditegakkan berdasarkan karena perdarahan yang kurang lebih sebanyak 550 ml dan terjadi dalam waktu 24 jam setelah persalinan, inilah yang dinamakan perdarahan primer pasca persalinan
3. Pada Ny. "P" masalah yang mungkin terjadi adalah ibu mengalami syok.
4. Pada Ny. "P" dilakukan tindakan segera untuk mengurangi jumlah volume darah yaitu, melakukan kolaborasi dengan dokter, masase uterus, kompresi bimanual interna, pemberian obat injeksi matergin dan amoxan, melakukan transfusi darah.
5. Rencana tindakan yang disusun pada Ny. "P" bertujuan untuk memperbaiki kondisi umum ibu dan menghindari terjadinya syok.

6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang dilakukan tercapai dengan adanya kerja sama antara bidan, dokter dan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.
7. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah asuhan yang diberikan berhasil atau tidak. Dan hasil pemantauan, didapatkan bahwa tindakan yang dilakukan pada Ny. "P" berhasil dan terlaksana dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan yaitu bayi lahir dengan selamat dan perdarahan dapat teratasi.

B. Saran

1. Untuk Klien
 - a. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memulihkan keadaannya.
 - b. Menganjurkan ibu mengetahui tentang apa-apa saja yang menjadi penghambat persalinan.
 - c. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat pasca melahirkan.
 - d. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin dan tetap memperhatikan keadaan bayinya.
 - e. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat secara teratur sesuai instruksi yang diberikan.
2. Untuk Bidan
 - a. Bidan harus memperdalam ilmu mengenai hal-hal apa saja yang menjadi wewenangnya dan apa saja yang tidak boleh untuk

dilakukan dan tindakan apa saja yang harus melakukan penanganan segera maupun kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan

- b. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun pada masa nifas agar ibu bisa merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya pembelajaran tentang penerapan manajemen asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Dwi dan Cristine Clervo P. *Asuhan Persalinan Normal Plus Contoh Askeb dan Patologi Persalinan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Depkes RI, 2015. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta. <http://www.depkes.go.id/resource/download/pusdatin/profil-kesehatanindonesia/profil-kesehatan-indonesia-2015.pdf>
- Eniyanti, Sholihah Afifin. *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Patologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Eniyati, Putri Melisa. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Errol, O John. *At A Glance Obstetri Dan Ginekologi*, Surabaya: Erlangga, 2013.
- Friedman. *Keperawatan Keluarga*, Jakarta: ECG, 2005.
- Ilmiah, Widia Shofa. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2015.
- Jannah, Nurul. *ASKEB II Persalinan Berbasis Kometensi*, Jakarta: ECG, 2017.
- Jenny, dkk. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Surabaya: Erlangga, 2013.
- JPNK-KR. *Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Asuhan Esensial Pencegahan Dana Penanggulangan segera Komplikasi Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: JHPIEGO, 2008.
- Kuswanti Ina, Melina Fitriani. *Askeb II Persalinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, anak, dan maternal (Panduan Praktis untuk Mahasiswa Kebidanan)*. Makassar: Alauddin University Press. 2013
- Nursiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

- Pronoto Ibnu, dkk. *Patologi Kebidanan*, Yogyakarta: Fitramaya, 2013.
- Puspita Eka, Dwi Kurni. *Asuhan Kebidanan Persalinan (IntranatalCare)*, Jakarta Timur : CV. Trans Info Media, 2014.
- Sagung dkk “*Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUP Dr. M. Djamil Padang,2013.* <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/viewFile/345/300> (diakses tanggal 26 april 2018)
- Shihab M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-qur’an, VOL. 12. Jakarta: Lentera hati, 2009
- Sukarni Icesmi, Zh Margaretha. Kehamila, *Persalinan, dan Nifas*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Sumadi, dkk “*Jurnal Ilmiah Kebidanan.*” *e-Journal Kebidanan Volume 1 Nomor 1, 1 Mei 2013.* <http://poltekkesdenpasar.ac.id/files/JIB/JURNAL%20KEBIDANAN%20VOLUME%201%20NOMOR%201.pdf#page=35> (diakses tanggal 20april 2018)
- Supartini dan Siti, “*Hubungan Antara Usia dan Paritas dengan Letak Sungsang pada Ibu Bersalin*”. *Jurnal Kebidanan*, Vol 1,April 2012.
- Ummah Nurul, dkk “*Faktor Resiko Penyebab Perdarahan Postpartum di Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang*”. *Jurnal Kebidanan*, Vol 7, April 2018.
- WHO (World Health Organization) 2017.Angka kematian ibu, <http://www.who.int/healthinfo/statistics/programme/en/index.html>
- Yeyeh, Ai, dkk. *Asuhan Kebidanan II Persalinan Edisi Revisi*,DKI Jakarta : CV. Trans Info Media, 2014.
- Yeyeh Ai, Yuliani. *Asuhan Kebidanan 4 Patologi bagian 2*, Jakarta :CV.Trans Info Media, 2012.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Nur Afni Pratiwi
Nim : 70400115064
TTL : Bone, 05 Juni 1997
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Citra Garden Blok F1 No. 9
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Basri S. Pd , M. Pd
Ibu : Hj. Nurhayati S. Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003- 2009 SD Negeri 39 Tamalalang
2. Tahun 2009- 2013 SMP Negeri 2 Pangkajene
3. Tahun 2013- 2015 SMA Negeri 1 Pangkajene
4. Tahun 2015- 2018 UIN Alauddin Makassar