

**GAMBARAN PENANGANAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE
DENGAN DERAJAT DEMAM BERDARAH DENGUE
DI RUANG RAWAT INAP RSI FAISAL MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR


**Oleh:
NUR ALIYAH
70300106013**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
MAKASSAR**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Gambaran Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue dengan Derajat Demam Berdarah Dengue di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar tahun 2010" yang disusun oleh saudari Nur aliyah, NIM : 70300106013, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan pertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 M bertepatan dengan 16 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan, (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Agustus 2010 M
16 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI

1. Prof. DR. H. Abd Rahim Yunus, M.A (.....)
2. M. Anwar Hafid, S. Kep., Ns.,M.Kes (.....)
3. Nur Hidayah, S.Kep, Ns.,M. Kes (.....)
4. Abubakar Betan, S.Kep.Ns.,M.Kes (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

dr. H. M. Furqaan Naie m, M.Sc, Ph.D
NIP : 19580404 1989031 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul *Gambaran Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue dengan Derajat demam berdarah Dengue*, dapat diselesaikan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Makassar. Tak lupa pula haturkan Salam dan taslim kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang telah membawa ajaran Islam kepada kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan mulai dari tahap persiapan sampai pada saat penelitian. Namun Alhamdulillah atas bimbingan, arahan, kerja sama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.DR.Azhar Arsyad, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Dr.H. M. Furqaan Naiem, M. Sc.,Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan dukungan berupa kemudahan izin dalam hal penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Nur Hidayah, S.kep, Ns, M. Kes. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan dan pembimbing I, yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abubakar Betan, S.Kep.Ns,M.Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan yang tiada terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof.DR.H.Abd. Rahim Yunus, M.A, selaku penguji I dan Bapak M. Anwar Hafid. S. Kep.,Ns. M.Kes, selaku penguji II yang telah memberikan dukungan, saran, dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik/Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi, Tata Usaha Dan Perpustakaan FIK (k'Jannah,K'Fian,k'Fatri) yang senantiasa sabar membantu segala kebutuhan perkuliahan.
8. Keluarga Ayahanda dan Ibunda tercinta (H. M. Idrus Husain dan Hj. Sitti Rapisah), serta saudara-saudariku yang saya sayangi yang telah mendidik dengan tidak kenal lelah tanpa mengharap imbalan apapun, terima kasih atas perhatian, doa, dan kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku yang senantiasa berbagi cerita, cinta dan kehidupan, menjadi bara semangat dalam suka dan duka (Eni, Mira, Sri, Inchi, Anhi,

Etri, Anti, sahabat dan teman-teman kost khususnya Dalia, Cua', dan Tika serta teman yang tidak sempat saya sebutkan).

10. Kepala Bagian Staf Kesatuan Bangsa Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kantor Walikota dan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kepala Puskesmas Makassar Makassar yang telah memberikan ruang dan waktu serta kerjasama yang baik selama penelitian.
11. Kepala Direktur selaku penanggung jawab di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Anda sekalian. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, kelemahan, dan kekurangan yang dimiliki. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT meridhoi segala usaha yang telah kita lakukan selama ini. Amin.

Makassar, Agustus 2010

Penulis


DAFTAR ISI

Halam judul.....	i
Halaman pernyataan keaslian skripsi.....	ii
Halaman pengesahan	iii
Kata pengantar.....	iv
Daftar isi	vii
Daftar tabel.....	ix
Daftar singkatan.....	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan umum demam berdarah	9
B. Tinjauan tentang penanganan kasus demam berdarah.....	9
C. Tinjauan umum tentang konsep kecemasan	15
BAB III KERANGKA KONSEP	33
A. Kerangka konsep penelitian	33
B. Kerangka kerja	34
C. Defenisi operasional dan kriteria objektif.....	35
BAB IV METODE PENELITIAN	37
A. Jenis penelitian	37
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	37
C. Populasi dan sampel	37
D. Pengumpulan data dan pengolahan data.....	39
E. Analisa data	39

F. Etika penelitian	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	48
BAB VI KESIMPULAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- TABEL 5.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan kelompok umur
- TABEL 5.2 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pendidikan
- TABEL 5.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif
- TABEL 5.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue berdasarkan dengan preventif
- TABEL 5.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue dengan kuratif
- TABEL 5.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue diagnostik
- TABEL 5.7 Distribusi frekuensi responden berdasarkan derajat demam berdarah dengue
- TABEL 5.8 Crosstab
- 

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Lambang
DBD	Demam berdarah dengue
KLB	Kejadian luar biasa
<	Kurang Dari
>	Lebih dari
\leq	Kurang dari sama dengan
\geq	Lebih sama dengan
%	Persen
n	Sampel / frekuensi
SPSS	Statistical package for social science
No	Nomor

ABSTRAK

Nama : NUR ALIYAH

NIM : 70300106013

Judul : Gambaran Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue dengan Derajat Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) atau *Dengue Hemorrhagic Fever* (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue* I, II, III, dan IV, yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang awalnya banyak menyerang anak tetapi akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran menyerang dewasa.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk diketahuinya gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif, preventif, kuratif dan diagnostik dengan derajat demam berdarah dengue. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sampel ditetapkan dengan cara *accidental sampling* yang sesuai dengan kriteria inklusi.

Populasi pada penelitian sebanyak 129 orang dengan jumlah sample sebanyak 30 orang. Setelah data terkumpul maka didistribusikan melalui analisa univariat. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui kuisioner dan observasi langsung terhadap pasien.

Dari hasil penelitian dapat dilihat adanya gambaran tentang penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif berdampak baik karena dari 30 orang responden terdapat 27 orang yang baik penanganannya promotifnya. Dari 27 orang tersebut 23 orang hanya menderita DBD derajat I, 3 orang menderita derajat II dan 1 orang menderita DBD derajat III. Sama halnya pada promotif, penanganan preventif DBD juga berdampak positif yaitu jumlah responden yang baik penanganannya sejumlah 27 orang, 24 orang menderita DBD derajat I, 2 orang menderita DBD derajat II, dan 1 orang menderita DBD derajat III. Lain halnya penanganan DBD dengan kuratif yang menunjukkan dampak yang kurang baik yaitu dari 30 responden hanya 4 orang yang penanganannya kuratifnya baik. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya pengobatan yang tepat terhadap DBD. Selanjutnya penanganan DBD dengan diagnostik juga memberikan dampak yang baik pada ke-30 responden.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan akan pentingnya penanganan demam berdarah baik berupa promotif, preventif, maupun pemeriksaan diagnostik karena ketiga penanganan DBD ini sangat memberikan dampak yang positif. Sedangkan kuratif masih memberikan dampak yang kurang memuaskan berhubung belum ditemukannya obat yang tepat untuk DBD.

Diharapkan bagi instansi kesehatan agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat serta mengupayakan penanganan kuratif yang tepat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) atau *Dengue Hemorrhagic Fever* (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue I, II, III, dan IV, yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang awalnya banyak menyerang anak tetapi akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran menyerang dewasa. (Soegijanto,2006).

Derajat Beratnya DBD secara klinis sangat bervariasi, WHO (1997 dalam Widyastuti, 2005) membagi menjadi 4 derajat yaitu:

Derajat I:

Demam disertai gejala-gejala umum yang tidak khas dan manifestasi perdarahan spontan satu-satunya adalah uji *tourniquet positif*.

Derajat II :

Gejala-gejala derajat I, disertai gejala gejala perdarahan kulit spontan atau *manifestasi* perdarahan yang lebih berat

Derajat III:

Didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit (< 20 mmHg), *hipotensi*, *sianosis* disekitar mulut, kulit dingin dan lembab, gelisah.

Derajat IV:

Syok berat (*profound shock*), nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur.

Demam berdarah masih menjadi penyakit penyebab kematian yang harus diwaspadai. Biasanya penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk *aedes aegypti* ini banyak berjangkit pada musim hujan. Namun, seiring perubahan lingkungan dan siklus atau daur hidup nyamuk itu sendiri, penyakit mematikan ini dapat menyerang setiap saat tanpa mengenal musim. Penyakit DBD biasanya ditandai dengan demam secara tiba – tiba, bintik merah di kulit, perdarahan (mulut, hidung, tinja), mual, lemas, dan persendian terasa ngilu. Gejala tersebut adalah profil DBD yang selama ini kita kenal.

Antara tahun 1975 dan 1995, DD/DBD terdeteksi keberadaannya di 102 negara di dari lima wilayah WHO yaitu : 20 negara di Afrika, 42 negara di Amerika, 7 negara di Asia Tenggara, 4 negara di Mediterania Timur dan 29 negara di Pasifik Barat. Seluruh wilayah tropis di dunia saat ini telah menjadi hiperendemis dengan ke-empat serotipe virus secara bersama-sama di wilayah Amerika, Asia Pasifik dan Afrika. Indonesia, Myanmar, Thailand masuk kategori A yaitu : (KLB/wabah siklis) terulang pada jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun. Menyebar sampai daerah pedesaan, sirkulasi serotipe virus beragam (WHO, 2000).

Penyakit DBD menempati urutan ke-8 sebagai sebab kesakitan di 10 negara tropik Asia. Indonesia merupakan Negara nomor dua di dunia setelah

Thailand yang mempunyai kasus DBD terbanyak.(Makaliwy,2003). Virus dengue termasuk family *Flaviviridae*, genus *Flavivirus*, terdiri dari 4 serotip, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Keempat serotip ini terdapat di Indonesia dan dilaporkan bahwa serotip virus DEN-3 sering menimbulkan wabah, sedang di Thailand penyebab wabah yang dominant adalah virus DEN-2.(Soegijanto,2006).

Penyakit DBD di Indonesia pertama kali terjadi di Surabaya pada tahun 1968, dan di Jakarta dilaporkan pada tahun 1969. Penyakit DBD merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Seluruh wilayah di Indonesia mempunyai resiko untuk terjangkit penyakit demam berdarah dengue, sebab baik virus penyebab maupun nyamuk penularannya sudah tersebar luas di perumahan penduduk maupun fasilitas umum diseluruh Indonesia. Laporan yang ada sampai saat ini penyakit demam berdarah dengue sudah menjadi masalah yang endemis pada 122 daerah tingkat II, 605 daerah kecamatan dan 1800 desa/kelurahan di Indonesia.

Kejadian Luar Biasa (KLB) *dengue* biasanya terjadi di daerah endemik dan berkaitan dengan datangnya musim hujan, namun tidak demikian, kini demam berdarah bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, perlu mengenal penyakit dan pencegahan dari penyakit DBD. Salah satu langkah promotifnya adalah pemberantasan penularan virus DBD, yaitu nyamuk *Aedes*, baik *Aedes aegypti* maupun *Aedes albopictus*. Metode pemberantasan yang banyak dikampanyekan adalah 3M Plus, menguras, menutup dan mengubur. Plusnya banyak, antara lain: melakukan penyemprotan (*fogging*), menabur abate ditempat yang menampung air (*abatisasi*), memelihara ikan pemakan jentik, dll. (Litbang Depkes, 2004).

Dalam al-Qur'an umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum dilarang membiarkan diri atau menceburkan diri pada penyakit dan sejenisnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195:

وَمَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini secara umum melarang manusia melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau membawa pada kebinasaan. Oleh karena itu, setiap manusia berkewajiban menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat menyebabkan kebinasaan, baik dengan cara menjaga kebersihan atau dengan melakukan pencegahan. (Muhammad Rasyid Ridha, 1990, Juz. I, hal. 97). Termasuk di dalamnya adalah melakukan pencegahan terjadinya demam berdarah yang dapat berujung pada kematian.

Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Incidence Rate (IR) Demam Berdarah dari tahun 2002-2006 menunjukkan bahwa angka kejadian DBD secara nasional terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Angka insiden DBD secara nasional sampai tahun 2004 37,11 per 100.000 penduduk dengan CFR 1,2% dan pada tahun 2006 mencapai 52,48 per 100.000 penduduk, ini merupakan jumlah tertinggi diantara Negara-negara di Asia

Tenggara saat ini. Di Indonesia jumlah penderita Demam berdarah pada tahun 2005 sebanyak 59.000 kasus dengan jumlah kematian 689 orang, pada tahun 2006 sebanyak 113.640 penderita dan meninggal 1.184 orang. Dan pada tahun 2007 terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah tercatat dari bulan Januari hingga April jumlah kasus 56.000.(Syahrudin,2007).

Dari 30 propinsi se Indonesia propinsi yang dilaporkan adanya KLB DBD sebanyak 12 propinsi yang meliputi: Nangroe Aceh Darussalam, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi selatan, Bali, NTB, Departemen kesehatan menyatakan telah terjadi KLB DBD Nasional pada tanggal 16 Februari 2004, dan menyatakan di Sulawesi Selatan CFR 3,84% merupakan angka kematian yang tinggi.(Hasan R,2008).

Situasi kasus DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 3.390 kasus dengan angka kematian (CFR : 0,83%) terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 2.734 kasus (CFR=1,10%). Kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada tahun 2008 adalah Kab. Bone sebanyak 668 kasus (CFR=0,60%), Kota Makassar sebanyak 262 kasus (CFR=1,15%), dan Kab. Gowa sebanyak 217 kasus (CFR=0,92%). (Dinkes,2009).

Dari data RSI Faisal Makassar, jumlah kasus DBD pada tahun 2007 adalah 161 orang, tahun 2008 adalah 377 orang, tahun 2009 adalah 211 orang, dan pada tahun 2010 periode Januari – Maret adalah 129 kasus.

Berdasarkan uraian tentang demam berdarah di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengambil judul skripsi yang berjudul “Gambaran penanganan kasus Demam Berdarah Dengue dengan derajat demam berdarah dengue di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana gambaran penanganan kasus Demam Berdarah Dengue dengan derajat demam berdarah dengue di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketuinya gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan derajat demam berdarah dengue

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui gambaran penanganan promotif dengan derajat demam berdarah dengue di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar.
- b. Diketahui gambaran penanganan preventif dengan derajat demam berdarah dengue di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar
- c. Diketahui gambaran penanganan kuratif dengan derajat demam berdarah dengue di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar.
- d. Diketahui gambaran penanganan diagnostik dengan derajat demam berdarah dengue di ruang rawat inap di RSI Faisal Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti :

Dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang penyakit dan penanganan penyakit DBD

b. Bagi Instansi Pendidikan :


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan khususnya bagi instansi pendidikan kesehatan

c. Bagi Instansi kesehatan :

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam penanggulangan penyakit DBD

d. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang penyakit DBD serta penanganannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Demam Berdarah

1. Pengertian

Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue I, II, III, dan IV, yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*. (Soegijanto,2006). Demam *dengue* (dengue fever, selanjutnya disingkat DF) adalah penyakit yang terutama terdapat pada anak atau orang dewasa, dengan tanda-tanda klinis demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, dengan / tanpa ruam (rash) dan limfadenopati, demam bifasik, sakit kepala yang hebat, nyeri pada pergerakan bola mata, rasa mengecap yang terganggu, trombositopenia ringan dan bintik-bintik perdarahan (petechie).

Infeksi virus Dengue telah menjadi masalah kesehatan yang serius pada banyak negara tropis dan subtropis, oleh karena peningkatan jumlah penderita, menyebarluasnya daerah yang terkena wabah dan manifestasi klinis berat yang merupakan keadaan darurat yaitu *Dengue Hemorrhagic Fever* (DHF) dan *Dengue Shock Syndrome* (DSS).

Demam berdarah (DB) atau demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit febril akut yang ditemukan di daerah tropis, dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Penyakit ini disebabkan salah satu dari

empat serotipe virus dari *genus* Flavivirus, *family* Flaviviridae. Setiap serotipe cukup berbeda, sehingga tidak ada proteksi – silang dan wabah yang disebabkan beberapa *serotipe* (*hiperendemisitas*) dapat terjadi.

2. Etiologi

Penyakit demam berdarah dengue pada seseorang dapat disebabkan oleh virus Dengue termasuk famili Flaviviridae dan harus dibedakan dengan demam yang disebabkan virus *Japanese Encephalitis* dan *Yellow Fever* (demam kuning).(Soegijanto,2006).

Hingga sekarang ini telah dapat diisolasi 4 serotipe di Indonesia, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Ternyata DEN-2 dan DEN-3 merupakan serotype yang paling banyak sebagai penyebab.(Soegijanto, 2006). Adapun sifat dari virus Dengue yaitu ukurannya 17-25 milimikron. Virus dengue terdapat di dalam darah penderita demam.(Entjang,2003).

Adapun ciri Morfologi *Nyamuk Aedes Aegypti* yaitu :

Nyamuk Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung (dorsal) tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari spesies ini. Sisik-sisik pada tubuh nyamuk pada umumnya mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk-nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk jenis ini kerap berbeda antar populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama perkembangan.

Nyamuk jantan dan betina tidak memiliki perbedaan dalam hal ukuran nyamuk jantan yang umumnya lebih kecil dari betina dan terdapatnya rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Kedua ciri ini dapat diamati dengan mata telanjang.

3. Manifestasi Klinik

Infeksi virus dengue pada manusia mengakibatkan suatu spektrum manifestasi klinik yang bervariasi antara penyakit yang paling ringan (*mild undifferentiated febrile illness*), *dengue fever*, *Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)* dan *Dengue Shock Syndrome (DSS)*. (Rampengan & Laurentz, 1992). Kasus khas DHF ditandai oleh empat manifestasi klinis mayor : demam tinggi, fenomena hemoragis, hepatomegali dan kegagalan sirkulasi. (WHO, 1999). Patokan WHO (1975) untuk membuat diagnosis DHF ditetapkan sebagai berikut.

Kriteria Klinik :

1. Demam tinggi mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari.
2. Manifestasi perdarahan, termasuk setidaknya uji tourniquet positif dan salah satu bentuk lain (petekia, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi), hematemesis dan atau melenas.
3. Pembesaran hati (Hepatomegali).
4. Renjatan yang ditandai oleh nadi lemah, cepat disertai tekanan nadi menurun, (menjadi 20 mmHg atau kurang), disertai kulit yang teraba

dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari dan kaki, penderita menjadi gelisah, timbul sianosis di sekitar mulut.(Soedarmo,2005).

Kriteria Laboratoris :

1. Trombositopenia : jumlah trombosit $100.000/mm^3$
2. Hemokonsentrasi : meningginya nilai hematokrit atau Hb $\leq 20\%$ dibandingkan dengan nilai pada masa konvalensen.

Mengingat derajat beratnya penyakit bervariasi dan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan prognosa, maka WHO (1975) membagi DBD dalam 4 derajat setelah kriteria laboratorik terpenuhi yaitu:

1. Derajat I : Demam mendadak 2-7 hari disertai gejala tidak khas dan satu - satunya manifestasi perdarahan ialah uji tourniquet positif.
2. Derajat II : Derajat I disertai dengan perdarahan spontan di kulit dan perdarahan lain.
3. Derajat III : Derajat II ditambah kegagalan sirkulasi ringan yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menurun ($\leq 20mmHg$) atau hipotensi (sistolik $\leq 80 mmHg$) disertai kulit yang dingin, lembab dan penderita gelisah.
4. Derajat IV : Derajat III ditambah syok berat dengan nadi yang tak terukur, dapat disertai dengan penurunan kesadaran, sianosis dan asidosis.

Derajat I dan II disebut DHF/DBD tanpa renjatan sedang derajat III dan IV disebut DHF/DBD dengan renjatan atau DSS.(Rampengan & Laurentz,1992).

4. Patofisiologi

Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan kemudian akan bereaksi dengan antibody dan terbentuklah kompleks virus-antibody. Dalam sirkulasi akan mengaktivasi system komplemen. Akibat aktivasi C3 dan C5 akan dilepas C3a dan C5a, dua peptida yang berdaya untuk melepaskan histamine dan merupakan mediator kuat sebagai factor meningkatnya permeabilitas dinding pembuluh darah dan menghilangkan plasma melalui endotel dinding itu.

Terjadinya trombositopenia, menurunnya fungsi trombosit dan menurunnya faktor koagulasi (protombin dan fibrinogen) merupakan factor penyebab terjadinya perdarahan hebat, terutama perdarahan saluran gastrointestinal pada DHF.

Yang menentukan beratnya penyakit adalah meningkatnya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, trombositopenia dan diathesis hemorrhagic, renjatan terjadi secara akut.

Nilai hematokrit meningkat bersamaan dengan hilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah. Dan dengan hilangnya plasma klien

mengalami hipovolemik. Apabila tidak diatasi bisa terjadi anoxia jaringan, acidosis metabolic dan kematian.

Patofisiologi primer DBD dan DSS adalah peningkatan akut permeabilitas vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke dalam ruang ekstrasvaskuler, sehingga menimbulkan hemokonsentrasi dan penurunan tekanan darah.(Soegijanto,2006).

Patofisiologi yang terutama pada Dengue Shock Syndrom ialah terjadinya peninggian permeabilitas dinding pembuluh darah yang mendadak dengan akibat terjadinya perembesan plasma dan elektrolit melalui endotel dinding pembuluh darah dan masuk kedalam ruang interstial, sehingga menyebabkan hipotensi, hemokonsentrasi, hipoproteinemia dan efusi cairan ke rongga serosa.(Handojo,2003)

Perbedaan patofisiologik utama antara DD/DBD/SSD dan penyakit lain adalah adanya peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan perembesan plasma dan gangguan hemostasis. Maka keberhasilan tatalaksana DBD terletak pada bagian mendeteksi secara dini fase kritis yaitu saat suhu turun (*the time of defervescence*) yang merupakan fase awal terjadinya kegagalan sirkulasi, dengan melakukan observasi klinis disertai pemantauan perembesan plasma dan gangguan hemostasis.

Patogenesis DBD tidak sepenuhnya dipahami, namun terdapat dua perubahan patofisiologis yang mencolok, yaitu meningkatnya permeabilitas kapiler yang mengakibatkan bocornya plasma, hipovolemia dan

terjadinya syok. Pada DBD terdapat kejadian unik yaitu terjadinya kebocoran plasma ke dalam rongga pleura dan rongga peritoneal. Kebocoran plasma terjadi singkat (24-48 jam). Hemostasis abnormal yang disebabkan oleh vaskulopati, trombositopeni dan koagulopati, mendahului terjadinya manifestasi perdarahan.

Kelainan utama pada DBD ialah

- (1) bertambahnya *permeabilitas vaskuler* yang menyebabkan terjadinya kebocoran plasma dan terjadinya *hipovolemi intravaskuler*,
- (2) gangguan *hemostasis (angiopati, trombositopeni dan koagulopati)*.

Pemulihan volume cairan *intravaskuler* secara dini dan adekuat *Koagulasi Intravaskuler Diseminata (KID)*. Secara teoritis tahapan perubahan pada *permeabilitas dinding vaskuler* dan pengaruhnya terhadap perbedaan tekanan *onkotik cairan intravaskuler dan ekstrasvaskuler*. Pada saat terjadi kebocoran plasma, albumin, air dan elektrolit keluar dari kompartemen intravaskuler ke dalam kompartemen ekstrasvaskuler. Dengan adanya protein dalam kompartemen *ekstrasvaskuler* tekanan osmotik cairan *ekstra-vaskuler* meningkat dan perbedaan (*gradien*) tekanan osmotik intra dan ekstra vaskuler menurun dengan akibat penarikan masuk air dan elektrolit pada sisi kapiler venus menurun. Berkurangnya cairan yang masuk kembali ke kompartemen *intravaskuler* menyebabkan terjadinya *hipovolemi intravaskuler*, *hemokonsentrasi*, *viskositas* darah meningkat, aliran darah menurun, perfusi jaringan berkurang dan mungkin terjadi renjatan dengan komplikasi yang

berat yaitu KID yang dapat menyebabkan *intravaskuler* menyebabkan terkumpulnya cairan di kompartemen *ektravaskuler* yang dapat bermanifestasi sebagai cairan *pleura, ascites* dan cairan pada dinding organ di perut.

B. Tinjauan Tentang Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue

1. Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue Dengan Promotif

Promotif adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olah raga secara teratur, istirahat yang cukup dan rekreasi sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal.(Effendy.N,1998) Adapun bentuk promosi kesehatan yaitu:

1. Promosi kesehatan kepada masyarakat tentang bahaya demam berdarah dan menghimpun masyarakat agar melakukan tindakan pencegahan demam berdarah.
2. Promosi kesehatan tentang konsep kesehatan lingkungan, mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik. Seperti konsep yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rumah sehat, penggunaan air bersih.


Dengan adanya promosi kesehatan diharapkan dapat membantu dalam penanganan kasus DBD. Memberikan informasi tentang pencegahan

DBD kepada masyarakat maka dapat meminimalkan bertambahnya kasus DBD. Penyakit DBD ini harus diwaspadai karena kalau sampai terlambat dalam penanganannya bisa berakibat fatal bagi penderitanya, karena itu harus diketahui tanda dan gejala dari penyakit DBD ini yaitu demam yang mendadak tinggi 2- 7 hari disertai muka kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang sendi/sendi, petekie/bintik-bintik perdarahan, mual, muntah, nafsu makan menurun dan nyeri perut. Adanya tanda perdarahan seperti epistaksis/mimisan, perdarahan gusi dan muntah darah perlu diwaspadai karena merupakan salah satu tanda kasus yang harus segera di rujuk ke pusat pelayanan kesehatan/rumah sakit. Adanya tanda dan gejala syok pada DBD juga harus diwaspadai yaitu terjadinya penurunan suhu tubuh tiba-tiba, akral dingin, nadi lemah dan kebiruan pada bibir. Karena itu jika anda panas usahakan untuk istirahat, makan makanan yang bergizi, minum air putih sebanyak 2,5 liter untuk orang dewasa dan minum obat penurun panas atau kompres dahi dengan air hangat. Namun bila panas badan tidak turun dalam jangka waktu 2 hari, periksakan diri segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Pencegahan wabah DHF didasarkan pada pengendalian vektor, karena vaksin belum tersedia. Saat ini satu-satunya cara yang efektif untuk menghindari infeksi virus *Dengue* adalah menghindari gigitan dari nyamuk yang terinfeksi (Hendarwanto,1996).Tetapi karena vektor tersebar luas, untuk keberhasilan pemberantasan diperlukan total *coverage* (meliputi seluruh wilayah) agar nyamuk tak dapat berkembangbiak lagi. Cara yang

hingga saat ini masih dianggap paling tepat untuk mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah adalah dengan mengendalikan populasi dan penyebaran vektor.

Menyampaikan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna kepada orang lain merupakan suatu tindakan mulia yang Insya Allah bernilai tinggi dihadapan-Nya.

Empat belas abad yang silam, Rasulullah saw. menyuruh sahabatnya agar menyampaikan informasi-informasi kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir atau tidak mendengarnya, bahkan pada sisi yang lain, Rasulullah saw. mengecam orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang dapat berguna bagi masyarakat, sebagaimana sabdanya:



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَتَبَ
عِصْمًا مِمَّا يَنْتَفَعُ اللَّهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ وَأَمْرَ اللَّهِ الْجَمْعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِحُجْمٍ مِنَ النَّارِ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Artinya:

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah saw. bersabda “Barang siapa yang menyimpan (tidak mau menyampaikan) ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi orang lain dan urusan agama, Allah swt. akan mengekangnya dengan api neraka”. (HR. Ibnu Majah)

Program yang sering dikampanyekan di Indonesia adalah 3M plus, yaitu menguras, menutup, dan mengubur.

1. Menguras bak mandi, untuk memastikan tidak adanya larva nyamuk yang berkembang di dalam air dan tidak ada telur yang melekat pada dinding bak mandi.
2. Menutup tempat penampungan air sehingga tidak ada nyamuk yang memiliki akses ke tempat itu untuk bertelur.
3. Mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan tempat nyamuk bertelur.

Setelah berusaha melakukan berbagai macam cara-cara pencegahan penyakit pada umumnya dan demam berdarah pada khususnya, maka umat manusia dituntut untuk berdo'a kepada Allah swt sehingga apa yang telah kita lakukan tidak sia-sia.

Plusnya banyak, antara lain : melakukan penyemprotan (*fogging*), menabur abate di tempat yang menampung air (*abatisasi*), memelihara ikan pemakan jentik, dll (Litbang Depkes, 2004).

Beberapa cara alternatif pernah dicoba untuk mengendalikan vektor dengue ini, antara lain mengintroduksi musuh alamiahnya yaitu larva nyamuk *Toxorhyncites sp.* Predator larva *Aedes sp.* ini ternyata kurang efektif dalam mengurangi penyebaran virus dengue. Penggunaan insektisida yang berlebihan tidak dianjurkan, karena sifatnya yang tidak *spesifik* sehingga akan membunuh berbagai jenis serangga lain yang bermanfaat secara ekologis. Penggunaan insektisida juga akhirnya memunculkan masalah resistensi serangga sehingga mempersulit penanganan di kemudian hari.

2. Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue Dengan Preventif

Preventif adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah. (Effendy, 1998).

Dalam epidemiologi yang merupakan ilmu dasar pencegahan dengan sasaran utama adalah mencegah dan menanggulangi penyakit dalam masyarakat. Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian.

Pencegahan terhadap penyakit adalah suatu usaha untuk menghindari suatu penyakit sebelum terjadi. Dan sebagai ummat Islam selain berusaha kita juga harus berdoa agar tindakan/usaha yang telah kita lakukan dapat bermanfaat sesuai yang kita inginkan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Najm /53: 39:

Terjemahannya :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak akan ada seorang manusia yang dapat mendapatkan sesuatu tanpa berusaha, serta dibarengi dengan doa.

Pada dasarnya ada empat tingkatan pencegahan penyakit secara umum yakni :

- a. *Primordial Prevention* / Pencegahan tingkat dasar
- b. *Primery Prevention* / Pencegahan pertama
- c. *Secondary Prevention* / Pencegahan kedua
- d. *Tertiary Prevention* / Pencegahan ketiga

Pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Sasaran dalam pencegahan ditujukan pada sumber penularan lingkungan serta faktor penjamu. (Syahrudin, 2007)

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah demam berdarah adalah :

1. Sumber penularan

Cara pemberantasan nyamuk sebagai sumber penularan yaitu :

- a. *Fogging* adalah salah satu upaya pemberantasan nyamuk demam berdarah. Pengasapan pada umumnya dilakukan dengan zat kimia yaitu *malathion* 2%-5% dicampur solar dengan menggunakan *slogin for*, yaitu alat penyemprot yang dapat dibawah di punggung untuk memberantas nyamuk di gudang-gudang, perumahan dan perkebunan yang luas.
- b. Penyemprotan nyamuk *Aedes Aegypti* dapat diberantas dengan menyemprotkan racun serangga yang dipergunakan sehari-hari di

rumah tangga, tetapi cara ini tidak cukup sebab nyamuk yang mati adalah nyamuk dewasa saja,

c. Membasmi jentiknya yang lebih dikenal dengan PSN-DBD, pemberantasan sarang nyamuk dengan demam berdarah dengan jalan :

- 1) Menguras tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali dan menabur bubuk abate
- 2) Menutup rapat tempat penampungan air
- 3) Mengubur / menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas dan plastic bekas.(Syahrudin,2007)

2. Lingkungan

Mengolah atau memodifikasi lingkungan melalui penimbunan tempat berkembangnya atau menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah, dan pekarangan atau saluran-saluran air minimal seminggu sekali. Beberapa usaha plus meliputi memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menyemprot dengan insektisida, menanam pohon anti jentik, memeriksa jentik berkala, pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil sampingan kegiatan manusia, perbaikan desain rumah dan upaya pencegahan lain sesuai dengan kondisi setempat.(Syahrudin,2007).

3. Faktor penjamu (manusia)

Menghindari gigitan nyamuk, misalnya dengan menggunakan kelambu pada waktu tidur, obat nyamuk dan bahan / zat penolak nyamuk. Selain itu meningkatkan daya tahan tubuh misalnya melalui peningkatan status gizi dan olahraga kesehatan.(Syahrudin,2007)

3. Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue Dengan Kuratif

Kuratif adalah usaha yang ditujukan terhadap orang yang sakit untuk dapat diobati secara tepat dan adekuat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya.(Effendy.N,1998)

Pengobatan DBD bersifat suportif. Tatalaksana didasarkan atas adanya perubahan fisiologi berupa perembesan plasma dapat mengakibatkan syok, anoreksia dan kematian.

Pengobatan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh ummat manusia untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Allah swt akan memberikan petunjuk dan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيٌّ يُتْرَبُ دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، غَنِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَنِبَهُ
مَنْ جَنِبَهُ.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali Dia menurunkan obat penyembuhnya ; obat penyakit diketahui bagi yang mengetahuinya, dan tidak diketahui bagi orang jahil.” (HR. Ahmad).

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit itu ada obatnya, maka dengan demikian manusia diharapkan untuk senantiasa berusaha mencari obat bagi penyakit.

Prognosis DBD terletak pada pengenalan awal terjadinya perembesan plasma, yang dapat diketahui dari peningkatan kadar hematokrit. Fase kritis pada umumnya mulai terjadi pada hari ketiga sakit. Penurunan jumlah *trombosit* sampai $<100.000/pl$ atau kurang dari 1-2 *trombosit/ Ipb* (rata-rata dihitung pada 10 Ipb) terjadi sebelum peningkatan hematokrit dan sebelum terjadi penurunan suhu. Peningkatan hematokrit 20% atau lebih mencerminkan perembesan plasma dan merupakan indikasi untuk pemberian cairan. Larutan garam isotonik atau ringer laktat sebagai cairan awal pengganti volume plasma dapat diberikan sesuai dengan berat ringan penyakit. Perhatian khusus pada kasus dengan peningkatan *hematokrit* yang terus menerus dan penurunan jumlah *trombosit* $< 50.000/41$. Secara umum pasien DBD derajat I dan II dapat dirawat di Puskesmas, rumah sakit kelas D, C dan pada ruang rawat sehari di rumah sakit kelas B dan A. Fase Demam Tatalaksana DBD fase demam tidak berbeda dengan tatalaksana DD, bersifat *simtomatik* dan *supportif* yaitu pemberian cairan oral untuk mencegah dehidrasi. Apabila cairan

oral tidak dapat diberikan oleh karena tidak mau minum, muntah atau nyeri perut yang berlebihan, maka cairan intravena rumatan perlu diberikan. *Antipiretik* kadang-kadang diperlukan, tetapi perlu diperhatikan bahwa *antipiretik* tidak dapat mengurangi lama demam pada DBD. Rasa haus dan keadaan dehidrasi dapat timbul sebagai akibat demam tinggi, anoreksia dan muntah. Jenis minuman yang dianjurkan adalah jus buah, air teh manis, sirup, susu, serta larutan oralit.

Pasien perlu diberikan minum 50 ml/kg BB dalam 4-6 jam pertama. Setelah keadaan dehidrasi dapat diatasi anak diberikan cairan rumatan 80-100 ml/kg BB dalam 24 jam berikutnya. Bayi yang masih minum asi, tetap harus diberikan disamping larutan *oralit*. Bila terjadi kejang demam, disamping antipiretik diberikan antikonvulsif selama demam.

Adapun cairan kristaloid yang harus disediakan adalah ;

1. *D5-Ringer laktat* (kalau mungkin *D5-Ringer acetate*)
2. *D5-Saline 0,45*
3. *D5-Saline 0,25*
4. *D5-Saline 0,9*

Sarana obat-obatan yang harus disediakan adalah obat-obatan golongan :

1. *Antipiretik* golongan parasetamol atau obat-obatan penurun panas yang tidak mengganggu fungsi hati
2. *Antikonvulsan, fenobarbital, diazepam, largaktil*
3. *Antibiotik, ampicilin, sefalosporin, kloksasilin*

4. *Dopamine, dobutamin*

5. Oksigen

Pada DBD tanpa syok (derajat 1 dan 2), terapi cukup dengan pengobatan simptomatis dan antipiretik parasetamol (jangan aspirin). Jika terjadi ensefalopati diberikan antibiotik dan kortikosteroid, kecuali jika ada perdarahan saluran cerna. Cairan intravena diberikan bila penderita muntah, tidak mau minum, demam tinggi dan dehidrasi.

Sementara, DBD dengan komplikasi DSS (derajat 3 dan 4), penggantian volume plasma yang hilang harus segera dilakukan. Pertama, dengan memberikan cairan kristalloid (ringer laktat) 15 ml/kg BB/jam. Jika terdapat gangguan hati, sebaiknya diberikan cairan ringer asetat. Karena dengan ringer laktat, hepar akan bekerja lebih keras untuk mengubah laktat menjadi bikarbonat. Setelah 15 menit, kemudian dievaluasi. Jika tensi tidak meningkat, dosis ditingkatkan menjadi 20 ml/kg BB/jam. Dalam waktu 20 menit, apabila syok belum teratasi, ringer laktat tetap diberikan dengan ditambah koloid (albumin dan hydroethylstarch/koloid sintetis) 20-30 ml/kg BB/jam, maksimal 1500 ml/hari.

Selain itu PMI juga harus dilibatkan secara aktif dalam persiapan KLB-DBD. Pihak PMI harus menyediakan :

1. Plasma segar atau plasma beku (FFP, *Fresh Frozen Plasma*)
2. Darah segar atau kompon[onen darah. Diperkirakan untuk keperluan 10 kasus SSD parah diperlukan sekitar 10 unit darah. Darah yang telah sesuai dengan pesanan pasien dapat disimpan di bank darah rumah sakit untuk memudahkan penggunaannya apabila diperlukan.(Djunaedi,2006).

Pasien harus diawasi ketat terhadap kejadian syok yang mungkin terjadi.

Periode kritis adalah waktu transisi, yaitu saat suhu turun pada umumnya hari ke 3-5 fase demam. Pemeriksaan kadar *hematokrit* berkala merupakan pemeriksaan laboratorium yang terbaik untuk pengawasan hasil pemberian cairan yaitu menggambarkan derajat kebocoran plasma dan pedoman kebutuhan cairan intravena. *Hemokonsentrasi* pada umumnya terjadi sebelum dijumpai perubahan tekanan darah dan tekanan nadi.

Hematokrit harus diperiksa minimal satu kali sejak hari sakit ketiga sampai suhu normal kembali. Bila sarana pemeriksaan hematokrit tidak tersedia, pemeriksaan *hemoglobin* dapat dipergunakan sebagai *alternative* walaupun tidak terlalu *sensitif*. Untuk Puskesmas yang tidak ada alat pemeriksaan *hematokrit (Ht)*, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan *hemoglobin (Hb)*. Sahli dengan estimasi nilai $Ht = 3 \times \text{kadar Hb}$ penggantian Volume Plasma.

4. Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengan Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan *diagnostik* adalah suatu sarana untuk menunjang *diagnostik* dan untuk memantau perjalanan/perkembangan penyakit (menentukan keparahan penyakit). Diagnosis laboratorium DBD baik pada anak maupun dewasa belum pernah dibedakan secara jelas, di mana masih memakai kriteria umum yaitu isolasi virus dengan cara kultur, pemeriksaan *serologis* dengan mendeteksi *antibody* anti *Dengue*, maupun pemeriksaan asam nukleat dari RNA virus *Dengue* yang sekaligus dapat mendeteksi jenis *serotype* virus *Dengue* yang diperlukan tidak saja untuk keperluan epidemiologi, namun salah satu faktor yang kemungkinan dapat mengarah pada gradasi berat ringannya gejala infeksi virus *Dengue*. Adapun aspek yang berperan dalam suatu penyembuhan suatu penyakit adalah deteksi dan pengobatan yang tepat. Jika ada anggota keluarga yang sudah mengalami demam tinggi sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa kondisinya. Dengan upaya cepat tanggap dari orang tua maka kejadian DBD dapat dicegah atau tingkat kematian akibat DBD dapat diturunkan karena penanganan yang tepat dan kondisi pasien yang belum parah (type I).

Tapi, sejumlah kasus akhir – akhir ini menunjukkan DBD tidak selalu muncul dengan gejala khasnya. yang muncul justru gejala – gejala lain yang tidak biasa, bahkan mirip penyakit lain. Sebagaimana rata-rata penyakit lain, gejala DBD juga sering tak nyata, bahkan oleh penglihatan medis sekalipun.

Tak cukup hanya dengan melihat gejala klinis belaka karena belum tentu tanda perdarahan kulit (petechiae, lebam) atau muntah darah, berak darah, selalu muncul pada setiap kasus. Cara satu-satunya untuk mengendus kemungkinan DBD agar tidak sampai kecolongan, ditempuh dengan cara pemeriksaan laboratorium darah. Sekurang-kurangnya menghitung sel pembeku darah (trombosit), Hb (hemoglobin), sel darah putih (leukosit), dan sel muda Ht (hematosit). Dari gambaran hasil pemeriksaan darah itu paling tidak bisa muncul kecurigaan atau bahkan sudah jelas keberadaan penyakitnya.

Diagnosis infeksi virus Dengue, selain dengan melihat gejala klinis, juga dilakukan dengan pemeriksaan darah di laboratorium. Pada Demam Berdarah Dengue, saat awal akan dijumpai jumlah leukosit (sel darah putih) normal, kemudian menjadi leucopenia (sel darah putih yang menurun) selama fase demam. Jumlah leukosit pada umumnya normal, demikian semua faktor pembekuan, tetapi saat epidemi/wabah dapat dijumpai trombositopenia (jumlah *trombosit* yang menurun). Enzim hati dapat meningkat ringan. Pada demam berdarah dengue (DBD), Pemeriksaan laboratorium menunjukkan *trombositopenia* dan hemokonsentrasi.

Peristiwa pitfall diagnosis atau kesalahan diagnosis penyakit DBD yang paling sering terjadi adalah demam *tifoid*, *faringitis akut* (infeksi tenggorok), *ensefalitis* (infeksi otak), campak, *flu* atau infeksi saluran napas lainnya yang disebabkan karena virus.

Dilihat dari aspek penderita dapat dilihat tentang gejala – gejala yang muncul yaitu :

Tanda atau gejala DBD yang muncul seperti bintik-bintik merah pada kulit. Selain itu suhu badan lebih dari 38°C, badan terasa lemah dan lesu, gelisah, ujung tangan dan kaki dingin berkeringat, nyeri ulu hati, dan muntah. Dapat pula disertai pendarahan seperti mimisan dan buang air besar bercampur darah serta turunnya jumlah *trombosit* hingga 100.000/mm³. Tidak perlu menunggu semua gejala ini muncul, bila menemukan beberapa tanda segera periksakan ke dokter atau sarana kesehatan terdekat.

Adapun Beberapa Pemeriksaan Laboratorium :

a). *Uji Rumpel Leede (RL)*

Pemeriksaan RL ditujukan untuk menilai ada tidaknya gangguan vaskuler. Perlu diingat bahwa bila uji ini positif tidak selalu disebabkan oleh virus *Dengue* saja, namun juga dapat oleh penyakit virus lainnya. Hasil dikatakan normal bila petekie pada bagian volar tangan (jangan dibaca pada lipatan siku) yang timbul dalam lingkaran berdiameter 5 cm yang terletak 4 cm di bawah lipatan siku berjumlah 5 atau kurang atau dalam diameter 2,8 inci terdapat petekie kurang dari 10.

b). *Kadar Hematokrit*

Peningkatan nilai *hematokrit* atau *hemokonsentrasi* selalu dijumpai pada DBD, merupakan indikator terjadinya perembesan plasma.

Hemokonsentrasi dapat dilihat dari peningkatan *hematokrit* di laboratorium PK RSUD Dr. Soetomo, wanita 35-45 %.

c). *Jumlah Trombosit*

Penurunan jumlah trombosit (*trombositopeni*) pada umumnya terjadi sebelum ada peningkatan hematokrit dan terjadi sebelum suhu turun. Dikatakan trombositopenia bila jumlah trombosit dibawah 100.000 / UI biasanya dapat dijumpai antara hari ketiga sampai ketujuh. Apabila diperlukan, pemeriksaan trombosit perlu diulang setiap hari sampai suhu turun.

Pemeriksaan *trombosit* dapat dihitung dengan cara direk dan indirek. cara direk dilakukan dengan menghitung jumlah *trombosit* dalam darah yang diencerkan menggunakan kamar hitung atau *blood cell counter*, sedangkan cara indirek (tidak langsung) bisa dilakukan dengan cara manual yaitu dengan menghitung trombosit dalam sejumlah lapangan pandang tertentu, biasanya 40 lapangan pandang dalam hapusan darah teppi (HDT) dan mengalikannya dengan 1000.

d). *Isolasi Virus*

Diagnosis pasti yaitu dengan cara isolasi virus *Dengue* dengan menggunakan kultur sel. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan isolasi virus adalah pengambilan spesimen yang awal biasanya dalam lima hari setelah timbulnya demam, penanganan spesimen serta pengiriman

spesimen yang baik kelaboratorium. Bahan untuk isolasi virus Dengue dapat berupa serum, plasma atau lapisan *buffy-coat* darah-heparimizet.

Derajat Beratnya DBD secara klinis sangat bervariasi, WHO (1997 dalam Widyastuti, 2005) membagi menjadi 4 derajat yaitu:

Derajat I:

Demam disertai gejala-gejala umum yang tidak khas dan manifestasi perdarahan spontan satu-satunya adalah uji *tourniquet positif*.

Derajat II :

Gejala-gejala derajat I, disertai gejala-gejala perdarahan kulit spontan atau *manifestasi* perdarahan yang lebih berat

Derajat III:

Didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit (< 20 mmHg), *hipotensi*, *sianosis* disekitar mulut, kulit dingin dan lembab, gelisah.

Derajat IV:

Syok berat (*profound shock*), nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur.

Kriteria Laboratorium:

Seseorang didiagnosa DBD jika hasil laboratorium menunjukkan hasil trombositopenia (<100.000/mm) dan peningkatan nilai hematokrit >20%, diagnosis DBD dipastikan dengan pemeriksaan *serologi* (*IHA*, *Imunoglobulin*) dan atau isolasi virus. Beberapa pemeriksaan laboratorium

yang dapat membantu diagnosis adalah: *hipoalbuminemia*, *hiponatremia*, peningkatan kadar *transaminase*, limfosit plasma biru (20-50 %).(Mansjor,2000)

Pemeriksaan *radiology* yang menunjang diagnosis:

1. Dilatasi pembuluh darah paru, efusi pleura, kardiomegali, dan *efusi perikard*.
2. *Hepatomegali*, dilatasi *vena hepatica*, cairan rongga *peritonium (ascites)* dan penebalan

Demam berdarah masih menjadi penyakit penyebab kematian yang harus diwaspadai. Biasanya penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk *aedes aegypti* ini berjang atau daur hidup nyamuk itu sendiri, penyakit mematikan ini dapat menyerang setiap saat tanpa mengenal musim. Menurunnya *trombosit* tidak selalu disebabkan DB, tetapi bisa juga penyakit lain, Seperti demam tifoid atau *chikungunya*. Penyebab trombosit rendah tidak selalu DB, tetapi bisa juga infeksi lain, seperti demam *tifoid* atau *chikungunya*. Sebab itu, perlu ada penatalaksanaan dalam menegakkan diagnosis apakah pasien itu terkena DB atau tidak misalnya, perlu pemeriksaan yang lengkap untuk mengetahui apakah pasien tersebut terkena DB.

Pemeriksaan yang dilakukan adalah tes hematokrit untuk mengetahui kekentalan darah, tes *trombosit*, tes *hemoglobin*, *leukosit* dan *serologi dengue*. Sebab pada saat terinfeksi virus dengue tidak harus ditandai dengan

turunnya trombosit, tetapi bisa dilihat dari turunnya leukosit. Selain itu pemeriksaan hati, ginjal, dan kadar gula darah pada diri pasien yang terkena virus dengue juga perlu dilakukan. Pada pasien dewasa perlu melakukan pemeriksaan lebih komplit lagi, seperti pemeriksaan hati, tes diabetes maupun ginjal. Sebab, virus dengue bisa menyerang sel-sel hati sehingga perlu juga mengecek fungsi hatinya. Ginjal pun harus diperiksa, katanya, mengingat orang yang diberi cairan dalam pengobatan jangan sampai mengganggu fungsi ginjalnya.(Leonard & Siswono ,2004)




BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Variabel independen (variable bebas) adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun variabel independent dalam penelitian ini ada enam yaitu promotif, preventif, kuratif dan diagnostik.

Variabel dependen (varriabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu derajat demam berdarah dengue.

Kerangka konsepnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Ket :




○ : Variabel Independen

○ : Variabel Dependen

B. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian secara keseluruhan dapat dilihat



C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Derajat Beratnya DBD secara klinis sangat bervariasi, dan terdiri dari 4 derajat yaitu:

Derajat I:

Demam disertai gejala-gejala umum yang tidak khas dan manifestasi perdarahan spontan satu-satunya adalah uji *tourniquet positif*.

Derajat II :

Gejala-gejala derajat I, disertai gejala-gejala perdarahan kulit spontan atau *manifestasi* perdarahan yang lebih berat (bintik-bintik merah dibawah kulit, mimisan, perdarah pada gusi, melena, nadi cepat dan lemah)

Derajat III:

Didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit (< 20 mmHg), *hipotensi*, *sianosis* disekitar mulut, kulit dingin dan lembab, gelisah.

Derajat IV:

Syok berat (*profound shock*), nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur.

2. *Promotif* yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasien maupun keluarga yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan seperti peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan olah raga secara teratur, istirahat yang cukup dan rekreasi.

Kriteria Objektif :

Baik : Bila skor ≥ 15

Kurang : Bila skor < 15

3. *Preventif* yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit DBD seperti melalui kegiatan 3M, Fogging, Abatisasi dsb

Kriteria Objektif :

Baik : Bila skor ≥ 20

Kurang : Bila skor < 20

4. *Kuratif* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang ditujukan terhadap penderita demam berdarah dengue. Seperti penggunaan obat Antipiretik, Antikonvulsan, Antibiotik, Dopamin, serta cairan kristaloid.

Kriteria Objektif :

Baik : Bila skor ≥ 9

Kurang : Bila skor < 9

5. Diagnostik sendiri yaitu suatu sarana pemeriksaan untuk menunjang diagnostik dan untuk memantau perjalanan / perkembangan penyakit (menentukan keparahan penyakit). Adapun pemeriksaan yang lengkap tersebut yaitu: kadar hematokrit, jumlah trombosit, dan isolasi virus.

Kriteria Objektif :

Baik : Jika pemeriksaannya lengkap dengan nilai ≥ 6

Kurang : Jika pemeriksaannya kurang lengkap dengan nilai < 6



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian *deskriptif* yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif, preventif, kuratif dan diagnostik dengan derajat DBD Dengue di Ruang rawat inap RSI Faisal Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini Insya Allah akan dilaksanakan di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar paada tanggal 19 Juli sampai 7 Agustus 2010.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sogiyono,2004). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita demam berdarah yang dirawat di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar. Angka kejadian DBD periode Januari-Maret sebanyak 129 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode *Aksidental sampling* yaitu suatu cara pengambilan sample yang dilakukan dengan kebetulan bertemu. Adapun sampel pada penelitian ini adalah pasien demam berdarah yang di rawat di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar yang memenuhi kriteria inklusi.

Kriteria Inklusi sebagai berikut :

- a) Pasien yang didiagnosa demam berdarah dengue.
- b) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar.
- c) Pasien demam berdarah dengue yang dirawat > 24 jam.
- d) Bersedia menjadi responden

Kriteria Eksklusi sebagai berikut :

- a) Pasien yang tidak didiagnosa demam berdarah dengue.
- b) Pasien yang tidak dirawat di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar.
- c) Pasien demam berdarah dengue yang dirawat < 24 jam.
- d) Tidak bersedia menjadi responden

D. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dengan observasi yaitu:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan lembar kuesioner kepada responden untuk mengetahui hubungan faktor Promotif dan preventif terhadap penanganan kasus demam berdarah.
2. Data tentang hubungan faktor kuratif dan diagnostik dilakukan observasi langsung dan rekam medik RSI Faisal Makassar.

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program SPSS Versi 17 .

Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk diteliti kelengkapan, kejelasan makna jawaban, konsistensi maupun kesalahan antar jawaban pada kuesioner.
- b. *Coding*, yaitu memberikan kode-kode untuk memudahkan proses pengolahan data.
- c. *Entry*, yaitu memasukkan data untuk diolah menggunakan komputer.
- d. *Tabulating*, yaitu mengelompokkan data sesuai variabel yang akan diteliti agar mudah dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.

E. Analisa Data

Analisa data dengan *analisis univariat* dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel, baik variabel bebas, variabel terikat dan karakteristik responden.

F. Etika Penelitian

Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan dengan manusia, maka segi etika harus diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Informed Consent


Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Beberapa informasi yang harus ada dalam informed consent tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, dan lain-lain.(Hidayat,2007).

b. Anonymity (tanpa nama)

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subbjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.(Hidayat,2007)

c. Kerahasiaan (confidentiality)

Masalah etika ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.(Hidayat,2007).



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptik*. Penelitian ini dilaksanakan di RSI Faisal Makassar Kabupaten Makassar dari tanggal 19 Juli sampai dengan 7 Agustus 2010. Penarikan sampel dengan cara *Accidental sampling* dengan jumlah sampel 30 orang yang mana terdiri dari 20 orang laki-laki dan 10 orang perempuan . Data diambil melalui lembar kuisisioner dan observasi yang langsung dilakukan pada responden.

Setelah data terkumpul, maka data tersebut disusun dalam master tabel data dan diolah dengan menggunakan komputer program SPSS versi 17. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa data Univariat. Analisis univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi yang berkenaan dengan karakteristik responden. Berdasarkan hasil pengelolaan data tersebut, disusunlah hasil-hasil yang diperoleh dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a. Distribusi Frekuensi Umur

Tabel 5.1

Distribusi frekuensi Responden berdasarkan kelompok Umur di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar Juli-Agustus 2010

Umur Responden	Frekuensi (n)	Persen %
17-27 tahun	18	59,8
28-40 tahun	12	40,2
Total	30	100.0

Sumber: Data primer 2010

Berdasarkan tabel 5.1 bahwa usia responden yang berumur 3-4 tahun sebanyak 13 orang (70,0%), dan responden yang berumur 5-6 tahun sebanyak 17 orang (30,0,5%).

a) Distribusi frekuensi Pendidikan

Tabel 5.2

Distribusi frekuensi responden berdasarkan Pendidikan di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persen %
SD	7	23,3
SLTP	8	26,7
SLTA	11	36,7
PERGURUAN TINGGI(Diploma, S1, dst)	4	13,3
Total	30	100

Sumber: Data primer 2010

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 7 orang (23,3%), responden yang berpendidikan SLTP sebanyak 8 orang (26,7%), responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 11 orang (36,7 %) dan responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang (13,3%).

b) Distribusi frekuensi faktor promotif

Tabel 5.3

Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue promotif di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar Juli-agustus 2010

Promotif	Frekuensi (n)	Persen %
Baik	27	90,0
Kurang	3	10,0
Total	30	100.0

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.3 responden yang baik penanganan kasus demam berdarah dengan promotif ada 27 orang (90,0%) yang kurang 3 orang (10,0%)

c) Distribusi Frekuensi Faktor Preventif

Tabel 5.4

Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue dengan preventif di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar Juli-agustus 2010

Preventif	Frekuensi (n)	Persen %
Baik	27	90,0
Kurang	3	10,0
Total	30	100.0

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.4 responden yang baik berdasarkan penanganan kasus DBD faktor preventif 27 orang (90,0%) dan yang kurang 3 orang (10,0%).

Tabel 5.5

Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue dengan kuratif di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar Juli-agustus 2010

Kuratif	Frekuensi (n)	Persen %
Baik	4	13,3
Kurang	26	86,7
Total	30	100.0

Sumber : Data primer 2010

Berdasarkan tabel 5.5 responden yang baik penanganan kasus DBD faktor kuratif 4 orang (13,3%) dan yang kurang 26 orang (86,7%).

Tabel 5.6

Distribusi Frekuensi responden berdasarkan faktor penanganan kasus demam berdarah dengue dengan diagnostik di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar Juli-agustus 2010

Kuratif	Frekuensi (n)	Persen %
Baik	30	100,0
Total	30	100.0

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan table 5.6 penanganan kasus demam berdarah dengue dengan diagnostik pada setiap responden baik.

Tabel 5.7

Distribusi frekuensi responden berdasarkan derajat demam berdarah di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar Juli-agustus 2010

Derajat	Frekuensi (n)	Persen %
I	25	83,3
II	4	13,3
III	1	3,3
Total	30	100,0

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan table 5.6 penanganan kasus demam berdarah dengue dengan diagnostik pada setiap responden baik.

Crosstab

Promotif *Derajat DBD

Promotif	Derajat demam berdarah dengue			Total
	I (gejala 1-2)	II (gejala 1-7)	III (gejala 1-10)	
Kurang	2	1	0	3
Baik	23	3	1	27
Total	25	4	1	30

Preventif*Derajat DBD

Preventif	Derajat demam berdarah dengue			Total
	I (gejala 1-2)	II (gejala 1-7)	III (gejala 1-10)	
Kurang	1	2	0	3
Baik	24	2	1	27
Total	25	4	1	30

Kuratif*Derajat DBD

Kuratif	Derajat demam berdarah dengue			Total
	I (gejala 1-2)	II (gejala 1-7)	III (gejala 1-10)	
Kurang	24	2	0	26
Baik	1	2	1	4
Total	25	4	1	30

Diagnostik*Derajat DBD

Diagnostik	Derajat demam berdarah dengue			Total
	I (gejala 1-2)	II (gejala 1-7)	III (gejala 1-10)	
Baik	25	4	1	30
Total	25	4	1	30

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif dengan derajat demam berdarah dengue.

Dari hasil penelitian didapatkan adanya gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif dengan derajat demam berdarah dengue. Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa hanya sebagian kecil dari 30 responden ada 27 orang yang melakukan penanganan demam berdarah promotif dengan baik dan 3 orang yang kurang. Dari 27 orang tersebut ada 23 orang yang hanya menderita DBD pada derajat I, 3 orang pada derajat II dan 1 orang pada derajat III.

Adapun pengertian promotif yaitu usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olah raga secara teratur, istirahat yang cukup dan rekreasi sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal.(Effendy,1998).

Promotif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasien maupun keluarganya yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan seperti mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang penyakit agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pencegahan DBD.

Menurut penulis, salah satu yang menjadi kunci keberhasilan dari usaha yang dilakukan adalah adanya kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri sehingga tercipta perilaku hidup sehat yang dengan sendirinya kebersihan lingkungan bukan lagi menjadi impian tetapi menjadi keharusan sehingga segala macam penyakit yang disebabkan oleh kurangnya keberhasilan lingkungan akan hilang secara perlahan-lahan. Jadi paradigma kesehatan masa datang adalah menjadi penting untuk menekankan akan pentingnya membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi setiap pribadi karena hal itu akan menjadi dasar untuk terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan.

2. Gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan preventif dengan derajat demam berdarah dengue.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat adanya gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan preventif dengan derajat demam berdarah dengue.

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa, dari 30 responden terdapat 27 orang (90,0%) melakukan penanganan kasus demam berdarah dengue preventif dengan baik. Dari 27 orang tersebut ada 24 orang (80,0%) menderita demam berdarah dengue derajat I, 2 orang (6,7%) menderita demam berdarah dengue derajat II, dan 1 orang (3,3%) menderita demam berdarah dengue derajat III.

Preventif atau pencegahan adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah.(Effendy, 1998). Pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Sasaran dalam pencegahan ditujukan pada sumber penularan lingkungan serta faktor penjamu.(Syahrudin,2007).

Preventif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh responden untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue seperti melakukan 3M, fogging, abatisasi dan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah.

.Untuk memutuskan rantai penularan, pemberantasan vektor dianggap cara yang paling memadai. Ada dua cara pemberantasannya:

- 1) Menggunakan Insektisida

Yang lazim dipakai dalam program pemberantasan DBD adalah malathion untuk membunuh nyamuk dewasa (*adultsida*) dan temephos (abate) untuk membunuh jentik (*Larvasida*).

- 2) Tanpa insektisida

Penyakit DBD menggunakan air sebagai penghubung vektor maka strategi pencegahan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki pengelolaan air permukaan, memusnahkan tempat

serangga berkembang biak dengan cara 3M (Adnan, 2004). Strategi pencegahan lain yaitu dengan mengurangi keperluan pergi ke tempat perindukan. Isolasi penderita agar tidak digigit nyamuk dengan cara memakai obat nyamuk maupun memakai kelambu dapat mencegah gigitan nyamuk.

Meski banyak responden yang memilih dan melakukan pencegahan DBD tetapi masih ada juga sebagian dari responden yang tidak menjalankannya secara rutin.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnan 2004, bahwa hampir semua responden yang ia teliti akan menjaga kebersihan lingkungan dan pribadi (94%) sebagai cara untuk tetap sehat merupakan bukti bahwa tingginya kesadaran akan pencegahan penyakit dan yang memilih selainnya itu sedikit sekali (6%). Selain itu juga nampak bila ada responden yang sakit maka hampir semua responden segera berobat ke dokter, meskipun ada 4% yang memilih untuk menunggu sampai penyakitnya parah baru ke dokter.

Menurut penulis, salah satu kunci agar terhindar dari penyakit DBD adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan menjalankan program 3M, Fogging dan beberapa pemberantasan DBD yang lainnya serta menghindari gigitan nyamuk DBD (*Aedes Aegypti*). Selain itu, penulis berharap agar seseorang yang menderita gejala DBD agar segera memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan

untuk mendapatkan penanganan segera agar penyakit DBD yang diderita tidak bertambah parah.

3. Gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan kuratif dengan derajat demam berdarah dengue

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat adanya gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan kuratif dengan derajat demam berdarah.

Gambaran yang dapat dilihat yaitu dari 30 responden ada 4 orang (13,3%) yang baik pengobatannya dan 26 orang (86,7%) yang kurang. Selanjutnya dari 4 orang yang baik pengobatannya tersebut ada 1 orang (3,3%) menderita demam berdarah dengue derajat I, 2 orang (6,7%) pada derajat II, dan 1 orang (3,3%) yang menderita derajat III.

Hal ini memberikan gambaran tentang kurangnya pengobatan yang dapat mengobati DBD secara tepat karena pengobatan DBD hanyalah bersifat simptomatik saja yaitu hanya meringankan gejala dari penyakit saja.

Adapun pengertian kuratif adalah usaha yang ditujukan terhadap orang yang sakit untuk dapat diobati secara tepat dan adekuat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya.(Effendy,1998).

Apabila hematokrit meningkat lebih dari 20% dari data dasar, maka hal ini merupakan indikator, adanya kebocoran plasma dan sebaiknya penderita dirawat dengan diberikan infus kristaloid maupun elektrolit. Pada kasus derajat I dan II, cairan pengganti dapat diberikan pada penderita rawat jalan di pusat rehidrasi selama kurun waktu 12 – 24 jam. Dalam banyak kasus, demam berdarah cukup ditangani dengan pemberian infus cairan. Transfusi darah diberikan jika terjadi perdarahan saluran cerna erat, Hb dan hematokrit turun secara periodik terus menerus sementara keadaan umum penderita semakin menurun. (Soegijanto, 1996).

Adapun pada penanganan renjatan pada penderita DBD juga sangat perlu mendapat perhatian karena merupakan kondisi yang sangat parah dari DBD, angka kematian akan meninggi bila renjatan tidak ditanggulangi secara dini dan adekuat. Dasar penanggulangan renjatan pada DBD ialah volume replacement atau penggantian cairan intravaskuler yang hilang sebagai akibat dari kerusakan dinding kapiler yang menimbulkan peninggian permeabilitas sehingga mengakibatkan plasma leakage.

Prinsip pengobatan dengue shock syndrome :

- a) Atasi segera hipovolemia
- b) Lanjutkan penggantian cairan yang masih terus keluar dari pembuluh darah selama 12-24 jam, atau paling lama 48 jam.

- c) Koreksi keseimbangan asam basa
- d) Beri darah segar bila ada perdarahan hebat.

Mengatasi renjatan (Volume replacement)

- a) Jenis cairan

Sebaiknya diberikan cairan kristaloid yang isotonis atau sedikit hipertenis seperti:

- a. Ringer laktat
- b. Glukose 5% dalam half strength NaCl 0,9%
- c. RL – DS; dapat dibuat dengan jalan mengeluarkan 62,5 cc
- d. NaCl 0,9%: D10, aa ditambahkan Natrium Bikarbonat 7,5% sebanyak 2cc/kg.bb

Plasma/Plasma ekspander

- a. Diperlukan pada penderita renjatan berat, atau pada penderita yang tidak segera mengalami perbaikan dengan cairan kristaloid di atas
- b. Bila dapat cepat disiapkan, diberikan sebagai pengganti cairan a.1, setelah itu cairan pertama dilanjutkan lagi
- c. Setelah pemberian cairan a.1, nilai hematokrit masih tinggi dan hitung trombosit masih rendah
- d. Dosis yang diberikan 10-20 ml/kg.bb dalam waktu 1-2 jam

e. Apabila nadi/tekanan darah masih jelek atau hematokrit masih tinggi, dapat ditambahkan plasma 10 ml/kg.bb setiap jam sampai total 40 ml/kg.bb.

Plasma ekspander yang dapat digunakan ialah :

- 1) Plasbumin (Human Albumin 25%)
- 2) Plasmanate (Plasma Protein Fraction 5%)
- 3) Plasmfuchsin
- 4) Dextran L 40

b). Dosis/kecepatan pemberian cairan :

Dosis yang biasanya diberikan ialah 20-40 ml/kg.bb, diberikan secepat mungkin dalam waktu 1-2 jam. Untuk renjatan yang tidak berat, cairan diberikan dengan kecepatan 20 ml/kg.bb/jam dan dapat diulangi hingga dua kali, bahkan bila vena kolaps dimana kecepatan pemberian yang diharapkan tidak dapat dicapai, maka dalam hal ini diberikan dengan semprit secara cepat sebanyak 100-200 ml. Untuk menentukan geyur tidaknya pemberian cairan, maka dilakukan pengukuran Central Venous Pressure (CVP/JVP) dengan pemasangan kateter vena centralis biasanya pada vena Basilica lengan kiri atau kanan ; apabila CVP/JVP kurang dari 5 cm maka cairan diberikan dengan tetesan cepat/diguyur. Pemberian ini dilanjutkan sampai CVP 5 cm, kemudian CVP dipertahankan antara 5-8 cm H₂O. Selanjutnya tranfusi darah :

- 1) Sebaiknya darah segar
- 2) Perdarahan hebat baik hematemesis/melena atau epistaksis yang memerlukan tamponade.
- 3) 24-48 jam setelah pengobatan syok anak jatuh dalam syok lagi, walaupun belum terlihat perdarahan
- 4) Hematokrit rendah (<35-40%) tetapi anak masih syok
- 5) Dosis 10-20 ml/kg.bb, dapat ditambah bila perdarahan berlangsung terus. (Rampengan, 1992).

Tidak ada terapi spesifik untuk demam berdarah. Tidak ada obat untuk penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan belum ada vaksin yang dianggap sempurna mengandung antigen virus dengue untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue (DBD). Pada dasarnya pengobatan demam berdarah dengue (DBD) bersifat suportif dan simptomatik dengan tujuan utama memperbaiki sirkulasi, mengatasi hipovolemi serta mencegah terjadinya DIC dan renjatan. Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang mengeluh demam dan badan terasa ngilu dapat diberikan obat antipiretik Parasetamol. Obat penurun panas seperti salisilat sebaiknya tidak diberikan sebab obat ini dapat menyebabkan perdarahan dan asidosis. Pada fase demam penderita dianjurkan untuk banyak minum minimal 1,5 – 2 liter air selama 24 jam, bisa berupa air dicampur gula seperti teh, susu, sirup, atau air buah dan oralit. (Soegijanto, 1996).

Meskipun pengobatan demam berdarah hanya bersifat simptomatik saja namun pengobatan seperti itu akan mampu meringankan gejala penyakit yang dirasakan oleh penderita.

Nabi saw bersabda:

إِنَّ كَلَّاءَ دَوَاءٍ

Artinya :

“Setiap penyakit ada obatnya (penawarnya).”

Hadits tersebut berlaku umum, yaitu untuk semua jenis penyakit mematikan dan penyakit yang di luar kemampuan para dokter, sebab bisa jadi Allah telah menciptakan obat untuk suatu penyakit, tetapi ilmu manusia tidak dapat menjangkaunya, karena manusia tidak memiliki ‘ilmu mencipta’, kecuali yang telah diberikan Allah pada manusia.

Karena itu, Nabi saw memosisikan kedudukan antara obat dan penyakit yang saling berlawanan, dan tidak ada sesuatu dari makhluk di bumi ini yang tidak berlawanan. Jadi setiap penyakit memiliki lawan dari obat, agar tidak melepaskan diri dari tawakkal kepada Allah.(Mahir,2007).

Oleh karena pengobatan DBD hanya simptomatik maka satu-satunya jalan untuk menghindari agar tak bertambah parah yaitu

dengan memberikan minum yang banyak kepada penderita untuk mencegah kekurangan cairan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengobatan DBD yang hanya bersifat simptomatik maka penulis berharap agar penderita DBD sebaiknya diberikan cairan baik dengan bantuan cairan kristaloid yang diberikan di RS maupun dengan pemberian minum yang banyak untuk mencegah kekurangan cairan.

4. Gambaran penanganan kasus demam berdarah dengue dengan diagnostik dengan derajat demam berdarah dengue

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat adanya gambaran penanganan kasus demam berdarah dengan diagnostik dengan derajat demam berdarah dengue. Hal ini dapat memberikan gambaran betapa pentingnya suatu pemeriksaan diagnostik bagi setiap penderita. Artinya, untuk mendiagnosis penyakit DBD baik derajat I sampai derajat IV semuanya pasti memerlukan pemeriksaan diagnostik seperti pemeriksaan hematokrit, trombosit, isolasi virus maupun serologi akan dilakukan karena dengan pemeriksaan tersebut suatu penyakit akan mudah diketahui.

Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian, dari 30 responden 25 orang (83,3%) yang menderita demam berdarah derajat I, 4 orang (13,3%) pada derajat II, dan 1 orang (3,3%) pada derajat III. Dengan adanya pemeriksaan diagnostik diharapkan dapat membantu

meringankan mempercepat penanganan kasus demam berdarah dengue agar tidak bertambah parah.

Diagnostik adalah suatu sarana pemeriksaan untuk menskrining penderita demam berdarah dengue. Melalui pemeriksaan kadar hematokrit, jumlah trombosit, isolasi virus dan pemeriksaan serologi.(Soegijanto,2006).

Penatalaksanaan terhadap kasus DBD tidak lepas dari kecermatan dalam menentukan diagnosis dan kondisi (fase) kasus DBD (kasus suspek DBD, kasus DBD tanpa perdarahan dan tanpa syok, kasus DBD dengan perdarahan tanpa syok, sampai dengan syok tanpa perdarahan.

Penatalaksanaan pada kasus tersangka DBD dapat dipakai sebagai petunjuk dalam memberikan pertolongan pertama kepada pasien DBD atau pasien yang diduga DBD di puskesmas, poliklinik, atau di instalasi gawat darurat rumah sakit dan sejenisnya disamping dapat dipakai sebagai petunjuk untuk memutuskan apakah pasien yang bersangkutan memerlukan rawat inap atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya.

Pada fase awal, manifestasi perdarahan mungkin belum nampak dan hasil pemeriksaan darah tepi (kadar hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht) dan hitung trombosit) juga belum menunjukkan kelainan atau masih dalam batas-batas normal. Keadaan semacam itu

sulit dibedakan dengan penyakit infeksi lain. Perubahan manifestasi klinis dan laboratories mungkin terjadi dari suatu saat ke saat berikutnya. Dalam kondisi meragukan semacam itu diperlukan pemeriksaan atau observasi lebih lanjut. Penetapan diagnosis pada seleksi pertama didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laboratoris (Hb, Ht, jumlah trombosit).

Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin dan merupakan kalam Ilahi yang didalamnya berisi tentang ajaran-ajaran dan pedoman bagi kaumnya dalam mengarungi bahtera kehidupan dan segala ujian di dunia ini.

Sebagaimana firman Allah SWT :

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahannya :

Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami Telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.(Q.S.Al-'Ankabut/29:51)

Maksud dari ayat tersebut diatas adalah Allah swt telah menurunkan

Al-Quran sebagai pelajaran hidup bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan duniawi, bukan hanya pelajaran agama tapi juga dalam dunia kesehatan.

Menurut penulis, pemeriksaan diagnostik sangat membantu pelayanan dan penanganan penyakit oleh karena itu diharapkan agar penderita DBD segera dibawa ke RS untuk menjalani pemeriksaan agar segera diketahui apakah penderita tersebut benar-benar menderita DBD atau tidak.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Perubahan musim yang sudah tidak teratur, sehingga peneliti mengalami kendala dalam mencukupi sampelnya
2. Pengetahuan peneliti tentang analisis hasil penelitian masih kurang, sehingga banyak kendala yang ditemukan dalam menganalisa hasil penelitian

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan kasus demam berdarah dengue dengan promotif memberikan dampak positif terhadap derajat DBD yaitu penderita pada derajat I lebih banyak dibandingkan derajat II dan III
2. Penanganan kasus demam berdarah dengue dengan preventif memberikan dampak positif terhadap derajat DBD yaitu penderita pada derajat I lebih banyak dibandingkan derajat II dan III
3. Penanganan kasus demam berdarah dengue dengan kuratif memberikan dampak yang kurang baik terhadap derajat DBD.
4. Penanganan kasus demam berdarah dengue dengan diagnostik memberikan dampak positif terhadap derajat DBD yaitu rata pemeriksaan diagnostik pada pasien dapat membantu pelayanan penanganan pada penderita.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan kepada :

1. Instansi kesehatan

Diharapkan bagi petugas kesehatan agar kiranya dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berupa informasi tentang DBD khususnya

pencegahannya, serta pemeriksaan laboratorium dan pemberian obat yang tepat agar dapat mempercepat penanganan kasus demam berdarah.

2. Instansi pendidikan

Diharapkan agar skripsi dapat menjadi bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi tenaga perawat

Diharapkan bagi tenaga perawat agar dapat membantu dalam penanganan pasien khususnya pada penyakit DBD serta saat melaksanakan tugas keperawatan dapat memberikan pendidikan kesehatan tentang DBD kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Adnan.2004.*Upaya pencegahan demam berdarah dengue dengan metode 3M oleh masyarakat di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*.Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas. UNHAS
- Basuki Hargo.2008. *Upaya Pencegahan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Talian Dolok*.Diakses:April 2010.<http://hargo.b.blog.friendster.com/2008/09/upaya-pencegahan-pemberantasan-demam-berdarah-dengue-di-kecamatan-talian-dolok/>
- Blogspot.2009. *Kemiripan penyakit DBD dengan penyakit lainnya*. Diakses: Februari 2010.http://aa-dbd.blogspot.com/2009/12/01_archive.html
- Depkes.2009.<http://m.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=3638> 5 Desember 2009
- Depkes.*Tatalaksana DBD*.Diakses:Februari 2010.<http://www.depkes.go.id/downloads/Tata%20Laksana%20DBD.pdf>
- Dunia Kesehatan.[http://www.dunia-kesehatan.com/index.php?option=com_content&task=view & id =68&Itemid=59](http://www.dunia-kesehatan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=59)
- Djunaedi, Djoni.2006. *Demam berdarah*. Malang: UMM Press
- Entjang,Indan.2003.*Mikrobiologi dan Parasitologi untuk Akademi Keperawatan dan sekolah tenaga kesehatan yang sederajat*.Bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- Effendy,Nasrul.1998.*Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat Edisi 2*.Jakarta:EGC
- Handojo, Indro.2003. *Imunosasi Terapan pada Beberapa Penyakit Infeksi*. Surabaya : Airlangga University Press
- Hidayat,Alimul.AA.2007.*Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*.Jakarta:Salemba Medika
- Mahmud, Mahir Hasan.2007.*Mukjizat Kedokteran Nabi*.Jakarta:Qultummedia

- Muhammad ibn Hambal: 1998. *Musnad Ahmad*. Bairut Lebanon: 'Alam al-Kutub.
- Muhammad ibn Isa al-Turmuzi, t.th.: *Sunan al-Turmuzi*. Bairut Lebanon: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari: 1987, *Shahih al-Bukhari*. Bairut Lebanon: Dar Ibnu Kastir.
- Muhammad ibn Yazid al-Qazwini: t.th.: *Sunan Ibn Majah*. Bairut Lebanon: Dar al-Fikr.
- Nasronuddin. 2009. *Demam berdarah penyakit musiman yang kian mewabah*. http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=54
- Neeladri.2006.*Aedes Aegypti*.Diakses Februari 2010. <http://neeladri.files.wordpress.com/2006/10/aedes-aegypti>.
- Nurrhikmahhanik.2009.<http://nurrokhimahhanik.blogspot.com/>
- Nursalam.2009.*Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*.Jakarta:Salemba Medika
- Rahim, Hasan. 2008. Skripsi *Faktor-faktor yang berhubungan dengan perdarahan spontan pada anak dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) di Ruang Perawatan Anak BPRSD. SALEWANGANG Maros. FK UNHAS* tidak diterbitkan.
- Rampengan, TH dan Laurentz.1992.*Penyakit Infeksi Tropik pada Anak*.Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Soedarmo,Sumarmo Sunaryo Poorwo.2005.*Demam berdarah dengue pada anak*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soegijanto, Soegeng.2006.*DEMAM BERDARAH DENGUE EDISI 2*.Surabaya : Airlangga University
- Sugiyono.2009.*Statistika untuk Penelitian*.Bandung:Alfabeta
- Syahrudin.2007.*Skripsi Hubungan tingkat pengetahuan dengan tindakan pencegahan penyakit demam berdarah pada keluarga di dusun Barambang desa Bonto Matenne Kec.Mandai Kab. Maros. FK-UNHAS* tidak diterbitkan.

WHO.1999.*Demam Berdarah Dengue Edisi 2*.Jakarta:EGC

PressWordpress.<http://keperawatan.kita.wordpress.com/tag/demam/>





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i)
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aliyah

Nim : 70300106013

Adalah mahasiswi program studi S.1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang akan mengadakan penelitian tentang “ Hubungan Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue dengan Derajat Demam Berdarah Dengue di Ruang Rawat Inapa RSI Faisal Makassar “. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menekan penyebaran penyakit demam berdarah.

Untuk itu kami mohon partisipasi Bapak/Ibu/Sdr. Semua data yang dikumpulkan akan dirahasiakan dan tanpa nama. Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Bila Bapak/Ibu/Sdr berkenan menjadi responden, silakan menanda tangani pada tempat yang telah disediakan. Atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr, saya ucapkan terima kasih.

Makassar, Juli 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Peneliti

Lampiran 2

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh :

N a m a : Nur Aliyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Yang berjudul “**Gambaran Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue dengan Derajat Demam Berdarah Dengue di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar**”. Tanda tangan saya dibawah ini menunjukkan saya telah diberi informasi dan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Makassar, - - 2010

Responden

(.....)

Tanda tangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**A. FAKTOR PENANGANAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE
DENGAN PROMOTIF**

Pilihlah jawaban yang paling benar menurut pendapat anda dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang tersedia

1. Apakah anda pernah ikut penyuluhan DBD jika ada ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
2. Apakah anda pernah mendengar tentang DBD ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
3. Apakah anda pernah mendengar bahwa nyamuk DBD menggigit pada waktu pagi dan sore ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
4. Apakah anda pernah diberitahu oleh petugas kesehatan/siapa saja bahwa salah satu gejala DBD itu adalah demam selama 2-7 hari ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
5. Setelah mengikuti penyuluhan apakah anda menjalankan program 3M ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
6. Setelah mengikuti penyuluhan apakah anda melaksanakan abatisasi ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
7. Apakah anda pernah mendengar / mendapat informasi bahwa salah satu gejala DBD adalah munculnya bintik-bintik merah pada kulit?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah


8. Apakah anda pernah mendengar bahwa salah satu cara untuk mencegah DBD adalah menggunakan kelambu pada waktu tidur ?
- a. Pernah b. Tidak pernah
9. Apakah anda pernah pernah mendengar informasi bahwa salah satu cara memberantas sarang nyamuk yaitu melakukan 3M?
- a. Pernah b. Tidak pernah
10. Apakah anda pernah mendengar bahwa fogging adalah salah satu cara memberantas sarang nyamuk DBD ?
- a. Pernah b. Tidak pernah

**B. FAKTOR PENANGANAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE
DENGAN PREVENTIF**

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat anda dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang menurut anda benar.

1. Apakah anda mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
2. Apakah anda pernah melakukan abatisasi ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Seringkah anda menguras bak mandi anda setiap 2 kali seminggu?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Jika tidur apakah anda menggunakan kelambu / anti nyamuk (bakar/oles)?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
5. Apakah anda sering menutup tempat penampungan air anda(Ember/Drum) setiap selesai mengambil air ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
6. Apakah anda menggantung pakaian kotor diruangan atau kamar yang gelap ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

7. Apakah anda menutup tempat sampah anda ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
8. Jika ada petugas Fogging yang datang ke rumah anda apakah anda pernah mengizinkannya masuk kedalam rumah anda?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
9. Apakah setiap demam anda segera memeriksakan diri / anggota keluarga anda ke pelayanan kesehatan ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
10. Apakah anda / anggota keluarga anda memberikan obat penurun panas dulu dan memberikan air minum yang banyak sebelum memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah



**C. FAKTOR – FAKTOR PENANGANAN KASUS DEMAM BERDARAH
DENGUE DENGAN KURATIF**

LEMBARAN OBSERVASI

Penanganam kasus demam berdarah dengue dengan kuratif

No. Kode Responden :

Tanggal Observasi : - - 2010

No	Kriteria Observasi	Ya	Tidak	Skor
1.	Antipiretik: golongan parasetamol atau obat-obatan penurun panas yang tidak mengganggu fungsi hati			
2.	Antikonvulsan: fenobarbital, diazepam, largaktil			
3.	Antibiotik: ampisilin, sefalosporin, kloksasilin			
4.	Dopamin: dobutamin			
5.	Cairan kristaloid: D5-Ringer laktat (kalau mungkin D5-Ringer acetate.			
6.	Cairan kriistaloid: D5-Saline 0,9			

**D. FAKTOR-FAKTOR PENANGANAN KASUS DEMAM BERDARAH
DENGUE DENGAN DIAGNOSTIK**

LEMBARAN OBSERVASI

Penanganam kasus demam berdarah dengue dengan diagnostik

No. Kode Responden :

Tanggal Observasi : - - 2010

No	Kriteria Observasi	Ya	Tidak	Skor
1	Pemeriksaan kadar hematokrit			
2	Pemeriksaan jumlah trombosit			
3	Isolasi virus			
4	Pemeriksaan Serologi			

E. OBSERVASI DERAJAT KLINIS DEMAM BERDARAH DENGUE
(Check list)

No.	Keadaan Pasien	Ada	Tidak ada
1.	Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$		
2.	Tourniquet test positif		
3.	Bintik-bintik merah dibawah kulit (Sebagian atau seluruh tubuh)		
4.	Mimisan (Epistaksis)		
5.	Perdarahan pada gusi		
6.	Berak darah (Melena)		
7.	Nadi cepat dan lemah		
8.	Tekanan nadi menurun $< 20\text{ mmHg}$		
9.	Akral dingin		
10.	Gelisah		
11.	Nadi tidak dapat diraba		
12.	Tekanan darah tidak terukur		

Kesimpulan :

- a. Derajat I : Poin 1 dan 2 ada
 b. Derajat II : Poin 1 sampai 7 ada
 c. Derajat III : Poin 1 sampai 10 ada
 d. Derajat IV : Seluruh poin diatas ada

RIWAYAT HIDUP



Nur aliyah, lahir di Kanang 27 Agustus 1988 Polman, Sulawesi Barat. Penulis adalah anak ke-6 dari empat bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan H. M. Idrus Husain dan Hj. Sitti Rapisah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tahun 1994, yaitu di SDN 12 Kanang Kab. Polman. Kemudian lanjut ke bangku SLTP tepatnya SLTP Negeri 2 Polewali Kab. Polman. Dan pada tahun 2003 penulis melanjutkan tingkat SMU di SMA Negeri 2 Polewali Kab. Polman sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna seutuhnya, namun harapan penulis kedepannya semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan serta perbandingan bagi penelitiannya selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“ JADILAH INSAN YANG BERBAKTI PADA AGAMA, NUSA DAN BANGSA”

ALA UDDIN
M A K A S S A R

VARIABLES=UMUR PENDIDIKAN PROMOTIF PREVENTIF KURATIF DIAGNOSTIK
 DERAJATDEMAMBERDARAH
 /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
 /ORDER= ANALYSIS .

Frequencies

[DataSet0]

Statistics

		UMUR	PENDIDIKAN	PROMOTIF	PREVENTIF	KURATIF	DIAGNOSTIK	DERAJATDEMAMBERDARAH
N	Valid	30	30	30	30	30	30	
	Missing	0	0	0	0	0	0	
Mean		27.5667	2.4000	1.9000	1.9000	1.1333	2.0000	1.
Median		27.0000	2.5000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	1.
Mode		25.00 ^a	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	
Minimum		17.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	
Maximum		40.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17.00	1	3.3	3.3	3.3
	19.00	1	3.3	3.3	6.7
	20.00	2	6.7	6.7	13.3
	21.00	1	3.3	3.3	16.7
	22.00	1	3.3	3.3	20.0
	23.00	2	6.7	6.7	26.7
	24.00	1	3.3	3.3	30.0
	25.00	4	13.3	13.3	43.3
	26.00	1	3.3	3.3	46.7
	27.00	4	13.3	13.3	60.0
	28.00	3	10.0	10.0	70.0
	32.00	1	3.3	3.3	73.3
	33.00	1	3.3	3.3	76.7
	34.00	1	3.3	3.3	80.0
	35.00	2	6.7	6.7	86.7
	36.00	1	3.3	3.3	90.0
	37.00	1	3.3	3.3	93.3
	38.00	1	3.3	3.3	96.7
	40.00	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NEGERI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	7	23.3	23.3	23.3
	SLTP	8	26.7	26.7	50.0
	SLTA	11	36.7	36.7	86.7
	PERGURUAN TINGGI	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

PROMOTIF

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	3	10.0	10.0	10.0
	BAIK	27	90.0	90.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

PREVENTIF

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	3	10.0	10.0	10.0
	BAIK	27	90.0	90.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

KURATIF

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	26	86.7	86.7	86.7
	BAIK	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

DIAGNOSTIK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK	30	100.0	100.0	100.0

DERAJATDEMAMBERDARAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DERAJAT 1-2	25	83.3	83.3	83.3
	DERAJAT 1-7	4	13.3	13.3	96.7
	DERAJAT 1-9	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

CROSSTABS

```
/TABLES=PROMOTIF PREVENTIF KURATIF DIAGNOSTIK BY  
DERAJATDEMAMBERDARAH  
/FORMAT= AVALUE TABLES  
/STATISTIC=CHISQ CC PHI LAMBDA UC CORR  
/CELLS= COUNT ROW  
/COUNT ROUND CELL .
```

Crosstabs

[DataSet0]

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PROMOTIF * DERAJATDEM AMBERDARAH	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%
PREVENTIF * DERAJATDEM AMBERDARAH	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%
KURATIF * DERAJATDEM AMBERDARAH	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%
DIAGNOSTIK * DERAJATDEM AMBERDARAH	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

PROMOTIF * DERAJATDEMAMBERDARAH

Crosstab

			DERAJATDEMAMBERDARAH			Total
			DERAJAT 1-2	DERAJAT 1-7	DERAJAT 1-9	
PROMOTIF	KURANG	Count	2	1	0	3
		% within PROMOTIF	66.7%	33.3%	.0%	100.0%
	BAIK	Count	23	3	1	27
		% within PROMOTIF	85.2%	11.1%	3.7%	100.0%
Total		Count	25	4	1	30
		% within PROMOTIF	83.3%	13.3%	3.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.222 ^a	2	.543
Likelihood Ratio	1.068	2	.586
Linear-by-Linear Association	.253	1	.615
N of Valid Cases	30		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.	
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.000	.000	. ^c	. ^c	
		PROMOTIF Dependent	.000	.000	. ^c	. ^c	
		DERAJATDEMAMBER DARAH Dependent	.000	.000	. ^c	. ^c	
	Goodman and Kruskal tau	PROMOTIF Dependent	.041	.093		.554 ^c	
		DERAJATDEMAMBER	.027	.070		.461 ^c	
		DARAH Dependent					
	Uncertainty Coefficient	Symmetric	PROMOTIF Dependent	.041	.077	.521	.586 ^c
			DERAJATDEMAMBER	.055	.102	.521	.586 ^c
		DARAH Dependent	PROMOTIF Dependent	.033	.063	.521	.586 ^c
DERAJATDEMAMBER							

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.
- Based on chi-square approximation
- Likelihood ratio chi-square probability.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.202			.543
	Cramer's V	.202			.543
	Contingency Coefficient	.198			.543
Interval by Interval	Pearson's R	-.093	.187	-.496	.624 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-.139	.219	-.741	.465 ^c
N of Valid Cases		30			

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- Based on normal approximation.

PREVENTIF * DERAJATDEMAMBERDARAH

Crosstab

			DERAJATDEMAMBERDARAH			Total
			DERAJAT 1-2	DERAJAT 1-7	DERAJAT 1-9	
PREVENTIF	KURANG	Count	1	2	0	3
		% within PREVENTIF	33.3%	66.7%	.0%	100.0%
	BAIK	Count	24	2	1	27
		% within PREVENTIF	88.9%	7.4%	3.7%	100.0%
Total		Count	25	4	1	30
		% within PREVENTIF	83.3%	13.3%	3.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.222 ^a	2	.016
Likelihood Ratio	5.563	2	.062
Linear-by-Linear Association	3.096	1	.078
N of Valid Cases	30		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.125	.394	.302	.763
		PREVENTIF Dependent	.000	.667	.000	1.000
		DERAJATDEMAMBERDARAH Dependent	.200	.310	.581	.562
Goodman and Kruskal tau		PREVENTIF Dependent	.274	.248		.019
		DERAJATDEMAMBERDARAH Dependent	.208	.193		.002
		Uncertainty Coefficient				
		Symmetric	.216	.181	1.086	.062
		PREVENTIF Dependent	.285	.231	1.086	.062
		DERAJATDEMAMBERDARAH Dependent	.174	.154	1.086	.062

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Based on chi-square approximation
- d. Likelihood ratio chi-square probability.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.524			.016
	Cramer's V	.524			.016
	Contingency Coefficient	.464			.016
Interval by Interval	Pearson's R	-.327	.217	-1.829	.078 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-.426	.229	-2.493	.019 ^c
N of Valid Cases		30			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

KURATIF * DERAJATDEMAMBERDARAH

Crosstab

			DERAJATDEMAMBERDARAH			Total
			DERAJAT 1-2	DERAJAT 1-7	DERAJAT 1-9	
KURATIF	KURANG	Count	24	2	0	26
		% within KURATIF	92.3%	7.7%	.0%	100.0%
	BAIK	Count	1	2	1	4
		% within KURATIF	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%
Total		Count	25	4	1	30
		% within KURATIF	83.3%	13.3%	3.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.038 ^a	2	.001
Likelihood Ratio	9.618	2	.008
Linear-by-Linear Association	12.597	1	.000
N of Valid Cases	30		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx T ^b	Approx Sig.
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.222	.176	1.017	.309
		KURATIF Dependent	.250	.217	1.017	.309
		DERAJATDEMAMBE RDARAH Dependent	.200	.310	.581	.562
Goodman and Kruskal tau		KURATIF Dependent	.435	.186		.002 ^c
		DERAJATDEMAMBE	.280	.180		.000 ^c
		RDARAH Dependent				
Uncertainty Coefficient		Symmetric	.346	.179	1.595	.008 ^d
		KURATIF Dependent	.408	.222	1.595	.008 ^d
		DERAJATDEMAMBE				
		RDARAH Dependent	.300	.157	1.595	.008 ^d

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- Based on chi-square approximation
- Likelihood ratio chi-square probability.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx T ^b	Approx Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.659			.001
	Cramer's V	.659			.001
	Contingency Coefficient	.550			.001
Interval by Interval	Pearson's R	.659	.173	4.637	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.630	.199	4.290	.000 ^c
N of Valid Cases		30			

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- Based on normal approximation.

DIAGNOSTIK * DERAJATDEMAMBERDARAH

Crosstab

			DERAJATDEMAMBERDARAH			Total
			DERAJAT 1-2	DERAJAT 1-7	DERAJAT 1-9	
DIAGNOSTIK BAIK	Count		25	4	1	30
	% within DIAGNOSTIK		83.3%	13.3%	3.3%	100.0%
Total	Count		25	4	1	30
	% within DIAGNOSTIK		83.3%	13.3%	3.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	30

a. No statistics are computed because DIAGNOSTIK is a constant.

Directional Measures

			Value
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	. ^a

a. No statistics are computed because DIAGNOSTIK is a constant.

Symmetric Measures

		Value
Nominal by Nominal	Phi	. ^a
N of Valid Cases		30

a. No statistics are computed because DIAGNOSTIK is a constant.