


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU POST PARTUM NY “S”
DENGAN EPISIOTOMI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan
Ahli Madyah Kebidanan Jurusan D III Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

MUTMAINNA ALKA
70400114076

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutmainna Alka
Nim : 70400114076
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 18 September 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN. Andi Tonro Permai Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Post Partum Ny “S” dengan Episiotomi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang di peroleh batal demi hukum.

Samata, 9 Maret 2018

Penyusun

MUTMAINNA ALKA
Nim.70400114076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal Karya Tulis Ilmiah Saudari **MUTMAINNA ALKA**, NIM: 70400114076, mahasiswi Jurusan Kebidanan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal berjudul, "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Natal Dengan Episiotomi Di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa", memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Juli 2017

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti saleha. S.SiT.,S.KM.,M.Keb

Pembimbing II



dr.Rauly rahmadhani, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Dengan Episiotomi Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017” yang disusun oleh **Mutmainna Alka** Nim: 70400114076, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari kamis 21 November 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Selasa, 21 November 2017 M
2 Rabiul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Rauly Rahmadhani, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rini Fitriani, M.kes	(.....)
Penguji II	: Dra. Hj. Hartini, M.Ag	(.....)

af Dekan B

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Dengan Episiotomi di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang istimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Alauddin dan Ibunda tercinta Kameriah yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada;

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. dr. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. Wakil Dekan I Dr. Nurhidayah S.Kep., Ns., M.Kes, Wakil Dekan II Ibunda Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes, Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Muchtar Lutfi, M.Pd.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb, dan sekretaris jurusan selaku Ketua Jurusan Kebidanan dan sekretaris jurusan kebidanan fakultas kedokteran

dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun


4. Teruntuk Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb dan dr. Raully Rahmadhani, M.Kes, sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi saran yang membangun dalam penyusunan KTI ini.
5. Teruntuk dr. Rini Fitriani, M.Kes, selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar baik saran maupun motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan KTI ini.
6. Ibunda Dra. Hj. Hartini, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini.
7. Segenap Dosen terkhususnya di lingkup Prodi Kebidanan, staf Akademi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas kontribusinya dalam penyelesaian penyusunan KTI ini.
8. Bidang Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan atas pemberian izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Direktur RSUD Syech Yusuf Gowa dan jajarannya atas bantuannya dan perizinannya sehingga KTI ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman Kebidanan angkatan 2014.

11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, Oktober 2107

Penyusun,



MUTMAINNA ALKA
NIM: 70400114076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Studi Kasus.....	4
D. Manfaat Studi Kasus.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Nifas.....	8
B. Tinjauan Teori Tentang Episioton, Luka Perineum dan Nyeri Perineum.....	23
C. Tinjauan Manajemen Kebidanan.....	46
D. Tinjauan Islam tentang Masa Nifas	61

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada tanggal 10 Agustus 2017	64
B. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada tanggal 13 Agustus 2017	88
C. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada tanggal 16 Agustus 2017	94
D. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada tanggal 21 Agustus 2017	101
E. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada tanggal 30 Agustus 2017	106

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar	109
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual	114
C. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	118
D. Langkah IV: Tindakan Emergency Dan Kolaborasi	122
E. Langkah V: Intervensi	124
F. Langkah VI: Implementasi	136
G. Langkah VII: Evaluasi	139

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asuhan Kunjunga Masa Nifas	12
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Visual Analog Scale (VAS)	42
--	----



DAFTAR ISTILAH

- Bounding attachment*** : Intraksi orang tua dan bayi secara nyata baik fisik, emosi, pada beberapa menit dan jam pertama segera setelah lahir
- Cardio vascular*** : Jantung
- Dispareuni*** : Nyeri pada alat kelamin atau nyeri di daerah panggul terjadi selama melakukan hubungan seksual
- Fourchette*** : Lipatan jaringan transversal yang pipih dan tipis terletak pada ujung bawah labia mayora
- Health education*** : Pendidikan kesehatan
- Hemoglobin*** : Protein yang mengandung zat besi
- Hypoxia*** : Suatu kondisi dimana tubuh atau daerah tubuh kekurangan pasokan oksigen yang memadai
- Ischialtuberosity*** : Tulang duduk
- Ice pack*** : Kantong es atau biang es
- Mammae*** : Payudara
- Pitting oedema*** : Penumpukan cairan yang berlebihan di dalam jaringan
- Puerperium*** : Masa nifas
- Puerperium intermedial*** : Masa kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu

- Remote puerperium*** : Masa yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna
- Spichter ani*** : Salah satu system pencernaan
- Taking in*** : Periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedia setelah melahirkan
- Taking hold*** : Periode ketergantungan yang berlangsung dari hari ketiga
- Letting go*** : Menerima tanggung jab akan peran bayinya



DAFTAR SINGKATAN

AKDR	: Alat kontrasepsi dalam rahim
ASI	: Air susu Ibu
AKI	: Angka kematian ibu
BAK	: Buang air kecil
BAB	: Buang air besar
KB	: Keluarga berencana
MPGS	: Mellenium development goalds
TFU	: Tinggi fundu seteri
WHO	: Word health organization



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbagda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa.
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Gowa atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Gowa Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, NOVEMBER 2017

Mutmainna Alka, 70400114076

Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb

Pembimbing II : dr. Raully Rahmadhani, M.kes

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Ny
“S” Dengan Episiotomi di Rumah Sakit Umum Daerah
Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu post partum dengan episiotomi di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dan mendokumentasikannya dalam bentuk SOAP.

Hasil studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “S” dengan luka episiotomi, tidak ditemukannya hambatan selama asuhan. Pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali selama 1 bulan. Selama melakukan asuhan serta kunjungan rumah didapatkan nyeri pada luka episiotomi sejak setelah ibu melahirkan pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian melakukan perawatan dengan menggunakan metode kompres es (*ice pack*), setelah dilakukan perawatan, Ny “S” sudah tidak merasakan nyeri luka episiotomi. Kemudian 7 hari masa nifas Ny “S” luka jahitan episiotomi telah kering dan berangsur sembuh.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus Ny “S” dengan Post partum episiotomi di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap Ny “S” dengan hasil ditemukannya masalah aktual nyeri luka episiotomi yang bisa diatasi dengan kompres es (*ice pack*), hal ini bermakna terapi kompres es (*ice pack*) dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menurunkan nyeri pada ibu post partum dengan luka episiotomi.

Kata Kunci : Episiotomi, Nyeri, kompres es (*ice pack*), 7 langkah Varney.

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, NOVEMBER 2017

Mutmainna Alka, 70400114076

Supervisor I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb

Supervisor II : dr. Rauly Rahmadhani, M.kes

“Midwifery Care Management on Post-Partum Mother of Mrs. “S” with Episiotomy at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2017”

The Scientific Paper is aimed at implementing the midwifery care management on post-partum mother with episiotomy at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital with a midwifery care management approach and documenting it in the form of SOAP.

The case study results applied on Mrs. “S” with an episiotomy wound found no barriers during the care. Monitoring was carried out 4 times for 1 month. During the care and home visits, pain existed in the episiotomy wound since after the mother delivered the baby on August 10, 2017 and then conducted a treatment using ice pack method; after the treatment, Mrs. “S” did not feel any pain of episiotomy wound. After 7 days postpartum of Mrs. “S”, the episiotomy suture wound has dried and gradually healed.

The conclusion of the case study is 7 steps of Varney and SOAP used for the process of obstetrical problem solving has been conducted an assessment and data analysis on the case of Mrs. “S” with episiotomy post-partum at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2017 and documented all findings and actions that have been performed on Mrs. “S” with the findings of actual problems of episiotomy painful wound can be overcome by ice packs, and this means that ice pack therapy can be used as an alternative to reduce pain in post-partum mother with episiotomy wound.

Keywords : Episiotomy, Pain, ice pack, 7 steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Orang-orang sering mendengar mengenai saat nifas, tetapi cuma sedikit orang yang tahu apakah itu saat nifas. Masa nifas (*puerperium*) adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Rukiah Ai yeyeh, dkk, 2011).

Dalam menurunkan angka kematian ibu berbagai upaya telah dilakukan. Namun, angka kematian ibu masih cukup tinggi. Menurut laporan WHO tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa. Amerika Serikat yaitu 9300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup (Kusmindarti Indah, dkk, 2014).

Sebagian besar kematian ibu tidak hanya dalam masa kehamilan dan persalinan. Namun, pasca persalinan atau masa nifas juga menjadi penyumbang angka kematian ibu yang disebabkan karena perdarahan, dan infeksi masa nifas. Salah satu program pemerintah untuk menurunkan AKI adalah Program Kerja

Gerakan Sayang Ibu antara lain memberikan kenyamanan ketika persalinan karena dapat terjadi robekan, baik robekan spontan atau melalui pembedahan (episiotomi). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI Indonesia adalah 359/100.000 kelahiran hidup. AKI Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di Asia. Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan pada masa nifas (26,9%), eklampsi pada waktu bersalin (23%), infeksi (11%), komplikasi puerperium (8%), trauma obstetrik (8%), partus lama (8%), aborsi (8%), dan lain-lain (10,9%) (Depkes RI, 2011). Infeksi pada masa nifas yang merupakan mordibitas dan mortalitas bagi ibu pasca bersalin. Penyebab infeksi tersebut adalah bakteri endogen dan eksogen. Faktor predisposisi infeksi masa nifas meliputi nutrisi yang buruk, defisiensi zat besi, persalinan lama, ruptur membran, episiotomi, atau seksio sesaria. Ibu berisiko mengalami infeksi postpartum karena adanya luka pada area pelepasan plasenta, laserasi pada saluran genital, dan episiotomi pada perineum. Hampir 90% pada proses persalinan pertama dan tidak jarang pada persalinan berikutnya mengalami robekan perineum, baik dengan atau tanpa episiotomi. Robekan perineum dapat terjadi secara spontan (tidak sengaja) dan dengan tindakan episiotomi (sengaja) (Kristianti Rini, 2014).

Dalam menjalankan asuhan praktik kebidanan, kewenangan bidan untuk melakukan suatu tindakan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 bab iii pasal 10 ayat (3) yang

mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang berbunyi sebagai berikut:

Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:

- (a) episiotomi;
- (b) penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- (c) penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- (d) pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
- (e) pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- (f) fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
- (g) pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- (h) penyuluhan dan konseling;
- (i) bimbingan pada kelompok ibu hamil;
- (j) pemberian surat keterangan kematian; dan
- (k) pemberian surat keterangan cuti bersalin.

Episiotomi adalah tindakan operatif untuk memperlebar jalan lahir dengan cara menyayat jaringan-jaringan perineum menurut alur tertentu. Penyayatan paling baik dilakukan pada saat kontraksi, ketika jaringan sedang merentang, agar mudah terlihat daerahnya, dan perdarahan kemungkinan tidak akan terlalu parah (Nurasiah Ai, dkk, 2014).

Dengan melihat data di atas dan masih tingginya kasus kematian ibu dalam masa nifas akibat infeksi, maka penulis tertarik untuk mengambil kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Dengan Episiotomi di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Dengan Episiotomi di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

C. Tujuan Studi Kasus

1. Tujuan Umum

Dapat dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu post Partum dengan episiotomi di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dan mendokumentasikannya dalam bentuk SOAP.

2. Tujuan Khusus

- 1) Melaksanakan pengkajian asuhan kebidanan pada Ny “S” pasca episiotomi.
- 2) Melakukan interpretasi data serta merumuskan diagnosis kebidanan, masalah, dan kebutuhan pada pasien pasca episiotomi

- 3) Dirumuskan diagnosis potensial pada pasien dengan pasca episiotomi
- 4) Mengidentifikasi antisipasi atau tindakan segera yang harus segera diberikan pada pasien pasca episiotomi
- 5) Ditetapkannya rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan pengkajian pada pasien pasca episiotomi.
- 6) Melakukan perencanaan asuhan kebidanan yang telah dibuat pada pasien pasca episiotomi.
- 7) Melakukan evaluasi tindakan secara teliti dan cermat pada Ny "S" pasca episiotomi
 - (a) Menganalisis kesenjangan antara teori dan kasus yang ada di lapangan termasuk faktor pendukung dan penghambat.
 - (b) Penulis mampu memberikan alternatif pemecahannya dari kesenjangan antara teori dan praktek nyata pada pasien pasca episiotomi

D. Manfaat Studi Kasus

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah tentang manajemen asuhan kebidanan dengan pengalaman yang nyata di lapangan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas pasca episiotomi.

2. Bagi profesi

Sebagai salah satu masukan bagi organisasi profesi dalam upaya meningkatkan kinerja bidan dalam memberikan asuhan kebidanan tentang pelaksanaan tindakan pasca episiotomi

3. Bagi institusi

Sebagai bahan referensi dan sumber bacaan mengenai asuhan kebidanan pasca episiotomi.

E. *Sistematika Penulisan*

Sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari IV bab yang meliputi bab I, bab II, bab III dan bab IV:

Pada bab I yaitu Pendahuluan yang akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus serta sistematika penulisan. Sehingga pembaca dapat memperoleh informasi secara ringkas dari Karya Tulis Ilmiah ini.

Pada bab II yaitu Tinjauan Pustaka berisi tentang teori medis yang meliputi pengertian Nifas, perubahan fisiologi masa nifas, tujuan masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas, tahapan masa nifas, kebijakan program nasional nifas, pengertian episiotomi, macam-macam episiotomi, tujuan episiotomi, indikasi episiotomi, tinjauan teori manajemen kebidanan

Pada bab III yaitu tinjauan kasus dan pembahasan berisi tentang tinjauan kasus dan pembahasan. Tinjauan kasus membahas tentang asuhan kebidanan

dengan postepisiotomi dimulai dari pengkajian sampai evaluasi dan dataperkembangan menggunakan SOAP. Sedangkan dalam pembahasan peneliti menjelaskan tentang masalah-masalah atau kesenjangan antara teori dan praktek yang penulis temukan di lapangan.

Pada bab IV yaitu Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan ini untuk menjawab tujuan penulis dan merupakan inti dari pembahasan, sedangkan saran merupakan alternatif pemecahan masalah yang realistis dan operasional.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Nifas

1. Pengertian

Ada beberapa pengertian tentang masa nifas, namun dari berbagai pengertian tersebut hanya ada tiga sumber yang menjadi acuan penulis. Masa nifas atau masa *puerperium* adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involusi (Maritalia Dewi, 2012).

Pendapat lain mengemukakan bahwa masa nifas (*puerperium*) adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Rukiah Ai Yeyeh, dkk, 2011).

Pendapat selanjutnya, masa nifas (*puerperium*) adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra-hamil. Lama masa nifas ini 6-8 minggu (Ambarwati Retna, 2012).

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Selama bidan memberikan asuhan sebaiknya bidan mengetahui apa tujuan dari pemberian asuhan pada ibu masa nifas, tujuan diberikannya asuhan pada ibu selama masa nifas antara lain untuk:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa ini peranan keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologis masa kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga.
 - b. Melaksanakan skrining yang komprehensif (menyeluruh) dimana bidan harus melakukan manajemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas secara sistematis yaitu mulai pengkajian data subyektif, obyektif maupun penunjang.
 - c. Setelah bidan melaksanakan pengkajian data maka bidan harus menganalisa data tersebut sehingga tujuan asuhan masa nifas ini dapat mendeteksi masalah yang terjadi pada ibu dan bayi.
 - d. Mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, yakni setelah masalah ditemukan maka bidan dapat langsung masuk kelangkah berikutnya sehingga tujuan diatas dapat dilaksanakan.
- Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya dan perawatan bayi sehat, memberikan pelayanan keluarga berencana.
- (Rukiah Ai Yeyeh, dkk, 2011).

3. Peran dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas

Sebagian besar wanita memiliki ketidaknyamanan pada beberapa hari setelah melahirkan. Salah satu penyebab umum dari ketidaknyamanan adalah karena tindakan episiotomi oleh karena itu intruksi atau pelatihan dini dapat

dilakukan sebelum persalinan seperti pada pemeriksaan *antenatal care*. Studi saat ini menyimpulkan bahwa perempuan yang menerima intruksi dan latihan diri perawatan perineum pada nyeri episiotomi selama periode *post partum* dapat menurunkan tingkat nyeri perineum pasca episiotomi yang mengganggu aktivitas sehari-hari ibu *post partum* seperti berjalan, duduk, buang air kecil, dan buang air besar. (Mohamed Hoda Abed El-Azim, dkk, 2012).

Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Adapun peran dan tanggung jawab bidan pada masa nifas antara lain:

- a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- b. Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga.
- c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- d. Membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi.
- e. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- f. Memberikan konselin untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman.

- g. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.
- h. Memberikan asuhan secara professional.
(Nugroho Taufan, dkk, 2014)

4. Tahapan Masa Nifas

Masa nifas dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. *Puerperium* dini

Merupakan masa pemulihan awal dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Ibu yang melahirkan per vagina tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala IV dianjurkan untuk mobilisasi segera.

- b. *Puerperium* intermedial

Suatu masa pemulihandimana organ-organ reproduksi secara beransur-ansur akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari.

- c. *Remote puerperium*

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Rentang waktu *remote puerperium* berbeda untuk

setiap ibu, tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama hamil atau persalinan. (Maritalia Dewi, 2012).

5. Kebijakan Program Nasional Nifas

Selama ibu berada pada masa nifas, paling sedikit 4 kali bidan harus melakukan kunjungan, dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi

Seorang bidan pada saat asuhan kepada ibu dalam masa nifas, ada beberapa hal yang harus dilakukan, akan tetapi pemberian asuhan kebidanan pada ibu masa nifas tergantung dari kondisi ibu sesuai dengan tahapan perkembangannya. (Rukiah Ai Yeyeh, dkk, 2011).

Tabel.1 Asuhan Kunjunga Masa Nifas

Kunjungan	Waktu	Asuhan
I	Asuhan 6-8 Jam Setelah melahirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri b. Pemantauan keadaan umum ibu c. Melakukan hubungan antara bayi dan ibu (<i>bonding Attachment</i>) d. ASI eksklusif
II	Asuhan 6 Hari setelah melahirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus dan tidak ada tanda-tanda perdarahan abnormal b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan abnormal c. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup d. Memastikan ibu mendapat makanan

		<p>yang bergizi</p> <p>e. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit</p>
III	Asuhan 2 minggu Setelah persalinan	<p>a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus dan tidak ada tanda-tanda perdarahan abnormal</p> <p>b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan abnormal</p> <p>c. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup</p> <p>d. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi</p> <p>e. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit</p>
IV	Asuhan 6 minggu setelah persalinan	<p>a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami</p> <p>b. Memberikan konseling untuk KB secara dini, imunisasi, senam nifas, dan tanda-tanda bahaya yang dialami oleh ibu dan bayi.</p>

(Ambarwati Retna, dkk 2012).

6. Perubahan Fisiologis Pada Masa Nifas

Pada masa nifas, organ reproduksi interna dan eksterna akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur dan berlangsung selama lebih kurang tiga bulan. Selain organ reproduksi, beberapa perubahan fisiologis yang terjadi selama masa nifas akan dibahas berikut ini. (Maritalia Dewi, 2012)

a. Uterus

Uterus merupakan organ reproduksi interna yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah alpukat yang sedikit gepeng dan berukuran

sebesar telur ayam. Panjang uterus sekitar 7 - 8 cm, lebar sekitar 5 - 5,5 cm dan tebal sekitar 2,5 cm. letak uterus secara fisiologis adalah *anteversiofleksio*.

Perubahan yang terjadi pada dinding uterus adalah timbulnya thrombosis, degenerasi dan nekrosis di tempat implantasi plasenta. Jaringan-jaringan di tempat implantasi plasenta akan mengalami degenerasi dan kemudian terlepas. Tidak ada pembentukan jaringan parut pada bekas tempat implantasi plasenta karena pelepasan jaringan ini berlangsung lengkap.

Dalam keadaan fisiologis, pada pemeriksaan fisik yang dilakukan secara palpasi didapat bahwa tinggi fundus uteri akan berada setinggi pusat segera setelah janin lahir, sekitar 2 jari dibawah pusat setelah plasenta lahir, pertengahan antara pusat dan sinfisis pada hari kelima postpartum dan setelah 12 hari post partum tidak dapat diraba lagi.

b. Serviks

Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Selama kehamilan, serviks mengalami perubahan karena pengaruh hormon estrogen. Menigkatnya kadar hormon estrogen pada saat hamil dan disertai dengan dengan hipervaskularisasi mengakibatkan konsistensi lunak.

Segera setelah persalinan bentuk serviks akan menganga seperti corong. Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi sedangkan serviks tidak berkontraksi. Warna serviks berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak.

Segera setelah janin dilahirkan, serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati 1 jari.

c. Vagina

Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar. Dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain, bentuk vagina sebelah dalam berlipat-lipat dan disebut juga rugae. Lipatan-lipatan ini memungkinkan vagina melebar pada saat persalinan dan sesuai dengan fungsinya sebagai bagian lunak jalan lahir.

Selama proses persalinan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar, terutama pada saat melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, vagina tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali.

d. Vulva

Vulva merupakan organ reproduksi eksterna, berbentuk lonjong, bagina depan dibatasi oleh clitoris, bagian belakang oleh perineum, bagian kiri dan kanan oleh labia minora.

Sama halnya dengan vagina, vulva juga mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan vulva tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol.

e. Payudara (*Mammae*)

Payudara atau *mammae* adalah kelenjar yang terletak dibawah kulit, diatas otot dada. Secara makroskopis, struktur payudara terdiri dari korpus (badan), areola dan papilia atau puting.

Sejak kehamilan trimester pertama kelenjar *mammae*. Sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa laktasi. Perubahan yang terjadi pada kelenjar *mammae* selama kehamilan adalah:

- 1) Proliferasi jaringan atau pembesaran payudara.
- 2) Terdapat cairan yang berwarna kuning (*kolostrum*) pada *duktus laktiferus*.
- 3) Terdapat hipervaskularisasi pada bagian permukaan maupun bagian dalam kelenjar *mammae*.

f. Tanda-tanda vital

Tanda-tanda vital merupakan tanda-tanda penting pada tubuh yang dapat berubah bila tubuh mengalami gangguan atau masalah.

1) Suhu tubuh

Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat sekitar $0,5^{\circ}$ celcius dari keadaan normal (36° - $37,5^{\circ}$), hal ini disebabkan karena meningkatnya metabolisme tubuh pada saat proses persalinan.

2) Nadi

Denyut nadi normal berkisar antara 60-80 kali permenit. Pada saat proses persalinan denyut nadi akan mengalami peningkatan.

3) Tekanan darah

Tekanan darah normal untuk sistol berkisar antara 110-140 mmHg dan untuk diastole antara 60-80 mmHg. Setelah partus, tekanan darah dapat sedikit lebih rendah dibandingkan pada saat hamil karena terjadinya perdarahan pada proses persalinan. Bila tekanan darah mengalami peningkatan lebih dari 30 mmHg pada sistol atau lebih dari 15 mmHg pada diastole perlu dicurigai timbulnya hipertensi atau pre eklampsia masa nifas.

4) Pernafasan

Frekuensi pernafasan normal berkisar antara 18-24 kali per menit. Pada saat partus frekuensi pernafasan akan meningkat karena kebutuhan

oksigen yang tinggi untuk tenaga ibu meneran/mengejan dan mempertahankan agar persediaan oksigen kejanin tetap terpenuhi.

g. Hormon

Selama kehamilan terjadi peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut berfungsi untuk mempertahankan agar dinding uterus tetap tumbuh dan berproliferasi sebagai media tempat tumbuh dan berkembangnya hasil konsepsi

h. Sistem peredaran darah (*CardioVaskular*)

Perubahan hormon selama hamil dapat menyebabkan terjadinya hemodilusi sehingga kadar hemoglobin (Hb) wanita hamil biasanya sedikit rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Selain itu, terdapat hubungan antara sirkulasi darah ibu dengan sirkulasi janin melalui plasenta. Setelah janin dilahirkan, hubungan sirkulasi darah terputus sehingga volume darah ibu relatif akan meningkat.

i. Sistem pencernaan

Ibu yang melahirkan secara spontan biasanya lebih cepat lapar karena telah mengeluarkan energi yang begitu banyak pada saat proses persalinan.

Buang air besar biasanya mengalami perubahan pada 1-3 hari pertama post partum. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan tonus otot selama proses persalinan. Selain itu, enema sebelum melahirkan, kurang asupan nutrisi dan dehidrasi serta dugaan ibu terhadap timbulnya rasa nyeri

disekitar anus/perineum setiap kali akan buang air besar juga mempengaruhi defekasi secara spontan.

j. Sistem perkemihan

Perubahan hormonal pada masa hamil menyebabkan peningkatan fungsi ginjal, sedangkan penurunan kadarhormon steroid setelah wanita melahirkan sebagian menjelaskan sebab penurunan fungsi ginjal selama masa post partum. Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan setelah wanita melahirkan. Diperlukan waktu sekitar 2 sampai 8 minggu supaya hipotonia pada kehamilan dan diatasi ureter serta pelvis ginjal kembali ke keadaan sebelum hamil.

k. Sistem integumen

Perubahan kulit selama kehamilan berupa hiperpigmentasi pada wajah (*cloasma gravidarum*), leher, *mammae*, dinding perut dan beberapa lipatan sendi karena pengaruh hormon, akan menghilang selama masa nifas.

l. Sistem muskuloskeletal

Setelah proses persalinan selesai, dinding perut akan menjadi longgar, kendur dan melebar selama beberapa minggu atau bahkan sampai beberapa bulan akibat peregangan yang begitu lama selama hamil. Ambulasi dini, mobilisasi dan senam nifas sangat dianjurkan untuk mengatasi hal tersebut.

7. Perubahan Psikologis Masa Nifas

Perubahan psikologi sebenarnya sudah terjadi pada kehamilan. Menjelang persalinan, perasaan senang dan cemas bercampur menjadi satu. Perasaan senang timbul karena akan berubah peran mejadi seorang ibu dan segera bertemu dengan bayi yang telah lama dinanti-nantikan. Timbulnya perasaan cemas karena khawatir terhadap calon bayi yang akan dilahirkan, apakah bayi akan lahir sempurna atau tidak.

Adanya perasaan kehilangan sesuatu secara fisik sesudah melahirkan akan menjurus pada suatu reaksi perasaan sedih. Kemurungan dan kesedihan dapat semakin bertambah oleh karena ketidak nyamanan secara fisik, rasa letih setelah proses persalinan, stress, kecemasan, adanya ketegangan dalam keluarga, kurang istirahat karena harus melayani keluarga dan tamu yang berkunjung untuk melihat bayi atau dikap petugas yang tidak ramah.

Minggu-minggu pertama masa nifas merupakan masa rentang bagi seorang ibu. Pada saat yang sama, ibu baru (primipara) mungkin frustrasi karena merasa tidak kompeten dalam merawat bayi dan tidak mampu mengotrol situasi. Semua wanita akan mengalami perubahan ini, namun penanganan atau mekanisme koping yang dilakukan dari setiap wanita untuk mengatasinya pasti akan berdeda. Hal ini dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga dimana wanita tersebut dibesarkan, lingkungan, adat istiadat, suku, bangsa, pendidikan serta pengalaman yang didapat.

a. Adaptasi Psikologi Ibu dalam Masa Nifas

Pada primipara, menjadi orangtua merupakan pengalaman tersendiri dan menimbulkan stress apabila tidak ditangani dengan segera. Perubahan peran dari wanita menjadi seorang ibu memerlukan adaptasi sehingga ibu dapat melakukan perannya dengan baik. Perubahan hormonal yang sangat cepat setelah proses melahirkan juga ikut mempengaruhi keadaan emosi dan proses adaptasi ibu pada masa nifas. Fase-fase yang akan dialami oleh ibu pada masa nifas antara lain adalah sebagai berikut:

a) Fase *Taking In*

Merupakan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif pada lingkungannya. Ketidaknyamanan yang dialami ibu lebih disebabkan karena proses persalinan yang baru saja dilaluinya. Rasa mules, nyeri pada jalan lahir, kurang tidur atau kelelahan, merupakan hal yang sering dikeluhkan ibu. Pada fase ini, kebutuhan istirahat, asupan nutrisi dan komunikasi yang baik harus dapat terpenuhi. Bila kebutuhan tersebut tersebut tidak terpenuhi, ibu dapat mengalami gangguan psikologi berupa: kekecewaan pada bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik dialami, rasa bersalah kerana belum bisa menyusui bayinya dan kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya.

b) Fase *Taking Hold*

Merupakan fase yang berlangsung Antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggungjawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitive sehingga mudah tersinggung. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan dan pemberian penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi, cara menyusui yang baik dan benar, cara perawatan luka jalan lahir, mobilisasi postpartum, senam nifas, nutrisi, istirahat, kebersihan diri dan organ lain.

c) Fase *Letting Go*

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Fase ini berlangsung 1-2 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya dan siap menjadi pelindung bagi bayinya. Perawatan ibu terhadap diri dan bayinya semakin meningkat. Rasa percaya diri ibu akan peran barunya mulai tumbuh, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Dukungan suami dan keluarga dapat membantu ibu untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri dalam merawat bayinya. Kebutuhan akan istirahat dan nutrisi yang cukup masih sangat diperlukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya. (Maritalia Dewi, 2012)

B. Tinjauan Teori Tentang Episiotomi, luka perineum dan nyeri perineum

1. Episiotomi

a) Pengertian episiotomi

Prinsip tindakan episiotomi adalah pencegahan kerusakan yang lebih pada jaringan lunak akibat daya regang yang melebihi kapasitas adaptasi atau elastisitas jaringan tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan untuk melakukan episiotomi harus mengacu pada penelitian klinik yang tepat dan teknik paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Dengan demikian tidak dianjurkan untuk melakukan prosedur untuk episiotomi secara rutin dengan mengacu pada pengalaman dan bukti-bukti ilmiah yang dikemukakan oleh beberapa pakar dan klinisi, ternyata tidak terdapat bukti bermakna tentang manfaat episiotomi rutin (Pujiastuti Retna Dewi, 2012: 1).

Beberapa pendapat mengemukakan bahwa episiotomi merupakan suatu tindakan insisi pada perineum yang menyebabkan terpotongnyaselaput lendir vagina, cincin selaput darah dan jaringan pada septum rektovaginal (Astuti Eny, 2014).

Kemudian pendapat lain, episiotomi adalah tindakan operatif untuk memperlebar jalan lahir, dengan cara menyayat jaringan-jaringan perineum menurut alur tertentu. Penyayatan paling baik dilakukan pada saat kontraksi, ketika jaringan sedang merentang, agar mudah terlihat

daerahnya, dan perdarahan kemungkinan tidak akan terlalu parah (Nurasiah Ai, dkk, 2014).

Pendapat selanjutnya yaitu, episiotomi adalah suatu insisi bedah yang dilakukan pada perineum untuk memudahkan kelahiran bagian presentase janin. Meskipun dahulu dilakukan secara rutin, kajian sistematis terhadap bukti-bukti memastikan bahwa praktik ini harus dibatasi sesuai kebutuhan klinis (Baston Hellen.dkk, 2012: 118).

Inti dari episiotomi adalah untuk mengurangi resiko cedera maternal pada jaringan selama proses kelahiran. Bukti saat ini mendukung membatasi penggunaan episiotomi yang diadopsi oleh sebagian besar negara maju, episiotomi rutin merupakan praktik kebidanan tradisional yang masih dilakukan di Nigeria. Praktek episiotomi rutin telah mengakibatkan tingkat episiotomi tinggi yang disertai komplikasi. Seperti komplikasi perdarahan, penyembuhan luka berkepanjangan, dan infeksi. (Nyengidiki Tammy, dkk, 2008).

b) Macam-macam Episiotomi

Untuk melancarkan jalannya persalinan, dapat dilakukan insisi pada perineum pada saat kepala tampak dari luar dan mulai meregangkan perineum (Nurasiah Ai.dkk, 2014:).

1) Mediolateralis

Sayatan dimulai dari titik tengah *Fourchette* dan diarahkan 45° dengan midline kearah suatu titik pertengahan diantara

ischialtuberosity dan anus. Garis akan menghindari bahwa kerusakan pada *spincter* ani maupun kelenjar bartholin. Namun sayatan ini yang paling sulit untuk dijahit kembali.

2) Medialis

Arah guntingan dibuat digaris tengah

3) Lateral

Sayatan ini pada garis tengah yang mengikuti garis alamiah insersi otot-otot perineum. Cara ini yakini sangat sedikit membuat perdarahan tetapi lebih tetapi lebih tinggi insiden kerusakan pada *spincter* anus. Sayatan ini mudah dijahit kembali dan hanya sedikit rasa sakit serta *dyspareunia*.

c) Tujuan Episiotomi

- 1) Fasilitasi untuk persalinan dengan tindakan atau menggunakan instrument.
- 2) Mencegah robekan perineum yang baku atau diperkirakan tidak mampu beradaptasi terhadap regangan yang berlebihan (misalnya bayi yang sangat besar atau makrosomia)
- 3) Mencegah kerusakan jaringan pada ibu dan bayi pada asus letak/presentase upnormal (bokong, muka, ubun-ubun kecil di belakang) dengan menyediakan tempat lebih luas untuk persalinan yang aman. (Pudiastuti Ratna Dewi, 2012).

d) Jenis-Jenis Episiotomi

a. Episiotomi Medialis

- (a) Secara anatomis lebih alamiah
- (b) Menghindari pembuluh-pembuluh darah dan syaraf, jadi penyembuhan tidak terlalu sakit.
- (c) Lebih mudah dijahit karena anatomis jaringan lebih muda.
- (d) Kehilangan darah lebih sedikit.
- (e) Jika meluas bisa lebih memanjang sampai ke sphincter ani yang mengakibatkan kehilangan darah lebih banyak, lebih sulit dijahit dan jika sampai sphincter ani harus dirujuk.

b. Episiotomi Mediolateralis

- (a) Pemotongan dimulai dari garis tengah fossa vestibula vagina ke posterior ditengah antara spina ischiadica dan anus.
- (b) Dilakukan pada ibu yang memiliki perineum pendek dan pernah ruptur grade.
- (c) Kemungkinan perluasan laserasi ke sphincter ani akan semakin kecil.
- (d) Penyembuhan terasa lebih sakit dan lama.
- (e) Mungkin kehilangan darah lebih banyak.
- (f) Jika dibandingkan dengan medialis (yang tidak sampai *sphincter ani*) lebih sulit dijahit.
- (g) Bekas luka parut kurang baik.

(h) Pelebaran introitus vagina.

(i) Kadang kala diikuti nyeri saat berhubungan (dyspareunia). (Tando Naomi Marie, 2013: 84)

e) Indikasi Episiotomi

- 1) Gawat janin. Untuk menolong keselamatan janin, maka persalinan harus segera diakhiri.
- 2) Persalinan pervaginam dengan penyulit, misalnya presbo, distokia bahu, akan dilakukan ekstraksi forcep, ekstraksi vacum.
- 3) Jaringan parut pada perineum ataupun pada vagina.
- 4) Perineum kaku dan pendek.
- 5) Adanya ruptur yang membakat pada perineum
- 6) Premature untuk mengurangi tekanan pada kepala janin. (Nurasiah Ai.dkk, 2014).

f) Prosedur Pelaksanaan Tindakan Episiotomi

1) Persiapan

(a) Peralatan

- (1) Bak steril berisi kasa
- (2) Gunting episiotomi
- (3) Betadin
- (4) S spuit 10 ml dengan jarum ukuran minimal 22 dan panjang 4 cm.

- (5) Lidokain 1% tanpa epineprin. Bila lidokain 1% tidak ada dan tersedia lidokain 2% maka buatlah lidokain tadi menjadi 1% dengan cara melarutkan 1 bagian lidokain 2% ditambah 1 bagian cairan garam fisiologis atau air destilasi steril.

(b) Pelaksanaan

(1) Pemberian Anestesi Local

- (a) Penjelasan prosedur kepada pasien.
- (b) Cuci tangan.
- (c) Memakai sarung tangan.
- (d) Hisap 10 ml larutan lidokain 1% tanpa epinefrin.
- (e) Letakkan 2 jari tangan kiri ke dalam vagina diantara kepala janin dan perineum.
- (f) Masukkan jarum di tengah *fourchette* dan arahkan jarum sepanjang tempat yang akan dilakukan episiotomi.

- (2) Lakukan aspirasi (menarik batang penghisap spuit) untuk memastikan jarum tidak berada di dalam pembuluh darah. Bila terdapat darah maka tariklah jarum dan tusukkan kembali pada daerah di dekatnya. Hal ini untuk menghindari kematian ibu karena lidokain yang di suntikkan kedalam pembuluh darah dapat mengakibatkan kejang pada ibu.

- (3) Tarik jarum perlahan sambil mendorong lidokain, suntikkan maksimal 10 ml, cabut jarum bila sudah kembali ke titik asal

pada saat jarum ditusukkan. Kulit perineum akan terlihat dan teraba pada palpasi menggelembung di sepanjang garis yang akan dilakukan episiotomi.

2) Prosedur Episiotomi

- a) Tindakan episiotomi dilakukan pada saat perineum menipis dan pucat, kepala janin sudah terlihat 3-4 cm saat kontraksi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perdarahan.
- b) Masukkan 2 jari tangan kiri (jika penolong tidak kidal) ke dalam vagina diantara kepala janin dan perineum. Kedua jari agak diregangkan dan sedikit melakukan tekanan kearah luar perineum dengan lembut. Tindakan ini dimaksudkan untuk melindungi kepala janin dari gunting dan membuat episiotomi lebih mudah karena perineum menjadi rata.
- c) Dengan gunting episiotomi desinfeksi tingkat tinggi atau steril, tempatkan gunting di tengah *faurchette* posterior dan posisi gunting mengarah ke sudut yang diinginkan dengan episiotomi mediolateral atau lateral. Bila menginginkan medio lateral, tempatkan gunting ke arah menjauhi anus.
- d) Gunting perineum dengan satu atau guntingan yang mantap sekitar 3-4 cm. jangan menggunting dengan cara sedikit demi sedikit. Hal ini akan mengakibatkan waktu penyembuhan luka lebih lama karena tepi luka tidak rata.

- e) Gunting ke arah dalam vagina sekitar 2-3 cm.
 - f) Bila kepala janin belum lahir, maka lakukan penekaran dengan kasa desinfeksi tingkat tinggi pada luka perineum untuk mencegah terjadinya perdarahan. Kendalikan lahirnya kepala, bahu dan badan janin dengan hati-hati apakah luka episiotomi, perineum, dan vagina bertambah panjang atau terdapat laserasi tambahan. (Sumarah.dkk, 2012: 172).
- 3) Proses menjahit luka episiotomi
- a) Atur posisi ibu menjadi posisi litotomi dan arahkan cahaya lampu sorot pada daerah yang benar.
 - b) Keluarkan sisa dari dalam lumen vagina, bersihkan daerah vulva dan perineum.
 - c) Kenakan sarung tangan yang bersih/DTT. Bila diperlukan pasanglah tampon atau kassa ke dalam vagina untuk mencegah darah mengalir ke daerah yang akan dijahit.
 - d) Letakkan handuk atau kain bersih dibawah bokong ibu.
 - e) Uji efektifitas anestesi local yang diberikan sebelum episiotomi masih bekerja (sentuhan ujung jarum pada kulit tepi luka). Jika terasa sakit, tambahkan anestesi local sebelum penjahitan dilakukan.
 - f) Atur posisi penolong sehingga dapat bekerja dengan leluasa dan aman dari cecaran.

- g) Telusuri daerah luka menggunakan jari tangan dan tentukan secara jelas batas luka. Lakukan jahitan pertama kira-kira 1 cm diatas ujung luka didalam vagina, ikat dan potong salah satu ujung dari benang dengan menyisakan benang dengan menyisakan benang kurang lebih 0,5 cm.
- h) Jahitlah mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur dengan jerat kebawah sampai lingkaran sisa hymen.
- i) Kemudian tusukkan jarum menembus mukosa vagina didepan hymen dan keluarkan pada sisi dalam luka perineum. Periksa jarak tempat keluarnya jarum diperineum dengan batas atas irisan episiotomi.
- j) Lakukan jahitan jelujur dengan jerat pada lapisan subkutisa dan otot sampai ke ujung luar luka (pastikan setiap jahitan pada kedua sisi memiliki ukuran yang sama dan lapisan otot tertutup dengan baik).
- k) Setelah mencapai ujung luka, baliklah arah jarum ke lumen vagina dan mulailah merapatkan kulit perineum dengan jahitan subkutikuler.
- l) Bila telah mencapai lingkaran hymen, tembuskan jarum ke liat mukosa vagina pada sisi yang berlawanan dari tusukan terakhir subkutikuler.

- m) Tahan benang (sepanjang 2 cm) dengan klem, kemudian tusukkan kembali jarum pada mukosa vagina dengan jarak 2 mm dari tempat keluarnya benang dan silangkan ke sisi berlawanan hingga menembus mukosa pada sisi berlawanan.
- n) Ikat benang yang dikeluarkan dengan pada klem dengan simpul kunci.
- o) Lakukan control jahitan dengan pemeriksaan colok (lakukan tindakan yang sesuai bila diperlukan).
- p) Tutup jahitan luka episiotomi dengan kassa yang dibubuhi cairan antiseptik. (Pudiastuti Ratna dewi, 2012: 5)

2. Luka Pada Perineum

a. Pengertian

Luka perineum adalah perlukaan perineum pada diafragma urogenitalis dan musculus levator ani, yang terjadi pada waktu persalinan normal, atau persalinan dengan alat, dapat terjadi tanpa luka pada kulit perineum atau pada vagina, sehingga tidak terlihat dari luar. (Rukiah Ai yeyeh .dkk,2012:43)

b. Tingkatan luka perineum

Perlukaan pada perineum dapat dibagi dalam beberapa tingkat yaitu:

- 1) Tingkat I, jika perlukaan perineum hanya terbatas pada mukosa vagina atau kulit perineum.

- 2) Tingkat II, jika perlukaan yang lebih dalam dan luas ke vagina dan perineum dengan melukai fascia serta otot-otot diafragma urogenital.
- 3) Tingkat III, perlukaan yang lebih luas dan lebih dalam yang menyebabkan muskulus spingter ani ekternum.
- 4) Tingkat IV, perlukaan yang lebih luas dan lebih dalam yang menyebabkan muskulus spingter ani eksternum sampai kedinding rektum anterior.

c. Bentuk luka perineum

Bentuk luka perineum ada 2 macam yaitu:

- 1) Ruptur adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan.
- 2) Episiotomi, adalah sebuah irisan bedah pada perineum untuk memperbesar muara vagina yang dilakukan tepat sebelum keluarnya kepala bayi.

d. Lingkup Lingkup perawatan perineum

Menurut Hamilton (Sujiyatini, 2012), lingkup perawatan perineum adalah:

- 1) Mencegah kontaminasi dari rectum.
- 2) Menangani dengan lembut pada jaringan yang terkena trauma.
- 3) Bersihkan semua keluaran yang menjadi sumber bakteri dan bau.

Waktu perawatan perineum menurut feerer (Sujiyatini, 2012):

1) Saat mandi

Pada saat mandi, ibu postpartum pasti melepas pembalut, setelah terbuka maka ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri pada cairan yang tertampung pada pembalut, untuk itu maka perlu dilakukan penggantian pembalut, demikian pula pada perineum ibu, untuk itu diperlukan pembersihan perineum.

2) Setelah buang air kecil

Pada saat buang air kecil, pada saat buang air kecil kemungkinan besar terjadi kontaminasi air seni pada rectum akibatnya dapat memicu pertumbuhan bakteri pada perineum untuk itu diperlukan pembersihan perineum.

3) Pada saat buang air besar

Diperlukan pembersihan sisa-sisa kotoran disekitar anus, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari anus ke perineum yang letaknya bersebelahan maka diperlukan proses pembersihan anus dan perineum secara keseluruhan.

e. Persiapan perawatan perineum

1) Persiapan

Ibu post partum: Perawatan perineum sebaiknya dilakukan dikamar mandi dengan posisi ibu jongkok jika ibu telah mampu atau berdiri dengan posisi kaki terbuka

Alat dan bahan: alat yang digunakan adalah botol, baskom dan gayung atau shower air hangat dan handuk bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air hangat, pembalut nifas baru dan antiseptik.

2) Penatalaksanaan

Perawatan khusus perineal bagi wanita setelah melahirkan anak mengurangi rasa ketidaknyamanan, kebersihan, mencegah infeksi, dan meningkatkan penyembuhan dengan prosedur pelaksanaan menurut Hamilton (2002) adalah sebagai berikut:

- a) Mencuci tangannya
- b) Mengisi botol plastik yang dimiliki dengan air hangat
- c) Buang pembalut yang telah penuh dengan gerakan kebawah mengarah ke rektum dan letakkan pembalut tersebut ke dalam kantung plastik.
- d) Berkemih dan BAB ke toilet.
- e) Semprotkan keseluruhan perineum dengan air
- f) Keriungkan perineum dengan tissue dari depan kebelakang
- g) Pasang pembalut dari depan kebelakang
- h) Cuci kembali tangan

3) Evaluasi

Parameter yang digunakan dalam evaluasi hasil perawatan adalah: perineum tidak lembab, posisi pembalut tepat, ibu merasa nyaman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh eny astuty tahun 2014 dengan hasil penelitian bahwa proses penyembuhan luka episiotomi yang dianastesi dan yang tidak di anastesi memiliki perbedaan. Dimana penyembuhan luka yang dianastesi lebih lama dibandingkan dengan yang dianastesi. Hal ini disebabkan karena efek anastesi atau zat anastesi lokal mempengaruhi kerja saraf disekitar luka episiotomi sehingga menyebabkan daerah atau jaringan perineum yang dianastesi menjadi padat. Saat bagian atau daerah perineum yang di anastesi ini padat maka akan dilakukan penjahitan untuk menyatukan kembali otot-otot perineum. Hasil penjahitan daerah perineum yang padat ini akan rapat/baik saat efek anastesinya belum hilang tetapi jika efek anastesinya hilang maka daerah perineum yang dianastesi dan padat tadi akan mulai mengendor sehingga luka jahitan tadi tidak rapat lagi atau bahkan ada jaringan yang tidak menyatu lagi. Disamping itu ada banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka antara lain: penyakit DM, bila ibu dengan gula darah tinggi maka akan mempengaruhi proses penyembuhan luka, perawatan luka yang kurang baik dari ibu sendiri juga berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka, keadaan nutrisi ibu juga sangat mempengaruhi penyembuhan luka. (Astuty Eny, 2014)

Kemudian hasil penelitian lain mengemukakan bahwa rata-rata waktu penyembuhan luka penyembuhan luka perineum pada tindakan episiotomi yaitu 6,61 hari dan robekan spontan yaitu 7,53 hari. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan waktu penyembuhan yaitu waktu penyembuhan luka perineum pada tindakan episiotomy lebih cepat daripada robekan spontan (Kristiyanti Rini, 2014).

f. Dampak perawatan luka perineum yang baik

Perawatan perineum yang dilakukan dengan baik dapat menghindarkan hal berikut ini:

1) Infeksi

Kondisi perineum yang terkena lokia dan lembab akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum.

2) Komplikasi

Munculnya infeksi pada perineum dapat merambat pada saluran kandung kemih ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan lahir.

3) Kematian ibu post partum

Penanganan komplikasi yang lambat dapat menyebabkan kematian pada ibu post partum mengingat kondisi ibu post partum masih lemah. (Sujiyatini.dkk, 2012).

g. Dampak perawatan luka perineum yang tidak benar

Perawatan perineum yang dilakukan dengan baik dapat menghindarkan hal berikut ini:

- 1) Infeksi: kondisi perineum yang terkena lokia dan lembab akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum.
- 2) Komplikasi: munculnya infeksi pada perineum dapat merambat pada saluran kandung kemih ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan lahir.
- 3) Kematian ibu pos partum: penanganan komplikasi yang lambat dapat menyebabkan terjadinya kematian pada ibu postpartum mengingat kondisi fisik ibu postpartum masih lemah.

Penanganan faktor yang mempengaruhi perawatan perineum, Antara lain:

1) Gizi

Faktor gizi terutama protein akan sangat mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka pada perineum karena penggantian jaringan sangat membutuhkan protein.

2) Obat-obatan

- a) Steroid: dapat menyamarkan adanya infeksi dengan mengganggu respon inflamasi normal.
- b) Antikoagulan: dapat menyebabkan hemoragi.
- c) Antibiotik spektrum luas/spesifik: efektif bila diberikan segera sebelum pembedahan untuk patologi spesifik atau kontaminasi bakteri. Jika diberikan setelah luka ditutup, tidak efektif karena koagulasi intrvaskular.

3) Keturunan

Sifat genetik seseorang harus mempengaruhi kemampuan dirinya dalam penyembuhan luka. Salah satu sifat genetik yang mempengaruhi adalah kemampuan dalam sekresi insulin dapat dihambat, sehingga menyebabkan glukosa darah meningkat. Dapat terjadi penipisan protein kalori.

4) Sarana prasaran

Kemampuan ibu dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam perawatan perineum akan sangat mempengaruhi penyembuhan perineum, misalnya kemampuan ibu dalam menyediakan antiseptik

5) Budaya dan keyakinan

Budaya dan keyakinan akan mempengaruhi penyembuhan perineum, misalnya kebiasaan makan telur, ikan dan daging ayam,

akan mempengaruhi asupan gizi ibu yang akan sangat mempengaruhi penyembuhan luka.

Fase-fase penyembuhan luka :

1) Fase inflamasi, berlangsung selama 1-4 hari.

Respons vascular dan selular terjadi ketika jaringan terpotong atau mengalami cedera. Vasokonstriksi pembuluh terjadi dan bekuan fibrinoplatet terbentuk dalam upaya untuk mengontrol perdarahan. Reaksi ini berlangsung dari 5 menit sampai 10 menit dan di ikuti oleh vasodilatasi venula. Mikrosirkulasi kehilangan kemampuan vasokonstriksinya karena norepinefrin di rusak oleh enzim intra selular. Juga, histamine dilepaskan, yang meningkat permeabilitas kapiler.

2) Fase proliforative, berlangsung 5-20 hari

Fibroblast memperbanyak diri dan membentuk jarring-jaring untuk sel-sel yang bermigrasi. Sel-sel epitel membentuk kuncup pada pinggir luka, kuncup ini berkembang menjadi kapiler.

3) Fase maturasi, berlangsung 21 sampai sebulan atau bahkan tahunan.

Sekitar 3 minggu setelah cedera, fibroblast mulai meninggalkan luka. Jaringan parut tanpa besar, sampai fibrilkolagen menyusun ke dalam posisi yang lebih padat. (Rukiah Ai yeyeh.dkk,2012:43).


3. Nyeri Luka Perineum

a. Pengukuran skala nyeri

Nyeri digolongkan sebagai gangguan sensorik positif. Pada hakikatnya nyeri tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat diukur, namun tidak dapat dipungkiri bahwa nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan bahkan menyakitkan. Nyeri adalah suatu sensasi yang unik. Keunikannya karena derajat berat dan ringan nyeri yang dirasakan tidak ditentukan hanya oleh intensitas stimulus tetapi juga oleh perasaan dan emosi pada saat itu.

Pada dasarnya nyeri adalah reaksi fisiologis karena reaksi protektif untuk menghindari stimulus yang membahayakan tubuh. Tetapi bila nyeri tetap berlangsung walaupun stimulus penyebab sudah tidak ada, berarti telah terjadi perubahan patofisiologis yang justru merugikan tubuh. Sebagai contoh, nyeri karena luka episiotomi, masih tetap dirasakan pada masa pasca melahirkan. Nyeri semacam ini tidak saja menimbulkan perasaan tidak nyaman, tetapi juga reaksi stres, yaitu rangkaian reaksi fisik maupun biologis yang dapat menghambat proses penyembuhan. Nyeri patologis atau nyeri klinik inilah yang membutuhkan terapi.

Derajat nyeri dapat diukur dengan berbagai cara, misalnya tingkah laku pasien skala verbal dasar / Verbal Rating Scales (VRS), dan yang umum adalah skala analog visual / Visual Analogue Scales (VAS).



Gambar 1. Visual Analog Scale (VAS)

Dalam penilaian skala nyeri diatas 0,1,2,3 termasuk dalam kategori ringan. 4,5,6 nyeri sedang. 7,8,9,10 termasuk kategori nyeri berat.

b. Patofisiologi nyeri

Proses rangsangan yang menimbulkan nyeri bersifat destruktif terhadap jaringan yang dilengkapi dengan serabut saraf penghantar impuls nyeri. Serabut saraf ini disebut juga serabut nyeri, sedangkan jaringan tersebut disebut jaringan peka-nyeri. Bagaimana seseorang menghayati nyeri tergantung pada jenis jaringan yang dirangsang, jenis serta sifat rangsangan, serta pada kondisi mental dan fisiknya. Reseptor untuk stimulus nyeri disebut nosiseptor. Nosiseptor adalah ujung saraf tidak bermielin A delta dan ujung saraf C bermielin.

Distribusi nosiseptor bervariasi di seluruh tubuh dengan jumlah terbesar terdapat di kulit. Nosiseptor terletak di jaringan subkutis, otot rangka, dan sendi. Nosiseptor yang terangsang oleh stimulus yang potensial dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Stimulus ini disebut sebagai stimulus noksius. Selanjutnya stimulus noksius ditransmisikan ke sistem syaraf pusat, yang kemudian menimbulkan emosi dan perasaan tidak

menyenangkan sehingga timbul rasa nyeri dan reaksi menghindar. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif terdapat empat proses tersendiri: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi.

1) Proses transduksi

Transduksi nyeri adalah rangsang nyeri (noksius) diubah menjadi depolarisasi membran reseptor yang kemudian menjadi impuls saraf reseptor nyeri. Rangsangan ini dapat berupa rangsang fisik (tekanan), suhu (panas), atau kimia. Adanya rangsang noksius ini menyebabkan pelepasan asam amino eksitasi glutamat pada saraf afferent nosisepsi terminal menempati reseptor AMPA (alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-D-aspartate), akibat penempatan pada reseptor menyebabkan ion Mg^{2+} pada saluran Ca^{2+} terlepas masuk ke dalam sel, demikian juga ion Ca^{2+} , K^{+} , dan H^{+} . Terjadi aktivasi protein kinase c dan menghasilkan NO yang akan memicu pelepasan substansi p dan terjadi hipersensitisasi pada membran kornu dorsalis.

Kerusakan jaringan karena trauma, dalam hal ini odontektomi, menyebabkan dikeluarkannya berbagai senyawa biokimiawi antara lain: ion H^{+} , K^{+} , prostaglandin dari sel yang rusak, bradikinin dari plasma, histamin dari sel mast, serotonin dari trombosit dan substansi P dari ujung saraf. Senyawa biokimiawi ini berfungsi sebagai mediator yang menyebabkan perubahan potensial nosiseptor sehingga terjadi arus elektrobiokimiawi sepanjang akson.

Kemudian terjadi perubahan patofisiologis karena mediator-mediator ini mempengaruhi juga nosiseptor di luar daerah trauma sehingga lingkaran nyeri meluas. Selanjutnya terjadi proses sensitisasi perifer yaitu menurunnya nilai ambang rangsang nosiseptor karena pengaruh mediator-mediator tersebut di atas dan penurunan pH jaringan. Akibatnya nyeri dapat timbul karena rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan nyeri misalnya rabaan. Sensitisasi perifer ini mengakibatkan pula terjadinya sensitisasi sentral yaitu hipereksitabilitas neuron pada korda spinalis, terpengaruhnya neuron simpatis, dan perubahan intraselular yang menyebabkan nyeri dirasakan lebih lama.

2) Proses transmisi

Transmisi adalah proses penerusan impuls nyeri dari nosiseptor saraf perifer melewati kornu dorsalis menuju korteks serebri. Saraf sensoris perifer yang melanjutkan rangsang ke terminal di medula spinalis disebut neuron aferen primer. Jaringan saraf yang naik dari medula spinalis ke batang otak dan talamus disebut neuron penerima kedua. Neuron yang menghubungkan dari talamus ke korteks serebri disebut neuron penerima ketiga.

3) Proses modulasi

Proses modulasi adalah proses dimana terjadi interaksi antara sistem analgesi endogen yang dihasilkan oleh tubuh dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgesi

endogen ini meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin memiliki efek yang dapat menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Proses modulasi ini dapat dihambat oleh golongan opioid.

4) Proses persepsi

Proses persepsi merupakan hasil akhir proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. (fauziah,2013: 3-5)

c. Pengaruh kompres es (*ice pack*) dalam menurunkan nyeri luka perineum.

Proses penanganan nyeri secara nonfarmakologi yaitu,berawal dari kerusakan jaringan seperti luka episiotomi menyebabkan sintesa prostaglandin , dimana prostaglandin inilah yang akan menyebabkan sensitasi dari reseptor-reseptor nosiseptif dan dikeluarkan zat-zat mediator nyeri.selanjutnya, proses penyaluran impuls saraf melalui serabut A-delta dan serabut C dari perifer ke madula spinalis yang membawa rangsangan kedalam organ yang lebih dalam dn visceral serta berhubungan dengan nyeri sehingga dapat dirasakan sebagai persepsi nyeri.Kandungan ice pack yang memberikan sensasi dingin dapat mengurangi produksi prostaglandin sehingga dapat melemahkan sensitasi dari mediator nyeri. Selain itu, ice pack juga membuat jaringan yang area episiotomi menjadi mati rasa sehingga menghambat aliran implus nyeri, selain itu kompres es juga

merangsang pelepasan endorphin sehingga menurunkan transmisi nyeri melalui diameter serabut C yang mengecil serta mengaktifkan transmisi serabut saraf sensorik A-beta yang lebih cepat dan hebat.

C. Tinjauan Manajemen Kebidanan

1. Pengertian

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan, dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang berfokus pada klien. (Nurul, 2012).

2. Proses Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan, yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bias diaplikasikan dalam semua situasi. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut Varney.

Adapun tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney adalah:

a. Pengkajian (pengumpulan data dasar)

Pengkajian atau pengumpulan data dasar adalah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan pasien.

Merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien.

1) Data Subyektif

a) Biodata yang mencakup identitas pasien

(1) Nama

Nama jelas dan lengkap, bila perlu nama panggilan sehari-hari agar tidak keliru dalam memberikan penanganan.

(2) Umur

Dicatat dalam tahun untuk mengetahui adanya resiko seperti kurang dari 20 tahun, alat-alat reproduksi belum matang, mental dan psikisnya belum siap. Sedangkan umur lebih dari 35 tahun rentang sekali untuk terjadi perdarahan dalam masa nifas.

(3) Agama

Agama untuk mengetahui keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau mengarahkan pasien dalam berdoa.

(4) Pendidikan

Berpengaruh dalam tindakan kebidanan dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat intelektualnya, sehingga bidan dapat memberikan konseling sesuai dengan pendidikannya.

(5) Suku/bangsa

Berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari.

(6) Pekerjaan

Gunanya untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial ekonominya, karena ini juga mempengaruhi dalam gizi pasien tersebut.

(7) Alamat

Ditanyakan untuk mempermudah kunjungan rumah bila diperlukan.

b) Keluhan Utama

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan masa nifas, misalnya pasien merasa mules, sakit pada jalan lahir karena adanya jahitan pada perineum.

c) Riwayat Kesehatan

(1) Riwayat kesehatan yang lalu

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat atau penyakit akut, kronis seperti: jantung, DM, Hipertensi, Asma yang dapat mempengaruhi pada masa nifas ini.

(2) Riwayat kesehatan sekarang

Data-data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya dengan masa nifas dan bayinya.

(3) Riwayat kesehatan keluarga

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh penyakit keluarga terhadap gangguan kesehatan pasien dan bayinya, yaitu apabila ada penyakit keluarga yang menyertainya.

d) Riwayat Perkawinan

Yang perlu dikaji adalah berapa kali menikah, status menikah sah atau tidak, karena bila melahirkan tanpa status yang jelas akan berkaitan dengan psikologisnya sehingga akan mempengaruhi proses nifas.

e) Riwayat Obstetrik

(1) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. Berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan, keadaan nifas yang lalu.

(2) Riwayat persalinan sekarang

Tanggal persalinan, jenis persalinan, jenis kelamin anak, keadaan bayi meliputi PB, BB, penolong persalinan. Hal ini perlu dikaji untuk mengetahui apakah proses persalinan mengalami kelainan atau tidak yang bisa berpengaruh pada masa nifas saat ini.

f) Riwayat KB

Untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama

menggunakan kontrasepsi serta rencana KB setelah masa nifas ini dan beralih ke kontrasepsi apa.

g) Kehidupan Sosial Budaya

Untuk mengetahui pasien dan keluarga yang menganut adat istiadat yang akan menguntungkan atau merugikan pasien khususnya pada masa nifas misalnya pada kebiasaan pantang makan.

h) Data Psikososial

Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap bayinya. Wanita banyak mengalami perubahan emosi/psikologis selama masa nifas sementara ia menyesuaikan diri menjadi seorang ibu. Cukup sering ibu menunjukkan depresi ringan beberapa hari setelah kelahiran. Depresi tersebut sering disebut sebagai postpartum blues. Hal ini sering terjadi sering diakibatkan oleh sejumlah faktor. Penyebab yang paling menonjol.

- (1) Kekecewaan emosional yang mengikuti rasa puas dan takut yang dialami kebanyakan wanita selama kehamilan dan persalinan.
- (2) Rasa sakit masa nifas awal
- (3) Kelelahan karena kurang tidur selama persalinan dan postpartum.
- (4) Kecemasan pada kemampuannya untuk merawat bayinya setelah meninggalkan rumah sakit.
- (5) Rasa takut menjadi tidak menarik lagi bagi suaminya.

i) Data Pengetahuan

Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu tentang perawatan setelah melahirkan sehingga akan menguntungkan selama masa nifas.

j) Pola Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

(1) Nutrisi

Menggambarkan tentang pola makan dan minum, frekuensi, banyaknya, jenis makanan, makanan pantangan.

(2) Eliminasi

Menggambarkan pola fungsi sekresi yaitu kebiasaan buang air besar meliputi frekuensi, jumlah, konsistensi dan bau serta kebiasaan buang air kecil meliputi frekuensi, warna, jumlah.

(3) Istirahat

Menggambarkan pola istirahat dan tidur pasien, berapa jam pasien tidur, kebiasaan sebelum tidur misalnya membaca mendengarkan music, kebiasaan mengomsumsi obat tidur, kebiasaan tidur siang, penggunaan waktu luang, istirahat sangat penting bagi ibu masa nifas karena dengan istirahat yang cukup dapat mempercepat penyembuhan.

(4) Personal hygiene

Dikaji untuk mengetahui apakah ibu selalu menjaga kebersihan tubuh terutama pada daerah genitalia, karena pada masa nifas masih mengeluarkan lochea.

(5) Aktifitas

Menggambarkan pola aktifitas pasien sehari-hari. Pada pola ini perlu dikaji pengaruh aktifitas terhadap kesehatannya.

2) Data Objektif

Dalam menghadapi masa nifas dari seorang klien, seorang bidan harus mengumpulkan data untuk memastikan bahwa keadaan klien dalam keadaan stabil. Yang termasuk dalam komponen-komponen pengkajian data obyektif ini adalah:

a) Tanda-tanda vital

Ditujukan untuk mengetahui keadaan ibu berkaitan dengan kondisi yang dialaminya.

(1) Temperatur/suhu

Peningkatan suhu badan mencapai pada 24 jam pertama masa nifas pada umumnya disebabkan oleh dehidrasi, yang disebabkan oleh keluarnya cairan pada waktu yang melahirkan, selain itu juga bisa disebabkan karena istirahat dan tidur yang diperpanjang selama awal persalinan.

(2) Nadi dan pernafasan

- (a) Nadi berkisar antara 60-80x/menit. Denyut nadi diatas 100x/menit pada masa nifas adalah mengindikasikan adanya suatu infeksi, hal ini salah satunya bisa diakibatkan oleh proses persalinan sulit atau karena kehilangan darah yang berlebihan.
- (b) Jika takikardi tidak disertai panas kemungkinan disebabkan karena adanya vitium kordis.
- (c) Beberapa ibu postpartum kadang-kadang mengalami bradikardi puerperal, yang denyut nadinya mencapai serendah-rendahnya 40 sampai 50x/menit.
- (d) Pernafasan harus berada dalam rentang yang normal, yaitu sekitar 20-30x/menit.

(3) Tekanan darah

Pada beberapa kasus ditemukan keadaan hipertensi postpartum, tetapi keadaan ini akan menghilang dengan sendirinya apabila tidak ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya dalam 2 bulan pengobatan.

b) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Menjelaskan pemeriksaan fisik.

1) Keadaan buah dada dan puting susu

- a) Simetris/tidak
- b) Konsistensi, ada pembengkakan/tidak
- c) Puting menonjol/tidak, lecet/tidak

2) Keadaan abdomen

a) Uterus:

Normal:

- (1) Kokoh, berkontraksi baik
- (2) Tidak berada diatas ketinggian fundal saat masa nifas segera.

Abnormal:

- 1) Lembek
- 2) Diatas ketinggian fundal saat masa post partum segera

b) Kandung kemih: bisa buang air/tidak bisa buang air

3) Keadaan genitalia

a) Lochea:

Normal:

- (1) Merah hitam (lochia rubra)
- (2) Bau biasa
- (3) Tidak ada bekuan darah atau butir-butir darah beku (ukuran jeruk kecil)

- (4) Jumlah perdarahan yang ringan atau sedikit (hanya perlu mengganti pembalut setiap 3-5 jam)

Abnormal:

- (1) Merah terang
 - (2) Bau busuk
 - (3) Mengeluarkan darah beku
 - (4) Perdarahan berat (memerlukan penggantian pembalut setiap 0-2 jam)
- b) Keadaan perineum: oedema, hematoma, bekas luka episiotomi/robekan, hecting
 - c) Keadaan anus: hemorrhoid
 - d) Keadaan ekstremitas: varises, edema, refleks patella.

b. Interpretasi Data

Mengidentifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang dikumpulkan diinterpretasikan menjadi diagnose kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap pasien, masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan.

1) Diagnose Kebidanan

Diagnosa dapat ditegakkan yang berkaitan dengan para, abortus, anak hidup, umur ibu, dan keadaan nifas. Data dasar meliputi:

a) Data subyektif

Pernyataan ibu tentang jumlah persalinan, apakah pernah abortus atau tidak, keterangan ibu tentang umur, keterangan ibu tentang keluhannya.

b) Data obyektif

Palpasi tentang tinggi fundus uteri dan kontraksi, hasil pemeriksaan tentang pengeluaran pervaginam, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital.

2) Masalah

Permasalahan yang muncul berdasarkan pernyataan pasien.

Data dasar meliputi:

a) Data subyektif

Data yang didapat dari hasil anamnesa pasien

b) Data obyektif

Data yang didapat dari hasil pemeriksaan

3) Diagnosa Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang mungkin akan terjadi. Pada langkah ini diidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa, hal ini

membutuhkan antisipasi, pencegahan, bila memungkinkan menunggu, mengamati dan bersiap-siap apabila hal tersebut benar-benar terjadi. Melakukan asuhan yang aman penting sekali dalam hal ini.

4) Antisipasi Masalah

Langkah ini memerlukan kesenambungan dari manajemen kebidanan. Identifikasi dan menetapkan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi pasien.

c. Perencanaan

Langkah-langkah ini ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya yang merupakan lanjutan dari masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah dilihat dari kondisi pasien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga berkaitan dengan kerangka pedoman antisipasi bagi wanita tersebut yaitu apa yang akan terjadi berikutnya.

Penyuluhan, konseling dari rujukan untuk masalah-masalah sosial, ekonomi atau masalah psikososial. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pada kasus ini adalah :

- 1) Observasi meliputi keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, anjurkan ibu untuk segera berkemih, observasi mobilisasi dini, jelaskan manfaatnya.

2) Kebersihan diri

- (a) Jaga kebersihan seluruh tubuh terutama daerah genitalia.
- (b) Ganti pembalut minimal dua kali sehari atau setiap kali selesai BAK.

3) Istirahat

- (a) Cukup istirahat
- (b) Beri pengertian mamfaat
- (c) Kembali mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

4) Gizi

- (a) Makan bergizi, bermmutu dan cukup kalori
- (b) Minum 3 liter air sehari atau segelas setiap habis menyusui.
- (c) Minum tablet Fe/zat besi
- (d) Minum vitamin A (200.000 unit)

5) Perawatan payudara

- (a) Jaga kebersihan payudara
- (b) Beri ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan.

6) Hubungan seksual

Beri pengertian hubungan seksual kapan boleh dilakukan.

7) Keluarga berencana

Anjurkan pada ibu untuk mengikuti KB sesuai dengan keinginannya.

d. Pelaksanaan

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan penyuluhan pada klien dan keluarga. Mengarahkan atau melaksanakan rencana asuhan secara efisien dan aman.

1) Mengobservasi meliputi

- a) Keadaan umum
- b) Kesadaran
- c) Tanda-tanda vital dengan mengukur (tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan.
- d) Tinggi fundus uteri, kontraksi uterus.
- e) Menganjurkan ibu untuk segera berkemih karena apabila kandung kencing penuh akan menghambat proses involusi uterus.
- f) Menganjurkan pada ibu untuk memperlancar pengeluaran lochea, memperlancar peredaran darah.

2) Kebersihan diri

- a) Menjaga kebersihan seluruh tubuh terutama daerah genitalia.
- b) Mengganti pembalut minimal dua kali sehari atau setiap kali selesai BAK.

3) Istirahat

- a) Memberi saran pada ibu untuk cukup tidur siang agar tidak terlalu lelah.

b) Memberi pengertian pada ibu, apabila kurang istirahat dapat menyebabkan produksi ASI kurang, proses involusiberjalan lambat sehingga dapat menyebabkan perdarahan.

c) Menganjurkan pada ibu untuk kembali mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

4) Gizi

a) Mengonsumsi makanan yang bergizi, bermutu dan cukup kalori,, sebaiknya ibu makan-makanan yang mengandung protein, vitamin dan mineral.

b) Minum sedikitnya 3 liter sehari atau segelas setiap habis menyusui

c) Minum tablet FE/zat besi selama 40 hari postpersalinan

d) Minum vitamin A (200.000 unit) agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

5) Perawatan payudara

a) Menjaga kebersihan payudara

b) Memberi ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan.

6) Hubungan seksual

Memberi pengertian hubungan seksual kapan boleh dilakukan.

7) Keluarga berencana

Menganjurkan pada ibu untuk segera mengikuti KB setelah masa nifas terlewati sesuai dengan keinginannya.

e. Evaluasi

Langkah ini merupakan langkah terakhir guna mengetahui apa yang telah dilakukan bidan. Mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang dibagikan, ulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau merencanakan kembali yang belum terlaksana. (Ambarwati Retna dkk, 2012)

D. Tinjauan Islam Tentang Masa Nifas

Agama islam telah mengatur yang ingin manusia lakukan dalam segala hal begitu pun dengan masa nifas seperti yang dijelaskan dalam surah dibawah ini (QS.Al-Baqarah /2:222), sebagai berikut:

وَدَسَّئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ


Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Q.S Al-Baqarah: 222).

Penjelasan mengenai ayat di atas adalah; Dari kata *mahidh* adalah tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Pernyataan di atas muncul pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan mereka pada saat mereka sedang haid atau datang bulan. Dengan demikian pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid, tetapi bagaimana tuntunan Ilahi pada suami pada saat istrinya sedang haid. Jawaban di atas sangat singkat namun menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid, dan bagaimana menghadapi mereka kala itu. Sesaat setelah turunnya ayat ini, Nabi saw, menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyetakan kepada para penanya dan seluruh ummat islam, “lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini debenarkan) kecuali hubungan seks” (H.R Muslim). lanjut ayat di atas – *hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita, dalam arti tidak bersetubuh, pada waktu mereka mengalami haid; atau pada tempat haid itu keluar. Itu berarti boleh mendekati asal bukan pada tempat haid, yakni bukan pada tempat gangguan itu. Nabi mengizinkan untuk bercumbu pada bagian atas, tidak dibagian bawah. Disini, ditegaskan lagi kata *mahidh*, walaupun bisa jadi ada sementara orang yang merasa cukup menunjuknya dengan kata *itu*. Misalnya *hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu itu atau pada tempat itu*.*

Kemudian, kapan hubungan seks dapat dilakukan? Kapan saja, tetapi dengan syarat *Apabila mereka telah suci (bersuci), maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepada kamu*. Tempat yang diperintahkan-

Nya itu, akan terlihat sebentar lagi dalam ayat 223. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai juga orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri*. Bertaubat adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau wudhu. Demikian penyucian jasmani dan rohani digabung oleh penutup ayat ini, sekaligus memberi isyarat bahwa hubungan seks baru dapat dibenarkan jika haid telah berhenti dan istri telah mandi. (Shihab, M. Quraish, 2009).



BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU POST PARTUM NY "S"
DENGAN EPISIOTOMI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 10 AGUSTUS 2017

No. Register : 42.xxxx

Tanggal partus : 10 Agustus 2017, Pukul 16.00 wita

Tanggal masuk : 10 Agustus 2017, Pukul 14.30 wita

Tanggal pengkajian : 10 Agustus 2017, Pukul 19.00 wita

Nama Pengkaji : Mutmainna Alka

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas

Identitas istri/suami

Nama : Ny. S / Tn. E

Umur : 23 tahun / 21 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Bujjulu, Kec. Borongloe Kab. Gowa

B. Data Subjektif

1. Keluhan utama

Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan bekas pengguntingan pada jalan lahir

2. Riwayat keluhan utama

- a. Ibu mengatakan pada saat proses persalinan dilakukan pengguntingan pada jalan lahir
- b. Nyeri dirasakan setelah melahirkan pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.00 wita
- c. Sifat nyeri dirasakan lebih terasa jika bergerak atau bila ditekan
- d. Usaha ibu untuk mengatasinya yaitu ibu berbaring dan bergerak lebih hati-hati

3. Riwayat kehamilan dan persalinan

- a. Riwayat kehamilan
 - 1) Merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
 - 2) Hari pertama haid terakhir tanggal 28 Oktober 2016
 - 3) Hari taksiran persalinan tanggal 17 Agustus 2017
 - 4) Selama hamil ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak \pm 4 kali

5) Selama hamil telah mendapatkan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid sebanyak 2 kali

TT 1 : 8 Februari 2017 di Puskesmas, Kec. Barongloe
Kab. Gowa

TT 2 : 6 Maret 2017 di puskesmas, Kec. Barongloe Kab.
Gowa

6) Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit serius lainnya

7) Tidak ada riwayat penyakit menurun, menular dan menahun dalam keluarga

8) Selama hamil ibu tidak pernah mengalami mual muntah berlebih, nyeri perut yang hebat, perdarahan atau tanda bahaya kehamilan lainnya

b. Riwayat persalinan

Ibu melahirkan pukul 16:00 wita dengan partus kala II lama.

Ibu melahirkan bayi laki-laki dengan BBL: 2750 gram. Plasenta lahir lengkap pukul 16:10 wita. Pada saat persalinan dilakukan pengguntingan pada jalan lahir (episiotomi mediolateralis dengan anastesi).

4. Riwayat kesehatan yang lalu

a. Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan asma

b. Tidak ada riwayat operasi

c. Tidak ada riwayat alergi obat

5. Riwayat keluarga berencana

Ibu belum pernah menjadi akseptor KB

6. Riwayat psikososial, spiritual dan ekonomi

- a. Ibu, suami dan keluarga sangat senang dengan kelahiran anak ibu
- b. Ibu dan suami senantiasa berdoa agar anaknya selalu sehat
- c. Biaya persalinan ditanggung oleh suami.

7. Pola pemenuhan dasar

a. Nutrisi

1) Sebelum nifas

Ibu mengatakan makan 2-3 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan teh

2) Selama nifas

Ibu mengatakan sudah makan 1 kali, menu dari rumah sakit, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan, buah dan minum 1 gelas air putih dan 1 gelas teh.

b. Eliminasi

1) Sebelum nifas

Buang Air Kecil (BAK) 6-7 kali sehari, warna urine kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada nyeri saat BAK

Buang Air Besar (BAB) 1-2 kali sehari, warna kuning kecoklatan, lunak, dan tidak ada keluhan

2) Selama nifas

Ibu mengatakan telah BAK 1 kali setelah melahirkan tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.30 wita.

Ibu mengatakan belum BAB setelah melahirkan

c. Istirahat/tidur

1) Sebelum nifas

Ibu mengatakan tidur siang 2-4 jam dan tidur malam 8 jam

2) Selama nifas

Ibu mengatakan baru tidur \pm 1½ jam setelah melahirkan

d. Keadaan psikologis

Ibu mengatakan merasa bahagia dan sangat senang dengan kelahiran anak pertamanya dalam keadaan sehat

e. Spiritual

1) Sebelum nifas

Ibu mengatakan rutin melakukan salat 5 waktu, ibu sesekali membaca Al-Qur'an dan tidak terlalu memahami tajwidnya

2) Selama nifas

Ibu mengetahui bahwa selama 40 hari masa nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dan setelah 40 hari ibu harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah.

f. Riwayat social budaya

1) Dukungan keluarga

Ibu mengatakan suami dan keluarganya sangat mendukung dan merasa senang dengan kelahiran anaknya

2) Kebiasaan adat istiadat

Ibu mengatakan bahwa setelah bayi lahir ari-arinya ditanam dekat rumah

3) Penggunaan obat-obatan

Ibu mengatakan hanya minum obat dari bidan atau dokter.

C. Data Objektif

1. Masa nifas hari pertama

2. Keadaan umum ibu baik

3. Kesadaran composmentis

4. Ekspresi ibu tampak meringis bila bergerak

5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80 kali/menit, teratur

Suhu : 36,6 °C, aksilar

Pernapasan : 24 kali/menit

1. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tampak meringis

- Palpasi : Tidak ada *pitting* oedem
- b. Mata
- Inspeksi : konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterus
- c. Hidung
- Inspeksi : tidak ada pernapasan cuping hidung, dan polip
- Palpasi : tidak ada nyeri tekan
- d. Mulut
- Inspeksi : bibir tidak pucat dan tidak pecah-pecah atau kering, keadaan mulut bersih, gigi tidak caries
- e. Telinga
- Inspeksi : tidak ada kelainan dan tidak ada serumen
- Palpasi : tidak ada nyeri tekan
- f. Leher
- Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid
- Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dan vena jugularis
- g. Payudara
- Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu sedikit menonjol, tampak hiperpigmentasi pada aerola, ada pembesaran, tidak ada peradangan
- Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila ditekan daerah aerola terdapat pengeluaran kolostrum

h. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : ada sedikit nyeri tekan, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.

i. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak ada varises, tampak pengeluaran lochia rubra, terdapat luka jahitan episiotomi secara mediolateral, luka jahitan masih lembab.

Palpasi : pada luka jahitan terdapat nyeri tekan, tidak ada *pitting* oedema. Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka.

j. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varices

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa Masalah Aktual : Nyeri luka jahitan dengan luka episiotomi

Data dasar

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.00 wita
2. Ibu mengatakan saat bersalin dilakukan pengguntingan pada jalan lahir dan mendapatkan beberapa jahitan
3. Ibu mengatakan nyeri pada jahitan bekas pengguntingan jalan lahir dan ada pengeluaran darah dari jalan lahir.

Data Objektif :

1. Keadaan umum ibu sedikit terlihat lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital
Tekanan darah : 120/80 mmHg
Nadi : 80 kali/menit, teratur
Suhu : 36,6 °C, aksilar
Pernapasan : 24 kali/menit, saat istirahat
4. TFU 1 jari di bawah pusat
5. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
6. Tampak pengeluaran lochia rubra

7. Tampak jahitan luka episiotomi mediolateral

Analisa dan interpretasi data

1. Ibu tampak lemah karena pada saat proses persalinan ibu dengan sekuat tenaga menyeimbangkan kontraksi yang dirasakannya dan selama proses persalinan ibu berkuat untuk melahirkan bayinya sehingga tenaga ibu terkuras dan ibu merasa kelelahan (Kuswanti dan Melina, 2014:7).
2. Pada hari pertama postpartum, didapatkan tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat. Lochia adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan vagina selama masa nifas. Pada hari pertama postpartum sampai hari kedua lochia yang keluar adalah lochia rubra (*cruenta*) berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekoneum, lochia ini yang akan keluar selama dua sampai tiga hari masa nifas (Saleha, 2013: 56).
3. Luka episiotomi adalah pengguntingan berupa sayatan kecil pada perineum yang dilakukan pada saat proses persalinan berlangsung. Episiotomi dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pembukaan vagina sehingga bayi dapat keluar lebih mudah tujuan tindakan episiotomi ialah memperlebar jalan lahir, mempercepat persalinan kala II lama yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primi, yang ditandai dengan tanda dan gejala klinis pembukaan serviks lengkap dan ibu mengedan tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala (Asri dan Clervo, 2012: 86).

4. Nyeri luka episiotomi disebabkan oleh terputus/rusaknya jaringan-jaringan dasar panggul atau terputusnya otot-otot perineum dari tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan respon nyeri ke hypothalamus dan presepsikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri. Dan dengan adanya jaringan parut dapat mengakibatkan *dispareunia* atau nyeri pada vagina atau nyeri di dalam panggul juga dapat terjadi selama melakukan hubungan seksual (Pudiastuti, 2012: 1).

Kebutuhan :

Memberikan perawatan luka episiotomi dengan kompres es (*ice pack*) dan *Health Education* tentang perawatan luka episiotomi.

LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa Masalah Aktual : Antisipasi terjadi infeksi luka episiotomi

Data Dasar

Data Subjektif :

1. Ibu melahirkan tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.00 wita
2. Ibu merasa nyeri pada jahitan luka jahitan
3. Ibu merasa adanya pengeluaran darah dari jalan lahir

Data Objektif :

1. Tampak jahitan luka episiotomi secara mediolateral
2. Nyeri tekan pada perineum
3. Luka jahitan episiotomi terlihat masih lembab

4. Tampak pengeluaran lochia rubra

Analisa dan interpretasi data

Luka episiotomi merupakan rusaknya jaringan daerah perineum tersebut, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada masa nifas masih terdapat pengeluaran darah lochia dan kotoran yang keluar dari vagina. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim. Padahal, dalam keadaan luka, perineum rentan didatangi kuman dan bakteri sehingga mudah terinfeksi (Marmi, 2012: 141).

LANGKAH IV: TINDAKAN EMERGENCY DAN KOLABORASI

Tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan dokter yaitu meresepkan dan pemberian obat analgetik, analgesik, antiinflamasi dan zat besi untukantisipasi terjadi infeksi.

- a. Asam Mafenamat 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai obat analgetik, analgesik, dan antiinflamasi.

- b. Cefadroxil 500 mg dosis 2 kali sehari

Sebagai antibiotik dengan spektrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif

- c. Multi Vitamin dengan Fero Sulfat 500 mg dosis 1 kali sehari

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke

otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

PLANNING

- Tujuan : 1. Masa nifas berlangsung normal
2. Nyeri pada luka episiotomi berkurang
3. Tidak terjadi infeksi
- Kriteria : 1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah ibu tenang
3. Ibu tidak mengeluh nyeri pada luka bekas jahitan
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- a. Tekanan darah sistol 90-130 mmHg dan distol 60-90 mmHg
- b. Nadi 80-100 kali/menit
- c. Suhu 36,5-37,5°C
- d. Pernapasan 16-24 kali/menit
5. TFU turun 1 cm setiap hari
6. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
7. Pengeluaran lochia sesuai waktunya

Intervensi tanggal 10 agustus 2017 pukul 19.15 wita

1. Jelaskan ibu hasil pemeriksaan

Rasional: Agar ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini.

2. Observasi Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi uterus, pengeluaran lochia

Rasional: Pemeriksaan TFU dilakukan untuk mengetahui bahwa proses involusi uteri berjalan normal atau tidak, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/hari yang teraba bundar dan keras (Saleha, 2013: 130). Menilai kontraksi uterus merupakan salah satu upaya pencegahan perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013: 131). Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa masa nifas berlangsung normal dengan ditandai pengeluaran lochia yang sesuai dengan waktu dan warna serta baunya (Maritalia, 2012: 21).

3. Jelaskan penyebab nyeri luka episiotomi yang dirasakan ibu

Rasional: Adanya pemisahan jaringan otot-otot perineum pada saat dilakukan episiotomi yang mengakibatkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1).

4. Anjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap

Rasional: mobilisasi dini dapat memulihkan kondisi tubuh dengan cepat, system sirkulasi di dalam tubuh pun bisa berfungsi normal kembali. Bahkan dapat mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah dapat menyebabkan terjadinya thrombosis vena dalam dan dapat menyebabkan infeksi (Marmi, 2012:137).

2. Lakukan perawatan luka episiotomi dengan kompres es

Rasional: Melakukan perawatan luka episiotomi dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan (Marmi, 2012: 141).

Penanganan nyeri dapat dilakukan secara farmakologis dan nonfarmakologis. Penanganan nyeri secara farmakologis berisiko bagi bayi karena masuk ke dalam peredaran darah yang terkumpul pada air susu ibu sedangkan secara nonfarmakologis lebih aman diterapkan karena mempunyai risiko yang lebih kecil, tidak menimbulkan efek samping serta menggunakan proses fisiologis. Salah satu cara penanganan nyeri nonfarmakologis dengan pemberian kompres dingin dalam bentuk kantong es (*ice pack*) yakni sebuah kompres es yang dikemas dengan menggunakan sarung tangan karet yang diisi batu es dan dibungkus dengan sesuatu yang bersih seperti kain lap sekali pakai atau handuk sekali pakai. Nyeri dapat mereda karena *ice pack* mengurangi prostaglandin yang memperkuat reseptor nyeri, menghambat proses inflamasi merangsang pelepasan endorfin sehingga menurunkan transmisi nyeri melalui diameter serabut C yang mengecil serta mengaktifasi transmisi serabut saraf sensorik A-beta yang lebih cepat dan besar. (Wenniarti, dkk.2016:2).

3. Berikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup

Rasional: Memulihkan kembali tenaga ibu yang terkuras selama proses persalinan (Marmi, 2012:137).

4. Jelaskan kepada ibu tentang akibat kurang istirahat

Rasional: Kurang istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri (Marmi, 2012:145).

5. Jelaskan kepada ibu tentang manfaat dari ASI eksklusif

Rasional: Komposisi susuai kebutuhan, kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim kebentuk semula (Saleha, 2013:31-32).

6. Anjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi

Rasional: Makan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:31-131).

7. Anjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum

Rasional: Menjaga kebersihan daerah perineum ibu dan mencegahnya dari infeksi serta membantu mempercepat proses penyembuhan luka jahitan episiotomi (Marmi, 2012:139).

8. Ajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka episiotomi

Rasional: Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang benar, maka ibu dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka episiotomi (Marmi, 2012: 142).

9. Jelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi

Rasional: Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada jahitan luka episiotomi, diharapkan ibu dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi (Marmi, 2012:142).

10. Jelaskan kepada ibu tentang tehnik menyusui yang baik dan benar

Rasional: Bayi akan tampak tenang karena mudah mnghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup, dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri (Saleha, 2013:38).

11. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan

Rasional: Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik (Marmi, 2012:147).

12. Anjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan.

Rasional: Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain penyebab infeksi, serta dengan pemberian zat besi pada ibu nifas karena di masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013:31-132).

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Tanggal 16 juni 2017 pukul 13.15 wita

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik

Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini

2. Mengobservasi Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi uterus, pengeluaran lochia

Hasil: TFU 1 jari di bawah pusat, Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras dan tampak pengeluaran lochia rubra, tidak berbau

3. Menjelaskan penyebab nyeri luka jahitan episiotomi yang dirasakan ibu disebabkan oleh adanya pemisahan jaringan atau otot-otot perineum dari akibat tindakan episiotomi.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan beradaptasi dengan keadaan tersebut

4. Menganjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap

Hasil: ibu telah dapat miring kanan dan kiri serta mulai duduk secara perlahan-lahan.

5. Melakukan perawatan luka episiotomi dengan menggunakan kompres es (*ice pack*)

- 1) Mencuci tangan
- 2) Menganjurkan ibu berbaring
- 3) Membuka pakaian bawah ibu
- 4) Menggunakan handscoon
- 5) Melihat keadaan luka episiotomi
- 6) Membersihkan dengan betadin
- 7) Melakukan vulva hygiene

- 8) Mengompres bekas luka jahitan dengan kompres es (*ice pack*) selama 20 menit.
- 9) Memasang pembalut, celana dalam dan pakaian bawah ibu
- 10) Membereskan alat
- 11) Melepas handscoon
- 12) Mencuci tangan
- 13) evaluasi

Hasil: telah dilakukan perawatan luka episiotomi, skla nyeri berkurang dari 6 menjadi 2. Bertahan selama \pm 3 jam.

6. Membantu ibu mengganti pembalut/popok

Hasil: Popok ibu telah diganti

7. Memberikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menjelaskan kepada ibu manfaat dari ASI eksklusif yakni mengandung kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung

zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan member ASI kepada bayinya secara eksklusif

10. Mengajarkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

11. Mengajarkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum, dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi dan mengganti pembalut ialah 3 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

12. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang pertama sebelum menyentuh daerah vagina maupun perineum tangan harus dalam keadaan bersih, membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru dan

jangan sekali-kali menaburi daerah perineum dengan bubuk bedak atau bahan lainnya karena itu dapat menyebabkan risiko infeksi

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

13. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, dan suhu tubuh melebihi 37,5°C.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

14. Menjelaskan kepada ibu tehnik menyusui yang baik dan benar yaitu mencuci tangan yang bersih dengan sabun, perah sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting, kemudian memilih posisi duduk atau berbaring.

a) Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi menyanggah seluruh tubuh bayi, kepala dan tubuh bayi lurus menghadap ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu ibu.

b) Segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa, sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu.

c) Meletakkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, dan bibir bawah bayi membuka lebar.

Hasil: ibu mengerti dan sedang melakukannya

15. Menganjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan dengan batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

16. Menganjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik yang telah diberikan.

- a. Asam Mafenamat : 6 tablet dosis 3 kali sehari

Sebagai obat analgetik dan antiinflamasi.

- b. Cefadroxil : 6 tablet dosis 2 kali sehari

Sebagai antibiotik dengan spectrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif

- c. Fero Sulfat : 3 tablet dosis 1 kali sehari

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obatnya sampai habis.

LANGKAH VII: EVALUASI

Tanggal 16 juni 2017 pukul 13.30 wita

1. Masa nifas berlangsung normal ditandai dengan;
 - a. Masa nifas hari pertama dengan TFU 1 jrbpst
 - b. Keadaan umum ibu baik
 - c. Ibu dapat beristirahat dengan tenang
 - d. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - Nadi : 80 kali/menit teratur
 - Suhu : 36,6°C aksilar
 - Pernapasan : 24 kali/menit saat istirahat
 - e. TFU 1 jari bawah pusat
 - f. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
 - g. Pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau
 - h. Ibu menyusui bayinya
 - i. Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang bergizi serta menjaga personal hygiene.
2. Nyeri luka episiotomi berkurang setelah diberikan kompres es selama 20 menit, dan bertahan selama \pm 3 jam, ditandai dengan;
 - a. Ibu masih sedikit meringis ketika bergerak
 - b. Ibu masih mengeluh nyeri luka episiotomi
 - c. Nyeri tekan pada perineum

3. Potensial terjadi infeksi ditandai dengan;
 - a. Luka jahitan masih lembab
 - b. Ada pengeluaran lochia
 - c. Nyeri tekan pada perineum.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU
NY “S” POST PARTUM DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, BUJJULU
TANGGAL 13 AGUSTUS 2017**

Tanggal kunjungan : 13 Agustus 2017, Pukul 14.15 wita

Tanggal pengkajian : 13 Agustus 2017, Pukul 14.20 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Bujjulu

Nama Pengkaji : Mutmainna Alka

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh masih merasakan nyeri pada daerah luka jahitan
2. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran darah dari jalan lahir
3. Ibu telah dapat beranjak dari tempat tidur tanpa dibantu
4. Ibu belum dapat beraktivitas seaktif biasanya
5. Ibu telah mengganti pembalutnya dengan rutin dan pada saat kunjungan
6. Ibu telah menyusui bayinya dan pengeluaran ASI lancar
7. Ibu telah BAB 2 kali setelah melahirkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2017 dan pagi ini dengan konsistensi feses lunak, berwarna kuning, dan tidak bercampur darah.

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari ketiga
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis
4. Ekspresi ibu sedikit meringis bila terlalu banyak bergerak
5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80 kali/menit, teratur

Suhu : 36,6°C, aksilar

Pernapasan : 22 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan sewaktu hamil : 58 kg

7. Berat badan sekarang : 53 kg

8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus

c. Payudara

Inspeksi : tampak pembesaran, tidak ada peradangan, puting susu mulai menonjol

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila dilakukan penekanan pada aerola ada pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, TFU 3 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras

e. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak ada varices, terdapat pengeluaran lochia rubra, terdapat luka jahitan episiotomi secara mediolateral, luka jahitan tampak masih sedikit lembab

Palpasi : terdapat nyeri tekan, tidak *pitting* oedem

Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka

f. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varices

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari ketiga dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 13 agustus 2017 pukul 14.30 wita

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik
Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini
2. Mengobservasi kontraksi uterus sebagai upaya pencegahan perdarahan postpartum
Hasil: kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab masih keluarnya darah dari jalan lahir yaitu disebabkan oleh terjadinya involusi uteri atau proses pengecilan uterus kembali seperti keadaan sebelum hamil, dan pengeluaran darah yang keluar tidaklah banyak dan masih berwarna merah.
Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah tidak merasa khawatir.
4. Menganjurkan ibu tetap melakukan aktivitas secara bertahap dan menghindari pekerjaan yang terlalu berat, karena dengan mobilisasi dini dapat membantu proses penyembuhan luka serta pencegahan infeksi pada luka episiotomi
Hasil: ibu mengerti dan bersedia beraktivitas secara bertahap
5. Menganjurkan ibu saat membersihkan daerah genitalianya dengan membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel

di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengajarkan ibu mengganti pembalutnya sekali dalam ± 4 jam atau jika ibu merasa pembalut telah penuh bahkan jika ibu merasa sudah tidak nyaman

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Mengajarkan kepada ibu bila membasuh daerah genitalia cukup menggunakan air biasa yang bersih, jangan pernah menaburinya dengan bedak atau ramuan-ramuan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Memberikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup yaitu ± 8 jam di malam hari dan ± 2 jam di siang hari untuk masa pemulihan tenaga ibu setelah melahirkan

Hasil: ibu bersedia melakukannya

9. Mengajarkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat agar saat buang air besar ibu tidak kesulitan atau terjadi konstipasi.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Mengajukan kepada ibu untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama 6 minggu atau 40 hari karena batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, bahkan mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, bahkan suhu tubuh melebihi 37,5°C.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

12. Mengajukan kepada ibu untuk segera ke pelayanan kesehatan segera mungkin bila merasa ada tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi atau bila memiliki keluhan lainnya

Hasil: ibu bersedia melakukannya.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU
NY “S” POST PARTUM DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, BUJJULU
TANGGAL 16 AGUSTUS 2017**

Tanggal kunjungan : 16 Agustus 2017, Pukul 14.00 wita

Tanggal pengkajian : 16 Agustus 2017, Pukul 14.05 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Bujjulu

Nama Pengkaji : Mutmainna Alka

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri pada luka episiotomi
2. Ibu mengatakan masih ada darah yang keluar dari jalan lahir tetapi sudah tidak sangat merah
3. Ibu telah beraktivitas seperti biasanya
4. Ibu sudah memberikan ASI pada bayinya dan ASI ibu lancar
5. Ibu mengatakan sulit tidur di malam hari

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari ketujuh
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis

4. Ekpresi wajah ibu tampak ceria

5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 78 kali/menit, teratur

Suhu : 36,5°C, aksilar

Pernapasan : 24 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan yang lalu : 53 kg

7. Berat badan sekarang : 55 kg

8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat

Palpasi : tidak *pitting* oedem

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah mudah, skleras tidak ikterus

c. Payudara

Inspeksi : tampak pembesaran, tidak ada peradangan, puting susu menonjol

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila dilakukan penekanan pada aerola ada pengeluaran ASI lancar

d. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, TFU pertengahan simfisis-pusat

e. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak ada varices, terdapat pengeluaran lochia sanguilenta,
jahitan luka episiotomi tampak kering,

Palpasi : pada luka jahitan tidak ada nyeri tekan dan *pitting* oedem

Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka.

f. Ekstremitas

Inspeksi : tidak varices

Palpasi : tidak *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari ketujuh dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 16 Agustus 2017 pukul 14.15 wita

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik
Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini
2. Menjelaskan kepada ibu penyebab masih keluarnya darah dari jalan lahir yaitu disebabkan oleh terjadinya involusi uteri atau proses pengecilan uterus kembali seperti keadaan sebelum hamil dan pada hari ke 4-7 darah yang keluar sudah tidak merah tetapi kemerah muda atau kecoklatan.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah tidak merasa khawatir.

3. Memberikan pendidikan kesehatan istirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari dan bila ibu menyusui bayinya saat berbaring ibu dapat pula memejamkan mata untuk beristirahat, jangan makan makanan berat kurang dari tiga jam sebelum pergi tidur, hindari kopi, the, minum segelas susu hangat setengah jam sebelum tidur, dan berhenti bekerja setidaknya sejam sebelum waktu tidur dan baca buku atau mendengar music menenangkan atau bahkan ayat suci Al-Qur'an.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Mengajukan kepada ibu tetap memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Mengajukan kepada ibu tetap mempertahankan makan makanan yang bergizi seimbang.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum meski ibu merasa bahwa bekas jahitan sudah mulai kering, dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi dan mengganti pembalut atau pakaian dalam 3- 4 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman sebagai upaya pencegahan infeksi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap membersihkan daerah genitalianya dengan membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru atau pakaian dalam ibu.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, bahkan mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, bahkan suhu tubuh melebihi 37,5°C.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

10. Memberikan konseling kontrasespsi secara dini kepada ibu dengan KB yang tidak mengganggu ASI

- a. Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. MAL merupakan kontrasepsi bila menyusui secara penuh, belum haid setelah melahirkan dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Keuntungan efektivitas tinggi, segera efektif, tidak mengganggu senggama, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu biaya.
- b. Pil progestin (Mini Pil) bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, mengganggu motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Keuntungan; tidak mengganggu senggama, efektif bila digunakan secara benar, kesuburan segera kembali, dapat dihentikan setiap saat, tidak mempengaruhi ASI. Kerugian; harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama bila lupa 1 maka kegagalan menjadi lebih besar, mual, pusing timbul jerawat
- c. Suntik 3 bulan bekerja dengan mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menghambat transportasi gamet oleh tuba, membuat selaput lendir rahim tipis. Keuntungan; mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, tidak berpengaruh pada senggama, membantu mencegah Ca endometrium dan kehamilan ektopik. Kerugian; pasien sangat bergantung pada pelayanan kesehatan, kesuburan terlambat kembali karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari depo), kering pada vagina, libido menurun, sakit kepala, timbul jerawat.
- d. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) bekerja dengan cara mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, lendir serviks menjadi kental,

mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Keuntungan; daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian kesuburan dengan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu senggama, tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Kerugian; nyeri kepala, perasaan mual, kepala pusing, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan, perubahan pola haid.

- e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) menghambat kemampuan sperma masuk ke tuba fallopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan; efektivitas tinggi, dapat efektif setelah pemasangan, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal. Kerugian; perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, saat haid terasa lebih nyeri, AKDR dapat keluar dengan sendirinya, tidak mencegah kehamilan ektopik, akseptor harus memeriksa posisi benang AKDR.

Hasil: ibu mengerti jenis kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan ingin berdiskusi dahulu dengan suaminya.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU
NY “S” POST PARTUM DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, BUJJULU
TANGGAL 21 AGUSTUS 2017**

Tanggal kunjungan : 21 Agustus 2017, Pukul 15.30 wita

Tanggal pengkajian : 21 Agustus 2017, Pukul 15.35 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Bujjulu

Nama Pengkaji : Mutmainna Alka

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh nyeri pada vagina
2. Nyeri dirasakan dengan tingkat nyeri ringan yaitu tidak mengganggu aktivitas ibu dan ibu masih dapat tidur nyaman di siang maupun malam hari
3. Nyeri dirasakan sejak 3 hari lalu setelah melakukan hubungan dengan suami
4. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan berwarna kekuning-kuningan
5. Ibu mengatakan ASI nya lancar dan memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin
6. Ibu mengatakan telah dapat tidur dengan nyenyak di malam hari

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari kedua belas
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis
4. Ekspresi wajah ibu tampak lesu
5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80 kali/menit, teratur

Suhu : 36,7°C, aksilar

Pernapasan : 23 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan yang lalu : 55 kg
7. Berat badan sekarang : 56 kg

8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Mata : konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus

b. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid, tidak ada nyeri tekan, TFU sudah tidak teraba diatas simfisis.

c. Vulva dan perineum : tidak ada kelainan, tidak ada varices, terdapat jaringan baru pada vulva dan terdapat pengeluaran lochia serosa. Jahitan luka episiotomi telah kering dan pada luka jahitan terdapat nyeri tekan dengan tingkat nyeri ringan yaitu ibu hanya mengerutkan alis ketika

dilakukan penekanan pada daerah vulva. Tidak ada *pitting* oedem, tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, serta tidak ada bau busuk dari daerah luka.

d. Ekstremitas : tidak varices dan tidak *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari kedua belas dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 21 Agustus 2017 pukul 15.45 wita

1. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan atau tanda bahaya dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal

Hasil: ibu mengerti dan tidak cemas lagi

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa cairan yang keluar dari jalan lahir merupakan cairan normal yang berwarna kekuningan di masa nifas hari keempat belas

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Menjelaskan kepada ibu bahwa nyeri yang dirasakan karena cairan pelumas yang minim akan berakibat gesekan penis dan dinding vagina tidak terjadi dengan lembut, akibatnya akan terasa nyeri serta dapat sebagai pengantar terjadinya infeksi akibat dari masuknya kuman-kuman dan minimnya pelumas atau lendir vagina diakibatkan karena ibu masih merasa khawatir dengan bekas

jahitannya serta adanya jaringan parut yang muncul, karena dalam berhubungan keadaan psikis haruslah tenang dan merasa nyaman.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk menghindari stress dengan cara beristirahat yang cukup, tidak terlalu memikirkan banyak hal, karena jika ibu dalam keadaan stress maka proses semua perubahan atau pemulihan dalam diri ibu setelah melahirkan akan terganggu terutamanya dalam produksi ASI

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Menganjurkan kepada ibu tetap menjaga pola istirahat yang cukup

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga pola makan gizi seimbang

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan kepada ibu tetap menjaga personal hygienenya, terutama saat ini dengan nyeri yang dirasakan ibu

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menganjurkan kepada ibu untuk tidak bekerja berat hingga nyeri yang dirasakan ibu berkurang

Hasil: ibu bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk tidak memakai pakaian dalam yang sangat ketat atau celana jeans yang dapat membuat gesekan terhadap daerah genitalia ibu

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Mengajukan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan bahkan hingga 2 tahun

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

11. Mengajukan ibu segera ke pelayanan kesehatan bila nyeri yang dirasakan tidak berkurang bahkan jika semakin nyeri

Hasil: ibu mengerti dan bersedia segera ke pelayanan kesehatan

12. Mengajukan ibu memperhatikan imunisasi bayinya

Hasil: ibu bersedia melakukannya dan ingin memenuhi imunisasi bayinya



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU
NY “S” POST PARTUM DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, BUJJULU
TANGGAL 30 AGUSTUS 2017**

Tanggal kunjungan : 30 Agustus 2017, Pukul 15.05 wita

Tanggal pengkajian : 30 Agustus 2017, Pukul 15.10 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Bujjulu

Nama Pengkaji : Mutmainna Alka

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri pada vaginanya
2. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan dari jalan lahir tetapi tidak banyak dan seperti keputihan normal
3. Ibu mengatakan belum menggunakan KB, ibu ingin menggunakan KB pada saat telah haid pertama setelah melahirkan
4. Ibu mengatakan ASI semakin lancar dan bayinya menyusui dengan kuat

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari ke dua puluh satu
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis

4. Ekpresi wajah ibu sangat senang

5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80 kali/menit, teratur

Suhu : 36,5°C, aksilar

Pernapasan : 22 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan yang lalu : 56 kg

7. Berat badan sekarang : 55 kg

8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Mata : konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus

b. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid, tidak ada nyeri tekan, TFU sudah tidak teraba diatas simfisis.

c. Vulva dan perineum : tidak dilakukan pemeriksaan pada vulva dan perineum karena ibu menolak. Tujuan dari pemeriksaan telah dijelaskan tetapi ibu tetap menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

d. Ekstremitas : tidak varices dan tidak *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari kedua puluh satu dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 7 juli 2017 pukul 15.20 wita

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang disampaikan dan ibu sangat senang

2. Menganjurkan kepada ibu tetap memperhatikan personal hygiene bahkan jika masa nifas ibu telah usai

Hasil: ibu bersedia melakukannya

3. Menganjurkan kepada ibu tetap menjaga pola nutrisi dan istirahat

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan kepada ibu tetap memberikan ASI kepada baiknya secara eksklusif dan memperhatikan imunisasi bayinya

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan kepada ibu segera ke pelayanan kesehatan bila memiliki keluhan

Hasil: ibu bersedia melakukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pelaksanaan asuhan pada Ny “S” masa nifas dengan luka episiotomi yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 1 hari pada tanggal 02 Agustus 2017 dan dilakukannya kunjungan rumah sebanyak 3 kali mulai tanggal 10 Agustus sampai 30 Agustus 2017.

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah Varney (2003).

A. LANGKAH I: PENGUMPULAN DATA DASAR

Pengumpulan data dasar adalah menghimpun informasi tentang klien. Data yang dikumpulkan adalah data yang tepat yaitu data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau atau data yang memiliki berhubungan dengan situasi yang ditinjau. Tehnik pengumpulan data ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi napas), penciuman (bau nafas, bau luka) serta perabaan (suhu badan, nadi) (Asri dan Clervo, 2012:26-27).

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut peneliti dapatkan dengan

mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang / laboratorium (Manguji dkk, 2012: 5).

Pada kasus Ny. "S" Pengumpulan data awal dilakukan dimulai dari data subjektif dan objektif. Data subjektif antara lain identitas istri/ suami, keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan lalu, Riwayat KB, riwayat psikososial, spiritual dan ekonomi, serta pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat, personal hygiene, aktivitas dan data psikososial, ekonomi dan spritual. Adapun data subjektif yang didapatkan pada saat menanyakan identitas klien yaitu nama Ny "S" berumur 23 tahun sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA dan alamat di Bujjulu, Kecamatan Borong loe, Kabupaten Gowa. Keluhan ibu nyeri luka jahitan episiotomi.

Pada saat proses persalinan pada tanggal 10 agustus 2017, ibu mengatakan dilakukan pengguntingan pada jalan lahir karena indikasi partus kala II lama dan merasakan nyeri pada saat bergerak atau apabila ditekan. Usaha yang dilakukan ibu untuk mengatasi nyeri tersebut yaitu berbaring dan bergerak lebih hati-hati. Ibu hamil pertama dan tidak pernah keguguran hari pertama haid terakhir tanggal 28 oktober 2016, tanggal taksiran persalinan 17 Agustus 2017, selama hamil ibu memriksakan kehamilannya sebanyak \pm 4 kali dan imunisasi Tetanus Toxoid sebanyak 2 kali. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit serius dan riwayat

penyakit menurun dalam keluarga. Serta tidak pernah merasakan tanda bahaya dalam kehamilan.

Data objektif diperoleh oleh pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada Ny "S" dengan masa nifas hari pertama yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, ekspresi ibu tampak meringis apabila bergerak. Pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali/menit dan teratur, suhu diukur pada aksila 36,6°C, pernafasan 22 kali/menit. Pemeriksaan fisik pada wajah ibu tidak ditemukan oedema, tidak pucat dan ibu tampak meringis. Tampak pada mata konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus, payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada nyeri tekan dan terdapat pengeluaran kolostrum.

Tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan stiae livide, ibu merasakan nyeri tekan, TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras. Pada vulva dan perineum tidak ada varises, tampak pengeluaran lochia rubra, terdapat luka jahitan episiotomi secara medio lateral dan luka jahitan masih lembab dan tidak ada *pitting oedema*. Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka. Dan ekstremitas tidak ada kelainan.

Pengkajian data dasar pada kasus ibu nifas dengan luka episiotomi dilakukan pertama kali pada saat ibu masuk keruangan nifas. Pengkajian meliputi anamnesis langsung diperoleh dari ibu sendiri. Pengkajian ini berupa identitas ibu,

riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat keluarga berencana, riwayat psikososial, spiritual dan ekonomi serta pola pemenuhan dasar. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. (Nurul, 2012).

Berdasarkan studi kasus pada Ny “S” dengan luka episiotomi hari pertama masa nifas ditemukan data ibu diepisiotomi karena partus kala II lama dimana ibu telah dipimpin mendedan yang baik dan benar selama tiga jam di Puskesmas Borongloe tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala. Setelah kala II berakhir dilakukanlah manajemen aktif kala III, setelah plasenta lahir utuh dan lengkap, dilakukanlah penjahitan luka episiotomi secara mediolateral dengan anastesi. Tidak dilakukan pengikatan pembuluh darah karena tidak ada perdarahan aktif, penjahitan menggunakan benang *plain catgut* ukuran 2/0. Penjahitan pada mukosa vagina menggunakan teknik jelujur, sementara pada perineum menggunakan teknik satu-satu dengan jumlah jahitan sebanyak 4 dengan jarak setiap jahitan adalah 1 cm dan jarak antara jahitan terakhir dengan pangkal luka adalah 0,5 cm. Penjahitan dilakukan oleh bidan.

Pada tinjauan pustaka dikatakan bahwa luka episiotomi adalah pengguntingan berupa sayatan kecil pada perineum yang dilakukan pada saat proses persalinan berlangsung. Episiotomi dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pembukaan vagina sehingga bayi dapat keluar lebih mudah tujuan tindakan episiotomi ialah memperlebar jalan lahir, mempercepat persalinan kala II lama yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primi, yang ditandai dengan tanda

dan gejala klinis pembukaan serviks lengkap, ibu mendedan tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala (Asri dan Clervo, 2012:86).

Tindakan episiotomi tidaklah boleh dilakukan secara rutin karena dapat meningkatkan ruptur menjadi tingkat III atau IV, meningkatnya jumlah darah yang hilang, risiko infeksi serta nyeri dengan luka persalinan. Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan episiotomi membutuhkan pertimbangan klinis dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang memperbolehkan dalam melakukan prosedur episiotomi. Berdasarkan ruang lingkup 24 standar kebidanan, penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi terdapat pada standar 12 (Purwoastuti dan Walyani, 2014: 152).

Pada kasus Ny "S" dilakukan tindakan episiotomi secara mediolateral, dengan pertimbangan untuk menghindari resiko ruptur bertambah menjadi ruptur tingkat III. Seperti yang dikatakan teori bahwa insisi episiotomi secara mediolateral digunakan secara luas pada obstetri operatif dikarenakan aman. Melakukan insisi ke bawah dan ke luar, ke arah batas *lateral sfingter ani* dan paling sedikit separuh jarak ke dalam vagina. Namun, insisi ini dapat menimbulkan banyak perdarahan dan dapat tetap akan terasa nyeri meskipun setelah nifas. Selain menimbulkan rasa nyeri saat masa nifas, episiotomi secara mediolateral juga memberi manfaat bagi ibu, yaitu ketika ibu BAB ibu tidak takut akan jahitannya dapat terlepas sewaktu-waktu jika ibu mengejan, dan ibu tetap dapat menjaga kebersihan anusnya setelah BAB karena jahitan bekas episiotomi secara mediolateral tidak mendekati anus (Benson dan Pernoll, 2013:176).

Pada saat dilakukan tindakan episiotomi pada kasus Ny “S” dilakukannya anastesi local terlebih dahulu, serta pada saat akan dilakukan penjahitan luka episiotomi ibu kembali di berikan anastesi local. Seperti teori mengatakan bahwa sebelum dilakukannya tindakan episiotomi, pasien perlu diberikan anetesi lokal, yaitu dengan lidokain 1% tanpa epineprin, jika tidak tersedia gunakan lidokain 2% yang dilarutkan dengan air steril dengan perbandingan 1:1 yang digunakan untuk menginfiltrasi jaringan dan mengeblok saraf sensorik. Episiotomi adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, dengan anastesi lokal merupakan bagian dari asuhan sayang ibu. (Tando, 2013: 125).

Pada tahap pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat pengumpulan data pada Ny “S” maupun keluarga serta bidan dan dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dengan demikian penjelasan pada tinjauan teori penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

B. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan (Nurhayati dkk, 2013). Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah

tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah/diagnosa kebidanan adalah pengolahan/analisa data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta (Asri dan Clervo, 2012:27-28).

Hasil pengkajian pada kasus Ny “S” didapatkan data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosa nyeri luka jahitan dengan luka episiotomi. Pasien mengeluhkan merasakan nyeri pada jahitan bekas pengguntingan pada jalan lahir pada saat setelah melahirkan. Persalinan Ibu adalah persalinan anak pertamanya, dari hasil pemeriksaan vulva dan perineum didapatkan jahitan bekas luka episiotomi secara mediolateral. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa nyeri pada luka episiotomi disebabkan karena terputusnya jaringan atau otot-otot perineum akibat tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan respon nyeri ke hypothalamus dan presepsikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri (Pudiasuti, 2012:1). Oleh karena itu, sangat pertimbangan untuk melakukan tindakan episiotomi harus mengacu pada penilaian klinik yang tepat dan tehnik yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi, dengan demikian tidak lagi dianjurkan untuk melakukan tindakan episiotomi secara rutin.

Prinsip tindakan episiotomi ialah pencegahan kerusakan yang lebih hebat pada jaringan lunak yang diakibatkan daya regang yang melebihi kapasitas adaptasi atau keelastisitasan jaringan tersebut, serta tindakan ini bertujuan untuk mencegah trauma pada kepala janin, mencegah kerusakan pada *sfincter ani* (Pudiastuti, 2012:1).

Nyeri luka episiotomi yang dirasakan ibu post partum dengan luka episiotomi ada beberapa yang menjadi perhatian bidan yaitu dengan memberikan perawatan luka episiotomi dengan kompres es (*ice pack*). Pada kasus Ny “S” pada pengukuran skala nyeri setelah memberikan perawatan luka episiotomi dengan kompres es (*ice pack*) didapatkan hasil nyeri yang dirasakan ibu berkurang dari angka skala nyeri 6(sedang) menjadi 2(ringan).

Selain menimbulkan rasa nyeri saat masa nifas, episiotomi secara mediolateral juga memberi manfaat bagi ibu, yaitu ketika ibu BAB ibu tidak takut akan jahitannya dapat terlepas sewaktu-waktu jika ibu mengejan, dan ibu tetap dapat menjaga kebersihan anusya setelah BAB karena jahitan bekas episiotomi secara mediolateral tidak mendekati anus. Episiotomi mediolateral dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa perluasan laserasi akan lebih kecil kemungkinannya mengenai sfincter ani. (Benson dan Pernoll, 2013:176).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Zangana (2016) bahwa episiotomi dikaitkan dengan meningkatnya kehilangan darah pada saat persalinan, pembentukan hematoma, infeksi, dan jarang abses dan pembentukan fistula recto-vaginal. Episiotomi garis tengah dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi

kerusakan sfingter anus dan rektum bila dibandingkan dengan episiotomi mediolateral.

Proses penyembuhan luka terdapat tiga fase, yaitu fase inflamasi selama 24 jam pertama-48 jam, fase proliferasi (48 jam-5 hari, dan fase maturasi (5 hari-berbulan-bulan). Pada fase inflamasi terjadi pengumpulan darah untuk menyatukan daerah yang terpisah akibat episiotomi (Majid dan Prayogi, 2013) sehingga pada hari pertama sampai 2 hari biasa pada luka episiotomi akan terjadi pembengkakan kecil.

Sedangkan pada fase proliferasi terjadi pertumbuhan jaringan baru melalui proses granulasi, kontraksi luka dan epitelialisasi. Pada fase ini pula akan terbentuk jaringan parut epitel fibrosa yang lebih kuat pada saat fibroblas dan serat kolagen mulai menyusut, menimbulkan kontraksi pada area tersebut (Primadona dan Susilowati, 2015:2-3). Pada fase maturasi tubuh berusaha menormalkan kembali semua yang menjadi abnormal karena proses penyembuhan. Kolagen menjadi lebih tersusun dan yang berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai dengan regangan yang ada, fibroblast berkurang dan kapiler darah telah normal kembali (Majid dan Prayogi, 2013).

Pada hari pertama sampai hari kedua masa nifas sangatlah rentan akan terjadinya infeksi, karena pada waktu inilah luka masih dalam keadaan lembab, dan keadaan luka masih basah diakibatkan karena lochia yang keluar dari jalan lahir akan melewati luka tersebut. Infeksi nifas yaitu infeksi bakteri pada dan melalui traktus genitalia yang terjadi sesudah melahirkan, ditandai kenaikan suhu

sampai 38°C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama (Fauziyah, 2012:163) oleh sebab itulah keadaan luka episiotomi sangatlah penting untuk diperhatikan hingga jahitan kering. Sebab, ibu nifas dengan luka episiotomi sangatlah rentan akan terjadinya infeksi pada luka tersebut yang ditandai dengan adanya pus/nanah, bau busuk dan suhu sekitar luka lebih tinggi dari pada suhu tubuh ibu. Dengan demikian penerapan tinjauan teori pada studi kasus Ny “S” penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

C. LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Nurhayati dkk, 2013). Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan tersebut, bidan harus siap apabila diagnosa masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji dkk, 2012: 6).

Pada tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial, melakukan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien diharapkan dapat pula bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi (Asri dan Clervo, 2012:29-30).

Menurut penelitian Rahayuningsih (2013) akibat dari laserasi perineum yang terjadi pada ibu post partum adalah adanya nyeri perineum sebanyak 70,9%. Dampak nyeri perineum tersebut adalah stress, traumatik, takut terluka, tidak nafsu makan, sulit tidur dan depresi, Sehingga ibu post partum mengalami keterlambatan mobilisasi, gangguan rasa nyaman pada saat duduk, berdiri, berjalan dan bergerak, sehingga berdampak pada gangguan istirahat ibu post partum dan keterlambatan kontak awal antara ibu dan bayinya. (Utami, 2015: 31).

Kebersihan vagina selama masa nifas harus dilakukan karena vagina merupakan daerah yang dekat dengan tempat buang air kecil dan tempat buang air besar yang tiap hari dilakukan, adanya luka di daerah perineum yang bila terkena kotoran dapat terinfeksi, dan vagina merupakan organ terbuka sehingga memudahkan kuman yang ada di daerah tersebut lebih mudah untuk menginfeksi.

Infeksi bisa terjadi karena ibu kurang disiplin melakukan perawatan pada lukanya. Ibu takut menyentuh luka yang ada di perineum sehingga memilih tidak membersihkannya. Padahal, dalam keadaan luka, perineum rentan didatangi kuman dan bakteri sehingga mudah terinfeksi (Marmi, 2012:142-143).

Kondisi ibu pada kasus Ny "S" saat ini dengan nyeri luka episiotomi akibat rusaknya otot-otot perineum dari tindakan episiotomi, terdapat pengeluaran lochia pada jalan lahir, hal inilah yang dapat memicu terjadinya infeksi luka episiotomi. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa luka episiotomi merupakan rusaknya jaringan daerah perineum tersebut, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada masa nifas masih terdapat

pengeluaran darah lochia dan kotoran yang keluar dari vagina. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim (Marmi, 2012: 141).

Ibu yang melahirkan dengan mendapatkan luka episiotomi akan memiliki rasa takut untuk menyentuh luka jahitan, akibatnya ibu enggan untuk memberishkan vaginanya dengan baik dan benar, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan vagina bila ibu benar-benar takut untuk menyentuh luka jahitan yaitu dengan cara duduk berendam dalam cairan antiseptik selama 10 menit. Lakukan setelah BAK atau BAB. Terkadang yang terlupakan setelah vagina dibersihkan, pembalutnya tidak diganti. Bila seperti itu caranya maka akan percuma saja karena pembalut yang kotor dan tidak digantik makan akan menyebabkan vagina akan tetap lembab dan kotor (Marmi, 2012: 141).

Akibat perawatan perineum yang kurang baik mengakibatkan kondisi perineum yang terkena lochia menjadi lembab dan akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Biasanya penyembuhan luka pada robekan perineum ini akan sembuh bervariasi, ada yang sembuh normal dan ada yang mengalami kelambatan dalam penyembuhannya. (Ma'rifa dan yeni, 2015: 2). Penyembuhan luka yang mengalami kelambatan disebabkan karena beberapa masalah diantaranya perdarahan yang disertai dengan perubahan tanda-tanda vital, infeksi seperti kulit kemerahan, demam dan timbul rasa nyeri, pecahnya luka jahitan sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya trauma serta

menonjolnya organ bagian dalam ke arah luar akibat luka tidak segera menyatu dengan baik. (Trisnawati dan mei muhartati, 2015: 5).

Penyembuhan luka adalah proses penggantian dan perbaikan fungsi jaringan yang rusak. Penyembuhan luka pada robekan perineum akan bervariasi, dapat terjadi cepat atau lambat tergantung dari luas dan dalamnya luka, semakin dalam luka tentunya penyembuhannya semakin lama. Seperti semua luka baru, area episiotomi atau luka sayatan membutuhkan waktu untuk sembuh, yaitu 7 hingga 10 hari. Berdasarkan penelitian dari Kristiyanti dkk (2013), waktu penyembuhan luka pada episiotomi lebih cepat dibandingkan robekan spontan, dari hasil penelitian yang dilakukan waktu penyembuhan luka episiotomi yaitu 6 hari sedangkan robekan spontan yaitu 7 hari. Dimana penyembuhan luka dikatakan lambat apabila waktu penyembuhan lebih dari 6 hari.

Penerapan tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny "S" tampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan yaitu berdasarkan data studi kasus Ny "S" pada hari pertama merasakan nyeri, luka jahitan perineum tampak basah, dan pada saat dilakukan perawatan bekas luka jahitan episiotomi dengan terapi kompres es (*ice pack*) dapat mengurangi nyeri yang dirasakan oleh ibu, penyembuhan luka episiotomi berangsur kering pada hari ke 6 masa nifas, pada kunjungan hari ke-tujuh ibu luka sudah mengering dan tidak ada tanda-tanda infeksi.

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny "S" dapat diidentifikasi masalah potensial yaituantisipasi terjadinya infeksi. Dengan demikian penerapan

teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny “S” nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

D. LANGKAH IV: TINDAKAN EMERGENCY DAN KOLABORASI

Menurut Mangkuji dkk (2012), perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami efek samping atau keluhan yang mengancam maka dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani akseptor baru implan. Tidak ada data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Dilangkah ini bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Bahkan dapat pula memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan yang lain. Penolong mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Antisipasi pertama untuk mencegah terjadinya infeksi yang dilakukan pada ibu nifas dengan luka episiotomi yakni berkolaborasi dengan dokter, untuk meresepkan obat-obat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu nifas dengan luka episiotomi dan antisipasi/bila terjadi infeksi, seperti analgetik, antiinflamasi, antibiotik (Asri dan Clervo, 2012:30).

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai

dengan kondisi klien. Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum penulis melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan seperti obat analgetik, antibiotik, dan vitamin. Adapun kegunaan dari obat antibiotik berfungsi mencegah terjadinya infeksi, obat analgetik untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu, sedangkan vitamin C berfungsi untuk menggantikan jaringan atau sel-sel yang rusak.

Pada kasus Ny "S" antisipasi yang dilakukan yaitu pemberian analgetik, antibiotik dan multi vitamin dengan Fero Sulfat seperti: Asam Mafenamat 6 tablet dosis 3 kali sehari sebagai obat analgetik dan antiinflamasi. Cefadroxil 6 tablet dosis 2 kali sehari sebagai antibiotik dengan spectrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif. Fero Sulfat 3 tablet dosis 1 kali sehari, diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Menurut Yeti (2014), Untuk mencegah timbulnya infeksi atau komplikasi lainnya pada masa nifas utamanya dengan luka pada perineum dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain perawatan perineum secara intensif. Asuhan masa nifas ini sangat diperlukan terutama pada 24-48 jam pertama. Perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas, demam, payudara berubah merah, panas, nyeri, infeksi pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium adalah perubahan yang dapat terjadi pada masa nifas. Sedangkan

menurut Rukhiyah, A. (2011) asuhan kebidanan yang perlu dilakukan pada masa nifas yaitu seperti perawatan luka post partum untuk pencegahan infeksi dengan tehnik aseptik, untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu post partum. (Wulansari, dkk, 2016: 1).

Laserasi vagina sering terjadi, khususnya setelah persalinan dengan tindakan yang menimbulkan trauma, salah satunya adalah episiotomi. Luka laserasi ini bisa mengalami infeksi. Infeksi pada luka episiotomi merupakan infeksi masa nifas yang paling sering ditemukan pada genetalia eksterna. Tepi luka tampak merah dan membengkak. Jahitan sering putus pada jaringan yang membengkak, sehingga luka yang mengalami purulen (nanah). Luka perineum menjadi nyeri, merah dan bengkak akhirnya luka terbuka dan mengeluarkan nanah. Perasaan nyeri dan panas timbul pada luka yang terinfeksi dan jika terjadi pernanahan dapat disertai dengan suhu yang tinggi dan menggigil. Dengan cara ini, terjadi kerusakan total pada tempat episiotomi tersebut (Fauziyah, 2012: 168-169).

Penerapan tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada Ny "S" secara garis besar tampak ada persamaan yaitu perlunya dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat untuk mencegah infeksi, peredam nyeri, sehingga apa yang dijelaskan pada tinjauan pustaka dengan studi kasustampak tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

E. LANGKAH V: INTERVENSI

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan

kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya (Nurhayati dkk, 2013). Pada langkah ini direncanakan usaha yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam konsep manajemen kebidanan bahwa perawatan nifas harus disetujui oleh klien, oleh sebab itu harus didiskusikan kebenarannya bersama klien sesuai situasi dan kondisi serta tindakan harus dapat dianalisa secara teoritis.

Pada langkah ini perencanaan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam suatu rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini di penolong dengan yang dotolong, karena meski penolong yang hanya menyetujuinya maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari yang ditolong (Asri dan Clervo, 2012:30-31).

Adapun sasaran dalam rencana asuhan pada kasus Ny "S" mengacu pada diagnosa pada kasus Ny "S" yaitu infeksi luka episiotomi serta untuk mencegah terjadinya masalah potensial yang bisa saja terjadi. Bila diagnosa nyeri luka episiotomi ditegakkan, rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu penyebab dari nyeri yang dirasakan oleh ibu. nyeri pada luka episiotomi disebabkan karena terputusnya jaringan atau otot-otot perineum akibat tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan

respon nyeri ke hypothalamus dan presepsikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1).

Rencana asuhan yang dilakukan pada Ny "S" pada tanggal 10 Agustus 2017 yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu agar ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini. Observasi Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi uterus, pengeluaran lochia. Pemeriksaan TFU dilakukan untuk mengetahui bahwa proses involusi uteri berjalan normal atau tidak, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/hari yang teraba bundar dan keras (Saleha, 2013: 130). Menilai kontraksi uterus merupakan salah satu upaya pencegahan perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013: 131). Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa masa nifas berlangsung normal dengan ditandai pengeluaran lochia yang sesuai dengan waktu dan warna serta baunya (Maritalia, 2012: 21).

Jelaskan penyebab nyeri luka episiotomi yang dirasakan ibu. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan jaringan otot-otot perineum pada saat dilakukan episiotomi yang mengakibatkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1). Anjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap, mobilisasi dini dapat memulihkan kondisi tubuh dengan cepat, system sirkulasi di dalam tubuh pun bisa berfungsi normal kembali. Bahkan dapat mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah dapat menyebabkan terjadinya thrombosis vena dalam dan dapat menyebabkan infeksi (Marmi, 2012:137). Lakukan perawatan luka episiotomi dengan kompres es

dengan melakukan perawatan luka episiotomi dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan (Marmi, 2012: 141).

Penanganan nyeri dapat dilakukan secara farmakologis dan nonfarmakologis. Penanganan nyeri secara farmakologis berisiko bagi bayi karena masuk ke dalam peredaran darah yang terkumpul pada air susu ibu sedangkan secara nonfarmakologis lebih aman diterapkan karena mempunyai risiko yang lebih kecil, tidak menimbulkan efek samping serta menggunakan proses fisiologis. Salah satu cara penanganan nyeri nonfarmakologis dengan pemberian kompres dingin dalam bentuk kantong es (*ice pack*) yakni sebuah kompres es yang dikemas dengan menggunakan sarung tangan karet yang diisi batu es dan dibungkus dengan sesuatu yang bersih seperti kain lap sekali pakai atau handuk sekali pakai. Nyeri dapat mereda karena *ice pack* mengurangi prostaglandin yang memperkuat reseptor nyeri, menghambat proses inflamasi merangsang pelepasan endorfin sehingga menurunkan transmisi nyeri melalui diameter serabut C yang mengecil serta mengaktivasi transmisi serabut saraf sensorik A-beta yang lebih cepat dan besar. (Wenniarti, dkk.2016:2).

Berikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup untuk memulihkan kembali tenaga ibu yang terkuras selama proses persalinan (Marmi, 2012:137). Jelaskan kepada ibu tentang akibat kurang istirahat, kurangnya istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri (Marmi, 2012:145). Jelaskan kepada ibu tentang manfaat dari ASI

eksklusif. Komposisi sesuai kebutuhan, kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula (Saleha, 2013:31-32). Anjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi. Makan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:31-131).

Anjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum. Menjaga kebersihan daerah perineum ibu dan mencegahnya dari infeksi serta membantu mempercepat proses penyembuhan luka jahitan episiotomi (Marmi, 2012:139). Ajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka episiotomi. Dengan mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang benar, maka ibu dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka episiotomi (Marmi, 2012: 142). Jelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada jahitan luka episiotomi, diharapkan ibu dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi (Marmi, 2012:142). Jelaskan kepada ibu tentang teknik menyusui yang baik dan benar, bayi akan tampak tenang karena mudah menghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup, dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri (Saleha, 2013:38).

Anjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan. Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik (Marmi, 2012:147). Anjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain penyebab infeksi, serta dengan pemberian zat besi pada ibu nifas karena di masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013:31-132).

Selain menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang dirasakannya, dilakukan pula observasi kontraksi uterus karena dengan mengobservasi kontraksi uterus yang baik merupakan salah satu upaya pencegahan perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013: 131).

Pada saat ini kondisi ibu lemas setelah melahirkan, sehingga menyebabkan ibu untuk lebih memilih untuk beristirahat. Luka yang didapatkan ibu akibat dari tindakan episiotomi pada saat proses persalinan mengharuskan ibu merasakan nyeri, yang mengakibatkan ibu takut untuk melakukan gerakan dikarenakan nyeri akan sangat terasa bila ibu bergerak. Sehingga diberikan asuhan berupa mengajarkan kepada ibu melakukan mobilisasi dini secara bertahap.

Persalinan merupakan proses yang melelahkan, itu mengapa ibu disarankan tidak langsung turun ranjang setelah melahirkan karena dapat menyebabkan jatuh pingsan akibat sirkulasi darah yang belum berjalan baik. Ibu harus cukup beristirahat, dimana ibu harus tidur terlentang selama 8 jam post partum untuk mencegah perdarahan post partum. Setelah itu, mobilisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersumbatnya pembuluh darah ibu. Ibu diminta untuk melakukan latihan menarik nafas yang dalam serta latihan tungkai yang sederhana, balik badan kekanan dan kekiri secara perlahan, duduk serta mengayunkan tungkai dari tepi ranjang. Setelah itu ibu bias pergi ke kamar mandi. Dengan begitu sirkulasi darah di dalam tubuh akan berjalan dengan baik.

Mobilisasi hendaknya dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan gerakan miring ke kanan dan ke kiri. Pada hari kedua ibu telah dapat duduk, lalu hari ketiganya ibu telah dapat menggerakkan kaki yakni dengan jalan-jalan. Kondisi tubuh akan cepat pulih jika ibu melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat. System sirkulasi di dalam tubuh pun bias berfungsi normal kembali akibat mobilisasi. Bahkan penelitian menyebutkan *early ambulation* (gerakan sesegera mungkin) bisa mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah bias menyebabkan terjadinya trombusit vena dalam atau *Deep Vein Thrombosis* (DVT) dan bisa menyebabkan infeksi (Marmi, 2012: 137-138).

Perawatan luka episiotomi dan mengajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka episiotomi. Melakukan perawatan luka episiotomi dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Luka episiotomi

merupakan rusaknya jaringan atau otot-otot perineum, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada dengan luka persalinan masih terdapat pengeluaran darah atau yang disebut *lochia* dan kotoran yang keluar dari vagina.

Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim. Siram vagina dan perineum hingga bersih dengan air biasa setiap kali habis BAB dan BAK. Air yang digunakan tak perlu matang asalkan bersih. Basuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum seperti air seni maupun *feses* yang mengandung kuman dan bisa menimbulkan infeksi pada luka jahitan.

Vagina boleh dicuci menggunakan sabun maupun cairan antiseptic karena dapat berfungsi sebagai penghilang kuman. Untuk menyentuh daerah vagina maupun perineum tangan harus dalam keadaan bersih. Setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru. Frekuensi mengganti pembalut ialah 3 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman. Ibu dianjurkan pula untuk menjaga kelembapan pakaian dalam dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi. Jangan sekali-kali menaburi daerah perineum dengan bubuk bedak atau bahan lainnya karena itu dapat menyebabkan risiko infeksi (Marmi, 2012: 141-142).

Dikondisi Ny “S” saat setelah melalui proses persalinan dimana ibu mendapatkan tindakan episiotomi mengharuskan ibu merasakan nyeri akibat tindakan episiotomi tersebut yang dapat mengganggu istirahat/tidur ibu. Sehingga, perlu dijelaskan kepada ibu bahwa akibat kurang istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri, memperlambat proses involusi uterus dan meningkatkan perdarahan (Marmi, 2012:145).

Selain anjuran kepada ibu untuk beristirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi jugalah penting. Pada masa nifas masalah diet perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Diet yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein dan banyak mengandung cairan (Saleha, 2013:71). Makan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:131).

Pada kasus Ny “S” dengan luka episiotomi dapat mengarah atau terjadinya masalah potensial yaitu infeksi luka episitomi. Sehingga, anjuran kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum. Setelah melahirkan ibu masih harus menjalani proses yang tak kalah merepotkan dari masa kehamilan, yakni proses “pembersihan diri” alias masa nifas. Biasanya 40 hari. Tahapan-tahapan

selama masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya darah tersebut mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati (nekrosis), serta sel-sel dinding rahim (endometrium), yang disebut lochia. Pada prinsipnya, urgensi kebersihan vagina maupun perineum dilandasi beberapa alasan yaitu banyak darah dan kotoran yang keluar dari vagina, vagina berada dekat saluran buang air kecil dan buang air besar yang tiap hari kita lakukan, adanya luka di daerah perineum yang bila terkena kotoran dapat terinfeksi, vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki oleh kuman sehingga dengan menjaga kebersihan daerah perineum ibu dan mencegahnya dari infeksi serta membantu mempercepat proses penyembuhan luka jahitan episiotomi (Marmi, 2012:139-140).

Infeksi pada luka episiotomi sangat tidak diharapkan oleh pihak petugas kesehatan terutamanya bagi ibu sendiri. Diharapkan dengan menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi diharapkan ibu dapat mengenali tanda dan gejala infeksi tersebut, sehingga ibu dapat mengambil tindakan segera yaitu ke pelayanan kesehatan bila mengalami salah satu tanda infeksi.

Adapun tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi ialah pada luka jahitan terdapat pus/nanah, adanya bau busuk, suhu perineum lebih hangat dari suhu sekitarnya. Bila hal tersebut sampai terjadi maka penderita akan mengalami suhu tubuh melebihi $37,5^{\circ}\text{C}$, menggigil pusing, mual, keputihan, keluar cairan nanah dari vagina, berbau sangat menyengat yang disertai rasa nyeri, dan terasa nyeri di perut dan perdarahan kembali banyak padahal sebelumnya sudah sedikit. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada jahitan luka episiotomi, diharapkan ibu

dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi (Marmi, 2012:142).

Ibu dianjurkan pula untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan. Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual kembali setelah 6 minggu persalinan. Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik. Meskipun hubungan telah dilakukan setelah 6 minggu adakalanya ibu tertentu mengeluh hubungan masih terasa sakit atau nyeri meskipun telah beberapa bulan proses persalinan. Gangguan seperti ini disebut *dyspareunia* atau rasa nyeri waktu senggama.

Pada kasus semacam ini ada kemungkinan yang bisa menjadi penyebab yaitu jaringan baru yang terbentuk karena proses penyembuhan luka guntingan jalan lahir masih sensitive dan faktor psikologis yaitu kecemasan yang berlebihan turut berperan. Hubungan seksual yang memuaskan memerlukan suasana hati yang tenang. Kecemasan akan menghambat proses perangsangan sehingga produksi cairan pelumas pada dinding vagina akan terhambat (Marmi, 2012:147).

Pada kasus Ny “S” bidan dan dokter melakukan kolaborasi dalam pemberian obat analgetik, antibiotik dan multi vitamin sebagai upaya untuk mencegah terjadinya infeksi. Agar kolaborasi bidan dan dokter terlaksana efektif, maka ibu dianjurkan untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain

penyebab infeksi (Asri dan Clervo, 2012:30). Serta dengan pemberian zat besi pada ibu nifas karena di masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013:31-132).

Namun, apabila masalah potensial yaitu infeksi luka episiotomi terjadi maka harus direncanakan asuhan atau tindakan apa yang akan dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan pertama kali yaitu kolaborasi dengan dokter Sp.OG. Luka perineum yang terinfeksi, seperti halnya luka bedah yang terinfeksi, harus diatasi dengan pemasangan drainase. Jahitan harus dilepas dan luka yang terinfeksi itu dilepas. Kegagalan dalam tindakan ini bukan saja menyebabkan perluasan infeksi ke dalam jaringan ikat paraservikal dan paravaginal, tetapi juga menyebabkan hasil akhir anatomi yang jelek.

Salah satu terapi kombinasi antibiotik berspektrum luas harus diberikan pada keadaan ini. Rasa nyeri diringankan dengan penggunaan preparat analgesic yang efektif dan bila terjadi retensi urin, pemasangan kateter harus dilakukan. Perbaikan dini terhadap luka episiotomi yang terbuka, dengan menekankan bahwa sebelum tindakan tersebut dikerjakan, infeksi harus diatasi terlebih dahulu (Fauziah, 2012: 170).

Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang teori dikatakan memiliki kesamaan dengan kasus yang didapatkan.

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan meningkatkan mutu asuhan (Asri dan Clervo, 2012:31).

Pada studi kasus Ny "S" dengan luka episiotomi hari pertama masa nifas semua tindakan telah direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik oleh ibu serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang nifas RSUD Syech Yusuf Gowa.

Penjelasan telah disampaikan bahwa kondisi ibu saat ini baik, hasil didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus ibu baik teraba bundar dan keras, serta menurunkan skala nyeri dengan kompres es (*ice pack*) pada tanggal 02 Agustus 2017.

Nyeri yang dirasakan ibu akibat dari tindakan episiotomi yang dilakukan pada saat proses persalinan karena adanya kerusakan otot-otot perineum. Ibu tak

perlu khawatir karena dengan memberikan perawatan kompres es pada luka perineum serta ibu menjaga dan merawat luka episiotomi sesuai dengan intruksi yang diberikan tersebut luka ibu akan segera sembuh dan dengan mobilisasi dini secara perlahan ibu akan mampu beradaptasi dengan nyeri yang dirasakannya dan akan membantu proses penyembuhan luka dengan cepat.

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan luka episiotomi yaitu melakukan perawatan luka episiotomi dengan kompres es (*ice pack*) sebagai salah satu upaya menurunkan skala nyeri dan mempercepat proses penyembuhan. Pertama yang dilakukan adalah menjelaskan kepada ibu tujuan dari prosedur kerja, kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah, mengajurkan kepada ibu untuk berbaring lurus dan membuka pakaian bagian bawah ibu tanpa lupa untuk menutup sampiran. Setelah mencuci tangan 7 langkah dengan bersih, keringkan tangan dengan handuk yang bersih, memakai handscoen steril, menganjurkan ibu berbaring, membuka pakaian bawah ibu, melihat keadaan luka episiotomi, membersihkan dengan betadin dan kassa steril, mengompres bekas luka jahitan episiotomi dengan kompres es (*ice pack*) selama 20 menit, memasang pembalut, celana dalam dan pakaian bawah ibu, membereskan alat, melepas handscoon, mencuci tangan.

Setelah perawatan luka episiotomi dilakukan, dilanjutkan dengan menjelaskan kepada ibu tentang akibat kurang istirahat. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu bersedia mengatur pola istirahat yang cukup, seperti ibu memejamkan mata disaat ibu menyusui bayinya.

Pada saat di rumah sakit ibu makan dengan pola yang teratur dengan lauk pauk serta buah dan terkadang minum susu. Dan ibu ingin tetap menerapkan hal yang sama ketika ibu telah pulang kerumah, ibu tetap ingin makan diwaktu yang tepat dan berusaha ingin memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

Dari penjelasan yang diberikan kepada ibu mengenai tanda-tanda infeksi, ibu ingin berusaha dan disiplin dalam menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genitalianya. Ibu telah paham tentang cara merawat luka episiotomi sewaktu ibu telah pulang kerumahnya, mulai dari cara membasuh vagina yang baik dan benar, menjaga personal hygienenya yaitu mengganti pembalut kurang lebih 4 kali setiap 4 jam atau ketika pembalutnya penuh atau bahkan ketika ibu tidak nyaman lagi.

Nyeri digolongkan sebagai gangguan sensorik positif. Pada hakikatnya nyeri tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat diukur, namun tidak dapat dipungkiri bahwa nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan bahkan menyakitkan. Nyeri adalah suatu sensasi yang unik. Keunikannya karena derajat berat dan ringan nyeri yang dirasakan tidak ditentukan hanya oleh intensitas stimulus tetapi juga oleh perasaan dan emosi pada saat itu. Pada dasarnya nyeri adalah reaksi fisiologis karena reaksi protektif untuk menghindari stimulus yang membahayakan tubuh. Tetapi bila nyeri tetap berlangsung walaupun stimulus penyebab sudah tidak ada, berarti telah terjadi perubahan patofisiologis yang justru merugikan tubuh. Sebagai contoh, nyeri karena luka episiotomi, masih tetap dirasakan pada masa pasca melahirkan. Nyeri semacam ini tidak saja menimbulkan perasaan tidak nyaman, tetapi juga reaksi stres, yaitu rangkaian reaksi fisik maupun biologis yang

dapat menghambat proses penyembuhan. Nyeri patologis atau nyeri klinik inilah yang membutuhkan terapi.

Setelah menjelaskan kepada ibu manfaat dari obat-obat yang diberikan kepadanya ibu sangat bersedia untuk menghabiskan obatnya. Ibu merasa ketakutan akan terjadinya infeksi pada luka episiotominya sehingga ibu benar-benar ingin menjaga kebersihan daerah genitalianya. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan telah mengarah pada kebutuhan pasien.


G. LANGKAH VII: EVALUASI

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya (Asri dan Clervo, 2012:31).

Pada kasus Ny "S" dengan luka episiotomi evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: Tingkat nyeri yang dirasakan berkurang dari pengukuran skala nyeri sebelum dilakukan perawatan angka skala nyeri yaitu 6 (sedang) dan setelah dilakukan perawatan kompres es (*ice pack*) angka skala nyeri yang dirasakan ibu yaitu 2 (ringan), keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU turun 1 cm perhari, pengeluaran lochia sesuai dengan masa involusi uteri, luka jahitan episiotomi telah

kering dan tidak ada nyeri tekan serta tanda-tanda infeksi seperti pada luka jahitan dengan luka episiotomi tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah bekas luka.

Derajat nyeri dapat diukur dengan berbagai cara, misalnya tingkah laku pasien skala verbal dasar / Verbal Rating Scales (VRS), dan yang umum adalah skala analog visual / Visual Analogue Scales (VAS). Dalam penilaian skala nyeri diatas 0,1,2,3 termasuk dalam kategori ringan. 4,5,6 nyeri sedang. 7,8,9,10 termasuk kategori nyeri berat. (fauziah, 2013: 3-5)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan asuhan kebidanan ibu post partum dengan episiotomi pada Ny “S” dari pengkajian hingga evaluasi, dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa.

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data ibu nifas pada Ny “S” dengan episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Hasil dari analisa data didapatkan Ny “S”, UMUR 23 TAHUN, PIA0 dengan keluhan nyeri luka episiotomi setelah melahirkan pada tanggal 02 Agustus 2017 pukul 19. 00 wita.
2. Telah dirumuskan diagnosa/masalah aktual ibu post partum pada Ny “S” dengan episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Hasil dari interpretasi data sehingga Ny “S”, umur 23 tahun mengalami masalah aktual nyeri luka episiotomi.
3. Telah dirumuskan diagnosa/masalah potensial ibu nifas pada Ny “S” dengan episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Hasil dari analisa dan interpretasi data aktual Ny “S” berpotensi mengalami infeksi luka episiotomi.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu post partum pada Ny “S” dengan episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk meresepkan obat-obat

yang sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu post partum dengan episiotomi danantisipasi/bila terjadi infeksi, seperti analgetik, antiinflamasi, antibiotik.

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu post partum pada Ny “S” dengan episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu perencanaan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial seperti perawatan luka episiotomi, *health education* tentang personal hygiene.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah disusun pada ibu post partum pada Ny “S” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu semua perencanaan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan.
7. Telah mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu post partum pada Ny “S” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu seluruh asuhan telah diberikan dan tidak ada hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada ibu post partum pada Ny “S” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Dalam bentuk SOAP.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

- a. Diharapkan kepada ibu-ibu post partum dapat dijadikan sebagai pengetahuan bahwa ibu post partum dengan nyeri luka jahitan episiotomi dapat dikurangi dengan menggunakan kompres es yang tepat dan benar sehingga ibu post partum bisa lebih nyaman dan lebih relaksasi, meningkatkan kondisi fisik dan psikis, serta personal hygiene untuk menghindari komplikasi yang lebih berat dalam masa nifas utamanya pada ibu nifas dengan luka episiotomi
- b. Perlunya dukungan dan ketelibatn suami dalam masa nifas terkhususnya pada kasus ibu nifas dengan luka episiotomi yang merupakan interaksi terus menerus yang bersifat penuh perhatian, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dan saling membutuhkan.


2. Untuk Bidan

Untuk tenaga kesehatan yang bekerja didalam lingkungan kebidanan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan pengetahuan yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat seperti perawatan luka episiotomi dengan kompres es (*ice pack*) serta tetap dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat. Memberikan asuhan sesuai dengan wewenang dan kode etik bidan serta dalam melakukan

pendokumentasian petugas kesehatan harus lebih teliti dan cermat yang dilakukan sebagai pembuktian pertanggungjawaban.

3. Untuk Institusi Pendidikan

Dengan mengetahui permasalahan yang dapat timbul pada ibu nifas dengan luka episiotomi, diharapkan institusi pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta perkembangan sesuai prosedur dalam memberikan asuhan dan dalam pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan dalam memecahkan suatu masalah kebidanan.



DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an dan Terjemahannya. *Kementrian Agama RI*. Bandung: Jawa barat, 2010.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2012
Tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Ambarwati, Retna dan Wulandari. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Yogyakarta: Mitra Cendeka, 2012.
- Astuti, Eny. “*Studi Komparasi Hasil Penyembuhan Luka Episiotomi Yang Dianastesi dan Yang Tidak Dianastesi Di Ruang Bersalin Rs. William Booth Surabaya*”. Surabaya: Akper William booth, 2014.
- Asri, Dwi dan Cristine Clervo. *Asuhan Persalinan Normal*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Benson, Ralph C dan Martin L.Pernoll. *Buku Saku Obstetri & Ginekologi*. Jakarta: EGC. 2013.
- Baston, Helen dan Jennifer Hall. *Midwifery Essentials: Persalinan*. Jakarta: Buku Kedokteran. EGC, vol. III, 2013.
- Dewi, Vivian Nanny Lia dan Tri Sunarsih. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2011.
- Fauziah, Yulia. *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Kristiyanti, Rini. Dkk. *Waktu Penyembuhan Luka Perineum Dengan Episiotomi dan Robekan Episiotomi dan Robekan Spontan*. Pekalongan: Stikes Muhammadiyah Pakajangan, 2014.
- Kuamindari, Indah dan Kholifah. “*Faktor Dominan Penyebab Kehamilan Risiko Tinggi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto*”, Mojokerto: Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2016.
- Majid, Abdul dan Agus Sarwo Prayogi. *Perawatan Pasien Luka Bakar*. Yogyakarta: Gosen Publishing. 2013.
- Mangkuji, Betty. dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC, 2012.
- Marmi. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas “Perurperium Care”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

- Maritalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhammed, Hoda Abed El-Azim. *Pengaruh Intruksi Diri Perineal Care Pada Episiotomi Nyeri dan Penyembuhan Luka Pospartum Perempuan*. Amerika: Jurnal Science Amerika, 2012.
- Nurasiah, Ai dan Ani Rukmanawati. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Nugroho, Taufan dkk. *Buku Ajar: Asuhan Kebidanan 3 Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Nyengidiki, Tami K, dkk. *Episiotomi Morbiditas Antara Ibu Melahirkan Di Universitas RS Pelabuhan Harcourt Teaching Port Harcourt*. Nigeria: Negeria Kesehatan Journal, vol. 8, 2018.
- Oxorn, Harry dan William r. Forte. *Ilmu Kebidanan: Patologi & Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.
- Primadona, Prakirtia dan Dewi Susilowati. *Penyembuhan Luka Perineum Fase Proliferasi pada Ibu Nifas*. Journal Profesi. Vol. 13 no 1 (September 2015). <https://ejournal.stikespku.ac.id/index.php/mpp/article/view/97/87> (Diakses tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 22:00 wita).
- Purwoastuti, Th.Endang dan Elisabeth Siwi Walyani. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2014.
- Pudiasuti, Ratna Dewi. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Patologi*. Yogyakarta: Muha Medika, 2012.
- Rukiah, Ai Yeyeh dkk. *Asuhan Kebidanan III (Nifas)*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2011.
- Rukiah, Ai Yeyeh dan Lia Yulianti. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2012.
- Saleha, Sitti. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat Lentera Hati, 2009.

Sumarah, dkk. *Perawatan Ibu Bersalin (asuhan kebidanan pada ibu bersalin)*. Yogyakarta: Penerbit fitramaya, 2012.

Sujiyatini, dkk. *Askeb III: Asuhan Ibu Nifas*. Yogyakarta: Cyrillus Publisher, 2012.

Tando, Naomy Marie. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: In Media, 2013.

Wenniarti, dkk. *“Pengaruh Terapi Ice Pack Terhadap Perubahan Skala Nyeri Pada Ibu Post Episiotomi*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II: Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B/13 /FKIK/PP.00.9/ 06 /2017

Gowa, 16 Juni 2017

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth.
Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mutmainna Aika
NIM : 70400114076
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Pasca Episiotomi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan Data Awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
Nip. 19640706 199103 1 003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.A.M. Yasin Limpo No. 36 Samat -Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-344/FKIK/PP.00.9/06/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 16 Juni 2017

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar


Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Mutmainna Alka
NIM : 70400114076
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Pasca
Episiotomi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
Tempat Penelitian : RSUD Sekh Yusuf Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.
2. dr. Raully Rahmadhani, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
NIP. 19640706 199103 2 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan),
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsh



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10091/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.1394A/FKIK/PP.00.9/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUTMAINNA ALKA**
Nomor Pokok : 70400114078
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :
" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PASCA EPISIOTOMI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Juli s/d 12 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Np : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon, 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 2 Agustus 2017

K e p a d a

Nomor : 070/ 443/BKB.P/2017

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Kab. Gowa

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 10091/S.01.P/P2T/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Mutmainna Alka**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 18 September 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN Andi Tonro Permai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data di wilayah/tempat saudara yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PASCA EPISIOTOMI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA**"

Selama : 12 Juli s/d 12 Agustus 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian-kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

Drs. BAHARUDDIN, T

Pangkat : Pembina Tk.1

N I P : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAlauddin Makassar ;
4. Yang Bersangkutan ;
5. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :253/Diklat.RSUD-SY/ XI /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Mutmainna Alka
N i m : 70400114076
Institusi : Akbid UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Perawatan Nifas (PNC) Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Dengan Episiotomi Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017* " pada tanggal 12 Juli 2017 S/D 12 Agustus 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R A

Sungguminasa, 13 Nopember 2017

An. Ketua Diklat
Koordinator Bagian Penelitian


Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS
Nip. 19630710 198703 2 019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Mutmainna Alka
Nim : 70400114076
T.T.L : Bulukumba 18 September 1996
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : BTN. Andi Tonro Permai, Gowa
Nama Orang Tua
a. Ayah : Alauddin Azis
b. Ibu : Kamriah

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 232 Bulukumba : 2003-2008
SMP Negeri 4 Bulukumba : 2008-2011
SMA Negeri 8 Model Bulukumba : 2011-2014
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017