


**GAMBARAN KEJADIAN PERSALINAN PRESENTASI BOKONG
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2009**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Program Studi Kebidanan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**


Oleh

**MASLINA
70400007027**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing institusi untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Juli 2010.



PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesabaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa KTI ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka KTI dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2010



Maslina
Nim. 70400007027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Maka tak seorang pun yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT. Maka tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada Ilah (yang hak) kecuali Allah SWT. Satu-satunya tiada sekutu bagi-Nya dan Kita bersaksi bahwa Muhammad SAW. Adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amma Ba'du.

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas rahmat-Nya dengan kenikmatan yang tak terhingga dibalik segala ujian yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program DIII Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Secara khusus, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Selle dan Ibunda Daraulang yang senantiasa mengiringi langkahku dengan do'a disetiap shalat dan hembusan nafasnya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapanku serta kepada adik-adikku tersayang Lya, Zul, Cali, Kia yang setia memberikan semangat dan dukungan serta

kepada seluruh keluargaku yang memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini.


2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak dr. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T, SKM. M.Keb selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
5. Ibu dr. Rini Fitriani S.Ked selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu dr. Nadyah S.Ked selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Ibu Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis sapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen Program Studi Kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program studi Kebidanan.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. dr. H. leo Prawirodihardjo, Sp.OG (K), M.Kes, M.M, PhD selaku Direktur RSIA Siti Fatimah Makassar beserta seluruh pegawai dan staf Rumah Sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
11. Terkhusus buat K' Bahar yang selama ini atas segenap kasih dan pengorbanan yang dengan setia, sabar menemani dan mendukung setiap kegiatan penulis hingga detik ini.
12. Sahabat seperjuanganku Husni, Wati, Dalia, Enhi, Chia, Fitto, Anha, Q2, Ilha, Idha, Naya n semua teman-teman mahasiswa angkatan 2007 prodi Kebidanan UIN Alauddin Makasar yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.
13. Spesial thanks untuk K' Imran, K' Danial dan K' Gaffar, atas do'a, perhatian serta bantuannya hingga detik ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada didalamnya, olehnya itu penulis berharap Karya Tulis ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak. AMIN....

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, September 2010



PENULIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penyusun : Maslina
Nim : 70400007027
Judul : **Gambaran Kejadian Persalinan Presentasi Bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari – Desember 2009”**

Angka Kematian Bayi (AKB) pada persalinan presentasi bokong lebih tinggi bila dibandingkan dengan presentasi kepala. Kelahiran bokong cukup bulan per vaginam menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas perinatal antara 1 dan 2%. Resiko kematian neonatal berlebihan yang terhitung adalah sekitar 4 per 1000.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana jumlah populasi sebanyak 3.705 orang dan sampel sejumlah 115 orang, sumber data yang diperoleh melalui data sekunder, kemudian keseluruhan data diolah secara manual untuk dianalisa dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan tabel.

Hasil penelitian menunjukkan persalinan presentasi bokong yang terbanyak terjadi pada paritas > 2 yaitu 65 orang (56,50%). Pada umur kehamilan 37 – 42 minggu yaitu 103 orang (89,56%). Pada riwayat kehamilan kembar yaitu 107 orang (93,04%) tidak mengalami kehamilan kembar. Pada berat badan lahir bayi yaitu 82 orang (71,30%) dengan berat badan 2500 – 4000 gram.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian persalinan berdasarkan paritas lebih banyak terjadi pada paritas > 2 sebanyak 65 orang (56,50%), lebih banyak terjadi pada umur kehamilan 37 – 42 minggu sebanyak 103 orang (89,56%), lebih banyak yang tidak mengalami kehamilan kembar sebanyak 107 orang (93,04%), lebih banyak dengan berat badan lahir 2500 – 4000 gram sebanyak 82 orang (71,30%).

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Keaslian	iii
Halaman Pengesahan	iv
Biodata Penulis	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Tentang Persalinan Presentasi Bokong.....	7
1. Pengertian	7
2. Klasifikasi	7
3. Frekuensi	8
4. Etiologi	8

5. Diagnosis	9
6. Mekanisme Persalinan	10
7. Prognosis	11
8. Cara Persalinan Presentasi Bokong	12
B. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Persalinan Presentasi Bokong	32
1. Paritas	32
2. Umur Kehamilan.....	32
3. Hamil Kembar	33
4. Hidramnion	33
5. Plasenta Previa	33
6. Kelainan Bentuk Rahim	34
7. Hidrosefalus	34
8. Berat Badan Bayi	35
BAB III KERANGKA KONSEP	36
1. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	36
a. Paritas	36
b. Umur Kehamilan.....	36
c. Hamil Kembar	37
d. Berat Badan Bayi	37
2. Bagan Kerangka Konsep.....	38
3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	39
BAB IV METODE PENELITIAN	42

A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi Dan Sampel	42
D. Teknik Pengambilan Sampel	43
E. Pengumpulan Data	43
F. Pengolahan Data	43
G. Teknik Analisa Data	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Cara Mencengkam Bokong Janin Secara Bracht.....	18
Gambar 2	: Gerakan Hiperlordosis	18
Gambar 3	: Gerakan Hiperlordosis Sampai Kepala Lahir	19
Gambar 4	: Kedua Kaki Janin Dibawa Ke Atas Perut Ibu Kemudian Lengan Belakang Dilahirkan	20
Gambar 5	: Kaki Janin Didekatkan Ke Arah Punggung Ibu, Kemudian Lengan Depan Dilahirkan.....	21
Gambar 6	: Cara Melahirkan Lengan Depan Secara Muller.....	22
Gambar 7	: Cara Melahirkan Lengan Belakang Secara Muller	23
Gambar 8	: Melahirkan Bahu Dan Lengan Secara Lovset.....	25
Gambar 9	: Cara Melahirkan Kepala Secara Mariceau.....	26
Gambar 10	: Melahirkan Kepala Secara Naujoks	27
Gambar 11	: Melahirkan Kepala Secara Prague Terbalik	28
Gambar 12	: Melahirkan Kepala Janin Dengan Ekstraksi Cunam Piper	29
Gambar 13	: Menurunkan Kaki Pada Ekstraksi Kaki	29
Gambar 14	: Ekstraksi Bokong	30

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 5.1 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Paritas Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2009	45
Tabel 5.2 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Umur Kehamilan Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2009	46
Tabel 5.3 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Kehamilan Kembar Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Ftimah Makassar Periode Januari – Desember 2009	46
Tabel 5.4 Distribusi Prersalinan Presentasi Bokong Menurut Berat Badan Bayi Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2009	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar kegiatan konsul

Lampiran 2 : Master Tabel

Lampiran 3 : Surat permohonan izin pengambilan data

Lampiran 4 : Surat izin penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun oleh masyarakat dan swasta.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan disesuaikan dengan indikator gabungan dari indikator Indonesia sehat dan indikator kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi; (a) indikator derajat kesehatan yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi; (b) indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup; (c) indikator-indikator pelayanan kesehatan. Sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan, dan kontribusi sektor terkait.

(Profil Dinas Kesehatan, 2009, hal 56)

Kematian ibu atau setiap dua jam ada dua ibu hamil, bersalin, nifas yang meninggal karena berbagai penyebab, data di Indonesia masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yang 307 per 100.000 kelahiran hidup. (Syafuruddin, 2008)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Makassar dari laporan dari Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 menunjukkan kematian ibu sebesar 97,12 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematiannya rata-rata disebabkan oleh sebab langsung seperti perdarahan, eklampsia, infeksi, dan lainnya. (Profil Dinas Kesehatan, 2009, hal 57)

Angka kematian bayi di Indonesia sebesar 36 per 1.000 kelahiran ini tergolong tinggi, misalnya dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Angka kematian bayi hanya berkisar antara 5/1.000 kelahiran hingga 10/1.000 kelahiran.

Berdasarkan survei lainnya, yaitu Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, kematian bayi baru lahir (neonatus) merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya Angka Kematian Balita (AKB). Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1.000 kelahiran hidup terenggut nyawanya dalam rentang waktu 0-12 hari pasca kelahirannya. Parahnya, dalam rentang 2002-2007 (data terakhir), angka neonatus tidak pernah mengalami penurunan. Penyebab kematian terbanyak pada periode ini. (Hegar.B, 2009, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 05 april 2010)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007, mencatat AKB di Sulawesi Selatan sebesar 41 per 1000 kelahiran hidup, namun masih lebih tinggi dari pencapaian secara nasional yakni 35 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi yang dilaporkan oleh

Subdin Kesga Dinkes Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 sebesar 7,12 per 1000 kelahiran hidup. (Profil Dinas Kesehatan, 2009, hal 56)

Salah satu penyulit dalam persalinan adalah kelainan letak janin dalam hal ini presentasi bokong. Presentasi bokong adalah suatu keadaan dimana janin dalam posisi membujur/memanjang, kepala berada pada fundus sedangkan bagian terendah adalah bokong. (Sumarah, 2008, hal 122)

Angka Kematian Bayi (AKB) pada persalinan presentasi bokong lebih tinggi bila dibandingkan dengan presentasi kepala. Di RS Karjadi Semarang, RS Umum dr. Pirngadi Medan dan RS Hasan Sadikin Bandung didapatkan angka kematian perinatal masing-masing 38,5%, 29,4% dan 16,8%. Eastman melaporkan angka-angka kematian perinatal antara 12-14%. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 613)

Kelahiran bokong cukup bulan per vaginam menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas perinatal antara 1 dan 2%. Resiko kematian neonatal berlebihan yang terhitung adalah sekitar 4 per 1000. (Liu.David T.Y, 2008, hal 272)

Faktor penyebab dari presentasi bokong adalah multiparitas, hamil kembar, hidramnion, hidrosefalus, plasenta previa, kelainan uterus dan berat badan bayi.

Insiden letak sungsang pada janin aterm ditemukan kira-kira 2-4%. Greenhill melaporkan 4-4,5%. Holland: 2-3%, sedangkan di RS dr. Pirngadi Medan ditemukan frekuensi 4,4% dan di RS Hasan Sadikin Bandung 4,6%. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 609)

Berdasarkan data dari RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari – Desember 2009 jumlah ibu bersalin sebanyak 3705 orang dengan presentasi bokong sebanyak 149 orang.

Janin letak bokong berada pada resiko mortalitas dan morbiditas perinatal yang lebih tinggi bukan hanya akibat trauma partus tetapi juga karena presentasi yang demikian disertai oleh keadaan atau komplikasi-komplikasi misalnya kelahiran prematur, berat lahir rendah yang tidak sesuai dengan umur kehamilan, tali pusat menumbung, malformasi congenital, plasenta previa dan solusio plasenta, selain itu angka kesakitan pada bayi juga tinggi karena mungkin terjadi fraktur humerus atau klavikula pada waktu melahirkan lengan, paralisis lengan karena tekanan atau tarikan pada fleksus brakialis pada waktu melahirkan kepala dengan cara Mericeau. (Sastrawinata.S, 2005, hal 140)

Oleh karena masalah presentasi bokong perlu mendapat perhatian maka penulis tertarik melakukan penelitian kejadian persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari – Desember 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kejadian persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar berdasarkan paritas ibu ?

2. Bagaimana gambaran kejadian persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar berdasarkan umur kehamilan ibu ?
3. Bagaimana gambaran kejadian persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar berdasarkan kehamilan kembar Ibu?
4. Bagaimana gambaran kejadian persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar berdasarkan berat badan bayi Ibu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diperoleh gambaran umum kejadian persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2009.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh gambaran kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan paritas Ibu.
- b. Untuk mengetahui gambaran kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan umur kehamilan Ibu.
- c. Untuk mengetahui gambaran kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan kehamilan kembar Ibu.
- d. Untuk mengetahui gambaran kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan berat badan bayi Ibu.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi instansi kesehatan untuk menentukan kebijakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan angka kematian ibu dan perinatal pada masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan informasi di RSIA Siti Fatimah Makassar dan sebagai bahan masukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Sebagai pengalaman berharga bagi penulis memperluas wawasan cakrawala berpikir.
4. Sebagai salah satu bahan bacaan dan sumber informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswi kebidanan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Persalinan Presentasi Bokong

1. Pengertian

- a. Presentasi bokong adalah bila bayi letak longitudinal dan bokong bayi berada di segmen bawah uterus ibu. (Chapman.V, 2006, hal 126)
- b. Presentasi bokong adalah letak memanjang dengan bokong sebagai bagian terendah. (Sastrawinata.S, 2005, hal 132)
- c. Presentasi bokong adalah suatu keadaan dimana janin dalam posisi membujur/memanjang, kepala berada pada fundus sedangkan bagian terendah adalah bokong. (Sumarah, 2008, hal 122)
- d. Presentasi bokong adalah bagian presentasi janin adalah bokong dengan sacrum sebagai penentu posisi. (Liu,D.T.Y, 2008, hal 269)

2. Klasifikasi

- a. Bokong murni (frank breech)
Pada bagian terendah janin adalah bokong saja dan kedua tungkai terangkat ke atas.
- b. Bokong sempurna (komplete breech)
Pada bagian terendah janin adalah bokong dan kedua tungkai/kaki.
- c. Bokong tidak sempurna (inkomplete breech)
Pada bagian terendah janin adalah bokong dan kaki atau lutut yang terdiri atas :

- 1) Kedua kaki : Letak kaki sempurna
 Satu kaki : Letak kaki tidak sempurna
- 2) Kedua lutut : Lutut sempurna
 Satu lutut : Lutut tidak sempurna

(Sumarah, 2008, hal 122)

3. Frekuensi

Frekuensi letak sungsang lebih tinggi pada kehamilan muda dibandingkan dengan kehamilan aterm dan lebih banyak pada multigravid dari pada primigravida. (Sastrawinata.S, 2005 hal 132)

Insiden letak sungsang pada janin aterm ditemukan kira-kira 2-4%. Greenhill melaporkan 4-4,5%. Holland: 2-3%, sedangkan di RS dr. Pirngadi Medan ditemukan frekuensi 4,4% dan di RS Hasan Sadikin Bandung 4,6%. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 609)

Presentasi ini paling sering terjadi sebelum usia kehamilan 28 minggu (insiden 20%) daripada saat cukup bulan (3%). (Liu.David T.Y, 2008, hal 269)

4. Etiologi

Letak janin dalam uterus bergantung pada proses adaptasi janin terhadap ruangan di dalam uterus. Pada kehamilan sampai kurang 32 minggu, jumlah air ketuban relatif lebih banyak, sehingga memungkinkan janin bergerak dengan leluasa. Dengan demikian janin dapat menempatkan diri dalam presentasi kepala, letak sungsang atau lintang.

Presentasi bokong lebih tinggi pada kehamilan belum cukup bulan, daripada kehamilan cukup bulan, dan faktor-faktor yang memegang peranan dalam terjadinya presentasi bokong ialah paritas, hamil kembar, hidramnion, hidrosefalus, plasenta previa dan kelainan bentuk uterus. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 611)

5. Diagnosis

Pada pemeriksaan luar, bagian bawah uterus tidak dapat diraba bagian yang keras dan bulat, yakni kepala, dan kepala teraba di fundus uteri. Kadang-kadang bokong janin teraba bulat dan dapat memberi kesan seolah-olah kepala, tetapi bokong tidak dapat digerakkan semudah kepala. Sering kali wanita tersebut menyatakan bahwa kehamilannya terasa lain dari pada kehamilan yang dulu, karena terasa penuh dibagian atas dan gerakan terasa lebih banyak dibagian bawah.

Denyut jantung janin pada umumnya ditemukan setinggi atau sedikit lebih tinggi daripada umbilikus. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 609)

Pada pemeriksaan dalam teraba sacrum, anus, tuber isciadikum, kadang-kadang kaki atau lutut. Perlu diperhatikan perbedaannya dengan presentasi muka.

Cara membedakannya dengan melakukan pemeriksaan dalam dan hasilnya :

- a. Apabila menemukan lubang kecil tanpa tulang, tidak ada hisapan, terdapat mekonium kesimpulannya hal tersebut adalah anus.

- b. Apabila menemukan lubang, menghisap, lidah, prosesus zigomatikus, maka kesimpulannya hal tersebut adalah mulut.
- c. Apabila menemukan tumit, sudut 90^0 dengan jari-jari rata, maka kesimpulannya hal tersebut adalah kaki.
- d. Apabila menemukan jari-jari panjang tidak rata dan tidak terdapat sudut maka kesimpulannya hal tersebut adalah tangan.
- e. Apabila menemukan patella dan poplitea maka kesimpulannya hal tersebut adalah lutut.

Diagnosis diperkuat oleh pemeriksaan ultrasonografi (USG).

(Sumarah, 2008, hal 123)

6. Mekanisme Persalinan

Bokong masuk ke dalam rongga panggul dengan garis pangkal paha melintang atau miring. Setelah menyentuh dasar panggul terjadi putaran paksi dalam, sehingga di pintu bawah panggul garis pangkal paha menempati diameter anteroposterior dan trokanter depan berada di bawah simfisis. Kemudian terjadi fleksi lateral pada badan janin, sehingga trokanter belakang melewati perineum dan lahirlah seluruh bokong diikuti oleh kedua kaki.

Setelah bokong lahir terjadi putaran paksi luar dengan perut janin berada di posterior yang memungkinkan bahu melewati pintu atas panggul dengan garis terbesar bahu melintang atau miring. Terjadi putaran paksi dalam pada bahu, sehingga bahu depan berada di bawah simfisis dan bahu belakang melewati perineum.

Pada saat tersebut kepala masuk kedalam rongga panggul dengan sutura sagitalis melintang atau miring. Di dalam rongga panggul terjadi putaran paksi dalam kepala, sehingga muka memutar ke posterior dan oksiput ke arah simfisis. Dengan suboksiput sebagai hipomoklion, maka dagu, mulut, hidung, dahi dan seluruh kepala lahir berturut-turut melewati perineum. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 611)

7. Prognosis

Sebab kematian perinatal yang terpenting adalah prematuritas dan penanganan persalinan yang kurang sempurna, dengan akibat hipoksia atau perdarahan di dalam tengkorak. Sedangkan hipoksia terjadi karena terjepitnya tali pusat antara kepala dan panggul pada waktu kepala memasuki rongga panggul serta akibat retraksi uterus yang dapat menyebabkan terlepasnya plasenta sebelum kepala lahir. Kelahiran kepala janin yang lebih lama dari 8 menit setelah umbilikus dilahirkan, akan membahayakan kehidupan janin. Selain itu bila janin bernafas sebelum hidung dan mulut lahir dapat membahayakan, karena mukus yang terhisap dapat menyumbat jalan napas. Bahaya asfiksia janin juga terjadi akibat tali pusat yang menumbung.

Perlakuan pada kepala janin terjadi karena kepala harus melewati panggul dalam waktu lebih singkat daripada persalinan presentasi kepala, sehingga tidak ada waktu bagi kepala untuk menyesuaikan diri dengan besar dan bentuk panggul, sehingga mudah menimbulkan luka

pada kepala dan perdarahan dalam tengkorak. (Wiknjosastro.H, 2007, hal 613)

Sedangkan bagi ibu dapat terjadi resiko infeksi karena robekan perineum yang lebih besar dan karena tindakan yang dilakukan, ketuban pecah terlalu cepat, dan partus lama. (Sumarah, 2008, hal 12)

8. Cara Persalinan Presentasi Bokong

Pada persalinan presentasi bokong sebaiknya ditolong oleh tenaga ahli yang berkompentensi dibidangnya dan pada fasilitas kesehatan yang dapat melakukan operasi.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisa'(4):
58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat di atas tersebut secara gamblang mewajibkan setiap urusan diserahkan kepada orang-orang yang memahami urusan tersebut, sebab kerusakan yang ditimbulkan oleh ketidakhlian lebih besar dibanding kerusakan yang lain. Apalagi dalam masalah persalinan yang sangat sensitif. (Wahbah al-Zuhaili, 1418 H., hal. Juz. 29: 125)

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat, ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.

Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi SAW, “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah”. Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

Amanah bukan sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan bermacam-macam semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanah antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan lingkungannya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki rincian, dan setiap rincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanah yang banyak itu hanya milik seorang.

Ketika memerintahkan menunaikan amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahli yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian,

baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. (Shihab M. Quraish, 1430 H, hal 579)

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Rasulullah saw. yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda “Jika amanah disia-siakan maka tunggulah akibatnya, Abu Hurairah bertanya “Bagaimana cara menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah saw., Rasulullah saw. menjawab “Jika urusan itu diserahkan bukan kepada ahli/pakarnya maka tunggulah kehancurannya. (HR. Bukhari, 1987, Juz. V, hal. 2382)

Dari ayat dan hadist tersebut diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan profesionalitas dalam melakukan sesuatu agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, persalinan seharusnya diserahkan kepada ahli di bidang persalinan sehingga bisa melakukan pertolongan secara maksimal kepada ibu dan anak yang lahir.

Komplikasi atau masalah yang akan terjadi pada persalinan presentasi bokong yaitu :

- Dislokasi persendian
- Trauma alat vital visera
- Fraktur tulang ekstremitas

- Fraktur persendian leher
- Asfiksia ringan sampai berat
- Perdarahan intrakranial
- Cacat seumur hidup, IQ-nya rendah
- Lahir mati (Manuaba,I.B.G, 2004, hal 98)

Pada persalinan presentasi bokong, yang berhak atau yang mempunyai wewenang dalam menangani persalinan adalah dokter yang memiliki keterampilan dalam kelahiran presentasi bokong, sedangkan prioritas bagi bidan adalah menjadi asisten dalam proses pertolongan persalinan presentasi bokong, dan tugas lain bidan ialah mempertahankan lingkungan yang tenang, dan mempersiapkan resusitasi neonatus yang diawali dengan pengisapan saat kelahiran wajah. Kehangatan lingkungan harus dipertahankan untuk mencegah terjadinya hipotermia neonatus dan hipoglikemia neonatus yang diakibatkannya. Pemberian makanan dini sangat menguntungkan bagi ibu. (Boile.M, 2008, hal 125)

Cara persalinan presentasi bokong dibagi 2 yaitu:

a. Persalinan pervaginam

Syarat pada persalinan pervaginam:

- 1) Pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat ada/tidaknya kelainan bawaan, lokasi plasenta, hipereksistensi kepala, taksiran berat janin.

- 2) Janin tunggal, terutama presentasi bokong murni, taksiran berat janin 2500-3500 gram.
- 3) Ukuran pintu atas panggul, diameter transversal $> 11,5$ cm dan diameter anteroposterior > 10 cm, sedangkan pintu tengah panggul distansia interspinarum > 10 cm dan diameter anteroposterior $> 11,5$ cm.
- 4) Adanya penolong yang trampil, fasilitas kamar operasi darurat untuk secsio cesarea.
- 5) Tidak ada indikasi obstetric maupun generalis untuk secsio cesarea baik bagi ibu maupun janin.

(Diyoyen, 2008, <http://diyoyen.blog.com>, diakses tanggal 20 maret 2010).

Ada beberapa cara pertolongan persalinan pervaginam pada persalinan presentasi bokong yaitu :

- 1) Pertolongan persalinan spontan (Bracht)

Janin dilahirkan dengan kekuatan dan tenaga ibu sendiri.

Cara ini lazim disebut cara Bracht.

Prosedur pertolongan persalinan spontan

Tahapan

- a) Tahap pertama: fase lambat, yaitu mulai lahirnya bokong sampai pusar (scapula depan). Disebut fase lambat karena fase ini hanya untuk melahirkan bokong, yaitu bagian janin yang tidak berbahaya.

- b) Tahap kedua: fase cepat, yaitu mulai dari lahirnya pusar sampai lahirnya mulut. Disebut fase cepat karena pada fase ini kepala janin mulai masuk pintu atas panggul, sehingga kemungkinan tali pusat terjepit. Oleh karena itu, fase ini harus segera diselesaikan dan tali pusat segera dilonggarkan. Bila mulut sudah lahir, janin dapat bernafas lewat mulut.
- c) Tahap ketiga: fase lambat, yaitu mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala lahir. Disebut fase lambat karena kepala akan keluar dari ruangan yang bertekanan tinggi (uterus), ke dunia luar yang tekanannya lebih rendah, sehingga kepala harus dilahirkan secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya perdarahan intra kranial.

Teknik

- a) Sebelum melakukan pimpinan persalinan penolong harus memperhatikan sekali lagi persiapan untuk ibu, janin, maupun penolong.
- b) Ibu tidur dalam posisi litotomi, sedang penolong berada di depan vulva. Ketika timbul his ibu disuruh mengejan dengan merangkul kedua pangkal paha. Pada waktu bokong mulai membuka vulva, di suntikkan 2-5 unit oksitosin intra muskulus. Pemberian oksitosin ini ialah untuk merangsang kontraksi rahim sehingga fase cepat dapat diselesaikan dalam 2 his berikutnya.

- c) Episiotomi dikerjakan pada saat bokong membuka vulva. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkam secara bracht, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul.



Gambar 1: cara mencengkam bokong janin secara Bracht.

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 105)

- d) Pada setiap his ibu disuruh mangejan. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak sangat teregang, tali pusat dikendorkan terlebih dahulu.



Gambar 2 : Gerakan Hiperlordosis

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 106)

- e) Kemudian penolong melakukan hiperlordosis pada badan janin guna mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke perut ibu. Penolong hanya mengikuti gerakan ini

tanpa melakukan tarikan, sehingga gerakan tersebut hanya disesuaikan dengan gaya berat badan janin. Bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlordosis ini, seorang asisten melakukan ekspresi kristeller pada fundus uteri, sesuai dengan sumbu panggul.

- f) Dengan gerakan hiperlordosis ini berturut-turut lahir pusar, perut, bahu, dan lengan, dagu, mulut dan akhirnya seluruh kepala.
- g) Janin yang baru lahir diletakkan di perut ibu. Seorang asisten segera menghisap lendir dan bersamaan dengan itu penolong memotong tali pusat.



Gambar 3 : Gerakan hiperlordosis sampai kepala lahir.
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 107)

2) Pertolongan persalinan dengan prosedur Manual Aid

Janin dilahirkan sebagian dengan tenaga dan kekuatan ibu dan sebagian lagi dengan tenaga penolong.

- a) Tahap pertama : Lahirnya bokong sampai umbilikus,
- b) Tahap kedua : Melahirkan bahu dan lengan

(1) Cara Klasik

- (a) Prinsip melahirkan bahu dan lengan secara klasik ini ialah: melahirkan lengan belakang lebih dahulu, kemudian lengan belakang berada di ruangan yang lebih luas (sakrum), baru kemudian melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Tetapi bila lengan depan sukar dilahirkan, maka lengan depan diputar menjadi lengan belakang, yaitu dengan memutar lengan bahu ke arah belakang dan baru kemudian lengan belakang ini dilahirkan.
- (b) Kedua kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong pada pergelangan kakinya dan dievelasi ke atas sejauh mungkin, sehingga perut janin mendekati perut ibu.



Gambar 4 : Kedua kaki janin dibawa ke atas perut ibu, kemudian lengan belakang dilahirkan

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 109)

- (c) Bersamaan dengan itu tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dan dengan jari-jari

tangan dan telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa kubiti kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin.



Gambar 5 : Kaki janin didekatkan ke arah punggung ibu, kemudian lengan depan di lahirkan.

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 109)

(d) Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan penolong dan ditarik curam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu.

(e) Dengan cara yang sama lengan depan dilahirkan.

(f) Bila lengan depan sukar dilahirkan, maka harus diputar menjadi lengan belakang. Gelang bahu dan lengan yang sudah lahir dicengkam dengan kedua tangan penolong sedemikian rupa sehingga kedua ibu jari tangan penolong terletak di punggung dan sejajar dengan sumbu badan janin sedang jari-jari lain mencengkam dada. Putaran diarahkan ke perut dan

dada janin, sehingga lengan depan terletak di belakang. Kemudian lengan belakang ini dilahirkan dengan teknik tersebut di atas.

- (g) Keuntungan cara Klasik ialah pada umumnya dapat dilakukan pada semua persalinan presentasi bokong, tapi kerugiannya ialah lengan janin masih relatif tinggi di dalam panggul, sehingga jari penolong harus masuk ke dalam jalan lahir yang dapat menimbulkan infeksi.

(2) Cara Mueller

- (a) Prinsip melahirkan bahu dan lengan secara Muller ialah melahirkan bahu dan lengan dengan ekstraksi, baru kemudian melahirkan bahu dan lengan belakang.



Gambar 6 : cara melahirkan lengan depan secara Muller
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 110)

- (b) Bokong janin dipegang secara femuro-pelviks yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sakralis media dan jari telunjuk pada krista iliaka dan

jari-jari lain mencengkam paha bagian depan. Dengan pegangan ini badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis, dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan bawahnya.

- (c) Setelah bahu depan dan lengan depan lahir. Maka badan janin yang masih dipegang secara femuro-pelviks ditarik ke atas, sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan kedua jari penolong. Keuntungan dari teknik Muller ini ialah tangan penolong tidak masuk jauh ke dalam jalan lahir sehingga bahaya infeksi minimal.




Gambar 7 : Cara melahirkan lengan belakang secara Muller

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 111)

(3) Cara Lovset

- (a) Prinsip persalinan secara Lovset ialah memutar badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik sambil dilakukan traksi curam ke bawah sehingga bahu yang sebelumnya berada di belakang akhirnya lahir di bawah simfisis. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa adanya inklinasi antara pintu atas panggul dengan sumbu panggul dan bentuk lengkungan panggul yang mempunyai lengkungan depan lebih pendek dari lengkungan di belakang, sehingga setiap saat bahu belakang dalam posisi lebih rendah dari bahu depan.
- (b) Badan janin dipegang secara femuro-pelviks dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah badan janin diputar setengah lingkaran, sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah yang berlawanan setengah lingkaran, demikian seterusnya bolak-balik, sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan.
- (c) Bila lengan janin tidak dapat dilahirkan dengan sendirinya, maka lengan janin ini dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan jari penolong. Keuntungan cara lovset ialah teknik yang sederhana

dan jarang gagal, dapat digunakan pada semua presentasi bokong, dan tangan penolong tidak masuk ke dalam jalan lahir, sehingga bahaya infeksi minimal.



Gambar 8 : Melahirkan bahu dan lengan secara Lovset
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 112)

c) Tahap ketiga : Melahirkan kepala

(1) Cara Mauriceau

(a) Tangan penolong yang sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir. Jari tangan dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk, dan jari keempat memegang fossa kanina, sedang jari lain memegang leher. Badan janin diletakkan di atas lengan bawah penolong, seolah-olah janin

menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ketiga penolong yang lain mencengkam leher janin dari arah punggung.

- (b) Kedua tangan penolong menarik kepala janin curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan ekspresi kristeller. Tenaga tarikan terutama dilakukan oleh tangan penolong yang mencengkam leher janin dari arah punggung. Bila suboksiput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas dengan suboksiput sebagai hipomoglion sehingga berturut-turut lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar dan akhirnya seluruh kepala janin.



Gambar 9 : Cara melahirkan kepala secara Mauriceau
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 114)

(2) Cara Najouk

Teknik ini dilakukan bila kepala janin masih tinggi, sehingga jari penolong tidak dapat dimasukkan ke dalam mulut janin. Kedua tangan penolong mencengkam leher

janin dari arah depan dan belakang. Kedua tangan penolong menarik bahu curam ke bawah dan bersamaan dengan itu seorang asisten mendorong kepala janin ke arah bawah. Cara ini tidak dianjurkan karena menimbulkan trauma yang berat pada sumsum tulang di daerah leher.



Gambar 10 : Melahirkan kepala secara Naujoks
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 115)

(3) Cara Prague Terbalik

Teknik prague terbalik dipakai bila oksiput dengan ubun-ubun kecil berada di belakang dekat sacrum dan muka janin menghadap simfisis. Satu tangan penolong mencengkam leher dari arah bawah dan punggung janin diletakkan pada telapak tangan penolong. Tangan penolong yang lain memegang kedua pergelangan kaki. Kaki janin ditarik ke atas bersamaan dengan tarikan pada bahu janin, sehingga perut janin mendekati perut ibu.

Dengan laring sebagai hipomoglion, kepala janin dapat dilahirkan.



Gambar 11 : Melahirkan kepala secara Prague terbalik
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 115)

(4) Cara Cunam Piper

- (a) Seorang asisten memegang badan janin pada kedua kaki, dan kedua lengan janin diletakkan dipunggung janin. Kemudian badan janin dielevasi ke atas, sehingga punggung janin mendekati punggung ibu.
- (b) Pemasangan cunam pada letak belakang kepala yaitu cunam dimasukkan dari arah bawah, yaitu sejajar dengan lipatan paha belakang. Setelah suboksiput tampak di bawah simfisis, maka cunam dielevasi ke atas dan dengan suboksiput sebagai hipomoglion, berturut-turut lahir dagu, mulut, muka, dahi dan akhirnya seluruh kepala lahir.



Gambar 12 : melahirkan kepala janin dengan ekstraksi Cunam Piper

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 116)

3) Ekstraksi pada presentasi bokong

Janin dilahirkan seluruhnya dengan memakai tenaga penolong.

a) Teknik Ekstraksi Kaki

- (1) Tangan penolong masuk mencari bokong, panggul paha sampai lutut, mengabduksi dan fleksi pada paha janin sehingga kaki bawah menjadi fleksi, pergelangan kaki dipegang dan dituntun keluar dari vagina sampai batas lutut.



Gambar 13 : menurunkan kaki pada Ekstraksi Kaki

Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 117)

- (2) Kedua tangan penolong memegang betis, kaki ditarik curam ke bawah sampai pangkal paha lahir.
 - (3) Pangkal paha ditarik cunam ke arah bawah sampai trokanter depan lahir, disusul trokanter belakang dan bokong lahir.
 - (4) Untuk melahirkan bayi seterusnya, tangan penolong memegang femuro-pelviks dan ditarik curam ke bawah sampai umbilikus lahir. Untuk melahirkan bahu, lengan dan kepala dilakukan pertolongan secara Manual Aid.
- b) Teknik Ekstraksi Bokong
- (1) Dilakukan pada presentasi bokong murni (Frank Breech) dan bokong sudah berada di dasar panggul. Jari telunjuk penolong yang searah dengan bagian kecil janin dimasukkan ke dalam jalan lahir dan diletakkan pada lipat paha. Lipat paha ditarik curam ke bawah.



Gambar 14 : Ekstraksi Bokong
Sumber: (Wiknjosastro.H, 2007, hal 120)

- (2) Setelah trokanter depan dilahirkan, maka jari telunjuk yang lain segera mengait lipat paha belakang, dan ditarik curam ke bawah sampai bokong lahir.
- (3) Tangan penolong memegang femuro-pelviks bayi dan melahirkan bayi dengan Manual Aid.

(Diyoyen, 2008, <http://diyoyen.blog.com>, diakses tanggal 20 maret 2010).

b. Persalinan dengan seksio cesarea

Beberapa kriteria yang merupakan indikasi dilakukan seksio cesarea yaitu :

- 1) Primigravida tua
- 2) Nilai sosial janin tinggi
- 3) Riwayat persalinan yang buruk
- 4) Janin besar, lebih dari 3500 gram – 4000 gram
- 5) Dicurigai adanya panggul sempit
- 6) Prematuritas

(Prawirohardjo,S, 2007, hal 121)

B. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Persalinan Presentasi Bokong

1. Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, salah satu penyebab presentasi bokong adalah multiparitas yaitu wanita yang pernah melahirkan bayi viabel beberapa kali.

(Fischer.R, 2006, <http://www.CBN Portal.com>, diakses tanggal 30 maret 2010).

Hal ini biasanya terjadi karena ibu telah melahirkan beberapa anak sebelumnya, sehingga rahim sangat elastis dan membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya.

(Andriani.R, 2009, <http://resi adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

2. Umur Kehamilan

Lamanya kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama haid yang terakhir sampai lahirnya bayi.

Umur kehamilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Prematur yaitu umur kehamilan 28 – 37 minggu
- b. Matur yaitu umur kahamilan 37 – 42 minggu
- c. Serotinus yaitu umur kehamilan > 42 minggu

(Sastrawinata.S, 2005, hal 1)

Letak janin tergantung pada proses adaptasinya di dalam rahim, pada usia kehamilan 32 minggu, jumlah air ketuban relatif banyak

sehingga janin masih dapat bergerak bebas, dari yang posisi sungsang berputar menjadi melintang lalu berputar lagi sehingga posisi kepala dibagian bawah rahim, namun memasuki usia kehamilan 37 minggu ke atas, posisi sungsang sudah sulit berubah karena bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. (Andriani.R, 2009 [http://resi adriani.com](http://resiadriani.com), diakses tanggal 25 maret 2010).

3. Hamil Kembar

Hamil kembar adalah satu kehamilan dengan dua janin atau lebih. Adanya lebih dari satu janin dalam rahim menyebabkan terjadinya perebutan tempat yang lebih nyaman. Sehingga ada kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar (yakni bokong janin) berada di bagian bawah rahim. (Andriani.R, 2009, <http://resi adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

4. Hidramnion

Hidramnion adalah keadaan dimana banyaknya air ketuban melebihi 2000 cc. Volume air ketuban yang melebihi normal menyebabkan janin lebih leluasa bergerak walau sudah memasuki trimester ketiga. (Andriani.R, 2009, <http://resi adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

5. Plasenta Previa

Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta berimplantasi pada tempat abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga

menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. (Sulistiyawati.A, 2009, hal 130)

Plasenta yang menutupi jalan lahir dapat mengurangi luas ruangan dalam rahim. Akibatnya, janin berusaha mencari tempat yang lebih luas yakni di bagian atas rahim. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

6. Kelainan Bentuk Rahim

Rahim berbentuk seperti buah alvokat atau buah peer yang sedikit gepeng kearah muka dan belakang. Jika terjadi kelainan dalam hal ini bagian bawah rahim lebih besar dari pada bagian atasnya, maka janin cenderung mengubah posisinya menjadi presentasi bokong. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

7. Hidrosefalus

Hidrosefalus adalah kelebihan cairan serebrospinal di dalam ventrikel otak kira-kira 500-1500 cc. Oleh karena keadaan ini, kepala menjadi sangat besar. (Sastrawinata.S, 2005, hal 43)

Besarnya ukuran kepala akibat kelebihan cairan (hidrosefalus) membuat janin mencari tempat yang lebih luas, yakni di bagian atas rahim. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

8. Berat Badan Bayi

Berat badan bayi yang dimaksud adalah berat badan bayi waktu lahir. Berat badan bayi yang relatif lebih kecil mengakibatkan janin bebas bergerak. Ketika menginjak usia 28-34 minggu kehamilan, berat janin makin membesar, sehingga tidak bebas lagi bergerak. Pada usia tersebut, umumnya janin sudah menetap pada satu posisi. Kalau posisinya salah, maka disebut presentasi bokong. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).



BAB III

KERANGKA KONSEP

1. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Presentasi bokong adalah suatu keadaan dimana janin dalam posisi membujur/memanjang, kepala berada pada fundus sedangkan bagian terendah adalah bokong. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya persalinan presentasi bokong, yaitu paritas, umur kehamilan, hamil kembar, hidramnion, hidrosefalus, plasenta previa, berat badan bayi. Adapun faktor-faktor yang akan diteliti yaitu:

a. Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, salah satu penyebab presentasi bokong adalah multi paritas yaitu wanita yang pernah melahirkan bayi viable beberapa kali. (Fischer.R, 2006, <http://www.CBN Portal.com>, diakses tanggal 30 maret 2010).

Hal ini biasanya terjadi karena ibu telah melahirkan beberapa anak sebelumnya, sehingga rahim sangat elastis dan membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya. (Andriani.R, 2009, <http://resi adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

b. Umur kehamilan

Lamanya kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama haid yang terakhir. Letak janin tergantung pada proses adaptasinya di dalam rahim, pada usia kehamilan 32

minggu, jumlah air ketuban relatif banyak sehingga janin masih dapat bergerak bebas, dari yang posisi sungsang berputar menjadi melintang lalu berputar lagi sehingga posisi kepala dibagian bawah rahim, namun memasuki usia kehamilan 37 minggu ke atas, posisi sungsang sudah sulit berubah karena bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).


c. Hamil kembar

Hamil kembar adalah sesuatu kehamilan dengan dua janin atau lebih. Adanya lebih dari satu janin dalam rahim menyebabkan terjadinya perebutan tempat yang lebih nyaman. Sehingga ada kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar (yakni bokong janin) berada di bagian bawah rahim. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

d. Berat badan bayi

Berat badan bayi yang dimaksud adalah berat badan bayi waktu lahir. Berat badan bayi yang relatif lebih kecil mengakibatkan janin bebas bergerak. Ketika menginjak usia 28-34 minggu kehamilan, berat janin makin membesar, sehingga tidak bebas lagi bergerak. Pada usia tersebut, umumnya janin sudah menetap pada satu posisi. Kalau posisinya salah, maka disebut sungsang. (Andriani.R, 2009, <http://resi.adriani.com>, diakses tanggal 25 maret 2010).

2. Bagan Kerangka Konsep



Keterangan :

————— : Variabel yang diteliti

----- : Variabel yang tidak diteliti

○ : Variabel dependen

□ : Variabel independen

3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, salah satu penyebab presentasi bokong adalah multi paritas yaitu wanita yang pernah melahirkan bayi viable beberapa kali. Hal ini biasanya terjadi karena ibu telah melahirkan beberapa anak sebelumnya, sehingga rahim sangat elastis dan membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya.

Kriteria objektif

- 1) Resiko rendah : Jumlah kelahiran 1
- 2) Resiko tinggi : Jumlah kelahiran > 2

b. Umur kehamilan

Lamanya kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama haid yang terakhir. Letak janin tergantung pada proses adaptasinya di dalam rahim, pada usia kehamilan 32 minggu, jumlah air ketuban relatif banyak sehingga janin masih dapat bergerak bebas, dari yang posisi sungsang berputar menjadi melintang lalu berputar lagi sehingga posisi kepala dibagian bawah rahim, namun memasuki usia kehamilan 37 minggu ke atas, posisi sungsang sudah sulit berubah karena bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul.

Pada usia kehamilan < 37 minggu berat badan bayi relatif masih kecil sehingga memungkinkan terjadinya presentasi bokong, sedangkan pada usia kehamilan > 42 minggu dengan posisi presentasi bokong, dapat terjadi gawat janin.

Kriteria objektif

- 1) Resiko rendah : Umur kehamilan 37 - 42 minggu
- 2) Resiko tinggi : Umur kehamilan < 37 minggu dan > 42 minggu

c. Kehamilan kembar

Hamil kembar adalah sesuatu kehamilan dengan dua janin atau lebih. Adanya lebih dari satu janin dalam rahim menyebabkan terjadinya perebutan tempat yang lebih nyaman. Sehingga ada kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar (yakni bokong janin) berada di bagian bawah rahim.

Kriteria objektif

- 1) Resiko rendah : Bila tidak terjadi kehamilan kembar
- 2) Resiko tinggi : Bila terjadi kehamilan kembar

d. Berat badan bayi

Berat badan bayi yang dimaksud adalah berat badan bayi waktu lahir. Berat badan bayi yang relatif lebih kecil mengakibatkan janin bebas bergerak. Ketika menginjak usia 28-34 minggu kehamilan, berat janin makin membesar, sehingga tidak bebas lagi bergerak. Pada usia tersebut, umumnya janin sudah

menetap pada satu posisi. Kalau posisinya salah, maka disebut presentasi bokong.

Dan pada proses kelahiran, apabila berat badan bayi lebih dari 4000 gram maka dapat menyebabkan trauma pada janin, selain itu dapat terjadi hipoksia yang dikarenakan kepala lama di jalan lahir, dan dapat juga berakibat terjadinya fraktur humerus pada saat melahirkan lengan dan tangan.

Kriteria objektif

- 1) Resiko rendah : Bila berat badan bayi 2500 gram - 4000 gram
- 2) Resiko tinggi : Bila berat badan bayi < 2500 gram dan > 4000 gram



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan secara objektif mengenai jumlah ibu bersalin dengan persalinan presentasi bokong di RSIA Siti Fatimah Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yaitu di RSIA Siti Fatimah Makassar yang terletak di jalan Gunung Merapi No 75 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

2. Waktu

Penelitian dilaksanakan tanggal 24 Juni – 06 Juli 2010.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah semua ibu bersalin di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari – Desember 2009 sebanyak 3705 orang.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah semua ibu bersalin dengan presentasi bokong di kamar bersalin RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari – Desember 2009 sebanyak 115 orang.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling dimana variabel dependen adalah semua ibu bersalin dengan presentasi bokong dan variabel independennya adalah paritas, umur kehamilan, kehamilan kembar dan berat badan bayi.

E. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh di rekam medis RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari – Desember 2009

F. Pengolaan Data

Data diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator dan ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase disertai penjelasan.

G. Teknik Analisa Data

Data dianalisa dengan menggunakan persentase dengan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variabel

n = Jumlah sampel (populasi)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai kejadian persalinan presentasi bokong dari Januari – Desember 2009 dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar pada bulan Juli 2010.

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan data di Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar dan diperoleh jumlah persalinan sebanyak 3705 orang dan jumlah persalinan presentasi bokong sebanyak 115 orang, yang diolah dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 5. 1
Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Paritas
Di rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
Januari – Desember 2009

Paritas	Jumlah	%
1	50	43,50
> 2	65	56,50
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Dari hasil penelitian, tabel 5. 1 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, paritas > 2 sebanyak 65 orang (56,50%) lebih banyak terjadi persalinan presentasi bokong.

Tabel 5. 2
Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Umur Kehamilan
Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
Januari – Desember 2009

Umur Kehamilan	Jumlah	%
< 37 minggu dan > 42 minggu	12	10,34
37 minggu – 42 minggu	103	89,56
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Dari hasil penelitian, tabel 5. 2 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, pada umur kehamilan 37 minggu – 42 minggu sebanyak 103 orang (89,56%) lebih banyak terjadi persalinan presentasi bokong.

Tabel 5. 3
Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Riwayat Kehamilan Kembar
Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
Januari – Desember 2009

Riwayat Kehamilan Kembar	Jumlah	%
Ya	8	6,96
Tidak	107	93,04
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Dari hasil penelitian, tabel 5. 3 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, lebih banyak yang tidak mengalami kehamilan kembar 107 orang (93,04%).

Tabel 5. 4
 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Berat Badan Bayi
 Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
 Januari – Desember 2009

Berat Badan Byi	Jumlah	%
< 2500 gram dan > 4000 gram	33	28,70
2500 gram – 4000 gram	82	71,30
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Dari hasil penelitian, tabel 5. 4 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, bayi yang lahir dengan presentasi bokong lebih banyak mempunyai berat badan 2500 gram dan – 4000 gram sebanyak 82 orang (71,30%)

B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data, berikut disajikan pembahasan hasil penelitian :

1. Paritas

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari persalinan presentasi bokong lebih banyak pada paritas 1 yaitu sebanyak 50 orang (43,50%), sedangkan paritas > 2 terdapat 65 orang (56,50%).

Ibu dengan multiparitas memungkinkan terjadinya persalinan presentasi bokong dikarenakan otot-otot uterus yang elastis sehingga memudahkan bayi dapat leluasa bergerak. Dan diketahui bahwa salah satu

penyebab dari persalinan presentasi bokong ialah multiparitas, multiparitas memiliki peranan yang tinggi dalam terjadinya presentasi bokong, uterus yang sudah mengalami perengangan beberapa kali yang mengakibatkan posisi bayi dapat berubah-ubah, sehingga ibu dengan paritas yang tinggi mempunyai peluang yang besar terjadinya persalinan presentasi bokong.

2. Umur Kehamilan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong lebih banyak pada umur kehamilan 37 minggu – 42 minggu yaitu sebanyak 103 orang (89,56%), sedangkan umur kehamilan < 37 minggu dan > 42 minggu sebanyak 12 orang (10,34%).

Pada persalinan dengan usia kehamilan < 37 minggu memungkinkan terjadinya persalinan presentasi bokong dikarenakan jumlah air ketuban relatif lebih banyak sehingga bayi dengan leluasa bisa berubah posisi dari kepala menjadi bokong, tetapi pada saat ibu belum mengalami persalinan dengan usia kehamilan 37 minggu biasanya pada proses kehamilan ibu kurang mengerti dengan penjelasan yang diberikan yaitu posisi bayi dapat berubah kembali apabila ibu sering melakukan posisi menungging beberapa kali setiap hari atau lebih gampang dengan posisi seperti sedang mengepel, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka banyak terjadi persalinan presentasi bokong pada usia kehamilan 37 – 42 minggu, karena apabila bayi dengan posisi bokong sampai usia kehamilan 37 minggu sudah tidak bisa berubah oleh karena bagian terendah janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul.

3. Kehamilan Kembar

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong hanya terdapat 8 orang (6,96%) yang mengalami kehamilan kembar dan yang tidak mengalami kehamilan kembar sebanyak 107 orang (93,04%).

Pada ibu yang mengalami hamil kembar memungkinkan terjadinya persalinan presentasi bokong karena di dalam uterus terdapat dua janin yang menyebabkan terjadinya perebutan posisi yang nyaman, ada kemungkinan bagian terbesar dari janin yaitu bokong berada pada bagian bawah uterus sehingga berpeluang terjadinya presentasi bokong, ibu dengan kehamilan kembar cenderung memiliki peluang terjadinya presentasi bokong tetapi tidak semua yang mengalami persalinan presentasi bokong dikarenakan oleh hamil kembar banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya presentasi bokong tetapi salah satunya adalah hamil kembar, dan faktor lain yang merupakan penyebab dari persalinan presentasi bokong ialah paritas, umur kehamilan, berat badan bayi, hidramnion, hidrosefalus, plasenta previa, dan kelainan bentuk rahim. Dari semua faktor penyebab persalinan presentasi bokong mempunyai peranan yang tinggi dalam terjadinya presentasi bokong.

4. Berat Badan Bayi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong ternyata paling banyak lahir dengan berat badan 2500

gram – 4000 gram yaitu 82 orang (71,30%) dan < 2500 gram dan > 4000 gram sebanyak 33 orang (28,70%).

Salah satu penyebab dari presentasi bokong ialah berat badan bayi yang relatif lebih kecil mengakibatkan bayi bebas bergerak yang dapat mengubah posisinya sendiri, biasanya pada usia kehamilan < 37 minggu karena jumlah air ketuban relatif banyak yang menyebabkan bayi bebas bergerak sampai usia kehamilan 37 minggu, apabila sampai usia kehamilan 37 minggu bayi masih dengan presentasi bokong maka hal tersebut sudah tidak bisa berubah karena air ketuban sudah mulai berkurang dan bagian terendah sudah masuk ke pintu atas panggul, pada usia kehamilan 37 minggu bayi sudah mempunyai berat berkisar antara 2500 – 4000 gram, sehingga bayi dengan persalinan presentasi bokong banyak yang memiliki berat 2500 – 400 gram.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran kejadian persalinan presentasi bokong di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dari Januari – Desember 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan paritas, lebih banyak terjadi pada paritas > 2 sebanyak 65 orang (56,50%).
2. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan umur kehamilan, lebih banyak terjadi pada umur kehamilan 37 minggu – 42 minggu sebanyak 103 orang (89,56%).
3. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan riwayat kehamilan kembar, lebih banyak yang tidak mengalami kehamilan kembar sebanyak 107 orang (93,04%).
4. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan berat badan lahir, lebih banyak yang lahir dengan berat badan 2500 gram – 4000 gram sebanyak 82 orang (71,30%).

B. Saran

1. Diharapkan kepada ibu hamil untuk memperhatikan kehamilannya dengan memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilan yaitu 1 kali pada trimester I dan II dan 2 kali pada trimester III untuk mengontrol keadaan ibu dan janinnya.

2. Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terutama ibu-ibu hamil sehingga komplikasi-komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifas termasuk kelainan presentasi seperti presentasi bokong dapat dideteksi lebih dini.
3. Diharapkan kepada instansi terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail: 1987, *Shahih al-Bukhari*, Cet. Ketiga, Dar Ibnu Katsir, Bairut Lebanon.
- Andriani.R, 2009, *Faktir Penyebab Kelahiran Sungsang*, <http://resi.adriani.com>) diakses tanggal 25 maret 2010.
- Boile.M: 2008, *Kelainan Posisi dan Presentasi, Kedaruratan Dalam Persalinan*, cetakan pertama, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Chapman.V: 2006, *Kelahiran Sungsang, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*, cetakan pertama, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Departemen Agama.RI: 2002, *Al-Qurran dan Terjemahannya*, DEPAG, Jakarta
- Diyoyen, 2008, *Cara Persalinan Sungsang*, <http://diyoyen.blog.com>.) diakses tanggal 20 maret 2010.
- Fischer.R, 2006, *Penyebab Terjadinya Sungsang*, [http://www.CBN Portal.com](http://www.CBNPortal.com)) diakses tanggal 30 maret 2010
- Hegar.B, 2009, *Angka Kematian Bayi*, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 05 april 2010
- Klein.S dan Thompsom.F: 2008, *Mendorong Tahap 2 Presalinan, Panduan Lengkap Kebidanan*, cetakan ketiga, Palmal, Yogyakarta
- Liu.D.T.Y: 2008, *Presentasi Bokong, Manual Persalinan*, edisi ketiga, cetakan pertama, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Manuaba.I.B.G, dkk: 2008, *Persalinan Letak Sungsang, Gawat-Darurat Obstetri-Ginekologi dan Obstetri Ginekologi Sosial untuk Propesiu Bidan*, cetakan pertama, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Manuaba.I.B.G: 2004, *Obstetri Darurat, Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi*, cetakan pertama, edisi kedua, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Notoatmojo.S: 2005, *Teknik Pengambilan Sampel, Metode Penelitian Kesehatan*, cetakan ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Propil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan: 2009, *Situasi Status Kesehatan, Informasi Capaian Program Bidang Kesehatan di Sulawesi Selatan 2008*, Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar

Ridha, Muhammad Rasyid: 1990, *Tafsir al-Manar*, al-Haiyah al-Mishriyah, Mesir

Sastraswinata.S: 2005, *Distosia Karena Kelainan Presentasi, Posisi atau Kelainan Janin, Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi*, edisi kedua, cetakan pertama, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Shihab, M. Quraish: 2009, *Tafsir al-Mishbah*, edisi pertama, cet. pertama, Lentera Hati, Jakarta.

Sumarah, dkk, 2008: *Deteksi Komplikasi dan Penyulit Kala II dan Cara Mengatasi, Perawatan Ibu Bersalin*, cetakan kedua, Fitramaya, Yogyakarta

Wiknjosastro.H: 2007, *Distosia Karena Kelainan Letak dan Bentuk Janin, Ilmu Kebidanan*, edisi ketiga cetakan kesembilan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta

Wiknjosastro.H: 2007, *Persalinan Sungsang, Ilmu Bedah Kebidanan*, edisi pertama, cetakan ketujuh, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai kejadian persalinan presentasi bokong dari Januari – Desember 2009 dilaksanakan dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar pada bulan Juli 2010.

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan data di Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar dan diperoleh jumlah persalinan sebanyak 3705 orang dan jumlah persalinan presentasi bokong sebanyak 115 orang, yang diolah dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 5. 1

Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Paritas
Di rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
Januari – Desember 2009

Paritas	Jumlah	%
1 – 3	94	81,73
> 3	21	18,27
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 5. 1 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, paritas 1 – 3 sebanyak 94 orang (81,73%) lebih banyak terjadi persalinan presentasi bokong.

Tabel 5. 2
 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Umur Kehamilan
 Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
 Januari – Desember 2009

Umur Kehamilan	Jumlah	%
< 37 minggu dan > 42 minggu	12	10,34
37 minggu – 42 minggu	103	89,56
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 5. 2 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, pada umur kehamilan 37 minggu – 42 minggu sebanyak 103 orang (89,56%) lebih banyak terjadi persalinan presentasi bokong.

Tabel 5. 3
 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Riwayat Kehamilan Kembar
 Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
 Januari – Desember 2009

Riwayat Kehamilan Kembar	Jumlah	%
Ya	8	6,96
Tidak	107	93,04
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 5. 3 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, lebih banyak yang tidak mengalami kehamilan kembar 107 orang (93,04%).

Tabel 5. 4
 Distribusi Persalinan Presentasi Bokong Menurut Berat Badan Bayi
 Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar
 Januari – Desember 2009

Berat Badan Byi	Jumlah	%
< 2500 gram dan > 4000 gram	33	28,70
2500 gram – 4000 gram	82	71,30
Jumlah	115	100

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 5. 4 menunjukkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong, bayi yang lahir dengan presentasi bokong lebih banyak mempunyai berat badan 2500 gram dan – 4000 gram sebanyak 82 orang (71,30%)

B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data, berikut disajikan pembahasan hasil penelitian :

1. Paritas

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari persalinan presentasi bokong lebih banyak pada paritas 1 – 3 yaitu sebanyak 94 orang (81,73%), sedangkan paritas > 3 hanya 21 orang (18,27%). Ibu dengan multiparitas memungkinkan terjadinya persalinan presentasi bokong dikarenakan otot-otot uterus yang elastis sehingga memudahkan bayi dapat leluasa bergerak. Dan diketahui bahwa salah satu penyebab dari persalinan presentasi bokong ialah multiparitas, multiparitas memiliki peranan yang tinggi dalam

terjadinya presentasi bokong, uterus yang sudah mengalami perengangan beberapa kali yang mengakibatkan posisi bayi dapat berubah-ubah, sehingga ibu dengan paritas yang tinggi mempunyai peluang yang besar terjadinya persalinan presentasi bokong.

2. Umur Kehamilan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong lebih banyak pada umur kehamilan 37 minggu – 42 minggu yaitu sebanyak 103 orang (89,56%), sedangkan umur kehamilan < 37 minggu dan > 42 minggu sebanyak 12 orang (10,34%), pada persalinan dengan usia kehamilan < 37 minggu memungkinkan terjadinya persalinan presentasi bokong dikarenakan jumlah air ketuban relatif lebih banyak sehingga bayi dengan leluasa bisa berubah posisi dari kepala menjadi bokong, tetapi pada saat ibu belum mengalami persalinan dengan usia kehamilan 37 minggu biasanya pada proses kehamilan ibu kurang mengerti dengan penjelasan yang diberikan yaitu posisi bayi dapat berubah kembali apabila ibu sering melakukan posisi menungging beberapa kali setiap hari atau lebih gampang dengan posisi seperti sedang mengepel, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka banyak terjadi persalinan presentasi bokong pada usia kehamilan 37 – 42 minggu, karena apabila bayi dengan posisi bokong sampai usia kehamilan 37 minggu sudah tidak bisah berubah oleh kerana bagian terendah janin sudah masuk kedalam pintu atas panggul.

3. Kehamilan Kembar

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong hanya terdapat 8 orang (6,96%) yang mengalami kehamilan kembar dan yang tidak mengalami kehamilan kembar sebanyak 107 orang (93,04%). Pada ibu yang mengalami hamil kembar memungkinkan terjadinya persalinan presentasi bokong karena didalam uterus terdapat dua janin yang menyebabkan terjadinya perebutan posisi yang nyaman, ada kemungkinan bagian terbesar dari janin yaitu bokong berada pada bagian bawah uterus sehingga berpeluang terjadinya presentasi bokong, ibu dengan kehamilan kembar cenderung memiliki peluang terjadinya presentasi bokong tetapi tidak semua yang mengalami persalinan presentasi bokong dikarenakan oleh hamil kembar banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya presentasi bokong tetapi salah satunya adalah hamil kembar.

4. Berat Badan Bayi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 115 persalinan presentasi bokong ternyata paling banyak lahir dengan berat badan 2500 gram – 4000 gram yaitu 82 orang (71,30%) dan < 2500 gram dan > 4000 gram sebanyak 33 orang (28,70%), salah satu penyebab dari presentasi bokong ialah berat badan bayi yang relatif lebih kecil mengakibatkan bayi bebas bergerak yang dapat mengubah posisinya sendiri, biasanya pada usia kehamilan < 37 minggu karena jumlah air ketuban relatif banyak yang menyebabkan bayi bebas bergerak sampai usia kehamilan 37 minggu,

apabila sampai usia kehamilan 37 minggu bayi masih dengan presentasi bokong maka hal tersebut sudah tidak bisa berubah karena air ketuban sudah mulai berkurang dan bagian terendah sudah masuk ke pintu atas panggul, pada usia kehamilan 37 minggu bayi sudah mempunyai berat berkisar antara 2500 – 4000 gram, sehingga bayi dengan persalinan presentasi bokong banyak yang memiliki berat 2500 – 400 gram.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran kejadian persalinan presentasi bokong di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dari Januari – Desember 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan paritas, lebih banyak terjadi pada paritas 1 – 3 sebanyak 94 orang (81,73%).
2. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan umur kehamilan, lebih banyak terjadi pada umur kehamilan 37 minggu – 42 minggu sebanyak 103 orang (89,56%).
3. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan riwayat kehamilan kembar, lebih banyak yang tidak mengalami kehamilan kembar sebanyak 107 orang (93,04%).
4. Kejadian persalinan presentasi bokong berdasarkan berat badan lahir, lebih banyak yang lahir dengan berat badan 2500 gram – 4000 gram sebanyak 82 orang (71,30%).

B. Saran

1. Diharapkan kepada ibu hamil untuk memperhatikan kehamilannya dengan memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilan yaitu 1 kali

pada trimester I dan II dan 2 kali pada trimester III untuk mengontrol keadaan ibu dan janinnya.

2. Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terutama ibu-ibu hamil sehingga komplikasi-komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifas termasuk kelainan presentasi seperti presentasi bokong dapat dideteksi lebih dini.
3. Diharapkan kepada instansi terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.



MASTER TABEL

Data Persalinan Presentasi Bokong Berdasarkan Paritas, Umur Kehamilan, Hamil

Kembar dan Berat Badan Lahir Bayi Di Rumah Siti Fatimah Makassar

Periode Januari – Desember 2009

No	Nama	Paritas	Umur kehamilan	Hamil kembar	Berat badan bayi
1	Ny. S	I	Aterm		2300
2	Ny. H	II	Aterm		3000
3	Ny. R	I	Aterm	Kembar	2200
4	Ny. S	II	Preterm		900
5	Ny. S	I	Preterm	Kembar	750
6	Ny. N	I	Aterm		2800
7	Ny. M	II	Aterm		2500
8	Ny. S	I	Aterm		2850
9	Ny. S	I	Preterm		750
10	Ny. A	I	Aterm		2500
11	Ny. M	III	Aterm		2500
12	Ny. A	I	Preterm		750
13	Ny. K	II	serotinus		2800
14	Ny. I	VI	Aterm		2500
15	Ny. A	I	Aterm		2900

16	Ny. H	III	Aterm		2400
17	Ny. K	I	Aterm		3100
18	Ny. Y	I	Aterm		2250
19	Ny. R	IV	Aterm		3450
20	Ny. F	II	Aterm		2600
21	Ny. F	III	Aterm	Kembar	1800
22	Ny. C	VI	Aterm	Kembar	2300
23	Ny. N	I	Aterm		2300
24	Ny. R	I	Aterm		2100
25	Ny. L	I	Preterm		800
26	Ny. S	I	Aterm	Kembar	1600
27	Ny. H	I	Aterm		2500
28	Ny. R	III	Aterm		2900
29	Ny. S	VI	Aterm		2500
30	Ny. E	IV	Aterm		3600
31	Ny. V	I	serotinus		2700
32	Ny. E	IV	Aterm		2500
33	Ny. F	III	Aterm		3000
34	Ny. G	III	Aterm	Kembar	2800
35	Ny. N	II	Aterm		3100
36	Ny. R	I	Aterm		2000
37	Ny. B	I	Aterm		2500

38	Ny. S	II	Aterm		2050
39	Ny. H	I	Aterm		2400
40	Ny. R	IV	Aterm		2810
41	Ny. A	I	Preterm		1900
42	Ny. S	I	Aterm		2900
43	Ny. A	III	Aterm		2800
44	Ny. R	I	Aterm		3350
45	Ny. M	I	Aterm		3500
46	Ny. I	I	Aterm	Kembar	2700
47	Ny. S	II	Aterm		3000
48	Ny. S	I	Aterm		3600
49	Ny. A	II	Aterm		2500
50	Ny. I	II	Aterm		3200
51	Ny. R	VII	Aterm		2500
52	Ny. R	IV	Aterm		3150
53	Ny. I	III	Aterm		3700
54	Ny. R	V	Aterm		2200
55	Ny. N	IV	Aterm		3000
56	Ny. H	VI	Aterm		2000
57	Ny. H	I	Aterm		2400
58	Ny. N	II	Aterm		2800
59	Ny. H	IV	Aterm		3000

60	Ny. R	I	Aterm		1900
61	Ny.f	II	Aterm	Kembar	2300
62	Ny. I	I	Aterm		2700
63	Ny.m	I	Aterm		2500
64	Ny. H	VII	serotinus		2650
65	Ny. N	V	Aterm		3250
66	Ny. A	III	Aterm		3150
67	Ny. G	V	Aterm		2700
68	Ny. S	III	Preterm		3000
69	Ny. H	I	serotinus		2900
70	Ny. P	I	Aterm		900
71	Ny. D	III	Aterm		2500
72	Ny. R	I	Preterm		2900
73	Ny. K	III	Aterm		1600
74	Ny. A	II	Aterm		2500
75	Ny. Y	IV	Aterm		2000
76	Ny. N	I	Aterm		2500
77	Ny. Y	I	Preterm		1900
78	Ny. R	II	Aterm		4150
79	Ny. N	II	Aterm		2300
80	Ny. D	IV	Aterm		3100
81	Ny. L	I	Aterm		2600

82	Ny. S	II	Aterm		2000
83	Ny. K	III	Aterm		3350
84	Ny. S	IV	Aterm		3750
85	Ny. A	I	Aterm		2800
86	Ny. A	II	Aterm		3300
87	Ny. M	IV	Aterm		2150
88	Ny. B	III	Aterm		3000
89	Ny. E	III	Aterm		2700
90	Ny. F	I	Aterm		2750
91	Ny. H	I	Aterm		2450
92	Ny. S	I	Aterm		3250
93	Ny. A	II	Aterm		3000
94	Ny. N	II	Aetrm		3700
95	Ny. M	III	Aterm		3600
96	Ny. F	II	Aterm		3500
97	Ny. H	II	Aterm		2350
98	Ny. R	I	Aterm		3100
99	Ny. K	I	Aterm		2500
100	Ny. D	I	Aterm		3200
101	Ny. M	I	Aterm		2850
102	Ny. K	II	Aterm		2500
103	Ny. R	III	Aterm		2500

104	Ny. K	II	Aterm		2900
105	Ny. S	I	Aterm		2900
106	Ny. R	III	Aterm		2600
107	Ny. R	I	Aterm		3000
108	Ny. S	I	Aterm		2300
109	Ny. H	II	Aterm		2500
110	Ny. D	III	Aterm		2900
111	Ny. S	II	Aterm		3100
112	Ny. S	IV	Aterm		4750
113	Ny. R	I	Aterm		3100
114	Ny. M	I	Aterm		2800
115	Ny. H	I	Aterm		3200

Data Persalinan Presentasi Bokong Berdasarkan Paritas

Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Periode Januari – Desember 2009

No	Nama	Paritas		klasifikasi	
		1 orang	> 2 orang	rendah	tinggi
1	Ny. S	✓		✓	
2	Ny. H		✓		✓
3	Ny. R	✓		✓	
4	Ny. S		✓		✓
5	Ny. S	✓		✓	
6	Ny. N	✓		✓	
7	Ny. M		✓		✓
8	Ny. S	✓		✓	
9	Ny. S	✓		✓	
10	Ny. A	✓		✓	
11	Ny. M		✓		✓
12	Ny. A	✓		✓	
13	Ny. K		✓		✓
14	Ny. I		✓		✓
15	Ny. A	✓		✓	
16	Ny. H		✓		✓
17	Ny. K	✓		✓	


18	Ny. Y	✓		✓	
19	Ny. R		✓		✓
20	Ny. F		✓		✓
21	Ny. F		✓		✓
22	Ny. C		✓		✓
23	Ny. N	✓		✓	
24	Ny. R	✓		✓	
25	Ny. L	✓		✓	
26	Ny. S	✓		✓	
27	Ny. H	✓		✓	
28	Ny. R		✓		✓
29	Ny. S		✓		✓
30	Ny. E		✓		✓
31	Ny. V	✓		✓	
32	Ny. E		✓		✓
33	Ny. F		✓		✓
34	Ny. G		✓		✓
35	Ny. N		✓		✓
36	Ny. R	✓		✓	
37	Ny. B	✓		✓	
38	Ny. S		✓		✓
39	Ny. H	✓		✓	
40	Ny. R		✓		✓

41	Ny. A	✓		✓	
42	Ny. S	✓	✓	✓	✓
43	Ny. A				
44	Ny. R	✓		✓	
45	Ny. M	✓		✓	
46	Ny. I	✓	✓	✓	✓
47	Ny. S				
48	Ny. S	✓	✓	✓	✓
49	Ny. A		✓		✓
50	Ny. I		✓		✓
51	Ny. R		✓		✓
52	Ny. R		✓		✓
53	Ny. I		✓		✓
54	Ny. R		✓		✓
55	Ny. N		✓		✓
56	Ny. H		✓		✓
57	Ny. H	✓		✓	
58	Ny. N		✓		✓
59	Ny. H		✓		✓
60	Ny. R	✓		✓	
61	Ny. F		✓		✓
62	Ny. I	✓		✓	
63	Ny. M	✓	✓	✓	✓

64	Ny. H		✓		✓
65	Ny. H		✓		✓
66	Ny. A		✓		✓
67	Ny. G		✓		✓
68	Ny. S				
69	Ny. H	✓		✓	
70	Ny. P	✓	✓	✓	✓
71	Ny. D				
72	Ny. R	✓	✓	✓	✓
73	Ny. K		✓		✓
74	Ny. A		✓		✓
75	Ny. Y				
76	Ny. H	✓		✓	
77	Ny. Y	✓	✓	✓	✓
78	Ny. R		✓		✓
79	Ny. N		✓		✓
80	Ny. D				
81	Ny. L	✓	✓	✓	✓
82	Ny. S		✓		✓
83	Ny. K		✓		✓
84	Ny. S				
85	Ny. A	✓	✓	✓	✓
86	Ny. A		✓		✓

87	Ny. M		✓		✓
88	Ny. B		✓		✓
89	Ny. E				
90	Ny. F	✓		✓	
91	Ny. H	✓		✓	
92	Ny. S	✓	✓	✓	✓
93	Ny. A		✓		✓
94	Ny. N		✓		✓
95	Ny. M		✓		✓
96	Ny. F		✓		✓
97	Ny. H				
98	Ny. R	✓		✓	
99	Ny. K	✓		✓	
100	Ny. D	✓		✓	
101	Ny. M	✓	✓	✓	✓
102	Ny. K		✓		✓
103	Ny. R		✓		✓
104	Ny. K				
105	Ny. S	✓	✓	✓	✓
106	Ny. R				
107	Ny. R	✓		✓	
108	Ny. S	✓	✓	✓	✓
109	Ny. H		✓		✓

110	Ny. D		✓		✓
111	Ny. S		✓		✓
112	Ny. S				
113	Ny. R	✓		✓	
114	Ny. M	✓		✓	
115	Ny. H	✓		✓	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Data Persalinan Presentasi Bokong Berdasarkan Umur Kehamilan

Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Periode Januari – Desember 2009

No	Nama	Umur Kehamilan		klasifikasi	
		< 37 & > 42 minggu	37 – 42 minggu	rendah	tinggi
1	Ny. S		✓	✓	
2	Ny. H		✓	✓	
3	Ny. R		✓	✓	
4	Ny. S	✓			✓
5	Ny. S	✓			✓
6	Ny. N		✓	✓	
7	Ny. M		✓	✓	
8	Ny. S		✓	✓	
9	Ny. S	✓			✓
10	Ny. A		✓	✓	
11	Ny. M		✓	✓	
12	Ny. A	✓			✓
13	Ny. K	✓			✓
14	Ny. I		✓	✓	
15	Ny. A		✓	✓	
16	Ny. H		✓	✓	
17	Ny. K		✓	✓	


18	Ny. Y		✓	✓	
19	Ny. R		✓	✓	
20	Ny. F		✓	✓	
21	Ny. F		✓	✓	
22	Ny. C		✓	✓	
23	Ny. N		✓	✓	
24	Ny. R		✓	✓	
25	Ny. L	✓			✓
26	Ny. S		✓	✓	
27	Ny. H		✓	✓	
28	Ny. R		✓	✓	
29	Ny. S		✓	✓	
30	Ny. E		✓	✓	
31	Ny. V	✓			✓
32	Ny. E		✓	✓	
33	Ny. F		✓	✓	
34	Ny. G		✓	✓	
35	Ny. N		✓	✓	
36	Ny. R		✓	✓	
37	Ny. B		✓	✓	
38	Ny. S		✓	✓	
39	Ny. H		✓	✓	
40	Ny. R		✓	✓	

41	Ny. A	✓			✓
42	Ny. S		✓	✓	
43	Ny. A		✓	✓	
44	Ny. R		✓	✓	
45	Ny. M		✓	✓	
46	Ny. I		✓	✓	
47	Ny. S		✓	✓	
48	Ny. S		✓	✓	
49	Ny. A		✓	✓	
50	Ny. I		✓	✓	
51	Ny. R		✓	✓	
52	Ny. R		✓	✓	
53	Ny. I		✓	✓	
54	Ny. R		✓	✓	
55	Ny. N		✓	✓	
56	Ny. H		✓	✓	
57	Ny. H		✓	✓	
58	Ny. N		✓	✓	
59	Ny. H		✓	✓	
60	Ny. R		✓	✓	
61	Ny. F		✓	✓	
62	Ny. I		✓	✓	
63	Ny. M		✓	✓	

64	Ny. H	✓			✓
65	Ny. H			✓	✓
66	Ny. A			✓	✓
67	Ny. G			✓	✓
68	Ny. S			✓	✓
69	Ny. H	✓			✓
70	Ny. P	✓			✓
71	Ny. D			✓	✓
72	Ny. R			✓	✓
73	Ny. K	✓			✓
74	Ny. A			✓	✓
75	Ny. Y			✓	✓
76	Ny. H			✓	✓
77	Ny. Y			✓	✓
78	Ny. R			✓	✓
79	Ny. N			✓	✓
80	Ny. D			✓	✓
81	Ny. L			✓	✓
82	Ny. S			✓	✓
83	Ny. K			✓	✓
84	Ny. S			✓	✓
85	Ny. A			✓	✓
86	Ny. A			✓	✓

87	Ny. M		✓	✓	
88	Ny. B		✓	✓	
89	Ny. E		✓	✓	
90	Ny. F		✓	✓	
91	Ny. H		✓	✓	
92	Ny. S		✓	✓	
93	Ny. A		✓	✓	
94	Ny. N		✓	✓	
95	Ny. M		✓	✓	
96	Ny. F		✓	✓	
97	Ny. H		✓	✓	
98	Ny. R		✓	✓	
99	Ny. K		✓	✓	
100	Ny. D		✓	✓	
101	Ny. M		✓	✓	
102	Ny. K		✓	✓	
103	Ny. R		✓	✓	
104	Ny. K		✓	✓	
105	Ny. S		✓	✓	
106	Ny. R		✓	✓	
107	Ny. R		✓	✓	
108	Ny. S		✓	✓	
109	Ny. H		✓	✓	

110	Ny. D		✓	✓	
111	Ny. S		✓	✓	
112	Ny. S		✓	✓	
113	Ny. R				
114	Ny. M		✓	✓	
115	Ny. H		✓	✓	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Data Persalinan Presentasi Bokong Berdasarkan Riwayat Kehamilan Kembar

Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Periode Januari – Desember 2009

No	Nama	Riwayat Kehamil Kembar		klasifikasi	
		Ya	tidak	rendah	tinggi
1	Ny. S		✓	✓	
2	Ny. H		✓	✓	
3	Ny. R	✓			✓
4	Ny. S		✓	✓	
5	Ny. S	✓			✓
6	Ny. N		✓	✓	
7	Ny. M		✓	✓	
8	Ny. S		✓	✓	
9	Ny. S		✓	✓	
10	Ny. A		✓	✓	
11	Ny. M		✓	✓	
12	Ny. A		✓	✓	
13	Ny. K		✓	✓	
14	Ny. I		✓	✓	
15	Ny. A		✓	✓	
16	Ny. H		✓	✓	
17	Ny. K		✓	✓	


18	Ny. Y		✓	✓	
19	Ny. R		✓	✓	
20	Ny. F		✓	✓	
21	Ny. F	✓			✓
22	Ny. C	✓			✓
23	Ny. N		✓	✓	
24	Ny. R		✓	✓	
25	Ny. L		✓	✓	
26	Ny. S		✓	✓	
27	Ny. H		✓	✓	
28	Ny. R		✓	✓	
29	Ny. S		✓	✓	
30	Ny. E		✓	✓	
31	Ny. V		✓	✓	
32	Ny. E		✓	✓	
33	Ny. F		✓	✓	
34	Ny. G	✓			✓
35	Ny. N		✓	✓	
36	Ny. R		✓	✓	
37	Ny. B		✓	✓	
38	Ny. S		✓	✓	
39	Ny. H		✓	✓	
40	Ny. R		✓	✓	

41	Ny. A		✓	✓	
42	Ny. S		✓	✓	
43	Ny. A		✓	✓	
44	Ny. R		✓	✓	
45	Ny. M		✓	✓	
46	Ny. I	✓			✓
47	Ny. S		✓	✓	
48	Ny. S		✓	✓	
49	Ny. A		✓	✓	
50	Ny. I		✓	✓	
51	Ny. R		✓	✓	
52	Ny. R		✓	✓	
53	Ny. I		✓	✓	
54	Ny. R		✓	✓	
55	Ny. N		✓	✓	
56	Ny. H		✓	✓	
57	Ny. H		✓	✓	
58	Ny. N		✓	✓	
59	Ny. H		✓	✓	
60	Ny. R		✓	✓	
61	Ny. F	✓			✓
62	Ny. I		✓	✓	
63	Ny. M				

64	Ny. H		✓	✓	
65	Ny. H		✓	✓	
66	Ny. A		✓	✓	
67	Ny. G		✓	✓	
68	Ny. S		✓	✓	
69	Ny. H		✓	✓	
70	Ny. P		✓	✓	
71	Ny. D		✓	✓	
72	Ny. R		✓	✓	
73	Ny. K		✓	✓	
74	Ny. A		✓	✓	
75	Ny. Y		✓	✓	
76	Ny. H		✓	✓	
77	Ny. Y		✓	✓	
78	Ny. R		✓	✓	
79	Ny. N		✓	✓	
80	Ny. D		✓	✓	
81	Ny. L		✓	✓	
82	Ny. S		✓	✓	
83	Ny. K		✓	✓	
84	Ny. S		✓	✓	
85	Ny. A		✓	✓	
86	Ny. A		✓	✓	

87	Ny. M		✓	✓	
88	Ny. B		✓	✓	
89	Ny. E		✓	✓	
90	Ny. F		✓	✓	
91	Ny. H		✓	✓	
92	Ny. S		✓	✓	
93	Ny. A		✓	✓	
94	Ny. N		✓	✓	
95	Ny. M		✓	✓	
96	Ny. F		✓	✓	
97	Ny. H		✓	✓	
98	Ny. R		✓	✓	
99	Ny. K		✓	✓	
100	Ny. D		✓	✓	
101	Ny. M		✓	✓	
102	Ny. K		✓	✓	
103	Ny. R		✓	✓	
104	Ny. K		✓	✓	
105	Ny. S		✓	✓	
106	Ny. R		✓	✓	
107	Ny. R		✓	✓	
108	Ny. S		✓	✓	
109	Ny. H		✓	✓	

110	Ny. D		✓	✓	
111	Ny. S		✓	✓	
112	Ny. S		✓	✓	
113	Ny. R		✓	✓	
114	Ny. M		✓	✓	
115	Ny. H		✓	✓	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Data Persalinan Presentasi Bokong Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi

Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Periode Januari – Desember 2009

No	Nama	Berat Badan Lahir		klasifikasi	
		< 2500 & > 4000 gram	2500 – 4000 gram	rendah	tinggi
1	Ny. S	✓			✓
2	Ny. H		✓	✓	
3	Ny. R	✓			✓
4	Ny. S	✓			✓
5	Ny. S	✓			✓
6	Ny. N		✓	✓	
7	Ny. M		✓	✓	
8	Ny. S		✓	✓	
9	Ny. S	✓			✓
10	Ny. A		✓	✓	
11	Ny. M		✓	✓	
12	Ny. A	✓			✓
13	Ny. K		✓	✓	
14	Ny. I		✓	✓	
15	Ny. A		✓	✓	
16	Ny. H	✓			✓
17	Ny. K		✓	✓	


18	Ny. Y	✓			✓
19	Ny. R		✓	✓	
20	Ny. F		✓	✓	
21	Ny. F	✓			✓
22	Ny. C	✓			✓
23	Ny. N	✓			✓
24	Ny. R	✓			✓
25	Ny. L	✓			✓
26	Ny. S	✓			✓
27	Ny. H		✓	✓	
28	Ny. R		✓	✓	
29	Ny. S		✓	✓	
30	Ny. E		✓	✓	
31	Ny. V		✓	✓	
32	Ny. E		✓	✓	
33	Ny. F		✓	✓	
34	Ny. G		✓	✓	
35	Ny. N		✓	✓	
36	Ny. R	✓			✓
37	Ny. B		✓	✓	
38	Ny. S	✓			✓
39	Ny. H	✓			✓
40	Ny. R		✓	✓	

41	Ny. A	✓			✓
42	Ny. S			✓	✓
43	Ny. A			✓	✓
44	Ny. R			✓	✓
45	Ny. M			✓	✓
46	Ny. I			✓	✓
47	Ny. S			✓	✓
48	Ny. S			✓	✓
49	Ny. A			✓	✓
50	Ny. I			✓	✓
51	Ny. R			✓	✓
52	Ny. R			✓	✓
53	Ny. I			✓	✓
54	Ny. R	✓			✓
55	Ny. N			✓	✓
56	Ny. H	✓			✓
57	Ny. H	✓			✓
58	Ny. N			✓	✓
59	Ny. H			✓	✓
60	Ny. R	✓			✓
61	Ny. F	✓			✓
62	Ny. I			✓	✓
63	Ny. M			✓	✓

64	Ny. H		✓	✓	
65	Ny. H		✓	✓	
66	Ny. A		✓	✓	
67	Ny. G		✓	✓	
68	Ny. S		✓	✓	
69	Ny. H		✓	✓	
70	Ny. P	✓			✓
71	Ny. D		✓	✓	
72	Ny. R		✓	✓	
73	Ny. K	✓			✓
74	Ny. A		✓	✓	
75	Ny. Y	✓			✓
76	Ny. H		✓	✓	
77	Ny. Y	✓			✓
78	Ny. R		✓	✓	
79	Ny. N		✓	✓	
80	Ny. D		✓	✓	
81	Ny. L		✓	✓	
82	Ny. S	✓			✓
83	Ny. K		✓	✓	
84	Ny. S		✓	✓	
85	Ny. A		✓	✓	
86	Ny. A		✓	✓	

87	Ny. M	✓			✓
88	Ny. B			✓	
89	Ny. E	✓			✓
90	Ny. F			✓	
91	Ny. H			✓	
92	Ny. S			✓	
93	Ny. A			✓	
94	Ny. N			✓	
95	Ny. M			✓	
96	Ny. F			✓	
97	Ny. H	✓			✓
98	Ny. R			✓	
99	Ny. K			✓	
100	Ny. D			✓	
101	Ny. M			✓	
102	Ny. K			✓	
103	Ny. R			✓	
104	Ny. K			✓	
105	Ny. S			✓	
106	Ny. R			✓	
107	Ny. R			✓	
108	Ny. S	✓			✓
109	Ny. H			✓	

110	Ny. D		✓	✓	
111	Ny. S		✓	✓	
112	Ny. S		✓	✓	
113	Ny. R		✓	✓	
114	Ny. M		✓	✓	
115	Ny. H		✓	✓	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R