

PENGARUH PEMBERIAN BISKUIT UBI JALAR UNGU (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK SEKOLAH USIA 7-9 TAHUN DI SD INPRES BORONG JAMBU III KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

OLEH

MUSDALIPA
70200113124

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalipa
NIM : 70200113124
Tempat/Tgl Lahir : Tanah Batue/ 16 November 1995
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/ Gizi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Tamangapa Raya 3
Judul : Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (Ipomea Batatas L. Poiret) Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun di Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata-Gowa, Januari 2018

Penyusun,

Musdalipa
NIM 70200113124

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017." yang disusun oleh Musdalipa, NIM : 70200113124, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Januari 2018 bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 23 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Syarfaini, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 1983121001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji hanyalah milik Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk ummat yang mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H. Mustamin dan Ibunda Hj. Siara telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta saudara-saudaraku M-FIVE yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. DR. H. Musafir Pababbari, M.Hi, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak DR. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Bapak Azriful, SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Syarfaini, SKM.,M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Irviani A. Ibrahim, SKM.,M.Kes Selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Santy Damayanti, SKM.,M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam

proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala Sekolah, Guru-guru, dan orangtua siswa SD Inpres Borong Jambu III yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian di SD Inpres Borong Jambu III.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Ummul Faisah, Gusriani, Ayu Puspitasari, Rika Rahayu dan Kasming atas segala bantuan dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar peminatan Gizi Angkatan 2013, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya khususnya pada tim penelitian biskuit ubi jalar ungu Amriani, SKM dan Nur Muslimah, SKM.
10. Teman-teman seperjuangan “DIMENSION” angkatan 2013 yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis dari awal menempuh pendidikan di Universitas hingga penyelesaian skripsi ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semua.

Samata-Gowa, Januari 2018

Penulis

Musdalipa
NIM 70200113124

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis Penelitian	5
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Sekolah	23
C. Tinjauan Umum Tentang Ubi Jalar Ungu.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Tepung Ubi Jalar Ungu.....	36

E. Tinjauan Umum Tentang Biskuit.....	39
F. Hasil Uji Laboratorium Biskuit Ubi Jalar Ungu	40
G. Kerangka Teori	41
H. Kerangka Konsep.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Instrumen Penelitian	46
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen.....	48
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
2. Hasil Analisis	58
B. Pembahasan.....	67
1. Asupan Energi.....	68
2. Asupan Protein.....	72
3. Asupan Vitamin C.....	75
4. Asupan Zat Besi	78
5. Berat Badan.....	81
6. Status Gizi	83
C. Keterbatasan Penelitian.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 91**LAMPIRAN..... 96****RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB, Standar Baku Antropometri WHO-2005.....	18
Tabel 2.2	Angka Kecukupan Energi, Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin C dan Besi yang dianjurkan Anak Sekolah.....	27
Tabel 2.3	Klarifikasi Ubi Jalar Ungu (<i>Ipomoea Batatas L. Poir.</i>).....	31
Tabel 2.4	Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Varietas Antin-1	34
Tabel 2.5	Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Varietas Antin-2	34
Tabel 2.6	Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Varietas Antin-3	34
Tabel 2.7	Kandungan Gizi Tepung Ubi Jalar Ungu dalam 100 gram.....	38
Tabel 2.8	Hasil Pemeriksaan Kandungan Zat Gizi Biskuit Ubi Jalar Ungu dalam Per 100 gram	40
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	53
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	54
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	55

Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	56
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	57
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Vitamin C, Zat Besi, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	58
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Vitamin C, Zat Besi, Berat Badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017.....	59
Tabel 4.8	Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017.....	40
Tabel 4.9	Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	61

Tabel 4.10	Rata-rata Perubahan Vitamin C Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	62
Tabel 4.11	Rata-rata Perubahan Zat Besi Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	63
Tabel 4.12	Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	65
Tabel 4.13	Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ubi Jalar Ungu Varietas Antin 1-3 35



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum dan Setelah Intervensi.....	69
Grafik 4.2	Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi.....	74
Grafik 4.3	Grafik Perubahan Asupan Vitamin C Sebelum dan Setelah Intervensi.....	76
Grafik 4.4	Grafik Perubahan Asupan Zat Besi Sebelum dan Setelah Intervensi.....	78
Grafik 4.5	Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum dan Setelah Intervensi.....	82
Grafik 4.6	Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum dan Setelah Intervensi.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Formulir Food Recall 24 Jam
- Lampiran 3 Form Data Pengukuran Antropometri
- Lampiran 4 Form Pemantauan Konsumsi Biskuit Ubi Jalar Ungu
- Lampiran 5 Form Pemantauan Konsumsi Biskuit Tepung Terigu
- Lampiran 6 Foto Hasil *Food Recall 24 jam* Melalui Aplikasi Nutri Survey 2007
- Lampiran 7 Kandungan Gizi Biskuit Ubi Jalar Ungu Dan Biskuit Tepung Terigu Dalam 100 Gram
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Hasil Pemantauan Konsumsi Prodak Biskuit Ubi Jalar Ungu
- Lampiran 10 Hasil Pemantauan Konsumsi Prodak Biskuit Tepung Terigu
- Lampiran 11 Hasil Analisis SPSS
- Lampiran 12 Hasil Recall 24 Jam Kelompok I (Intervensi)
Hasil Recall 24 Jam Kelompok II (Kontrol)
- Lampiran 13 Data Berat Badan Dan Status Gizi Kelompok I (Intervensi)
Data Berat Badan Dan Status Gizi Kelompok II (Kontrol)

ABSTRAK**Nama : MUSDALIPA****NIM : 70200113124****Judul : Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (*Ipomea Batatas L. Poiret*) terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017**

Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein merupakan salah satu kejadian malnutrisi yang umumnya terjadi pada anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun di SD Inpres Borong Jambu III. Penelitian ini merupakan penelitian *kuantitatif lapangan* dengan desain *non randomized pre-post control* design melalui pendekatan *quasi eksperimental*. Jumlah sampel sebanyak 36 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh asupan energi pada kelompok I (intervensi) ($p=0.000$) dan kelompok II (kontrol) ($p=0.000$). Tidak ada pengaruh asupan protein pada kelompok I (intervensi) ($p=0.501$) dan ($p=0.395$) pada kelompok II (kontrol). Tidak ada pengaruh vitamin C pada kelompok I (intervensi) ($p=0.855$) dan ($p=0.221$) pada kelompok II (kontrol). Ada pengaruh zat besi pada kelompok I (intervensi) ($p=0.035$) dan ($p=0.049$) pada kelompok II (kontrol). Ada pengaruh berat badan pada kelompok I (intervensi) ($p=0.002$) dan kelompok II (kontrol) ($p=0.052$). Ada pengaruh status gizi pada kelompok I (intervensi) ($p=0.020$) dan tidak ada pengaruh pada kelompok II (kontrol) ($p=0.111$). Pemberian intervensi biskuit ubi jalar ungu dan biskuit tepung terigu selama 30 hari belum mampu mengubah status gizi (BB/U) anak sekolah gizi kurang selama 30 hari ditandai dengan rata-rata nilai Zscorenya masih berada pada angka <-2 SD menandakan anak sekolah masih berada pada kategori gizi kurang, maka orangtua harus lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak mereka sehingga kualitas gizi pada anak menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Gizi Kurang, anak sekolah usia 7-9 tahun, biskuit ubi jalar ungu, biskuit tepung terigu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia sekolah merupakan fase yang sangat penting dalam pertumbuhan. Periode anak usia sekolah ini disebut juga dengan istilah *latency* yaitu periode dimana proses pertumbuhan berlanjut dari masa balita, namun dengan efek pertumbuhan yang tidak sebesar pada periode sebelumnya. Pada fase ini, tubuh dengan optimal menyimpan cadangan nutrisi yang diperlukan anak pada fase pubertas nantinya (Akhmadi, 2009 dalam Melisa dkk 2012).

Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat membutuhkan gizi yang cukup agar tidak terjadi penyimpangan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Gizi yang kurang juga akan membuat sistem imun pada anak menjadi lemah sehingga anak dapat dengan mudah mengalami penyakit infeksi serta ketidakseimbangan antara asupan dan kecukupan gizi yang akan menimbulkan masalah gizi, baik itu gizi lebih ataupun gizi kurang (Seprianty dkk, 2015:130).

Status gizi anak sekolah diukur berdasarkan umur (U), berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih yang didasarkan pada indikator berat badan menurut umur (BB/U). Status gizi berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) dinyatakan dalam tinggi badan normal, pendek, dan sangat pendek. Indikator lain yang dipakai untuk menilai status gizi anak adalah berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), indikator ini menyatakan kurus, sangat kurus, dan gemuk (Almatsier dkk, 2011).

Anak kelompok usia sekolah (6 – 12 tahun) termasuk salah satu kelompok yang rentan mengalami masalah gizi yaitu kekurangan energi protein. Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan sekitar 44,4 % anak sekolah, tingkat konsumsi energinya kurang dari 70 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sebanyak 59,7 % anak usia sekolah tingkat konsumsi proteinnya kurang dari 80 % berdasarkan AKG.

Berdasarkan data Riskesdas 2007, prevalensi kurus menunjukkan bahwa 10,9 % sampai 13,3% pada anak usia sekolah umur 6-14 tahun menurut jenis kelamin dan provinsi di Indonesia yaitu pada laki-laki sebesar 13,3% dan perempuan 10,9%. Sedangkan data Riskesdas 2010, status gizi umur 6-12 tahun (IMT/U) di Indonesia, yaitu prevalensi kurus adalah 12,2%, terdiri dari 4,6 % sangat kurus, dan 7,6% kurus. Serta data Riskesdas 2013, menurut indeks massa tubuh/umur (IMT/U) di Indonesia, yaitu prevalensi kurus adalah 11,2%, terdiri dari 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus.

Bila dilihat dari konsumsi energi dan protein, secara nasional persentase rumah tangga dengan konsumsi “energi rendah” sebesar 59,0% dan konsumsi “protein rendah” sebesar 58,5%. Di provinsi Sulawesi Selatan, status gizi penduduk usia 6-14 tahun kategori kurus adalah laki-laki 15,5% dan perempuan 13,4%, lebih tinggi di atas prevalensi nasional, dan termasuk pula di antara 21 provinsi dengan persentase konsumsi “energi dan protein rendah” lebih tinggi di atas angka nasional, yaitu sebanyak 71,7% dan 61,7% (Data Riskesdas 2007).

Serta pengambilan data awal yang dilakukan di SD Inpres Borong Jambu III pada tahun 2017 dengan mengambil 302 sampel terdapat 69 orang (22,8%)

yang mengalami gizi kurang, normal sebanyak 221 orang (73,2%), dan gizi buruk sebanyak 1 orang (3,0%), dan gizi lebih sebanyak 11 orang (3,6%).

Pada penelitian ini jenis ubi jalar ungu yang digunakan adalah ubi jalar ungu varietas antin-3 dikarenakan kandungan zat gizinya lebih tinggi dibandingkan varietas antin-1 dan antin-2. Kandungan gizi ubi jalar ungu varietas antin-3 150,7 mg antosianin, 1,1% serat, 18,2% pati, 0,4% gula reduksi, 0,6% protein dan 20,1 mg vitamin C (Balitbangtan, 2016).

Biskuit merupakan salah satu produk pangan olahan yang berbahan dasar tepung terigu. Menurut Wijaya (2010) biskuit adalah produk yang diperoleh dengan memanggang adonan dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lain dan dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Biskuit dapat dinikmati oleh semua kalangan umur mulai dari bayi sampai lansia dengan komposisi biskuit yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Biskuit mempunyai daya simpan lebih lama dan praktis dibawa sebagai bekal makanan yang sehat dan bergizi.

Adapun hasil uji zat gizi yang telah dilakukan sebelumnya pada biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*), dimana perbandingan yang telah digunakan adalah 1:1 dalam 100 gram biskuit ubi jalar ungu yaitu 15,59% karbohidrat, 4,95% protein, 29,76% lemak, 44,66 mg vitamin C, 0,103 mg zat besi (Fe) (Amriani, 2017).

Penelitian ini menggunakan ubi jalar ungu varietas antin-3 sebagai bahan dasar biskuit ubi jalar ungu dikarenakan kandungan zat gizinya yang tinggi, sebelumnya belum ada penelitian yang melakukan intervensi pemberian biskuit

ubi jalar ungu tersebut sebagai perbaikan status gizi kurang pada anak usia sekolah dasar.

Intervensi pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di SD Inpres Borong Jambu III akan dilakukan selama 30 hari dengan pemberian 5 keping biskuit ubi jalar ungu pada anak sekolah usia 7-9 tahun dalam 1 kali sehari. 1 keping biskuit ubi jalar ungu mengandung 12,4 kalori Karbohidrat, Protein 3,92 kalori dan Lemak 69.78 kalori.

Berdasarkan hal diatas peneliti akan meneliti “Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di SD Inpres Borong Jambu III” guna mengetahui apakah pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) pada anak memiliki pengaruh terhadap anak yang gizi kurang atau tidak berpengaruh terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di SD Inpres Borong Jambu III.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan “Apakah ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun di SD Inpres Borong Jambu III?”.

C. Hipotesis

1. Hipotesa alternatif (H_a) adalah “Ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun di SD Inpres Borong Jambu III”.

2. Hipotesa nol (H_0) adalah “Tidak ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun di SD Inpres Borong Jambu III”.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*)

Definisi Operasional : Ubi jalar ungu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ubi jalar ungu yang varietas antin-3.

Ruang Lingkup Penelitian : Ubi jalar ungu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ubi jalar ungu yang masih segar, tidak rusak atau bolong, berwarna ungu pekat dengan umur panen 4-4,5 bulan

2. Biskuit Ubi Jalar Ungu

Definisi Operasional : Biskuit ubi jalar ungu yang digunakan dalam penelitian ini adalah biskuit ubi jalar ungu yang memiliki kandungan kadar karbohidrat paling tinggi dengan formulasi 1:1 yaitu dengan kadar karbohidrat sebanyak 15,59%.

Ruang Lingkup Penelitian : Biskuit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tepung dari ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*).

3. Status Gizi

Definisi Operasional : Status gizi adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis yang dinilai dengan pengukuran antropometri.

Kriteria objektif :

Berat Badan Menurut Umur

Gizi Buruk : Apabila <-3 SD

Gizi Kurang : Apabila -3 SD s/d <-2 SD

Gizi Baik : Apabila -2 SD s/d $+2$ SD

Gizi Lebih : Apabila $>+2$ SD

Ruang Lingkup Penelitian : Pengukuran antropometri yang digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U) yang dinyatakan dalam *z-score* dengan kriteria objektif penelitian yaitu anak yang gizi kurang dengan nilai *z-score* -3 SD s/d <-2 SD.

4. Anak Sekolah

Definisi Operasional : Anak sekolah adalah anak sekolah yang berusia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Ruang Lingkup Penelitian: Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah anak yang gizi kurang yang bersekolah di SD Inpres Borong Jambu III yang merupakan lokasi penelitian peneliti dan masuk dalam kategori gizi kurang yaitu nilai *zscore* -3 SD s/d <-2 SD.

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Responden	Hasil Penelitian
1	Syurfaini, Dkk. 2014	Pengaruh Pemberian Nugget Tempe Dengan Substitusi Ikan Gabus Terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar Di Mis Ddi Ainus Syamsi Kel.Lette, Kota Makassar 2014	Anak Sekolah Dasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus selisih rata-rata status gizi sebelum dan setelah pemberian nugget tempe dengan substitusi ikan gabus adalah sebesar 0,39 sedangkan pada kelompok kontrol selisih rata-rata status gizi pada awal hingga akhir penelitian adalah sebesar 0,13. setelah dilakukan uji statistik Paired T-Test didapatkan nilai $p = 0,000$ yang lebih kecil daripada nilai alpha (0,05), maka dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, ada pengaruh antara pemberian nugget tempe ikan gabus terhadap status gizi anak sekolah gizi kurang.
2	Enny Susilowati . 2013	Perbedaan Status Gizi Anak Sekolah Dasar Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di SDN Plalan I Kota Surakarta	Anak Sekolah Dasar	Hasil uji korelasi status gizi sebelum dan sesudah PMT diperoleh hasil $p = 0,00$, yang berarti ada perbedaan status gizi sebelum dan sesudah PMT-AS. PMT-AS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan status gizi anak Sekolah Dasar Negeri Plalan I Kota Surakarta.

3	Meita A Kuncoro, Dkk. 2012	Pengaruh Pemberian Suplemen Zink Intrauterin Terhadap Berat Badan Anak Di Kabupaten Takalar	Anak Usia 9-10 Tahun	Pertambahan berat badan anak yang mendapatkan riwayat suplementasi zink + PMT dan PMT intrauterin sebagian besar termasuk status pertambahan berat badan yang normal sebesar 64% dan 61.1% dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan riwayat suplementasi zink + PMT intrauterin sebagian besar termasuk status pertambahan berat badan yang tidak normal sebesar 64.1%.
4	Michran Marsaoly, Dkk. 2011	Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (Telur Rebus Dan Bubur Kacang Hijau) Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah	Anak Usia Sekolah	Sebelum kelompok perlakuan diintervensi, terdapat 70,8% anak berstatus gizi normal, 20,8% berstatus gizi kurang, dan 8,3% berstatus gizi buruk. Setelah diintervensi, anak dengan status gizi normal meningkat menjadi 75%, karena terdapat 1 orang anak dari status gizi kurang, menjadi normal, sementara anak dengan status gizi buruk, tidak berubah. Berdasarkan indeks TB/U, diketahui bahwa sebelum kelompok perlakuan diintervensi, terdapat 83,3% anak dengan status gizi normal, dan setelah diintervensi menurun menjadi 79,2%, karena anak yang pendek, bertambah 4,1% (1 orang). Pada kelompok yang sama, untuk indeks BB/TB, anak dengan status gizi normal meningkat sebesar 8,3%, yaitu dari 87,5% menjadi

				95,8%, karena tidak ada lagi anak dengan status gizi kurus setelah diintervensi (sebelumnya 2 orang), sementara yang gemuk, tetap 4,2% (1 orang)
--	--	--	--	--

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini melakukan intervensi pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di SD Inpres Borong Jambu III.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di SD Inpres Borong Jambu III.

b. Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui perbedaan berat badan sebelum dan setelah pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap status gizi kurang pada siswa gizi kurang.

2) Untuk mengetahui perbedaan asupan makanan sebelum dan setelah pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) pada siswa gizi kurang.

3) Untuk mengetahui pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) terhadap perubahan status gizi pada siswa gizi kurang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan perbaikan zat gizi usia anak sekolah. Dan diharapkan mampu memberi kontribusi sebagai salah satu referensi atau bahan informasi tentang manfaat pemberian biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) guna memperluas wawasan dan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya mahasiswa Gizi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, informasi, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan pada institusi terkait yang berhubungan dengan penanganan masalah gizi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat disekitar lokasi peneliti

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi

1. Definisi Status Gizi

Kata gizi berasal dari Bahasa Arab “*Ghidza*” yang artinya makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Kata gizi (*Nutrition*) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi (Hariza, 2011 : 91).

Ilmu gizi (*Nutrition science*) adalah ilmu mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal (ilmu mempelajari cara memberikan makanan yang sebaik-baiknya agar tubuh selalu dalam kesehatan optimal) (Hariza, 2011 : 91).

Sejak dahulu kala syari'at Islam yang terbukti manjur untuk menjaga kesehatan dan mencegah datangnya berbagai penyakit ialah dengan memakan dan meminum yang halal dan baik. Hal tersebut sesuai dengan hadist di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى :

وَقَالَ تَعَالَى:

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ. [رواه مسلم]

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalehlah.

Dan Dia berfirman: Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata: Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (Riwayat Muslim).

Dalam kesehatan nutrisi, islam menganjurkan terhadap pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban (halal dan baik). Halal adalah suatu hal yang dibolehkan secara agama, sedangkan thayyib adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak termasuk fisik dan pikiran, dan harus memenuhi syarat dari segi kebersihan dan kesehatannya. Hal ini berkaitan dengan QS. al-Baqarah/ 2:168 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Kementerian Agama RI, 2010: 168).

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan-makanan yang halal (Quraish Shihab, 2002 Vol. 1 hal. 456).

Berdasarkan ayat diatas, Islam melarang manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak baik seperti bangkai, darah, daging babi, minuman keras (khamar), binatang yang dicekik atau tercekik dan hewan ternak yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Islam begitu hati-hati dalam hal kesehatan nutrisi ini, karena kebersihan dan kebaikan adalah suatu hal yang fitrah, hal yang fitrah ini akan dapat bersinergi dalam tubuh manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan keadaan fitrah (Syarfaini, 2013 : 89).

Mengenai kandungan zat gizi di dalam makanan, Al-Qur'an memberi kita petunjuk untuk mengkaji atau memperhatikan tentang kandungan zat gizi dalam makanan, selain memperhatikan dari segi kehalalannya, kita juga harus memperhatikan dari segi manfaatnya dalam tubuh kita agar makanan yang kita makan nantinya tidak menjadi mudharat ataupun membahayakan untuk tubuh kita karena Allah swt menciptakan seluruh isi bumi agar mampu dimanfaatkan oleh manusia dalam bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-A'raf/ 7: 31 tentang larangan berlebih-lebihan dan sebaiknya sesuai yang dibutuhkan tubuh.

﴿يَبْنَىِٔ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝﴾

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Kementerian Agama RI, 2010).

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat

berkata bahwa penggalan *ayat* tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Quraish Shihab, 2009: 82).

Dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pada pesan Rasulullah yang mengatakan tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perutnya. Cukupilah bagi putra-putri Adam yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhi perut), hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernapasannya (HR. at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban melalui Miqdam Ibn Ma'dikarib). Ditemukan juga pesan yang mengatakan termasuk berlebih-lebihan bila anda makan apa yang selera anda tidak tertuju kepadanya (Quraish Shihab, 2009:88).

Di dalam ayat tersebut terkandung beberapa makna mengenai larangan berlebih-lebihan. Salah satunya yaitu larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Dimana Allah tidak menyukai segala sesuatunya yang berlebihan. Apalagi dalam perkara makan dan minum manusia agar. Makanan dan minuman harus diperhatikan dan diatur agar dapat memelihara kesehatan. Dalam dunia kesehatan pun kita sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang seimbang yaitu sesuai dengan kebutuhan tubuh yang secara tidak langsung kita dilarang dalam berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan. Karena dampak yang akan terjadi tidaklah bertambah sehat namun akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

2. Penilaian Status Gizi

Menurut Supariasa, dkk (2001:18), penilaian status gizi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian secara langsung dan tidak langsung.

a. Penelitian secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu: antropometri, klinis, biokimia dan biofisik.

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidak seimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh (Supariasa, dkk, 2001 : 19).

Pemeriksaan klinis merupakan metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidak cukupan gizi.

Pemeriksaan secara biokimia merupakan pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratories yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : darah, urin, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi (Supariasa, dkk, 2001 : 20).

Penilaian secara biofisik merupakan metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan). Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik.

b. Penilaian status gizi secara tidak langsung

Survei konsumsi makanan merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga. Data yang didapat dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif.

Statistik vital merupakan salah satu metode penilaian status gizi melalui data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, seperti angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, statistik pelayanan kesehatan, dan angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kekurangan gizi (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

Penilaian status gizi dengan menggunakan factor ekologi karena masalah gizi dapat terjadi karena interaksi beberapa factor ekologi, seperti factor biologis, factor fisik, dan lingkungan budaya. Penilaian berdasarkan factor ekologi digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah (malnutrition) di suatu masyarakat yang nantinya akan sangat berguna untuk melakukan intervensi gizi (Supariasa, 2001).

Pada umumnya kekurangan gizi sering diidentikkan dengan konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan atau anak sulit untuk makan. Sebenarnya, ada berbagai penyebab yang menjadikan seorang anak dapat mengalami kekurangan gizi. Berikut ini penyebab kekurangan gizi yang biasa terjadi. (Widodo dalam Supriyanto, 2014).

Tabel 2.1
Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, TB/BB
Standar Baku Antropometri WHO-2005

No	Indeks	Batas Pengelompokan	Status Gizi
1	BB/U	>+2 SD	Gizi Lebih
		-2 s/d +2 SD	Gizi Baik
		-3 s/d <-2 SD	Gizi Kurang
		<-3 SD	Gizi Buruk
2	TB/U	>+2SD	Tinggi
		-2 s/d <-2 SD	Normal
		-3 s/d <-2 SD	Pendek
		<-3 SD	Sangat Pendek
3	BB/TB	>+2 SD	Gemuk
		-2 s/d <-2 SD	Normal
		-3 s/d <-2 SD	Kurus
		<-3 SD	Sangat Kurus

Sumber : Depkes RI, 2010

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Anak Usia Sekolah

a. Perkembangan Fisik Dan Sosial

Kelompok anak usia 7-12 tahun sebagai anak sekolah. Anak usia sekolah berusaha mengembangkan kebebasan dan membentuk nilai-nilai pribadi. Kebutuhan gizi antar anak berbeda, hal ini dipengaruhi oleh ukuran dan komposisi tubuh, pola aktivitas dan kecepatan tumbuh. Pertumbuhan cepat pada waktu bayi diikuti penurunan laju pertumbuhan pada anak pra sekolah dan anak usia sekolah (Yenita, 2012).

Rata-rata kenaikan berat badan di usia ini sekitar 1,8-2,7 kg setahun, sedangkan tinggi badan kurang lebih 7,6 cm setahun pada anak antara satu tahun

sampai tujuh tahun, kemudian meningkat sebanyak 5,1 cm setahun hingga awal pertumbuhan cepat pada usia remaja. Kelompok ini mempunyai laju pertumbuhan fisik yang lambat tetapi konsisten, terus menerus memperoleh pendewasaan dalam keterampilan motorik serta menunjukkan peningkatan yang berarti dalam keterampilan kognitif, sosial dan emosional (Yenita, 2012).

Kebiasaan makan yang terbentuk pada usia ini, serta jenis makanan yang disukai dan tidak disukai, merupakan dasar bagi pola konsumsi makanan dan asupan gizi anak usia selanjutnya. Anak usia sekolah mempunyai banyak akses ke uang, warung, penjaja makanan di lingkungan sekolah, toko swalayan yang menyebabkan terbukanya gerbang terhadap makanan yang nilai gizinya tidak jelas (Yenita, 2012).

b. Selalu Aktif

Semakin tinggi tingkat aktifitas tubuh maka nutrisi dan energi juga akan semakin banyak diperlukan, anak usia SD atau usia sekolah merupakan usia yang senang bermain. Senang menghabiskan waktunya untuk belajar mengetahui lingkungan sekitar. Untuk itu, perlunya nutrisi dan asupan energi yang banyak untuk menunjang aktifitas fisiknya (Ayu, 2014:24).

c. Pola Makan

Makan pagi sangat penting agar anak lebih bisa konsentrasi dan tidak mengantuk waktu belajar. Namun banyak anak yang tidak mau makan pagi dengan berbagai alasan. Makan malam bersama keluarga memberi kesempatan kepada keluarga untuk berinteraksi dan bersosialisasi (Yenita, 2012).

Selain pola makan yang harus diperhatikan, pola pengasuhan orang tua pun harus diperhatikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak usia sekolah memerlukan perhatian yang lebih dalam mengatur makan sang anak. Hal ini berkaitan di dalam QS. Al-An'am 151 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقٍ.....

Terjemahan :

”Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan (Kementerian Agama RI, 2010).”

Dari ayat diatas terdapat penggalan ayat yang mengatakan “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” dalam hal ini termasuk dalam bagaimana allah telah menganjurkan kita untuk merawat, membimbing anak dengan cara yang baik. Salah satu caranya yaitu mengasuh anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga anak pun terhindar dari segala macam penyakit.

d. Perubahan Sikap Terhadap Makanan

Anak usia sekolah tidak dapat ditebak, apa selera makan yang saat ini sedang ia senangi, perubahan sikap terhadap makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh dari luar. pada masa-masa inilah perhatian ibu terhadap pengaruh pola konsumsi makanan sepertinya harus digalakkan (Ayu, 2014:24).

e. Tidak Suka Makanan Bergizi

Anak usia sekolah sangat sulit untuk dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang sedang ia perlukan untuk masa pertumbuhan. Kriteria makanan yang banyak disukai oleh anak usia ini adalah makanan yang banyak gula dan mempunyai warna yang cerah sehingga menarik anak untuk mengkonsumsinya (Ayu, 2014:24).

3. Penanggulangan Gizi Kurang

Penanggulangan gizi kurang dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan memperbaiki pola makan. Pola makan menjadi kunci utama menjaga kesehatan tubuh. Masyarakat mengenal diet sebagai upaya keseimbangan pasokan gizi dan vitamin ke dalam tubuh. Selain pola makan yang harus diperhatikan dalam penanggulangan gizi kurang adalah beberapa cara yang dilakukan, dan diharapkan dapat mengurangi kejadian gizi kurang, yaitu :

a. Fortifikasi

Fortifikasi adalah suatu tindakan menambahkan kandungan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral (termasuk elemen) dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi dari pasokan makanan dan memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Fortifikasi makanan mengacu pada penambahan mikronutrien pada makanan olahan.

Karena manfaat yang besar, fortifikasi pangan dapat menjadi intervensi hemat biaya bagi kesehatan. Namun persyaratannya adalah bahwa makanan yang diperkaya

perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup oleh sebagian besar individu-individu dari target populasi.

b. Edukasi Gizi

Edukasi gizi merupakan salah satu upaya yang ekstensif dan persuasif diperlukan untuk menimbulkan perubahan perilaku dalam masyarakat agar orang-orang dalam masyarakat tersebut lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsinya.

c. Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan.

d. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

e. Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), hingga Puskesmas dan Rumah Sakit

f. Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

g. Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas.

B. Tinjauan Umum Anak Sekolah Dasar

1. Pengertian Anak Sekolah Dasar

Anak sekolah dasar adalah anak yang berusia 7-12 tahun, memiliki fisik lebih kuat dibanding balita, mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung pada orang tua. Biasanya pertumbuhan anak putri lebih cepat dibanding anak putra. Kebutuhan gizi anak sebagian besar digunakan untuk aktivitas pembentukan dan pemeliharaan jaringan (Alatas, 2011:25).

Anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal yaitu, sesuai dengan standar pertumbuhan fisik anak pada umumnya dan memiliki kemampuan sesuai standar kemampuan anak seusianya. Kesehatan bagi anak sekolah tidak terlepas dari pengertian kesehatan pada umumnya. Kesehatan di sini meliputi kesehatan badan, rohani, dan social, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan (UU No.9 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Kesehatan).

Pertumbuhan anak pada tahun ketiga begitu cepat dan berangsur-angsur menurun sehingga pada periode prasekolah dan masa sekolah kurva percepatan pertumbuhan akan membentuk kurva yang hampir datar. Sedang pada masa remaja terjadi percepatan pertumbuhan kedua untuk kemudian berhenti sama sekali, yaitu bertepatan dengan mulainya kematangan social (Adriani, 2014:246).

2. Karakteristik Anak Sekolah Dasar

Aspek perkembangan meliputi perkembangan psikologis seperti perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perilaku lainnya. Adapun fungsi biologis meliputi aspek fisiologis tubuh, metabolisme tubuh, kemampuan fungsi organ, dan sistem tubuh (Alatas, 2011:26). Adapun Karakteristik anak sekolah meliputi :

- a. Pertumbuhan tidak secepat bayi.
- b. Gigi merupakan gigi susu yang tidak permanen (tanggul).
- c. Lebih aktif memilih makanan yang disukai
- d. Kebutuhan energi tinggi karena aktivitas meningkat
- e. Pertumbuhan lambat
- f. Pertumbuhan meningkat lagi pada masa remaja.

3. Masalah Gizi Pada Anak Sekolah Dasar

Masalah gizi anak sekolah dasar adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan perorangan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah pangan antara lain menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan yang dipengaruhi kemiskinan, rendahnya pendidikan, adat/kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan.

Sementara, permasalahan gizi di Indonesia tidak hanya kekurangan gizi namun banyak pula kasus kelebihan gizi. Adapun masalah gizi yang sering timbul pada kelompok anak usia sekolah yaitu,

a. Anemia

Keadaan ini terjadi, karena terlalu sedikit kandungan zat besi dalam makanan yang dikonsumsi terutama pada anak yang sering jajan sehingga menurunkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan lain. Untuk mengatasi masalah ini, di samping memberikan suplemen-suplemen zat besi, anak harus diberi dan dibiasakan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi (Adriana dkk, 2014:269).

b. Kekurangan Yodium

Salah satu gambaran penyakit kekurangan yodium adalah terjadinya pembesaran kelenjar gondok yang disebut penyakit gondok atau nama ilmiahnya *struma simplex*. Kekurangan yodium juga mengakibatkan gambaran klinik lain selain *goiter endemis*, yang disebut *iodine deficiency diseases (IDD)* yaitu, gondok endemis, hambatan pertumbuhan fisik dan mental yang disebut *cretinism*, hambatan neuromotor, kondisi tuli disertai bisu (*deaf mutism*). Pembesaran gondok terdapat lebih dari 30 % diantara anak sekolah (Adriana dkk, 2014:269).

c. Karies Gigi

Karies gigi sering terjadi pada anak, karena terlalu sering makan makanan yang lengkes dan banyak mengandung gula. Gigi yang berlubang akan menyerang gigi permanen sebelum gigi tersebut berhasil menembus gusi. Makanan yang dapat dengan mudah menimbulkan karies antara lain, keripik kentang, permen, kue kering, minuman manis. Namun pada prinsipnya makanan apapun dapat menimbulkan karies pada gigi ketika kita tidak rutin menggosok gigi setelah makan. Upaya mencegah

karies yaitu, menggosok gigi dengan pasta gigi setelah makan (Adriana dkk, 2014:270).

d. Berat Badan Lebih

Laju pertumbuhan berat selayaknya dihentikan atau diperlambat sampai proporsi berat terhadap tinggi badan kembali normal. Perlambatan ini dicapai dengan cara mengurangi makan dan memperbanyak aktivitas. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya pendidikan gizi dan kesehatan bagi anak sekolah agar anak-anak sekolah mengetahui tentang perlunya gizi seimbang bagi tubuh dan kesehatannya (Adriana dkk, 2014:270).

4. Kebutuhan Makanan Pada Anak Sekolah Dasar

Anak dari golongan usia sekolah memerlukan makanan yang kurang lebih sama dengan yang dianjurkan untuk anak prasekolah terkecuali porsi harus lebih besar karena kebutuhannya yang lebih banyak, mengingat bertambahnya berat badan dan aktivitasnya. Kebutuhan gizi yang disesuaikan dengan banyak aktivitas yang dilakukan oleh anak usia sekolah sangat berpengaruh.

Adanya aktivitas yang tinggi mulai dari sekolah, kursus, mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan pekerjaan untuk esok harinya, membuat stamina anak menjadi menurun kalau tidak dituang dengan intake pangan dan gizi yang cukup dan berkualitas.

Agar stamina anak usia sekolah tetap fit selama mengikuti kegiatan disekolah maupun kegiatan lainnya, maka saran utama dari segi gizi adalah jangan

meninggalkan sarapan pagi. Serta mengkonsumsi makanan selingan selama di sekolah agar kadar gula tetap terkontrol dengan baik, sehingga konsentrasi terhadap pelajaran dan aktivitas lainnya dapat tetap dilaksanakan.

Kandungan zat gizi makanan selingan ditinjau dari besarnya kandungan energi dan protein sebesar 300 kkal dan 5 gram protein. Kebutuhan energi golongan umur 10-12 tahun relative lebih besar daripada golongan umur 7-9 tahun, karena pertumbuhan relative cepat, terutama penambahan tinggi badan. Mulai dari umur 10-12 tahun, kebutuhan gizi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Adapun jumlah energi dan protein yang dianjurkan oleh Widya Karya Nasional dan Gizi bagi anak umur 7-12 tahun tertera pada tabel :

Tabel 2.2
Angka Kecukupan Energi, Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin C dan Besi yang dianjurkan untuk Anak Indonesia

Kelompok Umur	BB (kg)	TB (cm)	Energi (Kkal)	Karbohidrat (g)	Protein (g)	Lemak (g)	Vitamin C	Besi
7-9 tahun	27	130	1850	254	49	72	45	10
Laki-laki 10-12 tahun	34	142	2100	389	56	70	50	13
Perempuan 10-12 tahun	36	145	2000	275	60	67	50	20

Sumber: Kemenkes, 2013

Kalori yang dihasilkan dalam 100 gram biskuit ubi jalar ungu

Kandungan karbohidrat dalam 1 gram biskuit ubi jalar ungu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{15.59}{100} = 0.155 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.155 \times 4 = 0.62$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.155 = 3.875$ gram

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan karbohidrat sebesar $3.875 \times 4 = 15.5$ kalori

Kandungan protein dalam 1 gram biskuit jalar ungu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{4.95}{100} = 0.049 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.049 \times 4 = 0.196$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.049 \text{ gram} = 1.225 \text{ gram}$

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan protein sebesar $1.225 \times 4 = 4.9$ kalori

Kandungan lemak dalam 1 gram biskuit jalar ungu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{29.76}{100} = 0.297 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.297 \times 9 = 2.673$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.297 \text{ gram} = 7.425 \text{ gram}$

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan lemak sebesar $7.425 \times 9 = 66.825$ kalori

Jadi, total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit ubi jalar ungu (25 gram) adalah 15.5 kalori karbohidrat + 4.9 kalori protein + 66.825 kalori lemak = 87.225 kalori. Total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit ubi jalar ungu (25 gram) adalah 872.25 kalori.

Jadi, untuk PMT anak usia 7-9 tahun diberikan sebesar 100 gram biskuit setara dengan 4 keping biskuit ubi jalar ungu. Biskuit ini akan diberikan setiap hari selama 30 hari kepada anak usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

C. Tinjauan Umum Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*)

1. Pengertian Ubi Jalar Ungu

Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi, jagung, dan ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri maupun pakan ternak. Sebagai sumber karbohidrat, ubi jalar memiliki peluang sebagai substitusi bahan pangan utama, sehingga bila diterapkan mempunyai peran penting dalam upaya penganeekaragaman pangan dan dapat diproses menjadi aneka ragam produk yang mampu mendorong pengembangan agro-industri dalam diversifikasi pangan (Zuraida dan Supriyati, 2011).

Produktivitas ubi jalar di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 152,00 ku/ha meningkat 5,61% pada tahun 2015 sebesar 160,53 ku/ha (*Badan Pusat Statistik, 2015*). Tercatat pada tahun 2015 produksi ubi jalar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71.677 ton terjadi kenaikan sebesar 4.035 ton dari tahun 2014 dengan produksi sebesar 67.642 ton. Penghasil ubi jalar terbesar di Sulawesi Selatan ada di Kabupaten Bone dengan produksi sebesar 21.688 ton, disusul Kabupaten Gowa sebesar 6.033 ton, Kabupaten Takalar 5.731 ton dan Kabupaten Maros sebesar 4.612 ton (*Dinas Pertanian Sulawesi Selatan, 2015*).

Ubi jalar ungu dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim panas dan lembab dengan suhu optimal 27°C serta lama penyinaran sekitar 11-12 jam per hari. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran dengan ketinggian sampai 1.000 meter dari permukaan laut. Bentuk ubi jalar ungu biasanya bulat sampai lonjong dengan permukaan rata hingga tidak rata. Kulit ubi jalar ungu berwarna ungu kemerahan, dan daging umbi berwarna keunguan (*Rukmana (1997) dalam Kusuma, 2013*).

Umur panen ubi jalar ungu ditentukan berdasarkan areal tanam, yaitu 120 hst (areal dataran rendah), 135 hst (areal dataran sedang) dan 180 hst (areal dataran tinggi) dengan rata-rata ukuran panjang umbi 14 cm diameter 7 cm dan warna kulit umbi merah tua sedangkan warna daging umbi ungu tua (*Balitkabi, 2015*).

2. Klasifikasi Ubi Jalar Ungu

Klasifikasi Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas (L.) Poir.*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Klasifikasi Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas (L.) Poir.*)

Klasifikasi Ubi Jalar Ungu (<i>Ipomoea babatas (L.) Poir.</i>)	
Kingdom	<i>Plantae</i>
Divisi	<i>Spermatophyta</i>
Subdivisi	<i>Angiospermae</i>
Kelas	<i>Dicotyledoneae</i>
Ordo	<i>Polemoniales</i>
Famili	<i>Convolvulaceae</i>
Genus	<i>Ipomoea</i>
Spesies	<i>Ipomoea batatas (L.) Poir.</i>

Ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) merupakan salah satu jenis ubi jalar yang mulai banyak mendapat perhatian belakangan ini. Bahan pangan ini mulai banyak diminati masyarakat karena selain mempunyai komposisi gizi yang baik juga memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Ubi jalar ungu memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna ungu kehitaman (ungu pekat) dan ungu kemerahan yang disebabkan oleh pigmen antosianin (Kumalaningsih, 2007 dalam Adhitya, 2011).

Terdapat 3 jenis varietas pada ubi jalar ungu di Sulawesi Selatan yaitu varietas antin-1, antin-2 dan antin-3. Pada ubi jalar ungu varietas antin-1 potensi hasil umbinya sebanyak 33,2 ton/ha dengan umur panen 4-4,5 bulan, sifat dari umbi varietas antin-1 toleran kekeringan, warna umbi cocok untuk dibuat produk kripik dengan kadar antiosianin terendah dari varietas lainnya yaitu 33,89mg/100g (bb). Ubi jalar ungu varietas antin-2 memiliki potensi hasil tertinggi yaitu 37,1 ton/ha dengan

umur panen 4-4,5 bulan, kadar antosianin dari varietas antin-2 yaitu 130,19 mg/100g (bb).

Sedangkan, ubi jalar ungu varietas antin-3 memiliki potensi hasil 30,6 ton/ha dengan umur panen 4-4,5 bulan dengan warna umbi ungu tua atau ungu pekat. Umbi varietas antin-3 memiliki kadar antosianin yaitu 150,67 mg/100g (bb) yang hampir sama dengan ubi jalar ungu varietas ayamurasaki yang berasal dari Jepang. Sifat dari ubi jalar ungu varietas antin2 dan antin-3 yaitu tahan boleng dan kudis (Balitkabi, 2015).

Islam senantiasa mengajarkan kepada kita sebagai umat muslim yang beragama agar memakan makanan halal serta bermanfaat untuk tubuh kita. Dari berbagai macam pangan yang telah dikalsifikasikan, yang merupakan ciptaan Allah swt yang dapat dimakan dan mempunyai nilai gizi yang baik, salah satunya adalah ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu merupakan pangan lokal yang mengandung gizi dan bermanfaat untuk kesehatan seseorang sebagaimana firman-Nya dalam:

Q.S. A' basa 20:24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Kementerian Agama RI, 2010).

Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna, maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan (Shihab 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk memerhatikan makanan yang akan dikonsumsi baik itu dari segi kandungan gizi, jumlah, maupun proses yang dilalui makanan tersebut hingga siap/tersaji dihadapan kita. Dengan demikian, kita dapat memperoleh makanan yang dibenarkan oleh agama dan dapat mendatangkan dampak positif untuk menumbuhkan dan memberikan kekuatan jasmani setelah mengkonsumsinya.

3. Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu

Ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi. Ubi jalar ungu juga merupakan sumber vitamin dan mineral, vitamin yang terkandung dalam ubi jalar antara lain vitamin A, vitamin C, thiamin (vitamin B1) dan riboflavin. Sedangkan mineral dalam ubi jalar ungu di antaranya adalah zat besi (Fe), fosfor (P) dan kalsium (Ca). Kandungan lainnya adalah protein, lemak, serat kasar dan abu (Yuni, 2012:28).

Ubi jalar ungu pekat mengandung antosianin 61,85 mg/100 g, 17 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan antosianin ubi jalar ungu muda 3,51 mg/100 g. Ubi jalar ungu pekat memiliki aktivitas antioksidan 59,25 %, lebih besar dibandingkan dengan ubi jalar ungu muda 56,64 %. Penurunan kandungan antosianin pada produk olahan dari kedua jenis ubi jalar menunjukkan kecenderungan yang sama.

Produk olahan ubi jalar ungu yang paling mampu mempertahankan kandungan antosianin diperoleh pada ubi kukus yaitu 34,14 % (ungu pekat) dan 42,16 % (ungu muda), sedangkan tingkat penurunan tertinggi diperoleh pada produk keripik yaitu 95,21 % (ungu pekat) dan 88,47% (ungu muda). Penurunan aktivitas antioksidan juga berbanding lurus dengan penurunan kadar antosianin pada semua

produk olahan, kecuali pada produk olahan keripik (Husna dkk, 2013). Kandungan gizi ubi jalar ungu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Varietas Antin-1

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Antosianin (mg)	33,9
Serat (%)	2,3
Kadar Pati (%)	19,3
Gula Reduksi (%)	1,7
Protein (%)	1,9
Vitamin A (%)	7,8
Vitamin C (mg)	21,8

Sumber: (Balitbangtan, 2016).

Tabel 2.5 Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Varietas Antin-2


Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Antosianin (mg)	130,2
Serat (%)	0,9
Kadar Pati (%)	22,2
Gula Reduksi (%)	0,4
Protein (%)	0,6
Vitamin C (mg)	22,1

Sumber: (Balitbangtan, 2016).

Tabel 2.6 Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Varietas Antin-3

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Antosianin (mg)	150,7
Serat (%)	1,1
Kadar Pati (%)	18,2
Gula Reduksi (%)	0,4
Protein (%)	0,6
Vitamin C (mg)	20,1

Sumber: (Balitbangtan, 2016).



Gambar 2.1 Ubi Jalar Ungu Varietas Antin1-3

Pigmen warna ungu pada ubi jalar ungu bermanfaat sebagai antioksidan karena dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam tubuh, dan menghambat pengumpulan sel-sel darah. Ubi ungu juga mengandung serat pangan alami yang tinggi, prebiotik. Kandungan lainnya dalam ubi jalar ungu adalah betakaroten. Semakin pekat warna ubi jalar, maka semakin pekat betakaroten yang ada di dalam ubi jalar. Betakaroten selain sebagai pembentuk vitamin A, juga berperan sebagai pengendalian hormon melatonin.

Hormon ini merupakan antioksidan bagi sel dan sistem syaraf, berperan dalam pembentuk hormon endokrin. Kurangnya melatonin akan menyebabkan gangguan

tidur dan penurunan daya ingat, dan menurunnya hormon endokrin yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. (Iriyanti, 2012:67).

Total kandungan antosianin bervariasi pada setiap tanaman dan berkisar antara 20 mg/100 g sampai 600mg/100 g berat basah. Total kandungan anthosianin ubi ungu adalah 519 mg/100g berat basah (Yuni, 2012:30).

Dari semua varietas warna ubi ubi jalar yang terdiri dari warna putih, kuning, oranye dan ungu. Hasil penelitian analisis vitamin C pada varietas ubi jalar yang umbinya berwarna ungu memiliki kandungan vitamin C paling besar yaitu 0,0177 mg/100 gram (Nathania dkk, 2013). Vitamin C merupakan vitamin alam yang mempunyai peranan penting dalam mencegah oksidasi akibat radikal bebas dalam tubuh manusia (Alamsah, 2008 dalam Nathania dkk, 2013).

D. Tinjauan Umum Tentang Tepung Ubi Jalar Ungu

Penggunaan tepung ubi jalar ungu ini cukup potensial sebagai bahan baku dalam pembuatan produk pangan berbasis tepung dan mampu bersaing dari segi kualitas produk yang dihasilkan. Sebagai bahan baku kue kering dan cake penggunaan tepung ubi jalar ungu dapat mencapai 50-100%. Dan sekarang ini tepung ubi jalar ungu bisa didapat dari produsen. (Sarwono, 2005:12).

Ubi jalar ungu dapat menggantikan terigu karena memiliki kadar pati yang tinggi sebesar 74,57%, rasio amilosa dan amilopektin juga hampir sama dengan tepung terigu. Tepung terigu memiliki rasio amilosa dan amilopektin sebesar 74:26

sedangkan tepung ubi jalar ungu 69,82:30,18 (Hidayat dkk (2007) dalam Putri, 2016). Pati tersusun atas perbandingan amilosa lebih besar akan menghasilkan adonan yang lebih padat dan kompak (Rauf (2015) dalam Putri, 2016).

Pada umumnya proses pengeringan dengan sinar matahari disebut sebagai penjemuran. Dua keuntungan penjemuran di bawah sinar matahari, yaitu adanya daya pemutih karena sinar *ultraviolet* matahari dan mengurangi degradasi kimia yang dapat menurunkan mutu bahan (Grace (1977) dalam Apriliyanti, 2010). Selain itu biaya produksi lebih rendah, tidak diperlukan bahan penolong lain seperti bumbu dalam pengalengan, serta upah buruh lebih murah karena tidak memerlukan keahlian khusus dan alat-alat yang digunakan lebih sederhana (Sutijahartini (1985) dalam Apriliyanti, 2010).

Kelemahan proses penjemuran adalah proses pengeringan hanya bisa berlangsung apabila sinar matahari cukup, sering terjadi perubahan warna pada bahan, serta proses pengeringan tidak berlangsung secara konstan karena bergantung sekali pada kondisi cuaca setempat (Sutijahartini (1985) dalam Apriliyanti, 2010). Kelemahan lainnya antara lain dapat terkontaminasinya bahan oleh debu yang dapat mengurangi derajat keputihan tepung, sulitnya mengontrol suhu dan kelembaban udara serta terjadinya kontaminasi mikroba (Grace (1977) dalam Apriliyanti, 2010).

Tepung ubi jalar ungu dengan menggunakan cara pengukusan selama 7 menit pada suhu 100°C dengan ketebalan umbi sebesar $1\pm 0,5$ cm dan dikeringkan

menggunakan pengering kabinet pada suhu 50–55°C selama 6–8 jam. (Karleen, 2010).

Adapun proses pengeringan yang optimal pada pembuatan tepung ubi jalar ungu dilihat dari segi sifat fisikokimia dan sensori adalah dengan proses pengeringan kabinet dryer T50°C tidak *blanching* (Apriliyanti, 2010). Komponen utama dari tepung ubi jalar ungu adalah karbohidrat, dengan nilai kalori antara 350:380 kalori per 100 g (Sarwono (2005) dalam Mentari, 2015).

Tabel 2.7 Kandungan Gizi Tepung Ubi Jalar Ungu dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Antosianin (mg)	73,89
Aktivitas Antioksidan (ppm)	555,18
Gula Reduksi (%)	1,11
Kadar Pati (%)	82,32

Sumber: Ticoalu dkk, 2016

Tahap-tahap dalam pembuatan tepung ubi jalar ungu adalah sebagai berikut :

1. Pilih ubi jalar ungu yang masih segar, yang tidak rusak atau bolong dan yang tidak lebih dari satu minggu setelah panen.
2. Sortasi dan potong bagian ujung dan pangkal ubi jalar ungu sekitar 2,0 cm, lalu kupas kulit ubi jalar ungu dengan pisau atau alat pengupas umbi lainnya.
3. Cuci bersih, kemudian potong tipis-tipis.
4. Rendam irisan ubi jalar ungu dengan larutan Na-metabisulfit 0,2% selama 15 menit lalu tiriskan.
5. Jemur irisan ubi jalar ungu di bawah sinar matahari atau menggunakan oven pengering.
6. Giling irisan ubi jalar ungu yang sudah dikeringkan

7. Ayak hasil gilingan dengan ayakan berukuran lubang 0,6-0,4 mm (40-60 mesh).
8. Simpan tepung ubi jalar dalam kantong plastik, toples, atau kaleng tertutup yang tertutup rapat.
9. Tepung ubi jalar dapat disimpan hingga 6 bulan.

E. Tinjauan Umum Tentang Biskuit

Biskuit adalah produk yang diperoleh dengan memanggang adonan yang berasal dari tepung terigu dengan penambahan makanan lain dan dengan atau penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Badan Standardisasi Nasional, 2011).

Biskuit adalah salah satu produk olahan kue kering yang merupakan makanan ringan yang disenangi karena enak, manis, dan renyah serta memiliki umur simpan cukup lama (Kusnandar dkk (2010) dalam Winata, 2015). Kadar air yang rendah pada biskuit dihasilkan dari proses pemanggangan adonan biskuit yang sempurna (Aprianita dan Wijaya (2010) dalam Winata, 2015).

Biskuit diklasifikasikan dalam empat jenis yaitu biskuit keras, *crackers*, *cookies* dan *wafer*. Biskuit keras adalah jenis biskuit yang dibuat dengan adonan berbentuk pipih, bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur padat dan dapat berkadar lemak tinggi atau rendah. *Crackers* adalah jenis biskuit yang dibuat adonan keras melalui proses fermentasi atau pemeraman. *Cookies* adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi dan bila dipatahkan penampang

potongannya bertekstur kurang padat, sedangkan *wafer* adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya berongga-rongga (Badan Standardisasi Nasional, 2011).

Dari data hasil Riskesdas (2013) tentang konsumsi makanan dari olahan tepung terigu diantaranya mi instan, mi basah, roti dan biskuit, sebanyak 13,4% penduduk Indonesia mengkonsumsi biskuit ≥ 1 kali per hari.

Pada penelitian ini biskuit yang dibuat adalah biskuit dari ubi jalar ungu yang dibuat menjadi tepung terlebih dahulu. Hasil penepungan atau tepung ubi jalar ungu dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biskuit, adapun warna dari biskuit ini warnanya seperti bahan bakunya yaitu ungu dan rasa biskuit yang manis seperti ubi jalar ungu dengan penambahan gula dan teksturnya yang kering dan renyah seperti biskuit pada umum.


F. Hasil Uji Laboratorium Biskuit Ubi Jalar Ungu

Tabel 2.8
Hasil Pemeriksaan Kandungan Zat Gizi Biskuit Ubi Jalar Ungu
Dalam per 100 gram

No	Parameter	Satuan	Sampel Biskuit Ubi Jalar Ungu
1	Karbohidrat	%	15.59
2	Protein	%	4.95
3	Lemak	%	29.76
4	Vitamin C	mg	44.66
5	Fe	μ /g	0.103

Sumber : Data Primer dalam Amriani, 2017


G. Kerangka Teori



Sumber : Persagi. 1999. *Visi dan Misi Gizi dalam Mencapai Indonesia Sehat Tahun 2010*. Jakarta.

H. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan :

- : Variabel yang diteliti
- : Variabel yang tidak diteliti
- > : Hubungan Variabel ke variabel

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan, yaitu pengumpulan data dari sampel, baik distribusi karakter, hubungan antara variabel, atau variabel lain terkait masalah kesehatan yang dapat dihitung berupa angka-angka mengenai Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun di SD Inpres Borong Jambu III.

2. Lokasi Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di SD Inpres Borong Jambu III.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimental. Dimana quasi eksperimen atau biasa disebut eksperimen semu yang memiliki perlakuan (treatments), pengukuran-pengukuran dampak (outcome measures), dan unit-unit eksperimen namun tidak menggunakan penempatan secara acak (Siagian, 2010:88).

Rancangan penelitiannya adalah rancangan *one group pre test-post test*. Desain ini menggunakan pretest terlebih dahulu pada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Dengan demikian hasilnya akan lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan setelah pemberian perlakuan. Skema desain ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1. Rancangan penelitian



Peneliti mengambil sampel pada siswa gizi kurang. Pada siswa gizi kurang, selain mengkonsumsi makanan sehari-hari juga diberi biskuit ubi jalar ungu dalam 1 kali sehari selama 30 hari. Kemudian dari pemberian biskuit ubi jalar ungu tersebut, peneliti kembali melakukan penimbangan berat badan dan menganalisis menggunakan indeks berat badan menurut umur (*z-score*) pada anak gizi kurang yang diteliti tersebut.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang gizi kurang yang berjumlah 36 orang yang bersekolah di SD Inpres Borong Jambu III.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah anak sekolah yang termasuk gizi kurang yang berjumlah orang, yang diperoleh dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling. Sampling adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat atau meneliti sampelnya saja. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek peneliti yaitu melalui observasi awal dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan terhadap obyek penelitian.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui penelusuran pustaka, jurnal-jurnal hasil penelitian, buku literatur yang relevan, laporan dan instansi yang terkait.

E. Instrumen Penelitian

1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biskuit tepung ubi jalar ungu yang telah lulus uji mikroba dan uji organoleptik. Pemberian dosis intervensi biskuit sebanyak 100gr perhari yang diberikan satu kali sehari selama 1 bulan berturut-turut.

2. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuesioner identitas responden, identitas sampel, dan form pengukuran antropometri anak.
- b. Food recall 24 jam untuk menilai gambaran kebiasaan konsumsi makanan responden.
- c. Timbangan digital untuk mengukur berat badan
- d. Form pemantauan konsumsi biskuit ubi jalar ungu oleh anak sekolah dasar.
- e. Alat timbang makanan.
- f. Alat tulis menulis.

3. Cara Kerja

- a. Pengukuran berat badan
 1. Timbangan diletakkan pada bidang datar.
 2. Pastikan timbangan telah dikalibrasi dan dalam kondisi baik dan pastikan jarum berada di angka 0.
 3. Subjek melepaskan sepatu, tas, dan barang lainnya selain pakaian yang dikenakan dan pastikan subjek tidak menggunakan pakaian yang tebal agar mendapatkan berat badan anak seakurat mungkin.
 4. Pastikan posisi badan subjek dalam keadaan berdiri tegak, tenang, mata, kepala lurus ke arah depan, kaki tidak menekuk.
 5. Setelah posisi benar, dilakukan pencatatan berat badan.

6. Ulangi prosedur sebanyak 2 kali. Apabila terdapat selisih >0.4 kg maka dilakukan pengukuran ketiga.
- b. Prosedur intervensi
1. Sampel diberikan biskuit ubi jalar ungu setiap hari selama satu bulan penuh.
 2. Biskuit ubi jalar ungu diberikan bersamaan dengan makanan lainnya ketika responden sedang makan atau dapat diberikan secara terpisah. Namun biskuit ubi jalar ungu berfungsi sebagai makanan tambahan diluar makanan yang diberikan oleh orang tua responden.

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang di uji validitas dan reliabilitasnya adalah instrument penelitiannya.

Suatu skala atau instrument dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas pengukuran berkaitan dengan tiga unsur yaitu: alat ukur, metode ukur, dan pengukur.

Dalam penelitian ini, keseluruhan unsur validitas termasuk alat ukur, metode pengukuran, dan pengukurannya sudah valid, artinya semua telah sesuai dengan standar operasional sehingga kesemua unsur dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur. Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Untuk menjaga tingkat konsistensi (reliabilitas) alat timbangan tersebut, maka peneliti melakukan pengulangan penimbangan sebanyak dua kali agar data yang diperoleh dapat diperoleh dapat dipercaya dan lebih akurat.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing dilakukan untuk menilai kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian nilai *zscore* dalam lembar hasil pengukuran penelitian.

b. Coding

Setelah memperoleh hasil pengukuran berat badan, dilakukan identifikasi, klasifikasi kemudian diberi kode.

c. Entry data

Memasukkan data yang telah diberi kode pada lembar hasil pengukuran untuk diproses secara komputerisasi.

d. Cleaning

Pembersihan data dari kesalahan-kesalahan selama mengentri data.

e. Tabulasi

Setelah instrumen diisi dengan baik, maka data kemudian di tabulasi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (Riyanto, 2011).

f. Nutrisurvey

Nutrisurvey digunakan untuk mengetahui kandungan gizi pada resep biskuit tepung tulang ikan tuna.

2. Analisis Data

Analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Uji yang digunakan yaitu uji-T berpasangan (*Paired T-Test*) adalah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari

perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sekolah Dasar Inpres Borong Jambu III di Jl. Tamangapa Raya IV No. 13, Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung yang dimiliki SD Inpres Borong Jambu III terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 ruang perpustakaan sekaligus sebagai ruang UKS, dan 1 ruang rapat. Jumlah siswa sampai saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 427 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 200 orang dan perempuan sebanyak 227 orang.

Sekolah Dasar Inpres Borong Jambu III oleh 14 tenaga pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 13 orang guru kelas, 1 orang pembersih sekolah dan 1 orang penjaga sekolah.

b. Visi dan Misi SD Inpres Borong Jambu

1) Visi SD Inpres Borong Jambu III

Unggul dalam prestasi, iptek, intaq dan berbudi pekerti yang luhur dalam pergaulan.

2) Misi SD Inpres Borong Jambu III

Disiplin dalam kerja, mewujudkan manajemen kekeluargaan, kerjasama, pelayanan prima dengan meningkatkan silaturahmi.

c. Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin

Berikut hasil analisis univariat pada kelompok jenis kelamin pada anak Sekolah Dasar Gizi Kurang :

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Jenis Kelamin	Kelompok I (Intervensi)		Kelompok II (Kontrol)	
	n	%	n	%
Laki-laki	11	61.1	7	38.9
Perempuan	7	38.9	11	61.1
Jumlah	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2017

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden pada kelompok I (intervensi), responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (61.1%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (38.9%). Sedangkan dari 18 responden pada kelompok II (kontrol), responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang (38.9%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang (61.1%).

2) Tingkatan Kelas

Tabel 4.2

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas
di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017**

Tingkatan Kelas	Kelompok I (Intervensi)		Kelompok II (Kontrol)	
	n	%	n	%
Kelas 2	14	77.8	-	-
Kelas 3	4	22.2	14	77.8
Kelas 4	-	-	4	22.2
Jumlah	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2017

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden pada kelompok I (intervensi), responden paling banyak pada kelas 2 dengan jumlah 14 orang (77.8%), kelas 3 dengan jumlah 4 orang (22.2%) dan tidak ada pada kelas 4. Sedangkan dari 18 responden pada kelompok II (kontrol), responden pada kelas 2 tidak ada, yang paling banyak pada kelas 3 dengan jumlah 14 orang (77.8%) dan kelas 4 dengan jumlah 4 orang (22.2%).

3) Umur

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Tingkatan Umur	Kelompok I (Intervensi)		Kelompok II (Kontrol)	
	n	%	n	%
7 Tahun	12	66.7	-	-
8 Tahun	6	33.3	13	72.2
9 Tahun	-	-	5	27.8
Jumlah	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2017

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden pada kelompok I (intervensi), terdapat 12 orang (66.7%) yang berumur 7 tahun, selanjutnya terdapat 6 orang (33.3%) yang berumur 8 tahun dan tidak ada yang berumur 9 tahun. Sedangkan dari 18 responden pada kelompok II (kontrol), tidak ada yang berumur 7 tahun, selanjutnya terdapat 5 orang (27.8%) yang berusia 8 tahun, dan tidak ada yang berumur 9 tahun.

4) Pendidikan Orang Tua

Tabel 4.4

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua di SD
Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017**

Pendidikan Orang Tua	Kelompok I (Intervensi)				Kelompok II (Kontrol)			
	Ayah		Ibu		Ayah		Ibu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tidak Sekolah	-	-	2	11.1	1	5.6	-	-
SD	6	33.3	6	33.3	6	33.3	7	38.9
SMP	5	27.8	5	27.8	6	33.3	5	27.8
SMA	7	38.9	5	27.8	5	27.8	6	33.3
Sarjana (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18	100	18	100	18	100	18	100

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada kelompok I (intervensi), orang tua responden khususnya pendidikan ayah yang tidak sekolah tidak ada dan ibu sebanyak 2 orang (11.1), SD masing-masing sebanyak 6 orang (33.3%), SMP masing-masing sebanyak 5 orang (27.8%), SMA khususnya ayah sebanyak 7 orang (38.9%) dan ibu sebanyak 5 orang (27.8%) dan tidak ada yang sarjana, sedangkan pada kelompok II (kontrol) pendidikan ayah sebanyak 1 orang (5.6%) dan ibu tidak ada, SD khususnya ayah sebanyak 6 orang (33.3%) dan ibu sebanyak 7 orang (38.9%), SMP khususnya ayah sebanyak 6 orang (33.4%) dan ibu sebanyak 5 orang (27.8%), SMA khususnya ayah sebanyak 5 orang (27.8%) dan ibu sebanyak 6 orang (33.3%) dan tidak ada yang sarjana.

5) Pekerjaan Orang Tua

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua di SD
Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Pekerjaan Orang Tua	Kelompok I (Intervensi)				Kelompok II (Kontrol)			
	Ayah		Ibu		Ayah		Ibu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Buruh	9	50.0	-	-	14	77.8	-	-
Petani	-	-	-	-	1	5.6	-	-
PNS	-	-	-	-	1	5.6	-	-
Karyawan Swasta	1	5.6	-	-	2	11.1	-	-
Wiraswasta	8	44.4	-	-	-	-	1	5.6
IRT	-	-	18	100	-	-	17	94.4
Jumlah	18	100	18	100	18	100	18	100

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada kelompok I (intervensi) kebanyakan orang tua responden khususnya ayah bekerja sebagai buruh sebanyak 9 orang (50.0%), petani dan PNS tidak ada, karyawan swasta sebanyak 1 orang (5.6%) dan wiraswasta sebanyak 8 orang (44.4%), sedangkan ibu paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 18 orang (100%). Pada kelompok II (kontrol) ayah paling banyak bekerja sebagai buruh 14 orang (77.8%), petani dan PNS masing-masing 1 orang (5,6%), dan karyawan swasta 2 orang (11.1%), ibu paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 17 orang (94.4%) dan wiraswasta sebanyak 1 orang (5.6%).

2. Hasil Analisis

a. Analisis Univariat

1) Perbedaan Asupan Energi, Asupan Protein, Vitamin C, Zat Besi (Fe), Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi.

Tabel 4.6

Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Vitamin C, Zat Besi (Fe), Berat badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Rata-Rata	Kelompok Intervensi & Kontrol		Independent t-test
	Kelompok I (Intervensi)	Kelompok II (Kontrol)	
Energi	853.11 Kkal	846.85 Kkal	0.924
Protein	27.14 g	29.37 g	0.337
Vitamin C	18.80	21.45	0.671
Zat Besi (Fe)	3.50	3.57	0.866
Berat Badan	17.46 kg	18.65 kg	0.006
Status Gizi (SD)	-2.38	-2.42	0.583

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata energi, protein, berat badan serta status gizi antara kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi. Untuk rata-rata energi, protein, vitamin C, zat besi (Fe), berat badan dan status gizi diperoleh hasil uji *independent t-test* pada masing-masing variabel pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi pada kotak *t-test for quality means* untuk kolom *Sig. (2-tailed)* baris pertama terlihat angka 0.924 untuk rata-rata energi, 0.337 untuk rata-rata

protein, 0.671 untuk rata-rata vitamin c, 0.866 untuk rata-rata zat besi (Fe), 0.006 untuk rata-rata berat badan dan 0.583 untuk rata-rata status gizi. Karena pada semua variabel kecuali berat badan nilainya lebih besar daripada nilai $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata energi, protein, vitamin C, zat besi (Fe) sedangkan berat badan ada perbedaan antara kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi.

2) Perbedaan Asupan Energi, Asupan Protein, Vitamin C, Zat Besi (Fe), Berat Badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi.

Tabel 4.7

Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Vitamin C, Zat Besi (Fe), Berat badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Rata-Rata	Kelompok Intervensi		Independent t-test
	Kelompok I (Intervensi)	Kelompok II (Kontrol)	
Energi	1131.79 Kkal	1188.56 Kkal	0.054
Protein	28.59 g	31.76 g	0.041
Vitamin C	17.57	18.51	0.865
Zat Besi (Fe)	4.27	4.28	0.960
Berat Badan	17.81 kg	18.99 kg	0.008
Status Gizi (SD)	-2.28	-2.34	0.546

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata energi, protein, berat badan serta status gizi antara kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi. Untuk rata-rata energi, protein, vitamin C, zat besi (Fe), berat badan dan status gizi diperoleh hasil uji *independent t-test* pada

masing-masing variabel pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) setelah intervensi pada kotak *t-test for quality means* untuk kolom *Sig. (2-tailed)* baris pertama terlihat angka 0.054 untuk rata-rata energi, 0.041 untuk rata-rata protein, 0.865 untuk rata-rata vitamin C, 0.960 untuk rata-rata zat besi (Fe), 0.008 untuk rata-rata berat badan dan 0.546 untuk rata-rata status gizi. Pada variabel energi, protein, berat badan lebih kecil daripada nilai $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata energi, protein dan berat badan. Sedangkan vitamin C, zat besi (Fe) dan status gizi tidak ada perbedaan antara kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) setelah intervensi.

b. Analisis Bivariat

1) Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu dan Biskuit Tepung Terigu Terhadap Asupan Energi Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun

Tabel 4.8

Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol)) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Asupan Energi	Mean		Paired t-test	Mean (Selisih)
	Sebelum	Setelah		
Kelompok I (Intervensi)	853.11	1131.79	0.000	278.68
Kelompok II(Kontrol)	846.85	1188.56	0.000	341.71

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan energi kelompok I (intervensi) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan energi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata asupan energi.

2) Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu dan Biskuit Tepung Terigu Terhadap Asupan Protein Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun

Tabel 4.9
Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Asupan Protein	Mean		Paired t-test	Mean (Selisih)
	Sebelum	Setelah		
Kelompok I (Intervensi)	27.14	28.59	0.407	1.45
Kelompok II(Kontrol)	29.37	31.76	0.233	2.39

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan protein pada kelompok I (intervensi) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.407$ yang lebih besar dari nilai α (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan protein pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.233$ yang lebih besar dari nilai α (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata berat badan.

3) Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu dan Biskuit Tepung Terigu Terhadap Asupan Vitamin C Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun

Tabel 4.10
Rata-rata Perubahan Asupan Vitamin C Kelompok I (Intervensi) dan
Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres
Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Asupan Vitamin C	Mean		Paired t-test	Mean (Selisih)
	Sebelum	Setelah		
Kelompok I (Intervensi)	18.80	17.57	0.855	1.23
Kelompok II(Kontrol)	21.45	18.51	0.221	2.94

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan vitamin C pada kelompok I (intervensi) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.855$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan vitamin C pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.221$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata asupan vitamin C.

4) Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu dan Biskuit Tepung Terigu Terhadap Asupan Zat Besi (Fe) Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun

Tabel 4.11
Rata-rata Perubahan Asupan Zat Besi (Fe) Kelompok I (Intervensi) dan
Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres
Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Asupan Zat Besi	Mean		Paired t- test	Mean (Selisih)
	Sebelum	Setelah		
Kelompok I (Intervensi)	3.50	4.27	0.035	0.77
Kelompok II(Kontrol)	3.57	4.28	0.049	0.71

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.11 Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan zat besi (Fe) pada kelompok I (intervensi) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.035$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata asupan zat besi (Fe) pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test*. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.049$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka terdapat pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Dari hasil uji statistika antara dua kelompok, terdapat perbedaan antara kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol). pada kelompok I (intervensi) tidak terdapat pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap kenaikan status gizi pada siswa gizi kurang. Berbeda dengan kelompok II (kontrol), dimana terdapat pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap kenaikan status gizi pada siswa gizi kurang.

5) Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu dan Biskuit Tepung Terigu Terhadap Berat Badan Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun

Tabel 4.12
Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Berat Badan	Mean		Paired t-test	Mean (Selisih)
	Sebelum	Setelah		
Kelompok I (Intervensi)	17.46	17.81	0.002	0.35
Kelompok II(Kontrol)	18.65	18.99	0.052	0.34

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.12 Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata berat badan pada kelompok I (intervensi) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.002$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata berat badan pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.052$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata berat badan.

6) Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu dan Biskuit Tepung Terigu Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun

Tabel 4.13
Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok I (Intervensi) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Status Gizi	Mean		Paired t-test	Mean (Selisih)
	Sebelum	Setelah		
Kelompok I (Intervensi)	-2.38	-2.28	0.020	-0.10
Kelompok II(Kontrol)	-2.42	-2.34	0.111	-0.08

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.13 Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata status gizi pada kelompok I (intervensi) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.020$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap rata-rata status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test*. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.111$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak terdapat pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

Dari hasil uji statistik antara dua kelompok, terdapat perbedaan antara kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol). Pada kelompok I (intervensi) terdapat pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap kenaikan status gizi pada siswa gizi kurang. Berbeda dengan kelompok II (kontrol), dimana tidak terdapat

pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap kenaikan status gizi pada siswa gizi kurang.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Juli-31 Agustus 2017 di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar kelas 2-4 dengan rentan umur 7-9 tahun yang berat badannya berada dalam kategori rendah atau gizi kurang dengan nilai *z-score* ($-3 \leq z < -2$ SD). Diperoleh 36 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Sebelum dilakukan intervensi terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang program intervensi kepada orangtua/wali siswa yang menjadi responden.

Dari 36 responden penelitian, kemudian di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol). 18 orang anak yang termasuk dalam kelompok I (intervensi) setiap hari diberikan kudapan sebanyak 100 gram biskuit ubi jalar ungu sedangkan 18 anak lainnya yang termasuk dalam kelompok kontrol diberikan kudapan sebanyak 100 gram biskuit tepung terigu.

Penelitian intervensi pada kelompok I (intervensi) dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) biskuit ubi jalar ungu 1:1 dalam 100 gram biskuit ubi jalar ungu yaitu adalah 15.5 kalori karbohidrat + 4.9 kalori protein + 66.825 kalori lemak = 87.255 kalori. Total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit ubi jalar

ungu (25 gram) adalah 348.9 kalori dan pada kelompok II (kontrol) 1:0 dalam 100 gram biskuit tepung terigu yaitu 15.2 kalori karbohidrat + 5.6 kalori protein + 67.95 kalori lemak = 355 kalori. Total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit tepung terigu (25 gram) adalah 887.5 kalori pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang di SD Inpres Borong Jambu III.

1. Asupan Energi


Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Energi yang masuk melalui makanan harus seimbang dengan kebutuhan energi seseorang. Apabila hal tersebut tidak tercapai, akan terjadi pergeseran keseimbangan kearah negatif atau positif.

Kebutuhan energi untuk setiap orang berbeda-beda, berbagai faktor yang mempengaruhi kecukupan energi yaitu berat-badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan (usia), dan jenis kelamin. Adapun kebutuhan energi pada anak sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebesar 1850 kkal per hari. Asupan energi dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall 24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur,1997) dalam (Supariasa 2002).

Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya hasil wawancara recall 24 jam dimasukkan kedalam aplikasi nutrisurvey 2007 untuk menggambarkan akumulasi asupan energi pada responden. Perubahan

asupan energi responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.1
Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2017

Pada Grafik 4.1 di atas, dapat dilihat perubahan asupan energi pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi.

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata asupan energi responden pada kelompok I (intervensi) yaitu 853.11 kkal dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 1131.79 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang dilihat pada ($\rho=0.000$). sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan energi sebelum dilakukan intervensi yaitu 846.85 kkal dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 1188.56 kkal. Hal

tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang dilihat pada ($p=0.000$).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih asupan energi mengalami peningkatan pada pertengahan intervensi, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 310.7 mg sedangkan pada kelompok I (intervensi) yaitu 241 mg, dan mengalami peningkatan diakhir intervensi juga lebih tinggi peningkatannya pada kelompok I (intervensi) yaitu sebesar 37.68 mg sedangkan pada kelompok II (kontrol) yaitu 31.01 mg. Hal tersebut dikarenakan kalori yang dihasilkan pada biskuit ubi jalar ungu yang diberikan pada kelompok I (intervensi) memiliki kalori yang lebih rendah yaitu 348.9 kkal per 100 gramnya sedangkan pada biskuit tepung terigu yang diberikan pada kelompok II (kontrol) menghasilkan kalori sebanyak 355 kkal per 100 gramnya.

Walaupun terjadi peningkatan asupan energi pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) namun jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan energi sesuai AKG (2013). Hal ini disebabkan karena kebanyakan siswa yang malas makan dan masih tingginya konsumsi jajanan pada anak yang mengakibatkan belum maksimalnya asupan makanan pokok sehari-hari dan asupan produk, serta kurangnya pengetahuan orangtua tentang gizi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ode et al. 2012) pada penelitiannya yang berjudul “Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Terhadap Status Gizi Siswa SD Inpres 2 Pannampu” bahwa tingkat pengetahuan

orangtua tentang gizi sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap dalam memilih makanan untuk anaknya. Keadaan gizi yang baik akan menentukan tingginya angka presentase status gizi secara nasional. Ketidaktahuan tentang makanan yang mempunyai gizi baik akan menyebabkan pemilihan makanan yang salah dan rendahnya gizi yang terkandung dalam makanan tersebut dan akan menyebabkan status gizi anak tersebut menjadi buruk atau kurang.

Hal ini berkaitan dalam QS. At-Taqhabun/64:15 yang berbunyi :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Kementerian Agama, 2010).

Maksud dari penggalan ayat diatas, “Sesungguhnya semua harta-harta kamu dan semua anak-anak kamu adalah ujian, terhadap diri kamu dimana kamu memperoleh harta itu dan bagaimana kamu mendidik mereka. Hal tersebut membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kamu dan ada ganjaran yang banyak lagi agung dan di sisi-Nya pula ada siksa yang pedih (Quraih Shihab, 2009:119).

Dari ayat diatas dijelaskan anak juga menjadi cobaan bagi orang tuanya. Sehingga orang tua diperingatkan untuk berhati-hati. Keindahan, kebahagiaan tidak boleh melalaikan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak boleh melalaikan tugas kita sebagai orang tua yaitu mengasuh anak dengan baik. Allah mengingatkan kembali bahwa orang tua sangatlah berperang penting dan memiliki tanggung jawab penuh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat dengan memperhatikan

makanan anak yang baik untuk dikonsumsi untuk anak dimana hal ini merupakan salah satu cobaan Allah untuk orang tua. Bagi orang tua yang lulus dari cobaan Allah akan mendapat pahala dari Allah SWT, termasuk menjaga pertumbuhan anak dengan suplai makanan yang bergizi.

2. Asupan Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada didalam otot, seperlima berada didalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh didalam kulit, dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh.

Protein mempunyai fungsi yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sebagai sumber energy dimana protein menyumbang energi sebanyak 4 kkal/gram. Apabila tubuh mengalami kekurangan zat energi maka protein terlebih dahulu akan menghasilkan energi untuk membentuk glukosa.


Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada asupan dan transportasi zat-zat gizi. Kekurangan protein yang terus menerus akan menimbulkan gejala yaitu pertumbuhan kurang baik, daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, daya kreatifitas dan daya kerja merosot, mental lemah dan lain-lain. Tingkat kecukupan asupan protein akan mempengaruhi status gizi.

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi (Almatsier 2001).

Adapun angka kecukupan protein (AKP) pada anak sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebanyak 49 gram (AKG 2013). Gambaran asupan protein dapat diperoleh dengan melakukan survey asupan makanan yaitu recall 24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur,1997) dalam (Supariasa 2002). Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi nutrisurvey 2007 untuk menggambarkan akumulasi asupan protein pada responden. Perubahan asupan protein responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.2

Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2017

Pada Grafik 4.2 di atas, dapat dilihat perubahan asupan protein pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi.

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata asupan protein responden pada kelompok I (intervensi) yaitu 27.14 gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 28.59 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang dilihat pada ($p=0.407$). sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan protein sebelum dilakukan intervensi yaitu 29.37 gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 31.76 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu

terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang dilihat pada ($\rho=0.233$).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih asupan protein mengalami peningkatan pada pertengahan intervensi, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok I (intervensi) yaitu sebesar 0.36 mg sedangkan pada kelompok II (kontrol) yaitu 0.06 mg, dan mengalami peningkatan diakhir intervensi lebih tinggi peningkatannya pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 2.33 mg sedangkan pada kelompok I (intervensi) yaitu 1.09 mg. Hal tersebut dikarenakan protein yang dihasilkan pada biskuit ubi jalar ungu yang diberikan pada kelompok I (intervensi) memiliki protein yang lebih rendah yaitu 4.95 g per 100 gramnya sedangkan pada biskuit tepung terigu yang diberikan pada kelompok II (kontrol) menghasilkan protein sebanyak 5.58 g per 100 gramnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusumawati 2015) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan secara bermakna ($\rho<0.05$) asupan energi, karbohidrat, lemak dan protein sebelum dan setelah intervensi.

3. Asupan Vitamin C


Vitamin C, dikenal pula dengan asam askorbat, merupakan vitamin yang larut air dan diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh. Selain itu, vitamin C juga berfungsi menjaga kesehatan paru-paru karena dapat menetralkan radikal bebas yang masuk melalui saluran pernapasan. Vitamin C juga meningkatkan

fungsi sel-sel darah putih yang dapat melawan infeksi dan dapat meningkatkan penyerapan zat besi sehingga dapat mencegah anemia (Dadang, 2010).

Kebutuhan vitamin C pada anak sekolah usia 7-9 tahun yaitu sebesar 45 mg per harinya. Asupan vitamin C dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall 24 jam yang dilakuknn beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur, 1997) dalam (Supariasa, 2002).

Perubahan asupan vitamin C anak sekolah sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 4.3
Grafik Perubahan Asupan Vitamin C Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber : Data Primer, 2017

Pada grafik 4.3 diatas, dapat kita lihat perubahan asupan vitamin C pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi. Pada uji statistik *paired test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi asupan

vitamin C anak sekolah pada kelompok I (intervensi) yaitu 18.80 mg dan mengalami penurunan setelah intervensi menjadi 17.57 mg. Hal tersebut menunjukkan bahwa “Tidak ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap perubahan asupan vitamin C pada anak sekolah” dilihat pada ($p=0.855$), sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan vitamin C sebelum intervensi yaitu 21.45 mg dan mengalami penurunan setelah intervensi menjadi 18.51 mg. Hal tersebut menunjukkan bahwa “Tidak ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap perubahan asupan vitamin C pada anak sekolah” ($p=0.221$).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok selisih rata-rata asupan vitamin C mengalami penurunan pada pertengahan intervensi, namun penurunannya jauh lebih tinggi pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 4.44 mg sedangkan pada kelompok I (intervensi) yaitu 3.79 mg, dan mengalami peningkatan diakhir intervensi lebih tinggi peningkatannya pada kelompok I (intervensi) yaitu sebesar 2.56 mg sedangkan pada kelompok II (kontrol) yaitu 1.50 mg.

Hal tersebut dikarenakan pada kedua kelompok ada beberapa anak yang pernah jatuh sakit, anak yang jatuh sakit lebih banyak pada kelompok II (kontrol) sebanyak 6 anak, sedangkan pada kelompok I (intervensi) sebanyak 4 anak sekolah. Pada awal intervensi ada 1 anak yang mengalami sakit gigi selama 2 hari pada kelompok I (intervensi), pada pertengahan intervensi lebih banyak yang jatuh sakit pada kelompok I (kontrol) sebanyak 5 anak, 4 anak yang mengalami demam selama 2 hari dan 1 anak yang demam selama 1 hari sedangkan pada kelompok I (intervensi)

sebanyak 3 anak dan mengalami demam selama 2 hari. Pada akhir intervensi ada 1 anak yang mengalami sakit mata juga mengalami demam selama 2 hari pada kelompok II (kontrol). Sehingga konsumsi biskuit yang diintervensikan tidak semuanya dihabiskan selama anak sekolah tersebut jatuh sakit dikarenakan rata-rata konsumsi produk pada kelompok I (intervensi) yang dihabiskan sebanyak 83.312 gram, menunjukkan bahwa dari 18 responden yang berada dibawah rata-rata konsumsi produk sebanyak 6 anak (33.3%) dan diatas rata-rata konsumsi produk sebanyak 12 anak (66.7%), sedangkan pada kelompok II (kontrol) yang dikonsumsi sebanyak 81.96 gram dari 18 responden yang berada dibawah rata-rata konsumsi produk sebanyak 11 anak (61.1%) dan diatas rata-rata konsumsi produk sebanyak 7 anak (38.9%) seperti yang dilampirkan pada lampiran 9 dan lampiran 10. Ditambah lagi kurangnya frekuensi konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah yang diintervensi baik di kelompok I (intervensi) maupun kelompok II (kontrol) penelitian ini selaras dengan hasil survey BPS (2009) yang menyatakan bahwa konsumsi buah di Indonesia masih rendah yaitu 60,4% masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi 1 porsi buah atau bahkan kurang dalam sehari. Selain itu hasil RISKESDAS (2013) juga menunjukkan bahwa terdapat 93,5% penduduk Kabupaten Gowa kurang mengkonsumsi buah dan sayur, maka kedua kelompok mengalami penurunan asupan vitamin C pada saat intervensi berlangsung.


4. Asupan Zat Besi

Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut electron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Zat besi dalam tubuh berperan penting dalam berbagai reaksi biokimia, antara lain dalam memproduksi sel darah merah. Sel ini sangat diperlukan untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Zat besi berperan sebagai pembawa oksigen, bukan saja oksigen pernapasan menuju jaringan, tetapi juga dalam jaringan atau dalam sel (Brock dan Mainou-Fowler (1986) dalam King 2006).

Kebutuhan zat besi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yaitu sebesar 10 mg per harinya. Asupan zat besi dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall 24 jam yang dilakuknn beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur, 1997) dalam (Supariasa, 2002).

Perubahan asupan zat besi anak sekolah sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 4.4
Perubahan Asupan Zat besi Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber : Data Primer, 2017

Pada grafik 4.4 diatas, dapat kita lihat perubahan asupan zat besi pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi. Pada uji statistik *paired test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi zat besi anak sekolah pada kelompok I (intervensi) yaitu, 3.50 mg dan mengalami peningkatan setelah intervensi menjadi 4.27 mg. Hal tersebut menunjukkan bahwa “Ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap perubahan asupan zat besi pada anak sekolah” dilihat pada ($p=0.035$), sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan zat besi sebelum intervensi yaitu 3.57 mg dan mengalami peningkatan setelah intervensi menjadi 4.28 mg. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa “Ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap perubahan asupan zat besi pada anak sekolah” ($p=0.049$).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok selisih rata-rata asupan zat besi mengalami penurunan pada pertengahan intervensi, namun penurunannya jauh lebih tinggi pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 0.12 mg sedangkan pada kelompok I (intervensi) yaitu, 0.09 mg, dan mengalami peningkatan diakhir intervensi lebih tinggi peningkatannya pada kelompok I (intervensi) yaitu sebesar 0.86 mg sedangkan pada kelompok II (kontrol) yaitu, 0.83 mg. Hal tersebut dikarenakan beberapa anak sekolah ada yang jatuh sakit sehingga konsumsi biskuit yang diintervensikan tidak semuanya dihabiskan selama anak sekolah tersebut jatuh sakit. Ditambah lagi kebiasaan anak sekolah yang di intervensi baik di kelompok I (intervensi) maupun kelompok II (kontrol) memiliki kebiasaan mengkonsumsi the gelas yang hampir di konsumsi tiap hari oleh beberapa anak sehingga menyebabkan penyerapan zat besi terhambat hal ini sejalan dalam penelitian yang dirilis oleh “Journal of Human Nutrition and Diabetics”, konsumsi berlebihan tanin yang terdapat dalam teh menghambat penyerapan zat besi non-heme dalam tubuh dan dengan demikian memicu kekurangan zat besi.

5. Berat Badan


Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai keadaan suatu gizi manusia. Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram (Mabella 2000)

Pada keadaan normal, dimana kondisi kesehatan seseorang dan seimbang antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi tubuh terjamin, maka berat badan juga bertambah seiring bertambahnya umur. Sedangkan pada keadaan abnormal, penambahan berat badan dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari keadaan normal.

Berat badan merupakan salah satu parameter penilaian status gizi yang sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan yang menurun. Parameter berat badan ini dinyatakan dalam bentuk Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka Indeks BB/U lebih dapat menggambarkan kondisi seseorang.

Berikut adalah grafik perubahan rata-rata berat badan pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) mulai dari sebelum dan setelah intervensi.

Grafik 4.5
Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2017

Pada grafik 4.5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemberian biskuit ubi jalar ungu pada kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol).

Hal tersebut ditunjukkan pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata berat badan responden kelompok I (intervensi) sebelum intervensi yaitu 17.46 kg menjadi 17.69 kg setelah intervensi. Sedangkan pada kelompok II (kontrol) sebelum intervensi yaitu 8.78 kg menjadi 9.02 kg setelah intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan berat badan pada kedua kelompok dengan hasil uji *paired t-test* didapatkan nilai ($\rho=0.014$) pada kelompok I (intervensi) dan ($\rho=0.000$) pada kelompok II (kontrol). Karena nilai p kedua kelompok tersebut kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu pada kelompok I (intervensi) dan pemberian biskuit tepung terigu pada kelompok II (kontrol).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih berat badan mengalami peningkatan pada pertengahan intervensi, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 0.25 mg sedangkan pada kelompok I (intervensi) yaitu 0.24 mg, dan mengalami peningkatan diakhir intervensi lebih tinggi peningkatannya pada kelompok I (intervensi) yaitu sebesar 0.11 mg sedangkan pada kelompok II (kontrol) yaitu 0.07 mg.

6. Status Gizi


Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Oleh karena itu, makanan bagi tubuh mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan sel-sel yang rusak. Status gizi adalah suatu tanda-tanda atau penampilan fisik yang diakibatkan karena adanya keseimbangan antara gizi seseorang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi atau asupan makanan dan status kesehatan. Adapun akibat dari tidak seimbangya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat.

Pengukuran status gizi yang paling sering dan umum digunakan adalah penilaian status gizi secara antropometri, yaitu menggunakan ukuran tubuh manusia. Parameter yang digunakan antara lain berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Indeks antropometri yang digunakan antara lain BB/U, TB/U dan BB/TB (Supariasa 2002).

Adapun pada penelitian ini, menggunakan indeks BB/U dengan ambang batas status gizi kurang yaitu (-3SD sampai <-2SD). Hasil dari pengukuran anthropometri selanjutnya dimasukkan kedalam aplikasi *WHO Anthroplus* untuk mendapatkan nilai *z-score* yang selanjutnya dicocokkan dengan tabel status gizi pada buku SK Antropometri 2010 untuk mengetahui kalsifikasi status gizi pada anak.

Berikut adalah grafik perubahan status gizi kelompok I (intervensi) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi.

Grafik 4.6
Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2017

Dari grafik 4.6 terlihat adanya perubahan status gizi anak sekolah yang mengalami gizi kurang sebelum dan setelah intervensi. Terdapat peningkatan status gizi pada kedua kelompok perlakuan.

Hasil uji *paired t-test* pada variable status gizi kelompok I (intervensi) sebelum dan setelah intervensi terdapat angka ($p=0.023$) karena nilai $p<0.05$ maka dianggap terdapat perbedaan pada nilai rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang pada kelompok I (intervensi)”. Sedangkan pada kelompok II(kontrol) setelah dilakukan uji *paired t-test* pada variable status gizi sebelum dan setelah intervensi terdapat angka ($p=0.111$) karena nilai $p>0.05$ maka dianggap tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Maka dapat

disimpulkan bahwa “tidak ada pengaruh pemberian biskuit tepung terigu terhadap status gizi siswa gizi kurang pada kelompok II (kontrol)”. Hal ini disebabkan oleh peningkatan rata-rata berat badan pada kelompok II (kontrol) yang lebih kecil sehingga kurang berpengaruh terhadap peningkatan status gizi pada anak gizi kurang.

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih asupan protein mengalami peningkatan pada pertengahan intervensi, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok I (intervensi) yaitu sebesar -0.09 mg sedangkan pada kelompok II (kontrol) yaitu -0.05 mg, dan mengalami peningkatan diakhir intervensi lebih tinggi peningkatannya pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar -0.03 mg sedangkan pada kelompok I (intervensi) yaitu -0.01 mg.

Pada kedua kelompok perlakuan, walaupun terjadi peningkatan status gizi kearah status gizi yang baik pada kedua kelompok, namun kedua kelompok tersebut masih terdapat dalam kategori gizi kurang hal ini terlihat dari nilai rata-rata status gizi pada kelompok I (intervensi) setelah intervensi yaitu -2.27 dan pada kelompok II (kontrol) setelah intervensi yaitu -2.34. nilai rata-rata status gizi tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok masih berada pada kisaran angka < -2 SD yang menunjukkan bahwa kedua kelompok masihlah dalam kategori gizi kurang.

Hal ini disebabkan karena status gizi adalah variabel terikat yang tidak konstan, sehingga amatlah penting mempertimbangkan durasi (lama) pemberian makanan tambahan pada anak. Efek perubahan status gizi kemungkinan dapat terlihat secara signifikan jika durasi pemberian makanan tambahan lebih lama (Marsaoly,

Michran 2011). Sejalan dengan pernyataan tersebut (Widodo dkk 2015) menyatakan bahwa intervensi selama 90 hari dapat meningkatkan status gizi BB/U, BB/TB, dan Kadar Albumin anak Gizi Kurang. Namun dalam penelitian ini, intervensi diberikan pada anak sekolah usia 7-9 tahun hanya selama 30 hari disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah bahan baku prodak intervensi yang digunakan yaitu ubi jalar ungu.

Didalam al-Qur'an telah diperintahkan agar manusia merubah diri ke arah yang lebih baik, dalam hal ini yaitu mengubah asupan makanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Rad/13:11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ.... ﴿١١﴾

Terjemahnya:

„,Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.... (Kementerian Agama RI, 2010).

Makna dari ayat tersebut yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang terlebih dahulu mengubah nasibnya. Disinilah Allah akan melihat ikhtiar hambanya. Sebagai muslim kita tidak boleh menyerah saja kepada takdir, tetapi kita percaya akan adanya takdir (Hamka 1983).

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah swt tidak akan mengubah keadaan seseorang melainkan adanya kesadaran dari diri-nya sendiri untuk berubah kearah yang lebih baik. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu, dengan mengetahui sumber daya alam yang ada dan manfaat yang terkandung di

dalamnya. Dalam hal ini yaitu ubi jalar ungu memiliki kandungan zat gizi yang baik khususnya zat gizi makro beserta senyawa antioksidan yang baik untuk mengatasi kejadian malnutrisi/KEP pada anak sekolah, maka diharapkan kepada masyarakat agar memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai alternatif makanan tambahan sehingga perlahan-lahan akan memberikan dampak yang bagus bagi anak yaitu mengubah status gizi anak dari status gizi kurang ke status gizi yang baik. karena perubahan status gizi kearah yang lebih baik akan terjadi apabila adanya usaha dari diri sendiri untuk merubahnya kearah yang lebih baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu :

1. Frekuensi pemberian yang hanya dilakukan 1 kali/hari sehingga kurang tercapainya konsumsi prodak yang maksimal pada anak sekolah usia 7-9 tahun.
2. Adanya keterbatasan peneliti untuk mengontrol faktor lain yang memengaruhi status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun.
3. Tidak dilakukannya pengukuran aktivitas pada responden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar tentang pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, asupan protein, berat badan, dan status gizi pada siswa gizi kurang sebelum dan setelah pemberian biskuit ubi jalar ungu pada kelompok I (intervensi) dan pemberian biskuit tepung terigu pada kelompok II (kontrol) selama 30 hari.
2. Tidak terdapat perbedaan rata-rata vitamin C dan zat besi pada siswa gizi kurang sebelum dan setelah pemberian biskuit ubi jalar ungu pada kelompok I (intervensi) dan pemberian biskuit tepung terigu pada kelompok II (kontrol) selama 30 hari.
3. Terdapat pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap perubahan status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar tentang pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu (*ipomoea batatas l. poiret*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9

tahun di SD inpres borong jambu III, maka ada beberapa saran yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Agar orangtua lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak mereka sehingga kualitas gizi pada anak menjadi lebih baik.
2. Diharapkan kepada pihak sekolah agar mengaktifkan kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan adanya pengawasan dari institusi kesehatan setempat sehingga dapat dilakukan penilaian status gizi serta penyuluhan gizi secara berkala guna dilaksanakannya upaya-upaya preventif kejadian malnutrisi pada siswa.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang durasi dan frekuensi yang efisien untuk pemberian intervensi biskuit ubi jalar ungu mendapat hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, Hariza. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta, Nuha Medika. 2011.
- Adriana, D. *Tumbuh kembang dan terapi bermain pada anak*. Jakarta: Salemba Medika. 2014.
- Adriani, M. 2014. *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Alatas, S. S. *Status Gizi Anak Usia Sekolah (7-12 Tahun) dan Hubungannya dengan Tingkat Asupan Kalsium Harian di Yayasan Kampungkids Pejaten Jakarta Selatan Tahun 2009*. Universitas Indonesia. 2011.
- Almatsier, sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi Cetakan Ke Sembilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010.
- Amriani. "Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L. Poiret*) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi di Masyarakat". *Skripsi*. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 2017, 3: 74, 75, 76.
- Apriliyanti, Tina. "Kajian Sifat Fisikokimia Dan Sensori Tepung Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas Blackie*) Dengan Variasi Proses Pengeringan". *Skripsi*. Surakarta : Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Balitkabi (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian). *Varietas Unggul Aneka Kacang dan Umbi. Artikel Penelitian*. 2015.
- BPS (Badan Pusat Statistik). *Data Statistik Konsumsi Buah*. 2015.
- Data SD Inpres Borong Jambu III. *Data Penimbangan Anak Sekolah*. Makassar: SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala. 2017.
- Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dinas Pertanian Sulawesi Selatan. *Data Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar*. 2015.

- Dwiyani, Hanifah. "Formulasi Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Tepung Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn Balita Gizi Kurang". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. 2013.
- Enny Susilowati. "Perbedaan Status Gizi Anak Sekolah Dasar Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di SDN Plalan I Kota Surakarta". *Skripsi*. Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.
- Gunawan, dkk. "Penilaian Konsumsi Pangan Metode Penimbangan Pangan Makanan (Food Weighing)". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. 2010.
- Hartriyanti, Y. & Triyanti. (2007). *Penilaian Status Gizi*. In : Syafiq, A. et all, eds. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, Beni *et al.* Karakterisasi Tepung Ubi Kayu Modifikasi Yang Diproses Menggunakan Metode Prigelatinisasi Parsial. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian* vol. 14, no 2, (September 2009).
- Husna, dkk. 2013. *Kandungan Antosianin Dan Aktivitas Antioksidan Ubi Jalar Ungu Segar Dan Produk Olahannya*. AGRITECH Vol. 33 No. 3.
- Karleen, Saffiera. "Optimasi Proses Pembuatan Tepung Ubi jalar Ungu (*Ipomeeabatatas (L.) Lam*) dan Aplikasinya dalam Pembuatan Keripik Simulasi (*Simulated Chips*)". *Skripsi*. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. 2010.
- Kemenkes. *Angka Kecukupan Anak*. 2013.
- Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2010.
- Kusuma, Rizal Darma. Kajian Karakteristik Organoleptik Dan Fisikokimia *Cookies* Kombinasi Tepung Terigu Tepung Millet Merah dan Tepung Ubi Jalar Ungu". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.
- Kusumawati, H,. Perbedaan Asupan Zat Gizi Makro Sebelum dan Setelah Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Bubur Instan Berbasis Ikan Gabus dan Labu Kuning Pada Anak Gizi Kurang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2015.

- Meita A Kuncoro, Dkk. "Pengaruh Pemberian Suplemen Zink Intrauterin Terhadap Berat Badan Anak Di Kabupaten Takalar". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 2012.
- Michran Marsaoly, Dkk. "Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (Telur Rebus Dan Bubur Kacang Hijau) Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 2011
- Ode, L. et al. *Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Terhadap Status Gizi Siswa SD Inpres 2 Pannampu*. Makassar: SD Inpres 2 Pannampu. 2012, 2: 2, 3.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian) Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Putri, Afika Iknar Wijaya. "Pengaruh Substitusi Tepung Jamur Tiram Terhadap Tingkat Kekerasan dan Daya Terima Biskuit Ubi Jalar Ungu" *Skripsi*. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.
- Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar). *Data Statistik Anak Gizi Kurang*. 2007
- Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar). *Data Statistik Anak Gizi Kurang*. 2010
- Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar). *Data Statistik Anak Gizi Kurang*. 2013
- Raihana. "Pengaruh Pemberian Jus Tempe Pisang Terhadap Status Gizi Pada Anak Batita Kekurangan Energi Protein Di Wilayah Kerja Puskesmas Pabentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014". *Skripsi*. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.
- Shihab, M.Q. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M.Q. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- SNI (Standar Nasional Indonesia). "*Uji Bahan Makanan dan Minuman*". Badan Standardisasi Nasional SNI 01-298-2011.
- Seprianty, Vita dkk. *Status Gizi Anak Kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 Sungalilin*. Palembang, 2015.
- Supariasa, dkk. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001.

Suparyanto. *Anak Gizi Kurang dan Cara Pengukurannya*. Jakarta, 2014.

Syarfaini, Dkk.. “Pengaruh Pemberian Nugget Tempe Dengan Substitusi Ikan Gabus Terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar Di Mis Ddi Ainus Syamsi Kel.Lette, Kota Makassar”. *Skripsi*. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 2014.

Putri, Afika Iknar Wijaya. “Pengaruh Substitusi Tepung Jamur Tiram Terhadap Tingkat Kekerasan dan Daya Terima Biskuit Ubi Jalar Ungu” *Skripsi*. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

Winata, Vincentius Yafet. Kualitas Biskuit dengan Kombinasi Tepung Kacang Mete (*Anacardium Occidentale L.*) dan Tepung Kulit Singkong (*Manihot Esculenta*). *Skripsi*. Program Studi Biologi Fakultas Teknologi Universitas Atma Jaga Yogyakarta. 2015.

Yenita. *Gizi Anak Sekolah dan Gizi Remaja*. Jakarta, 2012.

Zuraida, N. dan Supriyati, Y. 2001. Usahatani Ubi Jalar Sebagai Bahan Pangan Alternatif dan Diversifikasi Sumber Karbohidrat. *Buletin AgroBio* 4 (1): 13-23.

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 1

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Penelitian Mengenai Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (Ipomea Batatas L. Poiret) Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun Di
Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama :
Umur :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Orang Tua Anak :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden yang akan dilakukan oleh Musdalipa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dalam penelitian ini ada perubahan/keberatan menjadi responden dapat mengajukan pengunduran diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 2017

Mengetahui/menyetujui,

Orang tua/ wali anak

()

Lampiran 2

FORMULIR FOOD RECALL 24 JAM ANAK SEKOLAH DI SD INPRES BORONG JAMBU III KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

No. responden :

Nama :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Berat Badan :

Waktu	Jenis Makanan/ Bahan Makanan	Cara Pengolahan	Jumlah/Ukuran	
			URT	Gram
Pagi				
Selingan				
Siang				

Selingan				
Malam				
Selingan				

Keterangan

URT : Ukuran Rumah Tangga misalnya, piring, mangkok, sendok, gelas, dll.

Apakah Anda menghabiskan makanan yang anda konsumsi ?



Lampiran 2

FORMULIR FOOD RECALL 24 JAM ANAK SEKOLAH DI SD INPRES BORONG JAMBU III KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

No. responden :

Nama :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Berat Badan :

Waktu	Jenis Makanan/ Bahan Makanan	Cara Pengolahan	Jumlah/Ukuran	
			URT	Gram
Pagi				
Selingan				
Siang				

Selingan				
Malam				
Selingan				

Keterangan

URT : Ukuran Rumah Tangga misalnya, piring, mangkok, sendok, gelas, dll.

Apakah Anda menghabiskan makanan yang anda konsumsi ?



Lampiran 3

FORM DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI
PENGARUH PEMBERIAN BISKUIT UBI JALAR UNGU TERHADAP STATUS GIZI
KURANG PADA ANAK SEKOLAH USIA 7-9 TAHUN DI SD INPRES BORONG
JAMBU III KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

Nama Siswa :

Pengukuran Ke	Hari/Tanggal Pengukuran	BB (kg)



Lampiran 4

FORM PEMANTAUAN KONSUMSI BISKUIT UBI JALAR UNGU

(IPOMEA BATATAS L.POIRET)

No	Hari/Tanggal	Total Yang Dikonsumsi (gram)	Keterangan Masalah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Rata-tata			

Lampiran 5

FORM PEMANTAUAN KONSUMSI BISKUIT TEPUNG TERIGU

No	Hari/Tanggal	Total Yang Dikonsumsi (gram)	Keterangan Masalah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Rata-tata			

Lampiran 7

KANDUNGAN GIZI BISKUIT UBI JALAR UNGU DAN BISKUIT TEPUNG TERIGU DALAM 100 GRAM

	Karbohidrat (g)	Protein (g)	Lemak (g)	Vitamin C (mg)	Zat Besi (mg)
Biskuit Ubi Jalar Ungu (1:1)	15.59	4.95	29.76	44.66	0.103
Biskuit Tepung Terigu (1:0)	15.23	5.58	30.2	34.48	0.082

Catatan :

1. Kalori yang dihasilkan pada biskuit ubi jalar ungu dalam 100 gram : 348.9 kkal., dan pemberian sebanyak 100 gram.
2. Kalori yang dihasilkan pada biskuit tepung terigu dalam 100 gram : 355 kkal, dan pemberian sebanyak 100 gram.

1. Kalori yang dihasilkan dalam 100 gram biskuit ubi jalar ungu

Kandungan karbohidrat dalam 1 gram biskuit ubi jalar ungu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{15.59}{100} = 0.155 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.155 \times 4 = 0.62$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.155 = 3.875$ gram

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan karbohidrat sebesar $3.875 \times 4 = 15.5$ kalori

Kandungan protein dalam 1 gram biskuit jalar ungu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{4.95}{100} = 0.049 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.049 \times 4 = 0.196$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.049 \text{ gram} = 1.225$ gram

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan protein sebesar $1.225 \times 4 = 4.9$ kalori

Kandungan lemak dalam 1 gram biskuit jalar ungu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{29.76}{100} = 0.297 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.297 \times 9 = 2.673$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.297 \text{ gram} = 7.425$ gram

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan lemak sebesar $7.425 \times 9 = 66.825$ kalori

Jadi, total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit ubi jalar ungu (25 gram) adalah 15.5 kalori karbohidrat + 4.9 kalori protein + 66.825 kalori lemak = 87.225 kalori. Total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit ubi jalar ungu (100 gram) adalah 348.9 kalori.

2. Kalori yang dihasilkan dalam 100 gram biskuit tepung terigu

Kandungan karbohidrat dalam 1 gram biskuit tepung terigu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{15.23}{100} = 0.152 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.152 \times 4 = 0.60$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.152 = 3.8$ gram

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan karbohidrat sebesar $3.8 \times 4 = 15.2$ kalori

Kandungan protein dalam 1 gram biskuit tepung terigu:

$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{5.58}{100} = 0.056 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.056 \times 4 = 0.224$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.056 \text{ gram} = 1.4 \text{ gram}$

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan protein sebesar $1.4 \times 4 = 5.6$ kalori

Kandungan lemak dalam 1 gram biskuit tepung terigu:


$$1 \text{ gram biskuit} = \frac{30.2}{100} = 0.302 \text{ gram}$$

1 gram biskuit menghasilkan energi sebesar $0.302 \times 9 = 2.718$ kalori

1 keping biskuit (25 gram) = $25 \times 0.302 \text{ gram} = 7.55 \text{ gram}$

1 keping biskuit (25 gram) menghasilkan lemak sebesar $7.55 \times 9 = 67.95$ kalori

Jadi, total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit tepung terigu (25 gram) adalah $15.2 \text{ kalori karbohidrat} + 5.6 \text{ kalori protein} + 67.95 \text{ kalori lemak} = 88.75 \text{ kalori}$. Total energi yang dihasilkan dalam 1 keping biskuit tepung terigu (100 gram) adalah 355 kalori.



Lampiran 8

DOKUMENTASI PENELITIAN

**BISKUIT TEPUNG UBI JALAR UNGU DAN BISKUIT TEPUNG TERIGU
DIINTERVENSIKAN KEPADA ANAK SEKOLAH GIZI KURANG**



RECALL 24 JAM



ALAUDDIN
MAKASSAR

**PEMBERIAN BISKUIT UBI JALAR UNGU DAN BISKUIT TEPUNG
TERIGU**



UNIVERSITAS
LAUDER
MAKASSAR

PENIMBANGAN BERAT BADAN



Lampiran 10

JUMLAH DIATAS DAN DIBAWAH RATA-RATA KONSUMSI PRODUK PADA KELOMPOK I (INTERVENSI) DAN KELOMPOK II (KONTROL)

Statistics

		Kelompok I (Intervensi)	Kelompok II (Kontrol)
N	Valid	18	18
	Missing	0	0

Kelompok I (Intervensi)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	dibawah rata-rata	6	33.3	33.3	33.3
	diatas rata-rata	12	66.7	66.7	100.0
Total		18	100.0	100.0	

Kelompok II (Kontrol)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	dibawah rata-rata	11	61.1	61.1	61.1
	diatas rata-rata	7	38.9	38.9	100.0
Total		18	100.0	100.0	

Lampiran 11

HASIL ANALISIS SPSS

Kelompok I (INTERVENSI)

JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	11	61.1	61.1	61.1
	PEREMPUAN	7	38.9	38.9	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

KELAS SISWA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KELAS 2	14	77.8	77.8	77.8
	KELAS 3	4	22.2	22.2	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

UMUR (TAHUN)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7 TAHUN	12	66.7	66.7	66.7
	8 TAHUN	6	33.3	33.3	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERAKHIR AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	6	33.3	33.3	33.3
	SMP	5	27.8	27.8	61.1
	SMA	7	38.9	38.9	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERAKHIR IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	2	11.1	11.1	11.1
	SD	6	33.3	33.3	44.4
	SMP	5	27.8	27.8	72.2
	SMA	5	27.8	27.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PEKERJAAN AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BURUH	9	50.0	50.0	50.0
	WIRASWASTA	8	44.4	44.4	94.4
	KARYAWAN SWASTA	1	5.6	5.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PEKERJAAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	18	100.0	100.0	100.0

STATUS GIZI SETELAH INTERVENSI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	GIZI KURANG	15	83.3	83.3	83.3
	GIZI BAIK	3	16.7	16.7	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Kelompok II (Kontrol)

JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	7	38.9	38.9	38.9
	PEREMPUAN	11	61.1	61.1	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

KELAS SISWA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KELAS 3	14	77.8	77.8	77.8
	KELAS 4	4	22.2	22.2	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

UMUR (TAHUN)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8 TAHUN	13	72.2	72.2	72.2
	9 TAHUN	5	27.8	27.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERAKHIR AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	1	5.6	5.6	5.6
	SD	6	33.3	33.3	38.9
	SMP	6	33.3	33.3	72.2
	SMA	5	27.8	27.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERAKHIR IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	7	38.9	38.9	38.9
	SMP	5	27.8	27.8	66.7
	SMA	6	33.3	33.3	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PEKERJAAN AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BURUH	14	77.8	77.8	77.8
	KARYAWAN SWASTA	2	11.1	11.1	88.9
	PNS	1	5.6	5.6	94.4
	PETANI	1	5.6	5.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

PEKERJAAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	17	94.4	94.4	94.4
	WIRASWASTA	1	5.6	5.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

STATUS GIZI SETELAH INTERVENSI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	GIZI KURANG	15	83.3	83.3	83.3
	GIZI BAIK	3	16.7	16.7	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

UJI NORMALITAS

SEBELUM INTERVENSI

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		KELOMPOK	NILAI ENERGI	NILAI PROTEIN	NILAI VITAMIN C	NILAI ZAT BESI	NILAI BB	NILAI STATUS GIZI
N		36	36	36	36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.5000	849.9861	28.2611	20.1292	3.5389	18.0556	-2.4072
	Std. Deviation	.50709	192.10252	6.87248	18.34162	1.34950	1.34832	.22028
Most Extreme Differences	Absolute	.338	.145	.116	.236	.230	.098	.090
	Positive	.338	.145	.116	.236	.230	.098	.057
	Negative	-.338	-.070	-.088	-.147	-.081	-.098	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		2.028	.869	.699	1.419	1.382	.591	.542
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001	.437	.714	.036	.044	.876	.931

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

SETELAH INTERVENSI

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		KELOMPOK	NILAI ENERGI	NILAI PROTEIN	NILAI VITAMIN C	NILAI ZAT BESI	NILAI BB	NILAI STATUS GIZI
N		36	36	36	36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.5000	1160.1806	30.1792	18.0417	4.2792	18.4056	-2.3122
	Std. Deviation	.50709	88.84011	4.69181	16.18680	1.93577	1.36381	.27642
Most Extreme Differences	Absolute	.338	.083	.116	.188	.142	.086	.105
	Positive	.338	.070	.116	.188	.142	.086	.080
	Negative	-.338	-.083	-.073	-.153	-.111	-.050	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		2.028	.498	.694	1.127	.854	.514	.629
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001	.965	.722	.158	.459	.954	.824

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

UJI INDEPENDENT

SEBELUM INTERVENSI

Group Statistics

	KELOMPOK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NILAI ENERGI	KASUS	18	853.1167	232.28347	54.74974
	KONTROL	18	846.8556	148.32796	34.96124
NILAI PROTEIN	KASUS	18	27.1444	6.25326	1.47391
	KONTROL	18	29.3778	7.44960	1.75589
NILAI VITAMIN C	KASUS	18	18.8056	17.83984	4.20489
	KONTROL	18	21.4528	19.25226	4.53780
NILAI ZAT BESI	KASUS	18	3.5000	1.48374	.34972
	KONTROL	18	3.5778	1.24289	.29295
NILAI BB	KASUS	18	17.4611	1.14025	.26876
	KONTROL	18	18.6500	1.30170	.30681
NILAI STATUS GIZI	KASUS	18	-2.3867	.20985	.04946
	KONTROL	18	-2.4278	.23446	.05526


Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
								95% Confidence Interval of the Difference		
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
NILAI ENERGI	Equal variances assumed	3.160	.084	.096	34	.924	6.26111	64.96016	-125.75381	138.27603
	Equal variances not assumed			.096	28.887	.924	6.26111	64.96016	-126.61981	139.14204
NILAI PROTEIN	Equal variances assumed	1.481	.232	-.974	34	.337	-2.23333	2.29250	-6.89225	2.42558
	Equal variances not assumed			-.974	33.009	.337	-2.23333	2.29250	-6.89741	2.43074
NILAI VITAMIN C	Equal variances assumed	.002	.967	-.428	34	.671	-2.64722	6.18650	-15.21970	9.92525
	Equal variances not assumed			-.428	33.805	.671	-2.64722	6.18650	-15.22238	9.92793
NILAI ZAT BESI	Equal variances assumed	2.179	.149	-.170	34	.866	-.07778	.45621	-1.00490	.84935
	Equal variances not assumed			-.170	32.986	.866	-.07778	.45621	-1.00595	.85040
NILAI BB	Equal variances assumed	.106	.747	-2.915	34	.006	-1.18889	.40788	-2.01780	-.35998
	Equal variances not assumed			-2.915	33.421	.006	-1.18889	.40788	-2.01833	-.35945
NILAI STATUS GIZI	Equal variances assumed	.061	.807	.554	34	.583	.04111	.07416	-.10961	.19183
	Equal variances not assumed			.554	33.590	.583	.04111	.07416	-.10968	.19190

SETELAH INTERVENSI

Group Statistics

	KELOMPOK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NILAI ENERGI	KASUS	18	1131.7972	75.51861	17.79991
	KONTROL	18	1188.5639	94.02304	22.16144
NILAI PROTEIN	KASUS	18	28.5944	3.42130	.80641
	KONTROL	18	31.7639	5.31955	1.25383
NILAI VITAMIN C	KASUS	18	17.5722	15.39567	3.62879
	KONTROL	18	18.5111	17.37654	4.09569
NILAI ZAT BESI	KASUS	18	4.2778	1.73300	.40847
	KONTROL	18	4.2806	2.17060	.51162
NILAI BB	KASUS	18	17.8167	1.06177	.25026
	KONTROL	18	18.9944	1.40272	.33062
NILAI STATUS GIZI	KASUS	18	-2.2839	.23917	.05637
	KONTROL	18	-2.3406	.31370	.07394



Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
NILAI ENERGI	Equal variances assumed	.092	.763	-1.997	34	.054	-56.76667	28.42475	-114.53270	.99937
	Equal variances not assumed			-1.997	32.488	.054	-56.76667	28.42475	-114.63188	1.09855
NILAI PROTEIN	Equal variances assumed	3.769	.061	-2.126	34	.041	-3.16944	1.49077	-6.19904	-.13985
	Equal variances not assumed			-2.126	29.009	.042	-3.16944	1.49077	-6.21836	-.12053
NILAI VITAMIN C	Equal variances assumed	.029	.866	-.172	34	.865	-.93889	5.47200	-12.05934	10.18156
	Equal variances not assumed			-.172	33.514	.865	-.93889	5.47200	-12.06528	10.18751
NILAI ZAT BESI	Equal variances assumed	.300	.588	-.004	34	.997	-.00278	.65468	-1.33324	1.32768
	Equal variances not assumed			-.004	32.411	.997	-.00278	.65468	-1.33565	1.33009
NILAI BB	Equal variances assumed	.183	.671	-2.840	34	.008	-1.17778	.41466	-2.02047	-.33509
	Equal variances not assumed			-2.840	31.666	.008	-1.17778	.41466	-2.02276	-.33279
NILAI STATUS GIZI	Equal variances assumed	2.629	.114	.609	34	.546	.05667	.09298	-.13229	.24562
	Equal variances not assumed			.609	31.772	.547	.05667	.09298	-.13278	.24611

UJI PAIRED


KELOMPOK I (INTERVENSI)

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRETEST ENERGI	853.1167	18	232.28347	54.74974
	POST TEST ENERGI	1131.7972	18	75.51861	17.79991
Pair 2	PRE TEST PROTEIN	27.1444	18	6.25326	1.47391
	POST TEST PROTEIN	28.5944	18	3.42130	.80641
Pair 3	PRE TEST VITAMIN C	18.2500	18	18.06357	4.25762
	POST TEST VITAMIN C	17.3500	18	15.54564	3.66414
Pair 4	PRE TEST ZAT BESI	3.5000	18	1.48374	.34972
	POST TEST ZAT BESI	4.2778	18	1.73300	.40847
Pair 5	PRE TEST BB	17.4611	18	1.14025	.26876
	POST TEST BB	17.8167	18	1.06177	.25026
Pair 6	PRE TEST STATUS GIZI	2.0000	18	.00000	.00000
	POST TEST STATUS GIZI	2.2222	18	.42779	.10083

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PRETEST ENERGI & POST TEST ENERGI	18	.711	.001
Pair 2	PRE TEST PROTEIN & POST TEST PROTEIN	18	-.035	.890
Pair 3	PRE TEST VITAMIN C & POST TEST VITAMIN C	18	.630	.297
Pair 4	PRE TEST ZAT BESI & POST TEST ZAT BESI	18	.608	.007
Pair 5	PRE TEST BB & POST TEST BB	18	.931	.000
Pair 6	PRE TEST STATUS GIZI & POST TEST STATUS GIZI	18	.	.



Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
						Lower	Upper		
Pair 1	PRETEST ENERGI - POST TEST ENERGI	-278.68056	186.28605	43.90804	-371.31843	-186.04268	-6.347	17	.000
Pair 2	PRE TEST PROTEIN - POST TEST PROTEIN	-1.45000	7.23295	1.70482	-5.04686	2.14686	-.851	17	.407
Pair 3	PRE TEST VITAMIN C - POST TEST VITAMIN C	.90000	20.54124	4.84162	-9.31492	11.11492	.186	17	.855
Pair 4	PRE TEST ZAT BESI - POST TEST ZAT BESI	-.77778	1.44112	.33968	-1.49443	-.06113	-2.290	17	.035
Pair 5	PRE TEST BB - POST TEST BB	-.35556	.41618	.09809	-.56252	-.14860	-3.625	17	.002
Pair 6	PRE TEST STATUS GIZI - POST TEST STATUS GIZI	-.22222	.42779	.10083	-.43496	-.00949	-2.204	17	.042


KELOMPOK II (KONTROL)

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRETEST ENERGI	846.8556	18	148.32796	34.96124
	POST TEST ENERGI	1188.5639	18	94.02304	22.16144
Pair 2	PRE TEST PROTEIN	29.3778	18	7.44960	1.75589
	POST TEST PROTEIN	31.7639	18	5.31955	1.25383
Pair 3	PRE TEST VITAMIN C	21.4528	18	19.25226	4.53780
	POST TEST VITAMIN C	18.5111	18	17.37654	4.09569
Pair 4	PRE TEST ZAT BESI	3.5778	18	1.24289	.29295
	POST TEST ZAT BESI	4.2806	18	2.17060	.51162
Pair 5	PRE TEST BB	18.6500	18	1.30170	.30681
	POST TEST BB	18.9722	18	1.35638	.31970
Pair 6	PRE TEST STATUS GIZI	2.0000	18	.00000	.00000
	POST TEST STATUS GIZI	2.1667	18	.38348	.09039

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PRETEST ENERGI & POST TEST ENERGI	18	.526	.025
Pair 2	PRE TEST PROTEIN & POST TEST PROTEIN	18	.211	.401
Pair 3	PRE TEST VITAMIN C & POST TEST VITAMIN C	18	-.861	.000
Pair 4	PRE TEST ZAT BESI & POST TEST ZAT BESI	18	.792	.000
Pair 5	PRE TEST BB & POST TEST BB	18	.880	.000
Pair 6	PRE TEST STATUS GIZI & POST TEST STATUS GIZI	18	.	.



Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
						Lower	Upper		
Pair 1	PRETEST ENERGI - POST TEST ENERGI	-341.70833	127.16030	29.97197	-404.94366	-278.47300	-11.401	17	.000
Pair 2	PRE TEST PROTEIN - POST TEST PROTEIN	-2.38611	8.19047	1.93051	-6.45914	1.68691	-1.236	17	.233
Pair 3	PRE TEST VITAMIN C - POST TEST VITAMIN C	2.94167	9.82488	2.31575	-1.94413	7.82747	1.270	17	.221
Pair 4	PRE TEST ZAT BESI - POST TEST ZAT BESI	-.70278	1.40864	.33202	-1.40328	.00228	-2.117	17	.049
Pair 5	PRE TEST BB - POST TEST BB	-.32222	.65400	.15415	-.64745	.00300	-2.090	17	.052
Pair 6	PRE TEST STATUS GIZI - POST TEST STATUS GIZI	-.16667	1.38348	.09039	-.35737	.02403	-1.844	17	.083

Lampiran 12

**HASIL RECALL 24 JAM KELOMPOK I (INTERVENSI) PADA ANAK SEKOLAH USIA 7-9 TAHUN DI SD INPRES BORONG
JAMBU III KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017**

NO	NAMA SISWA INTERVENSI	JK	RECALL AWAL				RECALL TENGAH				RECALL AKHIR			
			ENERGI	PROTEIN	VIT. C	ZAT BESI	ENERGI	PROTEIN	VIT. C	ZAT BESI	ENERGI	PROTEIN	VIT. C	ZAT BESI
1	AM	P	662.5	15.5	45	3.65	1089.9	29.8	27.8	4.8	1077.5	25.2	25.95	5.3
2	MF	L	633.75	23.05	21.15	1.45	1164.55	35.1	21.9	5.9	1200.2	35.95	33.15	5.95
3	NA	P	624.25	21.1	17.15	1.75	1051.2	32.05	8.3	2.9	1057.9	34.8	7.05	3.25
4	NN	P	887.35	20.05	18.35	3.65	1023.05	28.1	18.5	2.95	1020.25	28.1	19.2	4.7
5	RT	L	653	32.1	19.05	3.6	1013.1	27.35	19.15	4.4	1056.2	22.55	18.7	5.05
6	ZZ	P	575.8	24.25	17.8	2.2	1015.25	26.45	18	4.8	1084.85	31.1	21.4	3
7	AR	P	843.45	29.25	12.2	1.75	1149.4	23.4	10.2	2.5	1152.25	25.95	7.5	2.35
8	AF	L	699.25	26.8	18.15	2.4	986.3	24.5	18.25	2.1	1041.65	29.3	18.15	2.9
9	MF	L	695.45	23.55	20.35	3.35	1010	22.85	15.85	2.7	1076.45	28.5	21.1	3.65
10	MN	L	869.8	22.95	16.75	5.35	1098.2	26.05	8.05	2.25	1180.25	24.8	14	5.25
11	MR	L	986.95	33.7	9.55	4.9	1145.75	31.8	9.35	3.3	1201	26.65	8.1	4.7
12	NS	P	613.05	22.6	13.2	3.25	917.9	22.25	7.25	2	1030.25	27.85	15.05	4.4
13	RZ	L	935.4	30.05	0.95	2.65	1042.15	24.2	8.3	2.9	1147.3	31.3	11.25	3.2
14	SI	P	1119.5	28.1	29.3	4.7	1122.6	24.9	29.35	2.55	1166.3	28.45	29.4	3.75
15	AN	L	1406.4	29.4	26.15	3.6	1254.9	32.75	10.4	2.65	1217.5	27.55	11.65	3.15
16	HA	L	1029.45	33.35	22.75	6.55	1189.6	28.9	17.3	3.45	1189.3	28.4	22.25	5.4
17	MH	L	1196.35	42.3	23.7	5.9	1256.1	29.4	15.6	5.75	1268.9	32	21.45	9.35
18	AM	L	924.4	30.5	6	2.3	1164.1	25.25	6.65	2.5	1199.3	26.25	6.9	1.65
RATA-RATA			853.11	27.44	18.8	3.5	1094.11	27.50	15.01	3.41	1131.79	28.59	17.57	4.27

HASIL RECALL 24 JAM KELOMPOK II (KONTROL) PADA ANAK USIA 7-9 TAHUN SEBELUM DAN SETELAH INTERVENSI DI SD INPRES BORONG JAMBU III KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

NO	NAMA SISWA KONTROL	JK	RECALL AWAL				RECALL TENGAH				RECALL AKHIR			
			ENERGI	PROTEIN	VIT. C	ZAT BESI	ENERGI	PROTEIN	VIT. C	ZAT BESI	ENERGI	PROTEIN	VIT. C	ZAT BESI
1	MF	L	920.4	35.4	16.1	3.7	1266.7	29.2	9.1	3.65	1344.25	34.5	13	5.4
2	NT	P	745.1	20.15	38.85	3.5	1156.2	29.35	29.35	3.55	1287.7	37.85	29	3.4
3	RA	P	566.95	21.4	5.2	2.25	965	16.85	5.4	2.2	963.55	19.4	5.45	2
4	SA	P	691.35	20.6	11.8	2.65	1207.7	29.9	11.85	2.75	1181.85	28.8	11.55	2.9
5	AR	L	853.45	33.75	6	2.6	1399.95	42.85	6.1	3.55	1172	26.3	6.05	3.9
6	AA	L	936.15	30.15	6.35	3.2	1113.5	27	6.4	3.4	1191.6	30.5	7	3.25
7	FA	P	1040.75	40.9	11.75	3.65	1122.45	30	4.2	3.6	1326.75	38.75	4.9	4
8	MR	L	1130.4	36.1	32.85	2.85	1262	35.3	25.7	3.1	1143.7	36.05	10.35	3.2
9	RY	P	677.65	23	18.1	3.4	1020.3	26.95	18.15	3.2	1102.35	26.15	25.2	4.65
10	RY	P	950.5	36.3	32.45	3.6	1293	30.8	32.5	3.55	1175.1	27.05	42.6	5.65
11	RA	P	930.35	33.9	35.3	3.15	1100.5	26.45	16.7	2.4	1111.3	27	39.8	2.85
12	SN	P	667.75	24.85	3.9	3.7	983.1	22.75	3.05	1.75	1107	31.65	3.95	4.5
13	TN	P	876.15	26.65	62.25	8.05	1212.35	32.65	42.55	7.1	1257.55	39	52.2	9.25
14	AM	L	887.35	24.1	34.15	4.7	1120.9	29.7	34.2	5	1246.95	31.45	27.55	10
15	NS	P	693.7	20.95	17.3	3.15	1008.8	25.6	17.35	3.6	1093.7	37.4	15.4	2.5
16	AR	L	783.5	25.2	19	3.8	1171.5	29.15	8.8	2.95	1223.75	31.05	9	2.8
17	BA	L	916.9	31.05	18.4	3.3	1238.65	32.4	18.45	3.55	1261.15	33.6	12.55	3.2
18	SA	P	975	44.55	16.3	3.15	1193.3	32.85	16.45	23.2	1204	35.1	17.65	3.6
RATA-RATA			846.85	29.37	21.45	3.57	1157.55	29.43	17.01	3.45	1188.56	31.76	18.51	4.28

Lampiran 13

DATA BERAT BADAN DAN STATUS GIZI KELOMPOK I (INTERVENSI) SEBELUM DAN SETELAH INTERVENSI

NO	NAMA SISWA INTERVENSI	JK	BERAT BADAN (Kg)			NILAI ZSCORE BBU			STATUS GIZI		
			AWAL	TENGAH	AKHIR	AWAL	TENGAH	AKHIR	AWAL	TENGAH	AKHIR
1	AM	P	17.9	17.7	17.5	-2.13	-2.24	-2.35	KURANG	KURANG	KURANG
2	MF	L	18.1	18	18.2	-2.29	-2.37	-2.31	KURANG	KURANG	KURANG
3	NA	P	15.6	16.4	16.8	-2.72	-2.36	-2.21	KURANG	KURANG	KURANG
4	NN	P	16.5	16.5	16.7	-2.37	-2.4	-2.33	KURANG	KURANG	KURANG
5	RT	L	17.2	17.3	17.1	-2.36	-2.34	-2.47	KURANG	KURANG	KURANG
6	ZZ	P	16.7	17.1	17.2	-2.13	-1.98	-1.97	KURANG	BAIK	BAIK
7	AR	P	16.4	17.5	17.3	-2.27	-1.81	-1.92	KURANG	BAIK	BAIK
8	AF	L	16.1	17.4	16.6	-2.81	-1.79	-2.62	KURANG	BAIK	KURANG
9	MF	L	17.2	17.2	17.4	-2.45	-2.48	-2.41	KURANG	KURANG	KURANG
10	MN	L	16.7	17.4	17.5	-2.56	-2.25	-2.24	KURANG	KURANG	KURANG
11	MR	L	17.7	17.7	17.9	-2.11	-2.05	-2.08	KURANG	KURANG	KURANG
12	NS	P	16.1	15.6	16	-2.63	-2.91	-2.74	KURANG	KURANG	KURANG
13	RZ	L	17.9	17.8	18.6	-2.13	-2.21	-1.88	KURANG	KURANG	BAIK
14	SI	P	17.9	18.4	18.7	-2.25	-2.08	-1.99	KURANG	KURANG	BAIK
15	AN	L	18.9	19	19.1	-2.52	-2.5	-2.49	KURANG	KURANG	KURANG
16	HA	L	19.3	19.1	19.2	-2.29	-2.4	-2.39	KURANG	KURANG	KURANG
17	MH	L	18.9	18.9	19.2	-2.41	-2.8	-2.34	KURANG	KURANG	KURANG
18	AM	L	19.2	19.6	19.7	-2.53	-2.39	-2.37	KURANG	KURANG	KURANG
RATA-RATA			17.46111	17.7	17.81667	-2.38667	-2.29778	-2.28389			

DATA BERAT BADAN DAN STATUS GIZI KELOMPOK II (KONTROL) SEBELUM DAN SETELAH INTERVENSI

NO	NAMA SISWA	JK	BERAT BADAN (Kg)			NILAI ZSCORE BBU			STATUS GIZI		
			AWAL	TENGAH	AKHIR	AWAL	TENGAH	AKHIR	AWAL	TENGAH	AKHIR
1	MF	L	19.5	19	19.1	-2.65	-2.89	-2.87	KURANG	KURANG	KURANG
2	NT	P	18.4	19.4	19.4	-2.35	-1.99	-1.98	KURANG	BAIK	BAIK
3	RA	P	18.1	18.5	18	-2.5	-2.37	-2.57	KURANG	KURANG	KURANG
4	SA	P	18.8	19.3	19	-2.39	-2.22	-2.37	KURANG	KURANG	KURANG
5	AR	L	19.1	19.5	19.1	-2.4	-2.26	-2.46	KURANG	KURANG	KURANG
6	AA	L	18.8	18.4	18	-2.56	-2.77	-2.61	KURANG	KURANG	KURANG
7	FA	P	17.9	17.5	18.1	-2.03	-2.23	-2.01	KURANG	KURANG	KURANG
8	MR	L	19.1	19.1	18.8	-2.34	-2.41	-2.53	KURANG	KURANG	KURANG
9	RY	P	17.2	17.3	17.5	-2.58	-2.57	-2.51	KURANG	KURANG	KURANG
10	RY	P	17.2	18.3	18.5	-2.58	-2.15	-2.1	KURANG	KURANG	KURANG
11	RA	P	17	18.2	18.1	-2.73	-2.24	-2.32	KURANG	KURANG	KURANG
12	SN	P	16	15.8	16.2	-2.86	-2.99	-2.83	KURANG	KURANG	KURANG
13	TN	P	18.1	18.5	18.7	-2.04	-1.9	-1.86	KURANG	BAIK	BAIK
14	AM	L	19.2	19.8	20	-2.46	-2.31	-2.02	KURANG	KURANG	KURANG
15	NS	P	19.8	19.4	20	-2.19	-2.37	-2.18	KURANG	KURANG	KURANG
16	AR	L	21.1	21	21.9	-2.45	-2.25	-2.21	KURANG	KURANG	KURANG
17	BA	L	20.3	20	19.6	-2.54	-2.69	-2.72	KURANG	KURANG	KURANG
18	SA	P	20.1	21.2	21.5	-2.05	-2.05	-1.98	KURANG	KURANG	BAIK
RATA-RATA			18.65	18.9	18.97222	-2.42778	-2.37	-2.34056			

M A K A S S A R



RIWAYAT HIDUP

Musdalipa, Lahir di Tanah Batue pada tanggal 16 November 1995, anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan H. Mustamin dan Hj. Siara. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2001 di SDN 176 Tanah Batue dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Libureng dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di SMAN 2 Libureng dan tamat pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi Masyarakat angkatan 2013 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

