

**PENGARUH CAIRAN KAPUR (CaCO_3) TERHADAP KUALITAS DAN
DAYA SIMPAN TELUR ASIN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar*

Oleh:

HARDIANTO
60700113029

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardianto
NIM : 60700113029
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai , 08 juni 1994
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl.korban 40 ribu jiwa Makassar
Judul : Pengaruh Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Kualitas dan Daya Simpan Telur Asin

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Desember 2017

Penyusun,

HARDIANTO
NIM: 60700113029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **HARDIANTO**, NIM: 60700113029 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Pengaruh Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Kualitas dan Daya Simpan Telur Asin”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *muntaqasyah*.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses lebih lanjut.


Gowa, Desember 2017

Pembimbing I




Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.P
Nip: 197207272000032008

Pembimbing II



Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly M.Si
Nip. 19590721986031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengaruh Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Kualitas dan Daya Simpan Telur Asin", yang disusun oleh HARDIANTO, NIM: 60700113029, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 07 November 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, Desember 2017 M
Rabi'ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag (.....)

Sekretaris : Astaty, S.Pt., M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. Ir. Muh. Basir Paly., M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si (.....)

Pembimbing II: Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P. (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Ir. Arifuddin, M.Ag
NIP. 196912051993031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Kualitas dan Daya Simpan Telur Asin”, yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insha Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, do'a, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ibunda Tang, dan kepada ayah yang tecinta Sommeng ,yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan

segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari., M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Arifuddin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly., M.Si. sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Ibu Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P. selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly., M.Si. dan Bapak Dr. Ir. Muh.Sabri AR., M.Ag. selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. Sahabat-sahabatku, Nurmiani Syam, Nuralfianti, Nurfaila Sakir, Ervina Sulfana, Hasrawati S.Pt, Jumriani Ibrahim S.Pt, dan Rika Nurfiana S.Pt, Muh. Aslam, Alif Striyan, Muh. Rahmat Asri, Mudassir dan semua teman-teman peternakan angkatan 2013 yang tidak ada henti-hentinya memberikan masukan, saran serta solusi yang ada selama penulis menyelesaikan skripsinya.

8. Serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsi baik itu waktu sertapemikirannya dalam pelaksanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini, terimakasih kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Reproduksi Sapi Bali. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah swt. Amin.

Wassalamu AlaikumWr. Wb

Gowa, Desember 2017

HARDIANTO
NIM: 60700113029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Iv
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Hipotesis	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
H. Kajian Terdahulu.....	6
 B. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Al-Qur'an terhadap Proses Pembuatan Telur.....	8
B. Karakteristik dan Komposisi Telur.....	12
C. Kandungan Gizi Telur.....	18
D. Defenisi Telur Asin dan Metode Pembuatan Telur Asin.....	20
E. Kualitas Telur Asin yang Baik.....	22
F. .Defenisi dan Manfaat Kapur.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
B. Alat dan Bahan.....	31
C. Jenis Penelitian.....	31
D. Metode Penelitian.....	32
E. Prosedur Penelitian.....	33
F. Parameter yang Diamati.....	37
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Cairan Kapur terhadap Daya Simpan Telur Berdasarkan Tinggi Yolc.....	39
B. Pengaruh Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Daya Simpan Telur Berdasarkan Warna Kuning Telur.....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Komposisi Kimia Telur.....	19
2.	Kandungan Gizi Telur.....	19
3.	Rancangan Penelitian Pengawetan Telur Asin dengan Menggunakan Larutan kapur dengan Lama Penyimpanan Selama 14 Hari.....	32
4.	Analisis Sidik Ragam.....	32
5.	Hasil Pengamatan Telur Asin pada Penggunaan Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Tinggi Yolk.....	39
6.	Hasil Uji BNT Analisis Sidik Ragam penggunaan cairan kapur terhadap tinggi yolk.....	40
7.	Hasil Pengamatan Telur Asin pada Penggunaan Cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Warna Yolk.....	42

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Struktur Telur.....	18
2.	Telur Asin.....	23
3.	Prosedur Pengawetan Telur.....	34
4.	Prosedur Pembuatan Telur Asin.....	35
5.	Prosedur Pengawetan Telur.....	36
6.	Kipas Warna Yolc.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Cairan Kapur terhadap Kualitas Telur Asin Berdasarkan Tinggi Yolk.....	52
2.	Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Cairan Kapur terhadap Kualitas Telur Asin Berdasarkan Warna Yolk.....	52
3.	Dokumentasi Penelitian.....	53



DAFTAR GRAFIK

No	Teks	Halaman
1.	Kualitas Telur Asin Berdasarkan Tinggi Yolc.....	41
2.	Kualitas Telur Asin Berdasarkan Warna Yolc.....	45



ABSTRAK

Nama : Hardianto
Nim : 60700113029
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Pengaruh Cairan Kapur (CaCO₃) terhadap Kualitas Dan Daya Simpan Telur Asin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan cairan kapur (CaCO₃) terhadap kualitas dan daya simpan telur asin. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Dasar Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 24 hari. Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap, yang terdapat 3 Perlakuan yaitu P0 (Tanpa cairan kapur), P1 (250 gram kapur), P2 (500 gram kapur) dengan 4 kali ulangan. Penelitian ini menggunakan kapur yang dilarutkan dalam air selama 24 jam. Parameter yang diukur yaitu tinggi yolk, dan warna yolk. Berdasarkan analisis sidik ragam penelitian menunjukkan pemberian larutan kapur berpengaruh nyata terhadap tinggi yolk ($P>0,05$), dan tidak memberikan pengaruh terhadap warna yolk ($P<0,05$).

Kata Kunci: *Telur, Telur Asin, Kapur, Tinggi Yolk, Warna Yolk.*

ABSTRACT

Name : Hardianto
Nim : 60700113029
Department : Ilmu Peternakan
Title : Influence Fluid Lime (CaCO_3) Against Quality And Old Store Egg Salty

Research this aim for knowing use fluid limestone (CaCO_3) to quality and lam save it egg salty. Research this do in Laboratory Basic Major Science Livestock, Faculty science and Technology, UIN Alauddin Makassar. Research this held for 24 day. Trial do use design an random complete, contained 3 Treatment namely P 0 (No fluid lime), P 1 (250 grams of lime), P 2 (500 grams of lime) with four replications. Research this use lime dissolved in water for 24 hours. Parameters measured that is depth,high yolk, and yolk color. Based on analysis fingerprint variety research show giving solution chalk take effect real to High yolk ($P > 0,05$), and no give influence to yolk color ($P < 0.05$).

Keywords: Eggs, Eggs Salted, Lime, High Yolk, Yolk Color/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani dan memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Teknik pengolahan telur telah banyak dilakukan untuk meningkatkan daya tahan serta kesukaan konsumen (Irmansyah dan Kusnadi, 2009). Telur juga termasuk bahan pangan yang mudah terkontaminasi mikroba baik langsung atau tidak langsung dengan sumber-sumber pencemaran mikroba yang berasal dari tanah, udara, air dan debu. Kontaminasi pada umumnya berasal dari jerami tempat bertelur, tanah, udara, dan kotoran unggas (Idayanti, 2009).

Telur jika disimpan bertahan selama 10-14 hari, Lama penyimpanan menentukan kualitas telur, semakin lama telur disimpan, kualitas dan kesegaran telur semakin menurun (Haryoto, 2010). Jika dibiarkan dalam udara terbuka (suhu ruang) telur hanya tahan 10-14 hari, setelah waktu tersebut telur mengalami perubahan-perubahan ke arah kerusakan seperti terjadinya penguapan kadar air melalui pori kulit telur yang berakibat kurangnya berat telur, perubahan komposisi kimia dan terjadinya pengenceran isi telur (Cornelia *dkk*, 2014).

Pengawetan telur pada dasarnya adalah suatu proses untuk mencegah penguapan air dan CO₂ dari isi telur melalui pori-pori kulit telur, serta mencegah berkembangnya mikroorganisme dalam telur. Perubahan sifat telur utuh dapat di

bedakan atas dua macam yaitu perubahan luar dan perubahan dalam (Romanoff dan Romanoff, 1963).

Pengawetan telur utuh bertujuan untuk mempertahankan mutu telur segar. Prinsip dalam pengawetan telur segar adalah mencegah penguapan air dan terlepasnya gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba di dalam telur selama mungkin. Jenis pengawetan telur dapat dilakukan dengan cara menutup pori-pori kulit telur atau mengatur kelembaban dan kecepatan aliran udara dalam ruangan penyimpanan. Penutupan pori-pori kulit telur dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kapur, parafin, minyak nabati (minyak sayur), air kaca (water glass), dicelupkan dalam air, pengasinan, Sedangkan pengaturan kecepatan dan kelembaban udara dapat dilakukan dengan penyimpanan di ruangan khusus (Winarto, 2002).

Untuk mempertahankan mutu telur biasanya dilakukan dengan cara pengawetan, pengawetan telur menurut Koswara (1991) pada perinsipnya adalah mencegah penguapan air dan terlepasnya gas-gas dari dalam isi telur serta mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba dalam telur selama mungkin.

Telur asin merupakan salah satu produk dari teknologi hasil ternak yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembuatan telur asin adalah dengan metode pemeraman. Dimana telur dibalut menggunakan campuran abu gosok/serbuk batu merah, garam, jahe dan disimpan selama beberapa hari. Menurut (Sahria, 2017) bahwa pengaruh metode pengasinan terhadap kualitas telur asin dari uji organoleptik berpengaruh nyata pada kemasirannya, akan tetapi tidak memberikan pengaruh nyata

dari segi rasa, aroma dan warna yolk sedangkan lama pengasinan terhadap kualitas telur asin berpengaruh nyata pada kemasiran, akan tetapi tidak berpengaruh nyata pada aroma, rasa dan warna yolk. Interaksi antara metode pengasinan dan lama pengasinan terhadap kualitas telur asin tidak memberikan pengaruh, baik dari segi kemasiran, rasa, aroma dan warna yolk.

Garam berfungsi sebagai bahan pengawet, garam bekerja dengan cara menaikkan tekanan osmotik larutan sehingga menyebabkan terjadinya plasmolisis. Akibatnya terjadi dehidrasi yang selanjutnya diikuti dengan kematian mikroorganisme. Garam juga memengaruhi aktivitas air bahan, sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme (Aristyan *dkk*, 2014).

Hajrawat dan Aswar (2011) menyatakan bahwa pH telur akan naik karena kehilangan CO₂. Kadar air pada telur akan hilang akibat lama simpan dan suhu penyimpanan untuk telur yang akan mempercepat terjadinya reaksi metabolisme dan pertumbuhan bakteri (Bobyda, 2009).

Telur asin akan mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh pencemaran mikroorganisme dari lingkungan sekitarnya. Menurut Frazier (1997) bakteri yang dapat tumbuh pada makanan yang mengandung garam adalah bakteri halofilik yang terdiri dari 3 tingkat yaitu (1) halofilik ringan, tumbuh optimal pada media yang mengandung 2-5% garam, (2) halofilik sedang, tumbuh optimal pada media yang mengandung 5-20% garam, dan (3) supra halofilik, tumbuh optimal pada media yang mengandung 20-30% garam. Bakteri lain yang dapat tumbuh dalam telur asin adalah *Bacillus* yang memiliki toleransi pada kadar garam 2%. *Bacillus* merupakan bakteri non halofilik berbentuk gram positif.

Daya simpan telur dapat diperpanjang dengan cara menutup pori-pori kulit telur atau mengatur kelembaban dan kecepatan aliran udara dalam ruangan penyimpanan. Penutupan pori-pori kulit telur dapat dilakukan dengan menggunakan cairan kapur, parafin, minyak nabati (minyak sayur), air kaca (water glass), dicelupkan dalam air, pengasinan, Sedangkan pengaturan kecepatan dan kelembaban udara dapat dilakukan dengan penyimpanan di ruangan khusus (Winarto, 2002).

Kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium karbonat (CaCO_3) dalam bentuk mineral kalsit. Mayoritas batu kapur terbentuk dilaut dangkal perairan hangat. Batu Kapur juga merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari karang, alga dan kotoran-kotoran sejumlah organisme pada Zaman dulu. Selain itu batuan sedimen juga dapat terbentuk dari kalsium karbonat yang berasal dari air danau atau laut yang mengendap secara alami dan dibantu proses kimia (Wardiyatmoko, 2006).

Batu kapur merupakan salah satu potensi batuan yang banyak terdapat di Indonesia. Pegunungan kapur di Indonesia menyebar dari barat ke timur mulai dari pegunungan di Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur, Madura, Sumatra, dan Irian Jaya (Arifin, 2010).

Perendaman dalam larutan kapur akan mencegah penurunan kualitas dan kerusakan telur. Terbentuknya lapisan kapur pada kulit telur akibat perendaman dalam larutan kapur bertujuan untuk menutup pori-pori kulit sehingga dapat mencegah penguapan (Winarno dan Koswara, 2002).

Perendaman dalam cairan kapur dapat mempertahankan telur karena kapur memiliki fungsi mencegah penguapan dari dalam telur selama penyimpanan dan dapat mempertahankan kualitas telur selama enam minggu. Keuntungan penggunaan cairan kapur sebagai bahan pengawet telur asin adalah bahannya murah dan mudah didapat serta mudah dilakukan oleh semua orang, namun untuk telur ayam belum diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang manfaat perendaman dalam larutan kapur pada telur ayam dengan mengkaji lama penyimpanan (Nurliyani, 2008).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perendaman cairan kapur selama 18 jam berpengaruh terhadap kualitas telur asin ?
2. Berapa lama simpan telur asin yang direndam dengan cairan kapur selama 18 jam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas telur asin yang direndam cairan kapur selama 18 jam.
2. Untuk mengetahui daya simpan telur asin yang direndam dengan cairan kapur selama 18 jam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengendalian mutu dan keamanan pangan dibidang peternakan khususnya pengaruh metode larutan kapur terhadap kualitas dan lama simpan telur asin.

E. Hipotesis

Diduga terdapat pengaruh cairan kapur terhadap kualitas dan lama simpan telur asin.

F. Defenisi Operasional

1. Telur merupakan salah satu bahan makanan yang hampir sempurna. Bahan makanan ini mengandung zat gizi lengkap antara lain protein, lemak, vitamin dan mineral.
2. Telur asin merupakan Telur yang telah mengalami proses pengawetan dengan cara diasinkan (diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak).
3. Kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium karbonat (CaCO_3) dalam bentuk mineral kalsit.
4. Cairan kapur merupakan metode pengawetan dengan melarutkan air dengan kapur sampai berbentuk cairan kemudian merendam telur tersebut sampai waktu yang ditentukan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah melihat pengaruh metode pengawetan dengan larutan kapur pada lama simpan telur, dalam metode pengawetan tersebut digunakan pengawetan dengan cairan kapur yaitu dengan mencairkan kapur dengan menambahkan air secukupnya kemudian merendam telur kedalam larutan kapur.

H. Kajian Terdahulu

Hastuti (2012), *pengaruh perendaman dalam cairan kapur dan lama penyimpanan terhadap kualitas telur asin. Penelitian ini menggunakan metode percobaan factorial dengan 2 faktor*. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh perendaman menggunakan cairan kapur dengan lama penyimpanan 24 hari memiliki jumlah mikroorganisme lebih rendah yaitu $6,55 \times 10^6$ cfu/g. Namun mutu organoleptik tekstur, warna, rasa dan bau telur asin yang dinilai oleh panelis semakin rendah. Penggunaan larutan kapur dengan lama simpan 24 hari menghasilkan telur asin dengan kualitas yang lebih baik ditinjau dari jumlah mikroorganisme, kadar protein, bau dan rasanya.

Saifin (2011), *pengaruh lama penyimpanan setelah perendaman dalam cairan kapur terhadap kualitas fisik dan daya simpan telur asin*. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa penggunaan cairan kapur memberikan pengaruh beda yang sangat nyata terhadap nyata indeks albumen, indeks yolk, penurunan, pH albumen, kesukaan serta bau dan rasa. Lama penyimpanan setelah perendaman dalam larutan mampu menjaga kualitas fisik telur asin.

Muhisa (2014), *pengaruh level pemberian cairan kapur terhadap lama penyimpanan dan kualitas telur itik*. Hasil penelitiannya, bahwa perendaman telur segar dilakukan dengan cara merendam berbagai larutan seperti air kapur atau penyamak nabati yang mengandung tanin dapat nilai haugh unit semakin tinggi dan kedalaman rongga udara mengalami penurunan. Semakin lama waktu penyimpanan, maka nilai haugh unit, yolk indeks semakin menurun. Kedalaman rongga udara, nilai penyusutan berat telur dan pH mengalami peningkatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Al-Quran terhadap Proses Pembentukan Telur

1. Tinjauan Al-Quran Tentang Proses Penciptaan Telur

Ternak ayam merupakan ternak penghasil telur. Telur merupakan produk asal hewan yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap. Dari telur tertetaslah ciptaan baru yang sepadan, Secara biologi sebelum ditetaskan telur berada di dalam system reproduksi selama 24 jam dalam sehari. Dalam penciptaan telur dijelaskan dalam Q.S Al-Imran/3: 27 sebagai berikut:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)

Terjemahannya:

“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)” (Depertemen Agama RI, 2004).

Maksud dari ayat ini yaitu Allah menggilirkan peredaran waktu siang dan malam selama 24 jam dimana 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam, dalam edaran waktu tersebut segala hal dapat terjadi dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari, seperti peristiwa pembentukan telur didalam sistem reproduksi ayam yang normalnya telur ayam terbentuk kurang lebih 24-26 jam. Perjalanan yolk dari ovarium menuju oviduct yang selanjutnya akan melewati setiap bagian-bagian dari oviduct sehingga waktu peneluran dapat berlangsung

normal kurang lebih 24-26 jam. semua itu dapat terjadi sebagai bukti kekuasaan Allah supaya kita bersyukur dan tidak ada yang tidak mungkin selama Allah mengkehendakinya. Seperti halnya pula telur asin, menjadikan telur yang memiliki rasa menjadi asin dan berkualitas.

Dalam “*Tafsir Al-Mishbah*” Allah mendatangkan sesuatu yang memiliki sifat hidup dari sesuatu yang tidak memilikinya dan mendatangkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Yang berawal dari sesuatu yang hidup (ayam) dan kemudian mendatangkan sesuatu yang mati (telur). Demikian siklus kehidupan yang terjadi pada ayam yang merupakan rahasia keajaiban alam dan rahasia kehidupan. Begitulah sang pencipta yang maha kuasa mengeluarkan kehidupan dari sesuatu yang bersifat mati lalu mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup.

2. Tinjauan Al-Quran tentang Telur Asin

Kebutuhan gizi masyarakat, dapat dipenuhi melalui proses pengembangan pengendalian mutu dan keamanan pangan, mengenai produk pengolahan telur harus memperhatikan unsur nutrisi yang ada di dalam telur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses pengawetan dengan pengasinan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Waqi’ah ayat 70 sebagai berikut :

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?” (muhammad, musthafa muslim, 2010).

Dalam “*Tafsir Al Azhar*” perlu untuk memikirkan yang sedemikian, untuk memperdalam keyakinan betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia, sebagaimana ujung ayat Allah swt berfirman “Alangkah baiknya kamu berterima kasih” karena Allah swt dalam beberapa menit saja dapat menciptakan gumpalan awan, air yang asin menjadi air tawar, untuk ditumpahkan dalam daerah yang sangat memerlukannya dan jarang sekali Allah menjadikan air yang tawar menjadi asin, karena kasih sayang Allah swt kepada manusia, oleh sebab itu dianjurkan kepada manusia untuk bersyukur (Hamka, 1982).

Ayat tersebut menjelaskan betapa besar kebesaran Allah, yang telah menjadikan air hujan itu menjadi asin, padahal asalnya air hujan itu datangnya dari laut, tapi tidak asin. Karena rahmat rahmat Allah kepada kita, akan memberi kita air itu untuk kehidupan kita. Kalau Allah jadikan air itu asin tentulah pohon-pohon semua akan mati, dan kitapun akan mati. Dan air laut yang asin itupun kemudian diolah oleh manusia sebagai sumber kehidupan di bumi. Dari hasil olahan air laut (garam) tersebut itu kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kehidupan.

Ayat tersebut memberikan perupamaan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, apabila dikehendaki oleh Allah swt. seperti halnya dengan telur pada mulanya tidak memiliki cita rasa khas, akan tetapi diolah dengan garam yang mempunyai kadar keasinan yang sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada dalam telur berupa protein, asam amino maupun unsur nutrisi lainnya. Pengawetan telur dengan pengasinan akan menghasilkan telur asin bercita rasa khas dan umumnya disukai. Telur yang diasinkan bersifat

stabil, dapat disimpan tanpa mengalami proses perusakan dengan pengasinan rasa amis telur akan berkurang dan tidak berbau busuk.

3. Tinjauan Al-Quran tentang Kapur

Kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium karbonat (CaCO₃) dalam bentuk mineral kalsit. Mayoritas batu kapur terbentuk dilaut dangkal atau perairan hangat. Batu kapur juga merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari karang, alga dan kotoran-kotoran sejumlah organisme pada zaman dulu. Selain itu, batuan sedimen juga dapat terbentuk dari kalsium karbonat yang berasal dari air danau atau laut yang mengendap secara alami dan dibantu proses kimia. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah/02:29 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Dialah Allah, yang maha menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu”(Departemen Agama RI,2007).

Dalam “*Tafsir Al-Misbah*” menjelaskan tentang diri manusia dengan mengingatkan awal kejadian, sampai kesudahannya dan menyebutkan bukti keberadaan serta kekuasaannya kepada makhluknya melalui apa yang mereka saksikan sendiri pada diri mereka, kemudian dia mnyebutkan ayat-ayat nya melalui apa yang mereka sakasikan sendiri pada diri mereka, kemudian dia menyebutkan penciptaan langit dan bumi, untuk menunjukkan kekuasaannya

yang meliputi segala-galanya dan menunjukkan betapa banyak karunianya kepada umat manusia dengan menjadikan segala yang dibumi sebagai bekal dan persediaan untuk dimanfaatkan.

Ayat tersebut memberikan perumpamaan bahwa segala yang ada dibumi diciptakan untuk dimanfaatkan. Seperti halnya hasil sumber daya alam (batu kapur) yang mulanya tidak dimanfaatkan kemudian melalui pemikiran manusia sehingga diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pengawet telur, untuk memberikan potensi pada tubuh atau kepuasan padanya dalam kehidupan duniawi. Dengan memikirkan dan memperhatikan benda-benda (batu kapur) yang tidak dapat diraih oleh tangan secara langsung, untuk digunakan sebagai bukti tentang kekuasaan penciptaanya dan dijadikan santapan rohani (telur), (Shihab, 2000).

B. Karakteristik dan Komposisi Telur

Telur merupakan sumber protein, lemak, mineral, dan vitamin yang baik bagi tubuh. Nilai gizi telur sangat lengkap, telur merupakan sumber protein yang baik, kadarnya sekitar 14%, sehingga dari tiap butir telur akan diperoleh sekitar 8 gram protein. Kandungan asam amino pada telur sangat lengkap, sehingga protein telur mempunyai nilai biologis mencapai 100%, yang lebih tinggi dibandingkan daging yang hanya mempunyai nilai biologis 84%. Meskipun mempunyai harga yang rendah, namun konsumsi masyarakat Indonesia terhadap telur hanya 87 butir telur per tahun per kapita, nilai ini sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya (Pos Kota, 2012).

Telur merupakan salah satu bahan pangan hasil ternak unggas yang bergizi tinggi dan bermanfaat untuk pemenuhan gizi masyarakat. Telur merupakan sumber protein yang mudah diperoleh. Protein tersebut terdapat di dalam kuning telur dan putih telur. Dibandingkan dengan telur ayam, telur itik mengandung protein, kalori dan lemak lebih tinggi. Tetapi seperti telur unggas lainnya, telur itik memiliki sifat mudah rusak. Kerusakan tersebut disebabkan kontaminasi pada kulit telur oleh mikroorganisme yang berasal dari kotoran induk unggas maupun yang ada pada kandang (Sarwono, 1986).

Penanganan pasca panen yang tidak tepat terhadap produksi telur yang melimpah dapat menurunkan kualitas telur. Karena produk ini bersifat *perishable* atau bahan makanan yang mudah rusak serta mudah menurun kualitasnya, jika tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya, sejak dari produsen ke konsumen. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat gizi dalam telur yang tinggi yang merupakan medium yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kerusakan yang terjadi pada telur dapat diatasi dengan pengawetan (Sirait, 1999).

Adanya kandungan protein dan kadar air pada produk mengakibatkan mikroba yang sudah ada pada awal penyimpanan akan berkembang biak dengan cepat. Kerusakan pada telur dapat terjadi secara fisik, kimia maupun biologis sehingga akan terjadi perubahan selama masa penyimpanan. Secara biologis kerusakan pada telur disebabkan oleh mikroorganisme (Sudaryani, 2000).

Secara umum telur terdiri atas tiga komponen, yaitu kulit telur atau cangkang ($\pm 11\%$ dari berat total telur), putih telur ($\pm 57\%$ dari berat total telur), dan kuning telur ($\pm 32\%$ dari berat total telur). Nilai tertinggi telur terdapat pada

bagian kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial serta mineral seperti: besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung banyak protein dan sedikit karbohidrat (Anggrahini, 2010).

Pada umumnya telur yang telah terkontaminasi oleh bakteri biasanya akan mudah mengalami kerusakan. Telur yang terkontaminasi oleh bakteri dapat menimbulkan gangguan kesehatan, penurunan nilai gizi, bahkan dapat meracuni konsumen (Susiwi, 2009). Untuk itu dalam usaha mencegah kerusakan pada telur yang disebabkan oleh bakteri, maka dibutuhkan penanganan yang tepat agar nilai gizinya tetap, tidak berubah rasa, tidak berbau busuk dan warna isinya tidak pudar. Salah satu usaha ataupun cara untuk mempertahankan mutu telur dalam jangka waktu yang cukup lama adalah dengan metode pengasinan hal ini karena terbukti bahwa garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Ayufitriah, 2009). Selain itu garam dapur juga dapat memberikan rasa gurih pada telur dan yang paling utama adalah menciptakan produk pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (Syamsir, 2010).

Koliform dalam makanan dan minuman merupakan indikator terjadinya kontaminasi akibat penanganan makanan dan minuman yang kurang baik. Adanya koliform di dalam makanan menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat toksik bagi kesehatan. Gangguan yang ditimbulkan pada manusia adalah mual, nyeri perut, muntah, diare, berak darah, demam tinggi bahkan pada beberapa kasus bisa kejang dan kekurangan cairan atau dehidrasi. Koliform tidak

diharapkan sebab keberadaannya dalam makanan menunjukkan telah terjadi pencemaran (Maulana, 2010).

Pengawetan telur dapat dilakukan pada telur segar ataupun telur olahan. Pengawetan telur segar yang bisa dilakukan dengan pengemasan kering (*dry packing*) perendaman dalam cairan, seperti larutan kapur (CaCO_3) dan *parafin oil* (Kautsar, 2005).

Selanjutnya Kautsar (2005), menyatakan bahwa selain pengawetan dalam bentuk segar, telur dapat juga diawetkan dengan cara pengolahan. Salah satu caranya adalah pembuatan telur asin. Sejak zaman dahulu masyarakat kita telah mengenal pengasinan sebagai salah satu upaya untuk mengawetkan telur (memperpanjang daya simpan), membuang rasa amis dan menciptakan rasa yang khas. Selain memberi rasa, garam juga berperan sebagai pengawet. Sehingga telur asin dapat disimpan lebih lama dibanding telur segar.

Lama penyimpanan dapat menyebabkan telur rusak, untuk mengurangi kerusakan telur bebek selama penyimpanan dan sekaligus meningkatkan nilai ekonominya dilakukan upaya pengasinan. Pengasinan telur umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman dalam larutan garam dan pemeraman oleh adonan campuran garam dengan tanah liat atau abu gosok atau bubuk bata merah. Prinsip kedua cara tersebut adalah dehidrasi osmosis, yaitu proses pengurangan air dari bahan dengan cara membenamkan bahan dalam suatu larutan berkonsentrasi tinggi, larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis tinggi (Sahroni, 2003).

Menurut Sarwono (1986), yang menyatakan bahwa putih telur terdapat diantara kulit telur dan kuning telur, dimana putih telur terdiri dari 4 lapisan, yaitu:

1. Lapisan terluar, berupa cairan kental yang banyak mengandung serat musin.
2. Lapisan tengah (*albuminous sac*), terdiri dari anyaman musin yang berbentuk setengah padat.
3. Lapisan dalam, yang mengandung cairan kental.
4. Lapisan membran *kalazifera*, berfungsi menahan kuning telur agar tetap di tempatnya.

Putih telur terdapat beberapa protein, diantaranya *Ovalbumin*, *Ovomukoid*, *Ovomusin*, *Ovokonalbumin* dan *Ovoglobulin*. Selain itu, putih telur juga mengandung protein antimikroba yaitu lisozim yang berfungsi untuk membantu memperlambat proses kerusakan pada telur. Kuning telur adalah bagian yang paling penting dalam isi telur, karena kuning telur merupakan cadangan makanan yang siap digunakan oleh embrio (Sarwono, 1986).

Selanjutnya (Sarwono, 1986) menyatakan bahwa komposisi telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bangsa, umur ayam, posisi telur dalam sebuah rangkaian peneluran, laju produksi telur, suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas makanan, stres serta adanya penyakit. Struktur telur secara fisik terdiri dari kulit telur (*Shell*), Putih telur (*Albumen*), Kuning telur (*Yolk*). Perbandingan ke tiga komponen tersebut terhadap bobot telur berbeda-beda sesuai spesies unggas. Bagian kulit telur hanya sebanyak 10%, putih telur 60% dan kuning telur 30 %. Di dalam telur terdapat dua lapis, yaitu selaput kulit dan selaput putih telur. Pada bagian ujung tumpul selaput tersebut berisi udara yang dapat keluar masuk melalui dinding kulit telur yang porus.

Dalam perkembangannya telur yang pada awalnya merupakan sel reproduktif, oleh manusia telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Pemanfaatan telur sebagai bahan pangan telah dimulai sejak jaman purbakala. Orang-orang primitif mengambil telur-telur burung liar dari sarangnya untuk dimakan. Hewan unggas betina domestik dapat bertelur secara terus-menerus tanpa kawin ataupun tanpa adanya rangsangan dari unggas jantan. Fenomena biologis ini telah dimanfaatkan manusia secara menguntungkan dalam memproduksi telur infertil untuk konsumsi manusia. Peranan telur dalam kehidupan sehari-hari tampak semakin penting. Hal ini disebabkan antara lain harga telur yang relatif murah sehingga terjangkau oleh daya beli masyarakat, disamping dengan semakin timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi terutama protein hewani. Informasi lainnya pada telur :

Struktur telur secara terperinci dapat dibagi menjadi :

1. Kerabang telur dengan permukaan agak berbintik-bintik. Kerabang telur merupakan pembungkus telur yang paling tebal, bersifat keras dan kaku. Pada kerabang terdapat pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran gas. Pada permukaan luar kerabang terdapat lapisan kutikula, yang merupakan pembungkus telur paling luar.
2. Selaput kerabang luar dan dalam. Selaput kerabang dalam lebih tipis dari selaput kerabang luar dan keduanya mempunyai ketebalan 0,01 – 0,02 mm. Pada ujung telur yang tumpul, kedua selaput terpisah dan membentuk rongga.

3. Albumen (putih telur) terdiri dari 4 lapisan, paling dalam lapisan tipis dan encer atau lapisan chalaziferous (lapisan 4), lapisan ini berhubungan langsung dengan selaput vitelina; lapisan luar yang tipis dan encer (lapisan 3) yang mengelilingi lapisan kental (lapisan 2). Paling luar adalah lapisan tipis dan encer (lapisan 1).
4. Struktur keruh berserat yang terdapat pada kedua ujung kuning telur yang disebut khalaza dan berfungsi memantapkan posisi kuning telur



Gambar 1: Struktur Telur (Bobyda, 2009).

C. Kandungan Gizi Telur

Telur adalah bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dan merupakan sumber asam amino esensial, kalori, vitamin dan mineral. Telur juga mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh, dari sebutir telur didapatkan gizi yang sempurna. Selain itu, zat gizi tersebut mudah dicerna oleh tubuh. Kandungan protein kuning telur yaitu sebanyak 16,5 % dan pada putih telur sebanyak 10,9%,

sedangkan kandungan lemak pada kuning telur mencapai 32% dan pada putih telur terdapat dalam jumlah yang sedikit. Disamping mengandung protein yang tinggi, telur juga merupakan sumber zat besi, beberapa mineral dan vitamin. Telur mengandung semua vitamin, kecuali vitamin C dan vitamin K, mineral. Mineral yang ada pada telur antara lain natrium, kalium, besi, fosfor, kalsium, tembaga, yodium, magnesium, mangan, potasium, sodium, zinc, klorida dan sulfur (Titik, 2000).

Tabel 1. Komposisi Kimia Telur

Komposisi	Telur utuh	Isi telur Tanpa cangkang	Kuning telur	Putih telur	Cangkang dan kulit membrane
Seluruh telur	100	-	31,0	58,0	11,0
Air	65	75,0	48,0	87,0	2,0
Protein	12	12,0	17,5	11,2	4,5
Lemak	11	11,0	32,5	0,2	-
Karbohidrat	1	0,5	1,0	1,0	-
Abu	11	1,5	1,0	0,8	93,5

Sumber: Titik, 2000.

Telur itik tersusun atas krabang telur (10,25 %), putih telur (59,50 %), dan kuning telur (31,9 %), sedangkan menurut bahan yang terkandung, telur terdiri dari air dan bahan kering yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan mineral (Winarti, 2004).

Tabel 2. Kandungan Gizi Telur

No	Bagian (%)	Isi Telur	Putih Telur	Kuning Telur
1	Berat	6,6	40,4	26,6
2	Air	69,7	86,8	44,8
3	Bahan kering	30,3	13,2	55,2
4	Protein	13,7	11,3	17,7
5	Lemak	14,2	0,08	35,2
6	Karbohidrat	1,2	1,0	1,1

Sumber: Winarti, 2004.

D. Definisi Telur Asin dan Metode Pembuatan Telur Asin

Telur asin adalah suatu hasil olahan telur dengan prinsip penggaraman. Proses pengasinan nyata menurunkan kadar air dari telur rebus asin pada enam perlakuan hingga 6,7 % lebih rendah. Penurunan kadar air dari telur bebek rebus asin tersebut terutama disebabkan proses pemanasan pada saat perebusan telur mentah. Pemanasan menyebabkan perubahan komponen telur dari cair (sol) menjadi semi padat (gel) yang disebut dengan koagulasi. Koagulasi terjadi akibat pengurangan kadar air pada telur asin, karena bagian cair pada telur bebek mentah terdiri atas putih dan kuning telur setelah perebusan menjadi semi padat, sehingga pengujian terhadap kadar air dari padatan telur asin, menghasilkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan pada telur bebek mentah sebagai bahan bakunya. Proses pembuatan telur asin bertujuan menyimpan hasil produksi telur yang melimpah sehingga bisa bertahan dalam waktu lama. Secara umum prinsip dan manfaat pengawetan telur adalah untuk mencegah masuknya bakteri pembusuk ke dalam telur yang dapat merusak telur dan mencegah keluarnya air dari dalam telur. Telur asin biasanya dibuat dari telur itik atau bebek (bahasa Jawa) karena

pori-porinya besar sehingga kadar garam mudah terserap. Kualitas Telur asin ditentukan dari aroma, rasa enak, mengandung minyak di pinggir (masir) dan letak kuning telur di tengah. Telur bebek merupakan telur yang mudah diperoleh dan jumlahnya banyak dipasaran, selain itu telur bebek harganya relatif murah dan jika dimanfaatkan menjadi telur asin maka harga jualnya dapat menghasilkan keuntungan karena bahan-bahan yang digunakan relatif mudah diperoleh dan tidak membutuhkan modal yang besar. Bahan-bahan tersebut tersedia di lingkungan sekitar kita sehingga memudahkan pada saat pembuatan telur asin. Proses pembuatannya pun tidak membutuhkan banyak keterampilan dan tidak membutuhkan banyak waktu. Telur asin ternyata banyak disukai dan harga pasarnya cukup bagus dan telur asin juga mengandung banyak gizi dan protein. Jika kita rajin sebetulnya industri kecil pembuatan telur asin bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Keuntungan yang besar dapat kita peroleh. Komponen putih dan kuning telur pada telur bebek mentah masih dalam keadaan cair. Air bebas yang telah terikat tidak mampu digunakan oleh mikroorganisme. sehingga telur asin secara umum akan mempunyai masa simpan yang lebih lama pada suhu ruang dibandingkan telur itik mentah. Pengasinan merupakan proses penetrasi garam kedalam bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam mengion menjadi Na^+ dan Cl^- . Penambahan garam dalam jumlah tertentu pada suatu bahan pangan dapat mengawetkan bahan pangan tersebut. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisis sel mikroba yaitu sel mengalami dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel dan plasmolisis sel terhadap CO_2 (Oktaviani, 2014).

Pembuatan telur asin dengan 2 cara yaitu perendaman dengan larutan garam jenuh dengan metode pemeraman. Metode dengan perendaman garam waktu yang dibutuhkan untuk proses pengasinan telur, yaitu 7-10 hari. Pembuatan telur asin dengan pembalutan adonan pengasinan (garam, serbuk batu bata dan abu gosok) memerlukan waktu sampai 7-10 hari. Rasa asin sedang diperoleh dengan penyimpanan selama 10-15 hari. Untuk rasa yang sangat asin diperoleh dengan penyimpanan selama 15-20 hari. Metode tradisional dengan menggunakan media campuran berupa garam, serbuk batu bata dan abu gosok akan menghasilkan telur yang bercita rasa khas dan disukai masyarakat (Leitasari, 2012).

E. *Kualitas Telur Asin yang Baik*

Telur asin berkualitas baik memiliki rasa asin yang cukup, kuning telur berwarna kemerahan, dan terkesan berpasir (masir). Pengasinan telur dikatakan berhasil dengan baik apabila telur asin yang dihasilkan bersifat stabil, dapat disimpan lama tanpa banyak mengalami perubahan, tidak berbau amoniak atau bau yang kurang sedap, penampakan putih dan kuning telur baik, serta berminyak dibagian pinggir. Telur asin yang baik, akan terlihat jika sudah dibelah. Kuningnya berada di tengah, minyaknya hanya terdapat di bagian pinggir atau masir, rasa dan aromanya enak. Bagian kuning telur mengandung hampir semua macam vitamin (kecuali vitamin C) dan juga sumber mineral seperti besi, fosfor, kalsium, tembaga, iodium, magnesium, mangan, kalium, natrium, seng, klorida dan sulfur serta vitamin D alami (Sutrisno dan Koswara, 1991).

Kandungan mineral yang lengkap pada telur tidak sama dengan bahan-bahan pangan tunggal lainnya, kecuali susu. Mineral-mineral penting yang terkandung dalam telur asin dibandingkan dengan telur itik segar, hampir tidak ada perubahan nilai gizi yang berarti akibat proses pengasinan. Kenaikan zat gizi yang cukup berarti terlihat pada kadar kalsiumnya, yaitu dari 56 mg pada telur itik segar menjadi 120 mg telur asin. Kenaikan kadar tersebut kemungkinan berasal dari kalsium yang ada pada garam dapur (sebagai kontaminan), abu gosok, serta kapur yang dipakai dalam pembuatan media pengasinan. Masuknya kalsium berlangsung melalui carayang sama seperti unsur natrium dan klorida, yaitu melalui pori-pori kulit telur. Penurunan nilai gizi yang cukup berarti terlihat pada kandungan vitaminnya, yaitu dari 1.230 Standar Internasional (SI) pada telur itik segar menjadi 841 Standar Internasional (SI) telur asin. Sejumlah ahli gizi merekomendasikan bahwa mengonsumsi telur asin, tak perlu takut kolesterol atau jantung (Sarwono, 1986).

Mutu telur asin menurut Standar Nasional Indonesia meliputi, bau, warna, kenampakan, kadar garam, cemaran mikroba *Salmonella* sp. dan *Staphylococcus aureus*. Kadar garam telur asin yang dibuat dengan perendaman air garam jenuh selama 12 hari adalah kuning telur 0,58 % dan putih telur 3,02 %, kadar garam telur asin pada bagian putih telur 3,69 – 3,79 % sedangkan pada bagian kuning telur 1,40 – 1,96 % (Winarti, 2004).



Gambar 2: Telur Asin (Winarno dan Koswara, 2002).

F. Definisi dan Manfaat Kapur

Kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium karbonat (CaCO_3) dalam bentuk mineral kalsit. Mayoritas batu kapur terbentuk dilaut dangkal atau perairan hangat. Batu kapur juga merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari karang, alga dan kotoran-kotoran sejumlah organisme pada zaman dulu. Selain itu, batuan sedimen juga dapat terbentuk dari kalsium karbonat yang berasal dari air danau atau laut yang mengendap secara alami dan dibantu proses kimia. (Sukandarrumidi, 1999)

Kapur adalah dengan definisi batu yang mengandung setidaknya 50% kalsium karbonat dalam bentuk kalsit berat. Semua batu gamping mengandung setidaknya beberapa persen lainnya bahan. Dalam batu kapur terdapat partikel-partikel kecil yang terdiri dari kuarsa, feldspar, mineral lempung, pirit, siderit dan mineral lainnya. Hal ini juga dapat berisi nodul rijang, pirit atau siderit.

Ketersediaan batuan kapur yang melimpah dapat dikatakan 3,5-4% elemen di bumi adalah kalsium, dan 2% terdiri dari magnesium. Dari keseluruhan ketersediaan kalsium menempati urutan kelima setelah oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Ketersediaan batuan kapur yang melimpah ini merupakan potensi yang besar terhadap pengembangan industri lebih lanjut (Hartono, 2009)

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang ada maka sebagai pijakan awal perlu diketahui karakterisasi batuan kapur (CaCO_3) ini secara lebih mendalam. Hal ini sangat diperlukan guna sebagai informasi awal pengembangan batu kapur (CaCO_3) ke arah yang lebih luas lagi. Guna menjawab kebutuhan tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai karakteristik maupun kemurnian dari batu kapur (CaCO_3). Ada banyak nama yang berbeda digunakan untuk batu kapur. Nama-nama ini didasarkan pada bagaimana batu terbentuk, penampilan atau komposisi dan faktor lainnya. Berikut adalah beberapa yang lebih umum digunakan :

1. *Kapur*: Sebuah batu kapur lembut dengan tekstur yang sangat halus yang biasanya berwarna putih atau abu-abu. Hal ini terbentuk terutama dari sisa-sisa organisme yang mengandung kapur, seperti organisme laut mikroskopis, foraminifera dan berbagai jenis ganggang laut.
2. *Coquina*: Sebuah batu kapur yang terdiri dari sisa-sisa organisme yang kurang baik maupun rusak. Ini sering terbentuk pada pantai di mana aksi gelombang pemisahan antara laut dan darat.

3. *Fossil limestone*: Sebuah batu kapur yang berisi fosil jelas dan berlimpah. Ini biasanya mengandung sisa organisme dan fosil kerangka organisme yang menghasilkan batu kapur.
4. *Litograf limestone*: Sebuah batu kapur padat dengan ukuran butir sangat halus. Pada akhir 1700-an proses pencetakan (litografi) dikembangkan untuk mereproduksi gambar dengan menggambar mereka di batu dengan tinta minyak dan kemudian menggunakan batu itu untuk menekan beberapa salinan dari gambar.
5. *Oolitic limestone*: Sebuah kapur terutama terdiri dari kalsium karbonat “oolites”, bulatan kecil yang dibentuk oleh presipitasi konsentris kalsium karbonat pada butir pasir.
6. *Travertine*: Sebuah batu kapur yang terbentuk oleh rembesan air di atas gua yang menghasilkan formasi seperti stalaktit, stalagmit dan Flowstone.
7. *Tufa*: Sebuah batu kapur yang dihasilkan oleh pengendapan air kalsium sarat dengan air panas, danau atau lokasi lainnya.

Pengertian batu kapur (bahasa Inggris: limestone) (CaCO_3) adalah sebuah batuan sedimen terdiri dari mineral calcite (kalsium carbonate). Sumber utama dari calcite ini adalah organisme laut. Organisme ini mengeluarkan shell yang keluar ke air dan terdeposit di lantai samudra sebagai pelagic ooze Calcite sekunder juga dapat terdeposit oleh air meteorik tersupersaturasi (air tanah yang presipitasi material di gua). Ini menciptakan speleothem seperti stalagmit dan stalaktit. Bentuk yang lebih jauh terbentuk dari Oolite (batu kapur Oolitic) dan dapat dikenali dengan penampilannya yang granular (Arifin, 2010).

Batu kapur membentuk 10% dari seluruh volume batuan sedimen. Ganesa (Proses Pembentukan Batu Kapur) Batu kapur (Gamping) dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia. Sebagian besar batu kapur yang terdapat di alam terjadi secara organik, jenis ini berasal dari pengendapan cangkang/rumah kerang dan siput, foraminifera atau ganggang, atau berasal dari kerangka binatang koral/kerang. Untuk batu kapur yang terjadi secara mekanik sebetulnya bahannya tidak jauh beda dengan batu kapur secara organik yang membedakannya adalah terjadinya perombakan dari bahan batu kapur tersebut kemudian terbawa oleh arus dan biasanya diendapkan tidak jauh dari tempat semula. Sedangkan yang terjadi secara kimia jenis batu kapur yang terjadi dalam kondisi iklim dan suasana lingkungan tertentu dalam air laut ataupun air tawar (Team Studi Kapur IPB, 1983).

Mineral karbonat yang umum ditemukan berasosiasi dengan batu kapur adalah aragonit (CaCO_3), yang merupakan mineral metastable karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit (CaCO_3). Mineral lainnya yang umum ditemukan berasosiasi dengan batu kapur atau dolomit, tetapi dalam jumlah kecil adalah Siderit (FeCO_3), ankererit ($\text{Ca}_2\text{MgFe}(\text{CO}_3)_4$), dan magnesit (MgCO_3) (Departemen Pertanian, 2004).

Batu gamping dapat dibedakan menjadi dua yaitu batu gamping non klastik dan batu gamping klastik. Batu gamping non klastik merupakan koloni binatang laut terutama terumbu dan koral yang merupakan anggota coelenterate sehingga di lapangan tidak menunjukkan perlapisan yang baik dan belum banyak

mengalami pengotoran mineral lain. Sedangkan batu gamping klastik merupakan hasil rombakan jenis batu gamping non klastik (Mansur, 2000).

Batu gamping yang komponennya berasal dari fasies terumbu oleh fragmentasi mekanik, kemudian mengalami transportasi dan diendapkan kembali sebagai partikel padat diklasifikasikan dalam batu gamping allochton rudstone. Batu kapur dapat berwarna putih susu, abu muda, abu tua, coklat bahkan hitam, tergantung keberadaan mineral pengotornya.

3. Keterdapatan Batu Kapur Potensi batu kapur di Indonesia sangat besar dan tersebar hampir merata di seluruh kepulauan Indonesia. Metode Penambangan Pada umumnya deposit batu gamping ditemukan dalam bentuk bukit. Oleh sebab itu teknik penambangan dilakukan dengan tambang terbuka dalam bentuk kuari tipe sisi bukit (*side hill type*) Untuk penambangan skala besar pembongkaran dibantu dengan sistem peledakan beruntun dibantu peralatan berat antara lain ekskavator, bulldozer, ripper (penggaruk), sedangkan untuk penambangan skala kecil dilakukan dengan alat sederhana antara lain cangkul, ganco dan sekop. Apabila skala penambangannya kecil, sistem yang diterapkan dalam kegiatan penambangan adalah sistem gophering, mengikuti bagian/jalur batu gamping yang relatif mudah dibongkar, namun dengan alasan keselamatan kerja sistem gophering tidak dianjurkan. Sebaiknya penggalian harus diupayakan untuk dimulai dari bagian paling atas (Sudarman, 1987).

Manfaat Batu Kapur Batu kapur/Limestone (CaCO_3) banyak digunakan, antara yaitu pengawetan telur, bahan untuk menurunkan kadar sulfur, bahan

pembuat soda api, piler kare, kabel, penurunan kadar asam air, industri pupuk, pengkristal gula tepung, penetral limbah, ekstraksi peleburan besi (Kasno,1993).

Perlakuan perendaman telur asin dalam cairan kapur merupakan salah satu cara memperpanjang masa simpan telur. Perendaman dalam cairan kapur akan mencegah penurunan kualitas dan kerusakan telur asin. Terbentuknya lapisan kapur pada kulit telur akibat perendaman dalam cairan kapur bertujuan untuk menutup pori-pori kulit sehingga dapat mencegah penguapan, disamping mencegah masuknya mikro-organisme ke dalam telur. Perendaman cangkang telur dengan larutan kapur dapat mencegah penguapan dari dalam telur selama penyimpanan dan dapat mempertahankan kualitas telur selama enam minggu (Haryoto, 1986).

Keuntungan penggunaan cairan kapur sebagai bahan pengawet telur asin adalah bahannya murah dan mudah didapat serta mudah dilakukan oleh telur semua orang. Perbandingan kapur tohor dan air yang digunakan dari hasil penelitian Nurawaliah (2000) adalah 1 kg : 16 liter, dengan lama perendaman selama 18 jam, selanjutnya disimpan pada suhu ruang. Perendaman dalam cairan kapur dapat mempertahankan telur konsumsi dua bulan, namun untuk telur asin belum diketahui (Idris, 1995). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang manfaat perendaman dalam larutan kapur pada telur asin dengan mengkaji lama penyimpanan, kadar protein, jumlah mikroorganisme dan mutu organoleptik. Perendaman dalam larutan kapur akan mencegah penurunan kualitas dan kerusakan telur asin. Terbentuknya lapisan kapur pada kulit telur akibat perendaman dalam cairan kapur bertujuan untuk menutup pori-pori kulit sehingga

dapat mencegah penguapan, disamping mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam telur.

G. Pengawetan Telur dengan Cara Perendaman dalam Cairan Kapur

Pengawetan telur dengan cara perendaman dalam cairan kapur dibuat berdasarkan pendapat (Nurawaliah, 2000), yaitu cairan kapur dapat dibuat dengan cara melarutkan 1 kg batu kapur CaO dalam 16 liter air, lalu dibiarkan selama sehari. Perndaman dilakukan selama 18 jam. Daya pengawet dari kapur karena mempunyai sifat basa sehingga mencegah tumbuhnya mikroba. Kapur CaO akan bereaksi dengan udara membentuk lapisan tipis. Kalsium karbonat CaCO_3 diatas permukaan cairan perendam, kemudian CaCO_3 yang terbentuk akan mengendap diatas permukaan telur, membentuk lapisan tipis yang menutupi pori-pori telur. Pori-pori yang tertutup ini menyebabkan mikroba tidak dapat masuk kedalam telur dan mencegah keluarnya air dan gas-gas lain dari dalam isi telur. Kapur juga menyebabkan kenaikan PH pada permukaan kulir telur yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September 2017, di laboratorium Teknologi Hasil Ternak Terpadu Jurusan Ilmu Peternakan. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada Penelitian ini yaitu seperti ayakan, baskom, toples, gelas kimia, ember, timbah, timbangan, dan talang, cawang petrik, jangka sorong, label.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu telur itik berumur kurang dari 7 hari sebanyak 90 butir dengan berat rata-rata 65 gram, garam 3,5 kg, batu bata 3,5 kg, abu gosok 2,16 kg, air 4 liter, kapur 250 gram dan 500 gram setiap perlakuan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode experiment yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kualitas dalam telur dengan berfokus kepada 2 variabel yang diamati yaitu tinggi yolk dengan warna yolk telur.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 4 kali ulangan setiap ulangan terdiri dari 10 butir telur dengan rancangan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. Rancangan Penelitian Pengawetan Telur Asin dengan Menggunakan Cairan Kapur (CaCO_3) dengan Lama Penyimpanan Selama 14 Hari.

Ulangan	Perlakuan		
	P0(0%)	P1(25%)	P2(50%)
U ₁	U ₁ .P ₀	U ₁ .P ₁	U ₁ .P ₂
U ₂	U ₂ .P ₀	U ₂ .P ₁	U ₂ .P ₂
U ₃	U ₃ .P ₀	U ₃ .P ₁	U ₃ .P ₂
U ₄	U ₄ .P ₀	U ₄ .P ₁	U ₄ .P ₂

Keterangan :

Perlakuan (P⁰ control) :Telur asin tanpa perendaman cairan kapur

Perlakuan (P¹):Telur asin dengan penambahan cairan kapur 25 %

Perlakuan (P²) : Telur asin dengan penambahan cairan kapur 50 %

Adapun Bagan Analisis Ragam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Table 4. Analisis Sidik Ragam


Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JKp)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F hitung
Kolom (P)	JKP	db JKP	KTP = JKP / db JKP	F hitung = KTP / KTG
Galat (G)	JKG	db JKG	KTG = JKG / db JKG	
Total (T)	JKT	db JKT		

E. Prosedur Penelitian

1. Pembuatan Telur Asin
 - a) Menyiapkan bahan
 - b) Mencuci telur kemudian mengampasnya
 - c) Menimbang masing-masing bahan : abu gosok 2,16 kg, garam 3,5 kg, batu bata 3,5 kg. Memasukkan abu gosok ke dalam baskom kemudian menambahkan garam dan air sebanyak 4 liter lalu menghomogenkannya.
 - d) Menambahkan batu bata dalam adonan kemudian menghomogenkannya.
 - e) Setelah semua bahan homogen selanjutnya telur dapat dibalut dengan adonan tersebut dan disimpan selama 10 hari..
2. Penyediaan cairan kapur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Kapur dilarutkan dalam air dengan perbandingan 250 gram : 16 liter dan 500 gram : 16 liter air dan dibiarkan selama 24 jam.
 - b) Cairan bening yang terbentuk dipisahkan dari endapan kapur , masing-masing 1,5 liter untuk 10 butir telur pada perlakuan P₁ dan P₂.
 - c) Setelah itu telur asin selanjutnya mendapat perlakuan perendaman dengan air kapur selama 18 jam.
3. Pengawetan telur dengan perendaman dalam cairan kapur.
 - a) Telur yang telah di asinkan selama 10 hari dan direndam dalam larutan kapur (CaCO₃) selama 18 jam,
 - b) Telur kemudian diangkat dari larutan kapur (CaCO₃) dan ditiriskan
 - c) Telur selanjutnya disimpan selama 14 hari pada suhu kamar.


- d) Pengamatan telur asin dilakukan setelah perendaman 14 hari, dengan mengukur indeks kuning telur dan warna kuning telur.

Diagram alir pembuatan cairan kapur



Gambar 3. Prosedur Pengawetan Telur

Diagram alir pembuatan telur asin



Gambar 4. Prosedur Pembuatan Telur Asin

Diagram alir pengawetan telur asin dengan cairan kapur terhadap daya simpan telur.



Gambar 5. Prosedur Pengawetan Telur

F. Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati pada penelitian ini yakni kualitas dalam telur asin sebagai berikut :

1. Tinggi Yolk

Pengukuran tinggi yolk bertujuan untuk melihat pengaruh kapur terhadap tinggi kuning telur (mm) (Koswara, 2009).

2. Warna yolk

Pengukuran warna yolk bertujuan untuk melihat perubahan warna kuning telur yang diakibatkan oleh pemberian larutan kapur. Cara pengukuran warna yolk disini menggunakan kipas warna sederhana dengan kisaran warna 1-15. Penilaian warna kuning telur dapat dilakukan secara visual dengan membandingkan warna kuning telur dengan alat yolk color fan yang memiliki skala Roche yaitu standar warna 1 - 15 dari warna pucat sampai warna pekat atau orange tua (Kurtini *dkk*, 2011).

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa menggunakan spss 16,0. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil).

Menurut Steel dan Torrie (1991), model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i ulangan ke-j.


μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P_0, P_1, P_2 (perlakuan)

j = 1,2,3,4 (ulangan)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Larutan Kapur Terhadap Daya Simpan Telur Berdasarkan Tinggi Yolk

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode pemeraman pada pembuatan telur asin selama 10 hari, kemudian dilanjutkan perendaman cairan kapur selama 18 jam menggunakan perlakuan P_0 (control, 0 %), P_1 (25%) dan P_2 (50 %), maka pengaruh cairan kapur terhadap daya simpan telur berdasarkan kualitas telur pada tinggi yolk diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 6. Hasil Pengamatan Telur Asin pada Penggunaan cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Tinggi Yolk (Cm/Butir)

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-rata
	1	2	3	4		
P_0 (Kontrol)	2.68	2.68	2.68	2.68	10.72	2.68
P_1 (25%)	2.67	2.39	2.56	2.52	10.14	2.54
P_2 (50%)	2.65	2.68	2.72	2.63	10.68	2.67
Total					31.54	
Rata-rata						2.628

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2017.

Pada Tabel 6. menunjukkan, bahwa rata-rata tinggi yolk telur yang dihasilkan bervariasi, antar perlakuan. Olehnya itu, selanjutnya dilakukan analisis sidik ragam (ANOVA) guna mengetahui pengaruh pemberian cairan kapur terhadap kualitas telur berdasarkan tinggi yolk (cm/butir) .

Hasil analisis sidik ragam(lampiran 1) menunjukkan bahwa, pemberian cairan kapur terhadap telur asin berpengaruh nyata ($P > 0,05$) pada taraf kepercayaan 95% sehingga dilakukan uji lanjut BNT yang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji BNT Analisis Sidik Ragam Pengaruh Penggunaan Cairan Kapur Terhadap Kualitas Telur Asin

Perlakuan	BNT
P0 (control)	2,68 b
P1 (25%)	2,54 a
P2(50%)	2,67 b

Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata ($P < 0,05$)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian cairan kapur berpengaruh nyata terhadap kualitas telur berdasarkan tinggi yolk artinya, dengan pemberian cairan kapur terhadap telur asin dapat meningkatkan daya simpan telur (memperpanjang daya simpan telur asin) dan kualitas telur asin tetap baik . Larutan kapur (CaCO_3) dapat memperpanjang daya simpan telur asin disebabkan, karena pada saat perendaman telur dalam cairan kapur selama 18 jam, kapur akan melekat pada kulit telur, sehingga terbentuklah lapisan kapur pada kulit telur. Adanya lapisan kapur pada kulit telur tersebut, akan menutupi pori-pori kulit telur. Tertutupnya pori-pori kulit telur, akan menyebabkan berkurangnya penguapan telur, sehingga kualitas telur dapat tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan Haryanto, 1986; Kasno, 1993; Idris, 1995, Nurawaliah, 2000; Hastuti , 2012 bahwa cairan kapur dapat digunakan dalam pengawetan telur, karena adanya kemampuan kapur membentuk lapisan pada kulit telur, yang pada akhirnya dapat ,mencegah terjadinya penguapan serta masuknya mikroorganisme ke dalam telur yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada telur.

Pada Tabel 6. menunjukkan, bahwa pemberian cairan kapur pada perlakuan P2 (50 %) menghasilkan tinggi yolk yang lebih baik daripada perlakuan P1 (25 %), Hal ini diduga disebabkan pada konsentrasi cairan kapur yang lebih tinggi, menyebabkan lebih banyaknya kapur yang melekat pada telur asin, sehingga lapisan kapur lebih tebal. Lebih tebalnya lapisan kapur berdampak pada lebih tingginya daya pencegahan penguapan telur, sehingga tinggi yolk telur yang dihasilkan lebih baik . Data pada Tabel 6 dapat dilustrasikan pada Grafik 1 berikut ini :



Grafik 1. Kualitas Telur Asin Berdasarkan Rata-Rata Tinggi Yolk

Pengawetan telur dengan metode pengasinan pada umumnya telah diketahui dan dilakukan oleh masyarakat, namun pengawetan telur menggunakan cairan kapur belum lazim. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan cairan kapur (CaCO_3) dapat digunakan untuk menambah daya simpan telur, karena kerusakan pada telur dapat dicegah khususnya pada bagian yolk (kuning telur). Telur yang tidak rusak, akan disenangi oleh konsumen, karena kandungan gizinya tetap terjaga. Menurut Sarwono, 1986; Sudaryani, 2000; Anggraini, 2010 bahwa telur yang dihasilkan oleh ternak unggas (ayam, itik)

mudah rusak , karena adanya kontaminasi pada kulit telur yang disebabkan oleh mikroorganisme, kerusakan tersebut dapat dilihat berdasarkan sifat fisika, kimia dan biologis dari telur. Telur terdiri dari tiga komponen utama yaitu kulit telur, putih telur dan kuning telur . Kuning telur mengandung asam amino esensial serta mineral .

Daya simpan telur menjadi hal yang penting terhadap kualitas telur, utamanya pada yolk . Hal ini disebabkan, jika dilakukan penyimpanan telur, maka didalam telur terjadi pemindahan air dari albumen menuju yolk serta penurunan tinggi yolk. Tekanan osmotik yolk lebih besar dari albumen sehingga air dari albumen berpindah menuju yolk. Perpindahan air secara terus menerus akan menyebabkan viskositas yolk menurun sehingga menjadi pipih kemudian akan pecah (Abbas,1989). Jika kondisi tersebut terjadi, maka kualitas telur menjadi berkurang.

B. Pengaruh Cairan Kapur terhadap Daya Simpan Telur Berdasarkan Warna Kuning Telur

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode pemeraman pada pembuatan telur asin selama 10 hari, kemudian dilanjutkan perendaman cairan kapur selama 18 jam menggunakan perlakuan Po (control, 0 %), P₁ (25%) dan P₂ (50 %), maka pengaruh cairan kapur terhadap daya simpan telur berdasarkan kualitas telur pada warna yolk diperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 9. Hasil Pengamatan Telur Asin pada Penggunaan cairan Kapur (CaCO_3) terhadap Warna Yolk

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-rata
	1	2	3	4		
P ₀ (kontrol)	13.66	13.66	13.66	13.66	54.64	13.66
P ₁ (25%)	12.66	14.33	13	13.66	53.65	13.41
P ₂ (50%)	14	13.66	13.66	13.66	54.98	13.75
Total					163.27	
Rata-rata						13.605

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2017.

Pada Tabel 9 menunjukkan, bahwa rata-rata warna yolk telur yang dihasilkan bervariasi, antar perlakuan. Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan analisis sidik ragam (ANOVA) guna mengetahui pengaruh pemberian cairan kapur terhadap kualitas telur berdasarkan warna yolk. Hasil analisis sidik ragam (ANOVA) ditunjukkan pada Tabel lampiran 2.

Pada tabel lampiran 2 menunjukkan bahwa, pemberian cairan kapur terhadap telur asin tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) pada taraf kepercayaan 95% terhadap kualitas telur berdasarkan warna yolk artinya, dengan pemberian cairan kapur terhadap telur asin dapat mempertahankan warna yolk, sehingga warna yolk tetap baik. Hasil tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) ini justru berimplikasi positif, karena warna putih dari kapur (CaCO_3) ternyata tidak mempengaruhi warna dari yolk. Makin tinggi angka warna yolk, maka nilai yolk berdasarkan warna makin baik. Dalam pengukuran warna yolk digunakan kipas warna yolk dengan kisaran angka dari terendah yaitu 1 dan tertinggi 15. Makin tua warna yolk, berarti angkanya makin tinggi atau makin berkualitas.



Gambar 3. Kipas Warna Yolck

Rata-rata wana yolck pada Tabel 8 menunjukkan, bahwa warna yolck telur asin dengan perlakuan P2 (50%) ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P0 dan P1, olehnya itu dapat dinyatakan, bahwa pemberian cairan kapur (CaCO_3) tidak menurunkan kualitas telur telur berdasarkan warna yolck. Ketidakmampuan cairan kapur (CaCO_3) untuk mempengaruhi warna kuning telur, diduga karena adanya kandungan yodium yang tinggi yang mengikat warna kuning telur, sehingga warna kuning telur dapat terjaga, selain itu garam dalam telur asin dapat menghambat masuknya zat-zat kapur yang mampu mempengaruhi warna dari kuning telur tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Scoot,*dkk.*,1982) menyatakan bahwa, kualitas dan warna kuning telur dipengaruhi oleh kadar *karotenoid* dan kenaikan kadar pigmen dalam ransum sehingga akan memengaruhi proses pigmentasi. Disusul dari pernyataan (Tyczkowski dan Hamilton 1991) , bahwa *karetenuid* sebagai pigmen warna yang tidak dapat disintesis oleh unggas tetapi tersedia dalam pakan, artinya warna kuning telur tidak dipengaruhi oleh faktor dari suhu tetapi warna kuning telur

dipengaruhi oleh faktor dari pakan. Hal penting lainnya, cairan kapur sebelum meresap kedalam kuning telur, sebahagian besar telah melekat pada cangkang (kulit telur) utamanya menutupi pori-pori kulit telur.



Grafik 2. Kualitas Telur Asin Berdasarkan Warna Yolk

Warna kuning telur sangat erat kaitannya dengan vitamin A yang terdapat didalam pakan sehingga semakin besar *karoten* yang akan terdeposisi dalam kuning telur yang akhirnya akan memengaruhi warna kuning telur. Kuning telur mengandung zat warna (pigmen) yang umumnya termasuk dalam golongan karotenoid yaitu santrofil, lutein dan zeasantin serta sedikit betakaroten dan kriptosantin. Warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam ransum yang dikonsumsi. Perubahan warna yang terjadi pada hasil olahan telur antara lain : hitam kehijauan, coklat atau merah. Warna hitam kehijauan disebabkan oleh pemanasan yang terlalu lama sehingga terbentuk ikatan Fe dengan S. Warna coklat disebabkan terjadinya reaksi pencoklatan (browning) sehingga terbentuk karbonilamin, sedangkan warna merah disebabkan terbentuknya ikatan kompleks antara conalbumin dengan ion besi (Piliang *dkk*, 2001).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Pemberian cairan kapur dapat mempertahankan kualitas telur asin dan daya simpan telur asin berdasarkan tinggi yolk dan warna yolk.
2. Pemberian cairan kapur dapat meningkatkan daya simpan telur asin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diharapkan untuk melakukan pengawetan telur dengan menggunakan cairan kapur, Karena cairan kapur memberikan pengaruh terhadap daya simpan dan kualitas telur asin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z dan Darminto, 2010. *Identifikasi dan Karakterisasi Batu Kapur (CaCO₃) Kemurnian Tinggi Sebagai Potensi Unggulan di Kabupaten Tuban*. Jurusan Fisika MIPA ITS. Surabaya.
- Anggrahini, P, 2010. *Skripsi Karakteristik Telur Ayam Asin Asap dan Daya Terima Konsumen*. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro.
- Ayufitriah. 2009. *Bab II Tinjauan Pustaka Bakteri*. jtptunimus-gdl-ayufitriah-5262-3-bab2.pdf (Diakses pada 27 Oktober 2017).
- Aristyan, I. 2014. *Pengaruh Perbedaan Kadar Garam terhadap Mutu Organoleptik dan Mikrobiologis Terasi Rebon (Acetes sp.)*. Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan Vol 3, No 2.
- Bobyda, 2009. *Telur yang Penuh Khasiat*. <http://infoduniat.com/telur-yang-penuh-khasiat.pdf>.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2008. SNI 3926:2008 *Telur Ayam Konsumsi*. BSN, Jakarta.
- Carter, F. L., A. M. Carlo and J. B. Stanley. (1978). *Termiticidal Components of Wood Extracts : 7-Methyljuglone from Diospyros virginia*. Journal Agriculture Food Chemistry.
- Departemen Pertanian. 2004. *Penentuan Kebutuhan Kapur dan Cara Pemberian Kapur Pertanian*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2007. *Al-Qura'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*. Bndung.
- Irmansyah, J dan Kusnadi, 2009. *Sifat Listrik Telur Ayam Kampung Selama Penyimpanan*. Media Peternakan 32.
- Gaudy AF and ET Gaudy, 1981. *Microbiology For Environmental Scientists and Engineers*. Internasional Student Edition. Mcgraw-Hill Internasional Book Company, Auckland.
- Hajrawati dan M. Aswar, 2011. *Kualitas Interior Telur Ayam Ras dengan Penggunaan Larutan Daun Sirih (Piper Betle L.) sebagai Bahan Pengawet*. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, Makassar.

- Hastuti, Sri. 2012. *Pengaruh Perendaman dalam Larutan Kapur dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Telur Asin*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al Azhar*. Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Idayanti., D. S, Nurullita. U. 2009. *Perbedaan Variasi Lama Simpan Telur Ayam Pada Penyimpanan Suhu Lemari Es Dengan Suhu Kamar Terhadap Total Mikroba*. Semarang.
- Idris S, 1995. *Telur dan Cara Pengawetannya*. Penerbit Fajar. Malang.
- Jazil, N, A. Hintono dan S. Mulyani (2013) *Penurunan Kualitas Telur Ayam Ras dengan Intensitas Warna Coklat Kerabang Berbeda Selama Penyimpanan*. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan.
- Koswara S, 1991. *Teknik Pengawetan Telur Segar*. Poultry Indonesia. Edisi Februari.
- Kasno, 1993. *Pengaruh Penambahan Bahan Organik, Kapur dan Pupuk NPK Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Hasil Kacang Tanah*. Pemberitaan Penelitian Tanah dan Pupuk.
- Kautsar I. 2005. *Pengaruh Lama Perendaman dalam Larutan Asam Asetat 7% dan Lama Perendaman Terhadap Beberapa Karakteristik Telur Asin*. [Skripsi] Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Jatinangoro.
- Kamprath, E.J. 1970. *Exchangable Alluminium as Criterion for Liming Laching Mineral Soils*. Soil Sci. Amer. Proc
- Kurtini, T., K. Nova, dan D. Septinova. 2011. *Produksi Ternak Unggas*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Romanoff, A.L. dan A.F. Romanoff. 1963. *The Avian Eggs*. John Wiley and Sons. Inc. New York.
- Leitasari, F.Y. 2012. *Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe (Zingiber Officinale Rosc) Varietas Empirit terhadap Aktivitas Antioksidan dan Aktivitas Antibakteri Pada Teur Asin Selama Penyimpanan Dengan Metode Penggaraman Basah*. Skripsi Universitas sebelas maret, Surakarta.
- Shihab,MQ. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Penerbit Lentera Hati: Jakarta.
- Melia S.Juliyarsi I.Africon.2009. *Teknologi Pengawetan Telur Ayam Ras dalam Larutan Gelatin dari Limbah Kulit Sapi*. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Surabaya.

- Mansur dan Koko, 2000, *Metode Penggunaan Kapur Pada Tanah Sulfat Masam. Ajun Teknisi Litkayasa Madya pada Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat*. Bogor.
- Muhlisa, N. 2014. *Pengaruh Level Pemberian Cairan Kapur terhadap Lama Penyimpanan dan Kualitas Telur Itik*. Skripsi. Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin.
- Maulana, M. N. 2010. *Coliform dan Pengaruhnya*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Magelang.
- Muhammad, musthafa muslim, 2010. *Al-Tafsir Al-Maudu'I Lisuwar Al-Quran Al-Karim*(dalam bahasa arab),sharjah: Univesitas Of Sharjah.
- Nurliyani, Rihastuti R.A., Indratiningsih, Wahyuni, E., 2008. *Bahan Ajar Ilmu dan Teknologi Susu dan Telur*. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Oktaviani, H. 2014. *Pengaruh Pengasinan terhadap Kandungan Zat Gizi Telur Bebek yang Diberi Limbah Udang*. Jurnal Teknosains Pangan Vol 3 No. 4.
- Romanoff, A.L. dan A.F. Romanoff. 1963. *The Avian Eggs*. John Wiley and Sons. Inc. New York.
- Piliang, W.G., A. Suprayogi, N. Kusmorini, M. Hasanah, S. Yuliani, dan Risfaheri . 2001. *Efek Pemberian Daun Katuk (Sauropus androgynus) Dalam Ransum terhadap Kandungan Kolesterol Karkas dan Telur Ayam Lokal*. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Proyek ARMP II. Desember 2001.
- Saifin, N. 2011. *Pengaruh Lama Penyimpanan Setelah Perendaman Dalam Larutan Kapur Terhadap Kualitas Fisik dan Daya Simpan Telur Asin*.Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.
- Sirait, S.P. 1999. *Pengaruh Lama Perendaman dan Konsentrasi Garam pada Proses Pembuatan Telur Asin Terhadap Karakteristik dari Telur Asin (Cortunix-cortunix Javonica)*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Jatinangor.
- Syarief dan H. Halid. 1990. *Buku Monograf Teknologi Penyimpanan Pangan.Laboratorium Rekayasa Pangan dan Gizi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Syamsir, E. 2010. *Keamanan Mikrobiologi Pangan*. Kulinologi The Science of Cooking Indonesia. Jakarta.
- Sudaryani, T. 2000. *Kualitas Telur*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sudarman, S. 1987. *Kajian Pengaruh Pemberian Kapur Pada Tanah Ultisol Atas Kelakuan Kalium dan Agihan Aluminium*. Tesis Doktor, Universitas Gadjah Mada. 305p
- Sanchez, P.A. 1976. *Properties and Management of Soil in The Tropics*. John Willey and Sons Inc. New York London. Sidney. Toronto.
- Sukristiyonubowo, Mulyadi, P. Wigena dan A.
- Sukandarrumidi. 1999. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Steel, R.G.D dan J.H. Torrie. 1995. *Prinsip dan Prosedur Statistika*. Penterjemah Bambang Sumantri. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Sarwono, B. 1986. *Telur Pengawetan dan Manfaatnya*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Susiwi, S. 2009. *Kerusakan Pangan*. Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas PMIPA. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sahroni. 2003. *Sifat Organoleptik, Sifat Fisik dan Kandungan Zat Gizi Telur Itik Asin dengan Penambahan Rempah-Rempah pada Proses Pengasinan*. [Skripsi] Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sutrisno dan Koswara. 1991. *Perbaikan Proses Pengasinan Telur Ayam dan Telur Itik*. Pusbangtepa-IPB, Bogor.
- Sarwono, B. Murtidjo dan Daryanto, A. 1985. *Telur Pengawetan dan Manfaatnya*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sahria, 2017. *Pengaruh Metode dan Lama Pengasinan yang Berbeda dengan Penambahan Asap Cair terhadap Kualitas Telur Asin* [skripsi] jurusan ilmu peternakan- UIN, Makassar.
- Team Studi Kapur Fakultas Pertanian IPB. 1983. *Studi Tata Pengadaan dan Penggunaan Serta Dampak Kapur Terhadap Pendapatan Petani Dalam Rangka Pengembangan Lahan Kering di daerah Transmigrasi*. Kerjasama antara Team Studi Kapur Fakultas Pertanian dengan Proyek P3DT Dit. Perluasan Areal Pertanian, Ditjen Pertanian Tanaman Pangan, Dep. Pertanian.


Tyczkowski, J. K. and P. B. Hamilton. 1991. *Altered metabolism of carotenoids during pale-bird syndrome in chickens infected with eimeria acervulina*. Journal. Poultry. Sci 70: 2074--2081.

Titik, S. 2000. *Kualitas Telur*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Winarno. F. G. dan Koswara, S. 2002. *Telur; Komposisi, Penanganan dan Pengolahannya*. M-Brio Press, Bogor.

Winarti, E. 2004. *Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengkajian*. BPTP, Yogyakarta.

Wardiyatmoko, 2006, *Batu Kapur dan Proses Pembentukan Batu Kapur*, Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Cairan Kapur terhadap Kualitas Telur Asin Berdasarkan Tinggi Yolk dengan Daya Simpan 14 Hari.

SK	DB	JK	KT	F.hitung		F tabel	
						0.05	0.01
Perlakuan	2	0.052	0.026	5.282	*	4.256	8.022
Galat	9	0.045	0.005				
Total	11	0.097					

Tabel hasil uji BNT analisis sidik ragam pengaruh penggunaan cairan kapur terhadap kualitas telur asin

Perlakuan	BNT
P0 (control)	2,68 b
P1 (25%)	2,54 a
P2(50%)	2,67 b

Lampiran 2. Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Cairan Kapur terhadap Kualitas Telur Asin Berdasarkan Warna Yolk dengan Daya Simpan 14 Hari.

SK	DB	JK	KT	F.hitung		F tabel	
						0.05	0.01
Perlakuan	2	0.052	0.026	0.622	tn	4.256	8.022
Galat	9	0.045	0.005				
Total	11	0.097					

lampiran 3. Dokumentasi hasil penelitian



Pembersihan telur



penimbangan telur



pemeraman



pembuatan adonan pengasinan



telur yang sudah diperam



pembersihan adonan



Pembuatan cairan kapur



perendaman telur dalam cairan kapur



Proses perendaman selama 18jam



telur yang telah direndam

RIWAYAT HIDUP



Hardianto,60700113029 lahir di Desa aska, Kecamatan sinjai selatan, Kabupaten sinjai, Sulawesi Selatan, 08 juni 1994. Penulis yang akrab disapa “Adhy” anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Sommeng dan Tang. Memulai pendidikan awal di SDN 52 Aska dan tamat pada tahun 2006, dilanjutkan ke pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 sinjai selatan dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 sinjai selatan dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.