

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Angka kematian maternal di dunia masihlah sangat tinggi. Sekitar 830 perempuan meninggal akibat komplikasi terkait kehamilan dan kelahiran di seluruh dunia setiap harinya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 303.000 meninggal selama atau setelah kehamilan dan kelahiran. Hampir seluruh kematian ini terjadi pada daerah dengan sumber daya rendah, dan kebanyakan dapat dicegah (WHO, 2016).

Di Asia dan Afrika Utara, penurunan angka kematian maternal lebih besar dibanding di Sub-Sahara. Antara 1990-2015, rasio kematian maternal global (jumlah kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup) menurun hanya 2.3% per tahun. Pada beberapa negara, penurunan tahunan kematian maternal antara tahun 2000-2010 berada di atas 5.5% (WHO, 2016).

Rasio kematian maternal di negara berkembang tahun 2015 yakni 239 per 100.000 kelahiran hidup dibanding 12 per 100.000 kelahiran hidup di negara maju. Terdapat disparitas yang besar di antara negara-negara, tetapi juga di dalam negara sendiri, dan antara perempuan dengan pendapatan tinggi dan rendah serta perempuan yang tinggal di daerah pedesaan di banding perkotaan (WHO, 2016).

Kebanyakan kematian maternal dapat dicegah, salah satunya solusi pelayanan kesehatan untuk mencegah atau mengelola komplikasi yang telah diketahui. Semua perempuan memerlukan akses ke pelayanan antenatal pada masa kehamilan, selama kelahiran, dan dukungan beberapa minggu setelah kelahiran. Kesehatan ibu dan neonatal berhubungan secara erat. Diperkirakan sekitar 2.7 juta neonates meninggal pada 2015 dan tambahan 2.6 juta yang akan menyusul. Hal penting adalah semua kelahiran dihadiri oleh tenaga kesehatan profesional dengan pengelolaan waktu yang baik dapat membuat perbedaan antara kehidupan dan kematian bagi keduanya, ibu dan bayi (WHO, 2016).

Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah tingginya angka kematian bayi. Berdasarkan data angka kematian neonatal, bayi dan balita di Indonesia, sekitar 56 persen kematian bayi terjadi pada masa neonatal dan salah satu penyebabnya yakni gizi buruk dan gizi kurang yang biasanya mulai terjadi sejak masa kehamilan. (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014). Angka kematian bayi baru lahir pada anak-anak yang ibunya mendapatkan pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh profesional medis adalah seperlima dari angka kematian pada anak-anak yang ibunya tidak mendapatkan pelayanan ini (UNICEF Indonesia, 2012).

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014). Estimasi angka kematian Ibu di Indonesia tahun 2015 sendiri sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2016). Kabupaten Gowa menempati urutan tertinggi bersama dengan Bone dalam jumlah kematian ibu hamil di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013. (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2014)

Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil bisa berpengaruh pada kesehatan janin di kandungan, saat kelahiran hingga masa pertumbuhan bayi dan anaknya. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan secara teratur pada masa kehamilan guna menghindari gangguan atau segala sesuatu yang membahayakan kesehatan ibu dan janin di kandungannya. (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014)

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya berdasarkan pedoman pelayanan antenatal yang ada, dan diutamakan pada kegiatan promotif dan

preventif. Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan ibu hamil, yaitu gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan pelayanan K4 merupakan gambaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga. (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014)

Data Riskesdas 2013 menunjukkan hampir seluruh ibu hamil di Indonesia (95,4%) sudah melakukan pemeriksaan kehamilan (K1) dan frekuensi kehamilan minimal 4 kali selama masa kehamilannya adalah 83,5 persen. Adapun untuk cakupan pemeriksaan kehamilan pertama pada trimester pertama adalah 81,6 persen dan frekuensi ANC 1-1-2 atau K4 (minimal 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua dan minimal 2 kali pada trimester3) sebesar 70,4 persen. Tenaga yang paling banyak memberikan pelayanan ANC adalah bidan (88%) dan tempat pelayanan ANC paling banyak diberikan di praktek bidan (52,5%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013). Kunjungan pada ANC yang tinggi diharapkan dapat membantu menurunkan komplikasi maternal dan neonatal serta kematian ibu dan anak melalui pendeteksian dini kehamilan berisiko tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Kebanyakan perempuan hamil (72%) di Indonesia melakukan kunjungan pertama, tetapi putus sebelum empat kunjungan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kurang lebih 16% perempuan (25% dari perdesaan dan 8% perempuan perkotaan) tidak pernah mendapatkan pelayanan antenatal selama kehamilan terakhir mereka (UNICEF Indonesia, 2012).

Dari data profil kesehatan Kabupaten Gowa tahun 2014, tampak bahwa cakupan pelayanan K4 selalu lebih rendah daripada cakupan pelayanan K1. Hal ini menunjukkan bahwa dimungkinkan ada suatu faktor pemengaruh yang berperan terhadap motivasi ibu hamil datang mengikuti asuhan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini yang menjadikan alasan perlunya dilakukan penelitian

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu “Apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui hubungan kelompok umur ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
2. Mengetahui hubungan paritas ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
3. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
4. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
5. Mengetahui hubungan status pekerjaan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

6. Mengetahui hubungan tingkat pendapatan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
7. Mengetahui hubungan sikap ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
8. Mengetahui hubungan dukungan keluarga ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
9. Mengetahui hubungan dukungan petugas kesehatan terhadap ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
10. Mengetahui korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dengan kunjungan asuhan antenatal (ANC) yang sesuai di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi masyarakat tentang gambaran faktor sosial ekonomi dalam mempengaruhi kunjungan pelayanan ibu hamil.
- b. Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan keilmuan dan menjadi sarana pengembangan diri melalui penelitian ini.
- c. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuhan Antenatal

Asuhan antenatal adalah upaya pencegahan program pelayanan kesehatan obstetrik untuk mengoptimalkan luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan ibu hamil selama masa kehamilan secara rutin. (Adriaansz, 2010)

Terdapat 6 penyebab mengapa setiap ibu hamil penting mendapatkan asuhan antenatal, yaitu: (Adriaansz, 2010)

1. Membangun rasa saling percaya antara klien dan petugas kesehatan.
2. Mengupayakan terwujudnya kondisi terbaik bagi ibu dan bayi yang dikandungnya.
3. Memperoleh informasi dasar tentang kesehatan ibu dan kehamilannya.
4. Mengidentifikasi dan menata laksana kehamilan risiko tinggi.
5. Memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan dalam menjaga kualitas kehamilan dan merawat bayi.
6. Menghindarkan gangguan kesehatan selama kehamilan yang akan membahayakan keselamatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya.

1. Jadwal Kunjungan Asuhan Antenatal

Bila kehamilan ibu termasuk dalam kehamilan risiko tinggi, maka perhatian dan jadwal kunjungan harus dilakukan lebih ketat. Akan tetapi, bila kehamilan normal maka jadwal asuhan cukup 4 kali. Dalam bahasa program kesehatan ibu dan anak, kunjungan antenatal ini diberi kode angka K yang merupakan singkatan dari kunjungan dengan kunjungan yang lengkap adalah K1, K2, K3, dan K4. Artinya, dalam masa kehamilan, minimal dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan selama kehamilan 28-36 minggu, dan sebanyak dua kali kunjungan antenatal pada usia kehamilan di atas 36 minggu. (Adriaansz, 2010)

Para ibu hamil akan mendapatkan serangkaian pelayanan yang terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan adanya penyulit atau gangguan kesehatan selama kehamilan yang mungkin dapat mengganggu kualitas dan luaran kehamilan selama kegiatan ANC berlangsung. (Adriaansz, 2010)

Terdapat 10 T (timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkaran lengan atas/ LiLa), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus bila diperlukan, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan laboratorium sederhana (rutin/khusus), tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara/ konseling) yang merupakan acuan sehingga pelayanan antenatal dapat disebut berkualitas dan memenuhi standar. (Marniyanti, et al., 2016)

2. Pemeriksaan Rutin dan Penelusuran Penyulit selama Kehamilan

Selain pencatatan data klien terkait kondisi fisik dan kehamilannya, data keluarga juga memiliki tempat khusus dalam pemeriksaan rutin ANC. Berikut merupakan data dan pemeriksaan yang perlu dilakukan selama kegiatan ANC berlangsung (Adriaansz, 2010).

a. Identifikasi dan Riwayat Kesehatan

- 1) Data Umum Pribadi
- 2) Keluhan Saat Ini
- 3) Riwayat Haid
- 4) Riwayat Kehamilan dan Persalinan
- 5) Riwayat Kehamilan Saat Ini
- 6) Riwayat Penyakit dalam Keluarga
- 7) Riwayat Penyakit Ibu
- 8) Riwayat Penyakit yang Memerlukan Tindakan Pembedahan
- 9) Riwayat KB
- 10) Riwayat Imunisasi
- 11) Riwayat Menyusui

- b. Pemeriksaan
 - 1) Keadaan Umum
 - 2) Pemeriksaan Abdomen
- c. Laboratorium
 - 1) Pemeriksaan Darah, Urin, dan Tinja
 - 2) USG Obstetrik

3. Pelayanan Pemeriksaan 10 T (Kementerian Kesehatan RI, 2016)

- a. Pengukuran tinggi badan cukup satu kali. Bila tinggi badan < 145cm, maka faktor risiko panggul sempit, kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Penimbangan berat badan setiap kali periksa. Sejak bulan ke-4 penambahan BB paling sedikit 1 kg/bulan
- b. Pengukuran tekanan darah. Tekanan darah normal 120/80mmHg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90mmHg, ada faktor risiko hipertensi (tekanan darah tinggi) dalam kehamilan.
- c. Pengukuran lingkar lengan atas (LiLA). Bila < 23,5cm menunjukkan ibu hamil menderita Kurang Energi Kronis (Ibu hamil KEK) dan beresiko melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).
- d. Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU). Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan.
- e. Penentuan presentasi janin (letak janin) dan penghitungan DJJ (denyut jantung janin). Apabila trimester III bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali/menit atau lebih dari 160 kali/ menit menunjukkan ada tanda GAWAT JANIN, SEGERA RUJUK!
- f. Penentuan status imunisasi Tetanus Toxoid (TT). Oleh petugas untuk selanjutnya bilamana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi.

- g. Pemberian tablet Fe. Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual.
- h. Tes laboratorium.
 - a. Tes golongan darah, untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan.
 - b. Tes hemoglobin, untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah (Anemia).
 - c. Tes pemeriksaan urine (air kencing).
 - d. Tes pemeriksaan darah lainnya, seperti HIV dan Sifilis, sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis.
- i. Konseling atau penjelasan (temu wicara). Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini (IMD), nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, Keluarga Berencana dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil.
- j. Tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil.

B. Keikutsertaan dalam Asuhan Antenatal

Perilaku individu dalam menggunakan pelayanan kesehatan akan mempengaruhi peran ibu hamil dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Adanya pengetahuan tentang manfaat pelayanan antenatal selama kehamilan akan menyebabkan sikap yang positif. Selanjutnya sikap positif akan mempengaruhi niat untuk ikut serta dalam pemeriksaan kehamilan. Kegiatan yang sudah dilakukan inilah disebut perilaku. (Ajzen & Fishbein, 1980)

Perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut (Notoatmodjo, 2003).

1. Faktor Predisposisi: Termasuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, moral sosial, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu (masyarakat).

2. Faktor Pendukung: Mencakup keterjangkauan fasilitas dan jarak ke pelayanan ANC.
3. Faktor Pendorong: Mencakup perilaku masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Faktor perilaku dan jam biologis juga dapat memperbesar risiko komplikasi yang mengancam kehidupan bagi seorang wanita hamil. Umur dan jumlah kelahiran juga merupakan dua dari sekian banyak faktor yang paling mudah dideteksi dan faktor universal paling penting selain postur tubuh, status gizi dan kesehatan wanita (Pitt, 1996 dalam Muslimin, 2009 dalam Rochka, 2012).

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu subyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni : Indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Siti Candra, dkk (2009) menunjukkan bahwa pengetahuan berhubungan dengan keteraturan kunjungan antenatal oleh ibu postpartum. Begitu pula dengan hasil penelitian Adri (2008) di Puskesmas Runding Kota Subussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemeriksaan kehamilan (Rochka, 2011).

2. Pendidikan

Anak-anak dari ibu yang kurang berpendidikan umumnya memiliki angka kematian yang lebih tinggi daripada mereka yang lahir dari ibu yang lebih berpendidikan. Selama kurun waktu 1998-2007, angka kematian bayi pada anak-anak dari ibu yang tidak berpendidikan adalah 73 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi pada anak-anak dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini disebabkan oleh perilaku dan pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik di

antara perempuan-perempuan yang berpendidikan (UNICEF Indonesia, 2012).

3. Sikap

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju). Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap adalah merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup (Rochka, 2011).

Sikap ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seorang ibu dalam berperilaku termasuk perilaku ibu hamil dalam melakukan kunjungan antenatal teratur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adri (2008) di Puskesmas runding Kota Sabussalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa variabel sikap mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemeriksaan kehamilan (Rochka, 2011).

4. Status Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat mengasumsikan bahwa ibu-ibu yang bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan akan menghalangi mereka untuk melakukan kunjungan antenatal secara teratur karena puskesmas, posyandu, polindes, dan puskesmas pembantu dibuka pada saat ibu bekerja (Kaswendi, 2002 dalam Rochka, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irma Sulastri (2008) menunjukkan bahwa ada pengaruh pekerjaan ibu dengan pemeriksaan kehamilan yang memenuhi standar (Rochka, 2011).

5. Pendapatan

Angka kematian anak terkait dengan kemiskinan. Anak-anak dalam rumah tangga termiskin umumnya memiliki angka kematian balita lebih dari dua kali lipat dari angka kematian balita di kelompok kuintil paling sejahtera. Hal ini karena rumah tangga yang lebih kaya memiliki akses yang lebih banyak ke pelayanan

kesehatan dan sosial yang berkualitas, praktek-praktek kesehatan yang lebih baik pada umumnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi (UNICEF Indonesia, 2012).

6. Paritas

Tingkat paritas telah menarik perhatian para peneliti dalam hubungan kesehatan ibu maupun si anak. Dikatakan umpamanya bahwa terdapat kecenderungan kesehatan ibu yang berparitas rendah lebih baik dari yang berparitas tinggi (Notoatmodjo, 2003).

Paritas seorang ibu yang tergolong risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan adalah pada kehamilan pertama. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. (Wiknjosastro, 2005 dalam Rochka, 2012).

7. Dukungan Keluarga

Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah suami, anak ataupun orang tua serta satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (Depdikbud, 1994). Keputusan mencari pelayanan kesehatan merupakan hasil jaringan interaksi yang kompleks. Menemukan proses pengambilan keputusan dan pola komunikasi yang relevan bukanlah masalah yang sederhana. Keputusan mencari pelayanan kesehatan dapat dibuat oleh wanita itu sendiri, atau oleh suaminya, tokoh masyarakat desa, dan atau anggota keluarga atau masyarakat lainnya (Koblinsky, dkk, 1997 dalam Rochka, 2012)

8. Dukungan Petugas Kesehatan (KIE)

Peningkatan komunikasi dan interaksi antara pasangan mengenai praktik kesehatan selama atau setelah diberikan pendidikan kesehatan dapat membuat pemahaman yang lebih baik (Mullany, Britta C, dkk, 2007 dalam Rochka, 2012). Petugas kesehatan diharapkan dapat dapat meluangkan waktu untuk memotivasi dan mengarahkan ibu hamil agar rajin melakukan asuhan antenatal sehingga jika

ditemukan masalah-masalah komplikasi kehamilan sudah dapat ditangani lebih dini betapapun sempitnya waktu yang dimiliki petugas kesehatan tersebut (Rochka, 2011).

Pemberian informasi mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan yaitu pelayanan antenatal secara rutin minimal 4 kali kunjungan selama kehamilan, serta memberikan informasi dampak yang dapat diterima ibu dan janinnya jika tidak mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. (Rochka, 2012)

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Angka kematian Ibu di Kabupaten Gowa masihlah menjadi peringkat teratas berdasarkan data tahun 2013. Tingginya peringkat ini tentunya menggambarkan bahwa tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas masihlah belum cukup baik di masyarakat. Asuhan antenatal merupakan salah satu upaya penting dalam mengontrol kondisi kesehatan kehamilan Ibu dan janin sehingga dapat mendeteksi apakah terdapat kelainan dalam kehamilan secara dini. Kesehatan ibu hamil tentunya menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi angka kematian ibu.


Jumlah frekuensi kunjungan asuhan antenatal yang ditetapkan pada negara berkembang seperti Indonesia yakni minimal empat kali selama kehamilan (Depkes, 2008). Dengan banyaknya hal yang dikaji, dinilai, serta diberikan selama kunjungan antenatal ini, maka banyak manfaat yang bisa diambil oleh bagi ibu hamil dan janinnya agar tercapai kondisi kesehatan optimal bagi mereka berdua. Namun, cakupan pelayanan K4 selalu lebih rendah daripada cakupan pelayanan K1. Hal ini menunjukkan bahwa dimungkinkan ada suatu faktor pemengaruh yang berperan terhadap motivasi ibu hamil datang mengikuti asuhan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan secara rutin (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014). Keteraturan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang diuraikan sebagai variabel dalam penelitian ini.

Suatu studi menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dan perilaku dalam frekuensi kunjungan asuhan antenatal di daerah Kediri (Komariyah, 2008). Dari penelitian lain juga mendapatkan hal serupa namun belum di daerah Kabupaten Gowa sendiri.


B. Kerangka Teori



C. Kerangka Konsep



Keterangan:



D. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen : Faktor-faktor ibu hamil
2. Variabel Dependen : Kunjungan asuhan antenatal (ANC)

E. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kriteria	Skala
A	Variabel Independen				
1	Kelompok Umur	Usia ibu hamil saat ini	Kuisisioner	a. Kelompok umur kehamilan berisiko (< 20 tahun atau ≥ 35 tahun) b. Bukan kelompok umur kehamilan berisiko (20-35 tahun)	Nominal
2	Paritas	Banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh ibu hamil	Kuisisioner	a. Tidak aman (Paritas ≤ 1 dan ≥ 4) b. Aman (Paritas 2 dan 3)	Nominal
3	Pengetahuan	Kemampuan ibu hamil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kuisisioner mengenai ANC	Kuisisioner	a. Kurang [skor < nilai median (3.3)] b. Cukup [skor \geq nilai median (3.3)]	Ordinal
Skala pengukuran yang digunakan adalah “Skala Guttman”. Dimana jawaban benar responden diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0					
4	Tingkat Pendidikan	Pendidikan formal terakhir yang telah diselesaikan oleh ibu hamil	Kuisisioner	a. Pendidikan Rendah (belum menyelesaikan)	Ordinal

				<p>pendidikan wajib belajar 9 tahun)</p> <p>b. Pendidikan Cukup (telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun)</p>	
5	Status Pekerjaan	Aktivitas ibu hamil yang menghasilkan pendapatan harian/bulanan	Kuisisioner	<p>a. Tidak bekerja/Ibu Rumah Tangga</p> <p>b. Bekerja</p>	Ordinal
6	Tingkat Pendapatan	Jumlah pendapatan yang diterima oleh ibu hamil sesuai dengan status pekerjaannya	Kuisisioner	<p>a. Di bawah UMP (< Rp2.250.000)</p> <p>b. Sesuai UMP (\geq Rp2.250.000)</p>	Ordinal
7	Sikap	Sikap adalah reaksi positif atau negatif yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek. Untuk pernyataan positif nilai 3 untuk pernyataan setuju, nilai 2 untuk pernyataan ragu-ragu, nilai 1 untuk Pernyataan tidak Setuju. Untuk	Kuisisioner	<p>a. Negatif [skor < nilai median (44.5)]</p> <p>b. Positif [skor \geq nilai median (44.5)]</p>	Ordinal

		<p>pernyataan negatif, nilai 1 untuk pernyataan setuju, nilai 2 untuk pernyataan ragu-ragu, nilai 3 untuk pernyataan tidak setuju.</p> <p>Pengukuran variabel ini menggunakan “<i>Skala Likert</i>” yaitu dengan memberikan skoring pada jawaban responden.</p>			
8	Dukungan Keluarga	<p>Bentuk dukungan dari keluarga berupa dukungan emosional, penghargaan, materi, dan/atau informasi.</p> <p>Skala pengukuran yang digunakan adalah “<i>Skala Guttman</i>”. Dimana jawaban benar responden diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0</p>	Kuisisioner	<p>a. Kurang [skor < nilai median (13)]</p> <p>b. Cukup [skor ≥ nilai median (13)]</p>	Ordinal

9	Dukungan Petugas Kesehatan	Dukungan yang ditunjukkan petugas kesehatan (perawat, bidan, dokter) dalam memberikan pelayanan ANC. Skala pengukuran yang digunakan adalah “ <i>Skala Guttman</i> ”. Dimana jawaban benar responden diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.	Kuisisioner	c. Kurang [skor < nilai median (7)] a. Cukup [skor ≥ nilai median (7)]	Ordinal
B	Variabel Dependen				
1	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)	Kesesuaian frekuensi kunjungan ibu hamil untuk ANC selama masa kehamilan pada tiap trimester.	KMS	a. Sesuai standar (min. 1x pada trimester I, 1x pada trimester II, 2x pada trimester III) b. Tidak sesuai standar (tidak melakukan kunjungan ANC min. 1x pada trimester I, 1x pada trimester II, 2x pada trimester III)	Ordinal

F. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif analitik dengan rancangan *cross sectional study* untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 27 Oktober s.d. 7 Desember 2016 di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

a. Populasi Target

Semua ibu hamil yang mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

b. Populasi Terjangkau

Semua ibu hamil yang mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016 selama 1 bulan periode penelitian. Dari data primer didapatkan bahwa jumlah kunjungan ANC hingga bulan Oktober 2016 adalah sebesar 1108 orang dengan rata-rata jumlah kunjungan ibu hamil yang mengikuti ANC setiap bulannya sebesar 111 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yang memenuhi kriteria dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Perhitungan jumlah sampel diperoleh dengan

menggunakan Rumus Slovin ($N=111$ dan $\alpha=5\%$) sehingga didapatkan minimal jumlah sampel yang harus didapatkan adalah sebanyak 86 sampel.

D. Kriteria Sampel

1. Kriteria Inklusi

- a. Semua ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Kabupaten Gowa pada tanggal 27 Oktober s.d. 7 Desember 2016.
- b. Bersedia menjadi responden

2. Kriteria Eksklusi

- a. Ibu hamil yang tidak memiliki KMS atau tidak mengetahui/mengingat riwayat kunjungan ANC sebelumnya.
- b. Ibu hamil yang diketahui menderita penyakit dalam kehamilan tertentu (Hipertensi dalam kehamilan, Diabetes Mellitus, Penyakit thyroid, dan Asma dalam Kehamilan).

E. Jenis Data dan Instrumen Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden serta data sekunder dari hasil data yang tertulis yaitu dengan melihat KMS ibu hamil.

2. Instrumen Penelitian

Alat pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan adalah alat tulis, kuisisioner (terlampir), dan tabel-tabel tertentu untuk mencatat data-data yang didapatkan dari tempat asuhan antenatal (ANC) di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner yang telah di lakukan uji validitas dan reliabilitas oleh peneliti lain sebelumnya (N. Siregar, 2013)

F. Manajemen Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah meminta izin kepada pihak pemerintah terkait dan Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa. Kemudian, pengambilan data primer dilakukan selama kegiatan pelayanan ANC di puskesmas tengah berlangsung. Pengambilan data dilakukan secara langsung antara pihak peneliti dan responden yakni ibu hamil yang sedang mengikuti kegiatan pelayanan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu dengan menggunakan alat bantu kuesioner sejumlah 88 orang.

2. Pengelolaan Data dan Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara manual dan dengan menggunakan program *Microsoft Excel* dan *SPSS 16.0* meliputi *editing*, *coding*, *entry data*, *cleaning* dan analisis data. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

a. Editing

Melakukan pemeriksaan hasil pengambilan data yang telah dilakukan yakni menyangkut kebenaran serta kelengkapan pengisian kuesioner.

b. Coding

Memberikan kode pada setiap jawaban dalam kuesioner yang telah dilengkapi untuk memudahkan entry data.

c. Entry

Pelaksanaan entry data dilakukan dengan terlebih dahulu membuat program entry data pada Program SPSS sesuai dengan variabel yang diteliti untuk mempermudah proses analisis hasil penelitian, kemudian data-data yang telah terkumpul dari hasil kuesioner dimasukkan (dientry) ke dalam komputer berdasarkan program entry data yang telah dibuat sebelumnya.

d. Cleaning

Memeriksa kembali data yang ada di program komputer dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam entry data.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Analisis univariat yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum masalah penelitian dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase tunggal yang terkait dengan tujuan penelitian.
- 2) Analisis bivariat terkait dengan melihat hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen penelitian dengan tabulasi silang (*crosstab*) disertai dengan uji *Chi-Square* (X^2).

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik *Chi-Square* dan hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis Null (H_0) dimana:

(1) H_0 ditolak jika nilai $p < \alpha = 0,05$.

(2) H_0 diterima jika nilai $p \geq \alpha = 0,05$.

Pengujiannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Keterangan :

X^2 = Nilai Chi Square

O = Observed (nilai observasi)

E = Expected (nilai harapan)

Untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen jika tidak ada nilai E yang kurang dari 5 dipergunakan *Chi-Square* dengan *Yates's Correction* menggunakan tabel kontigensi 2x2 dengan rumus:

$$X^2 = \frac{n(|ad - bc| - n/2)^2}{(a - b)(a - c)(b - d)(c - d)}$$

Jika terdapat sel yang mempunyai nilai E kurang dari 5 maka menggunakan *Fisher Test* dengan rumus:

$$p = \frac{(a + b)!(c + d)!(a + c)!(b + d)!}{n!a!b!c!d!}$$

Interpretasi: H_0 ditolak bila $p < 0,05$ dan H_a diterima.

Untuk mengetahui kuatnya hubungan jika hasil uji chi-square (X^2) dan Test Fisher untuk tabel kontigensi 2x2 bermakna digunakan koefisien ϕ (Phi)

$$\Phi = \frac{|ad - bc|}{\sqrt{(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)}}$$

Keterangan:

- a. Hubungan lemah : 0,01- 0,25
- b. Hubungan sedang : 0,26 – 0,5
- c. Hubungan kuat : 0,51 - 0,75
- d. Hubungan sangat kuat : 0,76 – 1,00 (Stang, 2005 dalam Rochka, 2012).

G. Penyajian Data

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram disertai dengan penjelasan-penjelasan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Responden yang terpilih sebagai sampel merupakan ibu hamil dengan berbagai usia kehamilan yang sedang melakukan kunjungan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa sejak tanggal 27 Oktober hingga 7 Desember 2016 dengan jumlah responden sebesar 88 orang. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan *editing* data untuk memeriksa kebenaran informasi sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Setelah dilakukan pengolahan data, maka hasil penelitian dapat disajikan dan dianalisis secara deskriptif dengan tabel distribusi frekuensi serta analisis bivariat yang disertai dengan narasi sebagai berikut.

1. Deskripsi Karakteristik Umum Responden

a. Umur Ibu Hamil

Umur ibu hamil dibagi menjadi 5 kategori dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Umur Responden Menurut Kelompok Umur di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Kelompok Umur Ibu (Tahun)	n	%
20 - 24	37	42.0
25 - 29	27	30.7
30 - 34	16	18.2
35 - 39	7	8.0
40 - 44	1	1.1
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 2 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut kelompok umur yang paling banyak adalah ibu dengan kelompok umur 20

- 24 tahun yaitu sebanyak 37 orang (42%) dan yang paling sedikit adalah ibu dengan kelompok umur 40 - 44 tahun yaitu sebanyak 1 orang (1.1%).

b. Usia Kehamilan

Usia kehamilan ibu dikategorikan menjadi tiga kategori yakni trimester I, II dan III. Distribusi responden berdasarkan usia kehamilannya dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Usia Kehamilan di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Usia Kehamilan	n	%
Trimester I	20	22.7
Trimester II	33	37.5
Trimester III	35	39.8
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 3 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut usia kehamilan yang paling banyak datang berkunjung mengikuti asuhan antenatal adalah ibu dengan usia kehamilan trimester III yaitu sebanyak 35 orang (39.8%) dan yang paling sedikit adalah ibu dengan usia kehamilan trimester I sebanyak 20 orang (22.7%).

c. Paritas

Paritas ibu dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Paritas di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Paritas	n	%
0	21	23.9
1	27	30.7
2	26	29.5
3	13	14.8
4	1	1.1
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 4 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut paritas yang paling banyak adalah ibu dengan paritas 1 yaitu sebanyak 27 orang (30.7%) dan yang paling sedikit adalah ibu dengan paritas 4 sebanyak 1 orang (1.1%).

d. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir ibu dibagi menjadi beberapa kategori yang dituangkan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Pendidikan Terakhir di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Tingkat Pendidikan Ibu	n	%
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1	1.1
Tidak/Belum Tamat SD	3	3.4
SD/MI/setara	17	19.3
SMP/MTS/setara	20	22.7
SMA/MA/ sederajat	31	35.2
Akademi/Diploma	9	10.2
Universitas	7	8.0
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 5 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut pendidikan terakhir yang ditempuh yang paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 31 orang (35.2%) dan yang paling sedikit adalah tidak/belum pernah sekolah sebanyak 1 orang (1.1%).

e. Pekerjaan

Distribusi responden menurut pekerjaan ibu di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa yakni sebagai berikut.

Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Pekerjaan Ibu di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Pekerjaan Ibu	n	%
Tidak Bekerja/IRT	64	72.7
Petani/Berkebun/Peternak/Penambak	1	1.1
Pedagang	8	9.1
Karyawan/Wiraswasta	14	15.9
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1.1
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 6 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut pekerjaan ibu yang paling banyak adalah tidak bekerja/IRT (Ibu Rumah Tangga) yakni sebanyak 64 orang (72.7%) dan yang paling sedikit adalah responden dengan pekerjaan sebagai Petani/Berkebun/Peternak/Penambak dan PNS yaitu masing-masing sebanyak 1 orang (1.1%).

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Kelompok Umur Ibu Hamil

1) Kelompok Umur (pertama kali hamil)

Distribusi responden berdasarkan umur responden saat hamil pertama kali dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur Kehamilan Pertama di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Kelompok Umur	n	%
<20 tahun	18	20.5
20 – 35 tahun	69	78.4
≥35 tahun	1	1.1
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 7 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut kelompok umur saat kehamilan pertama yang paling banyak adalah usia 20-35 tahun yakni sebesar 69 orang (78.4%) dan yang paling

sedikit adalah responden yang berumur ≥ 35 tahun yakni hanya 1 orang (1.1%).

2) Kelompok Umur (kehamilan berisiko saat ini)

Distribusi responden berdasarkan umur responden dengan kelompok umur kehamilan berisiko dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur Kehamilan Berisiko di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Kelompok Umur	n	%
Kelompok Umur Kehamilan Berisiko (<20 tahun dan >35 tahun)	8	9.1
Bukan Kelompok Umur Kehamilan Berisiko (20 – 35 tahun)	80	90.9
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 8 menunjukkan bahwa terlihat lebih banyak responden termasuk dalam bukan kelompok umur kehamilan berisiko dengan frekuensi sebesar 80 orang (90.9%) dibanding kelompok umur kehamilan berisiko sebanyak 8 orang (9.1%).

b. Paritas

Paritas dibagi dalam dua kategori yaitu paritas tidak aman dan paritas aman. Adapun distribusi responden menurut paritas dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Paritas di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Paritas	n	%
Paritas tidak aman (≤ 1 dan ≥ 4)	49	55.7
Paritas aman (2 dan 3)	39	44.3
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 9 menunjukkan bahwa distribusi responden menurut paritas terlihat lebih banyak responden dengan paritas tidak aman (≤ 1 atau ≥ 4) yaitu sebanyak 49 orang (55.7%) daripada responden dengan paritas aman (2-3) yaitu sebanyak 39 orang (44.3%).

c. Pengetahuan

Pengetahuan ibu dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu pengetahuan kurang dan cukup. Berdasarkan kategori tersebut dibuat distribusi pengetahuan ibu seperti pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Pengetahuan	n	%
Pengetahuan Kurang	43	48.9
Pengetahuan Cukup	45	51.1
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 10 menunjukkan distribusi responden menurut pengetahuan terlihat bahwa responden yang memiliki pengetahuan cukup yaitu sebanyak 45 orang (51.1%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan kurang yaitu sebanyak 43 orang (48.9%).

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ibu dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu pendidikan kurang dan cukup. Berdasarkan kategori tersebut dibuat distribusi tingkat pendidikan ibu dalam tabel berikut ini.

Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Tingkat Pendidikan	n	%
Pendidikan Rendah	41	46.6
Pendidikan Cukup	47	53.4
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 11 menunjukkan distribusi responden menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa responden yang memiliki pendidikan cukup yaitu sebanyak 47 orang (53.4%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki pendidikan rendah yaitu sebanyak 41 orang (46.6%).

e. Status Pekerjaan

Status pekerjaan ibu dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu tidak bekerja/IRT dan bekerja. Berdasarkan kategori tersebut dibuat distribusi status pekerjaan ibu dalam tabel berikut ini.

Tabel 12. Distribusi Responden Menurut Status Pekerjaan di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Status Pekerjaan	n	%
Tidak bekerja/IRT	64	72.7
Bekerja	24	27.3
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 12 menunjukkan distribusi responden menurut status pekerjaan terlihat bahwa responden yang tidak bekerja yaitu sebanyak 64 orang (72.7%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang bekerja yaitu sebanyak 24 orang (27.3%).

f. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan ibu dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yang didasarkan pada besar Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Berdasarkan kategori tersebut dibuat distribusi tingkat pendapatan ibu dalam tabel berikut ini.

Tabel 13. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendapatan di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Tingkat Pendapatan	n	%
Di bawah UMP (< Rp2.250.000)	75	85.2
Sesuai UMP (\geq Rp2.250.000)	13	14.8
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 13 menunjukkan distribusi responden menurut tingkat pendapatan terlihat bahwa responden dengan pendapatan di bawah UMP yaitu sebanyak 75 orang (85.2%) lebih banyak dibandingkan dengan responden dengan pendapatan sesuai UMP yaitu sebanyak 13 orang (14.8%).

g. Sikap

Sikap ibu dibagi dalam dua kategori yaitu negatif dan positif. Adapun distribusi responden menurut sikap yaitu sebagai berikut.

Tabel 14. Distribusi Responden Menurut Sikap ibu di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Sikap Ibu	n	%
Negatif	44	50
Positif	44	50
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 14 menunjukkan distribusi responden menurut sikap terlihat bahwa responden yang memiliki sikap positif memiliki frekuensi yang sama yaitu masing-masing sebanyak 44 orang (50%).

h. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga dibagi dalam dua kategori yaitu kurang dan cukup. Adapun distribusi responden menurut dukungan keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Distribusi Responden Menurut Dukungan Keluarga di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Dukungan Keluarga	n	%
Kurang	38	43.2
Cukup	50	56.8
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 15 menunjukkan bahwa responden yang berpendapat bahwa keluarganya cukup mendukung terhadap kunjungan antenatal yang dilakukan yaitu sebanyak 50 orang (56.8%) dan yang berpendapat bahwa keluarganya kurang mendukung terhadap kunjungan antenatal yang dilakukan yaitu sebanyak 38 orang (43.2%).

i. Dukungan Petugas Kesehatan

Dukungan dari petugas kesehatan dibagi dalam dua kategori yaitu kurang dan cukup. Adapun distribusi responden menurut dukungan petugas kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Distribusi Responden Menurut Dukungan Petugas Kesehatan di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Dukungan Petugas Kesehatan	n	%
Kurang	10	11.4
Cukup	78	88.6
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 16 menunjukkan distribusi responden menurut dukungan petugas kesehatan terlihat bahwa responden yang berpendapat bahwa dukungan dari petugas kesehatan yang diberikan selama asuhan antenatal sudah cukup yaitu sebanyak 78 orang (88.6%) dan yang berpendapat bahwa dukungan petugas kesehatan masih kurang yaitu sebanyak 10 orang (11.4%).

j. Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Berdasarkan kriteria objektif dalam penelitian ini, kunjungan asuhan antenatal dibagi dalam 2 kategori yaitu tidak sesuai standar dan sesuai standar. Adapun distribusi responden menurut kunjungan asuhan antenatal yakni sebagai berikut.

Tabel 17. Distribusi Responden Menurut Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa tahun 2016

Kunjungan Asuhan Antenatal	n	%
Sesuai standar	60	68.2
Tidak sesuai standar	28	31.8
Jumlah	88	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 17 menunjukkan bahwa responden lebih banyak yang memiliki kunjungan asuhan antenatal yang sesuai standar yaitu sebanyak 60 orang (68.2%) sedangkan responden yang memiliki kunjungan antenatal tidak sesuai standar yaitu sebanyak 28 orang (31.8%).

3. Analisis Hubungan Bivariat

a. Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Umur dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi berdasarkan kelompok umur dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 18. Distribusi Kelompok Umur dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Kelompok Umur	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar			
	n	%	n	%		
<20 tahun	0	0	0	0	0	0
20 – 35 tahun	55	62.5	25	28.4	80	90.9
>35 tahun	5	5.7	3	3.4	8	9.1
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100

Sumber: Data Primer

Tabel 18 menunjukkan bahwa distribusi kelompok umur yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal sesuai standar adalah kelompok umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 5 orang (62.5%) dan yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak sesuai standar juga dari kelompok umur yang sama sebanyak 25 orang (28.4%).

Hubungan Kelompok Umur dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Berikut merupakan hasil penelitian distribusi kelompok umur dan analisis hubungan kelompok umur dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 19. Hubungan Kelompok Umur dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Kelompok Umur	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Kelompok Umur Kehamilan Berisiko (<20 tahun dan >35 tahun)	5	5.7	3	3.4	8	9.1	X ² =0.131 p=1.000
Bukan Kelompok Umur Kehamilan Berisiko (20 – 35 tahun)	55	62.5	25	28.4	80	90.9	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 19 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang berada pada bukan kelompok umur kehamilan berisiko terdapat sebanyak 55 orang (62.5%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 25 orang (28.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 8 responden yang berada pada kelompok umur kehamilan berisiko terdapat 5 orang (5.7%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 3 orang (3.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=0.131$ dan nilai $p=1.000$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kelompok umur dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

b. Distribusi Responden berdasarkan Paritas dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi berdasarkan paritas dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 20. Distribusi Paritas dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Paritas	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar			
	n	%	n	%		
0	12	13.6	9	10.2	21	23.9
1	19	21.6	8	9.1	27	30.7
2	19	21.6	7	8.0	26	29.5
3	9	10.2	4	4.5	13	14.8
4	1	1.1	0	0	1	1.1
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100

Sumber: Data Primer

Tabel 20 menunjukkan bahwa distribusi paritas yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal sesuai standar adalah paritas 1 dan 2 yakni masing-masing sebanyak 19 orang (21.6%) sedangkan yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak sesuai standar adalah paritas 0 yakni sebanyak 9 orang (10.2%).

Hubungan Paritas dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Berikut merupakan hasil penelitian distribusi paritas dan analisis hubungan paritas dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 21. Hubungan Paritas dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Paritas	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Paritas tidak aman (≤ 1 dan ≥ 4)	32	36.4	17	19.3	49	55.7	$X^2=0.421$ $p=0.675$
Paritas aman (2 dan 3)	28	31.8	11	12.5	39	44.3	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 21 menunjukkan bahwa dari 39 responden yang termasuk paritas aman terdapat sebanyak 28 orang (31.8%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 11 orang (12.5%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 49 responden yang termasuk paritas tidak aman terdapat 32 orang (36.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 17 orang (19.3%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=0.421$ dan nilai $p=0.675$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan paritas dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

c. Hubungan Pengetahuan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi dan analisis hubungan pengetahuan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 22. Hubungan Pengetahuan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Pengetahuan	Kunjungan ANC				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Kurang	26	29.5	17	19.3	43	48.9	X ² =0.210 p=0.819
Cukup	34	38.6	11	12.5	45	51.1	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 22 menunjukkan bahwa dari 45 responden yang termasuk pengetahuan cukup terdapat sebanyak 34 orang (38.6%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 11 orang (12.5%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 43 responden yang termasuk paritas tidak aman terdapat 26 orang (29.5%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 17 orang (19.3%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=0.210$ dan nilai $p=0.819$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

d. Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi berdasarkan tingkat pendidikan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 23. Distribusi Tingkat Pendidikan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar			
	n	%	n	%		
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	1	1.1	1	1.1
Tidak/Belum Tamat SD	2	2.3	1	1.1	3	3.4
SD/MI/setara	16	18.2	1	1.1	17	19.3
SMP/MTS/setara	15	17.0	5	5.7	20	22.7
SMA/MA/ sederajat	15	17.0	16	18.2	31	35.2
Akademi/Diploma	6	6.8	3	3.4	9	10.2
Universitas	6	6.8	1	1.1	7	8.0
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100

Sumber: Data Primer

Tabel 23 menunjukkan bahwa distribusi tingkat pendidikan yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal sesuai standar adalah SD/MI/setara yakni sebanyak 16 orang (18.2%) sedangkan yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak sesuai standar adalah SMA/MA/ sederajat yakni sebanyak 16 orang (18.2%).

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Berikut merupakan hasil penelitian distribusi tingkat pendidikan dan analisis hubungan tingkat pendidikan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 24. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Pendidikan Rendah	33	37.5	8	9.1	41	46.6	$X^2=5.359$ $p=0.037$ $\phi=0.247$
Pendidikan Cukup	27	30.7	20	22.7	47	53.4	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 24 menunjukkan bahwa dari 47 responden yang termasuk tingkat pendidikan cukup terdapat sebanyak 27 orang (30.7%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 20 orang (22.7%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 41 responden yang termasuk tingkat pendidikan rendah terdapat 33 orang (37.5%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 8 orang (9.1%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=5.359$ dan nilai $p=0.037$, karena nilai $p < 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat pendidikan cukup dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa. Hasil uji statistik dengan koefisien ϕ (phi) diperoleh nilai $\phi=0,247$. Hal ini berarti terdapat hubungan lemah antara tingkat pendidikan cukup dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa dan memberikan kontribusi sebesar 24.7% terhadap kesesuaian kunjungan asuhan antenatal yang dilakukan ibu.

e. Distribusi Responden berdasarkan Status Pekerjaan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi berdasarkan status pekerjaan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 25. Distribusi Status Pekerjaan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Status Pekerjaan	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar			
	n	%	n	%		
Tidak Bekerja/IRT	42	47.7	22	25.0	64	72.7
Petani/ Berkebun/ Peternak/ Penambak	1	1.1	0	0	1	1.1
Pedagang	7	8.0	1	1.1	8	9.1
Karyawan/ Wiraswasta	10	11.4	4	4.5	14	15.9
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0	1	1.1	1	1.1
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100

Sumber: Data Primer

Tabel 25 menunjukkan bahwa distribusi status pekerjaan yang paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang tidak bekerja/ IRT sebanyak 42 orang (47.7%) dan juga paling banyak melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak sesuai standar yakni sebanyak 22 orang (25.0%).

Hubungan Status Pekerjaan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Berikut merupakan hasil penelitian distribusi status pekerjaan dan analisis hubungan status pekerjaan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 26. Hubungan Status Pekerjaan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Status Pekerjaan	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Tidak Bekerja / IRT	42	47.7	22	25.0	64	72.7	X ² =0.707 p=0.559
Bekerja	18	20.5	6	6.8	24	27.3	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 26 menunjukkan bahwa dari 24 responden yang bekerja terdapat sebanyak 18 orang (20.5%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 6 orang (6.8%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 64 responden yang tidak bekerja/IRT terdapat 42 orang (47.7%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 22 orang (25.0%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=0.707$ dan nilai $p=0.559$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan status pekerjaan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

f. Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi dan analisis hubungan tingkat pendapatan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 27. Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Tingkat Pendapatan	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Di bawah UMP (< Rp2.250.000)	50	56.8	25	28.4	75	85.2	<i>Fisher's Exact Test</i> p=0.538
Sesuai UMP (≥ Rp2.250.000)	10	11.4	3	3.4	13	14.8	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 27 menunjukkan bahwa dari 13 responden yang memiliki pendapatan sesuai UMP terdapat sebanyak 10 orang (11.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 3 orang (3.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 75 responden yang memiliki pendapatan di bawah UMP terdapat 50 orang (56.8%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 25 orang (28.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis *Fisher's Exact Test* diperoleh nilai $p = 0.538$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendapatan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

g. Hubungan Sikap dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi dan analisis hubungan sikap dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 28. Hubungan Sikap dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Sikap	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Negatif	29	33.0	15	17.0	44	50	X ² =0.210 p=0.819
Positif	31	35.2	13	14.8	44	50	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 28 menunjukkan bahwa dari 44 responden yang menunjukkan sikap positif terdapat sebanyak 31 orang (35.2%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 13 orang (14.8%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 44 responden yang menunjukkan sikap negatif terdapat 29 orang (33.3%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 15 orang (17.0%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=0.210$ dan nilai $p=0.819$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan sikap dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

h. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi dan analisis hubungan dukungan keluarga dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 29. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Dukungan Keluarga	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Kurang	25	28.4	13	14.8	38	43.2	X ² =0.176 p=0.850
Cukup	35	39.8	15	17.0	50	56.8	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 29 menunjukkan bahwa dari 50 responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang cukup terdapat sebanyak 35 orang (39.8%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 15 orang (17.0%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 38 responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang terdapat 25 orang (28.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 13 orang (14.8%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $X^2=0.176$ dan nilai $p=0.850$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan keluarga dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

i. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)

Hasil penelitian distribusi dan analisis hubungan dukungan petugas kesehatan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu yakni sebagai berikut.

Tabel 30. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Kunjungan Asuhan Antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa Tahun 2016

Dukungan Petugas Kesehatan	Kunjungan Asuhan Antenatal (ANC)				n	%	Hasil Uji Statistik
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar				
	n	%	n	%			
Kurang	7	8.0	3	3.4	10	11.4	<i>Fisher's Exact Test</i> p=0.603
Cukup	53	60.2	25	28.4	78	88.6	
Jumlah	60	68.2	28	31.8	88	100	

Sumber: Data Primer

Tabel 30 menunjukkan bahwa dari 78 responden yang berpendapat bahwa dukungan petugas kesehatan sudah cukup terdapat sebanyak 53 orang (60.2%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal secara teratur dan sebanyak 25 orang (28.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur. Sedangkan dari 10 responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang terdapat 7 orang (8.0%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal teratur sedangkan sebanyak 3 orang (3.4%) yang melakukan kunjungan asuhan antenatal tidak teratur.

Hasil analisis *Fisher's Exact Test* diperoleh nilai $p=0.603$, karena nilai $p > 0.05$ dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan petugas kesehatan dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.

4. Analisa Multivariat

Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan dua variabel independen yang mempengaruhi ($p < 0.25$) variabel dependen kunjungan asuhan antenatal yakni tingkat pendidikan dan pengetahuan. Setelah diuji kembali dengan regresi logistik, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 31. Analisa Multivariat dengan Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Tingkat Pendidikan	1.191	.504	5.576	1	.018	3.289	1.224	8.835
	Pengetahuan	-.807	.487	2.750	1	.097	.446	.172	1.158
	Constant	-1.456	1.041	1.955	1	.162	.233		

Sumber: Data Primer

Tabel 31 menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, tingkat pendidikan memiliki pengaruh paling kuat terhadap kunjungan asuhan antenatal dengan kekuatan sebesar 3,289x bila dibandingkan dengan variabel pengetahuan yang hanya mempengaruhi sekitar 0.446x.

B. Pembahasan

Setiap menit setiap hari, di suatu tempat di dunia, satu orang ibu meninggal disebabkan karena komplikasi persalinan. Kebanyakan kematian ibu tersebut merupakan tragedi yang dapat dicegah, dihindari, dan membutuhkan perhatian dari masyarakat di seluruh dunia. Asuhan antenatal merupakan salah satu pilar dalam *Safe Motherhood Initiative* yang bertujuan untuk mencegah komplikasi dan menjamin bahwa komplikasi dalam persalinan dapat dideteksi secara dini serta ditangani secara benar. (Rochjati 21)

Antenatal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya dan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan/SPK (Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kemkes RI, 2010 dalam Riskesdas, 2013). Bila kehamilan berisiko tinggi perhatian dan jadwal kunjungan harus lebih ketat. Namun, bila kehamilan normal jadwal asuhan cukup empat kali (Adriaansz, 2010).

Secara umum, ditemukan bahwa kunjungan asuhan antenatal yang sesuai standar di Puskesmas Somba Opu tergolong cukup tinggi. Hal ini tampak dari 88 responden yang diteliti, terdapat 60 orang (68.2%) yang mengikuti asuhan antenatal sesuai standar dan 28 orang (31.8%) yang mengikuti asuhan antenatal tidak sesuai standar. Artinya, terdapat 68.2% responden yang kunjungan antenatalnya sudah sesuai dengan standar asuhan antenatal yang ditetapkan yaitu minimal 1 kali pada trimester I, minimal 1 kali pada trimester II, dan minimal 2 kali pada trimester III.

Meskipun jumlah ibu hamil yang mengikuti asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu lebih banyak yang melakukan sesuai standar, namun masih terdapat 31.8% ibu yang mengikuti kunjungan tidak sesuai standar. Dari hasil wawancara

langsung oleh peneliti dengan responden selama proses pengambilan data, didapatkan bahwa penyebab beberapa responden tidak mengikuti kunjungan asuhan antenatal sesuai standar oleh karena ketidaktahuan responden bahwa mereka sudah hamil sehingga terlambat untuk datang memeriksakan diri. Selain itu, beberapa responden juga merasa sudah memiliki pengalaman pada kehamilan sebelumnya sehingga merasa tidak perlu untuk rutin datang memeriksakan kehamilan. Adapula responden lain yang tidak mengikuti asuhan antenatal sesuai standar mengakui bahwa dirinya sebenarnya telah mengetahui mengenai kehamilannya pada usia kehamilan trimester I, namun karena responden merasa tidak ada keluhan dan masalah terkait kehamilannya sehingga memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan pada usia kehamilan muda.

Ternyata beberapa alasan inilah yang membuat masih adanya ibu hamil yang belum mengikuti asuhan antenatal sesuai standar di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa. Ke semua alasan ini berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil dan juga janinnya sendiri.

Hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa dalam hal ini kelompok umur, paritas, pengetahuan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendapatan, sikap, dukungan keluarga, dan dukungan petugas kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kelompok Umur

Umur merupakan salah satu keadaan/ciri tertentu yang dapat menunjukkan apakah seorang ibu hamil memiliki risiko/bahaya kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan. Berdasarkan kapan ditemukan, cara pengenalan, dan sifat risikonya, umur digolongkan dalam kelompok faktor risiko I (FR I) dengan Ada-Potensi-Gawat Obstetrik/APGO dengan kriteria “7 terlalu” dimana salah satunya adalah primimuda, primi tua, dan umur ≥ 35 tahun. WHO menyebutkan bahwa di negara berpendapatan rendah dan menengah, komplikasi dari kehamilan dan

kelahiran merupakan penyebab utama kematian pada perempuan berusia 15-19 tahun (Rochjati, 2010).

Oleh karena itu pada umur-umur tertentu ibu hamil diharapkan agar lebih sering memeriksakan diri pada petugas kesehatan secara teratur. Umur kehamilan yang aman pada ibu adalah usia 20–35 tahun. Umur dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun merupakan usia rawan bagi kehamilan.

Distribusi responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengikuti asuhan antenatal sesuai standar adalah bukan kelompok umur dengan kehamilan berisiko yakni sebanyak 52.3% sedangkan hanya 15.9% responden yang termasuk kelompok umur kehamilan berisiko yang mengikuti asuhan antenatal sesuai standar. Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $p=0.762$ yang berarti tidak ada hubungan kelompok umur dengan kesesuaian ibu hamil mengikuti asuhan antenatal sesuai standar.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rochka (2012) bahwa tidak ada hubungan umur ibu dengan keteraturan kunjungan antenatal di Puskesmas Sudiang Raya. Pada penelitian ini, jumlah ibu hamil pada kelompok umur 20-35 menempati proporsi terbanyak dalam jumlah sampel sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kesesuaian ibu hamil mengikuti asuhan antenatal sesuai standar. Sebaran umur ibu pada saat kehamilan rata-rata tidak berada pada tingkat berisiko tinggi (Murniati, 2007). Tidak ada ibu yang berumur di bawah usia 20 tahun, sedangkan ibu yang berumur 43 tahun hanya 1 orang atau 1.1 %. Peneliti lain (Vitriyani, et al., 2012) juga menemukan hal serupa bahwa tidak ada hubungan faktor usia ibu terhadap pemeriksaan ANC K1 ibu hamil. Penelitian sebelumnya (Muslimin, 2009) juga memberikan hasil serupa di mana ditemukan tidak ada hubungan antara umur dan pemanfaatan pelayanan antenatal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Sulistiyanti, 2015) disimpulkan bahwa terdapat hubungan usia ibu hamil risiko tinggi dengan kepatuhan *antenatal care* di Puskesmas Manahan Surakarta. Dalam penelitian tersebut menunjukkan sebagian besar ibu hamil memiliki usia yang matang yaitu di atas 35 tahun. Kematangan usia tersebut membantu ibu untuk dapat memahami pentingnya pemeriksaan kehamilannya, sehingga mendorong perilaku ibu hamil

untuk memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Manahan Surakarta. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Christiani (2014) tentang hubungan usia ibu hamil dengan kepatuhan *Antenatal Care*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan usia ibu hamil terhadap kepatuhan *Antenatal Care*, yaitu dari segi kepercayaan, masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya. Semakin dewasa seseorang, maka cara berfikir semakin matang dan teratur melakukan *Antenatal Care*.

Penelitian oleh Desky (2014) juga menemukan hal serupa dimana ada hubungan antara usia ibu hamil dengan ANC. Ibu yang hamil pada usia <20 tahun kan meningkatkan risiko kehamilan karena pada usia muda organ-organ reproduksi wanita belum sempurna secara keseluruhan dan perkembangan jiwa belum siap dalam menerima kehamilan sehingga cenderung kurang memperhatikan kehamilannya.

2. Paritas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebesar 36.4% responden yang termasuk dalam paritas tidak aman dan mengikuti asuhan antenatal sesuai standar sedangkan terdapat sebesar 31.8% responden yang termasuk dalam paritas aman dan mengikuti asuhan antenatal sesuai standar. Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $p=0.675$ yang berarti tidak ada hubungan paritas dengan kesesuaian ibu hamil mengikuti asuhan antenatal sesuai standar.

Pada penelitian ini, jumlah ibu dengan paritas aman dan tidak aman yang melakukan kunjungan antenatal teratur tidak jauh berbeda sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap keteraturan kunjungan antenatal yang dilakukan. Ibu dengan paritas aman merasa pemeriksaan kehamilan merupakan suatu kebutuhan dan harus dilakukan secara teratur karena meskipun termasuk paritas aman ibu tetap waspada akan segala permasalahan yang terkait dengan kehamilannya yang mungkin muncul. Sehingga dengan kunjungan antenatal yang dilakukan secara rutin dapat dengan segera dideteksi masalah serta risiko kehamilan.

Dari hasil penelitian diperoleh paritas ibu melahirkan yang paling banyak adalah paritas 1, yaitu 27 orang (30.7%). Hal ini karena paritas ibu dari hasil penelitian rata-rata masih paritas 1 (satu), sehingga ibu merasa kondisinya masih sehat-sehat saja selama kehamilan berlangsung. Selain itu, selama wawancara berlangsung, masih ada beberapa ibu hamil yang berpikir untuk datang memeriksakan kesehatannya bila mengalami keluhan saja, dan tentunya bila pengalaman sudah melahirkan sebelumnya akan memberikan pengaruh terhadap perilaku ibu hamil dalam hal memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ibu dengan paritas tidak aman yang cenderung lebih teratur memeriksakan kehamilannya dikarenakan ibu tahu dan waspada akan kondisi dirinya dan segala risiko yang mungkin muncul pada kehamilannya. Riskesdas (2013) juga mendukung hal ini di mana usia paritas tidak aman yang juga termasuk usia muda dikatakan bahwa cakupan ANC menurut karakteristik menunjukkan bahwa semakin muda umur maka ibu cenderung untuk melakukan ANC.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya (Rochka, 2012) bahwa tidak terdapat hubungan antara paritas dengan keteraturan kunjungan antenatal. Penelitian Komariyah (2012) juga menunjukkan hal yang sejalan di mana jumlah kehamilan tidak mempengaruhi keteraturan responden untuk memeriksakan kehamilan. Serta penelitian (Vitriyani, et al., 2012) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan terhadap pemeriksaan ANC K1 ibu hamil.

3. Pengetahuan

Pengetahuan ibu mengenai manfaat mengikuti asuhan antenatal sangat penting untuk mendeteksi secara dini tanda dan gejala komplikasi kehamilan, penyakit yang menyertai kehamilan agar ibu hamil dapat melakukan kunjungan antenatal dan pemeriksaan kehamilan secara teratur sesuai standar yang telah direkomendasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemeriksaan kehamilan beserta manfaatnya

dengan jumlah 45 responden (51.1%) dan 34 orang di antaranya sudah mengikuti asuhan antenatal sesuai standar yang direkomendasikan.

Berdasarkan uji statistik ($p=0.819$), ternyata tidak ditemukan hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan kesesuaian ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal sesuai standar yang direkomendasikan. Dalam tabel tabulasi silang tampak jelas bahwa jumlah responden yang mengikuti asuhan antenatal secara teratur tidak berbeda secara signifikan antara responden dengan pengetahuan cukup dengan responden yang berpengetahuan kurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eka Vitriyani dkk (2012) yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ANC ibu hamil ($r=0,201$) terhadap pemeriksaan ANC K1 ibu hamil.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya (Rochka, 2012) bahwa terdapat hubungan kuat antara pengetahuan ibu dengan keteraturan kunjungan antenatal di Wilayah Kerja Puskesmas Sudiang Raya. Beberapa penelitian lain (Lumempouw, et al., 2015; Komariyah, 2008) dan juga menunjukkan hasil serupa dimana terdapat hubungan antara pengetahuan dengan keteraturan ibu hamil mengikuti asuhan antenatal.

Walaupun demikian, pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (*outcome*) pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 1997).

4. Tingkat Pendidikan

Distribusi tingkat pendidikan responden di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa menunjukkan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang cukup yang telah menyelesaikan program pemerintah wajib belajar 9 tahun sebanyak 47 responden (53.4%).

Pendidikan penting karena merupakan dasar dari mengertinya orang dalam hal menerima informasi. Pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan kecerdasan manusia maupun perubahan tingkah lakunya. Pendidikan juga berarti

bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah pula mereka menerima informasi. Pada akhirnya banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi (Mubarak, 2009 dalam (Sulistiyanti, 2015)

Hasil analisis statistik ($p=0.037$) menunjukkan bahwa ada hubungan tingkat pendidikan cukup dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan kekuatan korelasi sebesar $\phi=0,247$. Hal ini berarti terdapat hubungan lemah antara tingkat pendidikan cukup dengan kunjungan asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa dan memberikan kontribusi sebesar 24.7% terhadap kesesuaian kunjungan asuhan antenatal yang dilakukan ibu.

Penelitian ini mendapatkan hasil yang juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lumempouw, et al., 2015) di Puskesmas Teling Atas, Manado yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kunjungan *antenatal care*.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Sulistiyanti, 2015) dimana didapatkan bahwa tingkat pendidikan ibu hamil risiko tinggi merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan sehingga mendorong perilaku ANC pada ibu hamil.

Menurut (Rohan dan Siyoto, 2013 dalam (Lumempouw, et al., 2015) bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi dalam hidupnya. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan bertindak lebih rasional. Oleh karena itu orang yang berpendidikan akan lebih mudah menerima gagasan baru.

5. Status Pekerjaan

Dalam penelitian ini bekerja dikategorikan sebagai mereka yang memiliki aktivitas di luar rumah guna mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari, sedangkan tidak bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai ibu rumah tangga (IRT).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebesar 20.5% responden yang berstatus bekerja ketika hamil dan melakukan kunjungan antenatal secara teratur sedangkan terdapat sebesar 47.7% responden yang berstatus tidak bekerja ketika hamil dan melakukan kunjungan antenatal teratur. Hasil analisis uji chi-square diperoleh nilai $p=0.559$ yang berarti tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan kesesuaian ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal sesuai standar.

Dari penelitian ini tampak bahwa ibu-ibu hamil yang tidak memiliki kegiatan di luar rumah cenderung memiliki waktu yang cukup luang untuk datang memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya (Lumempouw, et al., 2015) yang juga menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara pekerjaan ibu dengan kunjungan antenatal care. Sejalan dengan hal tersebut juga ditemukan oleh Rochka (2012) mengenai tidak adanya hubungan antara pekerjaan ibu dengan keteraturan kunjungan antenatal. Penelitain lain (Vitriyani, et al., 2012) juga menemukan hal serupa dimana tidak ada hubungan faktor pekerjaan terhadap pemeriksaan ANC K1 ibu hamil.

6. Tingkat Pendapatan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sekitar 85.2% responden memiliki pendapatan di bawah UMP tetapi paling besar proporsinya terhadap responden yang mengikuti asuhan antenatal secara teratur yakni sebesar 56.8%. Setelah diuji statistik ($p=0.681$) ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan kesesuaian ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu.

Penelitian sebelumnya (Aisyah & Fitriani, 2013) menemukan bahwa kunjungan ANC pada ibu hamil dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dikarenakan faktor sosial budaya dan sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan) yang dalam hal ini adalah faktor pekerjaan yaitu sebagai ibu rumah tangga, dimana ibu rumah tangga tidak mempunyai

penghasilan secara mandiri yang harus bergantung pada pendapatan suami sehingga dapat berpengaruh terhadap keteraturan kunjungan ANC yang membutuhkan biaya.

Perbedaan hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan melihat bahwa pemerintah sudah sangat mengakomodir untuk mencapai Indonesia sehat melalui program kesehatan gratis. Kesehatan bukan lagi milik orang dengan pendapatan yang tinggi tetapi hak setiap warga negara memungkinkan setiap kalangan sosial ekonomi dapat melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Perbedaan mencolok penyebab terjadinya perbedaan hasil penelitian ini juga melihat lokasi penelitian yang cukup berbeda yaitu dilaksanakan di rumah sakit bersalin. Tentunya kondisi sosioekonomi Ibu hamil di rumah sakit bersalin berbeda dengan ibu hamil di puskesmas.

7. Sikap

Distribusi responden menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki sikap positif (50%) dan begitu pula sikap negatif (50%) terhadap kegiatan pemeriksaan kehamilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap dengan kesesuaian ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal ($p=0.819$) di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murniati, 2007) bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap ibu hamil dengan pemanfaatan pelayanan antenatal. Tetapi walaupun demikian sikap ibu yang lebih baik akan berdampak juga pada ibu yang memanfaatkan pelayanan antenatal. Sikap ibu dalam penelitian ini sebagian responden berada pada tingkat sifat positif (50%).

Penelitian lain (Komariyah, 2008) juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap kunjungan pemeriksaan kehamilan. Walaupun dari hasil analisa didapatkan tidak ada hubungan sikap responden dengan kesesuaian responden dalam mengikuti kunjungan asuhan antenatal namun sikap adalah faktor penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak sehingga kematian ibu dan anak bisa di cegah. Dengan sikap yang positif juga responden bisa merespon atau menilai arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sehingga sikap responden

dalam melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan dapat ditingkatkan, baik dengan cara pemberian penyuluhan ataupun dengan dibentuknya kelas ibu hamil.

Menurut Notoatmodjo (1997), sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan merupakan reaksi tertutup. Sikap mempunyai 3 komponen pokok yaitu:

- a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek
- b. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek.
- c. Kecenderungan untuk bertindak.

8. Dukungan Keluarga

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat telah memperoleh dukungan keluarga yang cukup yakni sebanyak 56.8% responden dan 39.8% di antaranya telah mengikuti asuhan antenatal sesuai dengan standar yang direkomendasikan. Setelah diuji statistik, ternyata tidak ditemukan hubungan ($p=0.850$) yang bermakna antara dukungan keluarga dan kesesuaian ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surniati (2013) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan keteraturan pemanfaatan antenatal care. Selain itu, Eka Vitriyanti dkk. (2012) juga menemukan hal serupa dimana tidak ada hubungan antara dukungan suami terhadap pemeriksaan ANC K1 ibu hamil.

Tidak adanya hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan keteraturan pemanfaatan antenatal care dapat disebabkan karena keluarga merupakan faktor yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku individu. Keluarga merupakan komponen eksternal yang membentuk perilaku (respons), sedangkan faktor internal atau yang berpengaruh secara langsung misalnya sikap dan niat individu (Notoadmodjo, 2010). Selain itu, dari hasil

wawancara responden tampak bahwa jawaban yang diberikan oleh beberapa responden cenderung untuk menjaga nama baik keluarganya sehingga memberikan jawaban yang baik secara berkelanjutan.

9. Dukungan Petugas Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi yang berpendapat bahwa dukungan dari petugas kesehatan sudah cukup dan melakukan kunjungan antenatal secara teratur lebih besar (60.2%) dibandingkan dengan proporsi responden yang berpendapat bahwa dukungan dari petugas kesehatan masih kurang dan tetap melakukan kunjungan antenatal teratur (8.0%). Setelah dilakukan uji statistik ($p=1.000$), disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kesesuaian ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal di Puskesmas Somba Opu.

Penelitian ini sejalan dengan yang didapatkan oleh Ngosiem (2008) di Puskesmas Dobo Kabupaten Aru Provinsi Maluku yang menyimpulkan bahwa pelayanan oleh tenaga kesehatan tidak berhubungan dengan rendahnya kunjungan ibu hamil pada trimester III. (Notoatmodjo, 2010)

Tidak adanya hubungan bermakna ini dapat disebabkan karena responden secara sadar merasa bahwa pemeriksaan kehamilan penting untuk dilakukan tanpa melihat bagaimana peran dari petugas kesehatan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan, walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menghindarinya.

1. Ketepatan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*. Pada desain ini, semua variabel diukur pada saat yang sama. Dengan demikian, desain ini tidak dapat memastikan hubungan temporal (pengaruh waktu) antara tiap faktor terutama variabel kelompok umur saat kehamilan pertama dan yang berisiko dengan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal. Perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan rancangan *case control study*.

2. Kualitas Data

Karena jumlah responden yang sedikit, yang disebabkan ada responden yang menolak ataupun ogah-ogahan dalam menjawab pertanyaan karena terlalu banyak pertanyaan serta tidak sabar dalam menunggu antrian pemeriksaan kehamilan, maka hasil data yang diperoleh tidak bisa maksimal.

3. Kualitas Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, yang dimulai dengan mendeskripsikan data dalam bentuk distribusi frekuensi masing-masing variabel. Selanjutnya dilakukan analisis bivariat dengan uji *chi-square* dan korelasi, dalam penelitian tidak dilakukan uji multivariat untuk semua jenis variabel data baik umum maupun variabel bebas.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa (tepatnya di Puskesmas Somba Opu), Sulawesi Selatan tahun 2016, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Tidak terdapat hubungan kelompok umur ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
2. Tidak terdapat hubungan paritas ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
3. Tidak terdapat hubungan pengetahuan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
4. Terdapat hubungan tingkat pendidikan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016 dan memberikan kontribusi sebesar 24.7% terhadap kesesuaian kunjungan asuhan antenatal yang dilakukan ibu hamil.
5. Tidak terdapat hubungan status pekerjaan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
6. Tidak terdapat hubungan tingkat pendapatan ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
7. Tidak terdapat hubungan sikap ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

8. Tidak terdapat hubungan dukungan keluarga ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
9. Tidak terdapat hubungan dukungan petugas kesehatan terhadap ibu hamil dengan keikutsertaan ibu hamil dalam mengikuti asuhan antenatal (ANC) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.
10. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh paling kuat terhadap kunjungan asuhan antenatal dengan kekuatan sebesar 3,289x di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dengan kunjungan asuhan antenatal (ANC) yang sesuai di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan frekuensi penyuluhan dan pemberian informasi oleh pihak Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa kepada ibu hamil mengenai manfaat dari asuhan antenatal berupa pemeriksaan kehamilan, baik secara individu maupun secara kelompok.
2. Bagi pihak Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pelayanan yang baik dan memuaskan dapat menjadikan ibu hamil merasa nyaman dan selalu rajin melakukan kunjungan antenatal secara teratur.
3. Disarankan bagi Pemerintah untuk terus melanjutkan penggalakan pendidikan wajib 12 tahun agar lebih meningkatkan pemahaman diri mengenai pentingnya mengikuti asuhan antenatal (ANC) secara teratur bagi ibu hamil.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan menggunakan variabel penelitian yang belum diteliti terkait faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan, seperti faktor etnis/budaya, faktor jarak pelayanan kesehatan, dan faktor partisipasi masyarakat lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaansz, G., 2010. Asuhan Antenatal. In: *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, pp. 278-287.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014. *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2014*. [Online]
Available at:
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2014.pdf
[Accessed 28 Sept 2016].
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2014. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014*. [Online]
Available at: http://dinkes.sulselprov.go.id/files_download/Data2014.pdf
[Accessed 28 Nov 2016].
- Marniyanti, L., Saleh, I. & Soebyakto, B. B., 2016. Pelayanan Antenatal Berkualitas dalam Meningkatkan Deteksi Risiko Tinggi pada Ibu Hamil oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sako, Sosial, Sei Baung dan Sei Selincah di Kota Palembang. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 3(1), pp. 355-362.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan dan JICA.
- Ajzen, I. & Fishbein, M., 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour*. New Jersey(USA): Prentice-Hall.
- Notoatmodjo, S., 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariyah, S., 2008. *Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Hamil tentang Pemeriksaan Kehamilan dengan Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorame Mojojoto Kediri*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. [Online]
Available at:
<http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Rikesdas%202013.pdf>
[Accessed 28 Sept 2016].
- Notoatmodjo, S., 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Vitriyani, E., Kirwono, B. & Firnawati, A. F., 2012. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) K1 Ibu Hamil sDi Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aisyah, S. & Fitriani, E., 2013. Hubungan Antara Keteraturan Kunjungan ANC dengan Keterampilan Menyusui pada Ibu Nifas di Ruang Bersalin. Volume 1.
- Sulistiyanti, A., 2015. *Hubungan Usia dan Pendidikan Ibu Hamil Risiko Tinggi dengan Kepatuhan Antenatal Care*. Surakarta, s.n.
- Murniati, 2007. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal oleh Ibu Hamil di Kabupaten Aceh Tenggara*, Medan: s.n.
- Lumempouw, G. A., Pelealu, F. J. & Maramis, F. R., 2015. *Hubungan antara Pengetahuan, Status Pendidikan, dan Status Pekerjaan Ibu dengan Kunjungan Antenatal Care di Puskesmas Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado*, Manado: s.n.
- Rochka, M. M., 2011. *Faktor yang Berhubungan dengan Keteraturan Kunjungan Antenatal di Wilayah Kerja Puskesmas Sudiang Raya Makassar Tahun 2011*, s.l.: Universitas Hasanuddin.
- Rochjati, P., 2010. Pelayanan Kebidanan di Indonesia. In: *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, pp. 21-34.
- WHO, 2016. *Maternal Mortality*. [Online] Available at: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/> [Accessed 22 January 2017].
- WHO, 2016. *Indonesia - Maternal and Perinatal Health Profile*, s.l.: WHO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*, s.l.: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- UNICEF Indonesia, 2012. *Ringkasan Kajian Kesehatan Ibu dan Anak*. [Online] Available at: https://www.unicef.org/indonesia/id/A5_-_B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf [Accessed 21 January 2017].