

**UJI AKTIVITAS IMUNOGLOBULIN G (IgG) KELINCI
(*ORYCTOLAGUS CUNICULUS*) AKIBAT PEMBERIAN MINYAK KELAPA
MURNI (*VIRGIN COCONUT OIL*) HASIL FERMENTASI**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh

MAKASSAR

HARNIDA

NIM.70100105028

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 27 Agustus 2010

Penyusun,

Harnida

NIM: 701 001 05 028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Aktivitas Immunoglobulin G (IgG) Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Akibat Pemberian Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) Hasil Fermentasi”, yang disusun oleh Harnida NIM: 701 001 05 028, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1431H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Agustus 2010 M.

17 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : **Drs. H. Hasyim Bariun, M.Si., Apt.** (.....)

Sekretaris Penguji : **Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt.** (.....)

Penguji I : **Abdul. Rahim, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)

Penguji II : **Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si.** (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Immunoglobulin G (IgG) Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Akibat Pemberian Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) Hasil Fermentasi”, dapat terselesaikan tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Berkat kemauan yang keras dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materi skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Karenanya patut rasanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Hasyim Bariun, M.Si, Apt, dan Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt atas saran, waktu, dan perhatian yang telah beliau berikan kepada penulis sejak dimulainya penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Karya ini khusus penulis persembahkan kepada keluarga, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd. Halim dan ibunda St. Rahmah yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, doa yang tulus dan ikhlas serta bantuan dan dorongan yang diberikan secara materi maupun moril. Om Hardi dan tanteku Herlina serta Nurhedah atas motifasi serta bantuan moral maupun materi.

Juga tak lupa ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Ketua Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
8. Kakak saya Harmiati , yang selama ini selalu memberikan motifasi serta Do'a, hingga tersusunya skripsi ini.
9. Ibu Asrama Alif Ibu Hj. Syamsiah Dg. Bau yang selama ini selalu memberikan perhatian dan motivasi.
10. Teman – teman Jurusan Farmasi angkatan 2005, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motifasi selama penelitian.

Semoga budi baik yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dan diterima disisi Allah SWT.

Akhirnya berkat restu dan hidayah dari Allah SWT, maka penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, dan penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis hanya mampu bertawakkal kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat diterima sebagai karya ilmiah yang bermanfaat. Amin.



Makassar, 27 Agustus 2010

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-4
<i>A. Latar Belakang</i>	1-4
<i>B. Rumusan Masalah</i>	4
<i>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5- 27
<i>A. Uraian Tanaman Kelapa</i>	5
1. Klasifikasi	5
2. Morfologi	5-6
3. Nama Daerah	6
<i>B. Minyak Kelapa murni</i>	6-8

1. Kandungan Kimia	7-8
2. Kegunaan	8
<i>C. Uraian Khamir Saccharomyces cerevisiae</i>	8-9
1. Klasifikasi	8-9
2. Morfologi	9
<i>D. Uraian Sistem Pertahanan Tubuh</i>	9-14
1. Imunitas	9-10
2. Klasifikasi	10-14
<i>E. Antigen</i>	14
<i>F. Antibodi</i>	14-16
<i>G. Fungsi Immunoglobulin</i>	16
<i>H. Klasifikasi Immunoglobulin</i>	16-17
<i>I. Struktur Immunoglobulin</i>	17-18
<i>J. Immunoglobulin G (IgG)</i>	18-20
1. Sifat Fisikokimia	18-19
2. Struktur dan sifat	19
3. Aktivitas biologi dan imunologi	19-20
<i>K. Teknik Immunokimia</i>	20-23
1. Immunopresipitasi	20-21
2. Aglutinasi	21-22
3. Hemaglutinasi pasif	22-23

<i>L. Uraian Hewan Coba</i>	23-24
1. Klasifikasi Kelinci	23
2. Karakteristik	24
<i>M. Tinjauan islam mengenai penelitian tanaman obat</i>	24-27
BAB III METODELOGI PENELITIAN	28-35
<i>A. Alat dan Bahan</i>	28
a. Alat dan yang digunakan	28
b. Bahan yang digunakan	28
<i>B. Penyiapan Sampel</i>	28-33
a. Penyiapan Alat	28-29
b. pengambilan Bahan penelitian	29
c. Pembuatan Santan	29
d. Pemisahan Krim dan Skim Santan	29
e. Pembuatan Medium	30
f. Peremajaan Khamir	30
g. Pembuatan Kultur Khamir	30-31
h. Perhitungan Jumlah Total Khamir dalam Kultur Khamir	31
i. Pembuatan Minyak Kelapa Murni	31
j. Penyiapan suspensi SDMD 2%	31-32
k. Penyiapan Larutan PBS	32
l. Penyiapan Emulsi Minyak	32-33

	<i>C. Pengujian Aktivitas IgG pada Hewan Uji</i>	33-35
	a. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji	33
	b. Uji Aktivitas IgG Awal	33
	c. Perlakuan Terhadap Hewan Uji	34
	d. Uji Hemaglutinasi	34-35
	<i>D. Pengumpulan dan Analisis data</i>	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	36-40
	<i>A. Hasil Penelitian</i>	36
	<i>B. Pembahasan</i>	37-40
BAB V	KESIMPULAN	41
	<i>A. Kesimpulan</i>	41
	<i>B. Implikasi Penelitian</i>	41
	DAFTAR PUSTAKA	42-43
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	44-52
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53

DAFTAR TABEL


Nomor		Halaman
1.	Komposisi asam lemak minyak kelapa	8
2.	Data Titer immunoglobulin Sebelum imunisasi dan Pemberian minyak kelapa murni (VirginCoconutOil).....	36
3.	Data Titer immunoglobulin Sebelum imunisasi dan Pemberian minyak kelapa murni (VirginCoconutOil).....	36
4.	Data Titer Immunoglobulin G (IgG) Setelah Ditransformasi dengan $[2 \log (\text{titer})]+1$	41
5.	Hasil Analisis Sidik Ragam (ASR) Perlakuan terhadap Aktivitas Immunoglobulin G (IgG)	43
6.	Perbandingan Antar Perlakuan	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Struktur Dasar Immunoglobulin.....	17
2.	Foto Pemisahan Minyak Kelapa Murni	51
4.	Foto Minyak Kelapa Murni	51
5.	Foto Data Titer Immunoglobulin G (IgG) sebelum perlakuan pada plat mikrotiter.....	52
6.	Foto Data Titer Immunoglobulin G (IgG) setelah perlakuan pada plat mikrotiter.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Skema kerja.....	44 – 45
2. Analisis Statistika Rasio Aktivitas Immunoglobulin G (IgG) Setelah Pemberian minyak kelapa murni dengan Menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda Nyata Jarak Duncan(BNJD).....	46



ABSTRAK

Nama : Harnida
NIM : 701 001 05 028
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Immunoglobulin G (IgG) Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Akibat Pemberian Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) Hasil Fermentasi.

Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas imunoglobulin G (IgG) kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) akibat pemberian minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) hasil fermentasi dengan metode hemaglutinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek imunoglobulin G terhadap aktivitas sistem imun kelinci. Metode hemaglutinasi, dengan menginduksi aktivitas IgG menggunakan sel darah merah domba (SDMD) 2% b/v secara intraperitoneal. Setelah diinduksi, kelinci diberi perlakuan selama 10 hari berturut-turut dimana kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dibagi dalam empat kelompok perlakuan yaitu perlakuan I sebagai kontrol diberi larutan koloidal gom arab dan ketiga perlakuan lain masing-masing diberi minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) dengan konsentrasi 7,8% v/v, 15,6% v/v, dan 31,2% v/v. Pengamatan dilakukan 10 hari setelah penginduksian SDMD dengan menghitung nilai titer antibodi yaitu pengenceran tertinggi serum darah kelinci yang masih menunjukkan aglutinasi. Berdasarkan hasil analisis statistika dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan analisis lanjutan dengan metode uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) memperlihatkan bahwa minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) pada konsentrasi 15,6% dan 31,2% v/v dapat meningkatkan aktivitas imunoglobulin G (IgG) pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Kata kunci : Imunoglobulin G (IgG), Hemaglutinasi, minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil)

ABSTRACT

Nama : Harnida
NIM : 701 001 05 028
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Thr Research About The Immunoglobulin G (IgG) Activity Of Male Rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) Because Of Giving Virgin Coconut Oil result fermentation.

The research about the immunoglobulin G (IgG) activity of male rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) because of giving Virgin Coconut Oil using hemagglutination method was conducted. The research was aimed to determine the effect of black seed infuse to immune system activity of male rabbit. In hemagglutination method, the IgG activity was induced by using Shell Red Blood Cell (SRBC) 2% w/v intraperitoneally. After induced, rabbit was treatment for 10 days continuously, where male rabbit divided into 4 treatment groups, first treatment as control was administrated with solution coloidal gom arab and the others treatment was administrated with Virgin Coconut Oil concentration 7,8%, 15,6% and 31,2%. Then, the Hemagglutination was observed 10 days after SRBC induction by calculating the antibody titer value that was highest dilution of rabbit blood serum in which showed agglutination. The result of the statistical analysis with the Complete Random Method (CRM) and then continued with the Duncan Random Significant Difference (DRSD) method showed that administration of Virgin Coconut Oil with concentration 15,6% and 31,2% v/v significantly increase the immunoglobulin G (IgG) activity of male rabbit (*Oryctolagus cuniculus*).

Key word : Immunoglobulin G (IgG), Hemagglutination, Virgin Coconut Oil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, kita diperintahkan untuk memakan bermacam-macam buah-buahan dan sari buah-buahan. Hal ini tersirat dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya dalam QS. Al-An'am (6) : 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِمَّنَّ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt memerintahkan kita untuk merenungkan tanaman saat berbuah dan saat masak. Manusia hendaknya memanfaatkan buah-buahan itu baik untuk di makan maupun untuk dijadikan obat. Banyak tanaman yang memiliki beraneka macam buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya adalah kelapa. Kelapa telah lama dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik sebagai sumber makanan, obat-obatan, industri dan lain-lain. (Wibowo 2005, 4-5).

Minyak kelapa murni merupakan produk modern dari buah kelapa yang memiliki kemampuan meningkatkan taraf kesehatan. Prosesnya dilakukan dalam suhu relatif rendah (Wibowo 2005, 4-5).

Proses pembuatan minyak kelapa murni ini sama sekali tidak menggunakan zat kimia organis dan pelarut minyak. Pengolahan minyak kelapa murni dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya metode fermentasi. Salah satu mikroba yang dapat digunakan untuk memfermentasi santan menjadi minyak kelapa murni antara lain *Saccharomyces cerevisiae*. Minyak kelapa murni (VCO) diyakini memiliki sejumlah khasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Ini karena kandungan asam lemak jenuhnya cukup tinggi. Asam lemak dalam minyak kelapa ini memiliki beberapa sifat antimikroba dan antivirus. Karenanya, VCO mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu mencegah infeksi virus, mengurangi risiko kanker, dan penyakit degeneratif lainnya.

Kekebalan tubuh berkaitan dengan antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah golongan protein yang dibentuk sel plasma (poliferasi sel B) akibat kontak dengan antigen. Tergantung dari jenis antigennya, dapat disintesa dan dilepaskan 5 tipe antibodies atau Imunoglobulin, yakni tipe A, D, E, G, dan M yang singkatnya dinamakan IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM (Tjay 2002, 729).

IgG salah satu jenis Ig, merupakan antibodi yang paling mudah berdifusi ke dalam jaringan ekstrasvaskular dan melakukan aktivitas antibodi di jaringan. IgG pulalah yang umumnya melapisi mikroorganisme sehingga partikel itu lebih mudah difagositosis, di samping itu IgG juga mampu menetralisasi toksin dan virus (Kresno 2001, 53-54).

Apabila bahan asing masuk ke dalam tubuh, interaksi antigen dan antibodi yang terdapat dalam serum darah akan segera terbentuk. Oleh itu interaksi antara antigen dan antibodi sangat penting dan banyak digunakan invitro untuk tujuan diasnogtik. Metode hemaglutinasi merupakan metode yang menggunakan prinsip di atas untuk menganalisis keaktifan antibodi seseorang. (Hadioetomo 1990, 56-57).

Permasalahan yang timbul kemudian adalah efek dari minyak kelapa murni terhadap kesehatan, khususnya dalam meningkatkan sistem imun, hanya sebatas pengalaman empiris semata. Sangat minim laporan praklinis maupun

klinis yang memuat data ilmiah efek minyak ini terhadap sistem pertahanan tubuh.

Berdasarkan hasil penelitian M.idrus (2006) tentang uji aktivitas immunoglobulin M (IgM) mencit akibat pengaruh pemberian minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) dengan menggunakan konsentrasi 7,8% v/v, 15,6% v/v, dan 31,2% v/v secara fermentasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dengan konsentrasi VCO tersebut dapat meningkatkan immunoglobulin M (IgM) pada mencit (*Mus musculus*).

Bertolak dari landasan berpikir diatas maka peneliti telah melakukan penelitian terhadap minyak kelapa murni dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh minyak kelapa murni (VCO) tersebut terhadap aktivitas sistem imun berdasarkan profil antibodi immunoglobulin G kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dengan menggunakan konsentrasi 7,8%v/v; 15,6%v/v; dan 31,2% v/v . Uji aktivitas IgG dilakukan dengan metode uji hemaglutinasi yaitu dengan mengamati pengenceran tertinggi dari serum darah kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) yang masih dapat mengaglutinasi sel darah merah domba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dapat timbul diatas yaitu :

Apakah pemberian minyak kelapa murni pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dapat menimbulkan efek immunoglobulin G (IgG).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah minyak kelapa murni (VCO) dapat menimbulkan efek imunoglobulin G (IgG). Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penggunaan minyak kelapa murni (VCO).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman Kelapa (Cocos nucifera Linn)*

1. Klasifikasi

Dunia	:	Plantae
Divisi	:	Spermatophyta
Anak divisi	:	Angiospermae
Kelas	:	Monocotyledonae
Anak kelas	:	Dialypetalae
Bangsa	:	Arecales
Marga	:	Cocos
Jenis	:	<i>Cocos nucifera</i> Linn (Tjitrosoepomo 1994, 444).

2. Morfologi

Pohon, tinggi 20-30 m, diameter 40 cm dan membesar pada pangkalnya, batang ramping tegak lurus, tidak bercabang, dengan bekas daun yang lepas. Daun majemuk menyirip tumbuh berkumpul diujung batang membentuk roset batang, panjang helaian daun sampai 5 m, dengan pangkal tangkai daun yang melebar menjadi upih dan membalut batang. Anak daun panjang, keras seperti kulit, ujung runcing mudah rontok. Bunga kecil-kecil, warnanya kuning putih, berkelamin tunggal yang terdapat dalam satu pohon, tersusun dalam karangan berupa tongkol yang bercabang, dikelilingi oleh

seludang bunga. Buahnya buah batu berbiji satu, diameter sekitar 15 cm, dengan 3 mata lembaga dekat pangkal buah. Buah berbentuk bulat telur sungsang, dengan diameter sekitar 25x17 cm, terbungkus serabut tebal dengan kulit dalamnya keras seperti tulang, berisi air dan daging yang mengandung santan (Wijayakusuma 1996, 63).

3. Nama Daerah

Sumatera	: Baku, krambil, tuwalah, hauni harambir, hayuni, halambir, arambir, kelapa, harambie, nyiui.
Jawa	: Kelapa, krambil, enyor, nyenyor, nyeyong.
Nusatenggara	: Niu, Nyiur, nyir, nia.
Kalimantan	: Enyu, nyoh.
Sulawesi	: Bango, tokhulu, bango, kaluku, anyoro.
Maluku	: Niur, ruhu, nikwel, honi, wago ayo.
Irian	: Nu, Nour Sraknan (Wijayakusuma 1996, 63).

B. Minyak Kelapa Murni

Codex Alimentarius mendefenisikan bahwa minyak kelapa murni adalah minyak dan lemak makan yang dihasilkan tanpa mengubah minyak. Minyak diperoleh dengan hanya perlakuan mekanis dan pemakaian panas minimal. Minyak kelapa murni diekstraksi dengan berbagai metode yaitu pemasakan, fermentasi, pendinginan, dan tekanan mekanis (sentrifugasi) (soedjana, 1).

1. Kandungan Kimia

Secara kimiawi, minyak kelapa terbentuk dari rantai karbon, hidrogen, dan oksigen, yang disebut dengan asam lemak. Asam lemak digabung oleh suatu molekul gliserol membentuk gliserida. Gliserida yang terdapat pada lemak dan minyak adalah trigliserida atau lipida. Diperlukan tiga molekul asam lemak yang dikombinasikan dengan satu molekul gliserol untuk membentuk satu molekul trigliserida.

Berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal diantara atom-atom karbon penyusunnya dan bersifat lebih stabil (tidak mudah bereaksi) daripada asam lemak tak jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki paling sedikit 1 ikatan ganda diantara atom-atom karbon penyusunnya. Ikatan ganda pada asam lemak tak jenuh mudah bereaksi dengan oksigen (mudah teroksidasi). Asam lemak dalam minyak kelapa sebagian besar (92%) merupakan minyak jenuh. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak kelapa memiliki kandungan asam lemak jenuh yang paling tinggi. Tingginya asam lemak jenuh yang dikandungnya menyebabkan minyak kelapa tahan terhadap ketengikan akibat oksidasi. Oksidasi menyebabkan pembentukan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh.

Tabel. 1.

Berikut komposisi asam lemak minyak kelapa murni :

Asam Lemak	Jumlah (%)
Asam Lemak jenuh	
Asam Kaproat	0,20
Asam Kaprilat	6,10
Asam Kaprat	8,60
Asam laurat	50,50
Asam miristat	16,18
Asam palmitat	7,50
Asam stearat	1,50
Asam arachnidat	0,02
Asam Lemak Tidak Jenuh	
Asam palmitoleat	0,20
Asam oleat	6,50
Asam linoleat	2,70

(Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian).

2. Kegunaan

Berbagai manfaat minyak kelapa yaitu : infeksi bakteri, virus, jamur menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, osteoporosis, diabetes mellitus, menjaga fungsi liver, obesitas, kanker, stamina, dan lain-lain

(Anonim, 2007).

C. Uraian Khamir *Saccharomyces cerevisiae*

1. Klasifikasi

Kerajaan	: Jamur
Filum	: Ascomycota
Subfilum	: Saccharomycotina
Kelas	: Saccharomycetes
Order	: Saccharomycetes
Keluarga	: Saccharomycetaceae
Genera	: <i>Saccharomyces</i>
Spesies	: <i>Saccharomyces cerevisiae</i>

2. Morfologi

Sel-selnya bundar, lonjong, memanjang, atau seperti benang dan menghasilkan pseudomiselium. Berkembang biak secara vegetative dengan cara penguncupan multilateral. Konjugasi isogam atau heterogen dapat mendahului atau dapat terjadi setelah pembentukan askus. Dapat berbentuk tonjolan-tonjolan. Setiap askus dapat mengandung satu sampai empat spora dengan berbagai bentuk. Spora dapat berkonjugasi. Disimilasi berlangsung dari oksidatif yang disukai sampai kepada fermentative yang dominan. Dalam biakan cair biasanya terjadi pertumbuhan di dasar. Cincin dan pelikel dapat

terbentuk dalam jangka waktu yang lebih panjang . senyawa-senyawa gula yang umum biasanya difermentasikan dengan kuat (Pelczar 2009, 959-960).

D. Uraian Sistem Pertahanan Tubuh

1. Imunitas

Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit terutama penyakit infeksi. Gabungan sel, molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut sistem imun dan reaksi yang dikordinasi sel-sel dan molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya disebut respons imun. Sistem imun diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup.

Mikroba dapat hidup ekstraselular, melepas enzim dan menggunakan makanan yang banyak mengandung gizi yang diperlukannya. Mikroba lain menginfeksi sel pejamu dan berkembangbiak intraselular dengan menggunakan sumber energi sel pejamu. Baik mikroba ekstraselular maupun intraselular dapat menginfeksi subyek lain, menimbulkan penyakit dan kematian, tetapi banyak juga yang tidak berbahaya bahkan berguna untuk pejamu (Baratawidjaja 2004, 1).

2. Klasifikasi

Sistem Imun pada manusia dibagi dalam 2 kelompok besar

1. Respon Imun Nonspesifik

Mekanisme fisiologik imunitas nonspesifik berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk ke tubuh dan dengan cepat menyingkirkan mikroba tersebut. Sistem ini disebut nonspesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu, telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Mekanismenya tidak menunjukkan spesifitas terhadap bahan asing dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak patogen potensial. Sistem tersebut merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung (Baratawidjaja 2004, 3).

Komponen-komponen sistem imun nonspesifik terdiri atas

a. Pertahanan fisik/mechanik

Dalam Sistem pertahanan fisik atau mekanik, kulit, selaput lender, silia saluran nafas, batuk dan bersin merupakan garis pertahanan terdepan terhadap infeksi. Keratinosit dan lapisan epidermis kulit sehat, dan epitel mukosa yang utuh tidak dapat ditembus kebanyakan mikroba. Kulit yang rusak akibat luka bakar dan

selaput lendir yang rusak oleh asap rokok akan meningkatkan resiko infeksi.

b. Pertahanan biokimia

PH asam keringat dan sebaseus, berbagai asam lemak yang dilapisi kulit mempunyai efek denaturasi protein membrane sel sehingga dapat mencegah infeksi yang terjadi melalui kulit. Lisozim dalam keringat, ludah, air mata dan air susu ibu melindungi tubuh dari berbagai kuman gram-positif oleh karena dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri. Air susu ibu juga mengandung laktooksidase dan asam neuraminik yang mempunyai sifat antibacterial terhadap *E.coli* dan stafilokok. Saliva mengandung enzim seperti laktooksidase yang merusak dinding sel mikroba dan menimbulkan kebocoran sitoplasma dan juga mengandung antibody serta komplemen yang dapat berfungsi sebagai opsonin dalam lisis sel mikroba. Asam hidroklorida dalam lambung, enzim proteolitik dan empedu dalam usus halus membantu menciptakan lingkungan yang dapat mencegah infeksi mikroorganisme.

c. Pertahanan humoral

Berbagai bahan dalam sirkulasi seperti komplemen, interferon, CRP dan kolektin (collectine) berperan dalam pertahanan humoral. Serum normal dapat membunuh dan menghancurkan beberapa bakteri

gram negative. Hal itu disebabkan oleh adanya kerjasama antara antibody dan komplemen (Baratawidjaja 2004, 3-7).

d. Pertahanan seluler

Salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya antigen bakteri, adalah menghancurkan bakteri bersangkutan secara nonspesifik dengan proses fagositosis. Fagosit, makrofag, sel Natural Killer (NK) berperan dalam system imun nonspesifik seluler ini.

Selain fagositosis, manifestasi respon nonspesifik lain adalah reaksi inflamasi. Reaksi ini terjadi akibat dilepaskannya mediator-mediator tertentu oleh beberapa sel misalnya histamin yang dilepaskan oleh basofil dan mastosit, vasoactive amine yang dilepaskan oleh trombosit, serta anafilatoksin berasal dari komponen-komponen komplemen yang merangsang pelepasan mediator-mediator oleh mastosit dan basofil sebagai reaksi umpan balik (Kresno 2001, 7-8).

2. Respon Imun spesifik

Kelompok mikroba mempunyai kesempatan luas melalui mutasi secara perlahan menyusun strategi, sehingga mampu menghindar dari pertahanan kekebalan alami kita. Tubuh jelas butuh untuk merencanakan mekanisme pertahanan yang dapat digunakan terhadap masing-masing organisme tidak peduli berapapun banyaknya mereka.

Benda asing yang pertama kali muncul dalam badan segera dikenal oleh sistem imun spesifik sehingga terjadi sensitasi sel-sel system imun tersebut. Sistem ini disebut spesifik karena sistem ini hanya dapat menghancurkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya.

Dua bagian utama dari sistem imun spesifik adalah :

1. Pertahanan humoral

Humor berarti cairan tubuh. Yang berperan dalam system imun spesifik humoral adalah limfosit B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berpoliferasi dan berkembang menjadi sel plasma yang dapat membentuk anibodi. Antibodi yang dilepas dapat ditemukan di dalam serum. Fungsi utama antibody ini ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus dan bakteri serta menetralisasi toksinnya.

2. Pertahanan selular

Banyak mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak intraseluler, antara lain dalam makrofag sehingga sulit dijangkau oleh antibodi. Untuk melawan mikroorganisme intraseluler itu diperlukan respon imun seluler. Yang berperan dalam sistem imun spesifik seluler adalah limfosit T atau sel T. Berbeda dengan sel B, sel T terdiri atas beberapa sel subset dengan fungsi yang berlainan. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler ialah untuk pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit dan keganasan.

E. Antigen

Antigen adalah suatu substansi yang mampu membangkitkan respon imun (Lawler, 1992). Antigen ini akan membentuk ikatan reversible dengan antibodi khusus yang terbentuk untuknya (reaksi antigen – antibodi) . Hasilnya adalah suatu kompleks antigen – antibody (imunkompleks). Antigen merupakan molekul besar (protein, karbohidrat, dan kadang-kadang juga lipid) dengan bobot molekul 10.000 dan mempunyai bagian struktur yang berperan pada kespesifikan serologic (determinan). Gugus determinan biasanya terletak pada permukaan molekul pembawa yang bertindak sebagai tempat ikatan antibodi (Mustchler 1991, 688).

F. Antibodi

Antibodi adalah suatu protein (imunoglobulin) yang dihasilkan oleh sel plasma untuk menanggapi rangsangan antigen sistem limfosit B (imunitas humoral) (Lawler, 1992). Antibodi terbentuk setelah antigen berkontak dengan sel yang mempunyai kemampuan imunologik. Biasanya antibodi merupakan produk organisme yang komplementer terhadap antigen dan spesifik. Antibodi dibentuk oleh sel plasma, yang terbentuk setelah kontak antigen dan berasal dari β limfosit yang mengalami proliferasi dan diferensiasi. Pada pertemuan pertama β limfosit dengan antigen, disamping terbentuk sel plasma (sel efektor) terbentuk juga apa yang disebut sel memori, yang juga bersirkulasi dalam darah. Pada kontak berikutnya dengan antigen yang kadang-kadang terjadi setelah beberapa

tahun, sel memori ini akan dapat mengenali antigen itu. Sel ini berfungsi mengatur sehingga pertemuan berikutnya dengan antigen yang sama akan berjalan dengan cara yang berbeda dari pertemuan pertama, karena sekarang sel plasma akan segera terbentuk dengan sangat cepat dalam jumlah banyak, sehingga antibodi yang terbentuk banyak sekali. Sebuah sel plasma mampu mensintesis sekitar 2000 molekul imunoglobulin identik dalam waktu 1 detik. Untuk pembentukan antibodi sel plasma ini perlu adanya kerja sama dengan sel T-limfosit (sel T-penolong). Jika suatu antigen berkontak dengan suatu sel plasma yang mampu memproduksi antibodi komplementer, maka ini akan bertindak sebagai rangsang terhadap terjadinya proliferasi sel ini. Setelah pembelahan sel dalam jumlah banyak, maka akan terbentuk banyak sel plasma dengan sifat yang sama. Semua sel dengan klon ini akan membentuk antibodi yang sama, karena semua informasi untuk pembentukan diteruskan kepada semua sel turunan. Umumnya antigen menstimulasi baik pertahanan humor maupun pertahanan sel, dan transmisi antigen kepada limfosit biasanya berlangsung dengan kerjasama makrofag (Mustchler 1991, 689).

G. Fungsi Imunoglobulin

Imunoglobulin merupakan substansi pertama yang diidentifikasi sebagai molekul dalam serum yang mampu menetralkan sejumlah mikroorganisme penyebab infeksi. Antibodi yang disekresikan dapat berfungsi sebagai adaptor yang mengikat antigen melalui *binding-sites*-nya yang spesifik, sekaligus

merupakan jembatan yang menghubungkan antigen dengan sel-sel sistem imun atau mengaktivasi komplemen. Pada beberapa keadaan, antibodi melaksanakan fungsi proteksinya dengan menetralkan antigen secara langsung dengan interaksi antigen-antibodi, tetapi yang lebih sering adalah bahwa dalam melaksanakan fungsinya ia dibantu oleh sistem efektor lain, misalnya komplemen, fagosit dan sel sitotoksik (Kresno 2001, 44-45).

H. Klasifikasi Immunoglobulin

Saat ini dikenal 5 kelas utama immunoglobulin, setiap kelas mempunyai rantai berat yang spesifik. IgG mempunyai rantai γ (G) sedangkan rantai berat pada IgM adalah rantai μ (M), pada IgA rantai beratnya adalah α (A), pada IgD rantai δ (D) dan pada IgE rantai ϵ (E). Jadi kelima kelas immunoglobulin diberi nama sesuai H-chain yang menyusunnya. Selain itu juga terdapat 2 tipe L-chain (rantai ringan) κ dan λ . Tiap molekul IgG tersusun atas satu unit dasar (monomer) terdiri atas 2 rantai γ yang dirangkai dengan 2 rantai κ atau rantai λ , IgE juga merupakan monomer, tersusun atas 2 rantai ϵ dan 2 rantai κ atau rantai λ , demikian pula IgD yang terdiri atas 2 rantai δ dan 2 rantai κ atau rantai λ . Di lain pihak molekul IgM yang disekresikan merupakan molekul pentamer terdiri atas 5 unit dasar. Tiap unit dasar terdiri atas 2 rantai μ dirangkai dengan 2 rantai κ atau rantai λ . Kelima unit dasar dirangkai satu dengan lain dengan rantai J (Joining chain), yaitu bagian non-immunoglobulin yang mengandung banyak sulfhidril. IgM pada permukaan limfosit (sIgM) dijumpai

sebagai monomer. IgA juga dapat dijumpai dalam 2 bentuk, monomer dan dimer. Sebagian besar (80-90%) IgA terdapat dalam bentuk dimer, terdiri atas 2 unit dasar, masing-masing unit mempunyai 2 rantai α dan 2 rantai κ atau rantai λ (Kresno 2001, 53).

I. Struktur Immunoglobulin

Struktur dasar immunoglobulin terdiri atas 2 rantai berat (H-chain) yang identik dan 2 rantai ringan (L-chain) yang juga identik. Setiap rantai ringan terikat pada rantai berat melalui ikatan disulfida (S-S), demikian pula rantai berat satu dengan yang lain diikat dengan ikatan S-S (Kresno 2001, 46). Ada 2 jenis rantai ringan (*kappa* dan *lambda*) yang terdiri atas 230 asam amino serta 5 jenis rantai berat yang tergantung pada kelima jenis immunoglobulin. Rantai berat terdiri atas 450-600 asam amino, sehingga berat dan panjang rantai berat tersebut adalah dua kali rantai ringan (Baratawidjaja 2004, 79).



Gambar 1 : Struktur Dasar Immunoglobulin

Molekul ini oleh enzim proteolitik papain dapat dipecah menjadi 3 fragmen yaitu 2 fragmen yang mempunyai susunan sama terdiri atas rantai berat (H) dan rantai ringan (L) disebut fragmen *Fab* yang dibentuk oleh domain

terminal-N dan 1 fragmen yang hanya terdiri atas rantai berat saja disebut fragmen *Fc* yang dibentuk oleh domain terminal-C. Fragmen *Fab* dengan antigen *binding site* berfungsi mengikat antigen. Karena itu susunan asam amino di bagian ini berbeda antara molekul immunoglobulin satu dengan yang lain dan sangat variabel sesuai dengan variabilitas antigen yang merangsang pembentukannya. Fragmen *Fc* tidak mempunyai kemampuan mengikat antigen tetapi dapat bersifat sebagai antigen (determinan antigen) dan menentukan sifat biologi immunoglobulin bersangkutan (Kresno 2001, 46).

J. Immunoglobulin G (IgG)

1. Sifat Fisikokimia

IgG adalah immunoglobulin utama pada serum manusia yang meliputi 70-75% dari seluruh immunoglobulin. IgG normalnya terdapat dalam serum orang dewasa pada konsentrasi 1,0 sampai 1,4 gram per 100 ml, dan itu berarti 12 sampai 18 persen dari total protein serum. IgG juga didistribusikan secara ekstravaskular (sekitar 50%). Rata-rata dihasilkan sekitar 2,3 gram per hari (untuk berat badan sekitar 70 Kg) dan $T_{1/2}$ nya sekitar 23 hari. Kandungan karbohidrat dari IgG sangat rendah : 2,5 %. Berat molekul dari IgG sekitar 160.000 dalton dan koefisien sedimentasinya sekitar 7 S (7 Svedbergs) (Rose 1973, 125-127).

2. Struktur dan sifat

Setiap molekul IgG terdiri dari 2 rantai L dan dua rantai H yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Karena mempunyai 2 tempat pengikatan yang identik, imunoglobulin ini bersifat divalen. Berdasarkan perbedaan antigenik rantai H dan pada jumlah dan lokasi ikatan disulfida, ada empat sub kelas IgG, yaitu IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Sebagian besar IgG adalah IgG1 (65%). Antibodi IgG2 ditujukan pada antigen polisakarida yang merupakan bagian sistem pertahanan penting terhadap bakteri berkapsul.

IgG merupakan antibodi terpenting pada respon imun sekunder dan juga merupakan antibodi penting untuk pertahanan terhadap bakteri dan virus. IgG adalah satu-satunya antibodi yang melewati plasenta. Antibodi ini memberikan imunitas pasif yang tinggi pada bayi baru lahir (Wahab dan Julia 2002, 17).

3. Aktivitas biologi dan imunologi

Diantara semua kelas imunoglobulin, IgG paling mudah berdifusi ke dalam jaringan ekstrasvaskular dan melakukan aktivitas antibodi di jaringan. IgG pulalah yang umumnya melapisi mikroorganisme sehingga partikel itu lebih mudah difagositosis, disamping itu IgG juga mampu menetralsasi toksin dan virus (Kresno 2001, 53). IgG dan komplemen bekerja saling membantu sebagai opsonin (memudahkan fagositosis) pada pemusnahan

antigen. IgG memiliki sifat opsonin dan efektif karena sel-sel fagosit, monosit, dan makrofag, mempunyai reseptor untuk fraksi Fc dari IgG (Fcγ-R) sehingga dapat mempererat hubungan antara fagosit dengan sel sasaran. Opsonin dalam bahasa Yunani berarti menyiapkan untuk dimakan. Selanjutnya proses opsonisasi tersebut dibantu oleh reseptor untuk komplemen pada permukaan fagosit (Baratawidjaja 2004, 79-80).

IgG berperan dalam imunitas seluler karena dapat merusak antigen sel melalui interaksi dengan sistem komplemen atau melalui efek sitolitik sel NK, eosinofil, neutrofil yang semuanya memiliki Fcγ-R. sel NK merupakan efektor dari *Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity* (ADCC). ADCC tidak hanya merusak sel tunggal, tetapi juga mikroorganisme multiseluler seperti telur skistosoma. Peranan efektor ADCC ini juga penting dalam penghancuran kanker, penolakan transplan dan penyakit autoimun, sedangkan ADCC melalui neutrofil dan eosinofil berperan pada infestasi parasit. Kadar IgG meninggi pada infeksi kronis dan penyakit autoimun (Baratawidjaja 2004, 80).

K. Teknik Immunokimia

1. Immunopresipitasi

Teknik immunopresipitasi merupakan salah satu cara yang banyak dipakai untuk mengukur kadar antigen atau antibodi. Antibodi yang

direaksikan dengan antigen spesifik membentuk kompleks yang tidak larut (presipitat) yang dapat diukur dengan berbagai cara. Reaksi presipitasi dapat dilangsungkan dalam media cair maupun media semi solid (gel) (Kresno 2001, 408).

Beberapa jenis reaktan menghasilkan imunopresipitasi yang optimal baik pada suhu 0°C maupun 37°C , sedangkan pH yang dianggap paling baik adalah pH yang netral yaitu antara 6 – 7,5 atau sebaiknya tidak kurang dari 6 dan tidak lebih dari 8,6. Pada pH kurang dari 6 dan lebih dari 8,6 kompleks antigen-antibodi mudah berdisosiasi kembali sehingga tidak terjadi presipitasi dan larutan yang dipakai sebaiknya larutan 0,15 M agar presipitasi optimal (Kresno 2001, 408-409).

Perbandingan antigen dengan antibodi merupakan faktor terpenting dalam reaksi presipitasi. Pembentukan presipitat terjadi apabila antara konsentrasi antigen dengan antibodi terjadi kesetimbangan. Kondisi antigen berlebihan akan mengakibatkan melarutnya kembali kompleks yang terbentuk, sedangkan antibodi berlebihan menyebabkan kompleks antigen-antibodi tetap ada dalam larutan tanpa membentuk presipitat (Kresno 2001, 409).

2. Aglutinasi

Ikatan protein antigen yang multivalen dengan antibodi membentuk presipitat, sedangkan ikatan sel atau partikel yang lebih besar dengan antibodi terhadap antigen pada permukaan menyebabkan aglutinasi (Roitt 1994, 109).

Partikel yang membawa antigen pada permukaannya dapat diikat oleh antiserum selanjutnya partikel dapat berkumpul dengan partikel lainnya dengan terikat atau diikat oleh antibodi. Fenomena aglutinasi dapat dijadikan pedoman tes kualitatif, secara sederhana mengindikasikan kehadiran antibodi. Itu juga dapat menyediakan cara pengukuran semikuantitatif yang berguna untuk mengetahui konsentrasi antibodi yang mengaglutinasi. Prosedur yang umum untuk kasus terakhir, yaitu menambahkan beberapa partikel yang membawa antigen pada satu seri tabung yang mengandung pengenceran dari antibodi (biasanya pengenceran 2 kali). Pengenceran tertinggi dari serum/larutan yang masih menunjukkan aglutinasi didefinisikan sebagai titer antibodi (Kimbal 1986, 95-96).

Reaksi aglutinasi terjadi dalam dua tahap, yaitu pertama-tama antibodi dengan salah satu reseptor pengikat antigen bereaksi dengan antigen. Karena pada umumnya antibodi memiliki lebih dari satu reseptor pengikat antigen maka pada tahap kedua dengan perantaraan reseptornya

yang lain antibodi bereaksi dengan molekul antigen lain yang mungkin sudah berikatan dengan salah satu molekul antibodi sehingga dengan demikian terbentuklah gumpalan antigen-antibodi (Roitt 1994, 109).

3. Hemaglutinasi pasif

Pada hemaglutinasi pasif, sel darah merah diaglutinasi oleh antibodi yang menyerang antigen yang telah digabungkan secara kimiawi pada permukaan sel darah merah. Jadi sel darah merah merupakan indikator nyata dari interaksi antigen dan antibodi (Kimbal 1986, 98).

Langkah pertama dari cara ini yaitu mensensitasi sel darah merah yaitu menggabungkan antigen ke dalamnya. Beberapa antigen polisakarida dapat diabsorpsi dengan stabil pada permukaan sel darah merah. Untuk antigen protein, larutan asam tannik atau krom klorida dapat digunakan untuk menggabungkan antigen pada sel darah merah (Kimbal 1986, 98).

Langkah terakhir yaitu dengan menambahkan sel darah merah yang telah disensitasi tadi ke dalam pengenceran bertingkat dari antibodi. Selanjutnya pengenceran tertinggi dari larutan yang masih menunjukkan reaksi aglutinasi didefinisikan sebagai titer dari antibodi (Kimbal 1986, 98).

L. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Kelinci

Kerajaan	:	Animalia
Filum	:	Chordata
Anak filum	:	Vertebrata
Kelas	:	Mammalia
Anak kelas	:	Theria
Bangsa	:	Logomorpha
Suku	:	Oryctolagidae
Marga	:	Oryctolagus
Jenis	:	<i>Oryctolagus cuniculus</i>

2. Karakteristik

Kelinci pada umumnya tidak berbahaya bila didekati dan dipegang lembut, sehingga banyak dipakai sebagai salah satu hewan percobaan. Kelinci dewasa yang sehat memiliki berat badan 2,0 kg – 5,0 kg (jantan), dan 2,0 kg – 6,0 kg (betina). Luas permukaan tubuh kelinci 2,5 kg : 1270,0 cm². Lama kehamilan pada kelinci betina mencapai 29 – 35 hari dengan melahirkan 4 – 10 anak. Volume darah normal dari kelinci dewasa 57 – 65 ml/kg; 4 – 7 x 10⁶/ mm³ (sel darah merah); 9 – 11 x 10³/mm³ (sel darah putih). Kebutuhan makanan kelinci terdiri atas 16 -20% serat kasar, 14 – 18 % protein kasar dan tidak lebih dari 2500 kcal/hari. Kebutuhan air minum

mencapai 10 ml dan makanan sekitar 5 g untuk setiap 100 g BB/hari. Kelinci harus ditangani dengan tenang selalu memperhatikan cara pengekanan pada saat pemindahannya (Malole 1989, 64).

M. Tinjauan islam mengenai penelitian tanaman berkhasiat obat

Di dalam Al-Qur'an seringkali Allah SWT menyebut ayat tentang tanaman yang beraneka macam buah sebagai salah satu tanda kebesarannya-Nya, hal ini tersirat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Nahl (16): 69 :

ثُمَّ كَلَىٰ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

“kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Maksud dari ayat diatas adalah agar manusia memanfaatkan buah-buahan baik untuk di makan maupun untuk dijadikan obat. Allah SWT memberikan

petunjuk kepada hamba-hambanya untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh yang dapat memperkuat ketahanan tubuh. Banyak tanaman yang memiliki beraneka macam buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya adalah kelapa.

Minyak kelapa murni dihasilkan dari buah kelapa tua yang segar atau baru dipetik, bukan terbuat dari kopra seperti minyak kelapa biasa. Proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia dan pemanasan tinggi. Minyak kelapa murni mengandung asam laurat yang sangat tinggi (45-50%), suatu lemak jenuh berantai sedang (jumlah karbonnya 12) yang biasa disebut dengan MCFA (Medium Chain Fatty Acid). Asam lemak jenuh rantai sedang ini memiliki kemiripan dengan asam lemak pada air susu ibu (ASI) yang diketahui sangat bermanfaat bagi sistem imun tubuh.

Air susu ibu (ASI) adalah sebuah ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Bayi yang diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan tubuh di dalam ASI memberikan perlindungan langsung melawan serangan penyakit. ASI sangat bermanfaat bagi bayi apabila disusui selama dua tahun. ASI adalah ungkapan kasih sayang Allah sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap

bayi yang lahir ke muka bumi. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ASI, antara lain dalam QS. Al-Baqarah (2) : 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hikmah ayat yang terkandung dalam kitab Suci Alqur'an tersebut, menekankan bahwa Air Susu Ibu (ASI) sangat penting. Walaupun masih ada perbedaan pendapat tentang wajib atau tidaknya menyusui, tapi selayaknya bagi seorang muslim menghormati ayat-ayat Allah SWT tersebut. Terlepas wajib atau

tidaknya hukum menyusui dalam ayat tersebut dengan tegas dianjurkan menyempurnakan masa penyusuan. Dan di sana juga disinggung tentang peran sang ayah, untuk mencukupi keperluan sandang dan pangan si ibu, agar si ibu dapat menyusui dengan baik. Sehingga jelas, menyusui adalah kerja tim. Keputusan untuk menyapih seorang anak sebelum waktu dua tahun harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami isteri dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi si bayi. Inspirasi utama dari pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada penghormatan kepada perintah Allah swt dan pelaksanaan hukum-Nya, dan tidak bertujuan meremehkan perintah-Nya. Demikian pula jika seorang ibu tidak bisa menyusui, dan diputuskan untuk menyusukan bayinya pada wanita lain, sehingga haknya untuk mendapat ASI tetap tertunaikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

a. Alat dan yang digunakan

Alat yang digunakan adalah cawan petri, colony counter, corong pisah, *Saccharomyces cerevisiae*, labu tentukur, LAF (Laminar Air Flow), neraca analitik (Chyo), ose bulat, otoklaf, oven, sumur mikrotiter tipe U (Well plate 96 lubang), pipet micron (sokorex), spoit, spoit oral, seperangkat alat sentrifus (Hettich).

b. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan yakni biaka murni, Buah kelapa tua (*Cocos nucifera* Linn), gom arab, larutan PBS (Phosfat Buffered saline), medium PDA (Potato Dextrose Agar), suspensi sel darah merah domba 2%.

B. Penyiapan sampel

a. Penyiapan alat

Alat-alat yang digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. Alat yang terbuat dari gelas disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180⁰ C selama 2 jam. Untuk alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan pada api, dan alat-alat yang terbuat dari plastik, alat gelas berskala, serta karet

disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit (Hadioetomo 1990, 56-57).

b. Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan penelitian adalah daging buah kelapa tua yang telah diparut (*Cocos nucifera* Linn), yang diperoleh dari pasar. Mikroorganisme yang digunakan adalah khamir *Saccharomyces cerevisiae* dalam bentuk biakan murni yang diperoleh dari koleksi Laboratorium Jurusan Farmasi Universitas Hasanuddin.

c. Pembuatan Santan

Daging buah kelapa tua yang tidak dikupas kulit arinya diparut dan diperas dimana pemerasan awal tanpa menggunakan air. Pemerasan kedua dilakukan dengan menambahkan air yang telah dididihkan dan suhunya masih hangat pada ampas perasan pertama. Proses ini diulangi sebanyak 2-3 kali dengan perbandingan kelapa dan air 1:1. Seluruh hasil perasan kemudian dikumpulkan (Idrus 2006, 39).

d. Pemisahan krim dan skim santan

Santan dimasukkan dan didiamkan dalam corong pisah selama 30 menit sampai 2 jam sehingga terbentuk 2 lapisan, yaitu krim santan dibagian atas dan skim santan di bagian bawah. Skim dan krim santan kemudian dikeluarkan secara bertahap dan ditampung pada masing-masing wadah terpisah (Idrus 2006, 39).

.e. Pembuatan Medium

Medium PDA (*Potato Dextrose Agar*)

Komposisi (g/l) :

- Infus kentang 4,0 g (dari 200 g kentang)
- D(+) glukosa 20,0 g
- Agar-agar 15,0 g
- Air suling hingga 1000 ml

pH $5,6 \pm 0,1$

Cara pembuatan :

Ditimbang semua bahan sesuai dengan perhitungan lalu dimasukkan kedalam labu Erlenmeyer kemudian dilarutkan dalam air suling dan dihomogenkan. Setelah itu diatur pH-nya ($5,6 \pm 0,1$), medium lalu disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit (Difco 1988, 121).

f. Peremajaan Khamir

Biakan murni khamir *Saccharomyces cerevisiae* diremajakan dengan cara menginokulasikan secara aseptis 1 ose biakan murni sebelumnya pada medium PDA miring dan di inkubasikan pada suhu kamar selama 3x24 jam.

g. Pembuatan Kultur Khamir

Kultur khamir dibuat dengan menginokulasikan 1 ose biakan murni khamir. Kultur ini kemudian di inkubasikan selama 3x24 jam pada suhu kamar (Suryanto 2005, 14-16).

h. Perhitungan Jumlah Total Khamir dalam Kultur Khamir

Kultur khamir yang telah di inkubasikan selama 3x24 jam diambil dengan spoit sebanyak 1 ml kemudian dibuat pengenceran dari 10^{-1} sampai 10^{-11} . Hasil pengenceran 10^{-7} sampai 10^{-11} diinokulasikan pada medium PDA lalu diinkubasikan pada suhu kamar selama 3x24 jam, selanjutnya dihitung jumlah total khamirnya.

i. Pembuatan Minyak Kelapa Murni

Sebanyak 200 ml krim santan dipanaskan dalam penangas air pada suhu 65°C selama 15 menit kemudian diinokulasikan 20 ml kultur khamir *Saccharomyces cerevisiae*. Krim santan lalu difermentsikan pada suhu kamar selama 8 jam sampai terbentuk 3 lapisan dimana minyak sebagai lapisan teratas. Minyak yang diperoleh dipisahkan dengan hati-hati lalu ditampung dalam botol dan dipanaskan pada temperatur hangat kuku selama 15 menit kemudian disimpan pada suhu kamar (Suryanto 2005, 14).

j. Penyiapan suspensi SDMD 2%

Darah domba ditampung dalam tabung bersih dan kering yang berisi serbuk EDTA sebagai antikoagulan. Untuk 1 ml darah domba, diperlukan 1 mg EDTA. Sel darah merah domba (SDMD) dipisahkan dari plasmanya dengan pemusingan pada kecepatan 1500 rpm. Selanjutnya sel darah merah domba dicuci dengan menambahkan PBS (Phosphat Buffered Saline) dalam jumlah besar dan tabung berisi suspensi tersebut dibolak – balik beberapa kali dan dipusingkan kembali. Lakukan pencucian paling sedikit 3 kali. Setelah selesai, PBS dibuang dan diperoleh SDMD 100%. Kemudian pada SDMD 100% tadi tambahkan PBS dengan volume sama hingga diperoleh suspensi SDMD 50%. Siapkan antigen yang akan digunakan dengan mengencerkan 0,4 ml suspensi SDMD 50% dengan 9,8 ml PBS sehingga diperoleh 10 ml suspensi antigen (SDMD 2% v/v).

k. Penyiapan Larutan PBS

Larutan PBS disiapkan dengan terlebih dahulu membuat larutan PBS dibuat dengan cara mencampurkan larutan A yaitu larutan $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 1,38 g/L dan NaCl 8,3 g/L sebanyak 280 ml dengan larutan B yaitu larutan NaH_2PO_4 1,42 g/L dan NaCl 8,5 g/L sebanyak 720 ml sampai diperoleh PBS dengan pH 7,2 kemudian disterilkan.

I. Penyiapan Emulsi Minyak

Penyiapan emulsi didahului pembuatan korpus emulsi dengan cara mencampurkan 1 bagian minyak dengan $\frac{1}{2}$ bagian PGA dan $1\frac{1}{2}$ bagian air pada lumpang hingga terdengar suara yang khas, dilanjutkan dengan penambahan sisa air yang telah diukur sebelumnya. Emulsi dengan konsentrasi 7,8% dibuat dengan mencampurkan minyak sebanyak 7,8 ml dengan 3,9 g PGA dan 11,7 ml air untuk pembuatan korpus emulsi. Sisa air ditambahkan hingga diperoleh emulsi 100 ml. Emulsi dengan konsentrasi 15,6% dibuat dengan mencampur minyak sebanyak 15,6 ml dengan 7,8 g PGA dan 23,4 ml air untuk pembuatan korpus emulsi. Sisa air ditambahkan hingga diperoleh emulsi 100 ml. Emulsi dengan konsentrasi 31,2% dibuat dengan mencampur minyak sebanyak 31,2 ml dengan 15,6 g PGA dan 46,8 ml air untuk pembuatan korpus emulsi. Sisa air ditambahkan hingga diperoleh emulsi 100 ml (Anis 1998, 38).

C. Pengujian Aktivitas IgG pada Hewan Uji

a. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) yang sehat berumur 4-5 bulan dengan bobot badan 1,5-2 kg, sebanyak 4 ekor (Malole 1989, 22).

b. Uji Aktivitas IgG Awal

Sebelum diimunisasi, semua kelinci diambil darahnya melalui telinga sebanyak 1 ml. Kemudian diletakkan dalam suhu kamar selama 1-2 jam sampai membeku/menggumpal, lalu disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm sehingga diperoleh serum, lalu diencerkan dengan PBS dengan pengenceran 2 x dimulai dari 1/4 sampai dengan 1/512, kemudian masing-masing pengenceran dipipet 50 μ l, dimasukkan ke dalam plat mikrotiter lalu ditambahkan 50 μ l suspensi SDMD 2 %, diinkubasi pada suhu 37° C selama 60 menit, lalu didiamkan selama 1x24 jam. Setelah itu, dilakukan pengamatan pengenceran tertinggi dari setiap serum darah kelinci yang masih dapat mengaglutinasi sel darah merah domba (Habibie 2006, 101).

c. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

1. Sebelum imunisasi semua kelinci diambil darah melalui vena telinga sebanyak 1 ml/ekor kemudian dilakukan uji aktivitas immunoglobulin (Ig) awal.
2. Imunisasi dan Perlakuan

Semua kelinci diimunisasi dengan SDMD 2 % sebanyak 10 ml intraperitoneal

a. Kelompok kontrol

Sebanyak 1 ekor kelinci diberi emulsi air gom arab dengan volume 15 ml / 2,5 kg selama 10 hari berturut-turut.

b. Kelompok I

Kelinci diberi emulsi minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) dengan konsentrasi 7,8 % v/v selama 10 hari berturut-turut.

c. Kelompok II

Kelinci diberi emulsi minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) dengan konsentrasi 15,6 % v/v selama 10 hari berturut-turut.

d. Kelompok III

Kelinci diberi emulsi minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) dengan konsentrasi 31,2 % v/v selama 10 hari berturut-turut.

d. Uji Hemaglutinasi

- a. Semua darah dari kelinci didiamkan pada suhu kamar selama 1-2 jam sampai membeku/menggumpal, kemudian disentrifuge selama 10 menit, dengan kecepatan 3000 rpm, lalu diambil serumnya (supernatan).
- b. Serum masing-masing kelinci diencerkan dengan PBS (Phosphat Buffered Saline) secara “double dilution” sehingga diperoleh pengenceran 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 dan 1/512. Masing-masing hasil pengenceran dipipet sebanyak 50 µl dan

dimasukkan ke dalam 3 sumur plat mikrotiter, kemudian ditambahkan 50 μ l SDMD 2 % lalu digoyang-goyang selama beberapa menit agar homogen selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 60 menit dan didiamkan selama 24 jam pada suhu kamar.

c. Pengamatan

Setelah 24 jam dilakukan pengamatan ada atau tidak adanya hemaglutinasi. Tidak ada hemaglutinasi apabila SDMD berkumpul di dasar sumur (negatif) dan ada hemaglutinasi apabila SDMD menyebar dalam sumur (positif) (Habibie 2006, 101).

D. Pengumpulan dan Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan pengenceran tertinggi serum darah kelinci yang masih dapat mengaglutinasi sel darah merah domba dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis secara statistika dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dan Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data Uji aktivitas imunoglobulin G (IgG) setelah pemberian minyak kelapa murni konsentrasi 7,8% v/v; 15,6% v/v; 31,2% v/v berdasarkan titer imunoglobulin G (IgG) pada kelinci 10 hari setelah diberikan SDMD 2% v/v adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Data Titer Imunoglobulin Sebelum Imunisasi dan Pemberian Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil).

Perlakuan	Titer Imunoglobulin G (IgG)			
	VCO 7,8%	VCO 15,6%	VCO 31,2%	Kontrol
Replikasi				
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Tabel 3.

Data Titer Imunoglobulin G Setelah Imunisasi dan Pemberian Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil).

Perlakuan	Titer Imunoglobulin G (IgG)			
	VCO 7,8%	VCO 15,6%	VCO 31,2%	Kontrol
Replikasi				
1	1/32	1/64	1/128	1/16
2	1/32	1/64	1/64	1/16
3	1/64	1/64	1/64	1/32

B. Pembahasan

Minyak kelapa murni dihasilkan dari buah kelapa tua yang segar. Proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia dan pemanasan tinggi. CODEX Alimentarius mendefinisikan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) sebagai minyak dan lemak makan yang dihasilkan tanpa mengubah minyak; minyak diperoleh hanya dengan perlakuan mekanis dan pemanasan minimal. Karena tidak melalui pemanasan tinggi, maka vitamin E dan enzim enzim yang terkandung di dalam daging buah kelapa dapat dipertahankan. Minyak kelapa murni mengandung asam laurat yang sangat tinggi (45-50%), suatu lemak jenuh berantai sedang (jumlah karbonnya 12) yang biasa disebut dengan *medium chain fatty acid* (MCFA). Asam lemak jenuh rantai sedang ini memiliki kemiripan dengan asam lemak pada air susu ibu (ASI) yang diketahui sangat bermanfaat bagi sistem imun tubuh.

Kekebalan tubuh berkaitan dengan antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah golongan protein yang dibentuk sel plasma (poliferasi sel B) akibat kontak dengan antigen. IgG salah satu jenis Ig, merupakan antibodi yang paling mudah berdifusi ke dalam jaringan ekstrasvaskular dan melakukan aktivitas antibodi di jaringan. IgG pulalah yang umumnya melapisi mikroorganismenya sehingga partikel itu lebih mudah difagositosis, di samping itu IgG juga mampu menetralkan toksin dan virus (Kresno 2001, 53-54).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode fermentasi. Tahap produksinya meliputi pengestraksian daging buah kelapa yang telah diparut bersama kulit arinya secara mekanik kemudian dilakukan pemerasan awal tanpa menggunakan air dan pemerasan 2- 3 kali dengan air hangat. Hasil ekstraksi (santan) didiamkan selama 2 jam untuk mendapatkan krim dan penginokulasian kultur mikroba ke kepala santan sebagai medium fermentasi. Tahap pemecahan minyak dari emulsi santan secara fermentatif menggunakan bantuan khamir *Saccharomyces cerevisiae*. Khamir golongan ini dapat memfermentasi glukosa dalam santan menjadi asam, lipoprotein sebagai emulgator pada suasana asam tidak stabil atau akan menggumpal pada pH rendah, sehingga butiran-butiran minyak kelapa akan menyatu dan minyaknya dapat dipisahkan dari air dan protein.

Antigen yang digunakan untuk diinduksi produksi antibodi adalah sel darah merah domba (SDMD). Antigen ini diinjeksikan ke tubuh kelinci secara intraperitoneal. Kemudian dilanjutkan dengan perlakuan selama 10 hari berturut-turut. Setelah itu dibiarkan hingga hari kesepuluh setelah imunisasi, diharapkan pada kurun waktu tersebut telah terjadi sensitasi sel B yang akan berproliferasi, berdiferensiasi dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi yaitu imunoglobulin G (IgG). Pada respon primer, terbentuknya IgG didahului dengan oleh IgM. IgM mulai terbentuk mulai hari pertama dan mencapai puncaknya antara hari kelima hingga ketujuh, setelah itu

mulailah IgG disensitasi. Oleh karena itu, darah kelinci diambil pada hari kesepuluh karena IgG mencapai puncak pada hari 10 sampai 14 setelah pemaparan antigen.

Pengujian pada serum darah kelinci dilakukan dengan menambahkan antigen yang sama yaitu sel darah merah domba. Interaksi antara antigen dengan antibodi menyebabkan aglutinasi sebab antigen merupakan partikel-partikel kecil yang tidak larut. Gumpalan yang terbentuk antara antigen dan anti serum spesifik akan bersatu dan akhirnya mengendap sebagai gumpalan-gumpalan besar dan mudah terlihat dengan cairan di atasnya tetap jernih. Hal ini terjadi karena pada umumnya antibodi memiliki lebih dari satu reseptor pengikat antigen sehingga antibodi bereaksi dengan molekul antigen lain yang mungkin sudah berikatan dengan salah satu molekul antibodi dan terbentuklah gumpalan. Reaksi aglutinasi baru dapat terjadi bila rasio antara antigen dan antibodi seimbang, dibantu oleh suhu yang tinggi ($37-56^{\circ}\text{C}$) dan oleh gerakan yang menambah kontak antigen dan antibodi (misalnya mengocok, mengaduk dan memusing) serta berkumpulnya gumpalan memerlukan garam-garam yang berasal dari PBS yang digunakan.

Berdasarkan analisis statistika dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Analisis Sidik Ragam (ASR) memperlihatkan bahwa pemberian minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) memberikan efek yang sangat nyata terhadap peningkatan aktivitas

Imunoglobulin G (IgG), yang dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel.

Analisis antar perlakuan dilakukan dengan metode Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND). Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara emulsi minyak kelapa murni 31,2% dengan emulsi minyak kelapa murni 7,8%, juga emulsi minyak kelapa murni 31,2% dengan kontrol menunjukkan perbedaan sangat signifikan, sedangkan antara minyak kelapa murni 31,2% dengan emulsi minyak kelapa murni 15,6% menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Perbedaan yang sangat signifikan juga terlihat pada emulsi minyak kelapa murni 15,6% dengan kontrol dan 7,8% dengan kontrol. Sedangkan antara emulsi minyak kelapa murni 15,6% dengan emulsi minyak kelapa murni 7,8% menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dari hasil ini berarti terjadi peningkatan aktivitas imunoglobulin G dengan pemberian minyak kelapa murni dimana konsentrasi yang paling baik adalah 15,6% dan 31,2%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data secara statistika dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa pemberian minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) dengan konsentrasi 15,6% dan 31,2% secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas imunoglobulin G (IgG) pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) sedangkan konsentrasi 7,8% tidak.

B. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) terhadap sistem organ tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Anis. *Ilmu Meracik Obat*. Yogyakarta : UGM Press. 1998.
- Anonim. Sekilas Virgin Coconut Oil. <http://www.smallcrab.com/kesehatan/25-healthy/92-sekilas-virgin-coconut-oil>. (Diakses Senin 16 Juli 2007, Pukul 3.13)
- Baratawidjaja, K.G.. *Imunologi Dasar. Edisi VI*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2004.
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Minyak Kelapa Murni: Harapan Nilai Tambah yang Menjanjikan. <http://www.pustaka-deptan.go.id>.
- Difco. *Cultur Media Handbook*. E-Merck. Darmstad. 1988.
- Hasbullah. *Teknologi tepat guna agroindustri kecil Sumatra barat*. <http://www.ristek.go.id>. Diakses 4 juni 2005. 2001
- Hadioetomo, R.S. *Mikrobiologi Dasar dalam Praktek: Teknik dan Prosedur Laboratorium*. Jakarta : PT Gramedia. 1990.
- Habibie. *Uji Efek Ekstrak Etanol Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap Aktivitas Immunoglobulin M (IgM) Mencit Jantan (Mus musculus)*. Skripsi, Makassar: Jurusan Farmasi. F MIPA. UNHAS. 2006.
- Idrus, M. *Uji Aktivitas Immunoglobulin M (Ig M) Mencit Jantan Akibat Pemberian Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) Hasil fermentasi*. Makassar : Jurusan farmasi. F MIPA. UNHAS. 2006.
- Kresno, S.,B. *Imunologi : Diagnosa Dan Prosedur Laboratorium*. Edisi Ketiga. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2001.
- Kimbal, J,W. *Introduction to Immunology*, second edition, New York Macmillan. Publishing Company. 1986.
- Lawler, W, dkk. *Buku Pintar Patologi Untuk Kedokteran Gigi*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1992.
- Malole. *Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan di Laboratorium*. Institut Pertanian Bogor. 1989.
- Maskoeri. J., *Zoologi Vertebrata*. Surabaya : CV. Sinar Jaya. 1995
- Masun, M.S., HelmiMembuat Minyak Kelapa secara Inovatif. Adi Cita Karya Nusa. Yogyakarta. Hal 55 Ma'at, S., 2004. *Penelitian dan pengembangan Produk*

Fitofarmaka dari Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) untuk Terapi Demam Berdarah Dengue Berdasarkan Data Preklinik, Toksisitas dan Percobaan Klinik. Universitas Airlangga. Surabaya. . 2004.

Mutschler, Ernst. *Dinamika Obat; Farmakologi dan Toksikologi Edisi Kelima;* Bandung. ITB. 1991.

Pleczar, J.M., and Reid, D.R. 1958. “*Microbiology*”. New York: Mc. Grow – Hill Book Company, Inc,

Price, Murray. *Definisi Virgin Coconut Oil*http://indococo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=2. Diakses 9 februari 2005. . 2003.

Rose, N *Principles of Immunology*, Macmillan Publishing CO, New york. . 1973.

Roitt, I., *Essential Immunology*, Eight Edition, London : Black Well Scientific Publications. 1994.

Soedjana, D., Tjeppey. *Minyak Kelapa Murni:Harapan Nilai Tambah yang Menjanjikan.* Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Sutarmi. *Taklukkan Penyakit dengan VCO.* Jakarta: Penebar swadaya. 2005.

Suryanto, D., Nasution. *Potensi Isolat Bakteri Dari Kepiting Batu Untuk Menghasilkan Minyak Kelapa Secara Fermentasi.* Jurnal mikrobiologi Indonesia. Vol 10,No. 1;14-16. 2005.

Tjay Hoan Tan, *Obat-Obat Penting Edisi V.* Jakarta : PT. Gramedia. 2005.

Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi Obat-Obatan.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1994.


Tjitrosomo,S_____. *Mikologi Dasar ke III.*

Wahab, S. *Sistem Imun, Imunisasi, dan Penyakit Imun.* Jakarta : Widya Medika. 2002.


Wibowo, S. *VCO dan pencegahan Komplikasi Diabetes.* Jakarta : Pawon Publishing. 2005.

Wijayakusuma, H dkk. *Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia.* Jakarta : Pustaka Kartini.1999.

SKEMA KERJA PEMBUATAN MINYAK KELAPA MURNI



SKEMA KERJA UJI HEMAGLUTINASI



ANALISIS STATISTIKA TITER IMUNOGLOBULIN G (IgG) SETELAH PEMBERIAN MINYAK KELAPA MURNI (*Cocos nucifera* Linn.) DENGAN MENGGUNAKAN RANCANGAN ACAK LENGKAP (RAL)

Tabel 4.
Data titer imunoglobulin G (IgG) setelah ditransformasi dengan: $[2 \log(\text{titer})] + 1$

Perlakuan	7,8%	15,6%	31,2%	Kontrol
Replikasi				
1	2,010	2,612	3,214	1,408
2	2,010	2,612	2,612	1,408
3	2,612	2,612	2,612	2,010
Jumlah	6,632	7,836	8,438	4,826
Rata-rata	2,211	2,612	2,813	1,609

Analisis Sidik Ragam (ASR)

A. Sumber Keragaman

$$\text{Model : } Y = \mu + \sigma + \zeta$$

Dimana : Y = Total hasil percobaan

μ = Nilai rata-rata harapan

ζ = Pengaruh kesalahan/galat

Sumber Keragaman adalah :

1. Perlakuan (P)
2. Kesalahan/Galat (G)
3. Total Percobaan (T)

B. Perhitungan Derajat Bebas (Db)

1. DbT = (r.t)-1 = (3.4) - 1 = 11

2. DbP = t - 1 = 4 - 1 = 3

3. DbG = DbT - DbP = 11 - 3 = 8

C. Perhitungan Jumlah Kuadrat (JK)

$$FK = \frac{Tij^2}{r.t} = \frac{27,732^2}{3 \times 4} = \frac{769,064}{12} = 64,089$$

1. JKT = T(Yij²) - FK

$$= (2,010^2 + 2,612^2 + 3,214^2 + 1,408^2 + 2,010^2 + 2,612^2 + 2,612^2 + 1,408^2 + 2,612^2 + 2,612^2 + 2,010^2) - 64,089$$

$$= 67,349 - 64,089$$

$$= 3,261$$

2. JKP = $\frac{TP^2}{r}$ - FK

$$= \frac{(6,632^2 + 7,836^2 + 8,438^2 + 4,826^2)}{3} - 64,089$$

$$= 66,625 - 64,089$$

$$= 2,536$$

3. JKG = JKT - JKP

$$= 3,261 - 2,536$$

$$= 0,725$$

A. Perhitungan Kuadrat Tengah (KT)

$$1. \text{KTP} = \frac{JKP}{DbP} = \frac{2,536}{3} = 0,845$$

$$2. \text{KTG} = \frac{JKG}{DbG} = \frac{0,725}{8} = 0,091$$

B. Perhitungan Distribusi F (Fh)

$$FhP = \frac{KTP}{KTG} = \frac{0,845}{0,091} = 9,286$$

C. Perhitungan Koefisien Keragaman (KK)

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\text{rata-rata}} = \frac{\sqrt{0,091}}{2,311} \times 100\% = \frac{0,3}{2,311} \times 100\% = 12,98\%$$

Tabel 5.

Hasil (Rancangan Acak Lengkap) Perlakuan terhadap Titer Imunoglobulin G (IgG)

Sumber Keragaman	Db	JK	KT	Fh	Ft	
					5%	1%
Perlakuan (P)	3	1,782	0,594	9,286**	4,07	7,59
Galat (G)	8	0,695	0,087			
Total (T)	11					

Keterangan : (**) Berbeda sangat nyata karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, ada pengaruh pemberian minyak kelapa murni (*virgin coconut oil*) terhadap peningkatan aktivitas imunoglobulin G (IgG) pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*), maka analisis statistik dilanjutkan dengan Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND)

Analisis Lanjutan dengan Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND)

$$S_{\hat{Y}} = \sqrt{\frac{KTG}{r}} = \sqrt{\frac{0,091}{3}} = 0,1$$

$$JNTD\alpha = P\alpha_{(p,v)} \times S_{\hat{Y}}$$

- Untuk jarak nyata 2

$$\begin{aligned} JNT_{5\%} &= JN_{5\%} \times S_{yi} \\ &= 3,26 \times 0,1 = 0,33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} JNT_{1\%} &= JN_{1\%} \times S_{yi} \\ &= 4,24 \times 0,1 = 0,42 \end{aligned}$$

- Untuk jarak nyata 3

$$\begin{aligned} JNT_{5\%} &= JN_{5\%} \times S_{yi} \\ &= 3,39 \times 0,1 = 0,34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} JNT_{1\%} &= JN_{1\%} \times S_{yi} \\ &= 5,00 \times 0,1 = 0,5 \end{aligned}$$

- Untuk jarak nyata 4

$$\begin{aligned} JNT_{5\%} &= JN_{5\%} \times S_{yi} \\ &= 3,47 \times 0,1 = 0,35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} JNT_{1\%} &= JN_{1\%} \times S_{yi} \\ &= 5,14 \times 0,1 = 0,51 \end{aligned}$$

Nilai Beda Jarak Nyata Metode Duncan

A	2	3	4
JN _{5%}	3,26	3,39	3,47
JN _{1%}	4,24	5,00	5,14
JN _{5%}	0,33	0,34	0,35
JN _{1%}	0,42	0,50	0,51

Perlakuan	A	B	C	D
Rata-Rata	2,813	2,612	2,211	1,609

Keterangan :

A = Diberi Emulsi Minyak Kelapa Murni (VCO) 31,2%

B = Diberi Emulsi Minyak Kelapa Murni (VCO) 15,6%

C = Diberi Emulsi Minyak Kelapa Murni (VCO) 7,8%

D = Larutan Koloidal Gom Arab (Kontrol)


Tabel 6. Perbandingan Antar Perlakuan

Perlakuan	Selisih	JNT		Keterangan
		P= 0,05	P= 0,01	
A-B	0,201	0,33	0,42	TS
A-C	0,602	0,34	0,50	SS
A-D	1,204	0,35	0,51	SS
B-C	0,401	0,33	0,42	S
B-D	1,003	0,34	0,50	SS
C-D	0,602	0,35	0,51	SS


Keterangan : TS = Tidak Signifikan

SS = Sangat Signifikan


S = Signifikan




Gambar 2. Foto pemisahan minyak kelapa murni
(Sumber : Harnida, 2010)



Gambar 3. Minyak Kelapa Murni (VCO)
(Sumber : Harnida, 2010)



Gambar 4. Foto data titer Imunoglobulin (Ig) sebelum perlakuan pada plat mikrotiter
(Sumber : Harnida, 2010)



Gambar 5. Foto data titer Imunoglobulin G (IgG) setelah perlakuan pada plat mikrotiter

(Sumber : Harnida, 2010).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Harnida, lahir di Talungeng (Bone) pada tanggal 3 Juli 1986, merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Abd. Halim dan St. Rahmah. Setelah menyelesaikan pendidikan di SDN. 79 Barebbo (1999), SMPN 2 Watampone (2002), MAN 1 (2005) di Bone. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2005 sampai memperoleh gelar sarjana pada tahun 2010.

