

**ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI ROTI RUMPUT LAUT LAWI-LAWI  
(CAULERPA RACEMOSA) SUBSTITUSI TEMPE SEBAGAI  
ALTERNATIF PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**A.MAHIRAH HUMAERAH**  
**70200114040**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Kandungan Zat Gizi Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulepa racemosa*) Substitusi Tempe sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat”, yang disusun oleh A. Mahirah Humaerah, NIM: 70200114040, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis 23 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 11 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2018 M

11 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Azriful, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Syarfaini, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes (.....)

Penguji I : Irvian I Ibrahim SKM., M.Kes (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
Nip. 19550203 198312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Mahirah Humaerah  
NIM : 70200114040  
Tempat/Tgl.Lahir : Soppeng/ 23 Oktober 1996  
Jurusan/ Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Gizi  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Strata 1 (S1)  
Alamat : Jalan H. M Yasin Limpo Kelurahan Romang-  
polong Kecamatan Somba Opu Samata Gowa  
Judul Penelitian : Analisis Kandungan Zat Gizi Roti Rumput Laut  
Lawi-Lawi (*Ceulera racemosa*) Substitusi Tempe  
sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2018

Penyusun

A. Mahirah Humaerah  
70200114040

## KATA PENGANTAR

Sungguh tiada kalimat yang paling afdhal dan paling terpelajar untuk mengawali kata pengantar ini, selain penyampaian puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Pemangku rezki Maha Pemberi. Dialah Allah, Pemilik ilmu yang Maha Tahu, Penggaris kebenaran, dan Penentu keadilan.

Shalawat dan salam, semoga tercurahkan ke haribaan junjungan dan panutan kita nabi dan rasul akhir zaman. Pelurus iman untuk semua zaman dan keadaan, penegak syariah pantang menyerah, prajurit budi pekerti tak kenal henti, pemantap akidah tak pernah gelisah, penyempurna akhlak tak pernah rusak. Dialah penghulu para nabi dan rasul, yakni Muhammad saw. Semoga berimbas kepada keluarga, para sahabat dan ummatnya yang senantiasa istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita semua. Semoga kelak di akhirat kita semua mendapat syafaatnya.

Penyusun sangat bersyukur kepada Allah Swt. karena telah diperkenankan menikmati lika-liku perjalanan dan perjuangan panjang dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Hanya atas karunia, rahmat, petunjuk dan pertolongan Allah Swt semata melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terkhusus dan teristimewa penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya A. Muh. Mursyid Ismail dan A. Thahirah Shaleh atas doa dan pengorbanan besar mereka yang sampi kapanpun penyusun

tidak akan mampu membalasnya. Semoga Allah Swt. mengalirkan pahala kebaikan serta menghadiahkan mereka JannahNya di akhirat kelak.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat atas bantuan semua pihak terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.SI, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Azriful, SKM., M.Kes. selaku ketua jurusan dan Emmy Bujawati, SKM., M.Kes. selaku sekretaris jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Syarfaini, SKM., M.Kes dan Hj. Dwi Santy Damayati, SKM., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kepeduliam telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Irviani Ibrahim, SKM. M.Kes dan Prof. Dr. Mukhtar Lurfi, M .Pd. selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin

Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kakak-kakak laboran di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar serta dosen dan mahasiswa di laboratorium PKK Prodi Tata Boga Jurusan Teknik Universitas Negeri Makassar yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2014 (*Hefabip*) dan di peminatan gizi (*Glukosa*) yang telah memberikan dukungan moril, moral maupun materil demi penyelesaian skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan cinta yang tulus dan haru saya mengucapkan terima kasih semoga Allah membalas dengan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada semuanya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Gowa, 20 Agustus 2018

Penyusun

**A. Mahirah Humaerah**  
**NIM : 70200114040**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN HASIL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
F. Hipotesis .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Zat Gizi .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa racemosa</i> )	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tempe .....	31
D. Pembuatan Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa racemosa</i> ) Substitusi Tempe.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Roti.....	34
F. Tinjauan Umum Tentang Uji Organoleptik .....	40
G. Kerangka Konsep .....	43
H. Rancangan Penelitian .....	44

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Objek Penelitian .....	47
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Validasi dan Rehabilitasi Instrumen.....	60
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	61

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	62
B. Pembahasan.....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	103
-----------------------	-----



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Tabel Sintesis .....	8
<b>Tabel 2.1</b> Angka Kecukupan Energi, Karbohidrat, Protein dan Lemak yang Dianjurkan untuk Orang Indonesia (per Orang per Hari) .....	20
<b>Tabel 2.2</b> Klasifikasi Karbohidrat Beserta Komponen Utamanya .....	22
<b>Tabel 2.3</b> Angka Kecukupan Konsumsi Zat Besi (Fe) yang Dianjurkan untuk Orang Indonesia .....	26
<b>Tabel 2.4</b> Klasifikasi Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa racemosa</i> ) .....	29
<b>Tabel 2.5</b> Komposisi Kimia 100 gr Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa racemosa</i> ) (Berdasarkan Berat Kering) .....	27
<b>Tabel 2.6</b> Komposisi Kimia Tempe (per 100 gr) .....	32
<b>Tabel 2.7</b> Kandungan Gizi Telur Ayam dalam 100 gram .....	38
<b>Tabel 3.1</b> Keterangan Penilaian Mutu Hedonik terhadap Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa .....	56
<b>Tabel 3.2</b> Tingkat Penilaian Mutu Hedonik .....	56
<b>Tabel 3.3</b> <i>Labeled Affective Magnitude Scale (LAM)</i> / Tingkat Penerimaan Konsumen .....	57
<b>Tabel 3.4</b> Interval Persentase dan Kriteria Kesukaan .....	60
<b>Table 4.1</b> Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Karbohidrat Dalam 100 gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	62
<b>Table 4.2</b> Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Protein Dalam 100 gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	63
<b>Table 4.3</b> Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Lemak Dalam 100 gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	63
<b>Table 4.4</b> Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Zat Besi (Fe) Dalam 100 gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	64

<b>Table 4.5</b> Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Kadar Air Dalam 100 gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	64
<b>Table 4.6</b> Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna, Aroma Tekstur dan Rasa,.....	65
<b>Table 4.7</b> Uji Mutu Hedonik (Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa) dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	66
<b>Table 4.8</b> Distribusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Warna Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018.....	67
<b>Table 4.9</b> Distribusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Aroma Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018.....	68
<b>Table 4.10</b> Distribusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Tekstur Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	69
<b>Table 4.11</b> Distribusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Rasa Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	70
<b>Table 4.12</b> Distribusi Frekuensi Uji <i>Over All</i> Mutu Hedonik Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	71
<b>Table 4.13</b> Uji <i>Over All</i> Mutu Hedonik Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	72
<b>Table 4.14</b> Uji Hedonik Dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulerpa Racemosa</i> ) Substitusi Tempe Tahun 2018 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulera racemosa</i> ) dari Perairan Kabupaten Takalar .....	28
<b>Gambar 2.2</b> Skema Pembuatan Roti Rumput Laut Lawi-Lawi ( <i>Ceulera racemosa</i> ) Substitusi Tempe .....	34
<b>Gambar 2.3</b> Kerangka Konsep.....	43
<b>Gambar 2.4</b> Rancangan Penelitian.....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Resep Pembuatan Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe
2. Lembar Score Sheet Uji Organoleptik
3. Master Tabel SPSS
4. Hasil Pengolahan Data SPSS
5. Hasil Uji Laboratorium
6. Dokumentasi Penelitian
7. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Prodi Tata Boga Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar
9. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar
10. Biografi Penulis



**ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI ROTI RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (*Ceulerpa racemosa*) SUBSTITUSI TEMPE SEBAGAI ALTERNATIF PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**

<sup>1</sup>Syarfaini <sup>2</sup>Dwi Santy Damayati <sup>3</sup>A.Mahirah Humaerah

<sup>1,2,3</sup>Bagian Gizi Jurusan Kesehatan Masyarakat,  
FKIK UIN Alauddin Makassar

(syarfaini.suyuti@uin-alauddin.ic.id)

---

**ABSTRAK**

Roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe merupakan salah satu produk diversifikasi pangan lokal dengan pemanfaatan rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) yang kaya zat besi (*Fe*) sebesar 9,9 mg/100 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, kadar air dan Zat Besi (*Fe*) serta uji organoleptik pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe. Jenis rancangan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dan pendekatan penelitian eksperimentatif dengan desain true-eksperimen. Metode yang digunakan untuk perlakuan rumput laut lawi-lawi dan tempe dengan perbandingan kelompok kontrol 100:0, kelompok eksperimen 75:25, 50:50, 25:75 dan 0:100. Hasil penelitian roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe formulasi 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 dan 0:100 berturut-turut yaitu karbohidrat (48,96%, 55,37%, 54,33%, 56,10% dan 53,99%), protein (8,25%, 8,77%, 10,28%, 11,42% dan 9,94 %), lemak (7,71%, 7,61%, 8,81%, 7,93% dan 8,79%), Fe (18,23277mg/kg, 17,17137mg/kg, 20,9091mg/kg, 16,80773mg/kg dan 10,81677 mg/kg) dan air (21,14%, 20,74%, 21,45%, 23,26% dan 25,16%). Uji hedonik dengan skor tertinggi terdapat pada formulasi 0:100 dengan kriteria sangat sangat suka dan formulasi 75:25, 50:50 serta 25:75 dengan kriteria sangat sangat suka. Adapun uji mutu hedonik dengan skor tertinggi pada formulasi 25:75 dengan kriteria agak baik. Uji Friedman  $p < 0,05$  menunjukkan ada pengaruh substitusi tempe terhadap kualitas roti rumput laut lawi-lawi dari aspek warna, rasa dan mutu *over all* serta tingkat kesukaan. Rekomendasi produk terbaik dari ke lima sampel untuk kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikro adalah formulasi 25:75. Jadi disarankan bagi masyarakat agar dapat melakukan diversifikasi pangan seperti roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe serta diperlukan penelitian lebih lanjut tentang zat gizi lain yang terkandung dalam roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe sebagai makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan zat gizi masyarakat.

*Kata Kunci: Roti, Rumput laut lawi-lawi, Kandungan gizi roti rumput laut lawi-lawi, Tempe, Uji organoleptik*

**THE NUTRITIONAL CONTENT ANALYSIS OF LAWI- LAWI (*Ceulerpa racemosa*) SEAWEED BREAD OF TEMPE SUBSTITUTION OF THE COMMUNITY NUTRITIONAL IMPROVEMENT ALTERNATIVE**

<sup>1</sup>Syarfaini <sup>2</sup>Dwi Santy Damayati <sup>3</sup>A.Mahirah Humaerah

<sup>1,2,3</sup>Nutrient Division of Public Health Department,

FKIK UIN Alauddin Makassar

(syarfaini.suyuti@uin-alauddin.ic.id)

---

**ABSTRACT**

The *lawi-lawi* seaweed bread of tempe substitution is one of the local food diversification products by making use of *lawi-lawi* seaweed (*Ceulerpa racemosa*) which is rich on iron (*Fe*) of 9.9 mg/100 grams. The study is aimed at determining the nutritional content (carbohydrate, protein, fat, water content, iron (*Fe*) and organoleptic test on *lawi-lawi* seaweed bread (*Ceulerpa racemosa*) of tempe substitution. The design type of this study is a completed randomized design (RAL) and an experimental research approach with true-experimental design. The methods applied for the treatment of *lawi-lawi* seaweed and tempe are by comparison of control groups of 100:0, experimental groups of 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100. The results of the study on the *lawi-lawi* seaweed bread of tempe substitution of the formulations of 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 respectively are carbohydrates (48.96%, 55.37%, 54.33% , 56.10% and 53.99%), protein (8.25%, 8.77%, 10.28%, 11.42% and 9.94%), fat (7.71%, 7.61% , 8.81%, 7.93% and 8.79%), Fe (18.23277mg/kg, 17.17137mg/kg, 20.9091mg/kg, 16.80773mg/kg and 10.81677 mg/kg), and water (21.14%, 20.74%, 21.45%, 23.26% and 25.16%). The hedonic test with the highest score is in the formulation of 0:100 with the like it very much criteria and the formulations of 75:25, 50:50 and 25:75 with the like it very much criteria. The hedonic quality test with the highest score is in formulation of 25:75 with the rather good criteria. The Friedman's test of  $p < 0.05$  indicated that there is an influence of tempe substitution on the *lawi-lawi* seaweed bread quality in terms of color, taste, and overall quality as well as the level of preference. The best product recommendation from the five samples for the needs of macro and micro nutrients are the formulation of 25:75. Therefore, it is recommended for the community to be capable of diversifying food such as *lawi-lawi* seaweed bread of tempe substitution and further research is needed on other nutrients contained in *lawi-lawi* seaweed bread (*Ceulerpa racemosa*) of tempe substitution as an additional food to fulfil the community's nutritional needs.

*Keywords* : Bread, Lawi-lawi seaweed, Nutritional content of lawi-lawi seaweed bread, Tempe, Organoleptic test.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingginya potensi rumput laut Indonesia tidak hanya disebabkan karena nilai ekonomi rumput laut yang tinggi, namun juga karena terdapat 70 wilayah perairan Indonesia dari 13.667 pulau wilayah Nusantara yang memiliki potensi rumput laut yang cukup besar seluas 26.700 ha dengan potensi produksi sebesar 462.400 ha/tahun dan tingkat eksploitasinya mencapai 24,31 (Firdaus, 2014: 1). Walaupun potensi pengembangan budidayanya besar, namun pemanfaatan rumput laut di Indonesia baru dilakukan oleh masyarakat pesisir yang dekat dengan sumber bahan baku dan pemanfaatannya masih terbatas.

Produksi rumput laut nasional jenis lawi-lawi (*ceulerpa sp*) dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kenikan dengan rata-rata pertumbuhan 22,2 %. Pada 2015, volume produksi rumput laut nasional sekitar 11,2 juta ton dengan nilai Rp 13,2 triliun atau naik 9,8 % dari volume produksi tahun sebelumnya sebanyak 10,2 juta ton (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016).

*Caulerpa racemosa* atau dikenal dengan nama lawi-lawi oleh masyarakat sekitar adalah salah satu jenis dari rumput laut yang dikembangkan di Sulawesi Selatan (Mukarramah dkk, 2017: 50). Kabupaten di Sulawesi Selatan yang paling banyak menyumbang produksi rumput laut pada tahun 2013 adalah Kabupaten Takalar sebanyak 580,394.40 ton, disusul oleh Luwu sebanyak 544,563.10 ton, dan Luwu Timur sebanyak 242,421.40 ton. (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2015).

Rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) memiliki bahan aktif seperti antioksidan, vitamin C dan *insoluble dietary fiber* sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi makanan fungsional (Fithriani, D, 2015 dalam Mukarramah dkk, 2017: 50). Rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) mampu menangkal radikal bebas karena jenis alga tersebut mengandung asam folat, tiamin dan asam askorbat. *Caulerpa* sp. mengandung caulerpenin yang menunjukkan bioaktivitas terhadap sel line manusia dan memiliki sifat antikanker, antiproliferasi dan antitumor (Chew dkk, 2008 dalam Ridhowati dan Asnani, 2016: 50).

Rumput laut lawi-lawi memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sebagai sumber protein nabati maupun mineral. Jenis rumput laut ini, mengandung protein 17 – 27%, lemak 0,08 – 1,9%, karbohidrat 39 – 50%, serat 1,3 -12,4%, dan kadar abu 8,15 – 16,9% serta kadar air yang tinggi 80 – 90% (Verlaque et al, 2003 dalam Burhanuddin, 2014: 8).

Untuk menambah kandungan gizi produk olahan berbahan dasar rumput laut lawi-lawi, dibutuhkan fortifikasi bahan pangan lokal lain yang dapat dioptimalkan keberadaannya dan merupakan sumber protein nabati serta kaya akan Fe dan zat gizi lainnya. Sebenarnya kualitas protein dari golongan nabati masih tergolong rendah dibandingkan protein hewani, namun kombinasi sumber nabati yang bervariasi mampu memberikan efek komplementari asam amino esensial (Winarno, 2002 dalam Estiningtyas, 2014: 9). Tempe merupakan salah satu bahan makanan yang tepat. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia. Sekitar 60% dari total konsumsi kedelai

nasional diproses menjadi tempe dan konsumsi tempe nasional mencapai sekitar 7 kg / kapita/tahun (Rusdah, 2016: 1). Produksi kedelai Indonesia pada periode 1980–2016 berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,40% per tahun. Rata-rata konsumsi per kapita kedelai masyarakat Indonesia tahun 2015 sebesar 6,12 kg/kapita/tahun. (Kementerian Pertanian, 2016: 51). Sulawesi Selatan memberikan kontribusi sebesar 5,06% (rata-rata produksi 44,80 ribu ton) terhadap produksi kedelai nasional selama lima tahun terakhir. Sedangkan produksi kacang kedelai di Takalar pada periode 2012–2014 berfluktuasi sebanyak 1.183,40 ton pada tahun 2012, 1.400,01 ton pada tahun 2013 dan 1037,87 ton pada tahun 2014 (Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, 2015).

Selain harganya yang murah, tempe juga merupakan bahan pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi. Setiap 100 gram tempe mengandung protein 20,8 gram, lemak 8,8 gram, serat 1,4 gram, kalsium 155 mg, fosfor 326 mg, zat besi 4 mg, vitamin B1 0,19 mg, dan karoten 34 µg (Bastian, dkk, 2013: 5).

Pemanfaatan rumput laut dan tempe dapat dimaksimalkan dengan diversifikasi produk olahan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna dan nilai ekonomis dari rumput laut. Salah satu usaha diversifikasi tersebut adalah dengan cara mengolah rumput laut jenis *Ceulerpa* menjadi produk olahan makanan. Salah satu jenis produk makanan yang saat ini sering dikonsumsi di masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa adalah roti.

Menurut Mudjajanto dan Yulianti (2004) dalam Suryatna (2015: 19), roti merupakan produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan ragi dan ditambahkan bahan pengembang lainnya kemudian dipanggang serta memiliki aroma dan citarasa yang disukai konsumen.

Keterkaitan zat-zat gizi dalam makanan dengan al-Qur'an untuk meningkatkan kesehatan tertuang dalam QS Abasa/80: 24-32 sebagai berikut;

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفِكَهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِنُتِّعَكُمْ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu". (Kementrian Agama, 2015).*

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (2009: 85), ayat ini menguraikan anugerah Allah kepada manusia berupa pangan, sekaligus mengisyaratkan dorongan manusia untuk menyempurnakan tugas-tugasnya.

Ayat ini menjelaskan tentang salah satu dari perwujudan syukur manusia atas segala nikmat-Nya dapat diterapkan dalam memperhatikan dan merenungi proses terbentuknya makanan maupun minuman sehingga nampak di atas piring dan ajakan untuk lebih selektif dalam memilih makanan maupun minuman yang bergizi bagi tubuh manusia (halalan tayyiban) (Putri, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka mengetahui kandungan gizi serta mengembangkan produk pangan rumput laut lawi-lawi dan tempe sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat

melalui bahan makanan lokal yang terjangkau maka peneliti akan membuat diversifikasi pangan lokal yaitu roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe dengan menganalisis kandungan zat gizi karbohidrat, protein, lemak, zat besi (Fe), dan uji organoleptik guna memberikan alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu bagaimana kandungan zat gizi dan uji hedonik roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe ?

### **C. Definisi Operasional**

#### **1. Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa Racemosa*)**

Definisi Operasional: Rumput laut lawi-lawi adalah tanaman rumput laut hijau, terdapat bulat-bulatan seperti anggur kecil di cabangnya.

#### **2. Tempe**

Definisi Operasional: Tempe adalah makanan hasil fermentasi antara kedelai dan jamur.

#### **3. Roti**

Definisi Operasional: Roti adalah produk makanan yang berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi menggunakan ragi roti, garam, air dan atau penambahan bahan lain dan selanjutnya dimasak dengan cara dipanggang atau di oven.

#### 4. Zat Gizi

Zat gizi adalah yang dibutuhkan tubuh yang dapat diperoleh dari makanan berfungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pembangun jaringan tubuh serta pengatur proses di dalam tubuh.

Kriteria Objektif sebagai berikut :

- a. Kadar Karbohidrat adalah jumlah kandungan karbohidrat dalam roti rumput laut lawi-lawi yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan menggunakan metode *Luff Schoorl*.
- b. Kadar Protein adalah jumlah kandungan protein dalam roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan menggunakan metode *Kjehdal*.
- c. Kadar Lemak yang dimaksud adalah jumlah kandungan lemak dalam roti rumput laut substitusi tempe yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan menggunakan metode *Gravimetri*.
- d. Kadar Zat besi (Fe) yang dimaksud adalah kandungan zat besi (Fe) dalam roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe yang di peroleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan metode *Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*.

#### 5. Uji Organoleptik

Definisi operasional: Uji organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk.

Kriteria objektif: uji hedonik

- a. 81 – 100 = sangat suka
- b. 61 – 80 = suka
- c. 41 – 60 = tidak suka
- d. < 41 = sangat tidak suka

Kriteria objektif: uji mutu hedonik

- a. Skor < 4 dikatakan buruk
- b. Skor > 4 dikatakan baik

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif cakupan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitiannya.

Tujuan pengkajian pustaka ini antara lain agar fokus penelitian tidak menjadi pengulangan dari penelitian dan tulisan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Sintesis**

No.	Judul	Peneliti	Tahun	Variabel		Metode Penelitian	Hasil
				Dependen	Independen		
1.	Formulasi Produk Diversifikasi Roti Manis Berbahan Dasar Tepung Ubi Jalar ( <i>Ipomea batatas</i> ) dengan Penambahan Rumput Laut ( <i>Kappaphycus alvarezii</i> )	Nikmawatisusanti Yusuf dan Asri S.	2015	Formulasi diversifikasi roti manis	Penggunaan bahan rumput laut dan ubi jalar	Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Analisis yang akan dilakukan pada tahap formulasi adalah metode analisis organoleptik ( <i>uji hedonik</i> ). Pada tahap karakterisasi adalah uji mutu hedonik dan analisis kimia (proksimat). Perlakuan pada penelitian ini adalah perbandingan konsentrasi rumput laut dan tepung ubi jalar. Selanjutnya untuk penentuan formula terpilih akan menggunakan metode bayes. Analisis data yang akan digunakan pada hasil uji organoleptik menggunakan analisis nonparametrik ( <i>kruskalwallis</i> ). Analisis kimia menggunakan RAL.	Berdasarkan hasil analisis penambahan rumput laut pada formula roti manis memberikan pengaruh terhadap karakteristik mutu hedonik (organoleptik) dan kimia roti yang dihasilkan. Berdasarkan uji hedonik (penerimaan) formula roti yang dianalisis diperoleh hasil bahwa penambahan rumput laut pada formula roti memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat penerimaan panelis. Secara umum 3 formula yang diuji seluruh parameter organoleptiknya masih berada pada batas standar penerimaan yaitu dari netral sampai suka. Hasil uji bayes formula terpilih pada penelitian ini adalah formula B yaitu formula dengan penambahan 50% rumput laut. Karakteristik formula roti terpilih secara organoleptik

						<p>Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS 16. Penentuan formula terpilih menggunakan uji Bayes.</p>	<p>memiliki kenampakan dan warna coklat kekuningan tidak berjamur, aroma khas ubi jalar cukup kuat, rasa manis khas roti. Karakteristik kimia untuk formula roti terpilih kadar air 23,65%, abu 2,31%, protein 4,48%, lemak 12,58%, karbohidrat 56,98% dan serat kasar 2,49%.</p>
2.	<p>Peningkatan Kelembutan Tekstur Roti Melalui Fortifikasi Rumput Laut <i>Euchema Cottoni</i></p>	<p>Bambang Sugeng Suryatna.</p>	2015	<p>Kelembutan Tekstur Roti</p>	<p>Fortifikasi Rumput Laut <i>Euchema Cottoni</i></p>	<p>Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan percobaan fortifikasi tepung rumput laut <i>Euchema cottoni</i> dengan tiga (3) tingkat fortifikasi yaitu : fortifikasi tepung rumput laut <i>Euchema cottoni</i> dalam adonan roti sebanyak 0% (tidak di fortifikasi), 5%, dan 10%. Produk roti yang dihasilkan selanjutnya dianalisa dengan uji organoleptik untuk menentukan tekstur kelembutan dan performa produk roti yang paling disukai atau paling enak.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa fortifikasi tepung rumput laut <i>Euchema cottoni</i> sebesar 5% menghasilkan produk roti dengan kelembutan tekstur dan performa roti yang paling baik. Temuan penelitian ini yaitu menemukan cara meningkatkan asupan Iodium khususnya pada anak-anak melalui konsumsi roti yang difortifikasi dengan rumput laut <i>Euchema cottoni</i>.</p>

					Hasil uji organoleptik dianalisa secara statistik dengan menggunakan z-score untuk menentukan perbedaan antara rata-rata.		
3.	Kandungan Gizi Sosis Substitusi Tepung Tempe dengan Bahan Pengisi Tepung Ubi Jalar Kuning (Ipomoea Batatas) dan Bahan Penstabil Ekstrak Rumput Laut (Eucheuma cottonii) untuk PMT Ibu Hamil	Dian Estining tyas	2014	Tekstur dan kandungan gizi sosis	Substitusi tepung tempe dengan bahan pengisi tepung ubi jalar kuning dan bahan penstabil ekstrak rumput laut.	Penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penelitian pendahuluan yang meliputi analisis bahan utama dan penentuan kadar substitusi tepung ubi jalar kuning sebagai bahan pengisi dan ekstrak rumput laut sebagai bahan penstabil dengan uji organoleptik dan penelitian utama yang menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor yaitu substitusi tepung tempe dengan 3 taraf (20%; 40%; dan 60%) dan 1 kontrol (0% tepung tempe). Analisis tekstur dengan <i>teksture analyzer</i> , kadar protein dengan metode <i>Kjeldahl</i> , kadar lemak dengan metode <i>Soxhlet</i> , kadar karbohidrat dengan <i>by difference</i> dan kadar $\beta$ -karoten dan zat besi dengan <i>spektrofotometer</i> . Selanjutnya data dianalisis menggunakan <i>One Way Anova</i> .	Semakin tinggi substitusi tepung tempe, kadar karbohidrat dan lemak semakin menurun. Sosis substitusi tepung tempe 60% memiliki kadar protein, zat besi, dan $\beta$ -karoten tertinggi, yaitu sebesar 23,24%, 2,14 mg/100 g, dan 1,25 mg/100 g sedangkan kadar lemaknya terendah sebesar 24,20%. Sosis substitusi tepung tempe 60% sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3820-1995), yaitu kadar protein minimal 13%, lemak maksimal 25% dan karbohidrat maksimal 8%.

4.	Substitusi Tepung Rumput Laut ( <i>Eucheum a cottonii</i> ) pada Pembuatan Ekado sebagai Alternatif Makanan Tinggi Yodium Pada Anak Sekolah	Dina Listiyana	2014	Kandungan yodium dan daya terima ekado	Substitusi tepung rumput laut	<p>Penelitian menggunakan rancangan percobaan <i>single factor</i>, rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan substitusi tepung rumput laut dengan konsentrasi 0%, 30%, 40% dan 50% kedalam pembuatan ekado. Kandungan yodium diuji dengan menggunakan metode <i>spektrofotometer</i>. Uji daya terima meliputi aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa. Uji <i>Anova</i> dan uji <i>Friedman Test</i> untuk menguji pengaruh substitusi tepung rumput laut pada pembuatan ekado terhadap kandungan yodium dan daya terimanya.</p>	<p>pembuatan ekado terhadap kadar yodium dengan <math>p\text{ value} = 0,000</math> (<math>&lt;0,05</math>) dan daya terima (aspek warna <math>p\text{ value} = 0,005</math> (<math>&lt;0,05</math>), aspek aroma <math>p\text{ value} = 0,009</math> (<math>&lt;0,05</math>), aspek tekstur <math>p\text{ value} = 0,019</math> (<math>&lt;0,05</math>), dan aspek rasa <math>p\text{ value} = 0,000</math> (<math>&lt;0,05</math>)). Berdasarkan uji daya terima memberikan tingkat kesukaan paling baik pada substitusi tepung rumput laut 30%.</p>
5.	Pengaruh Penambahan Tepung Tempe dan Tepung Rumput Laut ( <i>Eucheum</i>	Yuliana Ottong, Tamrin dan Djukrana Wahab.	2017	Karakteristik organoleptik sagon kelapa	Penambahan tepung tempe dan tepung rumput laut ( <i>Eucheuma cottonii</i> )	<p>Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah faktor tepung tempe : rumput laut (P) dengan 3 level yaitu P1(40:60), P2(50:50), P3(60:40). Faktor kedua</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk dengan suhu pemanggangan pada 1600C merupakan perlakuan yang paling disukai panelis dengan skor penilaian kesukaan terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur sebesar 3.73 (suka),</p>

	<i>a cottonii</i> ) terhadap Karakteristik Organoleptik Sagon Kelapa					adalah suhu pemanggangan (A) yang terdiri atas tiga taraf A1 (1500C), A2 (1600C) dan A3 (1700C) selama 30 menit.	3.38 (suka), 2.89 (agak suka) dan 3.07 (suka). Kandungan air, abu, lemak, protein dan serat berturut-turut sebesar 11.79%, 0.63%, 14.36%, 10.06%, dan 3.83 %, respectively.
6.	Formulasi Rumput Laut Gracilaria sp. dalam Pembuatan Bakso Daging Sapi Tinggi Serat dan Iodium	Lovi Dwi Prinest asari, Leily Amalia.	2015	Kandungan gizi dan daya terima bakso	Formulasi rumput laut gracilaria sp. dalam pembuatan bakso daging sapi	Formulasi dibuat dengan penambahan bubur rumput laut Gracilaria sp. sebesar 30%, 40%, dan 50% terhadap berat adonan total. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan faktor tunggal yaitu penambahan rumput laut Glaciralia sp. sebanyak 30%, 40%, dan 50% dari berat adonan total. Percobaan dilakukan dengan dua kali ulangan. Penelitian dilaksanakan mulai Desember 2014 sampai Maret 2015.	Produk bakso dengan penambahan rumput laut sebanyak 40% menunjukkan nilai penerimaan tertinggi secara organoleptik dan dipilih sebagai produk terpilih. Hasil uji proksimat kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat secara berturut-turut adalah 76,93%; 2,31%; 0,5%; 8,11%, dan 12,16%. Kadar serat pangan total dan iodium produk terpilih masing-masing adalah 5,98% dan 1,14 ppm. Hasil uji daya terima terhadap 31 anak SD menunjukkan 90,3% subjek menyatakan suka dan dapat menerima produk bakso terpilih dengan baik. Produk

							<p>bakso terpilih memberikan kontribusi energi 2,12-2,78%, protein 7,03-12,05%, lemak 0,36-0,42%, karbohidrat 2,19-2,87%, serat 10,37-14,13%, dan iodium 49,4% terhadap AKG anak usia 6-12 tahun. Dengan demikian, produk bakso dengan penambahan 40% rumput laut <i>Gracilaria</i> sp. merupakan produk tinggi serat dan iodium.</p>
7.	Aktivitas Antioksidan dan Rumput Laut <i>Ceulerpa</i> sp. Segar dan Rebus	Bagja Adhitia Putera	2015	Rumput laut <i>Caulerpa</i> sp. segar dan setelah proses Perebusan.	Suhu dan waktu perebusan terpilih, komposisi kimia, dan aktivitas antioksidan	Metode ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi tunggal menggunakan pelarut metanol selama 1×24 jam. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode DPPH. <i>Caulerpa</i> sp. segar dan rebusPreparasi dan ekstraksi sampel dilakukan di Laboratorium Karakteristik Bahan Baku Hasil Perairan, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut	Perlakuan terpilih perebusan <i>Caulerpa</i> sp. berdasarkan uji organoleptik yaitu dengan suhu 90°C selama lima menit. <i>Caulerpa</i> sp. dalam bentuk segar mengandung kadar air 76,47±0,09%, kadar abu 1,33±0,12%, kadar protein 3,58±0,14%, kadar lemak 0,35±0,04%, dan karbohidrat ( <i>by difference</i> ) sebesar 18,27±0,08%. <i>Caulerpa</i> sp. dalam bentuk rebus mengandung kadar air 79,43±0,19%, kadar abu

					<p>Pertanian Bogor. Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Nawa Agna, Cilendek Timur, Bogor. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka.</p>	<p>1,03±0,06%, kadar protein 3,37±0,1%, kadar lemak 0,4±0,03%, dan karbohidrat (<i>by difference</i>) sebesar 15,76±0,18%. Aktivitas antioksidan ekstrak kasar <i>Caulerpa</i> sp. segar (452,37±8,29 ppm) dan rebus (484,59±5,69 ppm) tergolong sangat lemah berdasarkan metode pengujian DPPH. Perebusan pada suhu 90°C selama lima menit menyebabkan turunnya aktivitas antioksidan <i>Caulerpa</i> sp. sebesar 32,22 ppm.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan terdapat pada bahan makanan yang diteliti terhadap kandungan gizi dan daya terima roti dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini bahan makanan yang diteliti adalah rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe.
2. Dalam proposal penelitian ini, peneliti secara signifikan lebih memfokuskan pada identifikasi zat gizi (karbohidrat, protein, lemak dan zat besi) serta kualitas organoleptik roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe sebagai alternatif perbaikan gizi masyarakat.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui zat gizi roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe sebagai alternatif peningkatan gizi di masyarakat.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kadar karbohidrat roti rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa Racemosa*) substitusi tempe.
- 2) Untuk mengetahui kadar protein roti rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa Racemosa*) substitusi tempe.
- 3) Untuk mengetahui kadar lemak roti rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa Racemosa*) substitusi tempe.

- 4) Untuk mengetahui kadar zat besi (Fe) roti rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa Racemosa*) substitusi tempe.
- 5) Untuk mengetahui sifat organoleptik roti rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa Racemosa*) substitusi tempe.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung dengan mengembangkan akademik dan sebagai bahan informasi guna memperluas wawasan dan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya di bidang gizi.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe sebagai alternatif perbaikan gizi terhadap masyarakat.

## F. Hipotesis

1. Ho : Tidak ada hubungan
2. Ha : Ada Hubungan

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Zat Gizi**

##### **1. Ilmu Gizi (Nutrition Science)**

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan bahan makanan dalam hubungannya dengan kesehatan tubuh yang optimal. Dalam bahasa Inggris, kata “gizi” berasal dari kata *nutrition* yang berarti jumlah total dari proses yang dibutuhkan dalam penyerapan dan pemanfaatannya untuk proses pertumbuhan, perbaikan dan perawatan tubuh. Dalam bahasa Arab, gizi berasal dari kata *ghidza* yang berarti makanan. Makanan menyuplai energi yang sangat esensial bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Gizi menjadi bagian integral tubuh dan berkontribusi langsung terhadap proses fisiologi dan biokimia tubuh (Tim MONSPUB15, 2016).

Zat gizi merupakan komponen kimia dalam pangan yang dibutuhkan untuk kenormalan fungsi tubuh, hidup sehat, cerdas dan produktif. Definisi ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat pangan yang bermanfaat bagi perkembangan dan prestasi manusia, proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai digunakan oleh tubuh dan dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, produktivitas kerja dan kelangsungan hidup, serta faktor yang memengaruhinya (Pakar Gizi Indonesia, 2014).

Begitu banyak hasil penelitian para ahli yang menyatakan kesalahan dalam makanan dapat mengganggu beberapa kerja tubuh hingga akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan penyakit. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan besar dikarenakan manusia terlalu berlebihan dalam berbagai hal. Seperti terlalu banyak garam, terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak dan kolesterol,

terlalu banyak bahan makanan tambahan (food additive), alkohol, merokok dsb. Padahal semua yang berlebihan itu tidak disukai Allah SWT, seperti dalam firman-Nya dalam QS al-A'raf/7: 31 sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
(٣١)

Terjemahnya:

*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap masuk masjid. Makan minumlah dan jangan berlebih-lebihan (melampaui batas yang dibutuhkan tubuh dan batas-batas yang dihalalkan). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Kementerian Agama, 2015: 155).*

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (2009: 87), ayat ini mengajak: *makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik *serta minumlah* apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu *dan janganlah berlebih-lebihan* dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum, karena *sesungguhnya Allah tidak menyukai*, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi *orang-orang yang berlebih-lebihan* dalam hal apapun.

Prinsip halal adalah perkara yang dititikberatkan dalam pemilihan makanan menurut syariat Islam. Prinsip halal secara umum melibatkan dua perkara. Pertama, bagaimana makanan itu diperoleh. Kedua, adakah zat atau makanan itu sendiri halal atau sebaliknya, dari segi syariat Islam. Ayat diatas juga menegaskan kepada kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan termasuk salah satunya adalah tidak bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala perkara dan hanya mengikuti hawa nafsu tanpa memikirkan sebab dan akibat dari perbuatan yang berlebih-lebihan salah satunya dalam hal makan dan minum yang melampaui batas yang

dibutuhkan tubuh. Makan yang berlebihan membuat seseorang merasa kekenyangan sehingga menimbulkan sifat malas beribadah.

Tidak bersikap berlebih-lebihan dalam segala hal, salah satunya dalam halmakan dan minum. Di antara adab makan adalah membagi perut menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ بْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقْمَنَ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتُلُتْ لِطَعَامِهِ وَتُلُتْ لِشَرَابِهِ وَتُلُتْ لِنَفْسِهِ

Terjemahnya:

*Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika dia harus mengerjakannya maka hendaklah dia membagi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) (Afandi, 2000: 152).*

Ini adalah beberapa tuntunan yang diajarkan oleh Nabi agar umatnya terjaga dari penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman, keterangan di atas menunjukkan dimakruhkan memperbanyak dan mempersedikit makan sehingga menyebabkan lemahnya badan.

## 2. Zat Gizi Makro

Zat gizi makro merupakan komponen terbesar dari susunan diet yang berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial (pertumbuhan sel/jaringan), pemeliharaan aktivitas tubuh. Yang termasuk zat gizi makro adalah karbohidrat (hidrat arang), lemak, protein (zat putih telur), makromineral dan air. Zat gizi makro sebagai sumber energi dapat diuraikan secara timbal balik, dalam hal ini karbohidrat menghasilkan 4 Kkal/g, lemak 9 Kkal/g dan protein 4 Kkal/g.

**Tabel 2.1**  
**Angka Kecukupan Energi, Karbohidrat, Protein dan Lemak yang**  
**Dianjurkan untuk Orang Indonesia (per Orang per Hari)**

Kelompok Umur	Energi (Kkal)	Karbohidrat (g)	Protein (g)	Lemak(g)		
				Total	n-6	n-3
Bayi/Anak						
0-6 bulan	550	58	12	34	4,4	0,5
7-11 bulan	725	82	18	36	4,4	0,5
1-3 tahun	1125	155	26	44	7,0	0,7
4-6 tahun	1600	220	35	62	10,0	0,9
7-9 tahun	1850	254	49	72	10,0	0,9
Laki-laki						
10-12 tahun	2100	389	56	70	12,0	1,2
13-15 tahun	2475	340	72	83	16,0	1,6
16-18 tahun	2675	368	66	89	16,0	1,6
19-29 tahun	2725	375	62	91	16,0	1,6
30-49 tahun	2625	394	65	73	16,0	1,6
50-64 tahun	2325	349	665	65	14,0	1,6
65-80 tahun	1900	309	62	53	14,0	1,6
80+ tahun	1525	248	60	42	14,0	1,6
Perempuan						
10-12 tahun	2000	275	60	67	10,0	1,0
13-15 tahun	2125	292	69	71	11,0	1,1
16-18 tahun	2125	292	59	71	11,0	1,1
19-29 tahun	2250	309	56	75	12,0	1,1
30-49 tahun	2150	323	57	60	12,0	1,1
50-64 tahun	1900	285	57	53	11,0	1,1
65-80 tahun	1550	252	56	43	11,0	1,1
80+ tahun	1425	232	55	40	11,0	1,1
Hamil						
Trimester 1	+180	+25	+20	+6	+2,0	+0,3
Trimester 2	+300	+40	+20	+10	+2,0	+0,3
Trimester 3	+300	+40	+20	+10	+2,0	+0,3
Menyusui						
6 bln pertama	+330	+45	+20	+11	+2,0	+0,2
6 bln kedua	+400	+55	+20	+13	+2,0	+0,2

Sumber: (Badan POM RI, 2014: 5-6).

a. Karbohidrat

Karbohidrat adalah energi yang disimpan dan disintesis oleh tanaman dari air serta karbondioksida dengan menggunakan energi matahari. Karbohidrat mempunyai rumus bangun yang umum  $(CH_2O)_n$  (Mann, 2014: 21). Rumus umum ini memberi kesan zat karbon yang diikat dengan air (dihidrasi), sehingga diberi nama karbohidrat.

Jumlah minimum karbohidrat yang diperlukan untuk menghindari ketosis diperkirakan sekitar 50 gram/hari. Kebanyakan orang mengonsumsi karbohidrat lebih dari 100 gram/hari dengan asupan berkisar dari 200 hingga 400 gram/hari. FAO/WHO Expert Consultation on Carbohydrates (1998) menganjurkan bahwa sekurang-kurangnya 55% energi total didapatkan dari karbohidrat yang diperoleh dari beragam sumber makanan (Mann, 2014: 37).

Menurut Suriyanti (2017: 26), di dalam hidangan, karbohidrat memudahkan pemberian bentuk kepada makanan. Dalam proses fermentasi, karbohidrat mempunyai sifat-sifat khusus untuk mendapatkan hasil olah yang disukai konsumen. Kerjasama antara karbohidrat dan protein tertentu di dalam tepung terigu memberikan hasil bakar (roti) yang empuk seperti spons.

Berikut tabel karbohidrat utama dalam makanan:

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Karbohidrat Beserta Komponen Utamanya**

Kelas	Subkelompok	Komponen Utama
Gula	Monosakarida Disakarida Poliol (gula alkohol)	Glukosa, fruktosa, galaktosa Sukrosa, laktosa, maltosa, trehalosa Sorbitol, manitol, laktitol, xylitol, eritritol, isomalt, maltitol
Oligosakarida (karbohidrat rantai pendek)	Malto-oligosakarida ( $\alpha$ -glukans) Oligosakarida non $\alpha$ - glukan	Maltodekstrin Rafinosa, stakiosa, frukto- dan galakto- oligosakarida, polidektrosa, insulin
Polisakarida	Pati ( $\alpha$ -glukans)  Polisakarida non-pati	Amilosa, amilopektin, pati yang dimodifikasi Selulosa, hemiselulosa, pektin, arabinoksilan, $\beta$ -glukans, glikomanan, gum serta musilago tanaman, hidrokoloid.

Sumber: (Mann, 2014: 22).

b. Protein

Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari asam amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida membentuk rantai peptida dengan beberapa jenis panjang antara lain dipeptida (terdiri dari dua asam amino), oligopeptida (4-10 peptida) dan polipeptida (lebih dari 10 peptida) (Webster dkk, 2014: 60).

Protein diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, perbaikan jaringan, sintesis enzim protein, metabolisme protein dan protein diperlukan untuk proses kekebalan tubuh atau mekanisme pertahanan tubuh (Sinaga, Maria dan Jansen, 2015: 258). Kandungan protein zat organik dapat ditentukan dengan dua cara: (1) secara langsung dengan menggunakan bahan kimia atau fisik tertentu tertentu yang unik untuk protein, atau (2) secara tidak langsung dengan menentukan kandungan nitrogennya. Metode Kjeldahl

adalah salah satu metode penentuan nitrogen yang umum digunakan, namun, kuantifikasi protein menggunakan spektrofotometri juga telah digunakan secara luas karena prosedurnya yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih mudah (Sinaga, Maria dan Jansen, 2015: 259).

### c. Lemak

Lemak atau lipid merupakan sekelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin (petrol) atau kloroform, tetapi biasanya tidak larut dalam air. Lemak yang terlihat paling jelas dalam makanan dan gizi meliputi minyak yang *edibel* (dapat dimakan) yang bersifat cair pada suhu kamar dan lemak yang padat pada suhu kamar. Banyak orang di negara yang berpenghasilan tinggi menganggap lemak dan minyak sebagai makanan yang harus dihindari karena persepsi bahwa unsur gizi tersebut dapat menimbulkan obesitas. Selain meningkatkan aroma dan kelezatan makanan, lemak memberikan pula kontribusi yang penting pada kecukupan gizi yang sebagian di antaranya sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung (Mann 2014: 47). Al-Quran sebagai acuan pertama mengisyaratkan penggunaan minyak dalam makanan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 20.

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلَّذِينَ كَلِمَاتٍ

Terjemahnya:

*Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan (Kementerian Agama, 2015: 344).*

Pada penetapan kadar lemak, ada beberapa metode yang paling sering digunakan salah satunya adalah metode soxhlet. Prinsip analisis kadar lemak dengan metode soxhlet adalah lemak diekstrak dengan pelarut lemak seperti petroleum eter, petroleum benzena, dietil eter, dan lain-lain. Lemak yang ada dalam pelarut dipisahkan dengan cara menguapkan pelarut, sehingga berat lemak dapat diketahui. Kelebihan metode ini yaitu pelarut yang digunakan masih utuh, dapat digunakan untuk pemisahan bahan lain. dikatakan masih utuh karena dalam penguapan dengan rotary evaporator hasil yang diperoleh memisahkan pelarut yang ada dalam filtrat. Namun, metode ini kurang efektif karena harga pelarut mahal dan lemak yang diperoleh harus dipisahkan dari pelarutnya dengan cara diuapkan (Tim Dosen PS ITP, 2012).

### **3. Zat Gizi Mikro**

Zat gizi mikro bukan merupakan senyawa pembangun atau sumber energi, namun demikian zat gizi mikro memiliki peranan penting dalam tubuh. Yang termasuk zat gizi mikro :

- a) Mineral; kalsium, fosfor, natrium, kalium, sulfur, klor, magnesium, zat besi, selenium, seng, mangan, tembaga, kobalt, iodium, krom, flour, timah, nikel, silikon, arsen, boron, vanadium, molibden.
- b) Vitamin ; vitamin A (retinol), vitamin D (kolekalsiferol), vitamin E (tokoferol), vitamin K, tiamin, riboflavin, niacin, biotin, folasin/folat, vitamin B6, vitamin B12, asam pantotenat dan vitamin C.
- c) Air. air merupakan kebutuhan yang esensial bagi kehidupan, karena lebih dari setengah bagian jaringan makhluk hidup terdiri dari air.

Pada penelitian ini zat gizi mikro yang akan diteliti pada roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe adalah sebagai berikut:

a. Zat Besi

Keberadaan besi dalam kerak bumi menempati urutan empat besar yang biasanya ditemukan dalam bentuk ferro ( $\text{Fe}^{2+}$ ) dan ferri ( $\text{Fe}^{3+}$ ) (Tim Penyusun, 2016). Fe (Ferrum) adalah nama salah satu elemen kimia dalam tabel periodik yang menjadi salah satu judul surat dalam kitab Al Qur'an, surat Al-Hadid. Berikut salah satu ayat dalam QS Al-Hadid/ 57: 25 yang membahas tentang besi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  
(٢٥)

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (Kementerian Agama, 2015: 542).*

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**Tabel 2.3**  
**Angka Kecukupan Konsumsi Zat Besi (*Fe*,)**  
**yang Dianjurkan untuk Orang Indonesia**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Besi (mg)</b>
Bayi/Anak	
0-6 bulan	-
7-11 bulan	7
1-3 tahun	8
4-6 tahun	9
7-9 tahun	10
Laki-laki	
10-12 tahun	13
13-15 tahun	19
16-18 tahun	15
19-29 tahun	13
30-49 tahun	13
50-64 tahun	13
65-80 tahun	13
80+ tahun	13
Perempuan	
10-12 tahun	20
13-15 tahun	26
16-18 tahun	26
19-29 tahun	26
30-49 tahun	26
50-64 tahun	12
65-80 tahun	12
80+ tahun	12
Hamil	
Trimester 1	+0
Trimester 2	+9
Trimester 3	+13
Menyusui	
6 bln pertama	+6
6 bln kedua	+8

Sumber: : (Badan POM RI, 2014: 5-6)

## B. Tinjauan Umum tentang Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*)

### 1. Deskripsi Rumput Laut

Rumput laut atau *sea weeds* merupakan komoditi hasil laut yang melimpah di Indonesia. Pada mulanya orang menggunakan rumput laut hanya untuk sayuran. Sudah lama rumput laut digunakan sebagai bahan makanan dan obat. Rumput laut memiliki kandungan serat kasar yang tinggi sehingga dapat membantu mencegah kanker usus. Rumput laut juga memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi terutama unsur Iodium dan Kalium yang sangat diperlukan untuk pencegahan penyakit gondok, keterbelakangan mental, kritinisme dan lain sebagainya, terutama pada anak-anak (Suryatna, 2015: 21). Seluruh bagian tumbuhan rumput laut disebut tallus karena belum dapat dibedakan antara batang, daun dan akarnya (Yudasmara, 2014: 469).

### 2. Deskripsi Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*)

Klasifikasi dari rumput laut *Caulerpa racemosa* sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Rumput Laut (*Caulerpa racemosa*)**

<b>Klasifikasi Rumput Laut (<i>Caulerpa racemosa</i>)</b>	
Kingdom	<i>Plantae</i>
Divisi	<i>Thallopyta</i>
Kelas	<i>Chlorophyceae</i>
Ordo	<i>Siphonales</i>
Famili	<i>Caulerpaceae</i>
Genus	<i>Caulerpa</i>
Spesies	<i>Caulerpa racemosa</i>

Sumber: (Khatimah, 2016: 12).

Morfologi rumput laut *Caulerpa racemosa* dilihat pada gambar berikut,



Gambar 2.1 Rumput laut (*Caulerpa racemosa*) dari perairan Kabupaten Takalar.

*Caulerpa* adalah salah satu genus alga laut dari Famili Caulerpaceae dan termasuk spesies dari Kelas Chlorophyceae (alga hijau) (Atmadja dkk, 1996 dalam Yudasmara, 2014). Makroalga laut jenis *Caulerpa racemosa* memiliki thalus berwarna hijau seperti tanaman rumput, batang pokok berukuran antara 16-22 cm dan terdiri dari banyak cabang tegak yang tingginya sekitar 2,5-6,0 cm. serta terdapat bulatan-bulatan seperti anggur pada puncak cabang dimana panjang setiap puncak cabang sekitar 2,5-10,0 cm (Suhartini, 2003 dalam Yudasmara, 2014: 469). *Caulerpa racemosa* sering disebut sebagai anggur laut karena tumbuh berumpun atau bergerombol. *Caulerpa racemosa* dapat dijumpai di paparan terumbu karang dengan kedalaman hingga 200 m. Sebagai fitobentik, tumbuhan ini

dapat hidup menempel di substrat dasar perairan laut seperti karang mati, fragmen karang, lumpur dan pasir. Pertumbuhannya bersifat saprofitik atau epifitik dan kadang-kadang berasosiasi dengan tumbuhan laut (Atmadja dkk, 1996 dalam Yudasmara, 2014: 470).

### **3. Kandungan Gizi Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*)**

Rumput laut *Caulerpa racemosa* merupakan salah satu jenis alga hijau yang hidup menyebar di beberapa perairan Indonesia. Aktivitas antioksidan ganggang laut dapat timbul dari pigmen seperti klorofil dan karotenoid, vitamin dan prekursor vitamin, fenolat dan zat antioksidan lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap penghambatan atau penekanan proses oksidasi (Cox dkk, 2014: 1824).

Rumput laut *Ceulerpa racemosa* merupakan bahan pangan yang kaya akan protein dan asam amino seperti L-Glutamic acid, L- Asparagine, L-Serine, L-Glycin, L-Threonin, L- Alanine, L-Leucine, L-Valine dan L-Lycine; kaya serat larut maupun tidak larut serta rendah lemak (Mukarramah dkk, 2017: 51).

Berdasarkan beberapa penelitian, *Caulerpa racemosa* menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antioksidan. *Caulerpa racemosa* mampu menangkal radikal bebas karena mengandung asam folat, tiamin dan asam askorbat (Anwar, Bubun dan Rosmawati, 2016: 111).

*Caulerpa racemosa* memiliki sifat antibakteri dan antijamur, serta mengandung beberapa jenis metabolit sekunder, diantaranya glyco glycerolipid dan kelompok enol,  $\alpha$ -1-gliceryl-Dmannoside-4-amonium sebagai antihelminthic (zat pembunuh cacing) dan alkaloid yang berfungsi sebagai

penurun tekanan darah dan mengobati penyakit rematik (Dwihandita, 2009 dalam Khatimah, 2016: 13).

Berdasarkan penelitian Ma'ruf (2013: 4-6) berikut komposisi kimia, serat dan makromineral pada *Caulerpa racemosa* yang tumbuh di perairan Jepara, Jawa Tengah;

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Kimia 100 gr Rumput Laut *Caulerpa racemosa***  
**(Berdasarkan Berat Kering)**

Senyawa	Kadar (%)
Kadar air (berat basah)	92.375 ± 0.027
Kadar protein	21.730 ± 5.165
Kadar lemak	8.681 ± 0.964
Kadar abu	20.910 ± 1.290
Kadar karbohidrat serat kasar	8.429 ± 2.380
K	0.013 ± 0.036
Na	1.900 ± 0.036
Ca	0.195 ± 0.024
Na-K	150.00 ± 0.000

Sumber: (Ma'ruf, Widodo dkk, 2013: 4-6)

Nilai energi Rumput laut *Caulerpa racemosa* kebanyakan di kontribusikan oleh karbohidrat dan protein karena nilai total lipid rendah (2,06% DW). Oleh karena itu, alga ini cocok sebagai makanan diet untuk menurunkan obesitas (Kumar dkk, 2011 dalam Mukarramah dkk, 2017: 50-51). *Caulerpa racemosa* dari Indonesia memiliki *insoluble dietary fiber* yang lebih tinggi dibanding *Caulerpa racemosa* yang berasal dari Jepang. *Insoluble dietary fiber* mengandung selulosa dan hemiselulosa yang bermanfaat dalam pencegahan konstipasi, hemoroid dan colitis. Fiber juga sangat cocok bagi penderita obesitas dan diabetes mellitus (Venugopal, 2010 dalam Mukarramah dkk, 2017: 51).

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tempe**

### **1. Deskripsi Tempe**

Tempe adalah produk kedelai fermentasi padat yang dikonsumsi secara luas di Indonesia. Tempe adalah nama yang biasa digunakan untuk produk fermentasi kedelai (Lakshmy dkk 2015: 166).

Menurut Astuti dkk (2003) dalam Ottong, Tamrin dan Djukana (2017: 497), tempe merupakan makanan tradisional yang telah dikenal di Indonesia, dibuat dengan cara fermentasi atau peragian, menggunakan bantuan kapang golongan *Rhizopus* sp. Tempe merupakan bahan pangan lokal yang murah dan memiliki nilai gizi tinggi.

Fermentasi adalah salah satu teknologi makanan rumah tangga dimana nilai gizi makanan dapat ditingkatkan. Tempe adalah salah satu cetakan hasil fermentasi yang paling banyak diterima dan diteliti (Lakshmy dkk, 2015: 166).

### **2. Kandungan Gizi Tempe**

Menurut Astawan (2013) dalam Kristianto, Arsinah dan Wahyu (2015: 198), dari sudut kesehatan tempe bermanfaat untuk mencegah terjadinya masalah gizi, bukan hanya kekurangan gizi tetapi juga kelebihan gizi karena protein yang terdapat dalam tempe sangat tinggi dan mudah dicerna.

Tempe mengandung vitamin dan mineral penting seperti asam folat, zat besi (Fe), vitamin B12, Seng (Zn) dan tembaga (Cu). Kandungan energi dan protein 100 gram tempe adalah masing-masing 199.1 Kal dan 19 gram. Keunggulan gizi tempe lainnya adalah kandungan asam amino yang sangat tinggi, sampai 85 kali kedelai. (Erhardt, 2007 dalam Kristianto, Arsinah dan Wahyu (2015: 198). Tempe adalah sejenis makanan ajaib karena mengandung asam lemak rantai panjang tanpa jenuh, vitamin B-12, D dan E, fitoestrogen

dan senyawa fungsional lainnya (M.E, Nawansih and Nurdjanah, 2017: 734).

Berikut tabel kandungan gizi tempe dalam 100 gram;

**Tabel 2.6**  
**Komposisi Kimia Tempe (per 100 g)**

Komponen	Jumlah	Mineral	Jumlah	Vitamin	Jumlah
Energi (Kkal)	193	Kalsium (mg)	111	Vitamin C (mg)	0
Air (g)	59,65	Besi (mg)	2,70	Tiamin (mg)	0,07
Protein (g)	18,54	Magnesium (mg)	81	Riboflavin (mg)	0,35
Lemak (g)	10,80	Fosfor (mg)	266	Niasin (mg)	2,64
Abu (g)	1,62	Kalium (mg)	412	Asam pantotenat (mg)	0,27
Karbihidrat (g)	9,39	Natrium (mg)	9	Vitamin B6 (mg)	0,21
Asam lemak jenuh (g)	2,22	Seng (mg)	1,14	Total folat	24
Asam lemak tidak jenuh tunggal (g)	3,00	Tembaga (mg)	0,56	Vitamin B12 (µg)	0,08
Asam lemak tidak jenuh jamak (g)	3,82	Mangan (mg)	1,3	Vitamin A (IU)	0

Sumber: (*USDA Nutrient Database for Standart Reference*, 2014 dalam Mursyid, 2014).

Tempe merupakan sumber protein yang baik. Setiap 100 g tempe mengandung 18-20 g zat protein dan 4 g zat lemak. Tempe juga memiliki berbagai sifat unggul seperti mengandung lemak jenuh rendah, kadar vitamin B12 tinggi, mengandung antibiotik dan berpengaruh baik pada pertumbuhan badan. Selain itu asam-asam amino pada tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh jika dibandingkan dengan kacang kedelai. Vitamin B12 yang terdapat pada tempe diproduksi oleh sejenis bakteri *Klasiella pneumoniae*. Kekurangan vitamin B12 ini dapat menghambat pembentukan sel darah merah. Zat tempe memiliki hipokolesterolemia (pengurangan kolesterol darah) yaitu protein, PUFA, serat

makanan, niasin, vitamin E, karotenoid, isovlafon dan kalsium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian tempe 150gr selama 2 minggu tanpa menggunakan obat dapat menurunkan kolesterol total 8,38%, LDL 8,28% (11,1 mg / dl), trigliserida 9,19% dan meningkatkan HDL sekitar 8,74% . Penelitian lain menghasilkan 25%, 50% dan 70% tempe dalam ransum karena substitusi sebenarnya dapat menurunkan kadar kolesterol serum (Bintanah dan Erma Handasari, 2016).


#### ***D. Pembuatan Roti Rumput Laut Lawi-Lawi Subtitusi Tempe***

Tahap-tahap dalam pembuatan roti rumput laut lawi-lawi subtitusi tempe adalah sebagai berikut :

1. Pilih bahan-bahan seperti rumput laut dan tempe yang masih segar, yang tidak rusak atau bolong dan bebas dari penyakit.
2. Pencucian rumput laut dilakukan dengan menggunakan air tawar. Pembersihan dilakukan untuk mencegah penurunan mutu dan kandungan dalam rumput laut. Kemudian dihaluskan menggunakan blender dan dikeringkan dalam suhu ruang.
3. Tempe dihaluskan menggunakan blender kemudian disangrai selama 5 menit dengan api kecil.
4. Pada wadah terpisah, tepung terigu, ragi, susu bubuk, telur, gula pasir, air, garam dan margarin di campur kemudian diaduk menggunakan mixer hingga kalis.
5. Tepung terigu ditambahkan untuk membantu pengkalisian kemudian adonan roti difermentasi selama 45 menit dalam keadaan kedap udara.

6. Adonan roti kemudian ditimbang dan dibagi menjadi lima adonan.
7. Setiap adonan dicampur dengan rumput laut lawi-lawi dan tempe sesuai dengan formulasi yang ditentukan lalu difermentasi kembali selama 20 menit kemudian dipanggang dengan suhu  $150^{\circ}\text{C}$  selama 20 menit.

Adapun cara pembuatan roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe ditunjukkan pada diagram alir pembuatan di bawah ini:



Gambar 2.2 Skema Proses Pembuatan Roti Rumput Laut Substitusi Tempe

### **E. Tinjauan Umum Tentang Roti**

Roti adalah produk makanan berbahan dasar tepung terigu. Proses pengolahannya mengalami fermentasi menggunakan ragi atau bahan pengembang lain yang bertujuan untuk memperoleh tekstur yang lembut dan

empuk kemudian dipanggang (Eddy dan Lilik, 2004 dalam Nikmawatisusanti dan Asri S, 2015).

Mutu roti dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria diantaranya volume roti yang besar, warna kerak roti yang coklat kekuningan, bentuk yang simetris, tekstur kerak yang tipis dan kering, serta sifat-sifat bagian roti meliputi tekstur dan butiran. Tekstur yang baik adalah yang halus lembut dan elastis sedangkan butiran yang baik adalah butiran dengan sel yang halus, seragam yang panjang-panjang. (Koswara, 2009 dalam Yusuf dan Asri S, 2015).

Menurut Suryatna (2015: 19), untuk membuat roti agar mengembang besar maka perlu digunakan jenis tepung terigu yang berprotein tinggi. Secara prinsip metode pembuatan adonan roti dapat dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Pembuatan adonan sistem cepat (*no time dough*). Ciri dalam pembuatan adonan ini adalah pengadukan 1 kali, lama fermentasi 0 – 45 menit, dilakukan penambahan *bread improver*. *Bread improver* sebagai bahan yang membantu menahan gas membantu memodifikasi gluten dengan unsur-unsur bahan penguat dan pelembut gluten (*oxidasing agent dan reducing agent*), tanpa penambahan unsur tersebut sebagian besar adonan tidak memiliki kekuatan dan akan kehilangan sebagian besar gas yang dihasilkan dan berakibat roti akan kurang baik volumenya dan teksturnya kasar. *Bread improver* terdiri dari komponen bahan yang dapat memodifikasi gluten, makanan atau perangsang bagi yeast, bahan pelembut remah (*crumb*) dan tambahan enzim. Daya tahan roti sekitar 3 hari,

kehilangan berat yang disebabkan fermentasi lebih sedikit sehingga hasil roti lebih banyak.

2. Pembuatan adonan sistem langsung (*straight dough*). Ciri utama pembuatan adonan ini adalah pengadukan 1 kali, lama fermentasi 1-3 jam, serta hasil yang diperoleh berkualitas cukup bagus. Daya tahan roti sekitar 5 hari.
3. Pembuatan adonan sistem biang (*Sponge dough*). Ciri utama pada pembuatan adonan ini adalah pengadukan 2 kali, yaitu pengadukan pertama untuk biang (*sponge*) 60 %, dan adukan kedua untuk bahan selebihnya 40% yang kemudian dicampurkan dengan adukan biang, waktu fermentasi 3-6 jam. Kualitas hasil roti cukup bagus dan daya tahan roti sekitar 7 hari.
4. Pembuatan adonan sistem *dough break roll* (DBR). Ciri utama dalam pembuatan adonan ini adalah setelah adonan diaduk dengan mixer, kemudian dilanjutkan dengan adonan tersebut dimasukkan kedalam alat roll, adonan berulang-ulang bahkan sampai 35 kali, fermentasi 1-3 jam. Serat adonan yang dihasilkan sangat bagus.

Namun dalam penelitian ini bahan utama yang digunakan dalam pembuatan roti adalah rumput laut lawi-lawi dan tempe.

Untuk menghasilkan roti rumput laut laut lawi-lawi substitusi tempe, bahan-bahan yang diperlukan di antaranya sebagai berikut:

1. Tepung Terigu

Tepung terigu adalah hasil dari penggilingan biji gandum baik gandum keras (*hard wheat*), gandum durum (*durum wheat*) atau gandum lunak (*soft wheat*). Adapaun jenis tepung terigu ada 3 yaitu :

- a. Tepung terigu protein rendah dengan kandungan protein sebesar 8-9 %. Sifat elastisnya kurang dan mudah putus. Tepung terigu ini biasa digunakan untuk membuat *cake*, *cookies* dan kue.
- b. Tepung terigu protein sedang dengan kandungan protein sebesar 10-11 %. Terigu ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai makanan (serbaguna) dan jajanan pasar.
- c. Tepung terigu protein tinggi dengan kandungan protein lebih dari 11 %. Sifat elastisnya baik dan tidak mudah putus. Terigu ini biasanya digunakan dalam pembuatan mie dan roti (Suryatna, 2015: 20).

Khas dari tepung terigu adalah kandungan proteinnya yang tidak larut dalam air yang disebut *gluten*. Gluten menyebabkan adonan tepung terigu dapat bersifat elastis seperti karet, mampu memanjang dan menahan gas CO<sub>2</sub> hasil fermentasi ragi sehingga makanan yang terbuat dari terigu seperti mie dan roti bertekstur empuk dan akan lebih mengembang (Suryatna, 2015: 21).

## 2. Telur

Fungsi telur dalam penyelenggaraan gizi kuliner sebagai pengental, perekat atau pengikat. Peranan utama telur atau protein dalam pengolahan pada umumnya adalah memberikan fasilitas terjadinya koagulasi, pembentukan gel, emulsi dan pembentukan struktur. Telur banyak digunakan untuk mengentalkan berbagai saus dan *custard* karena protein terkoagulasi pada suhu 62°C. Berdasarkan bagian-bagian telur yaitu cangkang telur (*shell egg*) 12%, putih telur (*white egg*) 58% dan kuning telur (*yolk egg*) 30%.

Kandungan gizi dalam telur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Kandungan Gizi Telur Ayam dalam 100 gram**

<b>Komposisi Zat Gizi</b>	<b>Jumlah Zat Gizi</b>
Kalori (kal)	162
Karbohidrat (g)	0,7
Lemak (g)	11,5
Protein (g)	12,8
Kalsium (mg)	54,0
Fosfor (mg)	180
Tiamin (mg)	0,10
Besi (mg)	3,0
Vitamin A (SI)	900
Vitamin C	0

Sumber: (Direktorat Gizi, 2004 dan Putra, 2013).

Telur mempunyai nilai kegunaan protein (*net protein*) 100 dibandingkan daging ayam (80%) dan susu (75%). Putih telur terbuat dari protein yang disebut albumen. Putih telur mengandung niasin (vitamin B3), riboflavin (vitamin B2), klorin, magnesium, potasium, sodium, serta sulfur. Putih telur pada telur mengandung 57% dari total protein telur (Putra, 2013).

Walaupun bergizi tinggi, namun perlu hati-hati dalam mengonsumsi telur. Selain kandungan lemaknya cukup tinggi, telur mengandung kolesterol dalam jumlah yang lumayan banyak ketimbang bahan makanan lain. Kandungan kolesterol di dalam 100 gram telur sekitar 424 mg. Padahal kita dianjurkan mengonsumsi kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Kadar mengonsumsi telur yang baik adalah cukup sekitar 2 butir telur per minggu (Putra, 2013).

### 3. Ragi/ Yeast atau Gist

Ragi adalah bahan penting dalam pembuatan adonan roti karena berfungsi sebagai pengembang adonan. Terdapat tiga jenis roti yaitu:

a. Ragi Basah (*Compressed Yeast*)

Berbentuk bulatan kecil putih kekuningan dan beraroma khas (tajam) yang juga memengaruhi aroma roti. Namun penggunaannya tidak praktis karena harus melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

b. Ragi Kering (Instan Dry Yeast)

Hampir sama dengan ragi basah dalam hal penggunaannya yang juga membutuhkan serangkaian proses.

c. Ragi Instan (*Instan Yeast*)

Ragi siap pakai ini lebih sering digunakan karena praktis. Berbentuk halus berwarna cokelat muda dan dapat langsung dicampur dengan tepung (Tim Ide Masak, 2013: 3).

4. Susu

Roti yang berserat halus dan bertekstur empuk serta harum dapat dihasilkan dengan menambah jumlah air atau susu tawar cair dan lemak sebanyak 5 % dari ukuran resep standar. Agar menghasilkan roti yang beraroma harum, penggunaan air dalam resep bisa diganti dengan susu tawar cair karena kandungan lemaknya yang tinggi dapat memberi tekstur lebih lembut dan aroma harum (Wibowo, 2016).

5. Bahan Tambahan Lainnya

- a. Garam berfungsi memberi rasa dan memperkuat dan rasa bahan-bahan lainnya serta mengontrol fermentasi. Sebaiknya menggunakan garam yang mudah larut dan bersih.

- b. Selain memberi rasa manis, gula juga berfungsi memperpanjang umur roti, membuat tekstur roti lebih lembut dan memberi warna pada permukaan roti.
- c. Mentega berfungsi sebagai pelumas adonan. Namun terlalu banyak mentega membuat roti tidak berbentuk kekar (Sukanto, 2016).

#### ***F. Tinjauan Umum Tentang Uji Organoleptik***

Uji organoleptik atau uji sensori merupakan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Uji organoleptik yang digunakan yaitu uji hedonik (uji kesukaan) terhadap 36 orang panelis. Panelis dimintakan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya (ketidaksukaan). Tingkat-tingkat kesukaan disebut sebagai skala hedonik. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendaknya. Skala hedonik dapat juga diubah menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan data numerik ini dapat dilakukan analisis data secara parametrik (Setyaningsih dkk. 2010 dalam Lestari dan Pepi, 2015: 944).

Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Pada penelitian ini, parameter sampel yang dilakukan uji hedonik meliputi parameter warna, aroma, tekstur, kelembutan dan rasa roti secara umum.

Menurut Rahayu (1998), dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak.

Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik.

### **1. Panel Perseorangan**

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat mengenal sifat, peranan dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai dan menguasai metode-metode analisa organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini adalah kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian efisien. Panel perseorangan biasanya digunakan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan mengenali penyebabnya.

### **2. Panel Terbatas**

Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bias lebih dapat dihindari. Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir.

### **3. Panel Terlatih**

Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului dengan seleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik.

#### **4. Panel Agak Terlatih**

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Sedangkan data yang sangat menyimpang boleh tidak digunakan dalam keputusannya.

#### **5. Panel Tidak Terlatih**

Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis suku-suku bangsa, tingkat sosial dan pendidikan. Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai sifat-sifat organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan, tetapi tidak boleh digunakan dalam uji perbedaan. Panel tidak terlatih biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita.

#### **6. Panel Konsumen**

Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi. Panel ini mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu.

#### **7. Panel Anak-anak**


Panel yang khas adalah panel yang menggunakan anak-anak berusia 3-10 tahun. Biasanya anak-anak digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim dan sebagainya. Cara penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan pemberitahuan atau dengan bermain bersama, kemudian dipanggil

untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti boneka snoopy yang sedang sedih, biasa atau tertawa.

### G. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep variabel yang diteliti dalam penelitian ini

sebagai berikut:



Keterangan:



: Variabel Independen




: Variabel Dependen

Gambar 2.3 Kerangka Konsep

## H. Rancangan Penelitian

Adapun rancangan penelitian berdasarkan uji yang dilakukan pada roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe, yaitu:



Gambar 2.4 Rancangan Penelitian

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian analisis uji organoleptik dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Sementara itu analisis uji zat gizi roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa Racemosa*) substitusi tempe dilaksanakan di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis rancangan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga kali pengulangan (triplo). RAL merupakan rancangan percobaan dengan analisis statistik terhadap objek percobaan sederhana dengan jumlah penggunaan, perlakuan dan ulangan yang fleksibel yang biasanya dilaksanakan di laboratorium (Pratisto, 2005: 170).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif dengan menggunakan desain true-eksperimen, Dikatakan true-eksperimen karena mengikuti seluruh prosedur dan syarat eksperimen terutama dalam kontrol variabel, pemberian manipulasi (perlakuan) dan pengujian hasil. Semua variabel dikontrol, kecuali variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Desain

eksperimental yang sebenarnya adalah desain terkuat yang paling baik dalam mengendalikan ancaman terhadap validitas internal, sehingga menciptakan kepercayaan terbesar dalam hubungan sebab-akibat yang diamati (Cottrell dan James, 2011: 183).

Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus (variabel yang akan diuji akibatnya), sedang kelompok kontrol diberi perlakuan lain (yang biasa dilakukan) dan hasilnya dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Pengukuran/pengujian menggunakan instrumen baku (tes standar). Setelah menentukan metode yang baik, selanjutnya dilakukan formulasi atau pengkomposisian roti dengan formulasi berikut :

1. Kelompok kontrol 0:1, dimana pada formulasi ini tidak menggunakan campuran rumput laut lawi-lawi, disini cuma menggunakan tempe sebanyak 100 g.
2. Kelompok eksperimen
  - a. 1:1 pada formulasi ini menggunakan bahan dasar 50 g rumput laut lawi-lawi dan 50 g tempe.
  - b. 3:1 pada formulasi ini menggunakan 75 g rumput laut lawi-lawi dan 25 g tempe.
  - c. 1:3 pada formulasi ini menggunakan bahan dasar sebanyak 25 g rumput laut lawi-lawi dan 75 g tempe.
  - d. 1:0 dimana pada formulasi ini tidak menggunakan campuran tempe, disini cuma menggunakan rumput laut lawi-lawi sebanyak 100 g.

Model true-eksperimen yang digunakan yaitu *Posttest Only Control Group Design*. Dalam rancangan ini, memungkinkan peneliti mengukur pengaruh perlakuan (intervensi) pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. Karena tidak ada pengujian awal, desain ini sangat berguna jika ada kekhawatiran tentang kemungkinan efek pengujian (Cottrell dan James, 2011: 186).

Bentuk rancangan ini sebagai berikut:

	Perlakuan	Post test
R (Kelompok Eksperimen)	X	02
R (Kelompok Kontrol)		

Pada penelitian ini dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar total kandungan zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, kadar air dan zat besi (Fe)), serta uji mutu hedonik dan uji hedonik melalui uji organoleptik dalam roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe.

### **C. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah rumput laut dan tempe. Adapun rumput laut yang digunakan adalah rumput laut jenis *Ceulerpa*, spesies *Ceulerpa racemosa* berumur panen berumur  $\geq 20$  hari yang masih segar dan tidak rusak.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Dokumentasi, yaitu penulis mencari data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal penelitian dan sebagainya.
2. Uji Laboratorium yaitu melakukan eksperimen melalui percobaan tertentu dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di laboratorium penelitian. Pengujian laboratorium pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kadar total kandungan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak dan zat besi (Fe) dalam roti rumput laut (*Ceulera racemosa*) substitusi tempe.
3. Uji organoleptik atau uji sensori adalah penilaian yang menggunakan indera. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik menyatakan suka dan tidaknya terhadap suatu produk.

#### **E. Instrumen Penelitian**

##### **1. Instrumen yang Digunakan untuk Pembuatan Sampel**

- a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuat sampel yaitu pisau, sendok, piring, oven, timbangan digital, kompor, blender, sendok takar, cetakan, mixer.
- b. Bahan yang digunakan yaitu rumput laut lawi-lawi (*Ceulera racemosa*), tempe, tepung terigu, telur, mentega, gula pasir, susu bubuk, air hangat, ragi dan garam.

##### **2. Kadar Karbohidrat metode *Luff Scrool***

Prosedur kerja dalam penentuan kadar karbohidrat sebagai berikut :

- a. Sampel ditimbang dengan seksama kurang lebih 5 g ke dalam Erlenmeyer 500 mL.

- b. Tambahkan HCL 3 % sebanyak 200 mL.
- c. Hubungkan dengan kondensor dan didihkan selama 3 jam menggunakan pendingin tegak setelah itu dinginkan.
- d. Larutkan dengan NaOH 30 % sebanyak 15 mL, hingga pH 5,5 atau dengan lakmus.
- e. Tambahkan CH<sub>3</sub>COOH 3% hingga suasana asam
- f. Pindahkan isi karbohidrat ke labu 500 mL dan himpitkan dengan aquades kemudian homogenkan dan saring menggunakan kertas saring.
- g. Pipet 10 mL ke dalam labu erlenmeyer 300 mL, tambahkan 25 mL larutan luff, masukkan batu didih dan 15 mL aquades.
- h. Panaskan hingga mendidih, diusahakan agar larutan dapat mendidih dalam waktu 3 menit (menggunakan stopwatch) didihkan terus sampai 10 menit, dinginkan diatas air.
- i. Setelah dingin ditambahkan 15 mL KI 20%, 25 mL H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 25%, titrasi dengan tio hingga kuning muda.
- j. Teteskan amilun 1-2 tetes, titrasi kembali dengan tio secara perlahan hingga warna putih susu.
- k. Hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam rumus :

$$\text{Kadar Glukosa} = \frac{\text{Glukosa dari tabel (mg)} \times \text{fp}}{\text{Bobot sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$\text{Kadar Karbohidrat} = 0,90 \times \text{Kadar glukosa}$$

Keterangan : Fp (Faktor Pengencer) = 100

### 3. Kadar Protein metode *Kjedahl*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar protein sebagai berikut:

- a. Timbang sampel kira-kira 0,5 g lalu dimasukkan ke dalam labu kjedahl.
- b. Tambahkan 2 g selenium dan 25 mL H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat serta batu didih.
- c. Panaskan sampai mendidih hingga larutan berwarna jernih kehijauan dan uap SO<sub>2</sub> hilang.
- d. Dinginkan lalu pindahkan ke dalam labu ukur 100 mL dan encerkan sampai tandai tera.
- e. Pipet 5 mL, masukkan ke dalam labu destilasi dan tambahkan 5 mL NaOH 10% 30% dan beberapa tetes indikator PP.
- f. Sulingkan selama lebih kurang 10 menit. Destilat ditampung dalam 10 mL larutan asam borat 2%. Lakukan destilasi sampai uap destilat tidak bereaksi basa lagi (uji dengan kertas pH). Setelah selesai destilasi, bilas ujung kondensor dengan air suling.
- g. Larutan asam borat dititrasi dengan HCL standar dengan menggunakan metal merah sebagai indikator.
- h. Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$\%N = \frac{(mL \text{ contoh}) \times N \text{ HCL} \times fp \times 14}{mg \text{ bobot contoh}} \times 100\%$$

$$\% \text{ protein} = \% N \times \text{faktor koreksi}$$

Keterangan :

% N = Nitrogen

N HCL = Normalitas HCL

Fp (Faktor pengenceran) = 20

Faktor koreksi = 6,25

#### 4. Kadar Lemak metode *Gravimetri*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar lemak sebagai berikut:

a. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik, corong, gelas kimia, gelas ukur, oven, labu alas bulat dan soxhlet.

b. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah n-heksan, kertas, kapas bebas lemak dan aluminium foil.

c. Prosedur Kerja

- 1) Timbang sampel 5 g, lalu bungkus dengan kertas saring yang dialasi kapas dan dibuat selongsong.
- 2) Masukkan selongsong ke dalam alat soxhlet yang telah dihubungkan dengan labu lemak berisi batu didih dan tuang 250 mL n-heksana ke dalamnya.
- 3) Untuk proses ekstraksi, panaskan dengan hotplate selama 6 jam.
- 4) Tampung ekstrak pada labu alas bulat, kemudian sulingkan heksana dengan alat rotavapor untuk memisahkan pelarut dengan lemak.
- 5) Keringkan ekstrak lemak dalam oven selama 1 jam.
- 6) Dinginkan di desikator.
- 7) Timbang wadah lemak dan wadah tanpa lemak

d. Perhitungan:

$$\% \text{ Lemak} = \frac{B-A}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

Ket: A = Labu lemak kosong  
B = Labu lemak + Lemak  
Setelah ekstraksi

e. Ketelitian

Kisaran hasil dua kali ulangan maksimal 5% dari nilai rata-rata hasil kadar lemak. Jika kisaran lebih besar dari 5% analisis harus diulang kembali.

**5. Kadar Zat Besi (Fe) Metode Spektrofometri Serapan Atom (SSA)**

Prosedur kerja dalam penentuan zat besi yaitu: seperangkat AAS, corong, gelas piala, labu ukur 50 mL dan labu ukur 100 mL, botol semprot, gelas kimia 100 mL, pinset, pipet tetes, pipet volume 10 mL dan 5 mL, pipet skala 25 mL, 10mL, 5 mL, batang pengaduk, neraca digital, hotplate, aquades,  $\text{HNO}_3$ , kertas saring, larutan standar Fe dan sampel roti rumput laut lawi-lawi dan tempe.

a. Destruksi sampel :

- 1) Timbang sampel dengan neraca digital sebanyak 5 gram pada gelas kimia.
- 2) Kemudian tambahkan aquades sebanyak 100 mL sampai sampel terendam seluruhnya dengan aquades.
- 3) Sampel yang telah ditambah aquades tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lemari asam untuk ditambahkan  $\text{HNO}_3$  sebanyak 5 mL dengan menggunakan pipet skala lalu dipanaskan dengan hotplate sampai larutan sampel dibawah 50 mL.
- 4) Kemudian hotplate dimatikan dan didiamkan hingga dingin. Setelah sampel dingin, saring menggunakan corong dan kertas saring ke dalam labu takar 100 mL.

5) Hasil dari penyaringan tersebut kemudian diimpitkan dalam labu takar 100 mL dan sampel tersebut dapat diuji.

b. Pembuatan larutan standar :

1) Larutan I : 0,5 mL larutan baku Fe 100 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian diimpitkan dengan aquades sampai tanda garis.

2) Larutan II : 1,0 mL larutan baku Fe 100 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian diimpitkan dengan aquades sampai tanda garis.

3) Larutan III : 2,5 mL larutan baku Fe 100 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian diimpitkan dengan aquades sampai tanda garis.

4) Larutan IV : 5,0 mL larutan baku Fe 100 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian diimpitkan dengan aquades sampai tanda garis.

5) Larutan V : 10,0 mL larutan baku Fe 100 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 mL, kemudian diimpitkan dengan aquades sampai tanda garis.

c. Pembacaan larutan sampel dengan AAS :

1) Alat AAS disiapkan dengan mengatur/men-setting lampu *Hollow Cathode*, laju udara dan laju bahan bakar.

2) Memastikan lampu alat AAS telah tersambung dengan komputer yang akan digunakan untuk mencatat hasil analisis.

- 3) Larutan standar I, II, III, IV, V dan larutan sampel dianalisis dengan menggunakan AAS.
- 4) Mencatat nilai *absorbance* dari masing-masing larutan.
- 5) Membuat kurva *absorbance*-[Fe].
- 6) Mencatat konsentrasi Fe dalam sampel dengan menggunakan ekstrapolasi.

## 6. Kadar Abu

Prosedur kerja dalam penentuan kadar abu sebagai berikut :

- a. Timbang dengan seksama 2-3 gram sampel kedalam sebuah cawan proselen yang telah di ketahui bobotnya
- b. Arangkan di atas nyala pembakar, lalu abukan dalam tanur listrik pada suhu maksimal 550°C sampai pengabuan sempurna (sekali-kali pintu tanur dibuka sedikit, agar oksigen bias masuk)
- c. Dinginkan dalam eksikator, lalu timbang sampai bobot tetap.
- d. Perhitungan:  
$$\text{Kadar abu} = \frac{W_1 - W_2}{W} \times 100\%$$

Keterangan

W = Bobot contoh sebelum diabukan ,dalam gram

W1= Bobot contoh + cawan sesudah diabukan, dalam gram

W2= Bobot cawan kosong dalam gram

## 7. Kadar Air

Prosedur kerja dalam penentuan kadar air sebagai berikut :

- a. Timbang sampel sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah diketahui berat kosongnya.
- b. Oven dengan suhu  $105^{\circ}\text{C}$  selama 3 jam, lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang dan dihitung kadar airnya dihitung kadar airnya dengan rumus:

$$\text{Kadar Air} = \frac{W}{W_1} \times 100 \%$$

Keterangan :  
W = Bobot sampel sebelum dikeringkan  
W1 = Kehilangan bobot sampel setelah dikeringkan

(Badan Standarisasi Nasional, SNI 01-2891-1992 dan SNI 01-2896-1998)

### 1) Uji Organoleptik

Uji organoleptik atau uji sensori adalah penilaian yang menggunakan indera. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik menyatakan suka dan tidaknya terhadap suatu produk. Kesan mutu hedonik lebih spesifik daripada sekedar suka atau tidak suka. Mutu hedonik dapat bersifat umum yaitu baik dan buruk dan bersifat spesifik seperti empuk atau keras untuk nasi, renyah atau liat untuk mentimun (Susiswi, 2009:36).

**Tabel 3.1**  
**Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap**  
**Warna, Aroma, Tekstur Dan Rasa**

<b>Mutu Hedonik</b>							
<b>Warna</b>		<b>Aroma</b>		<b>Tekstur</b>		<b>Rasa</b>	
1	Sangat kuning kecoklatan	1	Sangat Tidak Harum	1	Sangat Tidak lembut	1	Sangat Tidak Enak
2	Kuning kecoklatan	2	Tidak Harum	2	Tidak lembut	2	Tidak Enak
3	Agak kuning kecoklatan	3	Agak Tidak Harum	3	Agak Tidak lembut	3	Agak Tidak Enak
4	Kuning	4	Biasa	4	Biasa	4	Biasa
5	Agak putih pucat	5	Agak Harum	5	Agak lembut	5	Agak Enak
6	Putih pucat	6	Harum	6	Lembut	6	Enak
7	Sangat putih pucat	7	Sangat Harum	7	Sangat lembut	7	Sangat Enak

Pada tabel 3.1, untuk skala penilai mutu hedonik terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa memiliki range skor 1-7. untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor  $<4$  dikatakan buruk, dan  $>4$  dikatakan baik.

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Penilaian Mutu Hedonik**

<b>Mutu Hedonik</b>	
<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Tidak Baik
2	Tidak Baik
3	Agak Tidak Baik
4	Biasa
5	Agak Baik
6	Baik
7	Sangat Baik

Pada tabel 3.2 penilain over All mutu hedonik, digunakan untuk melihat secara keseluruhan mutu produk yang di teliti. Memiliki range skor 1-7. untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor  $<4$  dinyatakan buruk, dan  $>4$  dinyatakan baik.

Terdapat 11 tingkatan nilai untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen dengan skor yang paling rendah adalah 1 dan skor yang paling tinggi adalah 11. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut;

**Tabel 3.3**  
**Labeled Affective Magnitude Scale**  
**(LAM)/ Tingkat Penerimaan Konsumen**

<b>Hedonik</b>	
1	Sangat-Sangat Tidak Suka Sekali
2	Sangat-Sangat Tidak Suka
3	Sangat Tidak Suka
4	Tidak Suka
5	Agak Tidak Suka
6	Biasa
7	Agak Suka
8	Suka
9	Sangat Suka
10	Sangat Sangat Suka
11	Sangat-Sangat Suka Sekali

(Sumber: Stone dkk, 2012: 107).

*Labeled Affective Magnitude Scale* (LAM) atau Skala Tingkat Afektif Berlabel adalah salah satu skala baru yang dikembangkan yang secara afektif mengukur rasa menyukai produk atau ransangan. Pengembangan skala menggunakan skala estimasi magnitudo dengan istilah ekstrim untuk peringkat tertinggi dan terendah yang diberi label/nama kategori diluar label kategori standar skala hedonik 9 kategori (kategori skala hedonik sebelumnya). Reliabilitas dan validitas skala diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa skala LAM dapat digunakan, dibedakan dengan baik dan lebih baik dari skala yang lain karena sangat berkorelasi dengan skala hedonis dan mudah digunakan. Sebagai skala rasio, skala LAM memenuhi asumsi kesimpulan analisis statistik dan memungkinkan pernyataan tipe rasio mengenai hasil (misalnya satu produk dapat dikatakan dua kali lebih besar dari unit skala) (Stone dkk, 2012: 106).

Untuk penilaian kesukaan atau analisis sifat sensoris suatu komoditi diperlukan alat instrumen, alat yang digunakan terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panel, orang yang bertugas sebagai panel disebut panelis.

a. Panelis

Kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak membedakan jenis kelamin.
- 2) Sehat (tidak sakit).
- 3) Tidak buta warna.
- 4) Tidak dalam keadaan lapar (pukul 09.00-11.00 WITA).

b. Pelaksanaan penilaian

- 1) Waktu dan tempat

Dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar.

- 2) Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulera racemosa*) substitusi tempe dengan lima perlakuan berbeda. Sedangkan alat yang digunakan adalah formulir penilaian dan alat tulis.

c. Langkah-langkah pada uji daya terima

- 1) Mempersilahkan panelis untuk duduk di ruangan yang telah disediakan.
- 2) Membagikan sampel dengan kode sesuai variasi, formulir penilaian dan alat tulis.
- 3) Menjelaskan secara singkat kepada panelis terkait cara pengisian formulir.

- 4) Memberikan kesempatan kepada panelis untuk mengisi fomulir penilaian.
- 5) Mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh panelis.

#### d. Analisis Data

Untuk mengetahui daya terima dari panelis dilakukan analisis deskriptif kualitatif persentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari panelis harus dianalisis dahulu untuk dijadikan data kuantitatif yang diolah menggunakan SPSS. Skor nilai untuk mendapatkan persentase dilakukan berdasarkan kriteria penilaian tiap uji hedonik. Skor nilai untuk mendapatkan persentase dirumuskan sebagai berikut (Ali, 1993:86) :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Ket : % = Skor persentase  
 n = Jumlah skor yang diperoleh  
 N = Skor ideal (skor tertinggi x jumlah panelis)

Untuk mengubah data skor persentase menjadi nilai kesukaan konsumen, analisisnya sama dengan analisis dengan analisis kualitatif dengan nilai yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Nilai tertinggi = 11 (sangat suka)

Nilai terendah = 1 (tidak suka)

Jumlah kriteria yang ditentukan = 11 kriteria

Jumlah panelis = 5 orang

1) Skor maximum = Jumlah panelis x nilai tertinggi = 5 x 11 = 55

2) Skor minimum = Jumlah panelis x nilai terendah = 5 x 1 = 5

3) Persentase max. = (Skor Max)/(Skor Max) x 100%  
 = (55)/(55) x 100% = 100%

4) Persentase min. = (Skor Min)/(Skor Max) x 100%  
 = (5)/(55) x 100% = 9%

5) Rentangan = Persentase max–Persentase min

$$= 100\% - 9\% = 91\%$$

$$\begin{aligned} 6) \text{ Interval presentase} &= \text{Rentangan} : \text{Jumlah kriteria} \\ &= 91 : 11 = 8,27\% = 8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat dibuat interval persentase dan kriteria kesukaan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Interval Persentase dan Kriteria Kesukaan**

Persentase	Kriteria Kesukaan
92-100	Sangat-sangat suka sekali
83-91	Sangat-sangat suka
74-82	Sangat suka
65-73	Suka
56-64	Agak suka
47-55	Biasa
38-46	Agak tidak suka
29-37	Tidak suka
20-28	Sangat tidak suka
11-19	Sangat-sangat tidak suka
2-10	Sangat-sangat tidak suka sekali

## F. *Validasi dan Reliabilitasi Instrumen*

### 1. Validasi

Validitas adalah ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas merupakan suatu keadaan apabila suatu instrumen evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur secara tepat. Dalam penelitian ini, alat-alat yang digunakan dalam serangkaian uji coba analisis kandungan zat gizi merupakan peralatan yang sesuai standar menggunakan metode sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan pengukur dalam penelitian ini merupakan orang yang telah ahli dalam melakukan analisis kandungan zat gizi.

## **2. Reliabilitas**

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan tingkat konsisten dan stabilitas dari data berupa skor hasil persepsi suatu variabel dan tidak rentan terhadap perubahan situasi apapun (Sunyoto dan Ari, 2013: 54)

Dalam penelitian ini, reliabilitas yang dimaksud adalah satu sampel dianalisis atau diuji beberapa kali (3 kali ulangan) untuk meningkatkan dan mengevaluasi ketepatan dan ketelitian analisis tersebut. Dari beberapa ulangan yang dilakukan akan dihasilkan sekumpulan data yang belum dapat diketahui data yang paling mendekati nilai sebenarnya. Oleh karena itu biasanya dilakukan perhitungan nilai rata-rata (mean/average) dari keseluruhan data inilah yang dilaporkan sebagai data hasil analisis.

### ***G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang telah diperoleh dari penelusuran menggunakan dokumentasi dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium akan diolah dan disajikan secara sistematis, sejalan dengan rumusan masalah yang selanjutnya akan dilakukan analisis kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait. Dalam memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data, penulis menggunakan komputerisasi dengan menggunakan program SPSS atau Microsoft Excel, selanjutnya data yang telah di analisis disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan mengecek secara berulang-ulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber termasuk dari hasil uji laboratorium dan dokumentasi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian uji organoleptik berupa uji mutu hedonik dilakukan di Laboratorium PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan 36 panelis terlatih dan semi terlatih dengan beberapa parameter dan kriteria penilaian. Adapun analisis kandungan zat gizi roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dilaksanakan di Balai Besar Hasil Industri Perkebunan yang menerapkan SNI 01-2891-1992 dalam prosedur kerjanya. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Agustus tahun 2018, yang bertujuan untuk mengetahui kandungan daya terima dan zat gizi roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Karbohidrat Dalam 100 Gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa Racemosa*) Substitusi Tempe Tahun 2018**

Percobaan	Karbohidrat (%)				
	Formulasi				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
I	48,87	55,29	54,33	56,06	53,95
II	48,96	55,36	54,32	56,15	54,02
III	49,05	55,46	54,34	56,10	54,01
<b>Rata-rata</b>	<b>48,96</b>	<b>55,37</b>	<b>54,33</b>	<b>56,10</b>	<b>53,99</b>

Sumber : Data Primer, 2018

Data tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe kadar karbohidrat tertinggi pada perlakuan 25:75 sebanyak 56,10%, selanjutnya pada perlakuan 75:25 sebanyak 55,37% kemudian

perlakuan 50:50 sebanyak 54,33% dan 0:100 sebanyak 53,99% sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 100:0 sebanyak 48,96%.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Protein Dalam 100 Gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe Tahun 2018**

Percobaan	Protein (%)				
	Formulasi				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
<b>I</b>	8,22	8,73	10,25	11,39	9,96
<b>II</b>	8,25	8,81	10,32	11,47	9,92
<b>III</b>	8,27	8,76	10,27	11,40	9,95
<b>Rata-rata</b>	<b>8,25</b>	<b>8,77</b>	<b>10,28</b>	<b>11,42</b>	<b>9,94</b>

Sumber : Data Primer, 2018

Data tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe kadar protein tertinggi pada perlakuan 25:75 sebanyak 11,42%, selanjutnya pada perlakuan 50:50 sebanyak 10,28%, kemudian pada perlakuan 0:100 sebanyak 9,94 dan perlakuan 75:25 sebanyak 8,77%, sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 100:0 sebanyak 8,25%.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Lemak Dalam 100 Gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe Tahun 2018**

Percobaan	Lemak (%)				
	Formulasi				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
<b>I</b>	7,69	7,59	8,89	7,82	8,80
<b>II</b>	7,73	7,63	8,80	8,09	8,87
<b>III</b>	7,71	7,60	8,74	7,90	8,70
<b>Rata-rata</b>	<b>7,71</b>	<b>7,61</b>	<b>8,81</b>	<b>7,93</b>	<b>8,79</b>

Sumber : Data Primer, 2018

Data tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe kadar lemak tertinggi pada perlakuan 50:50 sebanyak 8,81%, selanjutnya pada perlakuan 0:100 sebanyak 8,79% kemudian pada

perlakuan 25:75 sebanyak 7,93% dan perlakuan 100:0 sebanyak 7,71%, sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 75:25 sebanyak 7,61%.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Zat Besi (Fe) Dalam 100 Gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe Tahun 2018**

Sampel	Zat Besi (mg/kg)				
	Formulasi				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
<b>Percobaan 1</b>	18,2211	17,0961	20,9190	16,7176	10,8117
<b>Percobaan 2</b>	18,2164	17,0825	20,9716	16,7316	10,8531
<b>Percobaan 3</b>	18,2608	17,3355	20,8367	16,9740	10,7855
<b>Rata-rata</b>	<b>18,23277</b>	<b>17,17137</b>	<b>20,9091</b>	<b>16,80773</b>	<b>10,81677</b>

Sumber : Data Primer, 2018

Data tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe kadar zat besi tertinggi pada perlakuan 50:50 sebanyak 20,9091 mg/kg, selanjutnya pada perlakuan 100:0 sebanyak 18,23277 mg/kg kemudian pada perlakuan 75:25 sebanyak 17,17137 mg/kg dan perlakuan 25:75 sebanyak 16,80773 mg/kg, sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 0:100 sebanyak 10,81677 mg/kg.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Kadar Air Dalam 100 Gram Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe Tahun 2018**

Percobaan	Kadar Air (%)				
	Formulasi				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
<b>I</b>	21,15	20,77	22,13	23,52	25,70
<b>II</b>	21,15	20,68	21,21	23,48	25,05
<b>III</b>	21,12	20,78	21,00	22,79	24,72
<b>Rata-rata</b>	<b>21,14</b>	<b>20,74</b>	<b>21,45</b>	<b>23,26</b>	<b>25,16</b>

Sumber : Data Primer, 2018

Data tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe kadar air tertinggi pada perlakuan 0:100 sebanyak

25,16%, selanjutnya pada perlakuan 25:75 sebanyak 23,26%, perlakuan 50:50 sebanyak 21,45% dan perlakuan 100:0 sebanyak 21,14% sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 75:25 sebanyak 20,74%.

**Tabel 4.6**  
**Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap**  
**Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa**

Mutu Hedonik							
Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
<b>1</b>	Sangat kuning kecoklatan	1	Sangat tidak harum	1	Sangat tidak lembut	1	Sangat Tidak Enak
<b>2</b>	Kuning kecoklatan	2	Tidak harum	2	Tidak lembut	2	Tidak Enak
<b>3</b>	Agak kuning kecoklatan	3	Agak tidak harum	3	Agak tidak lembut	3	Agak Tidak Enak
<b>4</b>	Kuning	4	Biasa	4	Lembut Biasa	4	Biasa
<b>5</b>	Agak putih pucat	5	Agak harum	5	Agak lembut	5	Agak Enak
<b>6</b>	Putih pucat	6	Harum	6	Lembut	6	Enak
<b>7</b>	Sangat putih pucat	7	Sangat harum	7	Sangat lembut	7	Sangat Enak

Pada tabel 4.6, untuk skala penilai mutu hedonik terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa memiliki range skor 1-7. untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor <4 dikatakan buruk, dan >4 dikatakan baik.

**Tabel 4.7**  
**Uji Mutu Hedonik (Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa) dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe Tahun 2018**

F	Warna			Aroma			Tekstur			Rasa		
	M	K	Sig.	M	K	Sig.	M	K	Sig.	M	K	Sig.
100:0	4.9	Kuning	.000	4.2	Harum biasa	.156	3.4	Agak tidak lembut	.129	4.2	Enak biasa	.000
75:25	4.1	Kuning		4.5	Harum biasa		3.4	Agak tidak lembut		4.6	Enak biasa	
50:50	4.0	Kuning		4.0	Harum biasa		3.6	Agak tidak lembut		5.0	Agak Enak	
25:75	3.5	Agak kuning kecoklatan		4.6	Harum biasa		4.3	Lembut biasa		5.3	Agak Enak	
0:100	3.0	Agak kuning kecoklatan		4.2	Harum biasa		4.0	Lembut biasa		4.4	Enak biasa	

Sumber: Data primer, 2018

Keterangan : M : Mean (Skor rata-rata)

K : Kategori

F : Formulasi

Skor <4 : Kurang baik

Skor >4 : Baik

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa mutu hedonik yang baik dengan skor >4 dalam roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe terdapat pada formulasi 100:0 yaitu 4,9 dengan kriteria warna kuning, pada aroma terdapat pada formulasi 25:75 yaitu 4,6 dengan kriteria harum biasa, pada tekstur terdapat pada formulasi 25:75 yaitu 4,3 dengan kriteria lembut biasa, dan pada rasa terdapat pada formulasi 25:75 yaitu 5,3 dengan kriteria enak biasa.

**Tabel 4.8**  
**Distrtribusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Warna dalam Roti Rumput**  
**Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Kategori	Formulasi									
	100:0		75:25		50:50		25:75		0:100	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sangat kuning kecoklatan</b>	1	2.8	1	2.8	3	8.3	2	5.6	4	11.1
<b>Kuning kecoklatan</b>	3	8.3	6	16.7	3	8.3	3	8.3	14	38.9
<b>Agak kuning kecoklatan</b>	2	5.6	7	19.4	11	30.6	15	41.7	6	16.7
<b>Kuning</b>	3	8.3	4	11.1	2	5.6	9	25.0	5	13.9
<b>Agak putih pucat</b>	17	47.2	11	30.6	9	25.0	6	16.7	6	16.7
<b>Putih pucat</b>	5	13.9	7	19.4	8	22.2	0	0	0	0
<b>Sangat putih pucat</b>	5	13.9	0	0	0	0	1	2.8	1	2.8
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100.0</b>								

*Sumber: Data primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi uji mutu hedonik warna dalam roti rumput laut (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan persentase tertinggi yakni pada formulasi 100:0 sebesar 47.2% dengan kategori warna agak putih pucat. Pada formulasi 75:25 sebesar 30.6% dengan kategori warna agak putih pucat. Pada formulasi 50:50 sebesar 30.6% dengan kategori warna agak kuning kecoklatan sedangkan pada formulasi 25:75 sebesar 25% dengan kategori warna kuning dan pada formulasi 0:100 sebesar 38,9% dengan kategori warna kuning kecoklatan.

**Tabel 4.9**  
**Distrtibusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Aroma dalam Roti Rumput**  
**Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Kategori	Formulasi									
	100:0		75:25		50:50		25:75		0:100	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sangat tidak harum</b>	3	8.3	0	0	2	5.6	0	0	2	5.6
<b>Tidak harum</b>	4	11.1	3	8.3	6	16.7	3	8.3	5	13.9
<b>Agak tidak harum</b>	4	11.1	4	11.1	4	11.1	5	13.9	5	13.9
<b>Harum Biasa</b>	6	16.7	9	25.0	11	30.6	6	16.7	8	22.2
<b>Agak harum</b>	12	33.3	13	36.1	8	22.2	12	33.3	5	13.9
<b>Harum</b>	6	16.7	5	13.9	5	13.9	8	22.2	9	25.0
<b>Sangat harum</b>	1	2.8	2	5.6	0	0	2	5.6	2	5.6
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100.0</b>								

*Sumber: Data primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi uji mutu hedonik aroma dalam roti rumput laut (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan persentase tertinggi yakni pada formulasi 100:0 sebesar 33.3% dengan kategori aroma agak harum. Pada formulasi 75:25 sebesar 36.1% dengan kategori aroma agak harum. Pada formulasi 50:50 sebesar 30.6% dengan kategori aroma harum biasa sedangkan pada formulasi 25:75 sebesar 33.3% dengan kategori aroma agak harum dan pada formulasi 0:100 sebesar 25% dengan kategori harum.

**Tabel 4.10**  
**Distrtibusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Tekstur dalam Roti Rumput**  
**Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Kategori	Formulasi									
	100:0		75:25		50:50		25:75		0:100	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sangat tidak lembut</b>	6	16.7	3	8.3	4	11.1	0	0	3	8.3
<b>Tidak lembut</b>	7	19.4	10	27.8	6	16.7	5	13.9	5	13.9
<b>Agak tidak lembut</b>	5	13.9	9	25.0	5	13.9	9	25.0	7	19.4
<b>Lembut Biasa</b>	7	19.4	1	2.8	11	30.6	5	13.9	8	22.2
<b>Agak lembut</b>	8	22.2	10	27.8	8	22.2	7	19.4	4	11.1
<b>Lembut</b>	2	5.6	3	8.3	1	2.8	9	25.0	6	16.7
<b>Sangat lembut</b>	1	2.8	0	0	1	2.8	1	2.8	3	8.3
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100.0</b>								

*Sumber: Data primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi uji mutu hedonik tekstur dalam roti rumput laut (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan persentase tertinggi yakni pada formulasi 100:0 sebesar 22.2% dengan kategori tekstur agak lembut. Pada formulasi 75:25 sebesar 27.8% dengan kategori tekstur tidak lembut dan agak lembut . Pada formulasi 50:50 sebesar 30.6% dengan kategori tekstur lembut biasa sedangkan pada formulasi 25:75 sebesar 25% dengan kategori tekstur agak tidak lembut dan lembut. Pada formulasi 0:100 sebesar 22.2% dengan kategori tekstur lembut biasa.

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Frekuensi Uji Mutu Hedonik Rasa dalam Roti Rumput**  
**Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Kategori	Formulasi									
	100:0		75:25		50:50		25:75		0:100	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sangat tidak enak</b>	0	0	1	2.8	0	0	0	0	3	8.3
<b>Tidak enak</b>	6	16.7	1	2.8	1	2.8	2	5.6	2	5.6
<b>Agak tidak enak</b>	4	11.1	2	5.6	3	8.3	2	5.6	5	13.9
<b>Biasa</b>	10	27.8	13	36.1	7	19.4	2	5.6	11	30.6
<b>Agak enak</b>	9	25.0	11	30.6	12	33.3	12	33.3	3	8.3
<b>Enak</b>	6	16.7	8	22.2	11	30.6	15	41.7	6	16.7
<b>Sangat enak</b>	1	2.8	0	0	2	5.6	3	8.3	6	16.7
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100.0</b>								

*Sumber: Data primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi uji mutu hedonik rasa dalam roti rumput laut (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan persentase tertinggi yakni pada formulasi 100:0 sebesar 27.8% dengan kategori enak biasa. Pada formulasi 75:25 sebesar 36.1% dengan kategori enak biasa. Pada formulasi 50:50 sebesar 33.3% dengan kategori agak enak sedangkan pada formulasi 25:75 sebesar 33.3% dengan kategori agak enak dan pada formulasi 0:100 sebesar 30.6% dengan kategori enak biasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Frekuensi Uji *Over All* Mutu Hedonik dalam Roti Rumput**  
**Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Kategori	Formulasi									
	100:0		75:25		50:50		25:75		0:100	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
Sangat tidak baik	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6
Tidak baik	5	13.9	0	0	0	0	1	2.8	0	0
Agak tidak baik	8	22.2	5	13.9	1	2.8	2	5.6	10	27.8
Biasa	9	25.0	5	13.9	12	33.3	9	25.0	8	22.2
Agak baik	4	11.1	14	38.9	9	25.0	5	13.9	4	11.1
Baik	8	22.2	11	30.6	9	25.0	16	44.4	7	19.4
Sangat baik	2	5.6	1	2.8	5	13.9	3	8.3	5	13.9
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100.0</b>								

Sumber: Data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi uji *over all* mutu hedonik dalam roti rumput laut (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan persentase tertinggi yakni pada formulasi 100:0 sebesar 25% dengan kategori biasa. Pada formulasi 75:25 sebesar 38.9% dengan kategori agak baik. Pada formulasi 50:50 sebesar 25% dengan kategori agak baik dan baik sedangkan pada formulasi 25:75 sebesar 44.4% dengan kategori baik dan pada formulasi 0:100 sebesar 27.8% dengan kategori agak tidak baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**Tabel 4.13**  
**Uji *Over All* Mutu Hedonik dalam Roti Rumput Laut**  
**Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Formulasi	N	Mean	Kriteria	Sig.
100:0	36	4.2	Biasa	.000
75:25	36	5.0	Agak baik	
50:50	36	5.1	Agak baik	
25:75	36	5.2	Agak baik	
0:100	36	4.5	Biasa	

Sumber: Data primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa uji *over all* mutu hedonik roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan skor  $>4$  dan kriteria agak baik terdapat pada semua sampel dengan nilai yang berbeda-beda antara lain formulasi 25:75 sebagai formulasi yang memiliki nilai tertinggi yaitu 5,2 selanjutnya formulasi 50:50 memiliki nilai 5,1 kemudian formulasi 0:100 dengan nilai 4,5 selanjutnya formulasi 75:25 dengan nilai 5,0 dan formulasi 100:0 dengan nilai 4,2. Berdasarkan uji friedman diperoleh nilai Sig. 0.00 berarti  $P < 0,05$ .

**Tabel 4.14**  
**Uji Hedonik dalam dalam Roti Rumput Laut Lawi-Lawi**  
**(Ceulerpa racemosa) Substitusi Tempe**  
**Tahun 2018**

Hedonik	Formula															sig	
	100:0			75:25			50:50			25:75			0:100				
	P	S	%	P	S	%	P	S	%	P	S	%	P	S	%		
Sangat-sangat tidak suka sekali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.021
Sangat-sangat tidak suka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sangat tidak suka	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tidak suka	7	28	1,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agak tidak suka	7	35	2,02	8	40	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biasa	3	18	0,76	5	30	1,26	19	114	4,80	22	132	5,56	18	108	4,55	0	
Agak suka	8	56	2,02	12	84	3,03	6	42	1,52	5	35	1,26	9	63	2,27	0	
Suka	6	48	1,52	7	56	1,77	4	32	1,01	5	40	1,26	4	32	1,01	0	
Sangat suka	4	36	1,01	3	27	0,76	3	27	0,76	2	18	0,51	5	45	1,26	0	
Sangat-sangat suka	0	0	0	1	10	0,25	1	10	0,25	3	30	0,76	1	10	0,25	0	
Sangat sangat suka sekali	0	0	0	0	0	0	4	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>224</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>247</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>225</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>225</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa total skor tertinggi dalam roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe terdapat pada formulasi 0:100 dengan total skor 258 dengan kriteria sangat sangat suka, kemudian formulasi 75:25 dengan skor 247, lalu formulasi 50:50 dan 25:75 dengan total skor 225 dengan kriteria sangat sangat suka dan terakhir formulasi 100:0 dengan skor 224. Berdasarkan uji friedman diperoleh nilai Sig 0.021 berarti  $P < 0,05$ .

## **B. Pembahasan**

### **1. Zat Gizi Roti Rumput Laut (*Ceulepa racemosa*) Substitusi Tempe.**

#### a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan polimer alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan sumber kalori utama bagi tubuh karena 80% dari kalori yang diperlukan tubuh manusia berasal dari karbohidrat. Karbohidrat memberikan asupan 60-75% dari jumlah energi total. Setiap 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Berdasarkan hasil analisis karbohidrat dari beberapa sampel roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulepa racemosa*) substitusi tempe menunjukkan bahwa kadar karbohidrat tertinggi pada perlakuan 25:75 sebanyak 56,10%, selanjutnya pada perlakuan 75:25 sebanyak 55,37% kemudian perlakuan 50:50 sebanyak 54,33% dan 0:100 sebanyak 53,99% sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 100:0 sebanyak 48,96%.

Kandungan karbohidrat yang tergolong tinggi dari ke-lima formulasi roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe yaitu mencapai  $\pm 50\%$  disebabkan karena sebagian besar bahan-bahan pembuatannya tinggi akan kandungan karbohidrat di antaranya rumput laut lawi-lawi yang memiliki kandungan karbohidrat sebesar 39-50 gram dalam 100 gramnya, tempe sebesar 9,39 gram karbohidrat dalam 100 gramnya, tepung terigu 72 gram dalam 100 gramnya, susu bubuk 40 gram dalam 100 gramnya, telur 0,7 gram dalam 100 gramnya, dan 99 gram gula pasir dalam 100 gramnya.

Menurut penelitian Sundari dkk (2015: 236), faktor pengolahan juga sangat berpengaruh terhadap kandungan karbohidrat pada makanan. Pemasakan

karbohidrat diperlukan untuk mendapatkan daya cerna pati yang tepat. Bila pati dipanaskan terlalu lama, granula-granula pati membengkak dan pecah sehingga pati tergalatinisasi. Dalam hal ini polimer pati akan terhidrolisis dan pecah sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan karbohidrat.

Menurut penelitian Shabrina (2017: 49), proses fermentasi juga berpengaruh pada kadar pati roti. Berkurangnya kadar pati tersebut diakibatkan pada proses saat fermentasi terjadi perombakan pati menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Terigu juga mengandung enzim amilase dan gula. Enzim amilase ini dapat menghidrolisa pati menjadi gula-gula sederhana yang dapat digunakan oleh ragi. Gula dalam terigu dapat jumlah sedikit tetapi dapat langsung digunakan oleh ragi untuk pertumbuhannya selama proses fermentasi adonan.

Karbohidrat pada rumput laut lawi-lawi merupakan karbohidrat kompleks berupa *insoluble dietary fiber* (serat makanan tak larut air) tinggi yang mengandung selulosa dan hemiselulosa yang bermanfaat dalam pencegahan konstipasi, hemoroid dan colitis (Venugopal, 2010 dalam Mukarramah dkk, 2017: 51). Tepung adalah bentuk lain dari karbohidrat kompleks yang terdapat pada roti dan merupakan sumber makanan utama karbohidrat yang dicerna tubuh dan diubah menjadi glukosa darah.

Karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan dengan kedelai disebabkan karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe yang berfungsi untuk mengubah senyawa makro molekul kompleks yang terdapat pada kedelai menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti monosakarida

Adapun hasil uji kandungan karbohidrat pada ke-lima formulasi yang tidak berbeda jauh namun berfluktuatif disebabkan karena gabungan dari karbohidrat kompleks yang ada pada rumput laut lawi-lawi dan karbohidrat sederhana yang ada pada tempe dengan komposisi yang berbeda menghasilkan kandungan karbohidrat total pada roti yang berbeda-beda pula pada setiap formulasinya.

Angka kecukupan gizi khususnya karbohidrat bagi orang Indonesia untuk rentan umur 0-5 tahun sebesar 58-220 gram per hari (Badan POM RI, 2014: 5-6). Anak memiliki resiko terkena gizi kurang karena pada usia ini anak tumbuh dan berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan zat gizi yang lebih banyak, salah satu zat gizi yang mereka perlukan adalah karbohidrat yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi utama bagi tubuh dan menunjang aktivitas anak yang sebagian besar memiliki pergerakan yang lebih aktif.

Menurut Diniyyah dan Triska (2017: 343), ketidakseimbangan tingkat konsumsi zat gizi makro seperti energi, karbohidrat lemak dan protein terhadap kebutuhan tubuh secara berkepanjangan dapat memengaruhi terjadinya perubahan pada jaringan dan massa tubuh yang akan berdampak pada penurunan berat badan (berat badan kurang).

#### b. Protein

Protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein dalam bahan makanan yang dikonsumsi manusia akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino (Sundari, dkk 2015: 237). Protein memberikan asupan 10-15% dari jumlah energi total. Setiap 1 gram protein mengandung 4 kalori. Selain digunakan sebagai pengatur,

protein dalam tubuh juga digunakan sebagai sumber energi ketika energi yang diperlukan oleh tubuh tidak terpenuhi (Beck, 2011: 23).

Berdasarkan data hasil analisis protein dari beberapa sampel roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulepa racemosa*) substitusi tempe kadar protein tertinggi pada perlakuan 25:75 sebanyak 11,42%, selanjutnya pada perlakuan 50:50 sebanyak 10,28%, kemudian pada perlakuan 0:100 sebanyak 9,94 dan perlakuan 75:25 sebanyak 8,77%, sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 100:0 sebanyak 8,25%.

Kandungan protein dari roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe yaitu berasal dari bahan-bahan diantaranya rumput laut lawi-lawi yang memiliki kandungan protein sebesar 17-27 gram dalam 100 gramnya, tempe sebesar 20,8 gram protein dalam 100 gramnya, tepung terigu 13 gram dalam 100 gramnya, susu bubuk 24 gram dalam 100 gramnya dan telur 12,8 gram dalam 100 gramnya.

Sebenarnya kualitas protein dari golongan nabati masih tergolong rendah dibandingkan protein hewani, namun kombinasi sumber nabati yang bervariasi mampu memberikan efek komplementari asam amino esensial (Winarno, 2002 dalam Estiningtyas, 2014: 9). Beberapa jenis protein mengandung semua macam asam amino esensial, namun masing-masing dalam jumlah terbatas yang cukup untuk perbaikan tubuh tapi tidak cukup untuk pertumbuhan. Asam amino yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk pertumbuhan dinamakan asam amino pembatas yang bila terdapat secara bersamaan dalam makanan sehari-hari, beberapa jenis protein tersebut dapat mengisi kebutuhan asam amino esensial.

Hal ini sesuai dengan perpaduan antara rumput laut lawi-lawi dan tempe yang keduanya memiliki asam amino pembatas, yaitu rumput laut lawi-lawi memiliki asam amino pembatas lisin yang dapat dilengkapi dengan tempe yang memiliki asam amino pembatas berupa metionin.

Adapun hasil uji kandungan protein pada ke-lima formulasi terlihat mengalami kenaikan dari formulasi 100:0 sampai 25:75 hal ini disebabkan karena kandungan protein pada tempe yang lebih tinggi dibandingkan rumput laut lawi-lawi. Namun pada formulasi 0:100 kandungan proteinnya mengalami penurunan karena kandungan protein pada tempe tidak dilengkapi dengan rumput laut lawi-lawi.

Angka kecukupan gizi khususnya protein bagi orang Indonesia untuk rentan umur 0-5 tahun sebesar 12-35 gram per hari (Badan POM RI, 2014: 5-6). Menurut Diniyyah dan Triska (2017: 343), asupan energi dan protein yang rendah berdampak pada meningkatnya resiko masalah gizi seperti kekurangan energi kronis dan kekurangan energi protein. Pada balita dapat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya.

#### c. Lemak

Kandungan lemak dalam makanan memiliki peranan yang penting bagi tubuh sebagai sumber tenaga. Bahkan jika dibandingkan dengan makronutrien lain seperti protein dan karbohidrat, lemak dapat menghasilkan energi yang lebih besar, yaitu dari 9 kkal dalam 1 gram lemak dibandingkan dengan protein yang hanya 4 kkal di setiap gramnya. Kebutuhan lemak pada orang dewasa sekitar 30% dari total kalori.

Berdasarkan hasil analisis lemak dari beberapa sampel roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulepa racemosa*) substitusi tempe kadar lemak tertinggi pada perlakuan 50:50 sebanyak 8,81%, selanjutnya pada perlakuan 0:100 sebanyak 8,87% kemudian pada perlakuan 25:75 sebanyak 7,93% dan perlakuan 100:0 sebanyak 7,71%, sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 75:25 sebanyak 7,61%.

Kandungan lemak dari roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe yaitu berasal dari bahan-bahan diantaranya rumput laut lawi-lawi yang memiliki kandungan lemak sebesar 0,08 – 1,9 gram dalam 100 gramnya, tempe sebesar 8,8 gram lemak dalam 100 gramnya, tepung terigu 1 gram dalam 100 gramnya, susu bubuk 28 gram dalam 100 gramnya dan telur 11,5 gram dalam 100 gramnya.

Asam lemak yang dominan dalam rumput laut lawi-lawi adalah asam palmitat. Umumnya, rumput laut hijau memiliki asam lemak tinggi sebagai penanda taksonomi yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Asam lemak tak jenuh tunggal yang dominan adalah asam oleat dan asam lemak tak jenuh ganda dominan adalah asam linoleat. Beberapa  $\omega$ -3 dan  $\omega$ -6 diidentifikasi dari kering, semi-kering, dan segar *C. racemosa*.  $\omega$ -3 memiliki beberapa fungsi untuk kesehatan termasuk sebagai dan mencegah penyakit kardiovaskular. Penelitian Polat dan Ozogul (2013), melaporkan bahwa beberapa rumput laut memiliki kandungan lemak rendah tetapi tinggi di PUFA. Proses pengeringan rumput laut menunjukkan beberapa perbedaan dalam komposisi asam lemak. Selama pengeringan beberapa mekanisme yang terjadi termasuk penurunan kadar air, oksidasi lipid, difusi dan pertukaran, dapat mempengaruhi perbedaan dalam

komposisi asam lemak. Asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap (tak jenuh) atau polyunsaturated fatty acids (PUFA) menyebabkan minyak sangat rentan terhadap oksidasi sehingga menyebabkan ikatan rangkap dapat terputus. Proses oksidasi dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: udara, cahaya, enzim atau logam (Cu, Fe). Khusus untuk lemak tak jenuh ganda, nutrisi ini bisa diperoleh dari sumber-sumber makanan dengan kandungan omega-6 dan omega-3, sedangkan untuk lemak tak jenuh tunggal dapat diperoleh dengan mengonsumsi sumber makanan berkandungan omega-9 dan keduanya ada pada rumput laut lawi-lawi (Sanjaya, 2016: 429-430).

Sedangkan proses fermentasi pada tempe meningkatkan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Akibat proses ini, asam lemak tidak jenuh majemuk pada tempe meningkat jumlahnya. Asam lemak tidak jenuh ini mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum, sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh (Badan Standarisasi Nasional, 2012: 4).

Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Contoh: Tristearin (ester gliserol dengan tiga molekul asam stearat) mempunyai titik lebur 71 °C, sedangkan triolein (ester gliserol dengan tiga molekul asam oleat) mempunyai titik lebur -17 °C.

Adapun hasil uji kandungan lemak pada ke-lima formulasi yang tidak berbeda jauh namun berfluktuatif disebabkan karena perbedaan jenis asam lemak pada rumput laut lawi-lawi dan tempe serta perbedaan titik leburnya.

Proses fermentasi juga memengaruhi kandungan kadar lemak roti. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yang dipakai dalam proses fermentasi yang terdapat pada ragi yaitu *Saccharomyces cerevisiae* bersifat lipolitik yang dapat menghidrolisis lemak dan menggunakan lemak dari substrat sebagai sumber energinya (Mahadi dkk, 2016: 5).

Angka kecukupan gizi khususnya lemak bagi orang Indonesia untuk rentan umur 0-5 tahun sebesar 35-62 gram per hari (Badan POM RI, 2014: 5-6). Menurut Diniyyah dan Triska (2017: 343), asupan lemak yang rendah juga menyebabkan terjadinya penurunan massa tubuh dan gangguan pada penyerapan vitamin larut lemak.

Konsumsi lemak sebanyak 15-30 % dari kebutuhan energi total merupakan hal yang baik untuk kesehatan. Jumlah ini telah memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin yang hanya larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari-hari dianjurkan paling banyak 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, dan 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda.

#### d. Zat Besi (Fe)

Besi merupakan mikronutrien dan merupakan unsur vital yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan hemoglobin serta merupakan komponen penting pada sistem enzim pernafasan. Pada metabolisme zat besi dapat diketahui komposisi dan distribusi besi dalam tubuh manusia, cadangan besi tubuh, siklus besi, absorpsi besi dan transportasi besi.

Berdasarkan hasil analisis kadar zat besi dari beberapa sampel menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulepa racemosa*) substitusi tempe kadar zat besi tertinggi pada perlakuan 50:50 sebanyak 24,7860 mg/kg, selanjutnya pada perlakuan 100:0 sebanyak 21,5841 mg/kg kemudian pada perlakuan 75:25 sebanyak 20,7864 mg/kg dan perlakuan 25:75 sebanyak 17,1827 mg/kg, sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 0:100 sebanyak 13,9195 mg/kg.

Kandungan Fe dari roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe yaitu berasal dari bahan-bahan diantaranya rumput laut lawi-lawi yang memiliki kandungan Fe sebesar 9,9 mg dalam 100 gramnya, tempe sebesar 2,7 mg Fe dalam 100 gramnya, telur sebanyak 3 gram dalam 100 gramnya, tepung terigu sebesar 40% Fe dari AKG dan susu bubuk sebesar 15% dari AKG.

Hal ini dimungkinkan karena zat besi sebagian dijadikan sebagai *trace element* yang dibutuhkan oleh kapang untuk pertumbuhannya. Secara umum mineral lebih tahan terhadap proses pengolahan dan selama penyimpanan dibandingkan dengan vitamin (Astuti, 2014: 157). Menurut Palupi (2010) dalam Astuti (2014: 157), faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan zat besi antara lain panas, udara, cahaya dan kelembaban, khususnya untuk tembaga, besi dan seng. Stabilitas zat besi tergantung dari beberapa faktor diantaranya adalah sifat alami bahan pembawa, ukuran partikel serta paparan terhadap panas, kelembaban dan udara. Pada roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe, kadar Fe antar perlakuan bervariasi, dan tidak linier sesuai dengan penambahan tempe. Hal

ini karena faktor pemasakan, yaitu faktor suhu, perbedaan lama fermentasi dan pemanggangan.

Berdasarkan Angka Kecukupan gizi khususnya zat besi yang dianjurkan untuk orang Indonesia pada kebutuhan protein balita usia 0-5 tahun sebesar 0-9 mg. Dengan demikian kandungan zat besi dari roti rumput laut lawi lawi substitusi tempe yang unggul dapat memberikan kontribusi gizi terhadap balita dan ibu hamil yang mengalami anemia dan dapat dijadikan sebagai makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien zat besi.

Peranan besi sangat penting bagi pertumbuhan. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan penyakit seperti anemia, yang dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan kurang konsentrasi. Zat besi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak anak dan pada anak, anemia dapat menyebabkan masalah perkembangan kognitif jangka panjang.

#### e. Kadar Air

Menurut penelitian Sundari, dkk (2015: 237), penentuan kadar air merupakan analisis paling penting dan paling luas dilakukan dalam pengolahan dan pengujian pangan. Kadar air berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas dan kualitas pangan. Semakin besar panas yang diberikan dan semakin lama pemanasan akan mengakibatkan berkurangnya kadar air pada bahan pangan dalam jumlah banyak.

Semakin tinggi kadar air yang terdapat dalam makanan, makin besar pula kemungkinan makanan tersebut rusak sehingga tidak tahan lama. Kadar air sangat penting dalam menentukan daya awet atau tahan dari pada bahan makanan karena

mempengaruhi sifat fisik, kimia, perubahan mikrobiologi dan perubahan enzimatis (Rahim, dkk, 2015 dalam Shabrina, 2017: 46).

Berdasarkan hasil analisis kadar zat air dari beberapa sampel menunjukkan bahwa pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulepa racemosa*) substitusi tempe dengan kadar air tertinggi pada perlakuan 0:100 sebanyak 25,16%, selanjutnya pada perlakuan 25:75 sebanyak 23,26%, perlakuan 50:50 sebanyak 21,45% dan perlakuan 100:0 sebanyak 21,14% sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan 75:25 sebanyak 20,74%. Pengamatan yang dilakukan pada kadar air roti menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kadar air seiring dengan bertambahnya persentase tempe yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh kandungan protein pada tempe memiliki sifat mudah mengikat air. Air yang terikat tidak akan dilepas saat pemanggangan roti dan dihitung sebagai kadar air. Interaksi antara molekul air dengan sisi hidrofilik protein terjadi melalui ikatan hidrogen (Halim dkk, 2015).

Sebelum fermentasi sebagian molekul air membentuk hidrat dengan molekul lain yang mengandung atom oksigen, nitrogen, karbohidrat, protein, garam, dan senyawa organik lainnya sehingga air sukar diuapkan, sedangkan saat fermentasi berlangsung, enzim-enzim mikroba memecah karbohidrat, protein, garam, dan senyawa organik lainnya sehingga air yang terikat berubah menjadi air bebas (Syahputri dkk 2014: 988). Sehingga kadar air pada saat proses fermentasi meningkat karena adanya proses pemecahan salah satunya air, namun dengan adanya proses pemanggangan air akan teruapkan dan kadar air akan menjadi menurun. Dalam proses pemanggangan terjadi perpindahan panas dan

perpindahan massa secara simultan. Perpindahan panas terjadi dari sumber pemanas ke media pemanas (permukaan panas dan udara panas) ke bahan yang dipanggang. Perpindahan massa yang terjadi adalah pergerakan air dari bahan ke udara dalam bentuk uap (Muchtadi, 2013 dalam Shabrina, 2017: 48).

Dari fungsi dan manfaat zat gizi di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa Allah menciptakan makanan dengan banyak manfaat bagi tubuh dan halal dari segi syariat Islam sebagaimana dalam Allah SWT. dalam QS al-Baqarah/2:168 berikut:

(١٦٨) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (tayyib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Kementerian Agama, 2015: 26).*

Menurut ulama kontemporer, “Yusuf al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan”. Sementara ‘Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn al- Sa’dî’ ketika mendefinisikan kata “*halâl*” menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghashab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram. Kesimpulannya halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang (Ali, 2016: 292).

Adapun tentang lafadz “*thayyib*” yang disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 168 menurut Imam Malik adalah berarti “halal”, sebagai penguat firman Allah “*halâl-an*”. Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan *thayyib* bertemu pada salah satu makna sebagai penguat (*takid*) perbedaan lafaz. Al-Syâfi‘i, sebagaimana dikutip al-Syawkânî adalah yang *melezatkan* (al-Syawkânî, 2007: 216). Imam al-Thabarî berpendapat bahwa arti lafaz “*thayyib*” dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram. Sedangkan al-Hâfîzh Ibn Katsîr menjelaskan bahwa lafaz “*thayyib*” dalam ayat ini yakni yang lezat bagi diri manusia tidak membahayakan kepada badan dan akal (Ali, 2016: 292).

Makanan halal adalah semua makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali yang dilarang yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Sedangkan makanan yang *thayyib* adalah makanan yang bernutrisi tinggi dan memberikan dampak kesehatan bagi tubuh seperti yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran seperti ikan segar, hewan ternak beserta susunya, biji-bijian, zaitun, kurma, anggur, madu dan lainnya.

## 2. Uji Organoleptik

### a. Uji Mutu Hedonik Kriteria Warna Dalam Roti

Menurut Lestari dan Pepi (2015: 944), warna merupakan visualisasi suatu produk yang langsung terlihat lebih dahulu dibandingkan dengan variabel lainnya. Warna secara langsung akan memengaruhi persepsi panelis.

Penampakan dalam hal ini warna suatu produk makanan merupakan faktor utama yang menjadi acuan penilaian sebelum mempertimbangan hal lain, seperti

rasa ataupun nilai gizi makanan tersebut. Warna roti pada umumnya adalah kuning, krem kecoklatan dan kecerahannya terlihat agak pucat. Hal ini dikarenakan faktor dari bahan-bahan yang ditambahkan seperti susu bubuk, mentega serta penambahan tepung terigu. Namun terdapat corak warna hijau dan coklat pada roti dalam penelitian ini karena adanya fortifikasi rumput laut lawi-lawi dan tempe.

Berdasarkan penilaian 36 panelis terhadap warna roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe dapat diketahui bahwa mutu hedonik terhadap warna dengan sampel formulasi (100:0) memiliki nilai 4,9 dengan kriteria kuning, Formulasi (75:25) memiliki nilai 4,1 dengan kriteria kuning, Formulasi (50:50) memiliki nilai 4 dengan kriteria kuning, Formulasi (25:75) memiliki nilai 3,5 dengan kriteria agak kuning kecoklatan, dan formulasi (0:100) memiliki nilai 3 dengan kriteria agak kuning kecoklatan.

Penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria warna skornya 4,0. Mengacu pada hal itu warna yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap roti dengan skor diatas 4 adalah formulasi (100:0), (75:25), (50:50). Hal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan rumput laut lawi-lawi sebagai bahan fortifikasi yang memberi warna pada roti.

Peningkatan kesukaan panelis terhadap warna roti meningkat seiring peningkatan komposisi rumput laut lawi-lawi dan menurun seiring dengan peningkatan komposisi tempe. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai warna roti dengan penggunaan rumput laut lawi-lawi karena

memberikan warna cerah pada roti sedangkan peningkatan komposisi tempe menghasilkan roti yang berwarna kecoklatan sehingga kurang disukai konsumen.

Aspek warna roti juga dipengaruhi oleh penggunaan gula dan temperatur suhu pemanasan. Semakin tinggi suhu pemanasan maka semakin cepat warna roti terbentuk. Pada saat karamelisasi gula terjadi, warna kerak roti menjadi coklat sehingga roti seperti terlihat hangus (Wahyuni dkk, 2017: 741).

#### b. Uji Mutu Hedonik Kriteria Aroma Dalam Roti

Aroma merupakan salah satu variabel kunci, karena pada umumnya cita rasa konsumen terhadap produk makanan sangat ditentukan oleh aroma (Lestari dan Pepi, 2015: 944). Aroma makanan juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam menentukan kualitas bahan baku suatu pangan atau makanan.

Berdasarkan penilaian 36 panelis dapat diketahui bahwa mutu hedonik terhadap aroma roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan sampel formulasi (100:0) memiliki nilai 4,2 dengan kriteria biasa, formulasi (75:25) memiliki nilai 4,5 dengan kriteria biasa, formulasi (50:50) memiliki nilai 4 dengan kriteria biasa, formulasi (25:75) memiliki nilai 4,6 dengan kriteria biasa, dan formulasi 5 (0:100) memiliki nilai 4,2 dengan kriteria biasa. Berdasarkan penilaian mutu hedonik terhadap aroma, nilai median dari mutu hedonik kriteria aroma skornya 4,0.

Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria aroma skornya 4,0. Mengacu pada hal itu aroma yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap roti adalah semua formulasi namun yang lebih tinggi skornya adalah formulasi 25:75.

Umumnya konsumen akan menyukai bahan pangan atau makanan jika mempunyai aroma khas yang tidak menyimpang dari aroma normal. Aroma langu pada tempe diperoleh karena adanya enzim lipoksigenase. Enzim lipoksigenase akan hilang dengan adanya proses pemanasan sehingga aroma tempe dapat berkurang (Shabrina, 2017: 58). Aroma roti ditentukan oleh komponen bahan yang digunakan seperti bahan tambahan berupa margarin, telur, ragi dan susu bubuk sehingga aroma yang dominan timbul adalah aroma khas roti. Hal ini sesuai dengan hasil uji statistik yang menyatakan bahwa tempe pada olahan roti rumput laut lawi-lawi tidak mempengaruhi kualitas aroma dari roti.

#### c. Uji Mutu Hedonik Kriteria Tekstur Dalam Roti

Proses pembentukan tekstur roti dipengaruhi oleh adanya molekul pati, serat dan protein dengan membutuhkan air. Sehingga pada saat proses pembentukan tekstur, komponen pati, serat dan protein saling berkompetisi mengikat air untuk membentuk tekstur (Shabrina, 2017: 55).

Berdasarkan penilaian 36 panelis dapat diketahui bahwa mutu hedonik terhadap tekstur roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan sampel formulasi 1 (100:0) memiliki nilai 3,4 dengan kriteria agak tidak lembut, formulasi 2 (75:25) memiliki nilai 3,4 dengan kriteria agak tidak lembut, formulasi 3 (50:50) memiliki nilai 3,6 dengan kriteria agak tidak lembut, formulasi 4 (25:75) memiliki nilai 4,4 dengan kriteria lembut biasa, dan formulasi 5 (0:100) memiliki nilai 4 dengan kriteria lembut biasa. Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria tekstur skornya 4,0. Mengacu pada hal itu tekstur yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap roti

adalah formulasi (75:25) dan (100:0). Hal ini membuktikan, peningkatan komposisi rumput laut lawi-lawi menurunkan tingkat kelembutan pada tekstur roti.

Ketika tepung gandum dicampur dengan air, gluten akan membentuk massa viskoelastis yang mengikat semua bahan adonan terutama pati menjadi suatu adonan, lapisan film yang terbentuk bersifat impermeable terhadap gas, sehingga gas dapat terperangkap dan membentuk pori. Pori-pori merupakan lubang kecil yang terbentuk karena gas CO<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh ragi pada proses fermentasi serta udara yang terperangkap didalamnya. Adanya pori-pori dalam roti menyebabkan tekstur menjadi lunak (Wijayanti, 2007 dalam Shabrina, 2017: 56).

#### d. Uji Mutu Hedonik Kriteria Rasa Dalam Roti

Rasa merupakan atribut mutu dari suatu produk yang biasanya merupakan faktor penting bagi konsumen dalam memilih produk. Parameter rasa dimulai dari tanggapan kepekaan kimiawi yang diikuti oleh indra pencicip dalam hal ini lidah. Rasa yang terdapat pada roti juga diakibatkan oleh ragi dan beberapa asam laktat. Adanya bakteri asam laktat dan khamir pada saat proses fermentasi akan menghasilkan rasa masam pada roti (Shabrina, 2017: 57).

Berdasarkan penilaian 36 panelis dapat diketahui bahwa mutu hedonik terhadap rasa roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan sampel formulasi 1(100:0) memiliki nilai 4,2 dengan kriteria enak biasa, Formulasi 2 (75:25) memiliki nilai 4,6 dengan kriteria enak biasa, Formulasi 3 (50:50) memiliki nilai 5 dengan kriteria agak enak, formulasi 4 (25:75) memiliki

nilai 5,3 dengan kriteria agak enak, dan formulasi 5 (0:100) memiliki nilai 4,4 dengan kriteria enak biasa. Penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria rasa skornya 4,0. Mengacu pada hal itu rasa yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap roti adalah formulasi 50:50 dan 25:75.

Rasa merupakan faktor yang sangat menentukan keputusan akhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk. Meskipun warna dan aroma suatu produk baik tetapi rasanya tidak enak maka makanan tersebut akan ditolak.

#### e. Hasil Uji *Over All* Mutu Hedonik Dalam Roti

Uji *over all* mutu hedonik dalam hal ini memiliki fungsi yaitu sebagai cara untuk mengetahui secara keseluruhan tentang baik tidaknya suatu produk makanan yang dalam hal ini adalah roti.

Berdasarkan uji mutu hedonik secara keseluruhan dapat diketahui bahwa mutu hedonik terhadap rasa roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dengan skor  $>4$  dengan kriteria biasa dan agak baik terdapat pada semua sampel dengan formulasi yang berbeda-beda antara lain formulasi 25:75 sebagai formulasi yang memiliki nilai tertinggi yaitu 5,2, selanjutnya formulasi 50:50 memiliki nilai 5,1, formulasi 75:25 dengan nilai 5, dan formulasi 0:100 dengan nilai 4,5. Terakhir pada formulasi 100:0 dengan nilai 4,2.

Tingkat kesukaan panelis terhadap keseluruhan roti cenderung kepada roti dengan kombinasi kedua bahan fortifikasi yakni rumput laut lawi-lawi dan tempe. Kombinasi dan komposisi dari kedua bahan tersebut memiliki mutu dan rasa yang khas dari roti ini.

#### f. Hasil Uji Hedonik Dalam Roti

Uji hedonik merupakan parameter organoleptik yang digunakan untuk menilai tingkat kesukaan panelis terhadap produk olahan roti rumput laut substitusi tempe. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik yang dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendaki. Dalam analisis datanya, skala hedonik ditransformasikan ke dalam angka kemudian dilakukan analisa statistik (Ayustaningwarno, 2014: 6).

Berdasarkan uji hedonik dapat diketahui bahwa total skor tertinggi dalam roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe terdapat pada formulasi 100:0 dengan total skor 258 dengan kriteria sangat sangat suka, kemudian formulasi 75:25 dengan skor 247, lalu formulasi 50:50 dan 25:75 dengan total skor 225 dengan kriteria sangat sangat suka dan formulasi 100:0 dengan skor 224.

#### e. Uji Statistik

Perhitungan statistika menggunakan aplikasi SPSS dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian substitusi terhadap mutu dari roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe dan jenis uji yang digunakan yaitu komperatif berpasangan karena penelitian lebih dari dua kelompok, namun karena data tidak terdistribusi normal ( $P < 0,05$ ) maka menggunakan uji *friedman*. Dalam hal ini kriteria kemaknaan dari uji *friedman* ( $P < 0,05$ ) bermakna, dan ( $P > 0,05$ ) tidak bermakna.

Hasil penelitian organoleptik menunjukkan bahwa pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi bermakna ( $P < 0,05$ ) terhadap warna. Artinya tempe

pada olahan roti rumput laut lawi-lawi mempengaruhi kualitas warna dari roti itu sendiri.

Hasil penelitian organoleptik menunjukkan bahwa pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi tidak bermakna ( $P > 0.05$ ) terhadap aroma. Artinya tempe pada olahan roti rumput laut lawi-lawi tidak mempengaruhi kualitas aroma dari roti itu sendiri.

Hasil penelitian organoleptik menunjukkan bahwa pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi tidak bermakna ( $P > 0.05$ ) terhadap tekstur. Artinya tempe pada olahan roti rumput laut lawi-lawi tidak mempengaruhi kualitas tekstur dari roti itu sendiri.

Hasil penelitian kriteria rasa menunjukkan pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi bermakna ( $P < 0.05$ ) terhadap rasa. Artinya pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi mempengaruhi kualitas rasa dari roti itu sendiri.

Hasil penelitian uji statistik mutu hedonik *over all* secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi bermakna ( $P < 0.05$ ). Artinya pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas dari roti. Selanjutnya hasil penelitian pada uji hedonik menunjukkan pemberian tempe terhadap roti rumput laut lawi-lawi berpengaruh nyata ( $P < 0.05$ ) terhadap daya terima atau tingkat kesukaan panelis terhadap produk roti tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan :

1. Kadar kandungan gizi makro dalam 100 gram roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe untuk karbohidrat paling banyak terdapat pada roti untuk perbandingan 25:75 dengan kandungan karbohidrat sebanyak 56,10%. Untuk protein pada perbandingan 25:75 sebanyak 11,42%. Untuk lemak pada perbandingan 50:50 sebanyak 8,81% dan zat besi (Fe) pada perbandingan 50:50 sebanyak 20,9091 mg/kg.
2. Uji *Over All* mutu hedonik pada roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe skor tertinggi pada perbandingan 25:75 dengan kriteria agak baik dan pada uji hedonik pada perbandingan 0: 100 dengan kriteria sangat-sangat suka.
3. Uji Friedman untuk analisa organoleptik menunjukkan ada pengaruh kualitas roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe dari aspek aroma, rasa, mutu *over all* dan uji hedonik (tingkat kesukaan).
4. Rekomendasi produk terbaik dari keempat sampel untuk zat gizi makro maupun mikro yaitu perbandingan 25:75.

## **B. *Saran***

Berdasarkan hasil penelitian roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperhatikan teknik pengolahan dalam pembuatan roti yang meliputi ketepatan komposisi bahan, kesamaan dan ketepatan lama fermentasi setiap adonan, inovasi bentuk roti yang lebih menarik serta pemanggangan dengan suhu yang tepat dan merata.
2. Bagi pemerintah, pentingnya untuk melakukan diversifikasi pangan guna meningkatkan daya tarik masyarakat dalam mengkonsumsi makanan berbasis pangan lokal yang baik dan bergizi guna memperbaiki status gizi masyarakat.
3. Bagi masyarakat dapat membuat roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe untuk menjadi makanan layak konsumsi sebagai makanan tambahan atau sebagai produk dagang guna memenuhi kebutuhan zat gizi dan ekonomi sehari-hari.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam tentang zat gizi lain yang terkandung dalam roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe serta aplikasi produk berdasarkan dasar kebermanfaatan produk tersebut dengan senantiasa lebih mengacu pada prospek Islam guna mengembangkan pendapat masyarakat ditinjau dari segi Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama, 2015.
- Afandi, Sayid Ahmad al-Hasyimi. *Muhtasor Ahaadis An-nabawi*. Jeddah: Maktabah Daar Ihyaul Kutub Al-arobiyah, 2000.
- Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- Al-Syawkânî, Imam. *Fath-hul Qadiir al-Jaami' Bayna Fannay ar-Riwaayah Wa ad-Diraayah Min 'Ilm at-Tafsiiir*". Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- Anwar, Lely Okmawaty, Rita L. Bubun dan Rosmawati. *Manfaat Anggur Laut (Caulerpa Racemosa) dan Penanganannya dengan Melibatkan Masyarakat Pantai di Desa Rumba-Rumba*. Seminar Nasional dan Gelar Produk. Kendari: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari, 2016.
- Amalia, Leily dkk. *Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Gizi Ibu Terkait Iodium dan Pemilihan Jenis Garam Rumah Tangga di Wilayah Pegunungan Cianjur*. Jurnal Gizi Pangan Vo. X No. 2. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Astuti dkk. *Komposisi Zat Gizi Tempe yang Difortifikasi Zat Besi dan Vitamin A pada Tempe Mentah dan Matang*. Jurnal Agritech Vol. XXXIV No. 2. Semarang: FKM, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2014.
- Ayustaningwaryo, Fitriyono. *Teknologi Pangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Badan POM RI, *Mengenal Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bagi Bangsa Indonesia*. InfoPOM. Jakarta: Percetakan Negara, 2014.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. *"Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan"*. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Sektor dan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor, 2015.
- Badan Standarisai Nasional. *Tempe: Persembahan Indonesia untuk Dunia*. Jakarta: PUSIDO Badan Standardisasi Nasional, 2012.
- Badan Standarisasi Nasional. *SNI 01-2891-1992. Cara Uji Makanan dan Minuman*. Jakarta: Dewan Standarisasi Nasional, 1992.
- Badan Standarisasi Nasional. *SNI 01-2896-1998. Uji Cemaran Logam dalam Makanan*. Jakarta: Dewan Standarisasi Nasional, 1998.

- Bastian, F, dkk. *Daya Terima dan Kandungan Zat Gizi Formula Tepung Tempe dengan Penambahan Semi Refined Carrageenan (Src) dan Bubuk Kakao*. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan Vol. II No. I. Makassar: Prodi Teknologi Pangan UNHAS, 2013.
- Beck, Mary E.. *Ilmu Gizi dan Diet*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Bintanah, Sufiati dan Erma Handarsari. *The Effecnt of Giving Furfures Soybean Tempeh Nugget Toward Reducing Cholesterol Levelof White Rat Blood (RattusNorvegicus) Hypercholesterolemia*. Journal of Study Program of Nutrition, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2016.
- Burhanuddin. *Respon Warna Cahaya terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Karotenoid Anggur Laut (Caulerpa racemosa) pada Wadah Terkontrol*. Jurnal Balik Diwa Vol. V No. 1. Makassar: Prodi Budidaya Perairan UNISMUH Makassar, 2014.
- Cottrell, Randall R. dan James F. McKenzie. *Health Promotion and Education Research Methods*. USA: Cathleen Sether.
- Cox, Sabrina dkk. *Antioxidant Potential and Antimicrobial Efficacy of Seaweed (Himanthalia Elongata) Extract in Model Food Systems*. Journal Appl Phycol 26: 1823-1831, 2014.
- Darmawati dkk. *Analisis Kandungan Karotenoid Rumput Laut Caulerpa sp. yang Dibudidayakan di Berbagai Jarak dan Kedalaman*. Seminar Nasioal. Bali: UNMAS Denpasar, 2016.
- Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. *Takalar dalam Angka 2015*. BPS Kabupaten Takalar, 2015.
- Diniyyah, Shafirah Roshmita dan Triska Susila Nindya. *Asupan Energi, Protein dan Lemak dengan Kejadian Gizi Kurang pada Balita Usia 24-59 Bulan di Desa Suci, Gresik*. Research Study Vol. I No. 4. Gresik: Amerta Nutrition, 2017.
- Estiningtyas, Dian. *Kandungan Gizi Sosis Substitusi Tepung Tempe dengan Bahan Pengisi Tepung Ubi Jalar Kuning (Ipomoea Batatas) dan Bahan Penstabil Ekstrak Rumput Laut (Eucheuma cottonii) untuk PMT Ibu Hamil*. Artikel Penelitian. Semarang: Prodi Gizi FK UNDIP Semarang, 2014.

- Firdaus, Fadilla. *Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir untuk Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Firdaus. “*Pengaruh Penambahan Wortel dan Rumput Laut terhadap Kualitas Nugget Tempe*”. Skripsi. Padang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, 2014.
- Halim dkk. *Evaluasi Mutu Roti Manis dari Tepung Komposit (Tepung Terigu, Pati Sagu, Tepung Tempe)*. *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia* Vol. VII No. 2. Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau, 2015.
- Hatta, Rachmi. *Studi Pembuatan Dodol Dari Rumput Laut (Eucheuma cottonii) Dengan Penambahan Kacang Hijau (Phaseolus aureus)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, 2012.
- Kementerian Pertanian. *Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Kedelai*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016.
- Khadijah, Jihan. *Analisis Komparatif antara Produksi Industri Keripik Pengolahan Rumput Laut Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Khatimah, Khusnul. *Analisis Kandungan Logam Timbal (Pb) pada Caulerpa racemosa yang Dibudidayakan di Perairan Dusun Puntondo, Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Kristianto, Yohanes, Arsinah Habibah Fitriah dan Wahyu Dwi Astuti. *Budaya Pengolahan Produk Tempe Generasi Dua di Sentra Industri Kerajinan Tempe Kota Malang*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. XVIII No. 2. Malang: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang, 2015.
- Laksmhy, P.S. dkk. *Rice and Green Gram Based ‘Tempeh’- Development and in Vitro Mineral Bioavailability*. *Journal of Tropical Agriculture* 53 (2). Department of Home Science, College of Horticulture, Kerala Agricultural University, Thrissur, Kerala, India-680656, 2015.
- Lestari, Sri dan Pepi Nur Susilawati. *Uji Organoleptik Mi Basah Berbahan Dasar Tepung Talas Beneng (Xantoshoma Undipes) Untuk Meningkatkan Nilai*

- Tambah Bahan Pangan Lokal Banten*. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon Vol. I No. 4. Banten: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten, 2015.
- Listiyana, Dina. *Substitusi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) pada Pembuatan Ekado sebagai Alternatif Makanan Tinggi Yodium Pada Anak Sekolah*. Skripsi. Semarang: Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Lubis, YM dkk. *Pengaruh Konsentrasi Rumput Laut (Eucheuma cottonii) dan Jenis Tepung pada Pembuatan Mie Basah*. Rona Teknik Pertanian, Vol. VI No. I, 2013.
- Mahadi dkk. *Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kualitas Susu Tempe Bubuk Sebagai Pengembangan LKM (Lembar Kerja Mahasiswa) Materi Bioteknologi Pangan*. Jurnal Biogenesis Vol. XII No. 1. Riau: Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau, 2016.
- M.E, Kustyawati, Nawansih O. and Nurdjanah S. *Profile of Aroma Compounds and Acceptability of Modified Tempeh*. International Food Research Journal 24(2): 734-740. Department of Agro-Product Technology, Faculty of Agriculture, University of Lampung, 2017.
- Mann, Jim dkk. *Buku Ajar Ilmu Gizi*. Jakarta: EGC, 2014.
- Ma'ruf, Widodo dkk. *Profil Rumput Laut Caulerpa racemosa dan Gracilaria verrucosa sebagai Edible Food*. Jurnal Saintek Perikanan Vol. IX No. 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Minarno, dkk. *Gizi dan Kesehatan Perspektif al-Quran dan Sains*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mukarramah dkk. *Low Fat High Protein Sosis Berbahan Dasar Lawi-Lawi (Caulerpa racemosa) sebagai Inovasi Kuliner Sehat Khas Makassar dan Makanan Alternatif bagi Anak Penderita Obesitas*. Makassar: Hasanuddin Student Journal Vol. I No. 1, 2017.
- Mursyid. *Kandungan Zat Gizi dan Nilai Gizi Protein Tepung Tempe Kedelai Lokal dan Impor serta Aktivitas Antioksidannya*. Tesis Sekolah Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Ottong, Yuliana, Tamrin dan Djukrana Wahab. *Pengaruh Penambahan Tepung Tempe dan Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) terhadap Karakteristik Organoleptik Sagon Kelapa*. Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017.

- Pakar Gizi Indonesia. *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: EGC, 2014.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Produksi Rumput Laut dan Bandeng Sulsel Tertinggi Nasional - DKP Genjot Produksi Komoditi Ekspor*. Website Resmi Pemerintah Sulawesi Selatan, 2017.
- Princestasari, Lovi Dwi dan Leily Amalia. *Formulasi Rumput Laut Gracilaria sp. dalam Pembuatan Bakso Daging Sapi Tinggi Serat dan Iodium*. Bogor: Jurnal Gizi Pangan Vol. X No.3, 2015.
- Pratisto, Arif. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005.
- Putera, Bagja Adhithia. *Aktivitas Antioksidan Rumput Laut Caulerpa sp. Segar dan Rebus*. Skripsi. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Putra, Sitiatava Rizema. *Gizi dan Diet*. Jogjakarta: D-Mediaka, 2013.
- Putri, Febri Ana. *Kenikmatan Pangan dalam Al-Qur'an*. Sripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Ridhowati, Sherly dan Asnani. *Potensi Anggur Laut Kelompok Caulerpa racemosa sebagai Kandidat Sumber Pangan Fungsional Indonesia*. Jurnal Oseana Vol. XLI No. 4. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016.
- Rusdah. *Antioxidative Peptides of Tempe from Indonesia*. Thesis of Bogor Agricultural University Bogor, 2016.
- Sanjaya, Yushinta A. dkk. *Phytochemicals Propertie and Faty Acid Profile of Green Seaweed Caulerpa racemosa from Madura, Indonesia*. International Journal of ChemTech Research Vol. IX No. 5. Doctoral Program of Fisheries and Marine Science University of Brawijaya Indonesia, 2016.
- Shabrina, Nadhila. *Pengaruh Substitusi Tepung Terigu Dengan Tepung Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L) dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik Roti Tawar*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

- Sinaga, Siti Morin, Maria Intan dan Jansen Silalahi. *Protein Analysis of Canned Legumes by using Visible Spectrophotometry and Kjeldahl Method*. International Journal of Pharm Tech Research Vol VIII No. 6. USA: IJRIF, 2015.
- Stone, Herbert. *Sensory Evaluation Practices*. USA: Academic Press Publication, 2012.
- Sukanto. *Rancang Bangun Mesin Pembuat Bahan Adonan Roti Tipe Horizontal Berkapasitas 10 Kg*. Bangka Belitung: Prodi Perawatan dan Perbaikan Mesin, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, 2016.
- Sundari, Dian, Almasyuri dan Astuti Lamid. *Pengaruh Proses Pemasakan Terhadap Komposisi Zat Gizi Bahan Pangan Sumber Protein*. Jurnal Kemenkes RI Vol. XXV No. 4. Jakarta: Media Litbangkes, 2015.
- Sunyoto, Danang dan Ari Setiawan. *Statistik Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Suriyanti. *Analisis Kandungan Zat Gizi Tepung Daging Ikan Tuna (Thunnus sp) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Suryatna, Bambang Sugeng. *Peningkatan Kelembutan Tekstur Roti Melalui Fortifikasi Rumput Laut Euchema Cottoni*. Semarang: Jurnal Teknobuga Vol. II No. 2, 2015.
- Syahputri, Dwi Arinda dan Agustin Krisna Wardani. *Pengaruh Fermentasi Jali (Coix lacryma jobi-l) pada Proses Pembuatan Tepung Terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Cookies dan Roti Tawar*. Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. III No. 3. Malang: Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, FTP Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Tapotubun, Alfonsina Marthina. *Komposisi Kimia Rumput Laut Caulerpa lentillifera dari Perairan Kei Maluku dengan Metode Pengeringan Berbeda*. JPHIP Vol. XXI No. 1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, 2018.
- Tim Ide Masak. *Resep Favorit untuk Usaha Roti Manis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Tim MONSPUB12. *Dasar Nutrisi Kedokteran*. Makassar: Penerbit MONSPUB15, 2016.

- Tim Dosen PS ITP. *Modul Praktikum Biokimia dan Analisis Pangan*. Malang: Ilmu dan Teknologi Pangan. THP-FTP Universitas Brawijaya, 2012.
- Waluyo, Nurmalita dan Rismawita Sinaga. *Bawang Merah yang Dirilis Oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran*. IPTEK Tanaman Sayuran. Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 2015.
- Yudasmara, Gede Ari. *Budidaya Anggur Laut (Caulerpa Racemosa) Melalui Media Tanam Rigid Quadrant Nets Berbahan Bambu*. Jurnal Sains dan Teknologi. Bali: Jurusan Budidaya Kelautan Universitas Pendidikan Ganesha, 2014.
- Yusuf, Nikmawatisusanti dan Asri S. *Formulasi Produk Diversifikasi Roti Manis Berbahan Dasar Tepung Ubi Jalar (Ipomea batatas) dengan Penambahan Rumput Laut (Kappaphycus alvarezii)*. Gorontalo: Laporan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Dana PNBP, 2015.
- Wibowo, R. Adie. *Koleksi Resep Cake Populer Bolu, Kue Kering dan Roti*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2016.
- Webster, Joan, Angela Madden dan Michelle Holdworth. *Gizi dan Dietetika Ed.2*. Jakarta: EGC, 2014.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN 1

### A. Resep Pembuatan Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*)

#### Substitusi Tempe

##### 1. Alat

Oven, mixer, blender, sendok takar, cetakan, kuas kue, sendok, pengaduk, mangkok dan lain-lain.

##### 2. Bahan

250 g tepung terigu, 50 g gula pasir, 2,5 g garam, 1 butir telur, 37 g margarin, 5 g ragi instan, 87 mL air, 30 mL susu bubuk, tempe dan rumput laut sebanyak perbandingan formulasi yang telah ditentukan.

##### 3. Cara Membuat

- a. Rumput laut dicuci/dibersihkan kemudian dihaluskan menggunakan blender dan dikeringkan dalam suhu ruang.
- b. Tempe dihaluskan menggunakan blender kemudian disangrai selama 5 menit dengan api kecil.
- c. Di wadah terpisah, tepung terigu, ragi, susu bubuk, telur, gula pasir, air, garam dan margarin di campur kemudian diaduk menggunakan mixer hingga kalis.
- d. Tepung terigu ditambahkan sebanyak 50 g untuk membantu pengkalisian kemudian adonan roti difermentasi selama 45 menit dalam keadaan kedap udara.
- e. Adonan roti kemudian ditimbang dan dibagi menjadi lima adonan masing-masing sebanyak 100 g .
- f. Setiap adonan dicampur dengan rumput laut lawi-lawi dan tempe sesuai dengan formulasi yang ditentukan lalu difermentasi kembali selama 45 menit kemudian dipanggang dengan suhu 150<sup>0</sup> C selama 20 menit.
- g. Roti rumput laut lawi-lawi substitusi tempe siap disajikan.

## LAMPIRAN 2

### B. Lembar Score Sheet Uji Organoleptik

#### SCORE SHEET MUTU HEDONIK ROTI RUMPUT LAUT LAWI-LAWI SUBSTITUSI TEMPE

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : L / P

Tanggal Pengujian : \_\_\_\_\_

Dihadapan Anda disajikan beberapa produk roti dengan tambahan rumput laut lawi-lawi (*Ceulepa racemosa*) substitusi tempe. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa dari produk tersebut berdasarkan skala berikut:

Uji Mutu Hedonik		Formula Lawi-lawi : Tempe				
		100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
Warna						
1	Sangat kuning kecoklatan					
2	Kuning kecoklatan					
3	Agak kuning kecoklatan					
4	Kuning					
5	Agak putih pucat					
6	Putih pucat					
7	Sangat putih pucat					
Aroma						
1	Sangat tidak harum					
2	Tidak harum					
3	Agak tidak harum					
4	Biasa					
5	Agak harum					
6	Harum					
7	Sangat harum					
Tekstur						
1	Sangat tidak lembut					
2	Tidak lembut					
3	Agak tidak					

	lembut					
4	Lembut Biasa					
5	Agak lembut					
6	Lembut					
7	Sangat lembut					
<b>Rasa</b>						
1	Sangat tidak enak					
2	Tidak enak					
3	Agak tidak enak					
4	Biasa					
5	Agak enak					
6	Enak					
7	Sangat enak					

Mutu Hedonik	Formula Lawi-lawi : Tempe				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
<b>Over All</b>					
1	Sangat tidak baik				
2	Tidak baik				
3	Agak tidak baik				
4	Biasa				
5	Agak baik				
6	Baik				
7	Sangat baik				

Uji Hedonik	Formula Lawi-lawi : Tempe				
	100 : 0	75 : 25	50 : 50	25 : 75	0 : 100
1	Sangat sangat tidak suka sekali				
2	Sangat sangat tidak suka				
3	Sangat tidak suka				
4	Tidak suka				
5	Agak tidak suka				
6	Biasa				
7	Agak suka				
8	Suka				
9	Sangat suka				
10	Sangat sangat suka				
11	Sangat sangat suka sekali				

Saran terkait produk: .....

### LAMPIRAN 3

#### C. Master Tabel SPSS

No	Formulasi Sampel (Warna)				
	F1	F2	F3	F4	F5
1	5	6	3	3	2
2	5	6	5	5	5
3	1	5	3	2	5
4	7	6	3	1	2
5	5	6	3	7	2
6	5	3	3	5	3
7	4	6	2	5	2
8	6	5	1	3	2
9	5	4	1	3	7
10	2	2	2	1	1
11	4	5	3	3	2
12	2	3	3	4	4
13	6	5	1	3	2
14	5	5	5	4	4
15	2	2	5	4	2
16	4	5	3	3	4
17	5	5	3	3	5
18	5	1	6	3	2
19	5	2	4	2	3
20	6	3	5	4	4
21	3	3	3	3	1
22	5	2	6	3	1
23	5	2	6	4	2
24	5	4	6	3	2
25	3	2	6	4	5
26	5	4	3	3	3
27	7	3	6	2	1
28	7	5	5	5	2
29	5	3	5	3	2
30	5	5	4	4	3
31	5	4	2	4	5
32	5	3	5	3	5
33	6	6	6	5	4
34	7	6	5	4	3
35	6	5	6	3	3
36	7	5	5	5	2

No	Formulasi Sampel (Aroma)				
	F1	F2	F3	F4	F5
1	5	7	4	6	4
2	6	5	4	3	6
3	4	2	4	4	4
4	1	2	3	4	6
5	6	7	6	7	6
6	2	6	6	3	3
7	7	4	5	5	6
8	6	4	2	5	2
9	5	4	1	7	6
10	1	2	2	2	2
11	5	5	5	6	2
12	5	6	6	5	4
13	6	4	1	2	3
14	5	5	4	6	6
15	5	4	5	5	6
16	5	6	4	5	4
17	4	5	3	6	5
18	2	3	3	4	5
19	1	3	4	3	4
20	4	5	5	6	3
21	4	5	5	5	5
22	6	5	4	3	1
23	2	6	2	4	5
24	5	4	2	6	7
25	4	6	5	4	4
26	3	3	2	5	5
27	3	5	4	6	7
28	2	5	2	5	3
29	5	5	6	4	4
30	3	4	5	5	3
31	4	4	5	5	4
32	3	5	4	6	2
33	5	5	6	5	6
34	6	5	4	3	1
35	5	3	3	2	2
36	5	4	4	5	6

No	Formulasi Sampel (Tekstur)				
	F1	F2	F3	F4	F5
1	5	5	2	3	4
2	6	5	4	3	3
3	4	1	1	2	2
4	3	2	1	6	4
5	5	6	7	5	6
6	5	3	3	6	5
7	4	5	1	5	6
8	3	5	1	6	6
9	5	3	4	6	7
10	5	5	5	4	4
11	5	3	5	5	6
12	5	5	6	3	4
13	6	5	4	3	2
14	2	2	5	3	4
15	4	3	2	2	3
16	7	5	4	5	3
17	4	2	5	5	3
18	2	3	4	6	1
19	1	2	4	4	2
20	1	3	4	4	3
21	4	5	5	3	3
22	1	2	4	5	5
23	1	2	3	4	2
24	4	3	2	6	7
25	3	5	5	6	5
26	2	3	3	5	4
27	3	6	4	7	5
28	2	2	3	4	4
29	4	6	5	3	4
30	2	2	2	2	2
31	2	2	3	3	1
32	1	3	2	6	1
33	5	4	5	2	6
34	1	2	4	6	7
35	2	1	2	3	3
36	3	1	4	2	6

No	Formulasi Sampel (Rasa)				
	F1	F2	F3	F4	F5
1	4	5	6	5	3
2	5	5	4	3	3
3	4	6	3	5	3
4	2	3	4	6	7
5	7	6	6	7	6
6	6	5	5	6	6
7	6	2	3	4	7
8	6	5	5	4	3
9	3	1	6	6	4
10	4	4	4	5	5
11	4	4	5	5	6
12	6	6	7	5	4
13	4	5	6	2	1
14	4	5	6	5	4
15	5	4	5	5	7
16	3	4	5	5	6
17	2	4	5	6	4
18	2	4	5	6	1
19	5	5	6	6	4
20	5	6	6	6	4
21	6	5	6	6	6
22	2	4	5	6	7
23	2	4	2	3	2
24	4	5	4	5	7
25	5	6	6	6	4
26	3	4	4	6	5
27	5	4	6	7	3
28	5	5	5	6	5
29	5	6	6	7	4
30	4	4	5	6	6
31	4	4	5	5	4
32	2	4	4	6	2
33	6	6	5	5	4
34	5	6	7	2	1
35	3	3	3	5	4
36	4	5	4	6	7

No	Formulasi Sampel (Over All)				
	F1	F2	F3	F4	F5
1	6	7	7	6	5
2	7	5	6	4	4
3	4	5	4	4	4
4	2	3	4	6	7
5	7	6	7	7	6
6	6	6	6	6	6
7	6	6	6	6	6
8	6	5	6	4	3
9	6	6	4	7	3
10	4	4	4	5	5
11	3	3	4	4	6
12	5	6	7	4	3
13	4	5	7	2	1
14	6	5	4	3	4
15	4	5	6	5	7
16	3	4	6	5	6
17	3	4	5	6	4
18	3	5	5	4	3
19	5	6	6	6	4
20	3	4	5	5	4
21	6	6	6	6	6
22	2	3	5	6	7
23	2	5	3	4	3
24	4	5	4	6	7
25	4	6	5	6	3
26	2	3	4	6	5
27	4	6	5	7	3
28	5	5	5	6	5
29	4	5	6	6	3
30	4	4	5	6	6
31	3	5	4	4	3
32	2	5	5	6	4
33	6	6	4	4	3
34	5	6	7	3	1
35	3	3	4	5	4
36	3	5	4	6	7

No	Formulasi Sampel (Uji Hedonik)				
	F1	F2	F3	F4	F5
1	9	10	9	9	11
2	9	7	8	7	6
3	7	8	6	6	6
4	5	6	9	8	9
5	8	9	9	10	9
6	8	8	8	9	8
7	7	9	7	10	11
8	8	7	8	6	5
9	9	7	10	1	3
10	4	5	6	6	7
11	4	5	6	6	8
12	7	8	9	6	6
13	6	7	11	3	4
14	7	6	5	5	7
15	6	5	7	7	9
16	4	5	6	7	9
17	5	6	7	7	8
18	5	7	6	6	5
19	7	8	8	8	6
20	6	7	7	8	5
21	8	8	8	8	8
22	4	5	7	9	11
23	5	5	5	5	5
24	5	7	5	8	9
25	5	8	6	8	5
26	4	5	3	9	7
27	8	7	9	11	6
28	7	7	8	8	7
29	7	8	7	10	6
30	5	6	6	8	8
31	4	7	5	6	6
32	4	7	7	8	7
33	8	6	5	6	5
34	7	9	10	6	5
35	5	5	5	7	6
36	9	7	8	8	11

## LAMPIRAN 4

### D. Hasil Pengolahan Data SPSS

#### 1. Warna

Descriptive Statistics						Test Statistics <sup>a</sup>	
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum		
warna formula 1	36	4.86	1.496	1	7	N	36
warna formula 2	36	4.08	1.500	1	6	Chi-Square	31.208
warna formula 3	36	3.97	1.612	1	6	df	4
warna formula 4	36	3.50	1.207	1	7	Asymp. Sig.	.000
warna formula 5	36	2.97	1.464	1	7	a. Friedman Test	

#### 2. Aroma

Descriptive Statistics						Test Statistics <sup>a</sup>	
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum		
aroma formula 1	36	4.17	1.612	1	7	N	36
aroma formula 2	36	4.53	1.276	2	7	Chi-Square	6.635
aroma formula 3	36	3.89	1.450	1	6	df	4
aroma formula 4	36	4.64	1.355	2	7	Asymp. Sig.	.156
aroma formula 5	36	4.22	1.692	1	7	a. Friedman Test	

#### 3. Tekstur

Descriptive Statistics						Test Statistics <sup>a</sup>	
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum		
tekstur formula 1	36	3.39	1.678	1	7	N	36
tekstur formula 2	36	3.39	1.554	1	6	Chi-Square	7.136
tekstur formula 3	36	3.56	1.501	1	7	df	4
tekstur formula 4	36	4.25	1.500	2	7	Asymp. Sig.	.129
tekstur formula 5	36	3.97	1.765	1	7	a. Friedman Test	

#### 4. Rasa

Descriptive Statistics						Test Statistics <sup>a</sup>	
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum		
rasa formula 1	36	4.22	1.396	2	7	N	36
rasa formula 2	36	4.56	1.157	1	6	Chi-Square	20.397
rasa formula 3	36	4.97	1.158	2	7	df	4
rasa formula 4	36	5.25	1.228	2	7	Asymp. Sig.	.000
rasa formula 5	36	4.42	1.811	1	7	a. Friedman Test	

5. *Over All*

Descriptive Statistics						Test Statistics <sup>a</sup>	
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum		
over all formula 1	36	4.22	1.514	2	7	N	36
over all formula 2	36	4.94	1.068	3	7	Chi-Square	21.217
over all formula 3	36	5.14	1.125	3	7	df	4
over all formula 4	36	5.17	1.231	2	7	Asymp. Sig.	.000
over all formula 5	36	4.47	1.665	1	7	a. Friedman Test	

6. Uji Hedonik

Descriptive Statistics						Test Statistics <sup>a</sup>	
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum		
hedonik formula 1	36	6.28	1.701	4	9	N	36
hedonik formula 2	36	6.86	1.355	5	10	Chi-Square	11.559
hedonik formula 3	36	7.11	1.753	3	11	df	4
hedonik formula 4	36	7.22	1.973	1	11	Asymp. Sig.	.021
hedonik formula 5	36	7.06	2.069	3	11	a. Friedman Test	

## E. Hasil Uji Laboratorium

### 1. Formulasi 1 (100:0)



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

#### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No.28 Makassar 90231

Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

#### LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.4814/LU-BBIHP/VII/2018

Nomor Analisis : P. 3773  
Tanggal Penerimaan : 04 Juli 2018  
Nama Contoh : Roti  
Keterangan Contoh : Kode 687.863.4, Kemasan Plastik, Perbandingan 1:0 (100% Rumput Laut:0% Tempe), Keadaan Contoh Baik, Untuk Analisis Kimia  
Nama Pelanggan : A. Mahirah Humaerah  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo Samata  
Pengambilan Contoh : -  
Berita Acara : -  
Tanggal Analisis : 04 Juli 2018  
Tanggal Penerbitan : 27 Juli 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Protein	%	Simplo: 8,22 Duplo: 8,25 Tripto: 8,27	SNI 01-2891-1992
Karbohidrat	%	Simplo: 48,87 Duplo: 48,96 Tripto: 49,05	SNI 01-2891-1992
Kadar Air	%	Simplo: 21,15 Duplo: 21,15 Tripto: 21,12	SNI 01-2891-1992
Kadar Lemak	%	Simplo: 7,69 Duplo: 7,73 Tripto: 7,71	SNI 01-2891-1992
Kadar Abu	%	Simplo: 1,63 Duplo: 1,63 Tripto: 1,63	SNI 01-2891-1992
Besi (Fe)	mg/kg	Simplo: 18,2211 Duplo: 18,2164 Tripto: 18,2608	SNI 01-2896-1998



Manajer Mutu,

DAWATI

## 2. Formulasi 2 (75:25)



### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No.28 Makassar 90231

Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

#### LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.4812/LU-BBIHP/VII/2018

Nomor Analisis : P. 3771  
Tanggal Penerimaan : 04 Juli 2018  
Nama Contoh : Roti  
Keterangan Contoh : Kode 687.863.2, Kemasan Plastik, Perbandingan 1:3 (25% Rumput Laut:75% Tempe), Keadaan Contoh Baik, Untuk Analisis Kimia  
Nama Pelanggan : A. Mahirah Humaerah  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo, Samata  
Pengambilan Contoh : -  
Berita Acara : -  
Tanggal Analisis : 04 Juli 2018  
Tanggal Penerbitan : 27 Juli 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Protein	%	Simplo: 11,39 Duplo: 11,47 Tripto: 11,40	SNI 01-2891-1992
Karbohidrat	%	Simplo: 56,06 Duplo: 56,15 Tripto: 56,10	SNI 01-2891-1992
Kadar Air	%	Simplo: 23,52 Duplo: 23,48 Tripto: 22,79	SNI 01-2891-1992
Kadar Lemak	%	Simplo: 7,82 Duplo: 8,09 Tripto: 7,90	SNI 01-2891-1992
Kadar Abu	%	Simplo: 1,37 Duplo: 1,37 Tripto: 1,37	SNI 01-2891-1992
Besi (Fe)	mg/kg	Simplo: 16,7176 Duplo: 16,7316 Tripto: 16,9740	SNI 01-2896-1998



### 3. Formulasi 3 (50:50)



#### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No.28 Makassar 90231

Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

#### LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.4811/LU-BBIHP/VII/2018

Nomor Analisis : P. 3770  
Tanggal Penerimaan : 04 Juli 2018  
Nama Contoh : Roti  
Keterangan Contoh : Kode 687.863.1, Kemasan Plastik, Perbandingan 1:1 (50% Rumput Laut:50% Tempe), Keadaan Contoh Baik, Untuk Analisis Kimia  
Nama Pelanggan : A. Mahirah Humaerah  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo, Samata  
Pengambilan Contoh : -  
Berita Acara : -  
Tanggal Analisis : 04 Juli 2018  
Tanggal Penerbitan : 27 Juli 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Protein	%	Simplo: 10,25 Duplo: 10,32 Tripto: 10,27	SNI 01-2891-1992
Karbohidrat	%	Simplo: 54,33 Duplo: 54,32 Tripto: 54,34	SNI 01-2891-1992
Kadar Air	%	Simplo: 22,13 Duplo: 21,21 Tripto: 21,00	SNI 01-2891-1992
Kadar Lemak	%	Simplo: 8,89 Duplo: 8,80 Tripto: 8,74	SNI 01-2891-1992
Kadar Abu	%	Simplo: 1,52 Duplo: 1,52 Tripto: 1,52	SNI 01-2891-1992
Besi (Fe)	mg/kg	Simplo: 20,9190 Duplo: 20,9716 Tripto: 20,8367	SNI 01-2896-1998



#### 4. Formulasi 4 (25:75)



### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No.28 Makassar 90231

Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

#### LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.4812/LU-BBIHP/VII/2018

Nomor Analisis : P. 3771  
Tanggal Penerimaan : 04 Juli 2018  
Nama Contoh : Roti  
Keterangan Contoh : Kode 687 863.2, Kemasan Plastik, Perbandingan 1:3 (25% Rumput Laut:75% Tempe), Keadaan Contoh Baik, Untuk Analisis Kimia  
Nama Pelanggan : A. Mahirah Humaerah  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo, Samata  
Pengambilan Contoh : -  
Berita Acara : -  
Tanggal Analisis : 04 Juli 2018  
Tanggal Penerbitan : 27 Juli 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Protein	%	Simplo: 11,39 Duplo: 11,47 Triplo: 11,40	SNI 01-2891-1992
Karbohidrat	%	Simplo: 56,06 Duplo: 56,15 Triplo: 56,10	SNI 01-2891-1992
Kadar Air	%	Simplo: 23,52 Duplo: 23,48 Triplo: 22,79	SNI 01-2891-1992
Kadar Lemak	%	Simplo: 7,82 Duplo: 8,09 Triplo: 7,90	SNI 01-2891-1992
Kadar Abu	%	Simplo: 1,37 Duplo: 1,37 Triplo: 1,37	SNI 01-2891-1992
Besi (Fe)	mg/kg	Simplo: 16,7176 Duplo: 16,7316 Triplo: 16,9740	SNI 01-2896-1998



Manajer Mutu,

IDAWATI

## 5. Formulasi 5 (0:100)



### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No.28 Makassar 90231

Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

#### LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.4815/LU-BBIHP/VII/2018

Nomor Analisis : P. 3774  
Tanggal Penerimaan : 04 Juli 2018  
Nama Contoh : Roti  
Keterangan Contoh : Kode 687.863.5, Kemasan Plastik, Perbandingan 0:1 (0% Rumput Laut :100% Tempe), Keadaan Contoh Baik, Untuk Analisis Kimia  
Nama Pelanggan : A. Mahirah Humaerah  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo, Samata  
Pengambilan Contoh : -  
Berita Acara : -  
Tanggal Analisis : 04 Juli 2018  
Tanggal Penerbitan : 27 Juli 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Protein	%	Simplo: 9,96 Duplo: 9,92 Tripto: 9,95	SNI 01-2891-1992
Karbohidrat	%	Simplo: 53,95 Duplo: 54,02 Tripto: 54,01	SNI 01-2891-1992
Kadar Air	%	Simplo: 25,70 Duplo: 25,05 Tripto: 24,72	SNI 01-2891-1992
Kadar Lemak	%	Simplo: 8,80 Duplo: 8,87 Tripto: 8,70	SNI 01-2891-1992
Kadar Abu	%	Simplo: 0,91 Duplo: 0,91 Tripto: 0,91	SNI 01-2891-1992
Besi (Fe)	mg/kg	Simplo: 10,8117 Duplo: 10,8531 Tripto: 10,7855	SNI 01-2896-1998



Manajer Mutu,

IDAWATI

## F. Dokumentasi Penelitian

### 1. Pengambilan Sampel



### 2. Proses Pembuatan Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulerpa racemosa*)

#### Substitusi Tempe



*Bahan-bahan pembuatan roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe*



*Proses penghalusan, pengadukan dan pencaempuran bahan roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe*



*Proses fermentasi, penimbangan, pencetakan dan pemanggangan adonan roti rumput laut lawi-lawi (*Ceulerpa racemosa*) substitusi tempe*

### 3. Uji Organoleptik



### 4. Uji Laboratorium

#### a. Kadar Karbohidrat dengan Metode *Luff Scrool*



*Proses preparasi, penyaringan, pemanasan menggunakan kondensor dan titrasi menggunakan larutan Luff pada sampel uji karbohidrat.*

#### b. Kadar Protein dengan Metode *Kjedahl*



*Proses pemanasan, penambahan tablet Khedahl, destruksi dan destilasi pada sampel uji protein.*

#### c. Kadar Lemak dengan metode *Gravimetri*



*Proses hidrolisis, soxhletasi, ekstraksi menggunakan hotplate dan pemisahan pelarut dengan lemak menggunakan rotavapor pada sampel uji lemak.*

#### d. Kadar Fe dengan metode AAS



*Proses penambahan  $\text{HNO}_3$  di lemari asam, pemanasan, pendinginan menggunakan desikator dan pembacaan menggunakan AAS pada sampel uji Fe.*

#### e. Kadar Air



*Proses penimbangan, pengovenan, dan pendinginan menggunakan desikator pada sampel uji kadar air.*

**G. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 53 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411) 8511879 Fax. 0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-<sup>2016. A</sup> /FKIK/PP.00.9/06/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Gowa, 28 Juni 2018

Kepada Yth.  
Kepala Batai Besar Hasil Industri Perkebunan

di-  
Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin untuk mengadakan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : A. Manira Humaerah  
NIM : 70200114040  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Judul Penelitian : Analisis kandungan Gal Rupi Rimpun dari Lawi-Lawi (Culerpa Racemosa) Substitusi Tempe Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dosen Pembimbing : 1. Syarifani, SKM., M.Kes.  
2. Dwi Santy Damayanti, SKM., M.Kes.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam



Dean Bid. Akademik

**BARASATI Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.**  
16405 2000604 2 003

Tembusan :  
1. Masing-masing Pembimbing  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip

**H. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITASN NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
Alamat: Jl. Dueng Tuta Raya Parzongtambung Makassar Telp. (0411) 864935 - Fax. (0411) 861507

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 308 /UN 36.2/PKK/V/2018

Pimpinan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga:

Nama : Dra. Srikandi, M.Pd  
NIP : 195806131986032002  
Jabatan : Ketua Jurusan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A. Mahirah Humacrah  
Nim : 70200114040  
Progran Studi : Kesehatan Masyarakat  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN

Telah melakukan uji organoleptik di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan Judul:

*"Analisis Kandungan Roti Rumput laut lawi (Ceuterpa racemosa) substitusi Tempe sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat"*

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## I. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian dari Balai Besar Industri

### Hasil Perkebunan Makassar



#### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

Jalan Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No.28 Makassar 90231 Kotak Pos: 1143 Telp: (0411) 441207  
Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhip.kemenperin.go.id E-mail: bbhip@bbhip.kemenperin.go.id

Nomor : 2117 /BPPI/BBIHP.2/6/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 29 Juni 2018

Yth : Dekan  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Makassar  
Di -

Gowa


Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Makassar Nomor: B-2082/FKIK/PP.00.9/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia memberi izin Penelitian mahasiswa atas nama :

Nama : A. Mahirah Humaerah  
NIM : 70200114040  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin  
Judul Penelitian : Analisis Kandungan Gizi Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulepa Racemosa*) Substitusi Tempe sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat. Sangkaropi, Sulawesi Selatan.

dengan ketentuan bahwa Mahasiswi yang melaksanakan Penelitian dapat mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan,  
& Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik

  
M. Nilzam

Tembusan :  
1. Ka. BBIHP (sebagai laporan);  
2. Kabag Tata Usaha;  
3. Kabid PK;  
4. Pertiinggal.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama A. Mahirah Humaerah. Lahir dari orang tua A. Muhammad Mursyid Ismail dan A. Thahirah Shaleh sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Lalabata Indah, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 23 Oktober 1996. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Negeri Pembina Soppeng (lulus tahun 2002), SDN 06 Ujung Baru Soppeng (lulus tahun 2008), MTs DDI Lil-Banat Pare-Pare (lulus tahun 2011), MAN 1 Watansoppeng (lulus tahun 2013) dan penulis sekarang aktif sebagai mahasiswa semester VIII di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Gizi.

Pengalaman organisasi penulis didapatkan sejak duduk di bangku sekolah hingga sekarang yaitu penulis pernah aktif sebagai pengurus OSIS di MTs maupun di MAN dan pengurus HMJ Kesehatan Masyarakat. Sekarang penulis aktif sebagai pengurus LDF Al-‘Aafiah FKIK UINAM dan FORMAGIZ (Forum Mahasiswa dan Alumni Gizi) UINAM.