

PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK *Lactobacillus plantarum* TERHADAP STATUS HEMATOLOGI BROILER



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WAHYUNI MENTARI
60300114143

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni Mentari
NIM : 60300114143
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung pandang/ 04 Oktober 1996
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Mamoa Baru No. 10 A makassar
Judul : Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum*
terhadap Status Hematologi Broiler.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 November 2018

Penyusun,

Wahyuni Mentari

NIM: 60300114143

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* Terhadap Status Hematologi Broiler”, yang disusun oleh Wahyuni Mentari, NIM: 60300114143, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 19 November 2018 M.
11 Rabiul Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hafsan, S.S.i., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah melalui proses pengerjaan yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini dapat juga terselesaikan. Untuk itu, penulis memanjatkan segala pujian dan rasa syukur tertinggi atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dialah Allah, Tuhan semesta alam yang mengajarkan kepada manusia semua ilmu di muka bumi ini.

Dia pulalah yang memberikan potensi kesuksesan kepada manusia. Memberikan akal, penglihatan, pendengaran dan hati kepada manusia untuk dapat meraih sesuatu yang diinginkan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada para Nabi, para Rasul dan pengikut mereka hingga akhir zaman. Salawat dan salam paling sempurna semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang tak kenal lelah menyampaikan risalah, amanat dan nasehat kepada seluruh manusia. Semoga Allah memberinya kebaikan, wasilah, keutamaan, kemuliaan dan kedudukan yang terpuji.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Tidak mungkin menyebutkan mereka satu persatu di sini. Meskipun begitu, pihak yang secara langsung terkait dan berjasa dalam pengerjaan tulisan ini harus disebutkan. Namun, penulis memohon pengertian mereka yang seharusnya disebutkan namun tak disebutkan karena keterbatasan ruang.

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam dan tulus kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Ir. Tasir, S.Hi dan ibunda Hj.

Maryam yang senantiasa merawat dan mendidik penulis dari kecil hingga sekarang. Terutama bagi ibu penulis semoga Allah senantiasa memberikan tempat terbaik. Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih penulis tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya. Untuk ayahanda tercinta, pengertian, motivasi dan doa yang selalu engkau panjatkan senantiasa penulis ingat, kagumi dan hormati.

Selanjutnya, penulis sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku ketua jurusan Biologi serta sekretaris Jurusan Biologi atas segala ilmu, petunjuk serta arahannya selama berkuliah di UIN Alauddin.
4. Ibunda Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd selaku pembimbing I dan Ibunda St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi yang senantiasa menyisihkan sedikit waktu-waktunya yang berharga untuk

membimbing penulis. Saran-saran serta kritik-kritik mereka sangat bermanfaat dalam merampungkan skripsi ini.

5. Ibunda Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. selaku pembahas I, yang telah memberikan saran, kritik dan bantuan baik dari segi moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag. selaku pembahas II.
6. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
7. Kepala Laboratorium dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan saya wadah dalam melakukan praktikum serta banyak pengenalan dan pengalaman dalam laboratorium.
8. Dokter Ida dan Kakanda Dewi di Makassar Pet Klinik yang senantiasa membimbing selama penelitian berlangsung.
9. Kepada Kak Ati Staf di Jurusan Biologi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis. Senantiasa meluangkan waktunya dalam hal mengurus persuratan dan sebagainya.
9. Kepada kedua orang tua saya, Ibu dan Ayah yang telah mendidik saya, memberikan motivasi, senantiasa memberikan semangat dan doa'nya. Dukungan moral serta materi Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir.

10. Kepada saudara dan saudari dari ibu dan ayah saya Tante, Paman, sepupu yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
11. Kepada Ibunda mursalim yang senantiasa membantu menjaga ayam-ayam penulis baik dari segi memberi makan, dan lain sebagainya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
12. Saudara-Saudari seperjuanganku Tim Bal Ayam Siti Suraya Asti, Mursalim dan Rahmat Fajrin Alir yang senantiasa berjuang sama-sama, saling memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. kepada teman se-Angkatan (LACTEAL) yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
14. Kakak-kakak Alumni dari angkatan Pioner sampai dengan Brachialis serta Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi Impuls, Imunoglobulin dan Inter Neuron atas bantuan, dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
15. Teman-teman KKN-57 di Kabupaten Soppeng, Kecamatan Liliriaja, khususnya di Desa Rompegading yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
16. Kakak-Kakak, Teman-teman dan Adik-adik di HMI kom. Saintek cabang gowa raya dan KSR PMI UNIT 107 Uinam yang telah memotivasi dan memaklumi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

17. Sahabat-sahabatku Ridha, husnul, indah, dan fahry yang selalu ada saat suka maupun dukanya penulis.

17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya sehubungan dengan pengumpulan bahan-bahan untuk membuat skripsi ini.

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran, kritikan atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam skripsi ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, skripsi ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Samata, 19 November 2018

Wahyuni Mentari
NIM: 60300114143

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Ayat yang Relevan.....	9
B. Tinjauan Umum Broiler.....	13
C. Tinjauan Umum Hematologi.....	18
D. Tinjauan Umum Profil dan Komponen Broiler.....	20
E. Tinjauan Umum Probiotik.....	25
F. Tinjauan Umum <i>Lactobacillus plantarum</i>	30
G. Hipotesis.....	32

H. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Variabel Penelitian.....	34
D. Defenisi Operasional Variabel.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Intsrumen Penelitian (Alat dan Bahan).....	35
G. Prosedur Kerja.....	36
H. Analisis data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
KEPUSTAKAAN.....	58
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Nilai Normal Komponen Darah pada Broiler Umur 35 hari.....	22
Tabel 3.1. Jenis Perlakuan Hewan Uji.....	38
Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Kadar Hematokrit UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik <i>L. plantarum</i>	43
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Kadar Hemoglobin UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik <i>L. plantarum</i>	44
Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik Kadar Eritrosit UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik <i>L. plantarum</i>	45
Tabel 4.4. Hasil Uji Statistik Rerata Pertumbuhan Bobot Badan Broiler UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik <i>L. plantarum</i>	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Broiler.....	18
Gambar 3.1. Bentuk Kamar Hitung Eritrosit.....	40
Gambar 4.1. Nilai Hematokrit (%) Darah Broiler yang diberi Probiotik <i>Lactobacillum plantarum</i>	42
Gambar 4.2. Kadar Hemoglobin (g%) broiler yang diberi probiotik <i>Lactobacillus plantarum</i>	44
Gambar 4.3. Jumlah Eritrosit ($10^6 \times \text{mm}^3$) broiler yang diberi probiotik <i>Lactobacillus plantarum</i>	45
Gambar 4.4. Pertambahan Bobot Badan Broiler yang diberi probiotik <i>Lactobacillus plantarum</i>	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rerata Nilai Hematokrit (%) Broiler.....	63
Lampiran 2. Rerata Kadar Hemoglobin (%) Broiler.....	63
Lampiran 3. Rerata Jumlah Eritrosit Broiler.....	63
Lampiran 4. Bobot dan pertumbuhan berat badan broiler (g/ekor).....	65
Lampiran 5. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada Kadar Hematokrit Broiler Umur 35 Hari.....	66
Lampiran 6. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada Kadar Hemoglobin Broiler Umur 35 Hari.....	67
Lampiran 7. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada Jumlah Eritrosit Broiler Umur 35 Hari.....	68
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	69
Lampiran 9. Alat dan Bahan Penelitian.....	72
Lampiran 10. Petunjuk Penggunaan RT- 7600.....	75



ABSTRAK

Nama : Wahyuni Mentari

NIM : 60300114143

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap Status Hematologi Broiler

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap status hematologi pada broiler. Status hematologi broiler dapat diketahui dengan melihat kadar gambaran darah.. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Sebagai perlakuan adalah pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* secara oral masing- masing sebanyak 2 ml yang terdiri dari P₀ (Pemberian hanya dengan Aquadest), P₁ (Pemberian probiotik *L. plantarum* dengan konsentrasi 10⁶), P₂ (Pemberian probiotik *L. plantarum* dengan konsentrasi 10⁸), dan P₃ (Pemberian probiotik *L. plantarum* dengan konsentrasi 10¹⁰). Pemeliharaan broiler dilakukan selama 35 hari untuk pemeriksaan jumlah hematokrit, hemoglobin dan eritrosit. Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan software SPSS menggunakan uji ANOVA dan diuji lanjut apabila terdapat perbedaan diantara perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan tidak berbeda secara signifikan (P> 0,05) terhadap semua variabel yang diamati (Hematokrit, hemoglobin dan eritrosit). Pemberian probiotik *L. plantarum* hasil isolasi dari dangke tidak berpengaruh terhadap status hematologi broiler.

Katakunci: *Lactobacillus plantarum*, Status hematologi, Broiler

ABSTRACT

Name : Wahyuni Mentari

SSN : 60300114143

Essay title : **The Effect of Giving Probiotics of *Lactobacillus plantarum* on Hematological Status in Broiler.**

This research aimed to determine the effect of giving probiotics of *Lactobacillus plantarum* on hematological status in broiler. Broiler hematology status can be known by looking at blood levels. This research used completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 replications. As the treatment is giving *Lactobacillus plantarum* orally 2 milliliters each of them with consisting of P₀ (giving only with Aquadest), P₁ (giving of probiotics *L. plantarum* with concentration 10⁶ cfu/ml), P₂ (giving of probiotics *L. plantarum* with concentration 10⁸ cfu/ml), and P₃ (giving of probiotics *L. plantarum* with concentration 10¹⁰ cfu/ml). Broiler maintenance is carried out for 35 days for checking the amount of hematocrit, hemoglobin, erythrocytes. The data obtained were analyzed statistically using SPSS software and ANOVA test and tested further if there were differences in treatment. The result of research showed that in general the treatment did not differ significantly (P>0,05) to all variables which observed (hematocrit, hemoglobin, and erythrocytes). Giving probiotics *L. plantarum* as a result of isolation from dangke did not effect the hematological status of broiler.

Keyword: *Lactobacillus plantarum*, Hematological status, Broiler

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt telah menciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya binatang ternak serta hasil ikutan-nya bukan tanpa maksud dan tujuan, di dalamnya memiliki manfaat masing-masing. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman di dalam QS. Shad/ 38:27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ ۚ ۲۷

Terjemahnya:

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam Tafsir Al- Misbah Allah swt. memberitahukan tentang sempurnanya hikmah (kebijaksanaan)-Nya dalam menciptakan langit dan bumi, dan bahwa Dia tidaklah menciptakan keduanya sia-sia (tanpa hikmah, faedah dan maslahat). Mereka beranggapan dengan anggapan yang tidak layak dengan kebesaran Allah swt. Allah swt menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan untuk kebenaran, Dia menciptakan keduanya (langit dan bumi) untuk memberitahukan kepada manusia sempurnanya ilmu-Nya, kemampuan-Nya, luasnya kekuasaan-Nya, dan bahwa Dia yang berhak disembah tidak selain-Nya yang tidak mampu menciptakan apa-apa, dan

bahwa Allah akan memutuskan masalah yang terjadi antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Allah swt juga memerintahkan agar sah- nya kita menggunakan atau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Hal ini semata-mata untuk kepentingan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia.

Pernyataan di atas sesuai pula dengan firman Allah swt dalam QS al-Nahl/16:5 yang berbunyi:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan (Kementerian Agama RI,2012).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba. Telah diciptakan untuk kalian unta, sapi, kambing, dan ayam yang bulu dan rambutnya bisa dipakai untuk menghangatkan badan, dan dagingnya bisa dimakan untuk kelangsungan hidup manusia. Allah swt menciptakan berbagai macam jenis binatang di dunia berupa binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, domba.dan ayam yang mempunyai banyak manfaat dan dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian dan makanan manusia. Dan Allah swt jadikan pula untuk mereka kemaslahatan dan memanfaatkan yang terdapat pada binatang itu (Shihab, 2008).

Dalam Tafsir Al- Maraghi, Allah swt. menyebutkan nikmat yang dia limpahkan kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia menciptakan binatang ternak untuk mereka. Allah pun telah menjadikan binatang-binatang ternak itu berbagai manfaat dan kegunaan buat mereka, yaitu bulunya mereka jadikan pakaian dan hampan, air susunya mereka minum, dan anak-anaknya mereka makan, serta pandangan mereka sebagai perhiasan buat mereka.

Salah satu hewan ternak yang juga merupakan ciptaan Allah swt dan mempunyai manfaat yang banyak bagi manusia yaitu hewan ternak ayam. Usaha ternak ayam merupakan salah satu usaha peternakan unggas yang cukup berkembang di Indonesia (Direktorat jendral perternakan, 2012). Usaha peternakan ayam di Indonesia juga telah lama dikenal masyarakat, baik dikalangan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan ternak ayam telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk dan serta kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bernilai gizi tinggi, menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan dan kebutuhan protein hewani. Salah satu cara alternatif dalam pengembangan permintaan masyarakat akan kebutuhan protein hewani adalah pengembangan usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) secara kontinu (Rasyaf, 2003).

Tetapi pengembangan usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) sering mengalami berbagai kendala seperti rendahnya produktivitas dikarenakan lambatnya pertumbuhan. Peningkatan produktivitas ayam adalah melalui pemberian pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas harganya relatif lebih mahal, sehingga diperlukan

manipulasi nutrisi untuk mengoptimalkan biaya pakan dengan memaksimalkan produksi (Astuti; dkk, 2015).

Alternatif yang semakin populer saat ini dalam industri pakan ternak, yaitu penggunaan bahan-bahan alami yang dapat mengurangi penggunaan antibiotik sintetik, seperti tanaman-tanaman herbal dan mikroba yang bersifat probiotik. Mikroba-mikroba isolat lokal yang bersifat probiotik telah banyak diisolasi, namun belum banyak diaplikasikan kepada ternak, khususnya ayam ras pedaging (Hidayat, 2008).

Pengolahan pangan dan pakan menggunakan BAL adalah teknologi yang telah ada sejak dulu yang dapat meningkatkan kandungan obat dan anti penyakit serta mencegah kebusukan dan perjangkitan penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Salah satu usaha untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas ayam adalah dengan manipulasi nutrisi untuk memaksimumkan pasokan nutrient sesuai dengan genetiknya, yaitu dengan menambahkan bahan pakan aditif berupa suplemen probiotik (Denny, 2011).

Probiotik merupakan suatu produk yang mengandung mikroba hidup non patogen yang diberikan kepada ternak untuk memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi konversi ransum dan kesehatan ternak (Ali, dkk., 2013). Salah satu sumber bakteri isolat lokal yang telah diuji kemampuannya secara *in vitro* sebagai kandidat probiotik yaitu *Lactobacillus plantarum*. Bakteri tersebut termasuk kelompok bakteri asam laktat (BAL) yang diisolasi dari limbah pembuatan dangke di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan (Nur, 2017).

Fungsi probiotik selain meningkatkan efisiensi ransum, produksi telur dan menurunkan kadar kolesterol telur serta kolesterol serum, ternyata probiotik juga mampu menurunkan nitrogen non protein dalam darah, konsentrasi asam urat, ammonia dan urea dalam darah (Denny, 2011).

Kesehatan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam broiler. Ayam yang sehat akan efisien mengkonversikan pakan yang dikonsumsi menjadi daging, karena energi yang diperoleh dari pakan dapat sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan. Gambaran darah merupakan salah satu parameter dari status kesehatan hewan karena darah merupakan komponen yang mempunyai fungsi penting dalam pengaturan fisiologis tubuh. Fungsi darah secara umum berkaitan dengan transportasi komponen di dalam tubuh seperti nutrisi, oksigen, karbon dioksida, metabolit, hormon, panas dan imun tubuh. Sedangkan fungsi tambahan dari darah berkaitan dengan keseimbangan cairan dan pH tubuh (Reece, 2006).

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menilai status kesehatan ayam broiler, salah satunya melalui penilaian/ pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan darah dan komponen-komponennya yang bertujuan untuk mendeteksi kelainan dimana diduga ada kelainan jumlah dan fungsi dari sel-sel darah (Khan and Zafar, 2005).

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap jumlah eritrosit, leukosit, hematokrit, dan kadar hemoglobin broiler dan

untuk mengetahui pada konsentrasi terbaik berapa pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* berpengaruh terhadap jumlah eritrosit, hematokrit, dan kadar hemoglobin broiler .

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap status hematologi broiler?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Pada penelitian ini probiotik *Lactobacillus plantarum* koleksi Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang diperoleh dari hasil isolasi bakteri asam laktat yang terdapat pada dangke.
2. Status kesehatan hematologi yang bakal meliputi pemeriksaan jumlah hematokrit, hemoglobin dan eritrosit darah broiler yang diuji dengan penambahan atau suplementasi bakteri asam laktat hasil isolasi dari pembuatan dangke.
3. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Pemeliharaan broiler di Pannujuang Desa Kalamandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan pemeriksaan hematologi di Makassar Pet Klinik.

D. *Kajian Pustaka*

1. Daud (2005), performan ayam pedaging yang diberi probiotik dan prebiotik dalam ransum bertujuan untuk melihat respon performan ayam pedaging dari penambahan probiotik, prebiotik dan kombinasi keduanya sebagai pengganti antibiotik dalam ransum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penambahan probiotik dan prebiotik baik secara terpisah maupun kombinasi keduanya dalam ransum tidak mempengaruhi performan ayam pedaging umur enam minggu, namun baik digunakan sebagai pengganti antibiotik. Penambahan probiotik, prebiotik dan kombinasi keduanya baik digunakan untuk menggantikan antibiotik dalam ransum karena tidak menimbulkan residu metabolik dalam jaringan ternak.
2. Hidayat (2008). Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendapatkan kemungkinan penggunaan *Bacillus* spp. Sebagai probiotik dalam memperbaiki performans ternak ayam ras pedaging, (2) Mengkaji berapa dosis *Bacillus* spp. yang efektif dan efisien dalam memperbaiki performans ayam ras pedaging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian antibiotik zinc-bacitracin 50 mg, probiotik *Bacillus* spp. 50 mg/kg pakan (8×10^8 CFU), dan Probiotik *Bacillus* spp. 60 mg/kg pakan ($11,2 \times 10^8$ CFU) berpengaruh nyata ($P < 0.05$) terhadap konsumsi pakan, pertambahan berat badan, dan konversi pakan, tetapi tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase lemak abdominal, berat karkas, panjang sekum, haemoglobin, dan hematokrit. Sedangkan perlakuan control tidak ada yang berpengaruh nyata ($P > 0.05$).

3. Duka, dkk. (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemberian probio FM^{plus} berpengaruh terhadap hemoglobin, hematokrit, eritrosit dan leukosit dan untuk mengetahui pada level terbaik berapa pemberian probio FM^{plus} berpengaruh terhadap hemoglobin, hematokrit, eritrosit dan leukosit. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian probio FM^{plus} pada broiler tidak berpengaruh terhadap hemoglobin, hematokrit, eritrosit dan leukosit. Level pemberian probio FM^{plus} pada broiler tidak berpengaruh terhadap status hematologis.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap status hematologi broiler.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber informasi bagi ilmu mikrobiologi dalam memanfaatkan BAL asal dangke tersebut sebagai probiotik yang mampu menjaga kestabilan kesehatan pada broiler.
2. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan probiotik khususnya *Lactobacillus plantarum* yang berhasil diisolasi dari dangke.
3. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler sehingga dapat menerapkan tambahan pakan probiotik *Lactobacillus plantarum* bagi broiler agar kualitas daging yang dijual semakin meningkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ayat lain yang Relevan

Dalam Islam, kesehatan termasuk hal utama. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan tentang makan-makanan yang halal untuk mendukung kesehatan. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman di QS al- Baqarah/ 2: 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan; karena sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, QS. Al- Baqarah/2: 168 Setelah Allah swt. menjelaskan bahwasanya tiada sembahyan yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalari syaitan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan

para pengikutnya.

Petunjuk lain yang ditemukan dalam Al- Quran berkaitan dengan perintah makan terdapat pada surah Abasa/ 80: 24 sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (Kementerian Agama, 2012).

Selain itu, dalam surah al- Maidah/5 : 3 disebutkan pula larangan atau keharaman makan daging babi, darah segar, makan bangkai, dan lain sebagainya yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada- Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat- Ku bagimu, dan telah aku ridhai islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar

bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Kementerian Agama RI, 2012).

Berdasarkan ayat diatas dalam Tafsir Al- Jalalain (Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak (daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah) misalnya disembelih atas nama lain- Nya (yang tercekik) yang mati karena tercekik (yang dipukul) yang dibunuh dengan jalan memukulnya (yang jatuh) dari atas ke bawah lalu mati (yang ditanduk) yang mati karena tandukan lainnya (yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih) maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih (dan yang disembelih atas) nama (berhala) jamak dari nishab; artinya patung (dan mengundi nasib) artinya menentukan bagian dan keputusan (dengan anak panah) azlaam jamak dari zalam atau zulam; artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada tujuh buah disimpan oleh pengurus ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman, jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan. (Demikian itu adalah kefasikan) artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah masa haji wadak, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu) yakni hokum-hukum dan kewajiban-kewajibannya (dan telah Kucukupkan padamu nikmat karunia-Ku) yakni dengan menyempurnakannya dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota mekah dalam keadaan aman (dan telah kuridai) artinya telah kupilih (islam itu sebagai

agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan) untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya (tanpa cenderung) atau sengaja (berbuat dosa) atau maksiat (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadapnya atas perbuatan memakannya itu (lagi Maha Pengasih) kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu.

Berdasarkan ayat di atas Allah swt. menganjurkan agar kita memilih makanan yang baik. Tentunya, baik untuk tubuh dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Sebaliknya, bila makanan tidak dipilih dengan baik, tubuh akan mengalami kekurangan zat gizi esensial tertentu.

Berdasarkan ayat di atas Allah swt juga memberitahukan kepada hamba-hamba Nya melalui kalimat yang didalamnya terkandung larangan memakan bangkai- bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Hal ini dikarenakan padanya terkandung mudarat (bahaya), mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap di dalam tubuhnya, hal ini berbahaya bagi agama dan tubuh.

Seorang muslim akan makan hanya hewan yang disembelih, darah akan terpisah dari daging. Sebagaimana, bahwa terdapatnya darah pada saluran pencernaan makanan (perut) dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya karena naiknya kadar amoniak dalam darah yang dapat mengakibatkan penyakit lever. Demikian juga,

bangkai yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya, seperti TBC, kuman, kanker hati, penyakit- penyakit itu dapat terjadi pada manusia yang makan bangkai selama kuman- kuman penyakit itu melekat di dalamnya.

Adapun kaitan ayat di atas dengan penelitian ini adalah kesehatan termasuk hal utama. Bahaya makanan terhadap tubuh selalu berkaitan dengan bahan-bahan buatan yang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan gangguan kesehatan. Contohnya pada peternakan, penggunaan pakan dan minuman ternak yang selalu mengandung unsur kimia, suntikan, obat-obatan untuk mempercepat pertumbuhan dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Broiler

Broiler (ayam pedaging) merupakan jenis ternak yang banyak dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani dan sudah banyak dternakkan di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang menjadikannya mata pencaharian utama. Broiler merupakan ternak ayam yang cepat pertumbuhannya, hal ini karena broiler merupakan hasil budidaya yang menggunakan teknologi maju, yaitu hasil dari perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik, sehingga memiliki sifat-sifat ekonomi yang menguntungkan (Nopendika: dkk, 2013).

Broiler merupakan jenis unggas yang banyak dipelihara di dunia, dikenal dengan nama species *Gallus domesticus*. Broiler merupakan ayam ras unggulan dari hasil persilangan bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas tinggi, terutama

dalam memproduksi daging yang mampu tumbuh cepat dan dapat menghasilkan daging dalam waktu relative singkat (5-6 minggu) (Ardana, 2009).

Broiler adalah ayam tipe pedaging yang telah dikembangkan secara khusus untuk pemasaran secara dini. Menurut Rasyaf (1992) ayam pedaging adalah ayam jantan dan ayam betina muda yang berumur dibawah 6 sampai 8 minggu yang dipelihara secara intensif untuk mendapatkan produksi daging yang optimal.

Broiler tumbuh sebanyak 50-70 gram per hari pada hari minggu-minggu terakhir. Performan ayam broiler akan berbeda menurut tempat pemeliharaan. Daerah dataran tinggi suhu lingkungannya lebih rendah dibandingkan daerah dataran rendah. Selain faktor suhu, status penyakit pada suatu wilayah juga mempengaruhi performa terutama angka mortalitas.

Broiler seperti juga ternak umumnya, termasuk kelompok hewan homeothermis, artinya suhu tubuhnya relatif konstan walaupun suhu lingkungan berubah-ubah (Kusnadi, 2008).

Broiler mempunyai kisaran suhu optimal yang sempit. Kebutuhan temperature pada saat anakan sekitar 31°C dan berangsur-angsur menurun sampai 21°C, pada umur 17 sampai 20 hari (Sulistyoningsih, 2004)

Broiler memiliki ciri-ciri pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek dan menghasilkan daging berserat lunak, dada lebar dengan timbunan daging yang baik, warna daging lebih cerah dan dagingnya lebih empuk serta kenyal saat dipegang, kulit licin (lebih mengkilap) dan banyak lemak dilapisan bawah kulit terutama di daerah sekitar ekor serta kulit lebih mudah sobek, aktif,

lincah, mata dan muka cerah (tidak mengantuk), bebas dari penyakit, nafsu makan dan minum baik, bulu cerah dan tidak kusam serta tidak berdiri, kaki kokoh dan cara berdiri tegak, bentuk tubuh proporsional, sayap tidak jatuh, posisi kepala terangkat dengan baik, tidak terdengar gejala nafas bersuara (ngorok), berat badan sesuai umurnya (standar), berat badan seragam dan tidak ada luka ditubuhnya serta pada anusnya bersih (Fadilah, 2004).

Persyaratan mutu bibit broiler atau *Day Old Chick* (DOC) menurut SNI (2005), yaitu bobot DOC per ekor minimal 37 g dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ditemukan kelainan bentuk dan cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering. Warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan berkembang serta jaminan kematian DOC maksimal 2 %. Untuk mewujudkan kemampuan genetik broiler diperlukan pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pemberian pakan yang baik maka National Research Council (1994), membuat patokan kebutuhan nutrisi bagi broiler. Kebutuhan protein untuk umur 0-3 minggu, 3-6 minggu dan 6-8 minggu masing-masing 23%, 20% dan 18% pada tingkat ME 3200 kkal/kg (Hafsan, 2018).

Broiler mempunyai kelebihan dalam pertumbuhan dibandingkan dengan jenis ayam piaraan dalam klasifikasinya, karena broiler mempunyai kecepatan yang sangat tinggi dalam pertumbuhannya. Hanya dalam enam atau tujuh minggu saja, ayam tersebut sudah dapat dikonsumsi dan dipasarkan padahal ayam jenis lainnya masih sangat kecil, bahkan apabila broiler dikelola secara intensif sudah dapat diproduksi hasilnya pada umur lima minggu dengan berat badan mencapai 2 kilogram

per ekor (Gunawan dan sundari, 2003).

Hal-hal yang terus diperhatikan dalam pemeliharaan broiler antara lain perkandangan, pemilihan bibit, manajemen pakan, sanitasi dan kesehatan, recording dan pemasaran. Banyak kendala yang akan muncul apabila kebutuhan ayam tidak terpenuhi, antara lain penyakit yang dapat menimbulkan kematian, dan bila ayam dipanen lebih dari 8 minggu akan menimbulkan kerugian karena pemberian pakan sudah tidak efisien dibandingkan kenaikan atau penambahan berat badan, sehingga akan menambah biaya produksi (Gunawan dan sundari, 2003).

Broiler sebagai bangsa unggas umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh sebab itu ia harus makan dengan cara mengambil makanan yang layak baginya agar kebutuhan nutrisinya dapat dipenuhi. Menurut Suprijatna *et al.* (2005) pakan adalah campuran dari berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk ternak yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan zat-zat makanan dalam proses pertumbuhan. Ransum dapat diartikan sebagai pakan tunggal atau campuran dari berbagai bahan pakan yang diberikan pada ternak untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak selama 24 jam baik diberikan sekaligus maupun sebagian.

Beberapa kelebihan broiler yakni daging empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan pertambahan berat badan sangat cepat. Namun demikian, memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit, dan sulit beradaptasi (Rahmanto, 2012).

Faktor yang dapat mempengaruhi ransum pada ayam broiler, diantaranya yaitu temperature lingkungan, kesehatan ayam, tingkat energi ransum yang diberikan, sistem pemberian makanan pada ayam, jenis kelamin ayam dan genetik ayam (Ammrullah, 2004).

Pemeliharaan broiler ditujukan untuk mencapai beberapa sasaran yaitu tingkat kematian serendah mungkin, kesehatan ternak baik, berat timbangan setiap ekor setinggi mungkin dan daya alih makanan baik (hemat).

Kesehatan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam broiler. Ayam yang sehat akan dengan mudah mengkonversikan pakan yang dikonsumsi menjadi daging, karena energi yang diperoleh dari pakan dapat sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai status kesehatan ayam broiler melalui penilaian hematologi (Sugiarto, 2014).



Gambar 2. 1. Broiler

Adapun secara taksonomi broiler menurut Suprijatna, dkk (2005) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Galliformes
Famili : Phasianidae
Genus : *Gallus*
Spesies : *Gallus gallus domestic sp.*

C. Tinjauan Umum Hematologi

Hematologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang darah, dan salah satu bagian penting dalam proses diagnosa suatu penyakit serta berperan

dalam ilmu patologi klinis. Hematologi tidak hanya mencakup pemeriksaan yang berhubungan dengan sel darah dan plasmanya, tetapi juga mencakup jaringan asalnya, penyimpanan dan sirkulasi darah (Talebi *et. al.*, 2005).

Hematologi adalah kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni *haima*; arti *haima* di sini adalah darah. Jadi, hematologi dikenal sebagai sebuah cabang ilmu kesehatan di mana yang dipelajari khususnya adalah tentang darah, penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah dan juga organ-organ pembentuk darah.

Pemeriksaan hematologi dilakukan untuk berbagai macam fungsi, antara lain untuk menilai kondisi kesehatan secara umum, juga untuk melihat adanya tanda-tanda infeksi dan beragam penyakit.

Pada hematologi, segala gangguan darah, diagnosa, pengobatan, hingga cara mencegah penyakit yang menyerang darah adalah hal-hal utama untuk dipelajari. Dalam hal ini, hematologi mempelajari juga protein darah, sel darah, pembuluh darah, trombosit, serta hemoglobin. Limpa dan juga sumsum tulang yang merupakan organ penghasil darah juga termasuk.

Tujuan dari pemeriksaan hematologi ini pada dasarnya adalah tes untuk mendeteksi kelainan dari kualitas maupun kuantitas sel darah merah, trombosit dan sel darah putih. Tak hanya itu, pemeriksaan hematologi juga memiliki tujuan untuk menguji ada tidaknya perubahan yang terjadi di bagian plasma sebagai pendukung pembekuan darah. Pemeriksaan hematologi juga dinamakan dengan pemeriksaan sel

darah dan hal ini bakal meliputi tes kadar hematokrit, eritrosit, jumlah trombosit dan leukosit, serta nilai eritrosit rata-rata.

Dalam peternakan broiler, peranan hematologi juga sangat penting dalam menentukan kesehatan ayam. Diduga hewan yang dipelihara pada sistem manajemen yang berbeda termasuk komposisi pakan akan memiliki karakteristik hematologis yang berbeda pula. Parameter darah merupakan indeks utama untuk mengetahui status fisiologi, patologi, dan status gizi dari sebuah organisme. Perubahan nilai komponen penyusun darah dibandingkan nilai normal dapat digunakan untuk menafsirkan tingkat metabolisme hewan serta kualitas pakan (Dienye and Olumuji, 2014).

Dalam pemeriksaan hematologis khususnya pada unggas, timbul kesulitan untuk menghitung secara langsung jumlah leukosit per mm^3 darah. Hal ini disebabkan karena eritrosit dan trombosit unggas berinti, dan tidak hancur oleh larutan pengencer darah yang biasanya digunakan untuk menghitung jumlah leukosit pada mamalia, bahkan inti eritrosit dan trombosit akan mengambil warna yang sama dengan leukosit, sehingga sukar dibedakan dari leukosit.

D. Tinjauan Umum Profil dan Komponen Darah Broiler

Darah merupakan salah satu parameter dari status kesehatan hewan karena darah merupakan komponen yang mempunyai fungsi penting dalam pengaturan fisiologis tubuh.

Fungsi utama darah adalah mempertahankan homeostasis tubuh (Dellman dan Brown, 1992; Sonjaya, 2012). Frandson *et. al.* (2009) menjelaskan beberapa fungsi darah yakni membawa nutrisi dari saluran pencernaan menuju jaringan tubuh, membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dibuang, membawa produk buangan dari berbagai jaringan menuju ginjal untuk diekskresikan, berperan penting dalam pengendalian suhu dengan cara mengangkut panas dari bagian dalam tubuh menuju permukaan tubuh dalam darah juga mengandung faktor-faktor penting untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit.

Fungsi darah secara umum berkaitan dengan transportasi komponen di dalam tubuh seperti nutrisi, oksigen, karbondioksida, metabolisme, hormone dan kelenjar endokrin, panas dan imun tubuh. Nutrisi yang diserap pada saluran pencernaan yang kemudian dibawa ke dalam darah guna memenuhi kebutuhan akan jaringan tubuh. Proses pembentukan sel-sel darah yang diproduksi setiap hari di dalam sumsum tulang memerlukan prekursor antara lain besi, mangan, kobalt, vitamin, asam amino dan hormone untuk mensintesis pembentukan sel darah. Darah memiliki peranan yang sangat kompleks untuk terjadinya proses fisiologis yang berjalan dengan baik, sehingga produktivitas ternak dapat optimal.

Selain pertumbuhan, kondisi kesehatan ternak juga dapat diamati melalui pemeriksaan darah. Gambaran keadaan darah dapat menunjukkan keadaan fisiologis maupun patologis seekor ternak. Pemeriksaan darah dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kelainan-kelainan dalam darah atau organ pembentuk

tubuh ternak (Napirah; dkk, 2013). Menurut Guyton and Hall (2006), jika tubuh hewan mengalami gangguan fisiologis maka akan terjadi perubahan profil darah.

Perubahan profil darah dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal seperti penambahan umur, status gizi, kesehatan, stress, siklus estrus dan suhu tubuh, sedangkan secara eksternal misalnya akibat infeksi kuman, keadaan lingkungan, dan faktor fisiologi seperti stress saat penangkapan dan transportasi, umur serta jenis kelamin. Broiler yang sehat memiliki gambaran darah yang normal terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Nilai Normal Komponen Darah pada Broiler Umur 35 hari

Komponen Darah	Nilai
PCV (Hematokrit) (%)	24 – 43
RBC (Eritrosit) (10^6 /mm ³)	2,17 – 2,86
Hb (Hemoglobin) (g/%)	7,3 – 10,90

Sumber : Talebi *et al.*, 2005

Hematokrit atau *Packed cell volume* (PCV) adalah persentase sel darah merah terhadap volume darah total. Hewan normal memiliki nilai hematokrit yang sebanding dengan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin. Nilai hematokrit mengalami perubahan akibat peningkatan air plasma (hemodilution) atau penurunan air plasma (hemoconcentration) tanpa mempengaruhi jumlah sel sepenuhnya (Rosmalawati, 2008). Kadar hematokrit sangat tergantung pada jumlah sel eritrosit, karena eritrosit merupakan masa sel terbesar dalam darah. Kadar hematokrit

tergantung pada jumlah sel eritrosit, ukuran eritrosit serta volume darah. Kadar hematokrit normal pada ayam adalah 24-43% (Winarsih *et al.*, 2013).

Guyton dan Hall (2006) menyatakan eritrosit adalah sel darah merah yang membawa hemoglobin dan O₂ dari paru-paru ke jaringan tubuh. Kandungan eritrosit pada hewan dewasa terdiri atas 62-72% air, 35% padatan, dan dari padatan tersebut 95% hemoglobin (Swenson, 1993). Eritrosit dipengaruhi oleh konsentrasi hemoglobin dan hematokrit. Jumlah eritrosit yang tinggi akan diikuti oleh kadar hemoglobin yang tinggi. Selain itu, dipengaruhi juga oleh umur, jenis kelamin, aktivitas, nutrisi, produksi telur, bangsa, panjang hari, suhu lingkungan dan faktor iklim. Eritrosit pada unggas intinya terletak ditengah dan berbentuk oval. (Dzialowski, 2015).

Penyesuaian bentuk sel darah merah terhadap fisiologis tubuh unggas antara lain dengan tingkat fleksibilitas sel darah untuk mampu bergerak bebas dengan kecepatan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan panas tubuh dari unggas. Eritrosit pada unggas memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan eritrosit pada mamalia. Ukurannya bervariasi tergantung dari spesiesnya (Gunnarson, 2012). Ukuran yang lebih besar terkait dengan jumlah molekul globin yang mampu dibawa dalam satu sel darah merah. Meskipun ukuran sel darah merah unggas lebih besar, namun bentuknya lebih datar, sehingga pergerakan sel darah merah lebih cepat.

Eritrosit juga digunakan sebagai indikasi kecukupan nutrisi dimana nutrisi tersebut Bersama oksigen berperan dalam metabolisme di dalam tubuh (Ali *et al.*, 2013). Jumlah eritrosit dipengaruhi saat terjadi peningkatan kecepatan metabolisme

sel di seluruh tubuh dan meningkatnya kebutuhan energi yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan oksigen sehingga terjadi percepatan *erythropoiesis* pada sumsum tulang. Kebutuhan oksigen meningkat pada saat tubuh ayam broiler membutuhkan energi, yaitu saat melakukan aktivitas dan berproduksi tinggi, dimana saat itu ayam broiler sedang tumbuh pesat, sehingga membutuhkan nutrisi yang banyak. Kebutuhan nutrisi yang banyak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga metabolisme berjalan cepat oleh karena itu diperlukan darah yang banyak. (Nurrasyidah *et al.*, 2012).

Eritrosit dipengaruhi oleh konsentrasi hemoglobin dan hematokrit. Peningkatan atau penurunan eritrosit akan mempengaruhi kadar hemoglobin dan hematokrit. Di pengaruhi juga oleh umur, jenis kelamin, aktivitas, nutrisi, bangsa, suhu lingkungan dan faktor lingkungan (Francis *et al.*, 2002).

Hemoglobin merupakan komponen yang berada di dalam eritrosit, yang berfungsi dalam membawa oksigen ke jaringan. Hemoglobin membutuhkan zat besi untuk mengikat oksigen sehingga cadangan besi harus selalu memenuhi untuk digunakan dalam proses hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang paling banyak terdapat dalam darah, sekitar 10% dalam darah dan 90% dari berat kering eritrosit (Apriyanto, 2007). Hemoglobin berfungsi sebagai pigmen respirasi darah dan sebagai system buffer dalam darah yang berikatan erat dengan kemampuan darah membawa oksigen (Swenson dalam Adriani, 2005).

Pada berbagai jenis unggas normal, hemoglobin menempati sepertiga dari volume sel darah merah. Warna merah darah disebabkan adanya hemoglobin dalam

sel darah merah. Menurut Khan *et al.* (2002) pada suhu lingkungan yang meningkat dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Suasana suhu lingkungan panas membuat metabolisme ayam menjadi semakin cepat.. metabolisme yang cepat membutuhkan suplai oksigen yang lebih banyak untuk diedarkan darah ke seluruh tubuh. Dalam hal tersebut membuat tingkat persaingan ayam dalam mendapatkan oksigen yang tinggi.

Peningkatan jumlah hemoglobin sejalan dengan peningkatan jumlah eritrosit. Karena hemoglobin merupakan pigmen eritrosit yang terdiri dari protein kompleks konjugasi yang mengandung besi, protein ini disebut globin. Warna merah hemoglobin disebabkan heme, yaitu senyawa metalik yang mengandung satu atom besi (Apriyanto, 2010). Menurut Wardhana (2010), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin adaalah umur hewan, species, lingkungan, pakan, ada tidaknya kerusakan eritrosit, dan penanganan darah pada saat pemeriksaan.

E. Tinjauan Umum Probiotik

Bakteri probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah yang cukup memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Probiotik dapat diisolasi dari berbagai sumber diantaranya susu dan hasil olahannya (Khalik, 2017).

Probiotik merupakan suatu produk yang mengandung mikroba hidup non patogen yang diberikan kepada ternak untuk memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi konversi ransum dan kesehatan ternak (Djouvinov, *et. al.*, 2005). Fungsi probiotik

selain meningkatkan efisiensi ransum, produksi telur, dan menurunkan kadar kolesterol telur serta kolesterol serum, ternyata probiotik juga mampu menurunkan nitrogen non protein dalam darah, konsentrasi asam urat, amonia dan urea dalam darah (Andajani, 2007). Tidak semua bakteri dapat dijadikan sebagai probiotik, kecuali bakteri yang dapat memenuhi kriteria tertentu. Syarat bakteri sebagai probiotik adalah bakteri tersebut tidak patogen, aman dikonsumsi, mampu bertahan hidup dan stabil dalam penyimpanan, dapat bertahan hidup dalam saluran pencernaan setelah melewati lambung, dengan kata lain probiotik haruslah tahan terhadap asam dan garam-garam empedu (Harimurti, 2002).

Probiotik didefinisikan sebagai mikroba hidup yang digunakan sebagai pakan imbuhan dan dapat menguntungkan inangnya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial pencernaannya (Hidayat, 2010). Untuk memaksimalkan aktivitas pemeliharaan ayam broiler maka dapat dilakukan penambahan probiotik ke dalam air minum yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan dan menyediakan enzim yang mampu mencerna serat kasar, protein, lemak dan mendetoksikasi zat racun atau metabolit (Primacitra *et al.*, 2014). Konsep memanfaatkan keseimbangan mikroflora ini menjadi landasan penggunaan probiotik untuk menekan perkembangan bakteri patogen, baik pada saluran pencernaan ayam maupun pada *litter* (lingkungan dalam kandang ternak).

Beberapa probiotik diketahui dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, protease dan lipase yang dapat meningkatkan konsentrasi enzim pencernaan pada saluran pencernaan inang sehingga dapat meningkatkan perombakan nutrisi.

Satu dari alasan penggunaan probiotik yaitu untuk menstabilkan mikroflora pencernaan dan berkompetisi dengan bakteri patogen, dengan demikian strain probiotik harus mencapai usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup (Suroño, 2004).

Karakteristik dan kriteria yang aman dari probiotik diantaranya nontoksik dan nonpatogenik, mempunyai identifikasi taksonomi yang jelas, dapat hidup dalam spesies target, dapat bertahan, berkolonisasi dan bermetabolisme secara aktif dalam target yang ditunjukkan dengan tahan terhadap cairan pencernaan dan empedu, persisten dalam saluran pencernaan, menempel pada ephitelum atau mucus, berkompetisi dengan mikroflora inang, memproduksi senyawa antimicrobial, antagonis terhadap pathogen, dapat merubah respon imun, Tidak berubah dan stabil pada waktu proses penyimpanan dan lapangan, Bertahan hidup pada populasi yang tinggi, mempunyai sifat organoleptik yang baik. Bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik yaitu *Lactobacillus* dan *Bifidobacteria*, kedua jenis bakteri ini dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan karena dapat menstimulasi respon imun dan menghambat patogen. Satu faktor kunci dalam seleksi starter probiotik yang baik yaitu kemampuannya untuk bertahan dalam lingkungan asam pada produk akhir fermentasi secara *in vitro* dan kondisi buruk dalam saluran pencernaan atau *in vivo* (Haryati, 2011).

Ketahanan probiotik pada kondisi *in vitro* dapat dipengaruhi oleh pembentukan metabolit oleh starter seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida dan bakteriosin (Saarela et al., 2000). Berbagai jenis mikroorganisme yang

digunakan sebagai probiotik diisolasi dari isi usus pencernaan, mulut, dan kotoran ternak. Pada saat ini, mikroorganisme yang banyak digunakan sebagai probiotik yaitu strain *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Bacillus spp*, *Streptococcus*, *yeast* dan *Saccharomyces cereviceae*. Mikroorganisme tersebut harus non-patogen, gram positif, strain yang spesifik, anti *E. coli*, tahan terhadap cairan empedu, hidup, melekat pada mukosa usus, dan minimal mengandung 30×10^9 CFU/g (Pal *et al.*, 2006).

Penelitian tentang probiotik telah difokuskan pada pembuktian dalam aspek keamanan dan kemanjuran strain yang terseleksi. Strategi penelitian untuk pembuktian kemanjuran meliputi pengaruh terhadap imunitas, studi anti-infeksi, percobaan secara klinis, kolonisasi dan perjalanannya sepanjang usus pencernaan, sedangkan untuk pembuktian keamanannya yaitu melalui karakterisasi toksisitas dengan mengukur pengaruhnya terhadap status kesehatan, konsumsi pakan dan morfologi mukosa pencernaan. Produk probiotik yang diberikan biasanya distandarisasi berdasarkan perkiraan jumlah kultur dapat hidup (*viable*), jadi kemampuan strain untuk mencapai populasi sel yang tinggi merupakan hal yang sangat penting. Salah satu teknologi penggunaan probiotik yang mempunyai sifat *Competitive Exclusion* (CE), yaitu meliputi pemberian kultur bakteri nonpatogen ke dalam saluran usus ternak untuk menurunkan kolonisasi atau mengurangi populasi bakteri patogen dalam saluran pencernaan (Denny, 2011). Pemberian probiotik biasanya dilakukan secara terus menerus, sedangkan pemberian probiotik yang

bersifat CE cenderung hanya sekali walaupun penambahan dosis pada umur ternak selanjutnya kemungkinan bermanfaat (Budiansyah, 2004).

Probiotik merupakan pakan imbuhan berupa mikroorganisme dapat hidup disaluran pencernaan, bersimbiosis dengan mikroorganisme yang ada, bersifat menguntungkan, dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, serta menyeimbangkan populasi mikroba pada saluran pencernaan, mengendalikan mikroorganisme patogen pada tubuh inang (Fuller, 1992). Menurut Fuller (2002), keseimbangan mikroba usus akan tercapai apabila mikroba yang menguntungkan dapat menekan mikroba yang merugikan, dimana mikroba patogen yang merugikan didesak keluar dari ekosistem saluran pencernaan oleh mikroba normal saluran pencernaan atau mikroba yang menguntungkan. Keuntungan probiotik adalah mencegah reaksi bakteri patogen, merangsang aktivitas peristaltik usus detoksikasi beberapa komponen makanan yang merugikan dan mengeluarkannya, mensuplai enzim untuk membantu mencerna beberapa bahan makanan (Jay, 2000).

Mekanisme kerja probiotik dijelaskan oleh Soeharsono (1998) menyatakan bahwa probiotik merupakan mikroba hidup yang a-patogen, yang mekanisme kerjanya mendesak mikroba non-indigenous keluar dari ekosistem saluran pencernaan, dan menggantikan lokasi mikroba pathogen di dalam saluran pencernaan, karena probiotik berasal dari mikroba indigenous, maka proses translokasi yang terjadi berjalan secara alamiah di dalam ekosistem usus.

Target utama dari penggunaan probiotik yaitu: (i) peningkatan ketahanan inang terhadap patogen eksogenus pencernaan; (ii) mengontrol penyakit dimana

komponen mikroflora pencernaan telah diimplikasi dalam aeteologi; (iii) menurunkan keracunan metabolisme mikrobial dalam pencernaan; dan (iv) mengatur sistem imunitas inang. Secara keseluruhan, tujuan dari strategi ini yaitu meningkatkan pertumbuhan bakteri yang dapat bersaing dengan, atau antagonis terhadap bakteri patogen. Produk probiotik yang diberikan biasanya distandarisasi berdasarkan perkiraan jumlah kultur dapat hidup (*viable*), jadi kemampuan strain untuk mencapai populasi sel yang tinggi merupakan hal yang sangat penting. Konsentrasi yang umum dianggap dapat berguna yaitu kira-kira 10^7 sel/ml pada saat dikonsumsi (Gomes dan Malcata, 1999).

Menurut Haryati (2011), probiotik dan prebiotik adalah bahan yang dapat digunakan untuk menggantikan penggunaan antibiotik yang dapat meningkatkan kinerja ternak. Penggunaan probiotik dan prebiotik sudah banyak diterapkan di luar negeri karena memberikan hasil yang positif, tetapi di Indonesia penelitian dan penggunaan kedua bahan ini masih belum banyak dilakukan. Berbagai sumber kedua bahan tersebut belum dieksplorasi secara optimal agar dapat dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang positif terhadap usaha peternakan.

Pemberian probiotik hanya dapat meningkatkan penambahan bobot badan dan menurunkan FCR (Feed Conversion Ratio) yang menunjukkan bahwa proses pencernaan dan penyerapan nutrisi lebih efisien. Sehingga zat yang dibutuhkan dalam proses pembentukan sel-sel darah dapat berlangsung lebih baik (Winarsih, 2005).

Manin dkk. (2014) menyatakan bahwa pemberian probiotik pada unggas dapat memperbaiki penyerapan nutrisi dan meningkatkan kesehatan tubuh. Probiotik

juga mampu meningkatkan kesehatan ternak dengan cara menyeimbangkan mikroflora dalam saluran pencernaan dan mengendalikan mikroba patogen dalam saluran pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup (Sugiarto, 2014).

F. Tinjauan Umum *Lactobacillus plantarum*

Lactobacillus plantarum adalah bakteri asam laktat dari family *Lactobacillaceae* dan genus *Lactobacillus*. Bakteri ini bersifat gram positif, non motil dan berukuran 0,6-0,8µm x 1,2-6,0 µm. Bakteri ini memiliki sifat antagonis terhadap mikroorganisme penyebab kerusakan makanan seperti *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* dan Gram negative. *Lactobacillus plantarum* bersifat toleran terhadap garam, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki pH ultimat 5,3 hingga 5,6 (Buckle *et al.*, 1987).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, salah satu BAL yang terdeteksi terdapat pada susu sapi dan olahannya adalah *Lactobacillus plantarum*. Keberadaan bakteri ini dianggap penting karena melalui beberapa penelitian diketahui bermanfaat terhadap kesehatan manusia diantaranya adalah kemampuannya dalam mengatasi diare, kanker kolorektal, menurunkan kadar kolesterol, penyerapan zat besi, regulasi sistem imun, produksi vitamin B, obesitas, mencegah *hyperlipidemia* dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Khalik, 2017).

Bakteri ini memiliki sifat katalase negative, aerob atau fakultatif anaerob, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak mereduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat. Pertumbuhan *Lactobacillus*


plantarum dapat menghambat kontaminasi dari mikroorganisme patogen dan penghasil racun karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH substrat, selain itu BAL dapat menghasilkan hydrogen peroksida yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. *Lactobacillus plantarum* juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang berfungsi sebagai zat antibiotik (Maryana, 2014).

Keberadaan *Lactobacillus plantarum* pada dangke yang berbahan dasar susu sapi didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan isolasi BAL dari susu sapi dan olahannya (Khalik, 2017). Dangke dari kabupaten Enrekang terdeteksi mengandung bakteri asam laktat *Lactobacillus plantarum* yang merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, dan bersifat katalase negative. Bakteri *Lactobacillus plantarum* yang diisolasi dari dangke berpotensi sebagai kandidat probiotik karena mampu hidup pada pH rendah (pH 2, 3, dan 4) dan konsentrasi garam empedu (0.1%, 0.3% dan 0.5%), serta memiliki kemampuan agregasi dan koagregasi dengan membentuk endapan didasar medium pertumbuhan (Khalik, 2017).

G. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu ada pengaruh pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* hasil isolasi BAL dari limbah pembuatan dangke pada status hematologi broiler.

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai November 2018. Pembuatan Suspensi BAL bertempat di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Pemeliharaan broiler bertempat di Pannujuang Desa Kalamandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan pemeriksaan status hematologi bertempat di Makassar Pet Klinik.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksperimental dengan menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua macam variabel yaitu variabel bebas (*Independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Dengan pemberian isolat BAL *Lactobacillus plantarum* sebagai variabel bebas dan status hematologi sebagai variabel terikat.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Isolat bakteri asam laktat (BAL) *Lactobacillus plantarum* merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, dan bersifat katalase negatif, yang diisolasi dari dangke dan berpotensi sebagai kandidat probiotik.
2. Status hematologi merupakan pemeriksaan jumlah sel darah dalam menentukan kesehatan broiler yang bakal meliputi pemeriksaan jumlah hematokrit, hemoglobin dan eritrosit

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui percobaan laboratorium dengan pengamatan terjadinya pengaruh terhadap jumlah hematokrit, hemoglobin dan eritrosit untuk menentukan status hematologi broiler.

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang sistem panggung sebanyak 4 petak, terpal 5x7, tempat pakan dan minum, 4 buah lampu pijar 60 watt, autoklaf, inkubator, perkakas, kabel, erlenmeyer, *hot plate and stirrer*, lampu spiritus, gelas ukur 1000 ml, tabung reaksi, *Laminar air flow* (LAF), *mortal and pastle*, oven, Mikropipet, timbangan digital, tip, ose bulat, spektrofotometer, botol you-c, botol vial, aluminium foil, kapas, termometer, neraca analitik, silk, tabung anti koagulan, pipet eritrosit, mikroskop, *spoite*, pipet hemoglobin, tabung sahli,

warna standar sebagai pembanding, pipet tetes, kamar hitung Neubauer, *hemoglobinometer*, RT- 7600 dan mikroskop,.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah broiler strain SR 707 umur 1 hari atau *Day Old Chick* (DOC), ransum BP 11 dan PB II, kardus, karung, sekam padi, biakan murni *L. plantarum*, zat antikoagulan, *Man Rogosa Sharpe Broth* (MRSB), vaksin ND B1, kapas, kertas saring, vita stress, vitachick larutan hayem, backtoagar, alkohol 70%, bcp, caco3, anti jamur, larutan hayem, larutan HCL 0.1 N, aquadest dan antikoagulan EDTA (*Ethylene Diamine Tetraacetic Acid*). .

G. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang digunakan dicuci bersih lalu dibilas dan dikeringkan. Kemudian alat-alat gelas disterilisasi dengan menggunakan oven pada suhu 180°C selama 2 jam.

b. Persiapan Kandang

Kandang yang digunakan berupa kandang dengan system panggung dengan jarak dari tanah 40 cm beralaskan sekam padi, berukuran 1 m x 1 m x 60 cm sebanyak 4 petak. Setiap petak kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum kapasitas 3 liter, serta lampu pijar 60 watt, bagian sisi kandang dilapisi kardus.

Sekam ditaburkan dengan ketebalan 5- 8 cm di lantai yang telah dipasang pengalas berupa karung terlebih dahulu. Suhu kandang diatur 31- 32°C dan dipertahankan untuk minggu pertama dengan menyalakan lampu selama 24 jam dan selanjutnya lampu akan dinyalakan pada malam hari hingga akhir penelitian.

2. Pemeliharaan Broiler

Sebelum pemberian perlakuan terhadap hewan uji, perlu dilakukan adaptasi terlebih dahulu dengan tujuan agar hewan uji yang digunakan mampu saling beradaptasi dan tidak saling menyerang satu sama lain. Sehingga pada saat perlakuan ayam tidak saling mengganggu dan tetap tenang karena telah terbiasa dalam keadaan satu kandang bersama. Broiler dipelihara selama 5 minggu, sebanyak 24 ekor dan dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor setiap kelompok perlakuan. Vaksin ND B1 diberikan saat ayam berumur 4 hari melalui tetes mata. Pada minggu pertama dan kedua, tempat pakan dan air minum diletakkan di atas sekam, sedangkan untuk minggu ketiga sampai pemanenan tempat pakan dan air minum digantung sejajar dengan punggung ayam. Pakan dan air minum diberikan secara *ad libitum*.

3. Preparasi Suspensi Bakteri Asam Laktat

Biakan murni *L. plantarum* diremajakan di media MRSA dan diinkubasi selama 2 x 24 jam. Kemudian bakteri yang telah tumbuh diuji dengan media BCP dan CaOH. Bakteri yang telah tumbuh kemudian dipindahkan kedalam media MRSB lalu di homogenkan dan di inkubasi selama 2 x 24 jam.

Pembuatan suspensi BAL menggunakan *Mc Farland 8* dengan metode pengenceran ($10^{10}, 10^9, 10^8, 10^7, 10^6$). Botol you c diisi dengan aquades steril sebanyak 27 ml. Isolat BAL *L. plantarum* di media MRSB dipipet kedalam botol you c 10^{10} , kemudian menghitung jumlah suspense BAL sampai mencapai nilai 0,94-0,98 cfu/ml di spektrofotometer dengan absorbansi 625 nm. Kemudian dilakukan seri pengenceran dari $10^{10}, 10^9, 10^8, 10^7, 10^6$. Kemudian konsentrasi $10^{10}, 10^8, 10^6$ di pipet masing-masing ke dalam botol vial sebanyak 2 ml (Tjay dan Rahardja, 2010).

4. Perlakuan Terhadap Hewan Percobaan

Broiler dibagi kedalam 4 kelompok perlakuan (Tabel 3.1). Semua kelompok broiler diberi pakan ransum standar.

Tabel 3.1. Jenis Perlakuan Hewan Uji

Kelompok Broiler	Perlakuan
P ₀	Broiler yang diberi Aquades 2 mL
P ₁	Broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^6 cfu/mL
P ₂	Broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^8 cfu/mL
P ₃	Broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^{10} cfu/mL

Sampel ini yang diberikan pada broiler sesuai dengan perlakuan. Pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* pertama kali diberikan setelah broiler beradaptasi dikandang selama 1 minggu . Pemberian BAL di lakukan setiap hari sebelum diberi makan pagi dan dilakukan secara oral dengan menggunakan metode sonde. Kemudian pada minggu terakhir penelitian diambil sampel darah untuk analisa status hematologi broiler tersebut.

3. Preparasi Sampel

a. Pengambilan sampel darah


Pengambilan sampel darah dilakukan pada hari terakhir penelitian yaitu hari ke 35 yang dilakukan secara acak pada setiap ulangan pada perlakuan penelitian. Sampel darah diambil secara langsung dari bagian *vena axillaris* pada sayap menggunakan spoite 1 ml yang telah diberi EDTA. Ayam dibungkus dengan kain dan ditidurkan (telentang), salah satu sayap dikeluarkan dari pembungkus. Pembuluh darah pada sayap tersebut di olesi dengan alkohol menggunakan kapas. Setelah bekas olesan alkohol kering darah diambil dengan spoite 1 ml dan darah dimasukkan kedalam tabung yang sudah mengandung antikoagulan.

b. Perhitungan Jumlah Eritrosit

Jumlah sel darah merah dapat diketahui dengan menggunakan *haemocytometer* (Ebenebe et. al. 2012; Sonjaya, 2015). Pengambilan darah dari tabung menggunakan pipet eritrosit (pipet sel darah merah) dengan bantuan alat pengisap (aspirator) sampai batas angka 0,5. Ujung pipet dibersihkan dengan tisu. Larutan pengencer Hayem diisap sampai tanda 101 yang tertera pada pipet eritrosit, kemudian pipa aspirator dilepaskan. Kedua ujung pipet ditutup dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, kemudian isi pipet dikocok dengan membentuk gerakan angka 8, dan cairan yang tidak ikut terkocok dibuang. Setetes cairan dimasukkan kedalam kamar hitung dan biarkan butir-butir dalam kamar hitung mengendap. Butir darah merah dihitung dengan mikroskop pada pembesaran 40 kali (a). Perhitungan dilakukan pada kotak hitung *Neubauer*, eritrosit yang terletak dan menyinggung garis batas sebelah kiri dan atas dihitung, sedangkan pada garis batas kanan dan bawah tidak dihitung. Lima kotak yang

biasa dihitung ialah empat kotak pojok dan 1 kotak tengah. Hasil perhitungan akhir (jumlah total eritrosit).

Jumlah total eritrosit = n. 10000



Gambar 3.1. Bentuk Kamar Hitung Eritrosit

c. Perhitungan Jumlah Hematokrit

Perhitungan jumlah hematokrit dilakukan menggunakan alat RT- 7600 dengan prosedur kerja terlampir.

d. Perhitungan Kadar Hemoglobin

Kadar hemoglobin dihitung dengan menggunakan metode Sahli. Tabung Sahli diisi dengan larutan HCl 0,1 N sampai angka 10. Darah diisap sampai batas 20 cm (0,02 ml) dengan pipet Sahli dan aspirator. Darah dimasukkan ke dalam tabung Sahli dan diletakkan diantara kedua bagian standar warna dalam alat *hemoglobinometer*, kemudian dibiarkan selama 5-10 menit sampai terbentuk asam hematin berwarna coklat. Ditambahkan setetes demi

setetes aquadest dengan pipet sambil diaduk, sampai warna larutan darah sama dengan warna standar. Perhitungan kadar hemoglobin dilakukan dengan membaca tinggi permukaan cairan pada tabung Sahli, dengan melihat skala g % yang berarti banyaknya hemoglobin dalam gram per 100 ml darah (Rosmalawati, 2008; Sonjaya, 2015).

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan program SPSS dengan model matematika sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \sum_{ij}$$

Y_{ij} = Pengaruh perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

μ = nilai tengah perlakuan

α_i = pengaruh perlakuan ke-i

β_j = pengaruh perlakuan ke-j

\sum_{ij} = galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA. Jika terdapat perbedaan nyata akan diuji lanjut dengan uji Duncan Multiple Comparison (Astuti; dkk, 2009).


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap Nilai Hematokrit Broiler

Hasil penelitian terhadap nilai hematokrit pada broiler dengan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Nilai Hematokrit (%) Darah Broiler yang diberi Probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀: kontrol dengan aquadest, P₁: *Lactobacillus plantarum* (10⁶ cfu/ml), P₂: *Lactobacillus plantarum* (10⁸ cfu/ml), P₃: *Lactobacillus plantarum* (10¹⁰ cfu/ml).


Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Kadar Hematokrit UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik *L. plantarum*

		Tipe III Jumlah Kuadrat	df	Rata-rata persegi	F	Sig.
Perlakuan	Hypothesis	27.116	3	9.039	.518	.685
	Error	104.647	6	17.441 ^a		
Ulangan	Hypothesis	24.407	2	12.203	.700	.533
	Error	104.647	6	17.441 ^a		
Perlakuan * Ulangan	Hypothesis	104.647	6	17.441	.	.
	Error	.000	0	. ^b		

Data berdasarkan Gambar 4.1. selanjutnya di uji secara statistik (SPSS) dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan yang ada sehingga nilai signifikan yang di dapatkan (lihat Tabel 4.1) yaitu ($P > 0,05$) tidak dipengaruhi secara nyata dengan perlakuan pemberian *L. plantarum*.

2. Pengaruh Pemberian *Lactobacillus plantarum* terhadap Kadar Hemoglobin Broiler

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kadar hemoglobin broiler yang diberi perlakuan selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Kadar Hemoglobin (g%) broiler yang diberi probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀: kontrol dengan aquadest, P₁: *Lactobacillus plantarum* (10⁶ cfu/ml), P₂: *Lactobacillus plantarum* (10⁸ cfu/ml), P₃: *Lactobacillus plantarum* (10¹⁰ cfu/ml).


Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Kadar Hemoglobin UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik *L. plantarum*

		Tipe III Jumlah Kuadrat	df	Rata-rata persegi	F	Sig.
Perlakuan	Hypothesis	5.873	3	1.958	1.551	.296
	Error	7.572	6	1.262 ^a		
ulangan	Hypothesis	2.102	2	1.051	.833	.480
	Error	7.572	6	1.262 ^a		
Perlakuan * ulangan	Hypothesis	7.572	6	1.262	.	.
	Error	.000	0	. ^b		

Data berdasarkan Gambar 4.2. selanjutnya di uji secara statistik (SPSS) UNIANOVA dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan yang ada sehingga nilai signifikan yang di dapatkan (lihat Tabel 4.2) yaitu (P> 0,05) tidak dipengaruhi secara nyata dengan perlakuan pemberian *L. plantarum*.

3. Pengaruh Pemberian *Lactobacillus plantarum* terhadap Jumlah Eritrosit Broiler

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kadar hemoglobin broiler yang diberi perlakuan selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Jumlah Eritrosit ($10^6 \times \text{mm}^3$) broiler yang diberi probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀: kontrol dengan aquadest, P₁: *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P₂: *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), P₃: *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).


Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik Kadar Hemoglobin UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik *L. plantarum*

		Tipe III Jumlah Kuadrat	Df	Rata-rata Kuadrat	F	Sig.
Perlakuan	Hypothesis	92956250000.000	3	30985416670.000	.245	.862
	Error	758687500000.000	6	126447916700.000 ^a		
Ulangan	Hypothesis	238962500000.000	2	119481250000.000	.945	.440
	Error	758687500000.000	6	126447916700.000 ^a		
Perlakuan * Ulangan	Hypothesis	758687500000.000	6	126447916700.000	.	.
	Error	.000	0	. ^b		

Data berdasarkan Gambar 4.3. selanjutnya di uji secara statistik (SPSS) UNIANOVA dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan yang ada sehingga nilai signifikan yang di dapatkan (lihat Tabel 4.3) yaitu ($P > 0,05$) tidak dipengaruhi secara nyata dengan perlakuan pemberian *L. plantarum*.

4. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap Pertambahan Bobot Badan Broiler

Hasil penelitian terhadap pertambahan bobot badan pada broiler dengan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Rerata Pertambahan bobot badan broiler yang diberi Probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀: kontrol dengan aquadest, P₁: *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P₂: *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), P₃: *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).

Tabel 4.4. Hasil Uji Statistik Rerata Pertumbuhan Bobot Badan Broiler UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik *L.plantarum*.

	Type III Jumlah Kuadrat	df	Rata-rata persegi	F	Sig.
Model	2115647.500 ^a	5	423129.500	247.671	.000
PERLAKUAN	2115647.500	5	423129.500	247.671	.000
Eror	25626.500	15	1708.433		
Total	2141274.000	20			

Data berdasarkan Gambar 4.4. selanjutnya di uji secara statistik (SPSS) UNIANOVA dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan yang ada sehingga nilai signifikan yang di dapatkan (lihat Tabel 4.3) yaitu ($P < 0,05$) dipengaruhi secara nyata dengan perlakuan pemberian *L. plantarum*.

B. Pembahasan

Broiler merupakan salah satu jenis ternak yang banyak dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani yang dipasarkan pada umur 4-6 minggu.. Tetapi pengembangan usaha broiler sering mengalami berbagai kendala diantaranya karena rendahnya produktivitas akibat lambatnya pertumbuhan, sehingga diperlukan manipulasi nutrisi. Alternatif yang semakin populer dalam industri ternak, yaitu penggunaan bahan-bahan alami seperti mikroba yang bersifat probiotik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ali, dkk (2013) bahwa probiotik merupakan suatu produk yang mengandung mikroba hidup non patogen yang diberikan kepada ternak untuk menjaga keseimbangan ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan dan

menyediakan enzim yang mampu mencerna serat kasar, protein, lemak dan mendetoksikasi zat racun atau metabolit guna dapat memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi konsumsi ransum dan kesehatan ternak. Salah satu sumber bakteri isolat lokal yang telah diuji kemampuannya secara *in vitro* sebagai kandidat probiotik yaitu *Lactobacillus plantarum*. Bakteri ini termasuk kelompok bakteri asam laktat (BAL) yang diisolasi dari dangke, makanan khas dari kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. *Lactobacillus plantarum* adalah bakteri asam laktat yang hidup normal dalam saluran pencernaan. Perannya sangat penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan.

Dalam Penelitian ini pemberian probiotik BAL *Lactobacillus plantarum* yang telah diisolasi dari pembuatan dangke Yang kemudian disuspensi menggunakan Mac Farland 8 dengan absorbansi 625 nm dengan metode pengenceran (10^{10} sampai 10^6) diharapkan mampu berpengaruh terhadap status kesehatan broiler. Dan Salah satu parameter dari status kesehatan hewan adalah darah. Darah mempunyai fungsi penting dalam pengaturan fisiologis tubuh. Fungsi darah secara umum berkaitan dengan transportasi komponen di dalam tubuh seperti nutrisi, oksigen, karbondioksida, metabolit, hormon, panas dan imun sedangkan fungsi tambahan dari darah berkaitan dengan keseimbangan cairan dan pH tubuh (Bijanti: dkk, 2009).

Dalam Penelitian ini ada 3 parameter dalam menentukan status hematologi broiler yaitu hematokrit, hemoglobin dan eritrosit yang telah di beri probiotik *L. plantarum* yang dapat dihat pada Gambar 4.1., Gambar 4.2., dan Gambar 4.3.

1. Pengaruh Pemberian *Lactobacillus plantarum* Terhadap Nilai Hematokrit Broiler

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan nilai hematokrit broiler yang telah diberi BAL *Lactobacillus plantarum* dan Aquades sebagai kontrol dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pada gambar tersebut nampak bahwa nilai hematokrit pada P₂ adalah 27,56%, nyata lebih tinggi dibandingkan pada P₀, P₁ dan P₃ masing-masing 26,46%, 24,70% dan 23,70%.

Menurut Aderinola *et. al.*, (2013), kisaran normal hematokrit pada broiler berkisar antara 24 – 43 %. Nilai hematokrit yang didapatkan pada penelitian ini berkisar 23,70 – 27,56 %. Hal tersebut menunjukkan pemberian probiotik *L. plantarum* dapat meningkatkan nilai hematokrit menuju kisaran normal. Peningkatan nilai hematokrit mungkin dipengaruhi oleh tingginya kadar Hb, yang mampu meningkatkan volume eritrosit. Pemberian probiotik *L. plantarum* sebagai makanan tambahan yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada hewan dengan meningkatkan mikroba dalam saluran pencernaan serta berpengaruh dalam pemenuhan protein. Kebutuhan protein perlakuan yang sudah mencukupi akan meningkatkan pembentukan eritrosit dan jumlah eritrosit yang tinggi akan meningkatkan pembentukan nilai hematokrit.

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pemberian probiotik *L. plantarum* dengan tingkat konsentrasi yang berbeda (10^{10} , 10^8 , dan 10^6) tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap jumlah hematokrit broiler.

Nilai hematokrit yang cenderung meningkat dengan penambahan konsentrasi BAL *L. plantarum* hingga perlakuan 10^{10} menunjukkan bahwa *L. plantarum* tidak memiliki efek toksik atau faktor pembatas yang menghambat penyerapan nutrisi. Sesuai dengan pernyataan Sanches *et. al* (2013) nilai hematokrit dapat menunjukkan kehadiran faktor toksik yang memberikan efek buruk pada pembentukan sel darah merah atau penurunan konsentrasi sel darah merah yang tidak sebanding dengan komponen cairan darah. Dan dijelaskan oleh Frandson (1993) dalam Hidayat (2011) menyatakan bahwa mikroba patogen di dalam saluran pencernaan dapat menghasilkan toksin yang mungkin akan masuk ke aliran darah dan hal ini akan menyebabkan terjadinya hemolisis pada sel-sel merah sedemikian rupa sehingga hemoglobin terlepas ke dalam plasma karena disebabkan oleh toksin bakteri. Nilai hematokrit mengalami perubahan akibat peningkatan air plasma atau penurunan air plasma tanpa mempengaruhi jumlah sel sepenuhnya. Hal tersebut dimungkinkan dipengaruhi kondisi saluran pencernaan. Selain itu, probiotik yang dapat meningkatkan kondisi pencernaan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok sehingga zat yang dibutuhkan dalam proses pembentukan sel-sel darah dapat berlangsung lebih baik. *Lactobacillus plantarum* mampu merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga menimbulkan suasana asam. Hal ini sesuai dengan pernyataan sukarmiati (2007) Dalam keadaan asam, *L. plantarum* memiliki kemampuan untuk menghambat bakteri patogen dan bakteri pembusuk.

Fungsi lain dari hematokrit yaitu mengukur proporsi sel darah merah (eritrosit), sebab hematokrit dapat mengukur viskositas (kekentalan) darah. Semakin besar persentase hematokrit maka semakin banyak gesekan yang terjadi di dalam sirkulasi darah pada berbagai lapisan darah dan gesekan ini menentukan viskositas, oleh karena itu viskositas darah meningkat dengan bersamaan hematokrit pun meningkat (Budiman, 2007).

2. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap Kadar Hemoglobin Broiler

Rerata nilai hemoglobin darah pada broiler setelah penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2. Hasil analisis variansi menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap kandungan hemoglobin. Rerata kandungan hemoglobin broiler dari hasil penelitian ini yaitu P₀ (Aquadess) yang berperan sebagai control dengan nilai 8,7 g/%, P₁ (Pemberian probiotik *L. plantarum* 10⁶) dengan nilai 7,6 g/%, P₂ (Pemberian probiotik *L. plantarum* 10⁸) dengan nilai 7,3 g/% dan P₃ (Pemberian probiotik *L. plantarum* 10¹⁰) dengan nilai 9 g/%.

Kandungan hemoglobin tertinggi di dalam penelitian ini adalah pada perlakuan pemberian probiotik *L. plantarum* 10¹⁰, sedangkan yang terendah adalah perlakuan pemberian *L. plantarum* 10⁸. Kandungan hemoglobin pada penelitian ini berkisar antara 7,3-9 g/%. Menurut Kusumasari; dkk (2012) kadar hemoglobin normal pada broiler berkisar antara 7,3- 10,90 g/%, sehingga secara umum kadar hemoglobin pada semua perlakuan masih dalam kisaran normal.

Kekurangan hemoglobin akan berpengaruh terhadap proses metabolisme yang terjadi di dalam sel, hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan seekor ternak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fredson (1993) dalam Hidayat (2011) menyatakan bahwa apabila jumlah hemoglobin rendah berkurang jauh dibawah normal, maka ternak akan menderita anemia. Selanjutnya dikatakan bahwa anemia dapat terjadi karena pembentukan darah yang kurang memadai karena gizi yang tidak baik, termasuk didalamnya defisiensi zat besi, Cu, vitamin, dan asam amino di dalam makanan.

Pada P₃ jumlah hemoglobin dan rerata berat badan broiler cenderung lebih tinggi ini menunjukkan bahwa perlakuan pada konsentrasi tersebut mempunyai efek terhadap peningkatan jumlah hemoglobin.

Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, semakin tinggi pula kadar Hb yang dimiliki oleh broiler. Semakin tinggi kadar Hb, maka semakin besar kemungkinan sel darah merah dapat mengikat dan mentransportasikan oksigen yang lebih banyak, sehingga kebutuhan oksigen setiap jaringan dan sel dapat tercukupi. Hal ini sesuai dengan pendapat Olugbemi *et. al.* (2010) menyatakan bahwa kadar hemoglobin mengindikasikan kecukupan nutrisi yakni pemenuhan kebutuhan protein pada broiler, rendahnya kadar hemoglobin selain menunjukkan keadaan anemia juga menandakan kekurangan protein serta kerusakan liver akibat infeksi parasit.

Pemberian probiotik dapat menghasilkan enzim pencernaan diantaranya amilase, protease dan lipase yang akan membantu pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh usus. Hal ini sesuai

dengan pendapat Sukarmiati (2007) yang menyatakan *bahwa* probiotik mengandung bakteri proteolitik yang dapat mensintesa enzim protease yang menghasilkan keratinase. Keratinase selanjutnya memecah senyawa-senyawa sederhana yaitu asam amino. Asam amino merupakan prekursor pembentukan eritrosit.

Hemoglobin dalam eritrosit memungkinkan timbulnya kemampuan untuk mengangkut oksigen, serta penyebab warna merah pada darah. Kandungan oksigen yang rendah dalam darah menyebabkan peningkatan produksi hemoglobin dan jumlah eritrosit.

Menurut Wardhana *et. al.* (2001) menyatakan bahwa kadar hemoglobin pada broiler dapat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor diantaranya faktor genetik, umur hewan, jenis kelamin, spesies, lingkungan, musim, nutrisi, ada tidaknya kerusakan eritrosit, waktu pengambilan sampel, status kesehatan, jenis antikoagulan yang dipakai dan metode yang digunakan.

3. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* terhadap Jumlah Eritrosit Broiler

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah eritrosit tidak berbeda secara signifikan antar kelompok perlakuan ($P > 0,05$) dengan rata-rata masing-masing kelompok perlakuan secara berurutan P_0 , P_1 , P_2 , dan P_3 adalah $2,28 \times 10^6/\text{mm}^3$, $2,05 \times 10^6/\text{mm}^3$, $2,08 \times 10^6/\text{mm}^3$ dan $2,12 \times 10^6/\text{mm}^3$. Walaupun secara statistik tidak menunjukkan adanya perubahan tetapi secara numeric jumlah eritrosit masih berada pada kisaran jumlah eritrosit normal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jain (1993)

dalam Duka *et al.*, (2015) bahwa kisaran jumlah eritrosit pada broiler berkisar antara $2,0 - 3,2 \times 10^6/\text{mm}^3$.

Pemberian probiotik BAL *L. plantarum* dengan konsentrasi 10^6 , 10^8 dan 10^{10} tidak mengganggu jumlah eritrosit. sehingga ayam dalam masih dalam keadaan sehat. Fungsi utama dari sel darah merah yakni membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan, kekurangan sel darah merah mengindikasikan bahwa kapasitas darah dalam membawa oksigen berkurang (Aderinola *et. al.*, 2013).

Sesuai pernyataan Olugbemi *et.al.*(2010) menyatakan bahwa sel darah merah bertanggung jawab atas pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah serta pembentukan hemoglobin maka nilai sel darah merah yang tinggi akan berpengaruh baik bagi kesehatan. Peningkatan jumlah hemoglobin sejalan dengan peningkatan jumlah eritrosit. Karena hemoglobin merupakan pigmen eritrosit yang terdiri dari protein kompleks konjugasi yang megandung besi, protein ini disebut globin.

Fungsi utama dari sel darah merah yakni membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan, kekurangan sel darah merah mengindikasikan bahwa kapasitas darah dalam membawa oksigen berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Olugbemi *et.al.*(2010) menyatakan bahwa sel darah merah bertanggung jawab atas pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah serta pembentukan hemoglobin maka nilai sel darah merah yang tinggi akan berpengaruh baik bagi kesehatan.

4. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* Terhadap Pertambahan Bobot Badan Broiler

Rerata nilai pertambahan bobot badan broiler dapat dilihat pada Gambar 4.4. Pada gambar tersebut nampak bahwa pertambahan bobot badan broiler umur 35 hari pada P₂ adalah 1524 gram nyata lebih tinggi dibandingkan pada P₀, P₁ dan P₃ masing-masing 1484, 1353, dan 1501 gram. Hasil analisis variansi menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap pertambahan bobot badan broiler. Hal ini dapat terlihat pada pertambahan bobot badan broiler tiap perlakuan antara P₀ (kontrol dengan aquades), P₁ (*L. plantarum* 10⁶ cfu/ml), P₂ (*L. plantarum* 10⁸ cfu/ml), dan P₃ (*L. plantarum* 10¹⁰ cfu/ml).

Menurut Rasyaf (2007) dalam Hidayat (2010) mengatakan bahwa pertambahan bobot badan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain umur, bangsa, jenis kelamin, kecepatan pertumbuhan, kesehatan ternak serta kualitas dan kuantitas pakan.

Berdasarkan penelitian pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan ($P < 0,05$) hal ini disebabkan oleh kandungan energi dan kandungan protein yang terkandung dalam pakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma; dkk (2015) yang menyatakan bahwa keseimbangan zat-zat nutrisi terutama imbang energi dan protein penting karena nyata mempengaruhi pertumbuhan. Pertambahan berat badan menunjukkan bahwa

pakan yang dikonsumsi oleh broiler cukup efisien dan banyak digunakan untuk pertumbuhan. Jika broiler mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang banyak namun penambahan berat badan tidak tinggi maka penyerapan makanan dalam saluran pencernaan broiler tersebut berlangsung tidak sempurna. Selain itu bisa juga disebabkan karena broiler sedang berada dalam kondisi sakit, faktor lainnya adalah jenis kelamin, suhu dan kualitas makanan.

Dan dijelaskan oleh Yeo dan Kim (1997) dalam Ali; dkk (2013) menyatakan bahwa pemberian probiotik pada ayam mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan, dan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik meningkatkan aktivitas enzim pencernaan sehingga penguraian dan penyerapan makanan menjadi lebih sempurna sehingga makanan yang diserap dengan baik tersebut dapat dimanfaatkan oleh ayam untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan.

Kecepatan pertumbuhan mempunyai variasi yang cukup besar, keadaan ini bergantung pada tipe ayam, jenis kelamin, galur, tata laksana, temperatur lingkungan, tempat ayam tersebut dipelihara, kualitas dan kuantitas ransum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* pada broiler hasil analisis variansi (ANOVA) tidak berpengaruh ($P > 0,05$) terhadap hematokrit, hemoglobin dan eritrosit. Konsentrasi pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* tidak berpengaruh terhadap status hematologis.

B. SARAN

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh leukosit sebagai salah satu parameter untuk mengetahui status hematologi broiler dan diperlukan kajian lebih lanjut mengenai status hematologi yang diberi probiotik BAL *Lactobacillus plantarum* pada broiler yang berumur 7, 14, 21 dan 28 hari sebagai pembanding.

KEPUSTAKAAN

- Ad-Dimasyiqi, Al-Iman Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Aderinola, O. A., T. A. Rafiu, A.O. Akinwumi, T. A. Alabi, and O. A. Adeagbo. *Utilization of Moringa oleifera leaf as feed supplement in broiler diet*. Int. J. Food Agric. Vet. Sci., 3(3): 94-102, 2013.
- Agustina, D., Iriyanti, N., dan Mugiyono. S. *Pertumbuhan dan konsumsi pakan pada berbagai jenis itik lokal betina yang pakannya di suplementasi probiotik*. Ilmiah peternakan 1(2): 691 – 698, 2013.
- Ali, S.A., Ismoyowati dan I. Diana. *Jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan hematokrit pada berbagai jenis itik lokal terhadap penambahan probiotik dalam ransum*. Jurnal Ilmiah peternakan. 1(3): 1001-1013, 2013.
- Amrullah, I. K. *Nutrisi Ayam Broiler*. Cetakan Ketiga. Lembaga Gunungbudi : Bogor. Analysa, L. 2007. *Efek penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan terhadap berat organ dalam, glukosa darah dan kolesterol darah ayam pedaging*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang, 2004
- Andajani, R., *Peran Probiotik dalam Meningkatkan Produksi*. Jakarta: Dalam Poultry Indonesia No. 206, 2007.
- Astuti. F.K. Busono. Dan Sjoifjan. *Pengaruh Penambahan Probiotik Cair Dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi pada Ayam Pedaging*. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya: Malang, 2015.
- Budiansyah, A. *Pemanfaatan Probiotik Dalam Meningkatkan Penampilan Produksi Ternak Unggas*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Budiman, R. *Pengaruh Penambahan Bubuk Bawang Putih pada Ransum Terhadap Gambaran Darah Ayam Kampung yang Diinfeksi Cacing Nematoda (Ascaridia galli)*. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2007.
- Dharmawan, N. S. *Pengantar patologi klinik veteriner*. Pelawa Sari. Denpasar, 2002.
- Direktorat Jendral Peternakan, *Populasi Ayam Menurut Provinsi Jakarta, 2012*.

- Djouvinov, M., Boicheva, S., Simeonova, T and Vlaikova, T. *Effect of feeding Lactina probiotic on performance, some blood parameters and caecal microflora of mule ducklings*. Journal of Sciences, Vol. 3, No. 2, pp 22-28, 2005.
- Franson R. D., W.L. Wilke dan A.D. Fails. *Anatomy and Physiology of Farm Animal 7th Ed*. Iowa (US): Willey-Blackwel, 2009.
- Fuller, R. *History and Development of Probiotics*. In *Probiotics the Scientific Basis*. Edited by Fuller. Chapman and Hall. London. New York, Tokyo, Melbourne, Madras., pp 1-7, 1992.
- Gunnarson, M. *Avian hematology*. Institute for Clinical Chemistry Swedish Agricultural University. Swedish, 2012.
- Gunawan dan Sundari, M.M.S. *Pengaruh Penggunaan Probiotik dalam Ransum Terhadap Produktivitas Ayam*. Wartazoa Vol. 13 No. 3, 2003.
- Guyton, A. C. and J. E. Hall. *Textbook of Medical Physiology*. 11th Ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2006.
- Goktepe, I., Juneja, V.K. Dan Ahmeda, M. *Probiotics in Food Safety and Human Health*. London: CRC Press Taylor and Francis Group, 2006.
- Hafsan, Bayu, G. Hidayat, Ar. S. Agustina, L. Natsir, A. Ahmad, A. *Bobot karkas dan Persentase Organ Dalam Broiler Dengan Suplementasi Fitase Dari Bukholderia sp. Strain HF.7*. Journal Seminar Nasional Biologi, 2018.
- Harimurti, Sri. *Bakteri Asam Laktat dari Intestine Ayam Sebagai Agensia Probiotik*. Purwokerto: Fakultas Peternakan Universitas Jendral Soedirman, 2007.
- Haryati, T. *Probiotik dan prebiotik Sebagai pakan imbuhan nonruminansia*. Bogor: Balai Penelitian Ternak, PO Box 221, 2011.
- Isroli, S. Susanti, E. Widiastuti, T. Yudiarti dan Sugiharto. *Observasi beberapa variabel hematologis ayam Kedu pada pemeliharaan intensif*. Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan. Hal: 548-557, 2009..
- Jay, J. M. *Modern Food Microbiology. 6th Edition*. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 2000.
- Kementerian Agama RI. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Kelembagaan Islam: Jakarta, 2012.

- Khalik, F. N. *Potensi Bakteri Asam Laktat yang Diisolasi Dari Dangke Sebagai Kandidat Probiotik Dalam Menghambat Bakteri Patogen*. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Khan, W. A., A. Khan, A. D. Anjum and Z. U. Rehman. *Effects of induced heat stress on haematological values in broiler chicks*. Int. J. of Agric. and Bio. 4 (1): 44-45, 2002..
- Khan T. A, and Zafar F. *Haematological study in response to varying doses of estrogen in broiler chicken*. International journal of poultry science.10: 748-751, 2005.
- Kusnadi, E. *Pengaruh temperatur kandang terhadap konsumsi ransum dan komponen darah ayam broiler*. J. Indon. Trop. Anim. Agric., 33(3):197-202. 2008.
- Kusumasari, Y., F. Y, V. D. Yuniarto, E. Suprijatna. *Pemberian Fitobiotik Yang Berasal Dari Mahkota Dewa (phaleria macrocarpa) Terhadap Kadar Hemoglobin dan Hematokrit pada Ayam Broiler*. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan vol.1 nomor 4, 2012.
- Manin, F., E. Hendalia, Yatno dan P. Rahayu. *Dampak pemberian probiotik FM terhadap status kesehatan ternak Itik Kerinci*. J. Ilmu Ternak. 1 (2): 7-11 2014.
- National Research Council (NRC). *Nutrient Requirement of Poultry*. National Academy Press, Washington, D.C. 1994.
- Olugbemi, T.S., S.K. Mutayoba and F.P. Lekule. *Effect of Moringa (Moringa oleifera) Inclusion in Cassava Based Diets Fed to Broiler Chickens*. Int. J. Poult. Sci., 9 (4): 363-367, 2010.
- Praja, D.I. *The Miracle of Probuotics*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Primacitra. D. Y ,Osfar. Sjofjan. Dan M Halim Natsir. *Pengaruh Penambahan Probiotik (Lactobacillus sp) Dalam Pakan Terhadap Energi Metabolis, Kecernaan Protein Dan Aktivitas Enzim Burung Puyuh*. Jurnal Ternak Tropika Vol. 15 No. 1: 74-79, 2014.
- Rasyaf, M. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya. Jakarta, 2003.
- Reece, W. O. *Functional anatomy and physiology of domestic animals*. Third edition. USA: Blackwell Publishing, 2006.

- Rosmalawati N. *Pengaruh Penggunaan Tepung Daun Sembung (Blumen Blamifera) dalam Ransum terhadap Profil Darah Ayam Broiler Periode Finisher*. Skripsi. IPB: Bogor, 2008. .
- Shihab. M. Q. *Tafsir*. Lentera Hati: Jakarta, 2008.
- Sonjaya, H. *Penuntun Praktikum Dasar Fisiologi Ternak*. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015.
- Sonjaya. H. *Dasar Fisiologi Ternak*. IPB. Bogor, 2012.
- Sugiharto, S. *Role of nutraceuticals in gut health and growth performance of poultry*. J. Saudi Soc. Agric. Sci. Hal: 113. Sugiharto, S., 2014.
- Sukarmiati. *Kajian Penggunaan berbagai Jenis Probiotik terhadap Profil Darah, Titer ND dan Kandungan Amonia Feses Ayam Petelur*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2007.
- Suprijatna. E. Umiyati. A dan Ruhayat. K. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Cetakan 1. Penebar Swadaya: Jakarta, 2005.
- Surono, I.S., *Probiotik, Susu Fermentasi dan Kesehatan*. Jakarta: Tri Cipta Karya, 2004.
- Swenson, M.J. *Physiological Properties and Cellular and Chemical Constituents of Blood In Swenson, M.J. Duke;s Physiology of Domestic Animal*. 10th Ed. Cornell University Press, Ithaca and London, 1993.
- Talebi, A. Asri-Rezaei, S. Rozeh-Chai, R. And Sahraei, R. *Comparative Studies on Hematological values of Broiler Strains (Ross, Cobb, arbor-acres and Arian*. *Int.Journal Poult.Sci*.4(8):573-579, 2005.
- Wardhana, April H, E Kenanawati, Nurmawati, Rahmaweni, dan C.B. Jatmiko. *Pengaruh Pemberian Sediaan Patikaan Kebo (Euphorbia Hirta L) terhadap Jumlah Eritrosit, Kadar Hemoglobin, dan Nilai Hematokrit pada Ayam yang Diinfeksi dengan Eimeria tenella*. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner*. Vol. 6 No. 2 Th. 2001. Bogor, 2001.
- Winarsih, W. *Pengaruh Probiotik dalam Pengendalian Slamonellosis Subklinis pada Ayam Gambaran Patologis dan Performan*. Thesis. Pasca Sarjana. Intitut Pertanian Bogor. Bogor, 2005.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Rerata Nilai Hematokrit (%) Broiler

NO.	PERLAKUAN (P)	ULANGAN (T)			Rerata
		T ₁	T ₂	T ₃	
1.	P ₀	26,1	18	27	23,70
2.	P ₁	25	25,5	23,9	24,80
3.	P ₂	25,3	30,1	24	26,46
4.	P ₃	21,8	32,5	28,4	23,56

Lampiran 2. Rerata Kadar Hemoglobin (%) Broiler

NO.	PERLAKUAN (P)	ULANGAN (T)			Rerata
		T ₁	T ₂	T ₃	
1.	P ₀	9	7,9	9,2	8,7
2.	P ₁	8	8,9	6	7,6
3.	P ₂	6,1	7,9	8	7,3
4.	P ₃	8	10	9	9

Lampiran 3. Rerata Jumlah Eritrosit Broiler

PERLAKUAN	KAMAR HITUNG										TOTAL
	I					II					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
P ₀ T ₁	46	47	48	64	35	54	52	65	56	68	535
P ₀ T ₂	46	43	38	41	53	39	44	40	39	37	420
P ₀ T ₃	35	40	55	32	76	33	32	38	36	36	413
P ₁ T ₁	34	35	30	27	35	41	48	35	35	35	355
P ₁ T ₂	39	43	36	35	36	55	58	65	58	66	491

P ₁ T ₃	40	47	30	35	37	44	38	26	47	41	385
P ₂ T ₁	53	45	44	52	39	42	34	51	39	26	425
P ₂ T ₂	38	34	44	39	45	45	47	39	36	38	405
P ₂ T ₃	46	48	43	46	39	42	44	35	36	40	419
P ₃ T ₁	32	35	27	30	42	28	40	42	34	35	345
P ₃ T ₂	35	33	34	36	37	38	47	37	45	49	391
P ₃ T ₃	67	62	61	62	58	48	44	50	46	39	537

JUMLAH TOTAL ERITROSIT = n x
10000

$$n = \frac{\text{total kamar hitung}}{2}$$

NO.	PERLAKUAN (P)	ULANGAN (T)			Rerata
		T ₁	T ₂	T ₃	
1.	P ₀	2.675.000	2.100.000	2.065.000	2,28 x 10 ⁶ /mm ³
2.	P ₁	1.775.000	2.455.000	1.925.000	2,05 x 10 ⁶ /mm ³
3.	P ₂	2.125.000	2.025.000	2.095.000	2,08 x 10 ⁶ /mm ³
4.	P ₃	1.725.000	1.955.000	2.685.000	2,12 x 10 ⁶ /mm ³

Lampiran 4. Bobot dan pertumbuhan berat badan broiler (g/ekor)

Umur Ayam (Hari)	Bobot Badan (g/ekor)			
	P0	P1	P2	P3
2	54	55	55	50
7	149	142	149	155
14	328	324	355	345
21	668	610	687	730
28	1019	928	1114	1186
35	1538	1408	1579	1632
Umur Ayam (Hari)	Pertumbuhan Bobot Badan (g/ekor/hari)			
	P0	P1	P2	P3
7	95	87	94	105
14	179	182	206	109
21	340	286	332	385
28	351	318	427	456
35	519	480	465	446

Lampiran 5. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada Kadar Hematokrit Broiler Umur 35 Hari

ANOVA

nilai hematokrit

	Jumlah Kuadrat	df	Rerata Persegi	F	Sig.
Antar Kelompok	27.116	3	9.039	.560	.656
Dalam Kelompok	129.053	8	16.132		
Total	156.169	11			

Beberapa Perbandingan

Variabel Terikat: Pemberian BAL

Tukey HSD

(I)Perlakuan	(J) Perlakuan	Rerata Perbedaan (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Selang Kepercayaan	
					Batas Terendah	Batas Teratas
aquades BAL 6	BAL 6	-1.00000	3.27940	.989	-11.5018	9.5018
	BAL 8	-2.76667	3.27940	.833	-13.2685	7.7351
	BAL 10	-3.86667	3.27940	.655	-14.3685	6.6351
BAL 6 BAL 8	aquades	1.00000	3.27940	.989	-9.5018	11.5018
	BAL 8	-1.76667	3.27940	.947	-12.2685	8.7351
	BAL 10	-2.86667	3.27940	.818	-13.3685	7.6351
BAL 8 BAL 10	aquades	2.76667	3.27940	.833	-7.7351	13.2685
	BAL 6	1.76667	3.27940	.947	-8.7351	12.2685
	BAL 10	-1.10000	3.27940	.986	-11.6018	9.4018
BAL 10	aquades	3.86667	3.27940	.655	-6.6351	14.3685
	BAL 6	2.86667	3.27940	.818	-7.6351	13.3685
	BAL 8	1.10000	3.27940	.986	-9.4018	11.6018

Lampiran 6. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada Kadar Hemoglobin Broiler Umur 35 Hari

ANOVA

Nilai Hemoglobin

	Jumlah Kuadrat	Df	Rerata Persegi	F	Sig.
Antar Kelompok	5.873	3	1.958	1.619	.260
Dalam Kelompok	9.673	8	1.209		
Total	15.547	11			

Beberapa Perbandingan

Variabel Terikat: Pemberian BAL

(I) Perlakuan	(J)Perlakuan	Rerata Perbedaan (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Selang Kepercayaan Batas Terendah	Batas Teratas
Aquadess	BAL 6	1.06667	.89784	.650	-1.8085	3.9419
	BAL 8	1.36667	.89784	.469	-1.5085	4.2419
	BAL 10	-.30000	.89784	.986	-3.1752	2.5752
BAL 6	aquadess	-1.06667	.89784	.650	-3.9419	1.8085
	BAL 8	.30000	.89784	.986	-2.5752	3.1752
	BAL 10	-1.36667	.89784	.469	-4.2419	1.5085
BAL 8	aquadess	-1.36667	.89784	.469	-4.2419	1.5085
	BAL 6	-.30000	.89784	.986	-3.1752	2.5752
	BAL 10	-1.66667	.89784	.317	-4.5419	1.2085
BAL 10	aquadess	.30000	.89784	.986	-2.5752	3.1752
	BAL 6	1.36667	.89784	.469	-1.5085	4.2419
	BAL 8	1.66667	.89784	.317	-1.2085	4.5419

Lampiran 7. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada Jumlah Eritrosit Broiler Umur 35 Hari

ANOVA

nilai eritrosit

	Jumlah Kuadrat	df	Rerata Persegi	F	Sig.
Antar Kelompok	92956250000.000	3	30985416670.000	.248	.860
Dalam Kelompok	997650000000.000	8	124706250000.000		
Total	1090606250000.000	11			

Beberapa Perbandingan

Dependent Variable: nilai eritrosit

Tukey HSD

(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Rerata Perbedaan (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Selang Kepercayaan	
					Batas Terendah	Batas Teratas
Aquadres	BAL 6	228333.33330	288335.74180	.856	-695019.2075	1151685.8740
	BAL 8	198333.33330	288335.74180	.899	-725019.2075	1121685.8740
	BAL 10	158333.33330	288335.74180	.944	-765019.2075	1081685.8740
BAL 6	aquadres	-228333.33330	288335.74180	.856	-1151685.8740	695019.2075
	BAL 8	-30000.00000	288335.74180	1.000	-953352.5408	893352.5408
	BAL 10	-70000.00000	288335.74180	.995	-993352.5408	853352.5408
BAL 8	aquadres	-198333.33330	288335.74180	.899	-1121685.8740	725019.2075
	BAL 6	30000.00000	288335.74180	1.000	-893352.5408	953352.5408
	BAL 10	-40000.00000	288335.74180	.999	-963352.5408	883352.5408
BAL 10	aquadres	-158333.33330	288335.74180	.944	-1081685.8740	765019.2075
	BAL 6	70000.00000	288335.74180	.995	-853352.5408	993352.5408
	BAL 8	40000.00000	288335.74180	.999	-883352.5408	963352.5408

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



(Kondisi Kandang Tampak Dari Depan)




(Kondisi Kandang Tampak Dari Dalam)



(Kondisi Kandang Tampak Dari Dekat)



(Vaksinasi Broiler umur 4 hari dengan ND B1)




(Proses Suspensi)




(Proses Pengenceran)



(Penggunaan Spektrofotometer)



(Tata Letak Cuvet)



(Hasil Uji Absorbansi)



(Pemberian BAL Secara Oral)



(Pengambilan Darah Dari Vena Axillaris)

Lampiran 9. Alat dan Bahan Penelitian



(oven)



(Autoklaf)



(Vortex)



(Spektrofotometer)



(Hot Plate)



(Neraca Analitik)



(Cuvet)



(Botol Vial)



(Timbangan Digital)



(Spoit Sonde)



(Tempat Minum 3 liter)




(Lampu 60 watt)




(Karung)



(Tempat Pakan 3 kg)



(Mikroskop)



(HCL)



(Vita chicks)




(Pipet Pengencer RBC)




(Tabung Sahli & warna standar pembanding)




(Kamar Hitung Neubauer)




(Vaksin ND B1)



(Larutan Hayem)



(MRSB)



(Bakto Agar)




(Alkohol)



(H₂SO₄ Pekat)

Lampiran 10. Petunjuk Penggunaan RT- 7600



RIWAYAT HIDUP



Wahyuni Mentari, lahir di Ujung Pandang, 04 Oktober 1996. Anak Pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Ir. Tasir, S.Hi dan Hj. Maryam Abdullah. Penulis memulai Pendidikan di TK Aisyiyah Busthanul Atfhal, kemudian melanjutkan ke Pendidikan Sekolah dasarnya pada Tahun 2003-2007 di SD Inpres Maccini kemudian pindah pada tahun 2007-2008 di SD Inpres Mallengkeri II dan menyelesaikan Pendidikan sekolah dasarnya disana. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang Pendidikan menengah pertamanya di SMP Neg 26 Makassar (2008-2011), lalu pada jenjang Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkannya di MAN 2 Model Kota Makassar (2011-2014). Setelah itu penulis mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri UIN Alauddin Makassar dan dinyatakan lulus pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2014.

Selama tercatat sebagai mahasiswi Biologi, penulis juga aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus diantaranya di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi, sebagai anggota bidang Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi (POK) periode (2015-2016) dan sebagai Koordinator bidang Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi (POK) periode (2016-2017). Penulis juga sebagai anggota di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit 107 UIN Alauddin Makassar Periode (2015-2018). Penulis juga

merupakan salah satu Ketua Srikandi Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Komisariat Uin Alauddin Makassar periode (2016-2018) serta sebagai Ketua Bidang Eksternal di Korps HMI-WATI (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowaraya. Dan juga penulis masih tercatat sebagai salah satu anggota dari Organisasi Kemanusiaan yang bergerak dibidang pendidikan yang bernama “Bangku Pelosok”.

