


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY “F” DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 06 JULI-31 JULI 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh

NISFAWATI

NIM : 70400115070

**JURUSAN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisfawati
Nim : 70400115070
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 11-02-1998
Jurusan/Fakultas : D3 Kebidanan/Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : *Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "F" Dengan Preeklampsia Berat Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tanggal 06 Juli - 31 Juli 2018.*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, plagiat, duplikat, dan dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 06 Agustus 2018

Penyusun



NISFAWATI
NIM:70400115070

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nisfawati
Nim : 70400115070
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "F" Dengan Preeklampsia Berat Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi Kebidanan DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Alauddin Makassar.

Samata, Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Anieq Muntah Alkautzar, S.SiT., M.Keb

dr. Rini Fitriani, M.Kes

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "F" Dengan Preeklampsia Berat Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Pada Tanggal 06 Juli – 31 Juli Tahun 2018, yang disusun oleh Nisfawati NIM: 70400112070, mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu 15 Agustus 2018 M. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Sampura, 15 Agustus 2018 M
04 DzulHijjah, 1439 H

DEWAN PENGLIJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Nitti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb (.....)

Pembimbing I : Anieq Mumti'ah Alkautzar, S.SiT., M.Keb (.....)

Pembimbing II : dr. Rini Fitriani, M. Kes (.....)

Penguji : Dr. Andi Tihardimonto, M. Kes (.....)

Penguji II : Dr. Firdaus Muhammad, M.Hi (.....)

Dekan |

Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan dan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny “F” Dengan Preeklampsia Berat Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018”.

Terima kasih yang tak pernah usai kepada kedua orang tuaku, Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Enre dan Almarhumah Rosi yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, membina penulis dengan ikhlas dan penuh pengorbanan serta kekhusu’an doa yang selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis. Demikian pula kepada saudara-saudaraku yang telah memberiku motivasi dan juga kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun

berkat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengarahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan berkualitas.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb, selaku ketua Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibunda Anieq Mumti'ah Alkautzar, S.SiT., M. Keb, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan KTI ini sehingga jauh lebih baik.
5. dr. Rini Fitriani, M.Kes, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan semangat sehingga lebih semangat dan giat dalam menyelesaikan penulisan KTI ini.
6. dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes, selaku penguji I yang telah memberikan masukan, dan saran guna membangun KTI ini menjadi lebih baik .
7. Ayahanda Dr. Firdaus Muhammad, M.Hi, selaku Penguji II (penguji agama) yang telah memberikan kritik dan sarannya mengenai kaitan kasus penelitian

dalam pandangan islam, sehingga dalam melaksanakan studi kasus maupun penyusunan KTI ini, tidak terlepas dari ajaran islam.

8. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajari kami, berbagi ilmu, berdiskusi dan mendukung setiap langkah kami.
9. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman kebidanan angkatan 2015, kakak- kakak, dan adik-adik kebidanan yang senantiasa telah berpartisipasi dan memberikan semangat yang luar biasa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, masukan ataupun kritikan yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Samata, 06 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Tentang Kehamilan Normal.....	11
1. Pengertian Kehamilan.....	11
2. Tanda - tanda Kehamilan.....	11

3. Perubahan Fisiologi pada Kehamilan	15
4. Perubahan Psikologis pada Ibu Hamil.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Preeklampsia.....	20
1. Pengertian Preeklampsia	20
2. Faktor Resiko Preeklampsia.....	21
3. Klasifikasi Preeklampsia.....	24
4. Patofisiologi Preeklampsia.....	25
5. Penatalaksanaan Pada Preeklampsia	31
6. SOP Preeklampsia.....	35
C. Tinjauan Umum Preeklampsia Pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam	37
D. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan.....	41
1. Definisi Asuhan Kebidanan.....	41
2. Tahapan Manajemen Kebidanan	41
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan	48
BAB III STUDI KASUS	
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	51
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual	58
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial	62
D. Langkah IV : Tindakan Emergency atau Kolaborasi	63
E. Langkah V : Intervensi	64
F. Langkah VI : Implementasi	66
G. Langkah VII : Evaluasi	67

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I	: Identifikasi Data Dasar.....	107
B. Langkah II	: Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual.....	110
C. Langkah III	: Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial	114
D. Langkah IV	: Tindakan Emergency atau Kolaborasi	115
E. Langkah V	: Intervensi.....	116
F. Langkah VI	: Implementasi.....	117
G. Langkah VII	: Evaluasi.....	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	-----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dari Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Gowa Atau Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepada Kepala Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab.Gowa
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf Kab.Gowa
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Jurusan Kebidanan
Uin Alauddin Makassar
Karya Tulis Ilmiah, Juli 2018

Nama : Nisfawati
NIM : 70400115070

Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny “F” Dengan Preeklampsia Berat Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 06 Juli – 31 Juli Tahun 2018

Preeklampsia Berat adalah kenaikan tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg dan disertai dengan proteinuria $\geq +2$ dan pembengkakan pada wajah atau tungkai. Preeklampsia dapat timbul pada trimester III dan dapat juga muncul sebelumnya atau diatas usia kehamilan 20 minggu dan jika muncul di bawah 20 minggu maka itu bukan preeklampsia. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ny “F” dengan Preeklampsia Berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “F” dengan Preeklampsia Berat, tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny “F” yaitu dengan memasang infuse RL, memantau tekanan darah ibu, memasang kateter, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat untuk mencegah kejang.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa observasi dan analisa data pada Ny “F” dengan Preeklampsia Berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2018 selama 5 hari di RSUD dan kunjungan rumah 3 kali maka didapatkan hasil yaitu tekanan darah sudah turun menjadi 120/80 mmHg, proteinuria Negatif serta pembengkakan pada tungkai menurun dan kehamilan berlangsung normal dan keadaan janin baik dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “F” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus.

Kata kunci : Ibu Hamil, Preeklampsia Ringan, 7 langkah varney

ABSTRACT

Midwifery Departement
Alauddin State Islamic University of Makassar
Scientific Paper, July 2018

Name : Nisfawati
NIM : 70400115070

The Antenatal Care Obstetric Manajement On Mrs "F" With Weight Preeclampsia at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital On July 06 – July 31, 2018

Preeclampsia Weight is the increase in blood pressure $\geq 160/110$ mmHg and accompanied by proteinuria $\geq +2$ and swelling of the face or limbs. Preeclampsia can arise on a trimester-III and can also appear before or above the gestational age of 20 weeks and if it appears under 20 weeks then it is not preeclampsia. The objective of the study is to provide care to mother with weight preeclampsia at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 using a case study approach with the seven steps of Varney and SOAP obstetric care manajement methods.

The results of a case study conducted on Mrs "F" with weight preeclampsia were not identified some obstacles when handling the case. The handling is done on Mrs "F" is the installing infuse RL, monitor the mother's blood pressure, placing a catheter, a collaboration with doctors for administering drug therapy to prevent seizures.

The conclusion of the case, namely the seven steps of Varney and SOAP that is used for the process of solving problems of midwifery has implemented the study of the form of observation and data analysis in Mrs "F" with weight preeclampsia at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 for 5 days in the Regional Public Hospital and home visits 3 times then obtained a result that is already down to blood pressure 120/80 mmHg, negative proteinuria(-) and swelling legs had been resolved, the pregnancy was normal and the fetus was in good condition; it had been carried out a study to document all the findings and actions performed for Mrs "F" with the result of no gap between the theory and the case.

Keywords: Pregnancy, Weight Preeclampsia, Seven Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan dan persalinan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, proteinuria dan oedema, yang kadang-kadang disertai dengan komplikasi koma. Gejala dari preeklampsia seperti hipertensi, oedema dan proteinuria sering tidak diperhatikan, sehingga tanpa disadari dalam waktu singkat dapat timbul menjadi preeklampsia berat, bahkan eklampsia (Prawihardjo S, 2014: 532).

Gambaran klinik preeklampsia bervariasi luas dan sangat individual. Kadang-kadang sukar untuk menentukan gejala preeklampsia mana yang timbul lebih dahulu. Secara teoritik urutan-urutan gejala yang timbul pada preeklampsia ialah oedema, hipertensi, dan terakhir proteinuria merupakan gejala yang paling penting. Namun sayangnya penderita sering kali tidak merasakan perubahan ini. Bila penderita sudah mengeluh adanya gangguan penglihatan, atau nyeri epigastrium, maka penyakit ini sudah cukup lanjut (Sarwono, 2014).

Gejala preeklampsia dapat dicegah dan dideteksi secara dini. Pemeriksaan antenatal yang teratur dan secara rutin mencari tanda-tanda preeklampsia, sangat penting dalam usaha pencegahan preeklampsia berat dan eklampsia. Ibu hamil yang mengalami preeklampsia berat perlu ditangani dengan segera. Penanganan ini dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak (Prawihardjo S, 2014: 543).

Status gizi merupakan salah satu status kesehatan yang mempengaruhi kejadian preeklampsia selain riwayat penyakit-penyakit yang terkait (preeklampsia, hipertensi, dan diabetes melitus). Ibu hamil yang mengalami obesitas beresiko lebih besar mengalami preeklampsia. Kegemukan disamping menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah juga menyebabkan kerja jantung lebih berat. Semakin gemuk seseorang maka semakin banyak pula jumlah darah yang terdapat di dalam tubuh yang berarti makin berat pula fungsi pemompaan jantung sehingga dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia. Selain itu faktor kecemasan juga menjadi pemicu terjadinya preeklampsia dimana kecemasan dapat mengakibatkan gangguan seperti meningkatnya tekanan darah dan denyut jantung (Dyah Ayu Wulandari, 2016:17).

Dampak preeklampsia pada ibu hamil yaitu terjadi kerusakan organ-organ tubuh seperti, sistem saraf pusat, perdarahan intrakranial, gagal jantung, gagal ginjal, gangguan fungsi hati dan edema paru, sedangkan pada janin ialah *intrauterine fetal growth restriction*, solusio plasenta, prematur, sindroma distress, kematian janin, perdarahan intraventrikular, kematian janin, dan kematian maternal (Sarwono, 2014:550).

Insiden preeklampsia di Negara berkembang sekitar 1,8%-18%. Preeklampsia dan eklampsia menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian di Indonesia dengan presentasi sebesar 26,9% pada tahun 2012 dan meningkat kembali pada tahun 2013 yaitu sebanyak 27,1%. (Depkes RI, 2015).

Kematian ibu terjadi akibat berbagai komplikasi dalam kehamilan, persalinan atau periode setelah melahirkan. Komplikasi tersebut disebabkan oleh

penyakit langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung terjadi akibat komplikasi obstetrik atau penyakit kronik yang menjadi lebih berat selama kehamilan. Penyebab langsung yang sering ditemui antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, dan infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung terjadi akibat penyakit yang telah ada sejak atau sebelum kehamilan atau penyakit yang timbul selama kehamilan seperti malaria dan anemia. (Sarwono, 2014).

Data yang didapatkan menurut WHO pada tahun 2014 melaporkan bahwa Angka Kematian Ibu di dunia mencapai 289.000 jiwa. Amerika Serikat yaitu 9300 jiwa, Afrika Utara yaitu 179.000 jiwa dan Asia Tenggara mencapai 16.000 jiwa. Angka Kematian Ibu (AKI) di Asia Tenggara yaitu Indonesia mencakup 214 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup. (WHO, 2014)

Di Indonesia AKI tergolong masih tinggi dan merupakan masalah besar bagi pembangunan kesehatan Indonesia. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) AKI tahun 2012 meningkat yaitu sebesar 350/100.000 kelahiran hidup dari 288/100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan, 39%, preeklampsia/eklampsia 24%, infeksi 7%, partus lama 5%, abortus 5% dan lainnya 33% (SDKI, 2012). Sedangkan di Negara maju, angka kejadian preeklampsia berkisar antara 6% - 7% (Kemenkes, 2014).

Data yang telah diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tentang kejadian preeklampsia pada ibu hamil pada tahun 2015 sebanyak 68 orang, tahun 2016 sebanyak 78 orang dan tahun 2017 sebanyak 96 orang. Jumlah kematian di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sebanyak 103 orang dengan angka kematian ibu hamil sebanyak 28 orang (17,6%), ibu bersalin sebanyak 47 orang (48,3%) dan ibu nifas sebanyak 40 orang (35,1%). Dan penyebab kematian ibu yaitu karena preeklampsia 68%, perdarahan 30% dan infeksi 4% (Dinas Kesehatan provinsi Sul-Sel, 2017).

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa juga didapatkan data tentang jumlah preeklampsia berat yang dialami oleh ibu hamil pada tahun 2015 sebanyak 21 orang, tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 23 orang dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebanyak 36 orang (Dinkes Gowa, 2017).

Dari data yang diperoleh dari Rekam Medis RSUD Syekh Yusuf Gowa angka kejadian preeklampsia berat pada ibu hamil pada tahun 2015 sebanyak 14 orang. Angka kejadian ini meningkat pada tahun 2016 yaitu berjumlah 17 orang. Dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebanyak 18 orang.

Pada umumnya kehamilan akan berlangsung normal dan sering kali kehamilan berubah menjadi kehamilan patologi. Deteksi dini gejala dan tanda bahaya selama kehamilan merupakan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan ataupun keselamatan ibu hamil. Deteksi dini didapatkan dari pemeriksaan tekanan darah secara rutin pada saat pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*). Karena itu pemeriksaan kehamilan rutin mutlak dilakukan agar preeklampsia dapat dideteksi lebih awal (Sarwono, 2014).

Dari data-data yang ada diatas kejadian preeklampsia pada ibu hamil kadang meningkat dan kadang menurun namun dari angka kejadian tersebut dapat menjadi acuan bagi kita sebagai petugas tenaga kesehatan khususnya seorang Bidan yang harus mampu mengurangi sepenuhnya angka kejadian preeklampsia. Karena dapat kita ketahui bahwa seorang ibu hamil yang mengalami preeklampsia berat akan beresiko mengalami kejang dan syok dan kadang berujung pada kematian apabila tidak mendapatkan penanganan yang cepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia Berat.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan dapat memperoleh informasi dan pelayanan nyata tentang proses Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia Berat.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanann *Antenatal care* dengan kasus preeklampsia berat.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dengan kasus preeklampsia berat.
- b. Dirumuskannya diangnosa/ masalah aktual yang terjadi dengan kasus preeklampsia berat.

- c. Dirumuskannya diagnosa/ masalah potensial dengan kasus preeklampsia berat.
- d. Dilakukannya identifikasi tindakan segera/ kolaborasi dengan kasus preeklampsia berat.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan dengan kasus preeklampsia berat.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang telah disusun pada ibu hamil dengan kasus preeklampsia berat.
- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan dengan kasus preeklampsia berat.
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah diberikan dengan kasus preeklampsia berat.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelolah program kesehatan dalam mencegah dan penanganan preeklampsia berat pada ibu hamil.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang preeklmasia berat pada ibu hamil.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang preeklamsia berat pada ibu hamil.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan preeklamsia berat pada ibu hamil.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang preeklampsia berat pada ibu hamil.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Keputusan

Penulisan mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan Preeklamsia.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan asuhan dan melaksanakan tindakan asuhan,

evaluasi hasil asuhan kebidanan serta pendokumentasian asuhan kebidanan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa/Wawancara

Penulisan menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara pemeriksaan:

- 1) Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata. Inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi jaringan atau organ pada tubuh.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada pemeriksaan fisik.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian dengan menggunakan pendengaran yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, bunyi usus serta mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, lingkungannya, kehidupan bertetangga, dan keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan dokter dan bidan yang menangani langsung klien dan dosen pembimbing baik dilahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II tujuan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kehamilan, tinjauan umum *antenatal care*, tinjauan khusus tentang

preeklampsia berat, tinjauan kehamilan menurut padang islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia berat.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional (FOGI, 2014), kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu yaitu minggu ke-13 hingga ke-27 dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40 minggu) (Prawihardjo 2014, 213).

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang memberikan perubahan pada ibu maupun lingkungannya. Dengan adanya kehamilan maka seluruh system genitalia wanita mengalami perubahan yang mendasar untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim selama proses persalinan berlangsung (Hutahean Serri 2013, 43).

2. Ada beberapa tanda-tanda kehamilan yang dapat diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a. Tanda persumtif/dugaan

Tanda persumtif adalah perubahan fisiologik pada ibu atau seorang perempuan yang mengindikasikan bahwa ia telah hamil. Tanda-tanda

tidak pasti atau terduga hamil adalah perubahan anatomic dan fisiologik selain dari tanda-tanda persumtif yang dapat dideteksi atau dikenali oleh pemeriksa.(Sarwono Prawihardjo 2014, 214).

Yang Termasuk tanda persumtif adalah:

1) *Amenorhea* (Tidak dapat haid)

Pada wanita sehat dengan haid yang tidak teratur, *amenorrhea* menandakan kemungkinan hamil. Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita yang hamil tidak dapat haid lagi. Kadang-kadang *amenorhea* disebabkan oleh hal-hal lain diantaranya penyakit berat seperti TBC, Typhus, Anemia atau karena pengaruh psikis misalnya karena perubahan lingkungan (dari desa ke asrama) juga dalam masa perang sering timbul *amenorhea* pada wanita.

2) *Morning Sickness* (Mual dan Muntah)

Mual dan muntah pada umumnya terjadi di bulan-bulan pertama kehamilan sampai akhir bulan pertama disertai kadang-kadang oleh muntah. Sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu. Dalam batas tertentu keadaan ini masih fisiologis, namun bila sudah terlampau sering dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang disebut dengan hiperemesis gravidarum.

3) Sering buang air kecil

Terjadi karena kandung kemih pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua pada umumnya keluhan ini hilang oleh karena

uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan gejala bisa timbul kembali karena janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kencing.

4) Payudara Membesar dan Tegang

Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh esterogen dan progesterone yang merangsang duktus dan alveoli pada mammae, sehingga glandula montgomery tampak lebih jelas.

5) Pigmentasi kulit

Terjadi pada kehamilan 12 minggu ketasa. Pada pipi, hidung, dan adahi, kadang-kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan yang dikenal dengan cloasma gravidarum (topeng kehamilan). Areola mammae juga berubah menjadi hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher menjadi lebih hitam dan linea alba. Hal ini terjadi karena pengaruh hormone kortiko steroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit (Nugroho Taufan, dkk 2014, 60-63).

b. Tanda Kemungkinan Hamil

Adalah perubahan-perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa (bersifat obyektif), namun berupa dugaan kehamilan saja. Yang termasuk tanda-tanda kemungkinan hamil yaitu:

- 1) Uterus membesar terjadi perubahan bentuk, besar dan konsistensi rahim. Pada pemriksaan dalam dapat pula diraba bahwa uterus membesar dan makin lama semakin bundar bentuknya.

- 2) Tanda hegar adalah perubahan pada isthmus uteri yang menyebabkan isthmus uteri menjadi lebih panjang dan lunak (usia 6 minggu).
 - 3) Tanda *Chadwick* adalah warna merah tua atau kebiruan pada vagina akibat peningkatan vaskularisasi (usia 8 minggu).
 - 4) Tanda *Piscasek* adalah pertumbuhan rahim tidak sama kesemua arah, tetapi terjadi pertumbuhan yang cepat didaerah implantasi plasenta sehingga bentuk rahim tidak simetris (usia 4-6 minggu).
 - 5) Tanda *Braxton Hicks* adalah kontraksi uterus yang datangnya sewaktu-waktu, tidak beraturan dan tidak mempunyai irama tertentu (akhir trimester).
 - 6) Tes kehamilan positif (usia 7-10 hari setelah konsepsi) (Nugroho Taufan,dkk 2013, 44).
- c. Tanda pasti adalah tanda-tanda obyektif yang didapatkan oleh pemeriksaan yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosa pada kehamilan. Yang termasuk tanda pasti kehamilan yaitu:
- 1) Terasa gerakan janin, gerakan pada primigravida dapat dirasakan oleh ibunya pada kehamilan 18 minggu, sedangkan pada multigravida pada kehamilan 16 minggu, karena telah berpengalaman dari kehamilan yang lalu. Pada bulan ke-IV dan V janin itu kecil diandingkan dengan banyaknya air ketuban, maka kalau rahim diorong atau digoyangkan, maka anak melenting didalam rahim. Ballotement ini dapat ditentukan dengan

pemeriksaan luar maupun dengan jari yang melakukan pemeriksaan dalam.

- 2) Teraba bagian-bagian janin, bagian-bagian janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksaan dengan cara palpasi menurut Leopold pada akhir trimester kedua.
- 3) Denyut jantung janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksa dengan menggunakan system doopler pada kehamilan 12 minggu danm stetoskop leanec pada kehamilan 18-20 minggu.
- 4) Terlihat kerangka janin pada pemeriksaan sinar rontgen. Dengan menggnakan USG dapat terlihat gambaran janin berupa ukuran kantong janin, panjangnya janin, dan diameter biparietalis hingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan (Nugroho Taufan,dkk 2014, 65-66).

3. Perubahan Fisiologis Pada Kehamilan

a. Berat Badan

- 1) Peningkatan berat badan sekitar 25% dari sebelum hamil (rata-rata 12,5 kg).
- 2) Pada trimester II dan III sebanyak 0,5 kg/ minggu.
- 3) Pengaruh dari pertumbuhan janin, pemeriksaan organ maternal, penyimpanan lemak dan protein, serta peningkatan volume darah dan cairan intertisial pada maternal.

b. Sistem Reproduksi

- 1) Uterus mengalami kenaikan yaitu 20 x 50 gram, volume 10 ml serta mengalami pembesaran uterus karena pengaruh esterogen adalah hiperplasia hipertrofi aringan otot uterus.
- 2) Serviks, pada serviks terdapat tanda-tanda *Chadwick*, *goondel* dan *mucus plug*, serviks uteri mengalami hipervaskularisasi dan pelunakan dan lendir serviks meningkat seperti gejala keputihan.
- 3) Ovarium, fungsi ovarium diambil alih oleh plasenta terutama fungsi produksi progesterone dan esterogen pada usia kehamilan 16 minggu . Tidak terjadi kematangan ovum selama kehamilan.
- 4) Payudara, payudara menjadi lebih besar, kenyal, terasa tegang, areola mengalami hiperpigmentasi, glandula montgomeri makin tampak, papilla mammae makin membesar atau menonol serta pengeluaran ASI belum berlangsung karena prolaktin belum berfungsi.
- 5) Vulva mengalami hipervaskularisasi karena pengaruh esterogen dan progesterone atau berwarna kebiruan.

c. Sistem Muskolesketal

- 1) Pembesaran payudara dan rotasi anterior panggul memungkinkan untuk etrajdinya lorosis
- 2) Ibu sering mengalami nyeri dibagian punggung dan pinggang karena mempertahankan posisis stabil.

- 3) Adaptasi muskolesketal yang disebabkan oleh pengbaruh hormonal yaitu relaksasi persendian karena pengaruh hormone relaksin, mlibilitas dan pliabilitas atau pelunakan meningkat pada sendi sakroiliaka, sakrokoksigeal dan pelvis untuk persiapan persalinan.
- 4) Relaksasi dan hipermobilitas sendi pada masa hamil kembali stabil dan ukuran sama dengan sebelum hamil, kecuali pada kaki (Hutaehan, Serri 2013, 45-46).

d. Sistem Integumen

Selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan pada system organ ibu dikarenakan pengaruh hormon. Begitupun dengan system integument. Perubahan pada system integument selama hamil disebabkan oleh perubahan keseimbangan hormone dan peregangan ekans yang ditandai dengan beberapa kondisi sebagai berikut.

- 1) Peningkatan aktivitas *melanophore stimulating hormone* mengakibatkan hiperpigmentasi wajah (*Cloasma gravidarum*), payudara, linea alba, dan striae gravidarum. Jaringan elastic kulit mudah pecah, menyebabkan striae gravidarum, atau tanda regangan. Respon alergi kulit meningkat. Kelenjar sebaceous, keringat, folikel rambut lebih aktif. Pigmentasi timbul akibat peningkatan hormone hipofisis anteriopr menotropin selama masa hamil, contoh pimentasi padawajah yaitu cloasma. Striae gravidarum atau tanda regangan terlihat dibawah abdomen disebabkan kerja adenokortikosteroid.

2) Perubahan umum lainnya yang timbul adalah peningkatan ketebalan kulit dan lemak subdermal, hiperpigmentasi, pertumbuhan rambut, kuku, percepatan aktivitas kelenjar keringat dan sebacea, serta peningkatan sirkulasi dan aktivitas vasomotor.

e. Sistem Respirasi

Kebutuhan oksigen meningkat 15%-20% diafragma terdorong keatas, hiperventilasi, pernapasan dangkal (20-24 x/menit) mengakibatkan penurunan compliansi dada, dan kapasitas paru serta terjadi peningkatan volume tidal. Oleh karena itu, system respirasi selama kehamilan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan inspirasi dan ekspirasi dalam pernapasan, yang secara langsung juga mempengaruhi suplai oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂) pada janin. Jika inspirasi meningkat maka jumlah kebutuhan oksigen akan meningkat (oksigen di arteri meningkat), sehingga suplai oksigen yang sampai ke fetus meningkat. Tapi jika ekspirasi meningkat maka output karbondioksida meningkat, sehingga karbondioksida dalam darah maternal menurun yang selanjutnya akan memudahkan transfer karbondioksida dari fetus kepada maternal.

f. Sistem Gastrointestinal

Selama masa hamil, nafsu makan meningkat, sekresi usus berkurang, fungsi hati berubah, dan absorpsi nutrient meningkat. Aktivitas peristaltik(motilitas) menurun, akibatnya bising usus menghilang, sehingga menyebabkan konstipasi, mual serta muntah. Aliran darah ke

panggul dan tekanan darah meningkat sehingga menyebabkan hemoroid terbentuk pada akhir kehamilan.

g. Sistem Kardiovaskular

Hipertrofi atau dilatasi ringan jantung mungkin disebabkan oleh peningkatan volume darah dan curah jantung. Oleh karena diafragma terdorong keatas, jantung terangkat ke atas lalu berotasi kedepan dan kekiri. Peningkatan ini juga menimbulkan perubahan hasil auskultasi yang umum terjadi selama masa hamil. Perubahan pada auskultasi mengiringi perubahan ukuran dan posisi jantung (Hutahean Serri 2013, 44-50).

h. Sistem Perkemihan

Uretra membesar, tonus otot-otot saluran kemih menurun akibat pengaruh esterogen dan progesterone. Kencing lebih sering laju filtrasi meningkat sampai 60%-150%. Dinding saluran kemih dapat tertekan oleh pembesaran uterus menyebabkan ibu sering berkemih (Sukarni, Icesmi 2013, 70).

4. Perubahan Psikologis Pada Kehamilan

Sikap atau penerimaan ibu terhadap keadaan hamilnya sangat mempengaruhi kesehatan atau keadaan umum ibu serta keadaan janin dalam kehamilannya. Umumnya kehamilan yang didinginkan akan disambut dengan sangat gembira, diiringi dengan pola makan yang teratur, perawatan tubuh dan upaya memeriksakan diri secara teratur dengan baik. Kadang timbul gejala yang lazim disebut ngidam, yaitu keinginan terhadap

hal-hal tertentu yang tidak seperti biasanya. Akan tetapi kehamilan yang tidak diinginkan, kemungkinan akan disambut dengan sikap tidak mendukung, nafsu makan menurun, tidak mau memeriksakan kehamilannya secara teratur, bahkan kadang-kadang juga ibu sampai melakukan saha-usaha untuk mnggugurkan kandungannya (Nugroho Taufan 2013, 52).

B. Tinjauan Umum Tentang Preeklampsia

1. Definisi Preeklampsia

Preeklampsia adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin dan nifas yang terdiri dari hipertensi, edema, dan proteinuria yang muncul pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan (Sukarni Icesmi dan Margaretha 2013, 169).

Preeklampsia adalah sekumpulan gejala yang secara spesifik hanya muncul selama kehamilan dengan usia lebih dari 20 minggu (kecuali pada penyakit trofoblastik) dan dapat di diagnosis dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Ada peningkatan tekanan darah selama masa kehamilan sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg), yang sebelumnya normal, disertai proteinuria ($\geq 0,3$ gram protein selama 24 jam atau ≥ 30 mg/dl dengan hasil reagen urine $\geq +1$).
- b. Apabila hipertensi selama kehamilan muncul tanpa proteinuria, perlu dicurigai adanya preeklampsia seiring kemajuan kehamilan, jika muncul gejala nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri pada

abdomen, nilai trombosit rendah dan kadar enzim ginjal normal (Norma Nita dan Mustika 2013, 59).

2. Faktor Resiko Preeklampsia

Ada beberapa faktor resiko tertentu yang berkaitan dengan perkembangan penyakit:

a. Primigravida, kira-kira 85% preeklampsia terjadi pada kehamilan pertama

Berdasarkan teori imunologik, preeklampsia pada primigravida terjadi dikarenakan pada kehamilan pertama terjadi pembentukan *blocking antibodies* terhadap antigen tidak sempurna. Selain itu pada kehamilan pertama terjadi pembentukan *Human Leucoyte Antigen* (HLA-G) yang berperan penting dalam modulasi respon imun sehingga ibu menolak hasil konsepsi atau terjadi intoleransi ibu terhadap plasenta sehingga menyebabkan preeklampsia (Norma Nita dan Mustika 2013, 67).

b. Grand multigravida

Pada ibu yang grand multigravida beresiko mengalami preeklampsia dikarenakan terjadi perubahan pada alat-alat kandungan yang berkurang elastisnya termasuk pembuluh darah sehingga lebih memudahkan terjadinya vasokonstriksi, terjadi peningkatan cairan, timbul hipertensi yang disertai oedema dan proteinuria (Norma Nita dan Mustika 2013, 68).

- c. Distensi rahim berlebihan: hidramnion, hamil ganda, dan mola hidatidosa. Preeklampsia terjadi pada 14% sampai 20% kehamilan dengan janin lebih dari satu.

Kehamilan ganda dan hidramnion sangat berkaitan dengan kejadian preeklampsia. Ibu dengan hamil ganda dapat menyebabkan terjadinya hidramnion akibat dua janin yang ada dalam rahim ibu sehingga tekanan dalam rahim ibu berlebihan. Akibatnya cairan yang berlebihan dalam rahim akan memudahkan terjadinya vasokonstriksi dan peningkatan pada tekanan darah ibu (Norma Nita dan Mustika 2013, 68).

- d. Morbid obesitas atau kegemukan dan penyakit yang menyertai kehamilan seperti diabetes mellitus

Kegemukan disamping menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah juga menyebabkan kerja jantung lebih berat. Semakin gemuk seseorang maka semakin banyak pula jumlah darah yang terdapat di dalam tubuh yang berarti makin berat pula fungsi pemompaan jantung sehingga dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia. Preeklampsia lebih cenderung juga terjadi pada wanita yang menderita diabetes melitus karena pada saat hamil plasenta berperan untuk memenuhi semua kebutuhan janin. Pertumbuhan janin dibantu oleh hormon-hormon dari plasenta, namun hormone-hormon plasenta ini juga mencegah kerja insulin dalam tubuh ibu hamil. Hal ini disebut resistensi insulin atau kebal insulin. Resistensi insulin membuat tubuh

ibu hamil lebih sulit untuk mengatur kadar gula darah sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi energi dan menumpuk didalam darah sehingga keadaan ini menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi tinggi (Dyah Ayu Wulandari, 2016:17).

- e. Pada ibu yang mengalami hipertensi kronis atau penyakit ginjal, insiden dapat mencapai 25%.

Ibu hamil dengan hipertensi kronis lebih memudahkan terjadinya preeklampsia berat dikarenakan pembuluh darah ibu sebelum mencapai 20 minggu sudah mengalami vasokonstriksi. Hal ini akan menyebabkan tekanan darah ibu tinggi dan kandungan dalam protein dalam urin selama kehamilan semakin meningkat. Gagal ginjal juga menyebabkan terjadinya preeklampsia akiba terjadi penurunan aliran darah ke ginjal sehingga menyebabkan filtrasi glomerulus berkurang akibatnya terjadi proteinuria (Dyah Ayu Wulandari, 2016:18).

- f. Jumlah umur ibu diatas 35 tahun

Wanita pada usia lebih dari 35 tahun lebih mudah mengalami berbagai masalah kesehatan salah satunya hipertensi dan preeklampsia. Hal ini terjadi karena terjadinya perubahan pada jaringan alat-alat kandungan dan jalan lahir tidak lentur lagi begitu pula dengan pembuluh darah, juga diakibatkan tekanan darah yang meningkat seiring dengan penambahan usia sehingga memudahkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah ibu, proteinuria dan oedema. Usia 35 tahun sebenarnya belum dianggap rawan, hanya pada usia ini kemampuan

reproduksi lebih menurun sehingga usia diatas 35 tahun dianggap fase untuk menghentikan kehamilan (Sukarni Icesmi dan Margaretha 2013, 169).

3. Klasifikasi Preeklampsia

Adapun preeklampsia digolongkan kedalam preeklampsia ringan dan preeklampsia berat dengan gejala dan tanda sebagai berikut:

a. Preeklampsia Ringan

Preeklampsia ringan adalah suatu sindroma spesifik kehamilan dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya vasopasme pembuluh darah dan aktivasi endotel (Prawihardjo 2014, 543). Berikut diagnosis preeklampsia ringan:

- 1) Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg pada usia kehamilan diatas 20 minggu
- 2) Tes celup urine menunjukkan proteinuria 1+ atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 300 mg/24 jam.

b. Preeklampsia Berat

Preeklampsia berat adalah preeclampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan diastolic ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Prawihardjo 2014, 544). Berikut diagnosis preeklampsia berat:

- 1) Tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu

- 2) Tes celup urine menunjukkan proteinuria $\geq 2+$ atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 5 g/24 jam
- 3) Atau keterlibatan organ lain:
 - a) Trombositopenia (< 100.000 sel/uL), hemolisis mikiroangiopati
 - b) Peningkatan SGOT/SGPT, nyeri abdomen kuadran kanan atas
 - c) Sakit kepala, skotoma penglihatan
 - d) Pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion
 - e) Edema paru atau gagal jantung kongestif
 - f) Oliguria (< 500 ml/24 jam), kreatinin lebih dari 1,2 mg/dl (Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan 2013, 111).

4. Patofisiologi Preeklampsia

a. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Pada kehamilan normal, rahim dan plasenta mendapat aliran darah dari cabang-cabang arteri uterine dan arteri ovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus miometrium berupa arteri akuarta memberi cabang arteri radialis. Arteri radialis menembus endometrium menjadi arteri basalis memberi cabang arteri spiralis.

Pada hamil normal, terjadi invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteri spiralis, yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut sehingga terjadi dilatasi pada arteri spiralis. Invasi trofoblas juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami

distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vascular, dan peningkatan aliran darah pada daerah utero plasenta. Akibatnya, aliran darah ke janin cukup banyak dan perfusi jaringan juga meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik.

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas secara sempurna pada lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis relative mengalami vasokonstriksi sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, sehingga terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta.

b. Teori iskemia plasenta, Radikal bebas dan disfungsi endotel

Sebagaimana dijelaskan pada teori invasi trofoblas, pada preeklampsia terjadi kegagalan pada aliran pembuluh darah, akibatnya plasenta mengalami iskemia. Plasenta yang mengalami iskemia plasenta dan hipoksia akan menghasilkan oksidan (disebut juga radikal bebas). Oksidan dan radikal bebas adalah senyawa penerima electron atau atom/molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Radikal hidroksil akan merusak membran sel,

yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak. Peroksida lemak selain akan merusak membran sel, juga akan merusak nukleus, dan protein sel endotel. Produksi oksidan atau radikal bebas dalam tubuh yang bersifat toksis, selalu diimbangi dengan produksi antioksidan.

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan sel endotel, yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya seluruh struktur sel endotel atau disebut dengan disfungsi endotel. Pada waktu terjadi kerusakan sel endotel yang mengakibatkan disfungsi endotel yang mengakibatkan disfungsi sel endotel, maka akan terjadi;

- 1) Gangguan metabolisme prostaglandin, karena salah satu fungsi sel endotel adalah memproduksi prostaglandin yaitu menurunnya produksi prostaglandin (PGE₂): suatu vasodilator kuat.
- 2) Agregasi sel-sel trombosit pada daerah sel endotel yang mengalami kerusakan. Agregasi sel trombosit ini adalah untuk menutup tempat-tempat di lapisan sel endotel yang mengalami kerusakan. Agregasi trombosit memproduksi tromboksan (TXA₂): suatu vasokonstriktor kuat. Dalam keadaan normal perbandingan kadar prostasiklin/tromboksan lebih tinggi kadar prostasiklin sehingga lebih tinggi vasodilator). Pada preeklampsia kadar tromboksan

lebih tinggi dari kadar prostasiklin sehingga terjadi vasokonstriksi, akibatnya tekanan darah mengalami kenaikan.

3) Peningkatan permeabilitas kapilar

c. Teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin

Pada perempuan hamil normal, respon imun tidak menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Hal ini disebabkan adanya *human leukocyte antigen protein G* (HLA-G), yang berperan penting dalam modulasi respon imun, sehingga ibu tidak menolak hasil konsepsi (pkasenta). Adanya HLA-G pada plasenta dapat melindungi trofoblas janin dari lisis oleh sel *Natura Killer* (NK) ibu.

Selain itu adanya HLA-G akan mempermudah invasi sel trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu. Jadi HLA-G merupakan prakondisi untuk terjadinya invasi trofoblas kedalam jaringan desidua ibu, disamping untuk menghadapi sel *Natural Killer*. Pada plasenta hipertensi dalam kehamilan, terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-G di desidua daerah plasenta, menghambat invasi trofoblas kedalam desidua. Invasi trofoblas sangat penting agar jaringan desidua menjadi lunak, dan gembur sehingga memudahkan terjadinya dilatasi arteri spiralis. HLA-G akan merangsang produksi sitikon, sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi. Kemungkinan terjadi *immune-maladapatation* pada preeklampsia.

d. Teori adaptasi kardiovaskular

Pada hamil normal pembuluh darah refrakter terhadap bahan-bahan vasesproser. Refrakter berarti pembuluh darah tidak peka terhadap rangsangan bahan vasespresor, atau dibutuhkan kadar vasopresor yang lebih tinggi untuk menimbulkan respon vasokontriksi. Pada kehamilan normal terjadi refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor adalah akibat dilindungi oleh adanya sintesis prostaglandin pada sel endotel pembuluh darah.

Pada hipertensi dalam kehamilan kehilangan daya refrakter terhadap bahan vasokonstriktor, dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Artinya, daya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang sehingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan vasopresor. Ada faktor keturunan dan familial dengan model gen tunggal. Genotipe ibu lebih menentukan terjadinya preeklampsia dalam kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan genotipe janin. Telah terbukti bahwa pada ibu yang mengalami preeklampsia, 26% anak perempuannya akan mengalami preeklampsia pula, sedangkan hanya 8% anak menantu mengalami preeklampsia.

e. Teori defisiensi gizi

Beberapa peneliti juga menganggap bahwa defisiensi kalsium pada diet perempuan hamil mengakibatkan resiko terjadinya preeklampsia/eklampsia. Penelitian di Negara Equador Andes dengan

metode uji klinik, ganda tersamar, dengan membandingkan pemberian kalsium dan placebo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang diberi suplemen kalsium cukup, kasus yang mengalami preeklampsia adalah 14% sedangkan yang diberi glukosa 17%.

f. Teori stimulus inflamasi

Teori ini berdasarkan fakta bahwa lepasnya debris trofoblas di dalam sirkulasi darah merupakan rangsangan utama terjadinya proses inflamasi. Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis dan nekrotik trofoblas akibat reaksi stres oksidatif.

Bahan-bahan ini sebagai bahan asing yang kemudian merangsang timbulnya proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas masih dalam batas wajar, sehingga reaksi inflamasi juga masih dalam batas normal. Berbeda dengan proses apoptosis pada preeklampsia, di mana pada preeklampsia terjadi peningkatan stress oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta misalnya pada plasenta besar, pada hamil ganda, maka reaksi stress oksidatif kan meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas makin meningkat. Keadaan ini menimbulkan beban reaksi inflamasi dalam darah ibu menjadi jauh lebih besar, disbanding reaksi inflamasi pada kehamilan normal. Respon inflamasi ini akan mengaktivasi sel endotel, dan sel-

sel granulosit, yang lebih besar pula, sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala-gejala preeklampsia pada ibu.

5. Penatalaksanaan pada preeklampsia

a. Preeklampsia Ringan

- 1) Penatalaksanaan rawat jalan pasien preeklampsia ringan, dengan cara:

Ibu dianjurkan untuk beristirahat (berbaring tidur/miring), diet: cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam; Pemberian sedative ringan: tablet Phenobarbital 3 x 30 mg atau diazepam 3 x 2 mg peroral selama 7 hari (atas instruksi dokter); roborantia: kujungan ulang setiap 1 minggu; pemeriksaan laboratorium: hemoglobin, hemotokrit, trombosit, urin lengkap, asam urat darah, fungsi hati dan fungsi ginjal.

- 2) Penatalaksanaan rawat tinggal pasien preeklampsia ringan berdasarkan kriteria: setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak menunjukkan adanya perbaikan dari gejala-gejala preeklampsia, kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih perminggu selama dua kali berturut-turut (2 minggu), timbul salah satu atau lebih gejala atau tanda-tanda preeklampsia berat.

Bila setelah 1 minggu perawatan diatas tidak ada perbaikan maka preeklampsia ringan dianggap sebagai preeklampsia berat. Jika dalam perawatan dirumah sakit sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari

lagi baru dipulangkan. Perawatan lalu disesuaikan dengan perawatan rawat jalan.

(Yeyeh Ai dan Lia Yulianti 2014, 176).

Jika kehamilan sudah diatas 37 minggu, maka pertimbangkan terminasi sebagai berikut dibawah ini:

- 1) Jika serviks matang, lakukan induksi dengan oksitosin 5 IU dalam 500 ml dekstrose IV 10 tetes/menit atau dengan prostaglandin
- 2) Jika serviks belum matang, berikan prostaglandin, misoprostol atau kateter Foley, atau terminasi dengan seksio sesaria (Pratono Ibnu 2014, 111).

b. Preeklampsia Berat

- 1) Segera masuk ke rumah sakit
- 2) Tirah baringmiring kesatu sisi. Tanda-tanda vital diperiksa setiap 30 menit, memeriksa reflex patella setiap jam.
- 3) Memasang infuse dengan cairan dexatose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan cairan infuse RL (60 -125CC/jam) 500cc.
- 4) Pemberian anti kejang /anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan terapi kejang. $MgSO_4$ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklampsia berat dan ringan.

Apabila terjadi kejang pada preeklampsia berat maka akan dilakukan pencegahan:

- a. Bila terjadi kejang, perhatikan jalan nafas, pernapasan (oksigen) sirkulasi (cairan intravena)
- b. MgSO₄ diberikan secara intravena kepada ibu dengan eklampsia (sebagai tatalaksana kejang) dan preeklampsia berat (sebagai pencegahan kejang).

Adapun syarat pemberian MgSO₄ adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedia cairan glukosa 10%
- 2) Ada reflex patella
- 3) Jumlah urin minimal 0,5 ml/kg BB/jam

Adapun cara pemberian MgSO₄ adalah sebagai berikut:

- a. Berikan dosis awal 4 gram MgSO₄ sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kejang atau kejang berulang dengan cara:
 - 1) Ambil 4 gram larutan MgSO₄ (10 ml larutan MgSO₄ 40%) dan larutan dengan 10 ml aquades.
 - 2) Berikan larutan tersebut secara perlahan-lahan sevara IV selama 20 menit
 - 3) Jika IV sulit, berikan masing-masing 5 gram MgSO₄ (12,5 ml larutan MgSO₄ 40%) sevara Im di bokong kiri dan kanan.
- b. Sambil menunggu rujukan mulai dosis rumatan 6 gram MgSO₄ dalam 6 jam sesuai prosedur dengan cara: Ambil 6 gram MgSO₄ (15 ml larutan MgSO₄ 40%) dan larutkan dalam 500 ml larutan

Ringer Laktat, Asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam, dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila eklampsia).

- c. Melakukan pemeriksaan fisik setiap jam, meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, reflex patella dan jumlah urin.
- d. Bila frekuensi pernapasan $<16x$ /menit, dan atau tidak didapatkan reflex patella dan atau oliguria produksi urin $<0,5$ ml/kg BB/jam), hentikan pemberian $MgSO_4$.
- e. Jika terjadi depresi nafas, berikan cairan glukosa 1 gram secara IV (10 ml larutan 10 %) bolus dalam 10 menit.
- f. Segala ibu hamil dengan preeklampsia dan eklampsia dirujuk patau dan nilai adanya perburukan preeklampsia. Apabila terjadi eklampsia, lakukan penilaian awal dan tatalaksana kegawatdaruratan. Berikan kembali $MgSO_4$ gram secara IV perlahan-lahan (15-20 menit). Bila setelah pemberian $MgSO_4$ ulang masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan untuk pemberian diazepam 10 mg secara IV selama 2 menit.

Ada beberapa pertimbangan persalinan atau terminasi kehamilan sebagai berikut:

- 1) Pada ibu dengan eklampsia, bayi harus segera dilahirkan dalam 12 jam sejak terjadinya kejang

- 2) Induksi persalinan dianjurkan bagi ibu dengan preeklampsia berat dengan janin yang belum viable atau tidak akan viable dalam 1-2 minggu.
 - 3) Pada ibu dengan preeklampsia berat, dimana janin sudah viable namun usia kehamilan belum mencapai 34 minggu, manajemen ekspektan dianjurkan, asalkan tidak terdapat kontraindikasi.
 - 4) Pada ibu dengan preeklampsia berat, di mana usia kehamilan antara 34-37 minggu, manajemen ekspektan boleh dianjurkan, asalkan tidak terdapat hipertensi yang tidak terkontrol, disfungsi organ ibu, dan gawat janin. Lakukan pengawasan ketat.
 - 5) Pada ibu dengan preeklampsia berat yang kehamilannya sudah aterm, persalinan dini dianjurkan.
 - 6) Pada ibu dengan preeklampsia ringan atau hipertensi gestasional ringan yang sudah aterm, induksi persalinan dianjurkan (Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan 2013, 112-116).
6. Standar Operasional Prosedur Preeklampsia Berat DI RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

Preeklampsia berat merupakan peningkatan tekanan darah > systole 140 mmHg, diastole > 110 mmHg disertai tanda lain protein urine ++ oliguria, hiperfleksian, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium dan kejang. Tujuan dari standar operasional ialah mengenali gejala

preeklampsia berat/ eklampsia, melakukan penatalaksanaan preeklampsia/ eklampsia, dan memberikan obat anti kejang (magnesium sulfat atau diazepam).

Adapun prosedur preeklampsia berat ialah dalam pengelolaan di IRD Jika tekanan diastolik > 110 mmHg, berikan anti hipertensi sampai diastolik 80-100 mmHg, pasang infus RL dengan jarum besar no.16, ukur keseimbangan cairan jangan sampai terjadi overload, infuse cairan di pertahankan 1,5-2 liter/24 jam, pasang dower kateter untuk pengukuran volume dan pemeriksaan proteinuria, observasi tanda vital, reflex dan DJJ setiap 1 jam , auskultasi paru untuk mencari tanda oedema paru jika ada oedema paru hentikan pemberian cairan dan berikan diuretik.

Kemudian nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan, jika pembekuan tidak terjadi setelah 7 menit kemungkinan terdapat koagulapati. Berikan anti konvulsan dosis awal $MgSO_4$ 40% 4 gram (10 ml) IV bolus selama 5 menit lanjutan dengan 6 gram $MgSO_4$ 40 % dalam larutan RL selama 6 jam, Pasien dapat di kirim ke ruang perawatan jika tekanan diastolik > 110 mmHg.

Jika terjadi kejang berikan obat anti kejang (anti konvulsan). Adapun perlengkapan untuk penanganan kejang (jalan nafas, penghisap lendir, masker oksigen, oksigen). Kemudian lindungi pasien dari kemungkinan trauma, aspirasi mulut tenggorokkan. Kemudian baringkan pasien pada sisi kiri posisi trandelenburg untuk mengurangi resiko aspirasi.

Anti konvulsan yang dapat di berikan yakni $MgSO_4$ dengan dosis awal 40 % 4 gr (10 ml) $MgSO_4$ dalam larutan NaCl 100 cc larutkan selama 10 menit, segera dilanjutkan dengan 6 gr (15 ml) $MgSO_4$ 40 % dalam larutan RL selama 6 jam, jika kejang berulang setelah 15 menit berikan $MgSO_4$ (40%) 2 gr IV selama 5 menit, dosis pemberian $MgSO_4$ 1 gr/jam melalui infuse RL diberikan sampai 24 jam, hentikan pemberian $MgSO_4$ jika reflex patella (-) bradipnea (<10 kali/menit) .

Untukantisipasi bantu pernapasan dengan ventilator, berikan kalsium glukonas 1 gr (20 ml dalam larutan 10 % IV perlahan-lahan sampai pernapasan mulai lagi, diazepam (dengan resiko terjadinya depresi neonatal). Dosis awal 10 mg IV pelan-pelan selama 2 menit jika kejang berulang, ulangi pemberian sesuai dosis awal.

Obat anti hipertensi yang dipilih dan di berikan bagi ibu hamil yang aman adalah nifedipine diberikan 5-10 mg oral yang dapat diulang sampai 8 kali/24 jam, jika respon tidak membaik selama 10 menit, berikan tambahan 5 mg nifedipine sublingual.

C. Tinjauan Umum Preeklampsia pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam

Kehamilan merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap pasangan yang dipercayakan kepada hamba-Nya. Kehamilan adalah suatu hal yang lamiah dan fisiologi, akan berlangsung normal selama tidak ada komplikasi yang menyertai pada masa kehamilan sampai proses persalinan. Namun kehamilan yang disertai penyulit tidak terjadi secara mendadak. Seperti

halnya preeklampsia berat yang muncul pada masa kehamilan yang dapat membahayakan bagi ibu dan janin. Deteksi dini terhadap tanda dan gejala pada kehamilan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan maupun keselamatan ibu dan janinnya. Ibu hamil yang mengalami preeklampsia berat saat kehamilan maupun menjelang persalinan harus tetap sabar dan berpikir positif bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21: 83

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Terjemahannya:

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: (Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang Di antara semua penyayang”. (Kementrian Agama RI, 2013: 329).

Ayat ini menjelaskan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Hal ini dengan member contoh melalui Nabi Ayyub as yang juga memperoleh limpahan karunia, tetapi diuji dengan kebiasaan dan kehancuran anugrah itu, bahkan dengan penyakit beliau derita. Namun demikian, hendaklah yang diuji meladani sikap Nabi Ayyub as yang diuraikan sekelumit kisahnya oleh ayat ini. Nabi Muhammad saw diperintahkan agar mengingat dan mengingatkan pula tentang kisah Nabi Ayyub as, ketika ia menyeru yakni mengadu dan berdoa kepada Tuhan Pemelihara dan pembimbing-Nya. Beliau tidak menggerutu, tidak pula mengadu kepada selain Allah. Beliau hanya menjadikan kedaannya dengan berkata:”Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesulitan menyangkut diriku disebabkan oleh ulah setan”. Demikian beliau tidak bermohon agar kesulitannya disingkirkan Allah karena beliau sadar bahwa hidup harus disertai ujian dan

karena beliau siap untuk bersabar. Karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taghabun/64:11-13

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahannya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja”. (Kementrian Agama RI, 2013: 557).

Kata *idzn* pada mulanya berarti *ketiadaan halangan untuk melakukan satu aktivitas*. Dari sini ia digunakan untuk membolehkan seseorang memasuki satu tempata atau disingkirkannya penghalang, yang menghambat masuknya. Yang *mengizinkan* tentu mengetahui tentang apa yang diizinkan itu. Dengan demikian izin mengandung arti *pengetahuan plus penyingkiran halangan*, bagi terlaksananya apa yang diizinkan itu.

Yang dimaksud di sini adalah penciptaan sebab dan factor-faktor bagi terjadinya sesuatu. Ini adalah system-sistem dan hukum-hukum alam yang diciptakan Allah bagi terjadinya segala sesuatu. Dia menciptakan system dan hukum-hukum alam itu. Manusia diatas menjelaskan bahwa manusia harus dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya, dan jika tidak mengidahnya, maka itu dapat merugikan dirinya sendiri. Ayat ini mendorong kaum muslim

untuk memahami hukum-hukum alam dan memanfaatkannya. Sang muslim dituntut juga untuk melakukan introspeksi guna melihat sampai di mana penyesuaian tindakannya dengan system dan hukum-hukum itu dalam rangka memperbaiki diri.

Perlu dicatat bahwa izin Allah terjadinya sesuatu tidak otomatis menandai restu dan ridha-Nya. Karena itu izin-Nya yang bersifat *syar'iy* dalam arti diizinkan atau dibolehkannya untuk dilakukan tanpa saksi apapun, dan arti yang bersifat *takwini* dalam arti Dia tidak menghalangi terjadinya, karena itu merupakan bagian dari sistem yang diberlakukan-Nya bagi semua pihak. Atas dasar itu pula bisa jadi ada musibah atau petaka yang menimpa seseorang yang tentu saja diizinkan-Nya tetapi tidak diizinkan-Nya. Bisa juga ada musibah yang menimpa yang dituntut oleh-Nya untuk dibendung dan diatasi. Seperti kezaliman yang menimpa. Itu adalah atas izin-Nya melalui system yang Dia tetapkan, tetapi Dia juga yang mendorong untuk menanggulangi musibah kezaliman itu, dengan menggunakan bagian dari system yang ditetapkan-Nya dan juga keberhasilan atau kegagalan menanggulangnya adalah bagian dari system itu.

Penyebutan kata *Allah* yang merupakan nama bagi Dzat yang wajib wujud-Nya dan menyanggah semua sifat-sifat sempurna padahal bisa saja digunakan kata Dia bertujuan mengundang mitra bicara untuk menghadirkan semua sifat-sifat Allah serta menyadari kebesaran dan keagungan-Nya yang dicakup oleh nama mulia itu (Tafsir Al-Misbah, 2009).

D. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Dengan adanya proses manajemen asuhan kebidanan ini maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah kedalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut langkah vernay. Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah vernay adalah sebagai berikut:

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Adapun pengumpulan data dasar yang lengkap untuk menilai yang menyangkut atau keadaan klien, data ini termasuk riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium serta laporan keterangan tambahan

lain hubungan dengan kondisi klien yang didapatkan melalui wawancara pada klien ataupun keluarganya.

Dalam manajemen kolaborasi, bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan pada dokter, bidan akan melakukan upaya konsultasi. Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi klien yang sebenarnya dan valid. Kaji ulang data yang sudah dikumpulkan apakah sudah tepat, lengkap dan akurat.

Pengkajian ibu hamil dengan preeklampsia berat, meliputi pertanyaan seputar sejarah pribadi sebelum hamil, riwayat keluhan utama, riwayat kesehatan keluarga, pekerjaan serta kebiasaan sosial lainnya. Selanjutnya, diperdalam lagi dengan menanyakan riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, dan nifas, riwayat KB, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu. Di samping itu diperlukan pula riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

Selain itu, data objektif pun termasuk ke dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia berat terdiri dari pemeriksaan fisik lengkap yang dilakukan khususnya terfokus pada penampilan umum (tanda- tanda dan gejala seperti pusing dan bengkak pada wajah maupun bagian tungkai bawah) dan pemeriksaan tanda- tanda vital. Terakhir pemeriksaan penunjang yaitu tes

laboratorium. Dalam tes laboratorium adanya preeklampsia berat umumnya ditentukan melalui pengukuran kadar proteinuria.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data yang dikumpulkan. Diagnosa adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan professional sebagai dasar/arahan untuk mengambil tindakan. Untuk mendiagnosa preeklampsia berat di dapatkan hasil yaitu tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg pada usia kehamilan ≥ 20 minggu, tes celup urin menunjukkan proteinuria $\geq 2+$ atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil ≥ 5 g/24 jam atau disertai keterlibatan organ lain yaitu trombositopenia (< 100.00 sel/uL), hemolisis mikroangiopati, nyeri abdomen kuadran kanan atas, sakit kepala, skotoma penglihatan, pertumbuhan janin terhambat dan oligohidramnion, edema paru, gagal ginjal dan oliguria (< 500 ml/24 jam), dan kreatinin diatas 1,2 mg/dl (Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan 2013, 111).

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosis/Masalah Potensial Yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Identifikasi adanya diagnosa atau masalah potensial lain dilakukan antisipasi atau pencegahan bila memungkinkan serta waspada dan bersiap untuk segala sesuatu yang dapat terjadi. Pada step ini sangat vital untuk perawatan yang aman. Pada kasus preeklampsia berat, seorang Bidan atau tenaga kesehatan lain dapat mengantisipasi kelainan yang akan terjadi pada saat rawat jalan atau rawat

inap karena pada kasus preeklampsia kemungkinan ibu akan mengalami syok atau kejang, dapat terjadi kematian ibu, kelahiran premature dan resiko terjadi Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR).

Pada langkah ketiga ini bidan dituntut mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis tersebut tidak terjadi. Langkah ini bersifat antisipasi yang rasional atau logis. Diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada preeklampsia berat adalah eklampsia.

Antisipasi terjadinya eklampsia dilihat dari beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya preeklampsia dan eklampsia diantaranya adalah sebagai berikut: resiko yang berhubungan dengan partner laki-laki berupa primigravida (resiko primigravida 2 kali lebih besar daripada multigravida), umur yang terlalu ekstrim terlalu muda atau terlalu tua untuk kehamilan, partner laki-laki yang pernah menikahi wanita kemudian hamil dan mengalami preeklampsia, inseminasi donor dan donor oocyte, resiko yang berhubungan dengan riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga berupa riwayat penyakit preeklampsia, hipertensi kronis, penyakit ginjal, obesitas, diabetes gestasional, dan resiko yang berhubungan dengan kehamilan berupa mola hidatidosa, kehamilan multiple, dan hydrops fetals (Yulia Fauziah 2012, 18).

d. Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera)

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Pada langkah ini, mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh

bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Langkah keempat mencerminkan kesinambungan proses manajemen kebidanan. Jadi, manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama-sama bidan terus-menerus, misalnya pada waktu wanita tersebut dalam persalinan.

Data baru mungkin saja dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data mungkin mengidentifikasi situasi yang gawat ketika bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu atau anak. Dari data yang dikumpulkan dapat menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara yang lain menunggu intervensi dari seseorang dokter, misalnya prolaps tali pusat. Pada preeklampsia berat diperlukan adanya tindakan segera agar tidak berlanjut menjadi eklampsia yaitu dengan pemberian $MgSO_4$ sebagai obat pemberian anti kejang.

Situasi lainnya bisa saja merupakan kegawatan pada preeklampsia berat sehingga dilakukannya kolaborasi dengan dokter SpOG dalam pemberian terapi obat-obatan dan petugas kesehatan lainnya seperti petugas laboratorium untuk pemeriksaan proteinuria. Dalam kondisi tertentu seorang wanita mungkin juga akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain seperti pekerja sosial, ahli gizi, atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir.

Jika dalam keadaan tertentu terjadi komplikasi pada ibu dan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai maka dilakukannya rujukan agar ibu dan bayi tetap dalam keadaan sehat.

e. Langkah V (Penyusunan Rencana)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya dan semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *up to date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*). Dalam menyusun rencana sebaiknya pasien dilibatkan karena pada akhirnya pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien. Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut, apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi, kultur atau masalah psikologis. Rencana asuhan pada ibu hamil dengan preeklampsia berat yaitu:

- 1) Memberitahu ibu bahwa ibu mengalami preeklampsia berat
- 2) Mengobservasi keadaan umum ibu dan tanda-tanda vitalnya
- 3) Melakukan pemeriksaan DJJ
- 4) Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL
- 5) Melakukan pemasangan kateter tetap

- 6) Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat
- 7) Memberikan obat oral nifedipin 3x1 sehari @ 10 mg
- 8) Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek protein urinaria.
- 9) Memberikan dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu

f. Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan)

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Implementasi merupakan pelaksanaan dari asuhan yang telah direncanakan secara efisien dan aman. Pada kasus ini dimana bidan harus berkolaborasi dengan dokter, maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan pasien adalah tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan bersama yang menyeluruh (Mangkuji dkk, 2012:6). Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia berat sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan.

g. Langkah VII (Evaluasi Asuhan Kebidanan)

Evaluasi ini dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan. Pada langkah ini meliputi evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Pada kasus preeklampsia berat pada ibu hamil evaluasi yang diharapkan yaitu, Preeklampsia berat sudah teratasi sehingga tidak terjadi eklampsia, tanda-tanda vital terdiri dari

tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan kembali dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium berupa proteinuria kembali dalam batas normal serta keadaan umum ibu sudah membaik dan kesadaran komposmentis.

3. Manajemen Asuhan Kebidanan dalam Bentuk SOAP

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

a) Data Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnese dengan klien. Analisis data subjektif yang didapatkan pada klien ibu hamil didapatkan keluhan masalah kehamilannya, riwayat menstruasi, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, dan data psikologis. Pada kasus ibu hamil dengan preeklampsia berat data subjektifnya berupa :

- 1) Ibu datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan pusing dan sakit kepala
- 2) Ibu merasa sering nyeri pada perut bagian atas
- 3) Ibu merasa bengkak pada tubuhnya
- 4) Ibu mengeluh cemas dengan kehamilannya

b) Data Objektif (O)

- 1) keadaan umum ibu baik dan tampak pusing.
- 2) Tanda – tanda vital tidak normal yaitu tekanan darah tinggi misalnya 170/110 mmHg.
- 3) Pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan proteinuria akan didapatkan hasil lebih dari 2+
- 4) Pada pemeriksaan fisik terutama pada tungkai yaitu adanya oedema.

c) *Assesment* (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien, apakah ibu betul terkena preeklampsia berat. *Assesment* ibu hamil dengan preeklampsia berat.

d) *Planning* (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana *planning* ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap ibu hamil dengan preeklampsia berat pada tahap berikutnya. Pada kasus preeklampsia evaluasi yang diharapkan adalah preeklampsia berat sudah teratasi sehingga tidak terjadi eklampsia, tanda-tanda vital terdiri

dari tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan kembali dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium berupa protein urinaria kembali dalam batas normal serta keadaan umum ibu sudah membaik dan kesadaran komposmentis.



BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL PADA NY”F”

GESTASI 28-30 MINGGU DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 6 JULI 2018

No. Register : 506xxx
Tanggal Masuk : 06 Juli 2018 pukul 15.15 wita
Tanggal Pengkajian : 06 Juli 2018 pukul 15.16 wita
Nama Pengkaji : Nisfawati

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

1. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “ F “ / Tn “ M “

Umur : 38 tahun / 40 tahun

Nikah : 1 X / 20 ± tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Romanglasa

2. Keluhan utama

Ibu datang dengan surat rujukan dari puskesmas masuk ke Poli KIA RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan keluhan sakit kepala, pusing dan pembengkakan pada kaki.

3. Riwayat keluhan utama:

- a. Pusing dirasakan sejak 2 hari yang lalu dan ibu datang memeriksakan diri di puskesmas Gentungang dan dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf pada tanggal 06-07-2018 Jam 13: 50 wita.
- b. Ibu mengatakan sakit kepala serta pembengkakan pada kaki sejak 1 minggu yang lalu.

4. Riwayat kehamilan sekarang

- a. Kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran
- b. Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 21 desember 2017
- c. Ibu mendapatkan imunisasi TT sebanyak 2X di puskesmas gentungang yaitu pada tanggal 15 februari 2018 dan 16 maret 2018
- d. Ibu telah 3 kali memeriksa kehamilannya di puskesmas Gentungang.
- e. Ibu mulai merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan 5 bulan dan dominan terasa pada perut sebelah kanan

5. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Tahun	Kehamilan	Persalinan			Bayi			Nifas
		Jenis	Tempat	Penolong	JK	BBL	Keadaan	
2009	Aterm	PBK	Rumah	Dukun	♀	-	Hidup	Normal

6. Riwayat kesehatan yang lalu

- a. Ibu tidak ada riwayat PMS
- b. Ibu tidak ada alergi terhadap makanan dan minuman
- c. Ibu tidak pernah mengalami penyakit serius
- d. Ibu tidak ada riwayat penyakit menurun seperti DM, hipertensi, asma dan penyakit jantung.
- e. Ibu tidak ada riwayat ketergantungan obat-obatan dan minuman keras.
- f. Ibu tidak pernah mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter.
- g. Ibu tidak pernah menderita penyakit infeksi pada sistem organ reproduksi.
- h. Tidak ada riwayat penyakit menular.

7. Riwayat Menstruasi

- a. Menarche : 14 tahun
- b. Siklus : 28 – 30 hari
- c. Durasi : 4 – 5 hari
- d. *Dismenorrhea* : Tidak ada

8. Riwayat KB

Ibu merupakan akseptor KB suntik 3 bulan selama 3 tahun yaitu mulai 2009 sampai 2012 dan ibu mengganti KB suntik 3 bulan menjadi KB implant selama ± 5 tahun yaitu mulai tahun 2012 sampai 2017.

9. Riwayat pola kegiatan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

1) Sebelum hamil

- Pola makan : 3 kali sehari
- Komposisi : Nasi, Ikan, Sayur
- Pola minum : 10 kali sehari

2) Selama hamil

- Pola makan : 4 – 5 kali sehari
- Pola minum : 15 kali sehari

b. Pola Eliminasi

1) Sebelum hamil

a) BAB (Buang Air Besar)

- Konsistensi : Lunak
- Warna : Kuning kecoklatan
- Frekuensi : 1 kali sehari

b) BAK (Buang Air Kecil)

- Warna : Kuning
- Bau : Amoniak

2) Selama hamil

a) BAB (Buang Air Besar)

- Konsistensi : Lunak
- Warna : Kuning kecoklatan
- Frekuensi : 1 kali sehari

b) BAK (Buang Air Kecil)

- Warna : Kuning
- Bau : Amoniak

c. Pola Istirahat

1) Sebelum hamil

- Tidur siang : 1 jam/ hari
- Tidur malam : 8 jam/ hari

2) Selama hamil

- Tidur siang : 2 jam/ hari
- Tidur malam : 9 jam/ hari

d. Personal Hyegine

1) Sebelum hamil

- Ibu mandi 2 kali setiap hari setiap pagi dan sore
- Ibu keramas 3 kali seminggu
- Ibu sikat gigi 3 kali sehari
- Ibu selalu mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau basah

2) Selama hamil

- Ibu mandi 2 kali setiap hari setiap pagi dan sore
- Ibu keramas 3 kali seminggu
- Ibu sikat gigi 3 kali sehari
- Ibu selalu mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau basah

10. Riwayat Ekonomi, Psikososial dan Spiritual

- a. Suami adalah tulang punggung dalam keluarga
- b. Ibu merasa khawatir dengan keadaanya
- c. Ibu merasa senang dengan kehamilannya
- d. Keluarga dan suami senang dengan kehamilannya
- e. Ibu yakin bahwa dia selalu dilindungi oleh Allah SWT
- f. Ibu dan keluarga selalu melaksanakan sholat 5 waktu.

11. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. BB sebelumnya : 74 kg
- d. BB sekarang : 80 kg
- e. TB : 156 cm
- f. LILA : 30 cm
- g. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital
 - TD : 180/120 mmHg
 - N : 80x/menit
 - S : 36,8 °C
 - P : 18x/menit

12. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*

- a. Kepala

Inspeksi : kulit kepala bersih, rambut lurus dan tidak ada ketombe

Palpasi : tidak rontok, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan

b. Wajah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, ada cloasma gravidarum

Palpasi : tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan ,konjungtiva merah mudah dan sklera putih.

d. Mulut dan gigi

Inspeksi : Mulut dan gigi bersih, ada 2 gigi yang tanggal dan terdapat gigi caries 2 buah.

e. Telinga

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

f. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar tyroid dan vena jugularis

g. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol keluar serta hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : Tidak ada massa dan nyeri tekan.

h. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi dan tampak linea nigra, striae alba dan pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat , 27 cm teraba bokong.

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 98 cm

TBJ : $98 \times 27 = 2646$ gram.

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 150x/menit.

i. Ekstremitas

1) Ekstremitas Atas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan dan terpasang infus RL pada bagian tangan kiri

Palpasi : Tidak ada oedema

2) Ekstremitas Bawah

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : Terdapat oedema dan tidak ada varises

Perkusi : Refleks patella (+ / +) kiri dan kanan.

j. Pemeriksaan Penunjang

- Pemeriksaan Hb : 13,5 gr%

- Protein urinaria : +3

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Diagnosa : GIPIA0, Gestasi 27 Minggu 6 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia berat

1. GIPIA0

a. Data Subjektif

Menurut ibu ini adalah kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran

b. Data Objektif

Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae alba, pembesaran perut sesuai usia kehamilan, terdapat cloasma gravidarum pada pemeriksaan wajah.

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

Keluarnya *Melanophore Stimulating Hormone* hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit di sekitar pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut (striae livide) pada primigravida dan (striae alba) pada multigravida (Manuaba, dkk, 2013: 107).

2. Gestasi 27 minggu 6 hari

a. Data Subjektif

Menurut ibu Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) nya adalah tanggal 21 Desember 2017

b. Data Objektif

- Pembesaran perut sesuai usia kehamilan
- TFU 3 jari di atas pusat

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

- a. Dari HPHT tanggal 21 desember 2017 sampai tanggal pengkajian 06 juli 2018 maka usia kehamilan ibu 28 minggu 1 hari. Menurut rumus Neagle.
- b. Pembesaran perut disebabkan oleh adanya pertumbuhan janin dan di bawah pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan hipertropi otot polos.

3. Intrauterine

a. Data Subjektif :

Ibu mengatakan sering merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut sebelah kanan.

b. Data Objektif :

Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong.

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Analisa dan Interpretasi Data :

Bagian besar janin dapat diraba saat dilakukan palpasi secara Leopold dan ibu tidak merasa nyeri saat janin bergerak, teraba bagian-bagian janin dalam uterus. Kehamilan intrauterine, perkembangan rahim sesuai dengan umur kehamilan.

4. Tunggal

a. Data Subjektif :

Ibu mengatakan merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut sebelah kanan.

b. Data Objektif :

Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong.

Leopold II : Puki

Auskultasi : DJJ terdengar jelas kuat dan teratur pada satu sisi yaitu pada sisi sebelah kiri perut ibu dengan frekuensi 150x/menit.

Analisa dan Interpretasi Data:

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, teraba dua bagian besar pada lokasi yang berbeda, bagian kepala pada kuadran perut bagian bawah, bokong berada pada kuadran fundus. Pada kehamilan tunggal hanya satu bunyi jantung.

5. Hidup

a. Data Subjektif :

Ibu merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut atas sebelah kanan

b. Data Objektif :

Pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada satu sisi yaitu pada sisi sebelah kiri dengan frekuensi 150x/menit.

Analisa dan Interpretasi Data :

Janin yang hidup ditandai dengan adanya pergerakan janin yang dapat dirasakan oleh ibunya, dan pada auskultasi terdengar DJJ yang jelas dan teratur.

6. Keadaan ibu dengan preeklampsia Berat

a. Data Subjektif :

Ibu mengeluh sakit kepala dan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu dan pusing sejak 2 hari yang lalu

b. Data Objektif :

Tekanan Darah : 180/120 mmHg

Potein Urinaria +3

Analisa dan Interpretasi Data :

- a. Preeklampsia berat dengan *impending eclampsia* dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala atau sakit kepala, pusing, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179).
- b. Preeklampsia berat ialah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik \geq 160 mmHg dan tekanan darah diastolik \geq 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam atau \geq +3 (Sarwono, 2014:544).

C. Langkah III : dentifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Diagnosa : Potensial terjadinya Eklampsia, Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR).

a. Data Subjektif :

Ibu mengeluh sakit kepala, pusing dan bengkak pada kaki

b. Data Objektif :

- 1) Tekanan Darah 180/120 mmHg
- 2) Oedema (+/+) pada kedua tungkai bawah.
- 3) Protein urine +3

Analisa dan Interpretasi Data:

- a. Pencegahan dan pengobatan preeklampsia berat yang tidak tertangani secara baik maka akan mengarah ke eklampsia.
- b. Kematian janin dalam Rahim (KJDR) merupakan kematian janin dalam uterus dengan usia kehamilan 20 minggu atau lebih dengan berat janin mencapai 500 gram atau lebih , ini merupakan salah satu komplikasi yang akan terjadi pada penderita preeklampsia jika tidak di tangani secara baik dan cepat .
- c. Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi $>160/110$ mmHg atau lebih disertai proteinuria dan oedema pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Gejala dan tanda preeklampsia berat : tekanan darah sistolik >160 mmHg, tekanan darah sistolik >110 mmHg, peningkatan kadar enzim hati atau ikterus, trombosit $<100.000/mm^3$, Oliguria <400 ml/24 jam, proteinuria >3 gr/liter,

nyeri epigastrium, skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat, perdarahan retina dan odema pulmonum (Yulia Fauziyah, 2012:26-27). Sedangkan eklampsia adalah preeklampsia yang disertai kejang tonik klonik yang dissusul dengan koma(Yulia Fauziyah, 2012:17).

D. Langkah IV : Tindakan Segera/ Kolaborasi

- a. Memantau tekanan darah
- b. Kolaborasi dengan dokter SpOG untuk pemberian terapi obat-obatan yang perlu diberikan kepada ibu
- c. Memasang infus RL 28 tpm
- d. Pemberian obat oral nifedipin 3×1 hari @10 mg
- e. Pemberian MgSO₄ untuk mencegah kejang jika tidak terjadi penurunan tekanan darah
- f. Memasang kateter
- g. Melakukan pemeriksaan Lab. untuk mengetahui proteinuria
- h. Pemberian dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a, bersabar dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu

E. Langkah V : Rencana Tindakan / Intervensi

Diagnosa : GIPIA0 gestasi 28 minggui 1 hari dengan PEB

Masalah aktual : PEB

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya Eklampsia

1. Tujuan :
 - a. Tidak terjadi eklampsia

2. Kriteria :

- a. Keadaan umum ibu baik dan kesadaran komposmentis.
- b. Ibu merasa pusing dan sakit kepala
- c. Tanda-tanda vital

TD : 180/120 mmHg

N : 84 x/menit

S : 36,8 °C

P : 22 x/menit

3. Rencana Tindakan :

- a. Memberitahu keadaan yang sedang dialami ibu.

Rasional : Dengan memberitahu keadaan yang sedang dialami ibu dapat mengerti dan bersedia untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

- b. Observasi keadaan umum dan TTV ibu pada pagi hari dan sore hari

Rasional : Dengan mengetahui keadaan umum, dan TTV dapat membantu dalam mengambil tindakan segera.

- c. Pemberian cairan RL

Rasional : larutan RL digunakan untuk mengganti cairan yang hilang, dan merupakan larutan isotonik yang sering digunakan dalam pemberian infus intravena karena mempunyai konsentrasi yang sama dengan plasma darah sehingga mencegah perpindahan cairan dan elektrolit ke dalam intrasel.

- d. Pemasangan kateter tetap untuk membantu ibu buang air kecil serta mengetahui cairan input dan output ibu.

Rasional : Dengan melakukan pemasangan kateter akan membantu ibu untuk berkemih dan mempermudah petugas kesehatan untuk mengetahui cairan output dan input ibu.

- e. Kolaborasi dengan dokter SpOG untuk pemberian obat oral nifedipin 3×1 hari @10 mg.

Rasional : Nifedipin merupakan obat antihipertensi yang menghambat kanal kalsium

- f. Kolaborasi dengan dokter SpOG untuk pemberian MgSO₄ untuk mencegah kejang jika tekanan darah tidak turun.

Rasional : MgSO₄ merupakan obat anti kejang yang berfungsi menghambat dan menurunkan kadar asetilkolin pada rangsangan serat saraf dengan menghambat transmisi neuromuskular.

- g. Kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteinuria

Rasional : dengan mengecek proteinuria dapat membantu untuk tindakan selanjutnya dan melaporkan hasilnya ke dokter .

- h. Melakukan pemeriksaan DJJ

Rasional : pemeriksaan DJJ di lakukan agar dapat memantau perkembangan janin

- i. Pemberian dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk tetap melaksanakan shalat dengan posisi berbaring dan selalu berdoa, berdzikir, bersabar dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

Rasional : Sebagai hamba Allah SWT shalat merupakan kewajiban kita serta berdoa, berdzikir, bersabar dan bertawakkal dalam segala cobaan yang kita hadapi karena segala cobaan dan ujian datangnnya dari Allah SWT.

F. Langkah VI : Implementasi Asuhanan Kebidanan

Tanggal 06 juli 2018

1. Memberitahu bahwa ibu mengalami preeklampsia berat
2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV pada pagi hari dan sore hari
3. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteinuria
4. Memberitahu ibu bahwa ibu harus di opname
5. Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat pada ibu
6. Melakukan pemasangan kateter tetap
7. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL
8. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteinuria
9. Memberikan dukungan moral pada ibu dan keluarga untuk tetap melaksanakan shalat dengan posisi berbaring serta berdoa, berdzikir, dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

G. Langkah VII : Evaluasi Asuhan Kebidanan

1. Ibu sudah mengetahui jika ibu mengalami preeklampsia berat
2. Sudah dilakukan observasi

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Komposmentis

TTV : TD : 180/ 120 mmHg

N : 84 x/i

S : 36,8 °C

P : 22x/i

3. Infus telah terpasang dengan cairan RL 500 cc
4. Kateter telah di pasang
5. Ibu dan keluarga telah melaksanakan shalat serta berdoa, berdzikir, bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT apapun yang terjadi untuk kesembuhan ibu.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY" F" DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 06 JULI 2018

No. Register : 506xxx
 Tanggal. Kunjungan : 06 Juli 2018 Pukul : 15 : 15 Wita
 Tanggal. Pengkajian : 06 Juli 2018 Pukul : 15 : 16 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny " F " / Tn " M "
 Umur : 38 tahun / 40 tahun
 Nikah : 1 X / ± 20 tahun
 Suku : Gowa / Gowa
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ini merupakan kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengeluh pusing sejak 2 hari yang lalu
3. Ibu mengeluh sakit kepala dan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu
4. Hari pertama haid terakhir tanggal 21 desember 2017

5. Ibu mulai merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan kurang lebih 5 bulan dan dominan terasa pada perut sebelah kanan.
6. Ibu sudah mendapatkan suntikan TT sebanyak 2 kali selama kehamilannya yaitu pada TT pertama pada tanggal 15 februari 2018 dan 16 maret 2018 di Puskesmas Gentungang.
7. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 3 tahun yaitu tahun 2009 sampai 2012 dan mengganti jenis KB tersebut karena merasa tidak cocok menjadi KB implant selama 5 tahun yaitu mulai tahun 2012 sampai tahun 2017.
8. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit menurun seperti hipertensi, diabetes melitus, asma, dan penyakit jantung.
9. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Tahun	Kehamilan	Tempat Bersalin	Penolong	Jenis kelamin	BBL	ASI	Keadaan
2009	Aterm	Rumah	Dukun	♀	-	✓	Hidup

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. HPHT : 21 Desember 2018
4. HTP : 28 September 2018
5. Pemeriksaan antropometri
 - BB sebelumnya : 74 kg
 - BB sekarang : 80 kg

TB : 156 cm

LILA : 30 cm

6. Tanda-tanda vital :

Tekanan Darah : 180/120 mmHg

Nadi : 84x/i

Pernafasan : 22x/i

Suhu : 36,8 °C

7. Pemeriksaan fisik

a) Wajah

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

b) Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva berwarna merah muda dan sklera tidak ikterus

c) Mulut

Inspeksi : Bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, ada 2 caries pada gigi

d) Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran pada leher

e) Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

f) Abdomen

Inspeksi : Terdapat linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi dan pembesaran perut ssesuai umur kehamilan.

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BAP

LP : 98 cm

TBJ : TFU x LP

: 27 x 98

: 2646 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 150x/menit.

g) Genitalia

Inspeksi : Tidak ada kelainan

h) Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : Terdapat oedema pada kedua kaki

Perkusi : Refleks patella kiri (+) kanan (+)

8. Pemeriksaan Laboratorium

Hb : 13,5 gr%

Albumin : +3

C. *Assesment* (A)

Ny "F" GIIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 28 minggu 1 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia berat antisipasi terjadinya eklampsia.

4. *Planning* (P)

Tanggal 06-07-2018 pukul 10 : 40 wita.

1. Memberitahu bahwa ibu mengalami preeklampsia berat

Hasil : Ibu sudah mengetahui kondisi yang dialaminya sekarang

2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan kesadaran composmentis

TD : 170/110 mmHg,

S : 36,8 °C

N : 84x/menit

P : 22xmenit

3. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 150x/menit,

4. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL

Hasil: Infus telah terpasang dengan cairan RL 500 cc dengan 28 tetes/menit di tangan kiri ibu.

5. Melakukan pemasangan kateter tetap

Hasil : Kateter telah terpasang

6. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteinuria

Hasil : urine ibu sudah dibawa ke laboratorium untuk di periksa

7. Melakukan kolaborasi dengan dokter SpOG untuk pemberian obat MgSO₄ pada ibu

Hasil : Telah diberikan MgSO₄ 40 % dengan dosis 4 gram atau 10 ml secara IV bolus selama 5 menit dan dilanjutkan dengan 6 gram MgSO₄ 40 % dalam larutan RL 500 cc dengan 28 tetes/menit

8. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat oral

Hasil : Nifedipin 10 mg 3 kali sehari

9. Memberikan support kepada ibu agar tidak cemas dengan keadaannya

Hasil : Ibu sedikit tampak tenang

10. Memberikan dukungan moral pada ibu dan keluarga untuk tetap melaksanakan shalat 5 waktu serta berdoa, berdzikir dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY "F " DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 07 JULI 2018

No. Register : 506xxx
 Tanggal. Kunjungan : 07 Juli 2018 Pukul : 15 : 15 Wita
 Tanggal. Pengkajian : 07 Juli 2018 Pukul : 11 : 40 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny " F " / Tn " M "
 Umur : 38 tahun / 40 tahun
 Nikah : 1 X / ± 20 tahun
 Suku : Gowa / Gowa
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu masih merasa pusing dan sakit kepala
2. Ibu merasa khawatir dengan keadaannya
3. Ibu merasa sangat panas pada tubuhnya

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik dan tampak pusing
2. Kesadaran composmentis

3. Tanda-tanda vital : Tekanan Darah : 170/110 mmHg

Nadi : 84x/i

Pernafasan : 22x/i

Suhu : 36,8 °C

4. Pemeriksaan fisik terfokus

a) Wajah

Inspeksi : tampak tidak pucat, ada cloasma gravidarum

Palpasi : tidak ada oedema

b) Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : Konjungtiva berwarna merah muda dan sklera tidak ikterus

c) Abdomen

Inspeksi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan.

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari diatas pusat, 27 cm bokong

Leopold II : PUKI S A R

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 98 cm

TBJ : 27 x 98 = 2646 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/menit.

d) Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Ada oedema

Perkusi : Refleks patella +

5. Pemeriksaan Laboratorium

Hb : 13 gr%

Proteinuria : +3

C. Assesment (A)

Ny "F" GIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 28 minggu 2 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia berat

D. Planning (P)

Tanggal 07-07-2018 Jam 11: 50 Wita

1. Memberitahu bahwa ibu masih mengalami preeklampsia berat

Hasil : Ibu sudah mengetahui kondisi yang dialaminya sekarang

2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV

Hasil : Keadaan umum ibu baik dan kesadaran composmentis

TD : 170/110 mmHg

N : 84x/menit

S : 36,8 °C

P : 22x/menit

3. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/menit,

4. Observasi cairan infus yang terpasang

Hasil : Masih terpasang cairan infus RL 28 tetes/ menit

5. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek protein urine

Hasil : Telah dilakukan dan proteinuria ibu masih positif

6. Melakukan observasi kateter

Hasil : Kateter masih terpasang

7. Mengobservasi pemberian obat MgSO₄

Hasil : Masih terpasang MgSO₄ 6 gram dalam larutan RL dengan 28 tetes/menit.

8. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengonsumsi obat oral yang diberikan oleh dokter yaitu nifedipin 10 mg

Hasil : ibu mengerti dan sudah meminumnya

9. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap makan-makanan yang bergizi agar nutrisi anaknya tetap terpenuhi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

10. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap melaksanakan shalat 5 waktu dengan posisi berbaring

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

11. Menganjurkan kepada ibu untuk mendengarkan murottal Al-Qur'an karena dapat menurunkan tekanan darah dan membuat hati lebih tenang dan tenang

Hasil : Ibu mengerti dan akan melakukannya.

12. Tetap memberikan dukungan moral pada ibu dan keluarga untuk tetap sabar, berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT atas segala ujian yang diberikan

Hasil : Ibu mengerti dan selalu melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY”F“ DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 08 JULI 2018**

NO. Register : 506xxx
Tanggal. Kunjungan : 06 Juli 2018 Pukul : 15 : 15 Wita
Tanggal. Pengkajian : 08 Juli 2018 Pukul : 08 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ F “ / Tn “ M “
Umur : 38 tahun / 40 tahun
Nikah : 1 X / ± 20 tahun
Suku : Gowa / Gowa
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SD
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu masih pusing
2. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan
3. Ibu merasa khawatir dengan kehamilannya

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Tanda-tanda vital :

TD : 160/110 mmHg

N : 78x/i

S : 36,3 °C

P : 22x/i

4. Pemeriksaan fisik terfokus

- a) Wajah

Inspeksi : Tidak pucat dan ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

- b) Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

- c) Abdomen

Inspeksi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV: BAP

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit.

5. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,5 gr%

Proteinuria : +2

C. Assesment (A)

Ny "F" GIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 28 minggu 3 hari, intra uterine, situs memanjang, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia berat.

D. Planning (P)

Tanggal 08-07-2018 Jam 08:30 Wita

1. Memberitahu ibu bahwa ibu masih mengalami preeklampsia berat

Hasil : Ibu mengetahuinya dan masih khawatir dengan keadaannya

2. Mengobservasi TTV

Hasil : TD : 160/110 mmHg

N : 78x/i

S : 36,3 °C

P : 22x/i

3. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit,

4. Observasi cairan infus yang terpasang

Hasil : Masih terpasang cairan infus RL 28 tetes/ menit

5. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek protein urine

Hasil : Telah dilakukan dan proteinuria masih positif

6. Melakukan observasi kateter

Hasil : Kateter masih terpasang

7. Mengobservasi pemberian obat MgSO₄

Hasil : Masih terpasang MgSO₄ dalam larutan RL 500 cc dengan dosis 6 gram 28 tetes/menit.

8. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap meminum obat-obatan yang dianjurkan yaitu nifedipin 10 mg

Hasil : Ibu mengerti dan ibu sudah meminumnya.

9. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mendengarkan murottal Al-Qur'an setiap ibu sudah melaksanakan shalat.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Tetap memberikan dukungan moral pada ibu dan keluarga untuk tetap berdoa dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

Hasil : Ibu tampak tenang dan selalu berdoa kepada Allah SWT

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY”F“ DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 09 JULI 2018

No. Register : 506xxx
 Tanggal. Kunjungan : 06 Juli 2018 Pukul : 15 : 15 Wita
 Tanggal. Pengkajian : 09 Juli 2018 Pukul : 09 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ F “ / Tn “ M “
 Umur : 38 tahun / 40 tahun
 Nikah : 1 x / ± 20 tahun
 Suku : Gowa / Gowa
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu merasa pusing pada kepalanya sudah agak berkurang
2. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan

B. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis

3. Tanda-tanda vital :

TD : 140/100 mmHg

N : 78x/i

S : 36,7 °C

P : 20x/i

4. Pemeriksaan fisik terfokus

a) Wajah

Inspeksi : Tidak pucat dan ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

b) Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

c) Abdomen

Inspeksi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142x/menit.

5. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,3 gr%

Proteinuria : +1

C. *Assesment* (A)

Ny "F" GIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 28 minggu 4 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan preeklampsia berat

D. *Planning* (P)

Tanggal 09-07-2018 Jam 09:30 Wita

1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : Ibu sudah mengetahuinya

2. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142x/menit,

3. Observasi cairan infus yang terpasang

Hasil : Masih terpasang cairan infus RL 28 tetes/ menit

4. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek protein urine

Hasil : Telah dilakukan dan proteinuria masih positif

5. Melakukan observasi kateter

Hasil : Kateter masih terpasang

6. Mengobservasi pemberian obat MgSO₄

Hasil : MgSO₄ tidak diberikan lagi

7. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap makan-makanan yang bergizi dan menghindari makanan yang bergaram dan berpiksin

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu mendengarkan murottal Al-Qur'an dan membaca al-Qur'an

Hasil : Ibu mengerti dan selalu melakukannya

9. Tetap memberikan dukungan moral pada ibu dan keluarga untuk tetap berdoa, sabar dan bertawakkal kepada Allah SWT agar senantiasa pneyakit ibu secepatnya diangkat

Hasil : Ibu mengerti dan selalu melakukannya.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY”F“ DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 10 JULI 2018

No. Register : 506xxx
 Tanggal. Kunjungan : 06 Juli 2018 Pukul : 10 : 30 Wita
 Tanggal. Pengkajian : 10 Juli 2018 Pukul : 09 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny “ F “ / Tn “ M “
 Umur : 38 tahun / 40 tahun
 Nikah : 1 x / ± 20 tahun
 Suku : Gowa / Gowa
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak pusing lagi
2. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis

3. Tanda-tanda vital :

TD : 130/90 mmHg

N : 78x/i

S : 36,6 °C

P : 20x/i

4. Pemeriksaan fisik terfokus

a) Wajah

Inspeksi : Tidak pucat dan ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

b) Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

c) Abdomen

Inspeksi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 27 cm teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit.

6. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 12,3 gr%

Proteinuria : (-)

C. Assesment (A)

Ny "F" GIIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 28 minggu 5 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik

D. Planning (P)

Tanggal 10-07-2018 Jam 09 : 30 Wita

1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil ; Ibu sudah mengetahuinya dan sangat merasa lega

2. Melakukan observasi DJJ

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit

3. Memberitahu ibu bahwa ibu sudah bisa pulang ke rumah sebentar siang

Hasil : Ibu sangat senang mendengarnya

4. Melakukan aff infus

Hasil : Infus telah di aff

5. Melakukan aff kateter

Hasil : Kateter telah di aff

6. Melakukan pemeriksaan protein urin di laboratorium

Hasil : telah dilakukan dan protein ibu sudah negative

7. Menganjurkan kepada ibu untuk meminum obat yang telah diberikan oleh dokter yaitu nifedipin 3 x 1 10 mg

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Menganjurkan kepada ibu untuk menghindari makanan yang bergaram saat pulang ke rumah

Hasil : Ibu mengerti

9. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap istirahat dulu di rumah dan tidak melakukan aktivitas berat

Hasil: Ibu sudah meminum obatnya sesuai dengan yang dianjurkan

10. Mengingatkan kepada ibu agar selalu bersyukur kepada Allah swt atas kesembuhan yang diberikan

Hasil: Ibu mengerti dan akan melakukannya

11. Memberitahu ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu I minggu kedepan untuk melihat keadaan ibu

Hasil : Ibu mengerti

12. Menganjurkan kepada ibu untuk datang kembali memeriksakan kehamilannya pada tanggal 25 juli 2018 atau jika ada keluhan

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia datang.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY "F" DI RUMAH KLIEN

PADA TANGGAL 17 JULI 2018

Tanggal Pengkajian : 17 Juli 2018 Pukul : 14 : 00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny " S " / Tn " S "
 Umur : 38 tahun / 40 tahun
 Nikah : 1 x / ± 20 tahun
 Suku : Gowa / Gowa
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak pernah pusing selama pulang dari rumah sakit
2. Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Pengukuran antropometri

BB sebelumnya : 80 kg

BB sekarang : 74 kg

LILA : 28 cm

4. Tanda-tanda vital :

TD : 120/80 mmHg

N : 80x/i

S : 36 °C

P : 22x/i

5. Melakukan pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat dan ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan

a. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva berwarna merah muda dan sklera tidak ikterus

b. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

c. Abdomen

Inspkesi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU 3 jari diatas pusat, 28 cm teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 98 cm

TBJ : $28 \times 98 = 2744$ gr

Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri
bawah perut ibu dengan frekuensi $140 \times / \text{menit}$

d. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Tidak ada oedema

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan +/+

C. Assesment (A)

Ny "F" GIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 29 minggu 5 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik.

D. Planning (P)

Tanggal 17-07-2018 Jam 14:30 Wita

1. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan

Hasil : Keadaan umum ibu baik

2. Menganjurkan kepada ibu untuk mengonsumsi kembali tablet Fe sebanyak 2x1 dengan dosis 20 mg dan kalsium sebanyak 1x1 sebagai penambah darah dan pembentukan tulang janin

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang *Health Education* (HE)

a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu hamil yaitu makanan sehat dan seimbang seperti nasi, sayuran hijau dan buah-buahan dan menghindari makanan yang banyak mengandung lemak seperti daging.

b. *Personal Hygiene*

Misalnya mandi setiap hari minimal 2x sehari dan menggosok gigi minimal 2x sehari serta menjaga kebersihan daerah kewanitaan.

c. Istirahat

Ibu harus istirahat yang cukup. Tidur siang minimal 2 jam dan tidur malam minimal 6 jam dan tidak melakukan aktivitas berat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Menganjurkan kepada ibu untuk menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan piksin

Hasil : Ibu mengerti

5. Memberitahu kepada ibu 10 tanda bahaya kehamilan

b. Sakit kepala yang hebat

c. Mual dan muntah yang berlebihan

d. Nyeri perut yang hebat

e. Pergerakan janin berkurang atau tidak ada

f. Perdarahan pervaginam

g. Penglihatan kabur

h. Ketuban pecah dini

- i. Kejang
- j. Oedema pada wajah, tangan dan kaki
- k. Demam

Hasil : Ibu mengerti dan akan segera ke pusat pelayanan kesehatan jika merasakan salah satunya

- 6. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu membaca al-qur'an atau mendengarkan murottal al-qur'an serta memperdengarkan murottal al-qur'an kepada janinnya.

Hasil : Ibu mengerti dan akan melakukannya.

- 7. Tetap mengingatkan kepada ibu agar selalu bersyukur kepada Allah swt atas segala kesehatannya yang diberikan

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

- 8. Memberitahu ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu setelah 1 minggu.

Hasil: Ibu sudah diberitahu dan tampak senang mendengarnya

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY "F" DENGAN GESTASI 30-32 MINGGU

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

PADA TANGGAL 24 JULI 2018

Tanggal kunjungan : 24 Juli 2018 pukul 09 : 30 wita

Tanggal. Pengkajian : 24 Juli 2018 pukul 09 : 35 wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny " F " / Tn " M "

Umur : 38 tahun / 40 tahun

Nikah : 1 X / ± 20 tahun

Suku : Gowa / Gowa

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak pernah pusing selama pulang dari rumah sakit
2. Ibu sudah meminum obat sesuai waktu yang dianjurkan dan sudah habis
3. Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif dan dominan terasa pada perut sebelah kanan
4. Ibu sudah tidak pernah mengalami bengkak lagi pada kakinya sejak pulang dari rumah sakit

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Pemeriksaan antropometri

BB sebelumnya : 74 kg

BB sekarang : 75,5 kg

LILA : 28 cm

4. Tanda-tanda vital :

TD : 120/80 mmHg

N : 80x/i

S : 36,5 °C

P : 22x/i

5. Melakukan pemeriksaan fisik terfokus

- a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat dan ada cloasm gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan

- b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : Konjungtiva berwarna merah mudan dan sklera tidak ikterus

- c. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

d. Abdomen

Inspeksi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU pertengahan antara pusat dengan
prosesus xipodeus 28 cm teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 99 cm

TBJ : $28 \times 99 = 2772$ gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146×/menit

e. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Tidak ada oedema

Perkusi : Refleks patella +/+

6. Hasil pemeriksaan laboratorium

Protein urin : -

Hb : 11,3 gr%

C. Assesment (A)

Ny "F" GIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 30 minggu 5 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik

D. Planning (P)

Tanggal 24-07-2018 Jam 09 : 40 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum

Hasil: Keadaan umum ibu baik

2. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan

Hasil : Ibu sudah diberitahu dan mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Menganjurkan ibu mengomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan bayi dan ibu tetap terpenuhi

Hasil : Ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan

4. Melakukan pemeriksaan protein urin di laboratorium

Hasil : urin ibu telah di periksa dan protein urin ibu negative

5. Memberitahu kepada ibu agar tetap mengonsumsi tablet fe yang telah diberikan yaitu 1x1 dosis 20 mg dan meminumnya pada malam hari sebelum tidur

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Tetap mengingatkan kepada ibu tanda bahaya kehamilan dan menganjurkan untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan jika merasakan salah satunya

Hasil : ibu mengertidan bersedia melakukannya

7. Mengingatkan kepada ibu agar selalu bersyukur kepada allah swt dan selalu memperdengarkan murottal al-qur'an pada bayinya

Hasil : Ibu mengertidan ibu selalu melakukannya setiap sudah sholat

8. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap bertawakkal dan berdoa kepada Allah swt agar persalinannya nanti lancar, ibu dan anaknya tetap selamat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menganjurkan kepada ibu untuk datang memeriksakan kehamilannya kembali pada tanggal 14 Agustus 2018 atau jika ada keluhan

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia datang

10. Memberitahu kepada ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu 1 minggu kedepan untuk melihat keadaan ibu

Hasil : Ibu mengerti dan sudah mengetahuinya



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL

PADA NY "F" DI RUMAH KLIEN

PADA TANGGAL 31 JULI 2018

Tanggal Pengkajian : 31 Juli 2018 Pukul : 15 : 15 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny " S " / Tn " S "
 Umur : 38 tahun / 40 tahun
 Nikah : 1 X / ± 20 tahun
 Suku : Gowa / Gowa
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Romanglasa

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak pernah merasa pusing dan sakit kepala
2. Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif sekali
3. Ibu merasa sering sekali kencing sejak 1 minggu terakhir

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Pengukuran antropometri

BB sebelumnya : 75,5 kg

BB sekarang : 77 kg

LILA : 28 cm

6. Tanda-tanda vital :

TD : 120/80 mmHg

N : 80x/i

S : 36 °C

P : 22x/i

7. Melakukan pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat dan ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : Konjungtiva berwarna merah muda dan sklera tidak ikterus

c. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

d. Abdomen

Inspeksi : Tampak striae alba, linea nigra, tidak ada bekas luka operasi serta pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Palpasi : Leopold I : TFU pertengahan antara pusat dengan *prosessus xipodeus*, 28 cm teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 98 cm

TBJ : $28 \times 99 = 2772$ gr

Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri
bawah perut ibu dengan frekuensi $140 \times / \text{menit}$

e. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varises

Palpasi : Tidak ada oedema

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan $+ / +$

C. Assesment (A)

Ny "F" GIPIA0 umur 38 tahun, gestasi 31 minggu 5 hari, intrauterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik.

D. Planning (P)

Tanggal 31-07-2018 Jam 14:10 Wita

1. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan

Hasil : Keadaan umum ibu baik

2. Memberitahu kepada ibu penyebab kencing yang sering dialami ibu karena kepala mulai turun kebawah sehingga menekan kandung kemih ibusehingga ibu tidak perlu mencemaskannya karena itu masih dalam batas normal

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan dan merasa lega mendengarnya

3. Menganjurkan kepada ibu untuk mengonsumsi kembali tablet Fe sebanyak 2x1 dengan dosis 20 mg dan kalsium sebanyak 1x1 sebagai penambah darah dan pembentukan tulang janin

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang *Health Education* (HE)

- a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu hamil yaitu makanan sehat dan seimbang seperti nasi, sayuran hijau dan buah-buahan

- b. *Personal Hygiene*

Misalnya mandi setiap hari minimal 2x sehari dan menggosok gigi minimal 2x sehari serta menjaga kebersihan daerah kewanitaan.

- c. Istirahat

Ibu harus istirahat yang cukup. Tidur siang minimal 2 jam dan tidur malam minimal 6 jam dan tidak melakukan aktivitas berat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda persalinan

- a. Nyeri perut tembus belakang
- b. Keluar lender dan darah
- c. Ketuban pecah
- d. Sakit pada perut semakin lama semakin kuat

Hasil : Ibu mengerti

6. Mengingatkan kembali kepada ibu tanda bahaya kehamilan dan jika merasakan salah satunya segera memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu membaca al-qur'an atau mendengarkan murottal al-qur'an serta memperdengarkan murottal al-qur'an kepada janinnya.

Hasil : Ibu mengerti dan akan melakukannya.

8. Tetap mengingatkan kepada ibu agar selalu bersyukur kepada Allah swt atas segala kesehatannya yang diberikan

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

9. Memberitahu ibu bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah ibu setelah 1 minggu.

Hasil: Ibu sudah diberitahu dan tampak senang mendengarnya

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di bahas tentang kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus pada pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan preeklampsia berat yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 5 hari mulai tanggal 06-07-2018 sampai 10-07-2018.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney, yaitu pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I : Pengkajian Data Dasar dan Analisa Data

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Tahap pengkajian diawali dengan pengumpulan data melalui anamnesis yang meliputi ibu, data biologis atau fisiologis, riwayat kehamilan atau persalinan lalu dan sekarang, pemeriksaan fisik yang berpedoman pada format pengkajian yang tersedia.

Data yang dikumpulkan adalah data yang tepat yaitu data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau atau data yang memiliki berhubungan dengan situasi yang ditinjau. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi napas), penciuman (bau nafas, bau luka) serta perabaan (suhu badan, nadi). Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis juga bisa dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nuurhayati dkk, 2013).

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis yang meliputi biodata bertujuan memperjelas identitas pasien, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sekarang dan riwayat psikososial untuk mendapatkan informasi tentang keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh ibu dan kekhawatiran khusus yang muncul akibat adanya perubahan psikologis maupun psikologi.

Dalam tahap pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat pengumpulan data pada Ny "F", maupun keluarga serta bidan dan dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi data pada tahap selanjutnya. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan urine. Pengkajian pada kasus ini maka dilanjutkan dengan perencanaan asuhan pada ibu dengan preeklampsia berat. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Langkah pertama yakni identifikasi data dasar pada Ny "F" didapatkan dari tahap anamnesa yakni keluhan utama ibu adalah ibu merasa pusing sejak 2 hari yang lalu, serta ibu merasa sakit kepala dan bengkak pada kakinya sejak 1 minggu yang lalu, riwayat kehamilan sekarang ibu didapatkan bahwa hari pertama haid terakhir ibu adalah tanggal 21 Desember 2017, riwayat kesehatan yang lalu ibu yakni ibu tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes melitus, asma dan jantung pada kehamilan sebelumnya, riwayat KB ibu didapatkan bahwa ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan dan KB implant.

Sedangkan pada tahap pemeriksaan fisik ibu atau data objektif didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah : 180/120 mmHg, suhu : 36,8 °C, nadi : 82 x/menit, pernapasan: 22x/i, pada palpasi ekstremitas bawah didapatkan bahwa ibu mengalami oedema pada kedua tungkai. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan protein urine ibu adalah +3, dan

hemoglobin ibu adalah 13,8 gr%. Preeklampsia berat ialah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam atau proteinuria $\geq +2$ (Sarwono, 2014:544). Preeklampsia berat dibagi atas 2 kategori yaitu, preeklampsia berat tanpa *impending eclampsia*, dan preeklampsia berat dengan *impending eclampsia* dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179).

Pada kasus Ny "F" usia 38 tahun G1P1A0 merupakan pasien rujukan dari puskesmas Gentung dengan keluhan ibu merasa pusing, sakit kepala dan bengkak pada kaki serta hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan 180/120 mmHg dan pada pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium) di peroleh proteinuria +3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan penerapan manajemen asuhan kebidanan.

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan interpretasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik. Kata masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis, tetapi sesungguhnya membutuhkan penanganan yang dituangkan kedalam sejumlah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering

diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya, masalah ini sering menyertai diagnosis.

Dalam tinjauan teori mengatakan bahwa preeklampsia berat ialah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam. Kriteria diagnosis untuk preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi $\geq 160/110$ mmHg atau lebih disertai proteinuria dan atau oedema pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Gejala dan tanda preeklampsia berat : tekanan darah sistolik >160 mmHg, tekanan darah diastolik >110 mmHg, peningkatan kadar enzim hati atau ikterus, trombosit $<100.000/mm^3$, Oliguria <400 ml/24 jam, proteinuria >2 gr/liter, nyeri epigastrium, skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat, perdarahan retina dan oedema pulmonum.

Penyulit lain juga bisa terjadi, yaitu kerusakan organ-organ tubuh seperti gagal jantung, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan pembekuan darah, sindroma HELLP, bahkan dapat terjadi kematian pada janin, ibu, atau keduanya bila preeklampsia tak segera diatasi dengan baik dan benar. Ditinjau dari umur kehamilan dan perkembangan gejala-gejala preeklampsia berat selama perawatan maka perawatan dibagi menjadi perawatan aktif yaitu kehamilan segera diakhiri atau diterminasi ditambah pengobatan medisinal dan perawatan konservatif yaitu kehamilan tetap dipertahankan ditambah pengobatan medisinal.

Dari tinjauan kasus diperoleh data: pada klien Ny "F" ibu hamil dengan preeklampsia berat dengan gejala yang dialami ibu yaitu pusing dan sakit kepala,

tekanan darah 180/120 mmHg dan data penunjang pemeriksaan protein urin +3, dan odema pada kedua tungkai.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari data pertama, maka diagnosa atau masalah aktual pada Ny "F" adalah : GIPIA0, Gestasi 28 Minggu 1 hari, Intrauterine, Tunggal, Hidup, Preeklampsia Berat

1. GIPIA0 merupakan kehamilan ketiga, telah 1 kali melahirkan dan tidak pernah keguguran. Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae alba, pembesaran perut sesuai usia kehamilan. Keluarnya *Melanophore Stimulating Hormone* hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit di sekitar pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut (striae livide) pada primigravida dan (striae alba) pada multigravida (Manuaba, dkk, 2013: 107). Usia kehamilan Ny "F" yaitu 28 minggu 1 hari, maka hal ini sesuai dengan data yang ada yaitu dari hasil bila dihitung dari HPHT tanggal 21 Desember 2017. Serta pembesaran perut sesuai usia kehamilan dan TFU 3 jari di atas pusat (sesuai dengan usia kehamilan).
2. Intrauterine, bagian besar janin dapat diraba saat dilakukan palpasi secara Leopold dan ibu tidak merasa nyeri saat janin bergerak, teraba bagian-bagian janin dalam uterus. Kehamilan intrauterine, perkembangan rahim sesuai dengan umur kehamilan.
3. Tunggal, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, teraba dua bagian besar pada lokasi yang berbeda, bagian kepala pada kuadran perut

bagian bawah, bokong berada pada kuadran fundus. Pada kehamilan tunggal hanya satu bunyi jantung.

4. Hidup, janin yang hidup ditandai dengan adanya pergerakan janin yang dapat dirasakan oleh ibunya, dan pada auskultasi terdengar DJJ yang jelas dan teratur.
5. Preeklamsia Berat, dengan gejala-gejala impending seperti nyeri kepala, mata kabur, mual atau muntah, nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kanan atas abdomen (Dewi Setiawati, 2013:179). Preeklamsia berat ialah preeklamsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5 g/24 jam (Sarwono, 2014:544).

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan. Adapun diagnosa/ masalah aktual yang dapat diidentifikasi pada klien Ny "F" ibu hamil dengan preeklamsia berat dengan gejala yang dialami tampak pusing, tekanan darah 180/120 mmHg dan data penunjang pemeriksaan proteins urinaria +3 sehingga dalam penentuan masalah aktual tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus pada Ny "F" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yang ditegaskan sehingga memperlihatkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Pada tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial, melakukan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien diharapkan dapat pula bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi.

Dalam merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan membahayakan klien. Diagnosa/ masalah potensial yang dapat diidentifikasi pada studi kasus Ny "F" ada kesamaan antara teori yaitu potensial terjadi eklampsia, dan KJDR.

Pada kasus Ny "F" yang dilakukan pengkajian penulis dapat mengidentifikasi masalah potensial yang akan terjadi pada kasus ini yaitu dapat terjadi eklampsia.

Antisipasi terjadinya eklampsia dilihat dari beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya preeklampsia dan eklampsia diantaranya adalah sebagai berikut: Risiko yang berhubungan dengan partner laki-laki berupa primigravida (resiko primigravida 2 kali lebih besar daripada multigravida), umur yang ekstrim terlalu muda atau terlalu tua untuk kehamilan, partner laki-laki yang pernah menikahi wanita yang kemudian hamil dan mengalami preeklampsia, inseminasi donor dan donor oocyte, resiko yang berhubungan dengan riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga berupa riwayat penyakit preeklampsia, hipertensi kronis, penyakit ginjal, obesitas, diabetes gestasional, dan

resiko yang berhubungan dengan kehamilan berupa mola hidatidosa kehamilan multipel, hydrops fetals (Yulia Fauziyah, 2012:18).

Kematian janin dalam Rahim (KJDR) merupakan kematian janin dalam uterus dengan usia kehamilan 20 minggu atau lebih dengan berat janin mencapai 500 gram atau lebih , ini merupakan salah satu komplikasi yang akan terjadi pada penderita pre eklamsia jika tidak di tangani secara baik dan cepat .

D. Langkah IV.Tindakan Emergency / Kolaborasi

Bidan atau dokter harus melakukan tindakan segera dan/atau mengonsultasikan serta menangani bersama anggota tim keesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi, manajemen kebidanan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan perinatal saja, melainkan juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya ketika wanita tersebut dalam persalinan. Data baru dapat saja perlu dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data dapat mengindikasikan situasi yang gawat, yakni bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu dan anak.

Adanya data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dan harus menyelamatkan jiwa ibu serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada ibu hamil dengan preeklampsia berat tindakan segera yang dilakukan yaitu memasang infus RL, memantau tekanan darah ibu, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat untuk mencegah

kejang, pada studi kasus Ny”F” telah dilakukan pemasangan infus dengan cairan RL, memantau tekanan darah dan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat. Pada kasus yang ditemukan bahwa Ny”F” di berikan MgsO4 karena pada hasil pemeriksaan laboratorium di dapatkan hasil protein urine (+3). Dengan demikian tindakan yang di lakukan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus di lahan praktek sesuai.

E. Langkah V. Intervensi Asuhan Kebidanan

Proses penyusunan suatu rencana tindakan harus berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang serta antisipasi diagnosa dan masalah lain yang mungkin timbul namun lebih dahulu harus dirumuskan tujuan dan kriteria yang akan dicapai.

Perencanaan adalah proses penyusunan suatu rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang, serta identifikasi diagnose dan masalah lain yang mungkin terjadi. Namun terlebih dahulu harus dirumuskan tinjauan yang akan dicapai serta kriteria keberhasilan.

Pada tahap perencanaan diagnosa kebidanan disusun menurut tingkat bertanya masalah dan kebutuhan pasien. Masalah preeklampsia berat merupakan prioritas utama penulis sebagai masalah yang mengancam keselamatan bayi dan perlu tindakan segera. Sedangkan masalah potensial yang penulis angkat yaitu potensial terjadinya eklampsia.

Pada manajemen kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif termasuk indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien serta hubungannya dengan masalah yang dialami klien, dan juga meliputi antisipasi dengan

bimbingan terhadap klien, serta konseling. Rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan, diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Ibu hamil pada Ny”F” dengan preeklampsia berat, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial sebagai berikut:

1. Memberitahu bahwa ibu mengalami preeklampsia berat
2. Mengobservasi keadaan umum, dan TTV
3. Melakukan pemeriksaan DJJ
4. Melakukan pemasangan infus dengan cairan RL
5. Melakukan pemasangan kateter tetap
6. Melakukan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian terapi obat sebagai anti kejang
7. Memberikan obat oral nifedipin 3×1 hari @ 10 mg
8. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk mengecek proteiunuria
9. Menganjurkan kepada ibu untuk mendengarkan murottal al-qur’an
10. Menganjurkan ibu untuk selalu sabar, berdoa dan bertawakkal kepada Allah swt agar diberika kesembuhan

F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan

pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan meningkatkan mutu asuhan

Sesuai tinjauan manajemen kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjalin rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada study kasus Ny^{”F”} ibu hamil dengan preeklampsia berat, semua tindakan telah direncanakan sudah dilaksanakan seluruhnya dengan baik, tanpa hambatan karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan yang ada di ruang *Instalasi Rawat Darurat (IRD)* RSUD Syekh Yusuf Gowa.

G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada tinjauan kebidanan evaluasi merupakan tingkat akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan. Mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan tercapai atau belum tercapai.

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atas keberhasilan dalam mengatasi

masalah yang dihadapi klien. Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Pada tinjauan pustaka evaluasi yang berhasil dilakukan adalah pemantauan keadaan ibu yang meliputi:

1. Preeklampsia berat sudah teratasi sehingga tidak terjadi eklampsia
2. Tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu badan dalam keadaan normal
3. Keadaan umum ibu sudah membaik dan kesadaran komposmentis

Berdasarkan study kasus Ny “F” ibu hamil dengan preeklampsia berat, setelah 5 hari diobservasi di rumah sakit RSUD Syekh Yusuf dan 3 kali kunjungan rumah tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu, pada tinjauan pustaka dan study kasus Ny “F” secara garis besar tidak ditemukan kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan preeklampsia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan pengkajian terhadap ibu hamil dengan preeklampsia berat dilaksanakan dengan pengumpulan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dari pasien dengan keluhan pusing, sakit kepala, bengkak pada kaki, dan data objektif di peroleh dari pemeriksaan tekanan darah 180/120 mmHg, oedema pada ekstremitas dan pemeriksaan laboratorium protein urinaria +3.
2. Interpretasi data dilakukan dengan pengumpulan data dengan teliti dan akurat sehingga didapatkan diagnosa Ny “F” GIPIIA0 umur 38 tahun, gestasi 28 minggu 1 hari, intra uterine, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia berat.
3. Diagnosa potensial pada Ny “F” tidak muncul.
4. Tindakan segera pada Ny “F” dengan preeklampsia berat adalah memantau tekanan darah, memasang infus RL 28 tpm, melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat anti kejang yaitu MgSO₄ dan obat oral yaitu nifedipin 3×1 hari @10 mg.

5. Rencana tindakan pada Ny “S” dengan preeklampsia berat memberikan konseling kepada ibu tentang keadaanya, pantau tekanan darah, melakukan pemasangan infus RL dengan 28 tpm, melakukan pemberian terapi obat anti kejang yaitu MgSO₄ secara IV dengan dosis 4 gram dan MgSO₄ dalam larutan RL 500 cc dengan dosis 6 gram dengan 28 tpm dan obat oral yaitu nifedipin 3×1 hari @10 mg serta melakukan pemasangan kateter dan melakukan kolaborasi dengan petugas lab untuk melakukan pemeriksaan proteinuria serta memperdengarkan murottal al-qur’an kepada ibu.
6. Pelaksanaan pada ibu hamil Ny “F” dengan preeklampsia berat sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan.
7. Evaluasi pada Ny F dengan preeklampsia berat yaitu preeklampsia berat dapat teratasi.
8. Dalam penanganan kasus preeklampsia berat pada Ny “F” tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.
9. Pendokumentasian sangat penting dilakukan pada setiap tahap dalam manajemen kebidanan, karena merupakan bukti pertanggungjawaban bidan terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan terhadap pasien.

B. Saran

- a. Diperlukan keterlibatan keluarga untuk lebih memfokuskan perhatian pada pasien terhadap keluhan ibu, dan segera membawa ke rumah sakit terdekat.

- b. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan, diharapkan senantiasa berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
- c. Seorang bidan hendaknya menganggap semua ibu hamil mengalami resiko komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu. Jadi diharapkan bidan mampu mendeteksi dini adanya tanda bahaya dan menganjurkan ibu dan keluarga segera ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.
- d. Sebagai bidan diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas lain (dokter, perawat, dan sesama bidan) untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang lebih baik dan lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Yenika, *Efektivitas Metode Inhalasi Aromaterapi (Campuran Minyak Esensial Lavender Dan Nerol) Untuk Menurunkan Hipertensi Dalam Kehamilan*. Global Health Science, vol. 2 Issue 2, Juni 2017.
- Bothamley, J., Boyhel, M. *Patofisiologi Dalam Kebidanan*. Jakarta: EGC, 2013 .
- Departemen R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2013.
- Dyah, dkk. 2016. *Hubungan Antara Status Gizi dan Kecemasan Ibu hamil dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Geyer I Kabupaten Grobogan*. Jurnal Kesehatan vol.4 No.3 Mei 2016
- Hutahean, Serri. *Perawatan Antenatal*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2013.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Dharma art, 2013
- Kementrian Kesehatan RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*, Jakarta: Unicef, 2013.
- Norma, Nita dan Mustika. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Nugroho, Taufan dkk. *Buku Ajar Askeb Kehamilan*. Yoyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, 2013
- Paulina, dkk. *Faktor Resiko Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Dikabupaten Belu*. Jurnal MKMI, vol.13 No. 2, Juni 2017.
- Patricia, dkk. *Karakteristik Preeklamsia di RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado*. Jurnal e-Clinic, vol.4 No. 1, Juni 2016.
- Pranoto, Ibnu. *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya, 2013.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Pt Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Saraswati, Nuning dan Mardiana, *Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil (studi Kasus di RSUD Kabupaten Brebes Tahun 2014)*. Unnes Journal of Public Health, April 2016.

Sukarni, Icesmi dan Margaretha. *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan pemeriksaan Kehamilan*. Makassar-Samata Gowa: UIN Press, 2013

Tigor, dkk. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Poli KIA RSUD Anutapura Palu*. Jurnal Kesehatan Tadulako vol 2 No. 1, Januari 2016.

Yeyeh, Ai dan Lia Yulianti. *Asuhan Kebidanan Patologi Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media, 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : Nisfawati
2. NIM : 70400115070
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 11 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. A. Mallombassang
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Enre
 - b. Ibu : Alm. Rosi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SDN 251 Balappangi tahun 2011
2. Tamat SMP : SMPN 3 Bulupoddo Tahun 2013
3. Tamat SMA : MAN 1 Sinjai Utara Tahun 2015
4. Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan