

**ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI DARI SAMPEL PUS
DAN POLA SENSIVITAS TERHADAP ANTIBIOTIK
PENICILLIN, CEFUROXIME DAN MEROPENEN
DI RS INCO PT.VALE SOROWAKO**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WAHYUNI
NIM. 60300115019

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni
NIM : 60300115019
Tempat/Tgl. Lahir : Panyurak 21 Desember 1996
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : jln Bontotangnga lorong 1
Judul : Isolasi dan Identifikasi Bakteri dari Sampel Pus dan Pola Sensivitas terhadap Antibiotik Penicillin, Cefuroxime dan Meropenen di RS Inco PT. Vale Sorowako

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Februari 2019

Penyusun,



Wahyuni

NIM: 60300115019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Isolasi dan Identifikasi Bakteri dari Sampel Pus dan Pola Sensivitas terhadap Antibiotik Penicillin, Cefuroxime dan Meropenem di RS Inco PT.Vale Sorowako", yang disusun oleh Wahyuni, NIM: 60300115019, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 M, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Februari 2019 M.
20 Jumadil Akhir 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof Dr. H Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Cut Muthiadin S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Burhanuddin, Lc. M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ekafadly Jusuf, S.Si., M.Kes	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof Dr. H Arifuddin, M.Ag
NIP. 196812311995031006


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Wahyuni**, NIM: 60300115019, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul, **“Isolasi dan Identifikasi Bakteri dari Sampel Pus dan Pola Sensivitas terhadap Antibiotik Penicillin, Cefuroxime dan Meropenem di RS Inco PT.Vale Sorowako”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar,


Ekafadly Jusuf S.Si.M.Kes
Pembimbing II


Dr. Mashuri Masri S.si, M.Kes
Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Segala puji milik Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi yang berjudul ‘*Isolasi dan Identifikasi Bakteri dari Sampel Pus dan Pola Sensivitas terhadap Antibiotik Penicillin, Cefuroxime dan Meropenem di RS Inco PT.Vale Sorowako*’ dapat selesai. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi Bahasa, maupun dari segi sitematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Sebuah persembahan dan sembah sujud serta terima kasih penulis persembahkan kepada Ayahanda **A.anto** dan Ibunda **Sumina** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, berkorban, bekerja keras sepenuh hati membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah sehingga penulis meraih gelar Sarjana strata satu (S1).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk ini pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Musafir Pabbari. M.Si** selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** sebagai Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu dekan I, pembantu dekan II, dan

pembantu dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. **Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si**, sebagai penguji atas masukan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Burhanuddin, Lc.,M.Ag**, sebagai penguji agama atas masukan dan kritikan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Si**. sebagai pembimbing sekaligus ketua jurusan Biologi saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya
6. **Dr. Ekafadly Jusuf, S.Si., M.Si**. sebagai pembimbing terima kasih atas saran, ilmu nasehat-nasehat serta kesabaran dalam membimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh Keluarga Besar Jurusan Biologi Serta Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi** yang telah memberi banyak arahan serta semangat pada penulis dalam menyusun skripsi.
8. **Seluruh Staf Sivitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi** yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
9. **(Dr. Hafsah, S.Si.,M.Pd, Dr. Fatmawati, S.Si.,M.Si, St. Aisyah Sijid, S.Si.,M.Kes, Ulfa Triyani, S.Si.,M.Pd, Eka Sukmawati, S.Si.,M.Si, Nurlaila Mappanganro, S.Pd.,M.Pi, Ar. Syarif Hidayat, S.Si.,M.Kes. Hasyimuddin, S.Si.,M.Si, Isna Rasdiana Azis, S.Si.,M,Sc, dan Zulkarnain S.Si.,M.Kes)** Dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. **Keluarga besar penulis (Sulastri, Habriati, Sumarlin, Zulkifli, dan Adhe Alfarebi)** tercinta yang tiada henti menguatkan, mendoakan, memotivasi, dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa berada situasi dan kondisi sekarang.
11. **Kakak-kakak dari Laboratorium Medik RS Inco PT Vale Sorowako** yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukan dalam penelitian penulis.

12. **Teman-teman Impul5, (Biologi Angkatan 2015)** yang telah menjadi teman perjuangan dalam menggali ilmu pada jurusan Biologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
13. **Teman-teman BUKANGANG (Dian,Fina,Ifa,Fausia, dan Afri)** yang selalu memberi semangat serta membantu selama pengurusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. **Teman-teman KKN Angkatan 59 Kec. Tompobulu Desa Datara Kab. Gowa**, terkhusus teman posko penulis dan Ibu, Bapak posko sebagai pengganti orang tua penulis selama KKN.
15. **Teman-teman Rumah Kuning (Sahra,Eci,Suci,Reski,Ika,Janna,Enceng)** yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat jika dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang tidak tercantum namanya dan kepada mereka tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga menjadi ibadah dana mal jariyah. AMINN

Makassar, 7 Februari 2019

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

Wahvuni
NIM: 60300115019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	7
C. <i>Ruang lingkup penelitian</i>	7
D. <i>Kajian Pustaka</i>	Error! Bookmark not defined.
E. <i>Tujuan penelitian</i>	11
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Ayat yang relevan</i>	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Tinjauan hadits tentang antibiotik</i>	Error! Bookmark not defined.
C. <i>Tinjauan umum tentang pola sensitivitas bakteri</i>	16
D. <i>Tinjauan umum tentang antibiotik</i>	22
E. <i>Tinjauan umum tentang PT Vale Sorowako</i>	31
BAB III.....	36
METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. <i>Jenis dan pendekatan</i>	36
B. <i>Waktu dan lokasi penelitian</i>	36

<i>C. Populasi dan sampel</i>	36
<i>D. Variabel penelitian</i>	36
<i>E. Pengertian varuabel penelitian</i>	36
<i>F. Metode pengumpulan data</i>	37
<i>G. Instrumen penelitian</i>	36
<i>H. Prosedur Kerja</i>	36
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
<i>A. Hasil Pengamatan</i>	40
<i>B. Pembahasan</i>	45
BAB V	
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
<i>A. Kesimpulan</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>B. Saran</i>	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Nama : Wahyuni
NIM : 60300115019
Judul Skripsi : 'Isolasi dan Identifikasi Bakteri dari Sampel Pus dan Pola Sensivitas terhadap Antibiotik Penicillin, Cefuroxime dan Meropenem di RS Inco PT.Vale Sorowako

Pus merupakan hasil dari proses infeksi bakteri. Penanganannya adalah dengan melakukan pemberian antibiotik. Namun pemberian antibiotik sering menimbulkan resistensi. Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya resistensi dan untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik, pemberian antibiotik harus berdasarkan informasi pola bakteri penyebab infeksi dan pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan tujuan Untuk memperoleh data ilmiah tentang jenis antibiotik *penicillin*, *cefuroxime* dan *meropenem* yang paling sensitivitas terhadap bakteri dari sample pus di Rs Inco PT Vale Sorowako. Sampel penelitian adalah hasil pemeriksaan kultur pada spesimen pus di RS Inco PT Vale sorowako. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampel pada penelitian ini adalah 21 sampel terdapat 7 jenis bakteri, bakteri gram negatif lebih banyak dibandingkan dengan bakteri gram positif. Tiga bakteri terbanyak yaitu *Enterobacter cloacae*, *staphylococcus aureus*, *Enterobacter aerogenes*. Secara keseluruhan sensitivitasnya tertinggi yaitu *meropenem* (90%) dan resisten tertinggi yaitu *cefuroxime* dan *penicillin* (45%). Kesimpulan didapatkan antibiotik yang paling tinggi tingkat sensitivitasnya pada spesimen pus yaitu antibiotik *meropenem* sebesar 90% dan tingkat resistensi tertinggi pada spesimen pus yaitu antibiotik *cefuroxime* dan *penicillin*. Dari total sampel yang diteliti terdapat 7 jenis bakteri yang didapatkan, bakteri yang paling dominan yaitu *staphylococcus aureus*, *Enterobacter cloacae*, dan *Enterobacter aurogenes*.

Kata kunci : Sensivitas, Resisten, Antibiotik *penicillin*, *cefuroxime*, dan *meropenem*.

ABSTRACT

Name : Wahyuni

Student ID Number : 60300115019

Title : Isolation and identification of bacterial from pus samples and sensitive patterns to penicillin, cefuroxime and meropenem in inco pt. surowako

Pus is the result of a bacterial infection process. Handling is by giving antibiotiks. However antibiotiks often cause resistance. One of the efforts to reduce the occurrence of resistance and to optimize the use of antibiotiks, antibiotiks should be based on information about the patterns of bacteria that cause infection and the pattern of bacterial sensitivity to antibiotiks. This study uses quantitative research with the aim of obtaining scientific data on the types of penicillin, cefuroxime and meropenem antibiotiks that are most sensitive to bacteria from pus samples in PT Vale Sorowako Rs. The research sample was the result of culture examination on pus specimens at PT Vale Sorowako Inco Hospital. The results showed that the number of samples in this study were 21 samples there were 7 types of bacteria, gram-negative bacteria were found more than gram-positive bacteria. The three most bacteria are *Enterobacter cloacae*, *staphylococcus aureus*, *Enterobacter aerogenes*. The highest overall sensitivity is *meropenem* (90%) and the highest resistance is *cefuroxime and penicillin* (45%). Conclusion The three most bacteria are *Enterobacter cloacae*, *staphylococcus aureus*, *Enterobacter aerogenes*. Gram-negative bacteria are more than Gram-positive bacteria. Overall the highest resistance of bacteria to *cefuroxime* and the highest sensitivity to *meropenem* antibiotiks.

Keywords: Sensitivity, Resistance, antibiotiks *penicillin*, *cefuxime*, and *meropenem*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama timbulnya penyakit di daerah tropis seperti Indonesia karena keadaan udara yang banyak berdebu, temperatur yang hangat dan lembab sehingga mikroba dapat tumbuh subur. Keadaan tersebut ditunjang dengan kemudahan transportasi dan keadaan sanitasi yang buruk sehingga memudahkan penyakit infeksi semakin berkembang (Kuswandi, 2001).

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang menempati urutan penyakit papan atas di Indonesia. Tingginya angka kejadian infeksi menyebabkan tidak terhindarkannya penggunaan antibiotik sebagai salah satu obat anti infeksi. Hal tersebut meningkatkan peluang terjadinya penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan dapat menyebabkan terjadinya resistensi . Resistensi antibiotik telah menjadi perhatian masyarakat di seluruh belahan dunia, hal tersebut memerlukan kesadaran bersama akan adanya hubungan antara tingkat resistensi antibiotik dengan pola penggunaan antibiotik. Informasi mengenai pola penggunaan antibiotik dapat digunakan sebagai alat deteksi dini adanya ketidakrasionalan dan sebagai sumber informasi dalam pengendalian resistensi antibiotik (Ivan, 2012).

Infeksi adalah adanya suatu mikroorganisme pada jaringan atau cairan tubuh yang disertai suatu gejala klinis baik lokal maupun sistemik (Utama, 2006). Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh empat kelompok besar hama penyakit, yaitu : bakteri, jamur, virus dan parasit (Jawetz *et al.*, 2001).

Salah satu respon tubuh terhadap infeksi yang ditandai dengan terbentuknya pus, dimana pus merupakan cairan yang kaya protein dari hasil proses inflamasi yang terbentuk dari sel (leukosit), cairan jaringan serta debris seluler. Adanya pus yang berlangsung lama yang terdapat pada luka yang mengalami infeksi menandakan bahwa adanya bakteri yang terus menerus berkembang di daerah tersebut. Sehingga perlu dilakukan pengujian kultur dan uji resistensi untuk mengetahui jenis bakteri penginfeksi untuk diberikan terapi yang sesuai dengan penyakit yang diderita (Nurmala,2015).

Sebagai upaya penanggulangan, penyakit infeksi dapat diatasi melalui pengobatan menggunakan antibiotika (Naim, 2003). Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia ditentukan harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya obat tersebut haruslah bersifat sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik terhadap hospes (Setiabudy dan Gan, 1995). Agen antibakteri yang optimal untuk pengobatan suatu infeksi adalah antibakteri yang mempunyai spektrum aktivitas yang paling sempit, dengan efek samping dan toksisitas minimal (Shulman dkk., 1994).

Pada beberapa negara berkembang, antibiotik diresepkan kepada 44-97% dari total pasien rumah sakit. Meningkatnya penggunaan antibiotik menimbulkan permasalahan dan ancaman global bagi kesehatan terutama akan menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain akan berdampak kepada morbiditas dan mortalitas dan bahkan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebesar 84% pasien rumah sakit di Indonesia mendapat terapi

antibiotik dan 38% diantaranya diberikan secara irrasional dan tidak tepat indikasi (Susanti, 2012).

Meskipun munculnya resistensi antibiotik bukan hal baru lagi, namun akibat pengaruh berbagai faktor menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik menjadi masalah kesehatan yang kompleks. Jumlah bakteri resisten meningkat dengan cepat dan beberapa bakteri patogen memiliki resistensi terhadap beberapa antibiotik, bahkan resisten terhadap semua antibiotik. Sebagian bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik lini pertama, memerlukan jenis antibiotik lini kedua atau ketiga yang lebih mahal (Rahmawati, 2012).

Resistensi antibiotik terhadap mikroba akan menimbulkan beberapa permasalahan yang serius. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang gagal berespon terhadap pengobatan sehingga mengakibatkan perpanjangan penyakit (*prolonged illness*) serta meningkatkan resiko kematian (*greater risk of death*) dan semakin lamanya masa rawat inap di rumah sakit (*length of stay*). Jadi, ketika respon terhadap pengobatan menjadi lambat bahkan akan mengalami kegagalan, pasien menjadi infeksius untuk beberapa waktu yang lama (*carrier*), sehingga hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi galur resisten untuk menyebar kepada orang lain. Transportasi dan globalisasi akan memudahkan penyebaran bakteri yang telah mengalami resistensi di berbagai daerah, negara bahkan lintas benua sehingga akan meningkatkan jumlah orang yang terinfeksi dalam suatu daerah (Deshpande *et al*, 2011)

Ketika infeksi menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotika lini pertama, maka harus digunakan antibiotika lini kedua atau ketiga yang memiliki harga lebih mahal dan kadang kala pemakaiannya lebih bersifat toksik. Di negara-negara miskin, dimana antibiotika lini pertama maupun kedua tidak tersedia, menjadikan potensi resistensi terhadap antibiotika lini pertama menjadi lebih besar. Antibiotika di Negara miskin, didapatkan dalam jumlah sangat terbatas, bahkan antibiotika yang seharusnya ada untuk mengatasi penyakit infeksi yang disebabkan bakteri patogen resisten, tidak terdaftar dalam daftar obat esensial (Bisht *et al*, 2009)

Segi ekonomi baik untuk klinisi, pasien, *health care administrator*, perusahaan farmasi, dan masyarakat. Biaya kesehatan akan semakin meningkat seiring dengan dibutuhkannya antibiotik baru yang lebih kuat dan lebih mahal, akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mampu menjangkau antibiotik generasi baru tersebut. Semakin mahal antibiotik, semakin masyarakat tidak bisa menjangkau, semakin banyak carrier di masyarakat, semakin banyak galur baru bakteri yang bermutasi dan menjadi resisten terhadap antibiotika (Misbahul, 2016)

Terapi dengan antibiotik adalah sebuah pengobatan yang cukup kompleks, karena melibatkan tiga faktor penting yaitu mikrobanya sendiri sebagai agen patogen, manusia yang diserangnya sebagai hospes dan jenis antibiotik yang dipakai untuk membunuh agen patogen tersebut. Ketiga faktor itu saling berinteraksi sempurna dan menentukan kesembuhan suatu penyakit (Misbahul, 2016)

Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya bakteri resisten terhadap antibiotik. Faktor yang penting adalah faktor penggunaan antibiotik dan pengendalian infeksi. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik secara bijaksana merupakan hal yang sangat penting disamping penerapan pengendalian infeksi secara baik untuk mencegah berkembangnya bakteri-bakteri resisten tersebut ke masyarakat (Kemenkes RI, 2011).

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat resistensi adalah dengan memilih jenis antibiotik berdasarkan pada informasi tentang spektrum bakteri penyebab dari infeksi dan pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Salah satu cara untuk mengetahui spektrum bakteri dan pola resistensi bakteri terhadap antibiotik dengan cara melakukan pemeriksaan kultur dan uji resistensi bakteri (Lestari, 2012).

Pola penggunaan antibiotik di rumah sakit biasanya belum berdasarkan pada pola kuman dan sensitivitas dari antibiotik (Dwiprahasto, 1995), sehingga semakin banyaknya pemakaian antibiotik tanpa didukung hasil pemeriksaan kultur bakteri dan tes kepekaan bakteri terhadap antibiotik, pemakaian antibiotik yang tidak teratur, dan dosis yang kurang tepat akan memberikan derajat resistensi yang semakin meningkat terhadap berbagai antibiotik (Scheld, 2003). Hal ini menyebabkan berbagai masalah, diantaranya meluasnya resistensi, timbulnya kejadian superinfeksi yang sulit diobati, meningkatkan beban ekonomi pelayanan kesehatan, efek samping yang lebih toksik dan kematian (Johnston, 2012), sehingga penentuan diagnosis secara cepat dan tepat serta pemilihan antibiotik berdasarkan

uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik melalui pemeriksaan spesimen pus akan sangat membantu dalam penatalaksanaan terapi (Kumala *et al*, 2010).

Rumah Sakit Inco PT Vale Sorowako merupakan pusat rujukan dari berbagai daerah di Luwu Timur. Pemeriksaan kultur dan uji resistensi dari RS Inco hanya dilakukan di Unit Laboratorium medik. Berdasarkan data skunder dari Unit Laboratorium Kesehatan, spesimen terbanyak yang diperiksa adalah pus. Tersedianya pola bakteri dan resistensi serta sensitivitasnya pada spesimen pus dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemberian antibiotik secara empiris pada pasien yang menunjukkan gejala dan tanda infeksi yang memproduksi pus. Dari data yang telah dipaparkan di atas, peneliti mencoba untuk mempelajari pola bakteri dan resistensi serta sensitivitasnya terhadap antibiotik pada spesimen pus di RS Inco PT Vale Sorowako.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola sensitiv bakteri dari sampel pus terhadap antibiotik. Munculnya suatu penyakit dalam diri kita adalah suatu ujian dan peringatan dari Tuhan kepada hamba-Nya agar mereka mau mendekati diri kepada-Nya. Tuhan memberikan suatu ujian kepada hamba-Nya sebagai ciri bahwa Tuhan masih mengingatnya. Ujian yang berupa kesulitan hendaknya diambil hikmahnya karena dibalik kesulitan terdapat kemudahan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al- Anbia (94) : 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemahnya :

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Kemeterian Agama RI, 2012).

Pada ayat ke 5, kata *al'usr* berbentuk *definite* (memakai *alif* dan *lam*) demikian pula kata tersebut pada ayat ke 6. Ini berarti bahwa *kesulitan* yang dimaksud pada ayat ke 5 sama halnya dengan kesulitan yang disebutkan pada ayat 6, berbeda dengan kata *yusran* (*kemudahan*). Kata tersebut tidak dalam bentuk *definite* sehingga kemudahan yang disebut pada ayat 5 berbeda dengan kemudahan yang disebut pada ayat 6, hal ini menjadikan kedua ayat tersebut mengandung makna “setiap satu kesulitan akan dibarengi dengan kemudahan (Shihab, Vol. 15, 2002: 419).

Pemberian antibiotika harus diberikan secara tepat sesuai diagnosis penyebab penyakit infeksi. Untuk menentukan penyebab penyakitnya, maka secara ideal diperlukan diagnosa bakteriologi dan tes sensitivitas bakteri terhadap antibiotika (Tietjen, 2004 :11). Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian mengenai uji sensitivitas bakteri dari sample pus terhadap antibiotik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bakteri jenis apa yang terdapat di sampel PUS?
2. Bagaimana pola sensitivitas bakteri dari sampel pus terhadap antibiotik penicillin, cefuroxime dan meropenem di RS Inco PT Vale Sorowako?

C. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel berupa infeksi luka (pus) yang diambil di Rumah Sakit Inco PT Vale dengan menggunakan lidi kapas (swab). Selanjutnya di

uji pola sensitivitas bakterinya terhadap antibiotik penisilin, cefuroxime dan meropenem. Penelitian ini dilakukan di laboratorium medis RS Inco PT Vale Sorowako Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan pada bulan juli- September 2018

D. Kajian pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pediatri sari (2013), dengan judul pola sensitivitas bakteri dan penggunaan antibiotik penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan mengakibatkan terjadinya resistensi obat, meningkatkan morbiditas, mortalitas dan biaya pengobatan. Faktor utama menentukan tepatnya penggunaan antibiotik adalah pemilihan antibiotik yang tepat, berdasarkan bakteri penyebab dan sensitivitasnya terhadap antibiotik. Sampai saat ini penelitian penggunaan antibiotik. Tujuan mengetahui pola bakteri dan sensitivitasnya terhadap antibiotik pada pasien anak yang di rawat di RSPI SS. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif, retrospektif dari rekam medis pasien rawat inap anak non bedah, umur 1 bulan-15 tahun, dari hasil kultur tumbuh bakteri, preode tahun 2010 dan 2011. Pasien PICU dan pasien yang dalam perawatannya didiagnosis sebagai pasien bedah dikeluarkan dari penelitian. Hasil kultur dilakukan pada 286/1256 ((22,8%) sampel, tumbuh bakteri pada 96/286 (33,6%). Kelompok bayi 1 bulan – 1 tahun 14 (26,9%) paling banyak dilakukan kultur. Hasil kultur terbanyak *S.typi* sensitive 100%

terhadap *sefatoksim*, *seftriakson*, *kloramfenikol*, dan *kotrimoksazol*. Sensivitas *E coli* (16,7%), sensivitas *S typhi* 100% terhadap semua antibiotik yang digunakan (*kontrimoksazol*, *tiamfenikol*, *kloramfenikol*, *sefatoksim*, dan *seftriakson*). Pertama antibiotik untuk *S typhi* masih bisa dengan lini pertama antibiotik sejauh tidak ada kontra indikasinya dan pola sensivitas bakteri pada pasien anak di RS penyakit infeksi Sulianti Saroso belum pernah dilakukan. Sari Pediatri 2013;15(2):122-6.

2. Misbahul huda (2016), dengan judul Resistensi Bakteri Gram Negatif Terhadap Antibiotik Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung Tahun 2012-2014. Resistensi bakteri terhadap suatu antibiotik mempunyai arti klinis yang amat penting. Suatu bakteri yang awalnya peka terhadap antibiotik, setelah beberapa tahun kemudian dapat menjadi resisten, dan berakibat pada sulitnya proses pengobatan karena sulitnya memperoleh antibiotik yang dapat membunuh bakteri tersebut (Jawetz, 2005). Jenis Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pengumpulan data di laboratorium Mikrobiologi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan variabel penelitian bakteri Gram Negatif dan antibiotik. Populasi dan sampel adalah data hasil uji sensitivitas bakteri Gram Negatif terhadap antibiotik yang terdapat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Analisa data univariat yaitu untuk memperoleh persentase resistensi dan sensitivitas bakteri Gram Negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung tahun 2012 sampai dengan 2014,

yang dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Setelah dilakukan penelitian resistensi bakteri Gram Negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2012-2014, maka didapatkan hasil bahwa bakteri Gram Negatif yang resisten terhadap antibiotik adalah bakteri *Enterobacter*, *Klebsiella sp*, *Pseudomonas sp*, *Escherichia coli*, *Proteus sp*, *Alcomonas aligenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella*, dan *Aeromonas sp*. Ada beberapa antibiotik yang merupakan antibiotik yang cenderung tinggi yaitu : Ampicilin, Trimetrofin, Amoxiciline, Cefradoxil, Erytromycine, Amocyclave, Ofloxacin, Cefadroxil, Sulphamethoxazole, Zeprozoine, Tetracycline, Cefuroxime, Sulfonamides, Ceftriaxone, Cefuroxime, Ciprofloxacin, Co-trimoxazol, Norflaxacin, Zoltrimetropin dan Netilmicin.

3. Rostina dkk, (2006) dengan judul pola kuman berdasarkan specimen dan sensitivitas terhadap antimikroba. Tingginya prevalensi penyakit menular di Indonesia menyebabkan penggunaan pengobatan anti mikroba yang tidak terkendali dengan kurang perhatian resistansi obat, ditandai dengan lebih sedikit permintaan untuk pengujian sensitivitas. Ini mengarah pada pengobatan anti mikroba irasional dan meningkatkan obat perlawanan. Dengan kondisi yang tidak didukung untuk menggunakan tes sensitivitas sebelum pengobatan anti mikroba, panduan umum untuk memilih agen anti mikroba untuk infeksi sistem organ tertentu diperlukan suatu studi deskriptif

dari data uji sensitivitas yang dikumpulkan secara retrospektif hasil dilakukan pada 841 spesimen dari sumber organ yang terinfeksi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo selama 2005–2006 periode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola mikroba infeksi organ spesifik (diwakili oleh mikroba dari spesimen), pola sensitivitas antimikroba dari mikroorganismenya, dan apakah ada pergeseran pola dalam periode 1 tahun. Pergeseran pola mikroba selama periode 2005-2006 ditemukan. *Klebsiella aeruginosa*, *Enterobacter agglomerans*, *Alkaligenes faecalis* dan *Escherichia coli* adalah mikroorganismenya yang paling sering ditemukan dari spesimen yang diperiksa. Sebagian besar obat antimikroba umumnya digunakan ditemukan efektif untuk sebagian besar mikroorganismenya, sementara amikacin, cefepime, gentamisin, sulbaktam, tobramycin, vankomisin dan meropenem masih cukup sensitivitas untuk sebagian besar agen infeksi.

E. Tujuan penelitian

1. Untuk memperoleh data ilmiah tentang pola sensitive bakteri terhadap jenis antibiotik penicillin, cefuroxime dan meropenem yang paling sensitive terhadap bakteri dari sample pus di Rs Inco PT Vale Sorowako.

F. Manfaat penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Sumber data ilmiah atau rujukan untuk penelitian lanjutan dan peneliti lainnya atau mahasiswa tentang pengujian pola sensitivitas antibiotika penicillin, cefuroxime dan meropenem terhadap bakteri dari sample pus



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ayat yang relevan

Berbagai macam penyakit merupakan bagian dari cobaan Allah swt. yang diberikan kepada hamba-Nya. Sesungguhnya, cobaan-cobaan itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah-Nya. Perlu diketahui bahwa Allah swt tidak menetapkan sesuatu, baik terhadap takdir kauni (takdir yang pasti berlaku di alam semesta ini) atau syar'i, melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang amat besar, sehingga tidak mungkin dinalar oleh akal manusia. Berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit dan kesulitan, semua itu mempunyai hikmah tertentu sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Mulk (67) :
1-2

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

1. Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Menurut tafsir al Misbah menyatakan bahwa : *maha melimpah kebijakan* lagi Maha mantap dan langgeng wujud Allah *Dia yang di tangan-Nya sendiri segala kerajaan*, kekuasaan dan pengendalian segala urusan, dan Dia sendiri tidak

ada selain-Nya yang *atas segala sesuatu* tanpa kecuali *Maha Kuasa*. Salah satu bukti kekuasaan-Nya adalah *Dia Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu*, yakni memperlakukan kamu perlakuan penguji untuk mengetahui di alam nyata setelah sebelumnya Dia telah mengetahui di alam gaib, *siapa di antara kamu yang lebih baikn amalnya* dan siapa juga yang lebih buruk amalnya. *Dan Dia Maha Perkasa* tidak satu pun yang dapat membendung kehendak-Nya lagi *Maha Pengampun* terhadap siapa pun yang memohon ampun kepada-Nya (Shihab, Vol. 14, 2002: 195).

Ujian bertujuan untuk menyelidiki kebenaran atau mencari yang lebih baik atau yang terbaik. Seperti halnya dengan uji sensitivitas antibiotika, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui antibiotika manakah yang paling sensitivitas atau antibiotik manakah yang paling terbaik untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri . ujian menyangkut hidup dan mati dipahami oleh sementara ulama dalam arti musibah kematian yang menimpa keluarga atau teman seseorang, demikian itu anugerah kehidupan serta kelahiran merupakan bahan ujian Allah SWT kepada manusia, apakah dia tabah dan sabar serta bersyukur dan berterima kasih. Ada juga yang memahaminya dalam arti :”Allah menciptaka kepada Allah. Ibn ‘Asyur memahami ayat diatas dalam arti: Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar kamu hidup lalu menguji kamu siapakah yang terbaik amalnya lalu kamu mati maka kamu diberi balasan sesuai dengan hasil ujian tersebut kematian untuk membangkitkan dan memberi kamu balasan dan menciptakan kehidupan untuk menguji kamu.” Atau Allah menciptakan kematian

dan kehidupan untuk menguji kamu siapa lebih mempersiapkan diri menghadapi kematian dan siapa yang lebih bergegas memenuhi ketaatan . Ulama ini menambahkan: “Karena tujuan yang terpenting dari penggalan ayat ini adalah pembalasan tersebut”, ayat diatas mendahulukan kata al-maut/mati. Pendapat serupa dikemukakan oleh Thabathaba’i. Sedangkan, Sayyid Quthub mengomentari ayat di atas dengan menyatakan bahwa: kematian dan kehidupan adalah ciptaan Allah. Ayat ini bertujuan membentuk hakikat tersebut dalam benak manusia dan mendorong untuk selalu sadar akan tujuan di balik penciptaan ini, yaitu kematian dan kehidupan bukanlah kebetulan atau tanpa pengaturan, tetapi ada tujuannya, yakni ujian untuk menampakkan apa yang tersembunyi dari ilmu Allah menyangkut tingkah laku manusia di pentas bumi ini serta mereka wajar memperoleh balasan. Kemantapan hakikat ini dalam bentuk manusia akan menjadikannya selalu waspada memperhatikan dengan penuh kesadaran yang kecil dan yang besar, baik dalam niat yang terpendam dalam hati maupun dalam pengalaman yang tampak di alam nyata. Ini menjadikan manusia tidak lengah atau lalai dan tidak juga menjadikan ia merasa tenang sehingga beristirahat tidak melakukan upaya(Shihab, Vol. 14, 2002: 197).

B. Tinjauan hadits tentang antibiotik

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda; Allah swt. tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya.

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt. yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan dosis serta penyakit yang diderita sehingga akan mendorong kesembuhannya. Akan tetapi, di dalam melakukan pengobatan hendaknya kita tidak berlebih-lebihan dan boros karena mengakibatkan dampak yang buruk bagi tubuh itu sendiri.

C. Tinjauan umum tentang pola sensitivitas bakteri

Uji sensitivitas bakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri serta mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Sedangkan, metode uji sensitivitas bakteri adalah metode cara bagaimana mengetahui dan mendapatkan produk alam yang berpotensi sebagai bahan anti bakteri serta mempunyai kemampuan untuk menghambat

pertumbuhan atau mematikan bakteri pada konsentrasi yang rendah. Atau dengan kata lain metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Seorang ilmuwan daro prancis menyatakan bahwa metode difusi agar dari prosedur Kirby-beur, sering digunkana untuk megetahui sensitivitas bakteri. Prinsip dari metode ini adalah penghambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambat akan terlihat sebagai daerah jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung zat antibakteri. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya, dikatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambat yang terbentuk menandakan bahwa bakteri tersebut semakin sensitivitas. (Waluyo, 2008).

Sensitivitas adalah suatu keadaan dimana mikroba sangat peka terhadap antibiotik atau dalam artian kepekaan terhadap antibiotik masi baik untuk memberikan daya hambat mikroba. Penurunan aktivitas antimikroba akan menunjukkan beberapa perubahan kecil yang tidak dapat di dilakukan dengan metode kimia, akan tetapi dengan menggunakan metode pengujian secara mikrobiologi yang biasanya merupakan standar untuk mengatasi tentang kemungkinan akan hilangnya aktivitas dari mikroba tersebut. (Djide, 2008).

Intermediet merupakan keadaan dimana terjadi pergeseran antara sensitivitas dengan resisten akan tetapi tidak resisten sepenuhnya. Sedangkan resisten adalah suatu keadaan dimana mikroba sudah tidak peka lagi terhadap berbagai jenis antibiotik (Djide, 2008).

Resisten merupakan ketahanan suatu mikroorganisme terhadap suatu antimikroba atau antibiotik, dimana resisten dapat berupa resisten alamiah, resisten karena adanya mutase secara spontan (resisten kromonal) serta resisten karena terjadinya pemindahan gen yang telah mengalami resisten (resistensi ekstrasosomal) dapat juga dikatakan bahwa suatu mikroorganisme dapat mengalami resisten terhadap obat-obat antimikroba, disebabkan karena mekanisme genetic atau non-genetik (Djide, 2008).

Adapun penyebab terjadinya resistensi terhadap mikroorganisme yaitu penggunaan antibiotik yang tidak sesuai, misalnya penggunaan dengan dosis yang tidak sesuai, pemakaian yang tidak teratur, serta waktu pengobatan yang tidak cukup lama, sehingga untuk mengurangi tingkat resistensi maka cara pemakaian antibiotik perlu diperhatikan. (Djide, 2008).

Zona Hambat merupakan tempat dimana bakteri terhambat pertumbuhannya akibat antibakteri atau antimikroba. Zona hambat adalah daerah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar oleh antibiotik. Contohnya: *Tetracycline*, *Erytromycin*, dan *Streptomycin*. *Tetracycline* merupakan antibiotik yang memiliki spektrum yang luas sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara luas (Djide, 2008).

Secara umum tingkat kepekaan bakteri gram positif lebih tinggi dari bakteri gram negative. Perbedaan tingkat kepekaan kedua jenis bakteri tersebut yaitu terletak pada dinding sel yang dimiliki, dimana bakteri gram negative memiliki struktur dinding sel relative lebih kompleks, sedangkan bakteri gram positif

mempunyai struktur dinding sel yang lebih sederhana sehingga senyawa uji yang bersifat aktif sebagai antibakteri lebih mudah masuk kedalam sel. (Pelctzar and Chan, 1988).

Manusia adalah hos alami bagi banyak spesies bakteri yang mendiami pada suatu permukaan di kulit sebagai flora normal. Rintangan utama terhadap invasi mikroba adalah kulit yang dapat juga disebut flora normal yang pathogen maupun non pathogen. Mikroba tersebut terus menerus berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan mendiami di suatu tempat tertentu adalah bakteri. Organisme yang khas yang mendiami pada permukaan kulit biasanya spesies bakteri gram positif seperti *staphylococcus epidermidis*, *staphylococcus pyogenes* (Djuanda, 2007).

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya resistensi bakteri yaitu faktor primer adalah penggunaan antibiotik, munculnya strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik, dan penyebaran strain tersebut ke bakteri lain. Selain itu, faktor pejamu, seperti lokasi infeksi, kemampuan antibiotik mencapai organ target infeksi sesuai dengan konsentrasi terapi, flora normal pasien, dan ekologi lingkungan merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Penggunaan antibiotik secara berlebihan, memiliki andil besar dalam menyebabkan peningkatan resistensi terhadap antibiotik, terutama di rumah sakit. Peresepan antibiotik yang kurang perlu dan banyak terjadi di negara industry juga ditemukan pada banyak negara berkembang. Faktor yang juga berpengaruh adalah penyalahgunaan antibiotik oleh praktisi kesehatan yang tidak ahli, karena kurangnya perhatian pada efek merusak dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat (Yulika, 2009).

Penyebab utama resistensi antibiotika adalah penggunaannya yang meluas dan irasional. Lebih dari separuh pasien dalam perawatan rumah sakit menerima antibiotik sebagai pengobatan ataupun profilaksis. Sekitar 80% konsumsi antibiotik dipakai untuk kepentingan manusia dan sedikitnya 40% berdasar indikasi yang kurang tepat, misalnya infeksi virus. Terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya resistensi, antara lain :

1. Penggunaan yang tidak tepat (*irrational*) terlalu singkat, dosis yang terlalu rendah, diagnose awal yang salah, dalam potensi yang tidak kuat.
2. Faktor yang berhubungan dengan pasien. Pasien yang memiliki pengetahuan yang kurang akan menganggap wajib diberikan antibiotik untuk menangani penyakit meskipun disebabkan oleh virus, misalnya flu, batuk-pilek, demam yang banyak dijumpai dikalangan masyarakat. Pasien dengan kemampuan finansial yang baik akan meminta diberikan terapi antibiotik yang paling baru dan mahal meskipun tidak diperlukan, bahkan pasien membeli antibiotika sendiri tanpa peresepan dari dokter (*self medication*), sedangkan pasien dengan kemampuan finansial yang rendah seringkali tidak mampu untuk menuntaskan regimen terapi.
3. Peresepan dalam jumlah besar, meningkatkan *unnecessary health care expenditure* dan seleksi resistensi terhadap obatobatan baru. Peresepan meningkat ketika diagnosis awal belum pasti. Klinisi sering kesulitan dalam menentukan antibiotik yang tepat karena kurangnya pelatihan dalam hal penyakit infeksi dan tatalaksana antibiotiknya.

4. Penggunaan monoterapi dibandingkan dengan penggunaan terapi kombinasi, penggunaan monoterapi lebih mudah menimbulkan resistensi.
5. Perilaku hidup sehat terutama bagi tenaga kesehatan, misalnya mencuci tangan setelah memeriksa pasien atau desinfeksi alat-alat yang akan dipakai untuk memeriksa pasien.
6. Penggunaan di rumah sakit adanya infeksi endemik atau epidemik memicu penggunaan antibiotika yang lebih massif pada bangsal-bangsal rawat inap terutama di *intensive care unit*. Kombinasi antara pemakaian antibiotik yang lebih intensif dan lebih lama dengan adanya pasien yang sangat peka terhadap infeksi, memudahkan terjadinya infeksi nosokomial.
7. Penggunaan untuk hewan dan binatang ternak, antibiotik juga dipakai untuk mencegah dan mengobati penyakit infeksi pada hewan ternak. Dalam jumlah besar antibiotik digunakan sebagai suplemen rutin untuk profilaksis atau merangsang pertumbuhan hewan ternak. Bila dipakai dengan dosis subterapeutik, akan meningkatkan terjadinya resistensi.
8. Promosi komersial dan penjualan besar-besaran oleh perusahaan farmasi serta didukung pengaruh globalisasi, memudahkan terjadinya pertukaran barang sehingga jumlah antibiotik yang beredar semakin meluas. Memudahkan akses masyarakat luas terhadap antibiotik.
9. Kurangnya penelitian yang dilakukan para ahli untuk menemukan antibiotik baru.
10. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam distribusi dan pemakaian antibiotik, seperti pasien dapat dengan mudah mendapatkan

antibiotika meskipun tanpa peresepan dari dokter, selain itu juga kurangnya komitmen dari instansi terkait baik untuk meningkatkan mutu obat maupun mengendalikan penyebaran infeksi (Kemenkes RI, 2011).

D. Tinjauan umum tentang antibiotik

Penemuan antibiotik diinisiasi oleh Paul Ehrlich yang perma kali menemukan apa yang disebut “*magic bullet*”, yang dirancang untuk menangani infeksi mikroba. Pada tahun 1910, Ehrlich menemukan antibiotik pertama, Salvarsan, yang digunakan untuk melawan syphilis. Erlich kemudian diikuti oleh Alexander Fleming yang secara tidak sengaja menemukan penicillin pada tahun 1928. Tujuh tahun kemudian, Gerhard Domagk menemukan sulfa, yang membuka jalan penemuan obat anti TB, isoniazid. Pada 1943, anti TB pertama, streptomycin, ditemukan oleh Selkman Waksman dan Albert Schatz. Waksman pula orang pertama yang memperkenalkan terminologi antibiotik. Sejak saat itu antibiotik ramai digunakan klinisi untuk menangani berbagai macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Zhang, 2007).

Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Sedang antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme (khususnya dihasilkan oleh fungi) atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain. Secara garis besar antimikroba dibagi menjadi dua jenis yaitu

antimikroba yang dapat membunuh kuman (bakteriasida) dan dapat menghambat pertumbuhan kuman (bakteriostatik). Antibiotik yang termasuk dalam golongan bakteriasida antara lain *penisilin*, *sefalosporin*, *aminoglikosida* (dosis besar), *kotrimoksazol*, *rifampisin*, *isoniazid* dan lain-lain. Sedangkan jenis antibiotik yang memiliki sifat bakteriostatik, dimana penggunaannya tergantung status imunologi pasien, antara lain *sulfonamida*, *tetrasiklin*, *kloramfenikol*, *eritromisin*, *trimetropim*, *linkomisin*, *klindamisin*, *asam paraaminosalisilat*, dan lain-lain

Berdasarkan sifat toksisitas selektif ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba (bakteriostatik), dan ada yang bersifat membunuh mikroba (bakterisid). Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba disebut dengan kadar hambat minimal (KHM) sedangkan kadar minimal untuk membunuh mikroba disebut dengan kadar bunuh minimal (KBM) (Setiabudy,2012).

Pemusnahan mikroba dengan antibiotik yang bersifat bakteriostatik masih tergantung dari kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peran lamanya kontak antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat mendukung untuk mendapatkan efek (Setiabudy,2012).

Antibiotik yang termasuk bakteriostatik adalah Sulfonamid, Tetrasiklin, Kloramfenikol, dan lain-lain. Sedangkan antibiotik yang termasuk golongan bakterisid adalah Penisillin, Cefalosporin, Fusidin, Asam nalidiksat, Aminoglikosida dan lain-lain (Gupte, 1990).

Terdapat pembagian lain dalam klasifikasi antibiotika, yaitu berdasarkan cara kerja maupun spektrum kerjanya. Penggunaan pembagian ini secara klinis masih kurang bermanfaat. Dalam prakteknya, klasifikasi yang paling sering dipakai klinisi adalah berdasarkan susunan senyawa kimia. Lebih sering dipakai karena sifatnya yang praktis, nama obat yang dipakai langsung terkait dengan golongan senyawa kimia masing-masing. Antibiotika yang dibagi berdasarkan senyawa kimianya antara lain golongan *penicillin*, *cephalosporin*, *amfenikol*, *aminoglikosida*, *tetrasiklin*, *makrolida*, *linkosamid*, *polipeptida*, dan *antimikobakterium*

Ada beberapa cara kerja antibiotik terhadap bakteri sebagai targetnya, yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat sintesis protein, merusak membran plasma, menghambat sintesis asam nukleat, dan menghambat sintesis metabolit esensial. Dinding sel bakteri terdiri atas jaringan makromolekuler yang disebut peptidoglikan. Penisilin dan beberapa antibiotik lainnya mencegah sintesis peptidoglikan yang utuh sehingga dinding sel akan melemah dan akibatnya sel bakteri akan mengalami lisis. Ribosom merupakan mesin untuk menyintesis protein. Sel eukariot memiliki ribosom 80S, sedangkan sel prokariot 70S (terdiri atas unit 50S dan 30S). Perbedaan dalam struktur ribosom akan mempengaruhi toksisitas selektif antibiotik yang akan mempengaruhi sintesis protein.

Antibiotika dapat ditemukan dalam berbagai sediaan, dan penggunaannya dapat melalui jalur topikal, oral, maupun intravena. Banyaknya jenis pembagian, klasifikasi, pola kepekaan kuman, dan penemuan antibiotika baru seringkali

menyulitkan klinisi dalam menentukan pilihan antibiotika yang tepat untuk menangani suatu kasus penyakit yang sesuai sehingga hal ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya resistensi pada antibiotik.

Syarat- syarat antibiotik yang ideal adalah sebagai berikut (Jawetz, 2005):

1. mempunyai kemampuan mematikan dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas (broad spectrum antibiotik)
2. tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme patogen
3. tidak menimbulkan efek samping yang buruk pada host, seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung,
4. tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus dan flora kulit usus atau flora kulit.

Penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya dapat dibagi dalam beberapa golongan (Djide. N, 2008: 347):

1. Antibiotika dengan spektrum luas, efektif baik terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Contoh, turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan mikrolida, rifampisin, beberapa turunan ampisilin (ampisilin, amoksisilin, bakampisn, karbenisilin, hetasilin dan lainnya).

2. Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri Gram positif. Contoh basitrasin, eritromisin, sebagian besar turunan penisilin, seperti benzyl penisilin kloksasilin dan lainnya.

3. Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri Gram negatif. Contoh kolistin, polimiksin B sulfat dan sulfomisin.

4. Antibiotika yang aktivitasnya dominan pada *mycobacteriae*. Contoh streptomisin, kanamisin, sikloserin, fimisindan lainnya.

5. Antibiotika yang aktif terhadap jamur. Contoh griseofulvin, dan antibiotika polien (nistatin, ampoterisin B).

6. Antibiotika yang aktif terhadap neoplasma (antikanker). Contohnya aktinomisin, bleomisin, mitomisin, midramisin, dan lainnya.

Berdasarkan atas struktur kimianya antibiotika dibagi menjadi 10 kelompok yaitu (Djide. N, 2008: 348):

1. Antibiotika β -laktam
2. Turunan amfenikol
3. Turunan tetrasiklin
4. Amnioglikosida
5. Antibiotika makrolida
6. Antibiotika polipeptida
7. Antibiotika linkosamida
8. Antibiotika polien
9. Antibiotika ansamisin
10. Antibiotika antrasiklin

Berdasarkan mekanisme kerjanya antibiotika dibagi dalam beberapa kelompok (Ganiswarna, 1995: 586):

1. Menghambat biosintesis dinding sel : Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin, dan sikloserin.

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer mukopetiptida (glikopeptida). Oleh karena itu, tekanan osmotik dalam sel kuman lebih tinggi daripada di luar sel kuman, akan menyebabkan terjadinya lisis yang merupakan efek dari bakterisida pada kuman yang peka. Contohnya : Ampicilin, Amoxicilin dan Cefadroxil.

2. Menghambat metabolisme sel : Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok sulfonamide, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik. Contohnya : Sulfametaxazol dan Cotrimoxazol.

3. Mengganggu membran sel : obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah polimiksin, golongan polien serta berbagai antimikroba kemoterapeutik, misalnya antiseptic surface active agents. Contohnya : Polimiksin B.

4. Menghambat sintesis protein : Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan aminoglikosida, makrolida, linkomisin, tetrasiklin, kloramfenikol. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan m-RNA dan t-RNA. Pada bakteri, ribosom terdiri dari dua sub unit, yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S. Contoh : Tetrasiklin, Kloramfenikol, Tiamfenikol dan Streptomisin.

5. Menghambat sintesis asam nukleat : Antimikroba yang termasuk golongan ini adalah rifampisin, dan golongan kuinolon. Contohnya : Rifampicin, Siprofloksasin dan Ofloksasin.

Penisilin merupakan derivat β -laktam tertua yang memiliki aksi bakterisidal dengan mekanisme kerja menghambat sintesis dinding sel bakteri. Masalah resistensi akibat penicilinase mendorong lahirnya terobosan dengan ditemukannya derivat penicilin seperti methicilin, fenoksimetilpenicilin yang dapat diberikan oral, karboksi penicilin yang memiliki aksi terhadap *Pseudomonas sp.* Namun hanya fenoksimetil penicilin yang dijumpai di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Penisilin V (Depkes RI, 2005: 34).

Penisilin pertama kali diterapkan untuk aplikasi klinik tahun 1942. Beberapa kelebihan penisilin yaitu mempunyai spektrum yang luas, aktif terhadap bakteri gram positif dan mempunyai toksisitas yang rendah sehingga penggunaan penisilin G dengan dosis tinggi tidak menyebabkan alergi (Crueger & Crueger 1984). Keberadaan gen yang berperan pada proses biosintesis penisilin dipercaya sangat penting untuk organisme penghasil sehingga dapat bersaing dengan organisme lainnya, namun molekul ini kemungkinan juga berperan dalam proses signaling (Weber *et al.* 2012).

Salah satu jamur yang dikenal luas dapat menghasilkan penisilin adalah *Penicillium chrysogenum* (Houbraken *et al.* 2012; Kardos & Demain, 2011). Produksi penisilin dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya oksigen terlarut, karbondioksida terlarut, glukosa, serta variasi fraksi volume fase abiotik dan biotik.

Sefalosporin adalah antibakterial semi sintesis yang berasal dari antibakterial alami yaitu *cephalosporium acremonium*. Golongan ini bersifat bakterisida dan menghambat sintesis dinding sel, sama seperti penicillin.

Sefalosporin terbagi atas empat generasi. Generasi pertama adalah *cefalotin*, generasi kedua yaitu *cefuroxime*, generasi ketiga *cefotaxime*, *cefixime*, *ceftazidime*, *cefaperazone* dan *cefpiramide* dan generasi keempat yaitu *cefepime*, *ceftirome*, *ceftobiprole* (Sweetman, 2009).

Golongan karbapenem merupakan antibiotik dengan lini ketiga yang mempunyai aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada sebagian besar beta laktam. Beberapa jenis golongan karbapenem adalah imipenem, meropenem, dan doripenem yang dapat menghambat sebagian besar bakteri gram positif, negative, dan anaerob dimana ketiga jenis bakteri sangat tahan terhadap betalaktam. Adapun efek samping yang sering dijumpai adalah mual dan muntah, dan kejang apabila diberikan dengan dosis yang tinggi pada pasien dengan lesi SSP atau insufisiensi ginjal. Adapun meropenem dan doripenem mempunyai efikasi serupa imipenem, tetapi lebih jarang menyebabkan kejang.

Mekanisme kerja sistem imun yaitu mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain (seperti fagosit) untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi

akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplemen. Komplemen adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus atau sel-sel yang terinfeksi. Bersama, semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas.

Sefalosporin dan analog 7-metoksinya, semafisin seperti *cefoxitin* (se FOX i tin), *cefotetan* (se foe TEE tan), dan *cefmetazole* (sef MET a zol) adalah antibiotik beta-laktam yang berkaitan erat dengan penicillin secara struktur dan fungsional. Kebanyakan sefalosporin dihasilkan secara semisintetik dengan peningkatan kimia pada rantai samping 7-aminosefalosporanat. Sefalosporin dan semafisin mempunyai mekanisme resistensi yang sama, tetapi obat-obat tersebut cenderung menjadi lebih resistensi dibandingkan penicillin terhadap beta-laktam (Mycek *et al*, 2001).

Tabel 2. Klasifikasi dan Aktivitas Sefalosporin

Generasi	Contoh	Aktivitas
I	Sefaleksin Sefalotin Sefazolin Sefradin Sefadroksil	Antibiotik yang efektif terhadap Gram positif dan memiliki aktivitas sedang terhadap Gram negatif
II	Sefaklor Sefamandol Sefuroksim Sefoksitin Sefotetan Sefmetazol Sefprozil	Aktivitas antibiotik Gram negatif yang lebih aktif daripada generasi I
III	Sefotaksim Seftriakson Seftazidim Sefiksिम Sefoperazon Sefrizoksim Sefpodoksim Moksalaktam	Aktivitas kurang aktif terhadap kokus Gram positif dibandingkan generasi I, tapi lebih aktif terhadap <i>Enterobacteriaceae</i> , termasuk strain yang memproduksi beta laktamase. Seftazidim dan sefoperazon juga aktif terhadap <i>P. Aeruginosa</i> , tapi kurang aktif dibandingkan generasi III lainnya terhadap kokus Gram positif
IV	Sefepim Sefpirom	Aktivitas lebih luas dibandingkan generasi II dan tahan terhadap beta-laktamase

Sumber : Kemenkes (2011)

Obat yang termasuk karbapenem adalah meropenem. Antibiotik ini diindikasikan pada pasien dengan infeksi berat oleh kuman gram negatif yang resisten terhadap antibiotik turunan penisilin dan sefalosporin generasi ketiga serta resisten terhadap bakteri yang memproduksi *extended spectrum beta lactamase* (ESBL). Antibiotik ini dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan riwayat kejang. Dosis yang diberikan untuk infeksi standar adalah IV 20 mg/kgBB/dosis, sedangkan untuk infeksi berat adalah IV 40 mg/kgBB/dosis pada meningitis yang disebabkan *Pseudomonas sp* (IDAI, 2012).

Prinsip dari metode difusi adalah kemampuan suatu agen antibakteri berdifusi ke dalam media agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji. Beberapa metode difusi yang sering digunakan untuk uji aktivitas adalah tes Kirby Beur (diss diffusion) (Pratiwi, 2008).

Zona jernih pada lapisan agar yang terbentuk diakibatkan karena senyawa antimikroba berdifusi ke dalam lapisan agar dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (bakteri) sehingga disebut sebagai zona hambat sedangkan lapisan agar yang ditumbuhi mikroorganisme akan tampak keruh. Senyawa antimikroba bekerja dengan cara berinteraksi dengan dinding sel bakteri sehingga mengakibatkan gangguan permeabilitas pada dinding sel bakteri dan memudahkan senyawa antimikroba untuk bisa berdifusi ke dalam sel bakteri. Difusi yang terjadi akan mengakibatkan gangguan pada serangkaian proses pertumbuhan dari bakteri sehingga menghambat pertumbuhannya (bakteriostatik) ataupun memberikan efek lain yaitu dengan membunuh bakteri (bakteriosidal). Selain itu, senyawa antimikroba juga dapat menembus membran sel dan berinteraksi dengan material genetik dari bakteri sehingga bakteri dapat mengalami mutasi (IDAI, 2012).

E. Tinjauan umum tentang PUS

Nanah (PUS) adalah massa setengah cairan yang kental, berwarna putih kekuningan atau putih kehijauan dan berbau tidak sedap. Nanah terdapat pada bisul, kudis, luka yang terinfeksi bakteri, dan sebagainya. Nanah keluar bersama-sama sel darah merah (eritrosit) yang mati dan membusuk dari luka yang terinfeksi bakteri atau kuman. Proses terbentuknya nanah yaitu pada saat tubuh terjangkiti oleh organisme penyakit seperti bakteri, maka pertahanan tubuh yaitu neutrofil atau sel darah putih berpindah dalam jumlah yang besar dengan cara mengalir melewati pembuluh darah menuju daerah yang terjangkiti bakteri tersebut. Sehingga pembuluh darah di sekitar daerah yang terjangkiti mulai membesar. Neutrofil menerobos melalui dinding pembuluh darah yang membesar itu kemudian menyerang bakteri dan menelannya. Neutrofil juga bertugas menyerap pecahan-pecahan sel tubuh yang telah mati akibat serangan bakteri. Banyak dari neutrofil mati karena racun kuman. Sebelum mati, neutrofil mengeluarkan enzim pencerna, yang berperan menghancurkan sel yang mati di sekitarnya. Sebagai akibat aktivitas ini, daerah yang terjangkit menjadi bengkak penuh dengan darah, cairan jaringan, sel yang telah mati, bakteri yang hidup dan yang mati, serta neutrofil dan juga bermacam-macam jenis pecahan sel. Semua unsur ini membentuk massa setengah cairan yang kental dan disebut nanah (Djide, 2010).

Nanah muncul sebagai reaksi alami tubuh ketika melawan infeksi, atau respons peradangan pada tubuh terhadap infeksi bakteri dan kadang juga terhadap jamur. Infeksi akan menimbulkan nanah ketika bakteri masuk ke dalam tubuh

melalui kulit yang terluka, terhirup saat batuk atau bersin, dan akibat kebiasaan yang tidak higienis. Ketika terjadi infeksi di bagian tubuh tertentu, sel darah putih yang disebut neutrofil akan berkumpul pada bagian tubuh tersebut dan berperang melawan bakteri penyebab infeksi. Selama proses tersebut, banyak sel darah putih dan jaringan tubuh lain di sekitarnya yang mati. Nah, akumulasi sel darah putih dan jaringan tubuh yang mati inilah yang kemudian disebut nanah. Banyak jenis infeksi yang dapat menyebabkan munculnya nanah. Penyebab yang paling umum adalah infeksi oleh bakteri *Staphylococcus aureus* atau *Streptococcus pyogenes* (Djide, 2010).

Mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain (seperti fagosit) untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya (Jawetz, 2007).

Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplemen. Komplemen adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus atau sel-sel yang terinfeksi. Bersama, semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas (Jawetz, 2007).

F. Tinjauan umum tentang PT Vale Sorowako

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km². Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau, Mangkutana. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama menjadi PT Vale. Pada tahun 2008, pendapatan asli daerahnya berjumlah Rp. 38,190 m. pendapatan per kapita masyarakat Luwu Timur pada tahun 2005 adalah Rp. 24,274 juta.

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak di sebelah selatan khatulistiwa. Tepatnya di antara 2°03'00"-3°03'25" lintang Selatan dan 119°28'56"-121°47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,994.88 km² sekitar 11,14% provinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Di kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Sorowako mempunyai luas wilayah daratan 808,27 km, dimana luas wilayah perairan sebesar 56.100 ha yang merupakan kawasan pembangkit tenaga listrik. Kondisi topografi wilayah pusat sorowako pada umumnya daerah pegunungan dan berbukit. Di daerah sorowako terdapat 3 danau diantaranya danau Matano, danau Mahalona, dan danau Towuti ketiga danau tersebut dihubungkan oleh sungai Larona dan bermuara di Malili ibukota Kabupaten Luwu Timur. Sorowako termasuk dalam kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah ini berada pada ketinggian ± 1388 kaki dari permukaan laut.


Pada tahun 1901 bijih nikel mula-mula ditemukan oleh seseorang Belanda bernama Kruyt di pegunungan Verbeek, Sulawesi kemudian berlanjut pada tahun 1937 oleh ahli geologi limited. Flat Elves melakukan studi endapan nikel di Sorowako, pada tahun 1968 kontrak karya ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan PT International Nickel Indonesia Tbk (PTI). Selanjutnya pada tahun 1977 fasilitas penambangan dan pengolahan nikel di Sorowako berhasil diresmikan, lalu pada tahun 1978 produksi nikel komersial pertama PTI. Pada tahun 1996 perpanjangan kontrak karya hingga 2025, kemudian pada tahun 2006 Inco pemilik saham PTI 60% diakuisasi oleh Vale dan pada tahun 2012 PTI resmi mejadi PT Vale.

PT Vale Tbk adalah perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia dan berinduk pada Vale. Produk utama perusahaan ini berupa nikel dalam matte dengan kandungan rata-rata 78% nikel, 1% kobal, dan 20% sulfur dan logam lainnya. PT Vale Indonesia Tbk merupakan pemimpin global dalam produk besi dan penghasil nikel kedua terbesar dunia. Vale juga memproduksi tembaga, batubara, mangan, pupuk, kobal dan logam dari kelompok platinum selain itu vale juga bergerak dalam bidang logistic, baja dan sector energy. Vale bermarkas di rio de jeneiro dan memiliki area operasional, perkantoran, proyek eksplorasi dan perusahaan patungan yang tersebar di 38 negara, lima benua.



Gambar 2.1 : Peta administrasi kabupaten luwu timur

G. Kerangka fikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan

Penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan eksperimental yang merupakan penelitian yang diperoleh dari data sekunder yang didapatkan dari catatan rekam medis bagian mikrobiologi.

B. Waktu dan lokasi penelitian

Adapun waktu dan lokasi dilakukan penelitian yaitu 23 July-28 September 2018 yang berlokasi di Laboratorium Medis RS Inco PT.Vale suorowako.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh sampel yang ada di laboratorium medis Rs Inco Sorowako merupakan populasi sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sampel pus (infeksi luka).

D. Variabel penelitian

Adapun variabel penelitian yaitu pola sensitiv bakteri sebagai variabel terikat dan antibiotik merupakan variabel bebas

E. Pengertian variabel penelitian

Pemeriksaan uji sensitivitas dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan antibiotik yang sesuai dengan penyakit infeksi tersebut.

Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme (khususnya dihasilkan oleh fungi) atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain.

F. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode Eksperimen di laboratorium.

G. Instrument penelitian

1. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, lampu Bunsen, inkubator, jarum ose, kapas, pinset, *Laminar Air Flow* , autoklaf , alat tulis menulis dan alat fotografi.

2. Bahan

Medium Muller Hinton Agar (MHA), *Paper disk* penicillin, *Paper disk* cefuroxime, *Paper disk* meropenem, NaCl dan Spesimen pus.

H. Prosedur kerja

1. Sterilisasi alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan terlebih dahulu.

Alat-alat gelas dan media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama

15 menit. Sedangkan jarum öse dan pinset dan *L-Glass* dipijarkan dengan pembakaran diatas api langsung (Lay dan Hastowo, 1992).

2. Teknik Penentuan Antibiotika

Antibiotika yang digunakan adalah antibiotika jenis penicillin, cefuroxime dan meropenem

3. Teknik Penentuan dan Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan berupa apus (swab) dari pasien yang infeksi luka (pus). Pengambilan dengan lidi kapas apus (swab) pus, kemudian dimasukkan ke dalam media MHB (Muller Hinton Broth).

4. Penyiapan Antibiotika

Tiga jenis antibiotika yang diujikan secara “*dise diffusion*” dalam penelitian ini adalah penicillin, cefuroxime, dan meropenem .Ketentuan mengenai resistensi dan sensitivitasnya didasarkan pada besarnya zona bebas bakteri di sekitar *disk* antibiotika dengan berpedoman pada *National Comm ittee for Clinical Laboratory Standards* (NCCLS).

5. Pengujian Sensitivitas

Pengujian sensitivitas yang digunakan adalah cara difusi Kirby- Bauer dengan cara mengambil koloni bakteri uji yang telah ditumbuhkan selama 24 jam sebelumnya dan disuspensikan ke dalam 0,5 ml media cair kemudian di inkubasi selama 5-8 jam. Suspense bakteri uji tersebut ditambahkan NaCL 0,85% hingga mencapai kekeruhan, selanjutnya dengan menggunakan lidi kapas steril (swab) suspense bakteri dioleskan secara merata pada media MHA,

kemudian paper disk yang berisi agen antibiotik diletakkan di atas media tersebut dan diinkubasi selama 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat ada tidaknya zona hambat di sekeliling paper disk tersebut dimana adanya zona hambat menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Uji sensitivitas

Tabel 1 : Hasil pengukuran diameter zona hambatan beberapa antibiotik.

No	Hasil pemeriksaan	Jenis bakteri		Jenis antibiotik			
		positif	negatif	Pen	Cef	Cep	Mer
1.	<i>Acinobacter baumannii</i>		-	R	R	S	S
2.	<i>Staphylococcus aureus</i>	+		R	S	S	S
3.	<i>Aeromonas Hidropila</i>		-	S	S	R	S
4.	<i>Serratia odorifera</i>		-	R	S	S	S
5.	<i>Staphylococcus aureus</i>	+		S	R	S	S
6.	<i>Staphylococcus aureus</i>	+		S	R	S	R
7.	<i>Enterobacter cloacae</i>		-	S	R	S	S
8.	<i>Enterobacter aerogenes</i>		-	S	S	R	S
9.	<i>Enterobacter cloacae</i>		-	S	R	S	S
10.	<i>Enterobacter aerogenes</i>		-	S	S	S	S
11.	<i>Acinobacter baumannii</i>		-	S	S	R	S
12.	<i>Pseudomonas airoginosa</i>		-	R	R	R	S
13.	<i>Enterobacter cloacae</i>		-	R	S	S	S
14.	<i>Enterobacter cloacae</i>		-	R	R	R	S
15.	<i>Enterobacter cloacae</i>		-	S	R	S	S
16.	<i>Pseudomonas airoginosa</i>		-	R	R	S	S
17.	<i>Serratia odorifera</i>		-	R	R	S	R
18.	<i>Enterobacter aerogenes</i>		-	R	R	R	S
19.	<i>Staphylococcus aureus</i>	+		S	S	S	S
20.	<i>Staphylococcus aureus</i>	+		S	S	R	S

KET : Pen : Penicillin

Cef : Cefuroxime

Cep : Ceptriaxone

Mer : Meropenen

Tabel 2 : Persentase semua jenis bakteri terhadap antibiotik

NO	NAMA BAKTERI	PNCLN		CFR		MRPN	
		R	S	R	S	R	S
1.	<i>Acinobacter baumannii</i>	50%	50%	50%	50%	0%	100%
2.	<i>Staphylococcus aureus</i>	20%	80%	40%	60%	20%	80%
3.	<i>Aeromonas Hidropila</i>	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4.	<i>Serratia odorifera</i>	0%	100%	50%	50%	50%	50%
5.	<i>Enterobacter aerogenes</i>	70%	30%	70%	30%	0%	100%
6.	<i>Enterobacter cloacae</i>	60%	40%	80%	20%	0%	100%
7.	<i>Pseudomonas airoginosa</i>	100%	0%	100%	0%	0%	100%

Tabel 3 : Hasil persentase dari semua sampel pus


No	Antibiotik	Jumlah sampel					
		S	%	I	%	R	%
1.	Penicillin	11	55%	-	0%	9	45%
2.	Cefuroxime	11	55%	-	0%	9	45%
3.	Ceftriaxone	13	65%	-	0%	7	35%
3.	Meropenem	18	90%	-	0%	2	10%

Ket: S :Sensivitas

R : Resisten

I : Intermediat

Gambar 10 : diagram hasil persentasi dari semua sampel pus



B. Pembahasan

Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Uji kepekaan/sensitivitas bertujuan untuk mengetahui daya kerja/efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri (wahyutomo,2009).

Sampel yang digunakan berupa infeksi luka (PUS) dari beberapa pasien yang berada di RS Inco PT Vale Sorowako dengan menggunakan beberapa jenis antibiotik yang sering digunakan terutama untuk mengobati infeksi luka yaitu dari golongan penicillin, golongan sefalosporin generasi ke 2 yaitu cefuroxime dan Meropenem.

Pus merupakan hasil dari proses infeksi bakteri yang terjadi akibat akumulasi jaringan netrofik, netrofil mati, magrofag mati serta cairan jaringan. Setelah proses infeksi ditekan, pus secara bertahap akan mengalami autolysis dalam

waktu beberapa hari, selanjutnya produk akhirnya akan diabsorpsi ke jaringan sekitar akan tetapi beberapa kasus proses infeksi sulit ditekan sehingga mengakibatkan pus tetap diproduksi sehingga hal tersebut dapat disebabkan bakteri yang menginfeksi mengalami resisten terhadap antibiotik. Pada penelitian ini, sampel yang diambil berasal dari infeksi yang menghasilkan pus dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kultur dan uji resistensi terhadap pus untuk diberikan terapi yang sesuai.

Pemeriksaan berbagai organism klinis diperlukan untuk diagnosis yang akurat dan menentukan strategi pengobatan yang tepat. Beberapa kondisi klinis dapat menyebabkan akumulasi pus dan sebagai sumber infeksi utama karena menyediakan lingkungan lembab untuk pertumbuhan pathogen serta menyebarkan infeksi. Sampel pus merupakan infeksi piogenik yang ditandai dengan peradangan jaringan yang biasanya disebabkan oleh bakteri piogenik, hal ini menyebabkan lekosit mati dan akumulasi agen infeksius (Koneman et al., 2005; Sharma et al., 2015).

Bakteri penghasil pus (nanah) yang paling sering adalah *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Escherichia coli*, dan *Streptococcus spp.*, dimana *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri tersering yang menghasilkan pus (nanah) pada luka (Kumar, 2013).

Zona jernih pada lapisan agar yang terbentuk diakibatkan oleh karena senyawa antimikroba berdifusi ke dalam lapisan agar dan menghambat

pertumbuhan mikroorganisme (bakteri) dan biasa sebagai zona hambat, sedangkan lapisan agar yang ditumbuhi mikroorganisme akan tampak keruh. Senyawa antimikroba bekerja dengan cara berinteraksi dengan dinding sel bakteri dan memudahkan senyawa antimikroba untuk bisa berdifusi ke dalam sel bakteri. Difusi yang terjadi akan mengakibatkan gangguan pada serangkaian proses pertumbuhan dari bakteri sehingga menghambat pertumbuhannya (bakteriostatik) ataupun memberikan efek lain yaitu dengan membunuh bakteri (bakteriosidal). Selain itu, senyawa antimikroba juga dapat menembus membran sel dan berinteraksi dengan material genetik dari bakteri sehingga bakteri dapat mengalami mutase (IDAI, 2012).

Dasar penggolongan antibiotik yang sensitivitas, intermediet maupun resisten didasarkan pada antibiotik yang melalui pengujian laboratorium dan disesuaikan dengan kriteria standar baku dari masing-masing jenis antibiotik. Standar dari tiap antibiotik berbeda terhadap suatu bakteri tertentu yang diujikan. Hasil pengujian tersebut kemudian ditandai dengan huruf “S” dan “I” (intermediet) sedangkan antibiotik resisten ditandai dengan huruf “R”. Sensitivitas menunjukkan bahwa antibiotik tersebut memiliki daya hambat yang lebih besar dari kriteria yang seharusnya, intermediet berada pada rentang minimum terendah hingga mencapai sensitivitas, dan resisten menunjukkan daya hambat yang terbentuk berada jauh dibawah kriteria yang telah ditentukan (Kemenkes, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa antibiotika yang memberikan hambatan yang besar dan ada juga yang tidak memberikan hambatan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa adanya antibiotika yang masih sensitivitas maupun telah resisten. Dimana resisten merupakan suatu keadaan dimana mikroorganisme sudah tidak peka lagi terhadap antibiotik, dimana pada suatu medium tidak adanya zona hambatan atau diameter zona hambatnya berada pada rentang resisten. Sensitivitas adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme masih peka terhadap mikroorganisme, dimana pada suatu medium terdapat zona hambatan yang kemudian diukur diameternya dan dibandingkan dengan tabel standar yang telah ditentukan (Kemenkes, 2011).

Sensitivitas bakteri terhadap antibiotik diperoleh melalui pengukuran diameter zona hambat yang terbentuk setelah proses penempelan cakram antibiotik. Kemudian hasil dari pengukuran zona hambat selanjutnya dibandingkan dengan standar diameter zona hambat berdasarkan pedoman CLSI (*Clinical and Laboratory Standard Institute*). Pada pengujian ini digunakan 3 jenis cakram antibiotik, yaitu *penicillin*, *cefuroxime*, dan *meropenem*.

Secara umum bakteri yang paling sering ditemukan pada spesimen pus adalah *staphylococcus*, bakteri batang Gram-negatif Pada penelitian Verma (2012) bakteri yang ditemukan pada spesimen pus adalah *Staphylococcus aureus* (40%), *Klebsiella* sp (33%), *Pseudomonas aeruginosa* (18%), *Escherichia coli* (16%) dan *Proteus* sp (7%). Tidak jauh berbeda dengan penelitian Chudlari (2012) yang dilakukan di RSUD dr. Moewardi, bakteri yang paling banyak ditemukan adalah *S.*

aureus (30,19%) diikuti oleh *A. baumani* (15,09%), *E.coli* (15,09%), *K. pneumoni* (11,33%). Sedangkan pada penelitian ini didapatkan 7 jenis bakteri dari 20 total sampel pus yang diperiksa. bakteri yang paling banyak ditemukan adalah *enterobacter clocae* diikuti oleh *Staphilococcus aureus* dan *Enterobacter aerogenes*. Fenomena ini belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun hal ini mungkin dapat disebabkan oleh adanya pergeseran pola bakteri yang ditemukan pada spesimen pus. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran pola bakteri diantaranya adalah perbedaan respon imun, faktor genetik populasi, perbedaan cara analisis mikrobiologi, perbedaan tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta perubahan pola pemakaian antibiotik misalnya tidak tepat pemberian antimikroba dalam terapi empiris dan kurang tepat strategi pengendalian infeksi.

Mekanisme resistensi bakteri gram negatif adalah Gen pembawa resistensi bakteri berada pada plasmid, transposon, dan kromosom. Plasmid maupun transposon merupakan komponen ekstra-kromosom dan berfungsi sebagai pembawa gen resistensi pada bakteri Gram positif maupun negatif. Satu sel bakteri dapat mengandung beberapa plasmid yang sama atau lebih dari 1 jenis plasmid yang berbeda. Plasmid konjugatif di dalam suatu bakteri dapat mentransfer dirinya sendiri ke bakteri lain (spesies dapat sama/ berbeda). Transposon dalam sel bakteri dapat melompat (*hop*) pada kromosom atau plasmid pada bakteri yang sama atau berbeda spesies. Transposon tidak dapat replikasi sendiri, tetapi harus pada replikon seperti kromosom dan plasmid. Kromosom yang telah ditempel oleh transposon

(terjadi sekuens insersi) akan berperan pada mekanisme resistensi apabila bakteri tersebut membelah diri. Adanya plasmid dan transposon memungkinkan terjadinya isolat yang multiresisten.¹⁵ Resistensi bakteri tidak hanya terjadi terhadap antibiotik yang diberikan, tetapi juga terhadap antibiotik lain disebut sebagai *multidrug resistance* (Niederman, 2003).

Pseudomonas aeruginosa dapat meningkat secara klinik karena resisten terhadap berbagai antibiotik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan tingkat Multi Drug Resisten (MDR) yang tinggi. MDR-PA ini merupakan resisten paling tidak terhadap 3-antimikroba yaitu dari golongan beta-laktam, carbapenem, aminoglikosida, dan fluoroquinon. *Pseudomonas aeruginosa* tidak bisa diobati dengan terapi obat tunggal karena memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dan bakteri dengan cepat mengalami resisten. (Jawetz *et al.*, 2004).

Pseudomonas aeruginosa merupakan kuman gram negative patogen yang sangat sulit diobati. Resistensinya terhadap pengobatan menyebabkan kegagalan pengobatan. *Pseudomonas aeruginosa* cenderung tumbuh pada lingkungan yang lembab. *Pseudomonas aeruginosa* merupakan penyebab utama kematian karena dikaitkan dengan resistensi terhadap organisme dan tingkat kematian yang tinggi karena kesulitan dalam mengobati (Srifeungfung, 2004). Banyak penelitian yang melaporkan tingkat kematian karena resistensi *Pseudomonas aeruginosa* terhadap obat. *Betalaktamase, sefalosporin dan karbapenem* merupakan bagian dari mekanisme pertahanan dari *Pseudomonas aeruginosa* (Anathanarayan and Jayarampaniker, 2009).

Antibiotik betalaktamase bekerja dengan cara membunuh bakteri dengan menginhibisi sintesis dinding selnya. Pada proses pembentukan dinding sel, terjadi reaksi transpeptidasi yang dikatalis oleh enzim transpeptidase dan menghasilkan ikatan silang antara dua rantai peptide-glukan. Enzim transpeptidase yang terletak pada membrane sitoplasma bakteri tersebut juga dapat mengikat antibiotik betalaktam sehingga menyebabkan enzim ini tidak mampu untuk mengkatalisis reaksi transpeptidasi walaupun dinding sel tetap terus dibentuk. Dinding sel yang terbentuk tidak memiliki ikatan silang dan peptidoglikan yang terbentuk tidak sempurna sehingga lebih lemah dan mudah terdegradasi. Pada kondisi yang normal, perbedaan tekanan osmotik di dalam sel bakteri gram negative dan lingkungan akan membuat terjadinya lisis sel. Selain itu, kompleks protein transpeptidase dan antibiotik betalaktam akan menstimulasi senyawa autolysin yang dapat mendigesti dinding sel bakteri tersebut. Dengan demikian, bakteri yang kehilangan dinding sel maupun mengalami lisis akan mati (Jawetz *et al.*, 2004).

Resistensi terhadap antibiotik golongan sefalosporin terjadi karena terjadinya mutasi yang menyebabkan dihasilkan produksi protein pengikat penisilin (PBP) yang berbeda sehingga sefalosporin tidak dapat menghambat PBP lagi. Selain itu resistensi juga dapat terjadi karena mutasi yang mengubah porin yang terlibat dalam transport melewati membran luar, hal ini mengakibatkan sefalosporin tidak dapat mencapai membran sitoplasma (lokasi PBP). Kemampuan bakteri memproduksi β laktamase dan adanya gen yang dapat mengkode β laktamase juga mengakibatkan bakteri resisten terhadap antibiotik ini dikarenakan

terjadinya hidrolisi pada ikatan cincin β laktam yang mengakibatkan inaktivasi antibiotik (Pratiwi, 2008).

Bakteri- bakteri yang resisten terhadap antibiotik beta-laktam memiliki 3 mekanisme resistensi, yaitu destruksi antibiotik dengan beta-laktamase, menurunkan penetrasi antibiotik untuk berikatan dengan protein transpeptidase, dan menurunkan afinitas ikatan antara protein pengikat tersebut dengan senyawa antibiotik. Beberapa bakteri seperti *Haemophilus influenzae*, golongan *Staphylococcus*, dan sebagian besar bakteri enteric berbentuk batang memiliki enzim beta-laktamase yang dapat memecah cincin beta-laktam pada antibiotik tersebut dan membuat menjadi tidak aktif. Secara detail, mekanisme yang terjadi diawali dengan protein transpeptidase sehingga terjadi kehilangan kemampuan untuk menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Beberapa studi menyatakan bahwa selain ditemukan secara alami pada bakteri gram positif dan negatif, gen penyandi enzim beta-laktamase juga ditemukan pada plasmida dan transposon sehingga dapat ditransfer antar spesies bakteri. Hal ini akan menyebabkan kemampuan resistensi akan antibiotik beta-laktam dapat menyebar dengan cepat. Difusi antibiotik beta laktam ke dalam sel bakteri terjadi melalui perantara protein transmembrane yang disebut porine dan kemampuan difusinya dipengaruhi oleh ukuran, muatan, dan sifat hidrofilik dari suatu antibiotik (Jawetz, 1997).

Staphylococcus aureus merupakan kuman berbentuk kokus Gram positif bila diamati secara mikroskopis, sebagai organisme individual, berpasangan dan

kelompok. *Staphylococcus* adalah bakteri non-motil, tidak berspora, katalase positif dan merupakan bagian dari flora normal manusia yang dapat ditemukan di daerah aksila, inguinal, perineum dan nares interior (Eiff et al., 2001; Yasmeen, 2014). Mikroorganisme ini menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan penyakit atau sindrom spesifik dan dapat menyebabkan pathogenesis infeksi *Staphylococcus* (Faden et al., 2010).

Methicillin Resistan Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan bakteri *Staphylococcus aureus* yang mengalami kekebalan terhadap antibiotik jenis metisillin. MRSA mengalami resisten karena perubahan genetic yang disebabkan oleh paparan terapi antibiotik yang tidak rasional. Transmisi bakteri berpindah dari satu pasien ke pasien yang lainnya melalui alat medis yang tidak diperhatikan tingkat sterilisasinya, melalui udara maupun fasilitas ruangan, misalnya selimut atau kain tempat tidur (Nurkusuma, 2009).

Adapun faktor-faktor terjadinya MRSA antara lain lingkungan, populasi, kontak olahraga, kebersihan individu, riwayat perawatan, riwayat operasi, riwayat infeksi dan penyakit, riwayat pengobatan, serta kondisi medis (Biantoro, 2008).

Berdasarkan dari distribusi frekuensi pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik *penicillin*, *cefuroxime* dan *meropenem*, hasil penelitian menunjukkan bahwa antibiotik dengan kepekaan tertinggi adalah meropenem sebesar 85% disebabkan karena meropenem merupakan antibiotik golongan beta laktam dari golongan karbapenem dengan spektrum luas dan merupakan satu satunya obat grup karbapenem yang tersedia saat ini. Meropenem merupakan antibiotik lini ketiga

untuk infeksi bakteri yang terlalu berat serta golongan karbapenem yang memiliki spectrum luas yang aktif melawan bakteri gram negative, bakteri gram positif dan bakteri anaerob. Meropenem memiliki kestabilan tinggi terhadap hidrolisis oleh serin beta-laktamase, berbeda dengan golongan karbapenem terdahulu (imipenem/silastatin), meropenem relative stabil oleh enzim *dehydropeptidase-I* (Baldwin, 2008). Mekanisme kerja dari meropenem yaitu mengganggu dinding sel bakteri, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan menyebabkan kematian sel, meropenem berpenetrasi dengan cepat ke dalam dinding sel bakteri dan berikatan dengan *penicillin-binding proteins* (PBP) dengan afinitas yang tinggi, sehingga menginaktivasi bakteri (Baldwin, 2008). Sedangkan angka resistensi tertinggi adalah cefuroxime dan penicillin yaitu sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa antibiotik meropenem masih dapat digunakan sebagai pengobatan infeksi luka (pus) dengan berdasarkan pada uji kepekaan dan pemeriksaan kultur bakteri. Sedangkan untuk penggunaan *cefuroxime* perlu diperhatikan dengan cermat karena telah resisten.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa antibiotik golongan penicillin dan golongan sefalosporin memiliki tingkat sensitivitas yang sama, yang seharusnya golongan sefalosporin memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan penicillin, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan Sefalosporin mempunyai spektrum kerja yang luas, secara klinis aktif terhadap bakteri gram positif dan negatif, tahan terhadap enzim β -laktamase, dan lebih aman dibandingkan obat golongan penisilin (Jobanputra & Vasait 2015, Vasait &

Jobanputra 2015). Berdasarkan dari data dapat dikatakan bahwa antibiotik jenis sefalosporin mengalami penurunan tingkat sensitivitas di RS Inco PT Vale Sorowako yang disebabkan karena pemberian antibiotik tidak sesuai dengan infeksi bakteri yang dialami dan penggunaan antibiotik tidak secara rasional.

Timbulnya resistensi dari beberapa antibiotik ini disebabkan karena beberapa bakteri mempunyai kemampuan alami untuk kebal atau resistensi terhadap efek pengobatan, meskipun tidak berinteraksi secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena bakteri mempunyai enzim yang dapat merusak obat. Reseptor tempat agen antimikroba bereaksi dapat berubah baik afinitas reseptor terhadap antimikroba maupun respon reseptor yang dapat menaikkan aktivitas sehingga dapat mengatasi obat tersebut. Berkurangnya akumulasi obat oleh adanya sel resisten terjadi dengan adanya penurunan permeabilitas membrane sel terhadap antibiotik dan variasi jalur metabolisme tersebut oleh antimikroba. Obat yang dapat menghambat pertumbuhan antagonis kompetitif metabolisme normal, dapat menghasilkan metabolik yang berlebihan. Akibatnya obat tersebut tidak efektif lagi bagi bakteri (Setyabudi 1995).

Timbulnya resistensi terhadap suatu antibiotika terjadi berdasarkan salah satu atau lebih mekanisme berikut:

1. Bakteri mensintesis suatu enzim inaktivator atau penghancur antibiotik. Misalnya stafilococcus, resisten terhadap penicillin G menghasilkan beta-laktamase, yang akan merusak obat tersebut. Beta-laktamase lainnya dihasilkan oleh bakteri batang gram negatif.

2. Bakteri mengubah permeabilitasnya terhadap obat. Misalnya tetrasiklin, tertimbun dalam bakteri yang rentan tetapi tidak pada bakteri yang telah resisten.
3. Bakteri mengembangkan suatu perubahan struktur sasaran bagi obat. Misalnya, resistensi kromosom terhadap aminoglikosida berhubungan dengan hilangnya protein spesifik pada sub unit 30s ribosom bakteri yang bertindak sebagai reseptor pada organisme yang rentan.
4. Bakteri mengembangkan perubahan jalur metabolic yang langsung dihambat oleh obat. Misalnya beberapa bakteri yang resisten terhadap sulfonamide tidak membutuhkan PABA ekstraseluler, tetapi seperti sel mamalia dapat menggunakan asam folat yang telah dibentuk.
5. Bakteri mengembangkan perubahan enzim yang tetap dapat melakukan fungsi metabolismenya tetapi lebih sedikit dipengaruhi oleh obat daripada enzim pada kuman yang rentan. Misalnya beberapa bakteri yang rentan terhadap sulfonamide, dihidropteroat sintetase, mempunyai afinitas yang jauh lebih tinggi terhadap sulfonamide dari pada PABA (Jawetz, 1997).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Antibiotik yang paling tinggi tingkat sensitivitasnya pada spesimen pus yaitu antibiotik *meropenem* sebesar 90% dan tingkat resistensi tertinggi pada spesimen pus yaitu antibiotik *cefuroxime* dan *penicillin*.
2. Dari total sampel yang diteliti terdapat 7 jenis bakteri yang di dapatkan, bakteri yang paling dominan yaitu *Staphylococcus aureus* (25%), *Enterobacter cloacae* (25%), dan *Enterobacter aurogenes* (15%).

B. *Saran*

Adapun saran pada penelitian ini adalah penggunaan antibiotik secara bijaksana sesuai dengan penyebab infeksi untuk mengurangi tingkat resistensi obat, tingkat morbiditas dan mortalitas dan biaya pengobatan serta hasil kultur yang telah diteliti sebaiknya dibuatkan pola sensitivitas dan resistensi tingkat kepekaan di setiap daerah.

KEPUSTAKAAN

- Anathanarayan R. and Jayarampaniker C.K., 2009. *Text Book of Microbiology. 8th Edition*. India Universities Press.
- Atikah Proverawati, Eni Rahmawati. 2012. *Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Bisht, R., Katiyar, A., Singh, R., Mittal, P. 2009. *Antibiotik resistance- A global issue of concern. Asian journal of pharmaceutical and clinical research*. Volume 2. Issue 2.
- Biantoro, I. 2008. *Metichillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*. (Tesis). Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 20 pp.
- Chudlori, B., Kuswandi, M., Indrayudha, Peni. (2012). *Microbial Pattern and Antibiotik Resistance of Isolates Collected From Specimen Pus In Dr. Moewardi Hospital Period 2012*. 70-71
- Crueger, W & Crueger, A 1984, *Biotechnology: a textbook of industrial microbiology*, Sinauer Associates, Inc., Sunderland.
- Deshpande, J. D., Joshi, M. 2011. *Antimicrobial resistance : the global public health challenge*. International journal of student research. Volume I. Issue 2.
- Dwiprahasto. 1995. *Penggunaan Antibiotik Rasional. Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran UGM*, Yogyakarta.
- Depkes RI, 2005. *Pharmaceutical care untuk penyakit infeksi pernapasan Handbook*.
- Djide, M.N., dan Sartini. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Lembaga Penerbit UNHAS. Makassar
- Djide, M.N., 2010. *Mikrobiologi Klinik*. Bagian Mikrobiologi-Bioteknologi Farmasi, Fakultas Farmasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Djuanda Adhi., 2007., *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*. Edisi kelima. Balai Penerbit FKUI. Jakarta.
- Faden H., A.J. Lesse., J. Trask, J. Hill., D.J. Hees, D. Dryja. 2010. *Importance of Colonization Site in the Current Epidemic of Staphy*
- Ganiswarna, S., G.Dkk. 1995. *Farmakologi dan Terapi, Ed. IV*. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Gupte, Satish, 1990. Mikrobiologi Dasar. Terjemahan E.Suryawidjaja : *The Short Textbook of Medical Microbiology*. Bina rupa Aksara. Jakarta.
- Houbraken, J, Frisvad, JC, Seifert, KA, Overy, DP & Tuthill, DM 2012, 'New penicillin producing Penicillium species and an overview of section Chrysogena', *Persoonia*, vol 29, pp. 78–100.
- Ivan dkk, *Identifikasi Pola Penggunaan Antibiotik sebagai Upaya Pengendalian Resistensi Antibiotik. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*. Vol 1 no. 1. Bandung : 2016.
- Jawetz, Melnick, Adelberg. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi 23. Salemba Medika, Jakarta : 2007.
- Jawetz, E. 1997. *Principle of antimicrobial drug action. Basic and clinical pharmacology*. Third edition. Appleton and Lange, Norwalk
- Johnston, L. 2012. *Rational Use of Antibiotik in Respiratory Tract Infectious*. S Afr Pharm J, 79 (4): 34-39.
- Jobanputra AH, Vasait RD (2015) *Cephalosporin C acylase from Pseudomonas species: production and enhancement of its activity by optimization of process parameters*. Biocatal Agric Biotechnol 4:465-470. Doi: 10.1016/j.bcab.2015.06.009.

- Kardos, N & Demain, AL 2011, 'Penicillin: the medicine with the greatest impact on therapeutic outcomes', *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol 92, pp. 677-687. Kumala, S., D.A.M. *Pasanema, dan Mardiasuti*. 2010. *Pola resistensi antibiotik terhadap isolate bakteri dari sputum penderita tersangka infeksi saluran nafas bawah*. *Jurnal Farmasi Indonesia*. 5: 24-32.
- Kuswandi., 2001, *Perkembangan Penyakit Infeksi di Daerah Tropis*, Kompas 12 April 2001.
- Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Antibiotik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta : 2011.
- Koneman W.K., Allen S.D., Janda W.M., Schreckenberger P.C., propcop G.W., Woods G.L, Win W.C., and Jr. Philadelphia. 2005. *Color Atlas and Text Book of Diagnostic Microbiology. 6 th Edition*. Lippincort-ravea Publisher. Pp. 624-662.
- Kumar A.R. 2013. *Antimicrobial sensitivity pattern of klebsiella pneumonia isolated from pus from tertiarycar hospital and issues related to the rational selectian of antimicrobial*. *Journal of chemical and pharmaceutical research*. 5(11): 326-331.
- Lestari Putriana Indah, Ika Susanti. *Pola kepekaan antibiotik di ruang rawat intensif RSPI Prof Dr. Sulianti Saroso*. *The Indonesian journal of infection disasea*: Jakarta, 2011.
- Misbahul. *Resistensi Bakteri Gram Negatif Terhadap Antibiotik Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung Tahun 2012-2014*, Jurusan Analisis Kesehatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, bandar lampung : 5 no 1, 2016
- Mycek, Mary J; Harvey, Richard A; Champe, Pamela C., 2001, *Farmakologi Ulasan Bergambar*, Ed ke-2. Di dalam: Hartanto, H. (ed), *Farmakologi*

Ulasan Bergambar: Prinsip-Prinsip Terapi Antimikroba, Widya Medika, Jakarta.

Nurmala, dkk. *Resistensi dan Sensitivitas Bakteri terhadap Antibiotik di RSUD dr. Soedarso Pontianak Tahun 2011-2013*. Jurnal Resistensi dan Sensitivitas Bakteri, 3 no. 1. Tanjungpura : 2015.

Niederman MS. *Appropriate use of antimicrobial agents: Challenges and strategies for improvement*. Crit Care Med 2003;31(2):608-16.

Nurkusuma, D. 2009. *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Metichillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) pada Kasus Infeksi Luka Pasca Operasi di Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang*. (Tesis). Universitas Diponegoro. Semarang. 28 pp.

Pelczar, J.M and Chan, E.C.S. 1988. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Edisi I. Terjemahan Ratna Siri dkk. UI-Press Jakarta.

Pratiwi, S. T. *Mikrobiologi farmasi*. Yogyakarta: Erlangga, 2008.

Scheld, W.M. 2003. *Maintaining Fluoroquinolon Class Efficacy: Review of Influencing Factors*. *Emerging Infectious Disease*. 10: 1.

Setiabudy, R. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi 5. Balai Penerbit FKUI, Jakarta : 2007.

Setiabudy, R., Di dalam: Gunawan, S. G; Setiabudy, R; Nafrialdi; Elysabeth (ed), *Farmakologi dan Terapi Ed ke-5: Antimikroba*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta : 2012.

Sharma V., G. Parihar, V. Sharma and H. Sharma. 2015. *A Study of Various Isolates from Pus Sample with Their Antibigram from Jln Hospital Ajmen*. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. 14(10): 64-68


- Sriefungfung S., Chuntima T., Thitiya Y., Chertsak D. 2004. *Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Mucooidansd non-mucooidtype. Southeast Asian Journal Trop. Med. Public Health.* 35(4): 893-896.
- Shulman. S.T. Phair. J.P.Sommer. H.M, 1994, *Dasar dan Biologi Klinis Penyakit Infeksi*, Edisi IV, UGM Pres, Yogyakarta, hal:13.
- Weber, SS, Bovenberg, RAL & Driessen, AJM 2012, '*Biosynthetic concepts for the production of β -lactam antibiotiks*', *Biotechnology Journal*, vol 7, pp. 225–236.
- Waluyo L, 2008. *Teknik dan Metode Dasar dalam mikrobiologi*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Yulika. *Pola resistensi*. Universitas Indonesia. Jakarta : 2009.
- Zhang, Y. *Mechanisms of antibiotik resistance in the microbial world*. Baltimore, USA : 2007.

LAMPIRAN

1. Persentase bakteri terhadap antibiotik


NO	NAMA BAKTERI	PNCLN		CFR		MRPN	
		R	S	R	S	R	S
1.	<i>Acinobacter baumannii</i>	50%	50%	50%	50%	0%	100%
2.	<i>Staphylococcus aureus</i>	20%	80%	40%	60%	20%	80%
3.	<i>Aeromonas Hidropila</i>	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4.	<i>Serratia odorifera</i>	0%	100%	50%	50%	50%	50%
5.	<i>Enterobacter aerogenes</i>	70%	30%	70%	30%	0%	100%
6.	<i>Enterobacter cloacae</i>	60%	40%	80%	20%	0%	100%
7.	<i>Pseudomonas airoginosa</i>	100%	0%	100%	0%	0%	100%

Gambar 2 : Persentase Bakteri *Staphylococcus aureus*




Gambar 3 : Persentase Bakteri *Acinobacter baumannii*

Acinobacter baumannii




Gambar 4 : Persentase Bakteri *Aeromonas Hidropila*

Aeromonas Hidropila




Gambar 5 : Persentase Bakteri *Serratia odorifera*


Serratia odorifera




Gambar 6 : Persentase Bakteri *Enterobacter cloacae*



Gambar 7 : Persentase Bakteri *Enterobacter aerogenes*



Gambar 8 : Persentase Bakteri *Pseudomonas airoginosa*



2. Hasil kultur sampel pus



3. Zona hambat







