

**KELIMPAHAN BAKTERI SEDIMEN LAUT DI PESISIR PANTAI PULAU
DUTUNGAN KABUPATEN BARRU**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana sains
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURAENI
60300114007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurani
NIM : 60300114007
Tempat/Tgl. Lahir : Bone-bone, 06 Mei 1996
Jur. Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. H. Muh. Yasin Limpo
Judul : Kelimpahan Bakteri Sedimen Laut di Pesisir Pantai
Kepulauan Duingan Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sepenuhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan menduplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 28 Februari 2019

Penyusun,



Nurani
NIM: 60300114007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Nuraeni**, NIM: 60300114007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama Skripsi berjudul, "Kelimpahan Bakteri Sedimen Laut di Pesisir Pantai Kepulauan Dutungan Kabupaten Barru", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut

Gowa, 28 Februari 2019

Pembimbing II



Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si

NIP. 19860716 201503 2006

Pembimbing I



Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si

NIP. 19821110 200912 2005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Kelimpahan Bakteri Sedimen Laut di Pesisir Pantai Kepulauan Dutungan Kabupaten Barru" yang disusun oleh Nuraeni, NIM: 60300114007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 M, bertepatan dengan 23 Jumadil ula 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Februari 2019 M
23 Jumadil ula 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Hasyimuddin, S.Si., M.Si. (.....)
Munaqisy I : Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., MPd. (.....)
Munaqisy II : Dr. Sadiq Sabry, M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si. (.....)
Pembimbing II : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969 205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Kelimpahan Bakteri Sedimen Laut di Pesisir Pantai Kepulauan Dutungan Kabupaten Barru”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar . Salam serta shalawat tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai sekarang.

Ungkapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Bustamin Dg. Tiro dan Ibunda tercinta Saga Dg. Ti'no, serta saudaraku Awaluddin dan Nuralam selalu memberi Do'a, semangat, dukungan dan kasih sayang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga ke jenjang perguruan tinggi serta suami tercinta Fajar Sahar, S.Pd Dg Lolo yang selalu memberi dukungan dan penuh perhatian. Terimakasih juga kepada bapak mertua H. Sahar S.Sos Dg Naba, ibu mertua Hj. Rosi Dg Bollo serta saudara ipar Hj. Farida S.Kep., Ners Dg Lebong, Fatmawati S.Kep., Ners Dg Singara. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si.,M.Kes, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, dan ibu Baiq Fahratul Wahidah, S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si dan ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si selaku pembimbing I dan II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbimngannya selama penyusunan Skripsi.
5. Ibu Ulfa Triani A Latif S.Si., M.Pd. dan bapak Dr. Sadiq Sabri, M.Ag selaku penguji I dan II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf jurusan, staf akademik, terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. Untuk seluruh keluarga besar Biologi, terkhusus Angkatan 2014 “LACTEAL” yang telah bersama-sama menjalani metamorfosis. Terimakasih untuk semangat dan do’a serta setiap moment terbaik yang telah kalian berikan.
8. Untuk sahabat saya Jumania S.Si, Zulfiana Machmud S.Si, Rismawati S.Si, Nurul Karimah, Hartina S.Si, Rahmat Fajrin Alir S.Si, Andika Saputra S.Si dan Saifullah Azman S.Si trimakasih telah membantu saya dalam penelitian ini.

5. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, saran dan partisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari penulisan maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati segala bentuk koreksi, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sekaligus dapat menambah ilmu mahasiswa Biologi, serta bagi pemerintah dan masyarakat.

Dewa, 28 Februari 2019

Penulis



Nurrahma

NIM. 603001114007

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ILUSTRASI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ASBSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15-30
A. Ayat Lain	15
B. Tinjauan Umum Pulau Dutungan	20
C. Tinjauan Umum Sedimen Laut.....	21
D. Bakteri Laut	23

E. Jumlah Total Bakteri.....	27
F. Morfologi Bakteri	28
G. Kerangka Pikir	30
BAB III METODEODOLOGI PENELITIAN	31-33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Variabel Penelitian	31
D. Defenisi Operasional Variabel.....	31
E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan).....	32
F. Prosedur Kerja	32
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37-40
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
KEPUSTAKAAN.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengukuran parameter lingkungan.....	34
Tabel 4.2 Kelimpahan bakteri.....	35
Tabel 4.3 Pengamatan makroskopik	35



Daftar ilustrasi

Gambar 2.1 Peta pulau Dutungan	18
Gambar 4.2 Diagram kelimpahan bakteri	35



Abstrak

Nama : Nuraeni

NIM : 60300114007

Judul Skripsi : **Kelimpahan Bakteri Sedimen Laut di Pesisir Pantai Pulau
Dutungan Kabupaten Barru**

Telah dilakukan penelitian tentang kelimpahan bakteri sedimen laut di pesisir pantai pulau Dutungan Kabupaten Barru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelimpahan dan jenis bakteri pada sedimen laut. Kelimpahan bakteri dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan menggunakan metode deskriptif. Setelah dilakukannya proses pengambilan sampel kemudian dilakukan isolasi, kultur, pengamatan morfologi dan pengujian biokimia. Hasil penelitian di tiga stasiun ditemukan 3 jenis bakteri yang terdapat pada sedimen laut yakni *Streptococcus*, *Bacillus* dan *Actynomicetes*. Kelimpahan bakteri di pesisir pantai kepulauan Dutungan Kabupaten Barru Pada stasiun I kelimpahan bakteri sebesar $2,0 \times 10^6$ Cfu/ml, stasiun II kelimpahan bakteri sebesar $5,9 \times 10^6$ Cfu/ml, serta pada stasiun III kelimpahan bakteri sebesar $7,6 \times 10^6$ Cfu/ml. Kelimpahan bakteri tertinggi terletak pada stasiun III. Dari ketiga stasiun tersebut 42 isolat berhasil dimurnikan.

Kata kunci: Pulau, bakteri, sedimen

ABSTRACT

Name : Nuraeni
Student ID Number : 60300114007
Title : The abundance of marine sediment bacteria in the coastal area of Dutungan Island, Barru Regency

This study is about abundance of marine sedimentary bacteria in the coast of Dutungan island Barru regency. This study aims to know abundance and type of bacteria in marine sediments. The abundance of bacteria is influenced by biotic and abiotic factors. This study was conducted in May until August 2018 using descriptive method. The steps of this study were sampling, isolating bacteria, culturing bacteria, observing bacterial morphology, and doing biochemical test. The result from three stations was 3 types bacteria found in marine sediments. The bacteria were *Streptococcus*, *Bacillus*, and *Actinomycetes*. Abundance of bacteria in the coast of Dutungan island Barru regency was $2,0 \times 10^6$ Cfu/ml in station I, $5,9 \times 10^6$ Cfu/ml in station II, and $7,6 \times 10^6$ Cfu/ml in station III. 42 bacterial isolates from 3 stations were successfully purified.

Keyworld: Islands, bacteria, sediments



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara bahari yang mempunyai kekayaan biodiversitas mikroorganisme laut yang potensial untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun nilai komersial dalam meningkatkan industri dalam negeri. Kemajuan bidang bioteknologi menstimulasi berkembangnya penelitian dan eksplorasi kekayaan biodiversitas mikroorganisme laut asli Indonesia untuk melengkapi database mikroorganisme potensial yang saat ini belum banyak dilakukan. Pemanfaatan biodiversitas mikroba laut semakin diharapkan secara maksimal untuk menghasilkan terobosan baru melalui produk hasil metabolisme, bioproses maupun kemampuannya menghasilkan jenis enzim yang spesifik. Tingginya permintaan pasar akan produk-produk baru dan mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sangat dibutuhkan dalam bidang industri seperti pangan fungsional, farmasi, peternakan, bioenergi, lingkungan dan kesehatan. Saat ini pemanfaatan teknologi enzimatik dalam dunia industri sedang pesat dilakukan, salah satu enzim yang mempunyai peranan penting tersebut adalah enzim mananase. Enzim mananase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis dari ikatan β -1,4-manosidik dari rantai manan, glukomanan, dan galaktomanan. Enzim mananase dapat digunakan dalam aplikasi teknologi enzim pada industri yang beragam seperti makanan, pakan, farmasi, kertas maupun dalam industri gas sebagai stimulasi

maupun perlakuan awal terhadap biomasa lignoselulosa sebagai bahan untuk biofuel generasi kedua (Songsiriritthigul et al. 2010).

Air adalah sumber daya alam yang termasuk komponen penting bagi aspek seluruh kehidupan di muka bumi ini. Dengan adanya faktor biotik dan abiotik, air yang merupakan media kehidupan manusia. Ekosistem perairan baik danau, sungai maupun laut merupakan kumpulan dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu struktur fungsional. Perubahan pada salah satu dari komponen tersebut tentunya akan dapat berpengaruh keseluruhan sistem kehidupan yang ada didalamnya (Fachrul, 2007).

Allah swt. menurunkan al-Quran yang merupakan kitab suci yang berisi perintah dan aturan perilaku bagi setiap umat manusia. Al-Quran juga membicarakan sifat-sifat Allah swt., tugas para malaikat dan jin, sejarah para rasul dan berbagai umat, serta berbagai gejala alam seperti penciptaan dan berakhirnya alam semesta, pergantian siang dan malam, perubahan musim, penciptaan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan sebagainya. Sebagai saintis muslim, layaklah al-Quran sebagai petunjuk dan menjadikan jembatan untuk kebesaran Allah swt. dalam ciptaanNya termasuk di laut yang dijelaskan dalam QS an-Nahl 16/14 yang berbunyi:

وَإِخْرَافُ الْفُلْكَ وَتَرَى تَلْبَسُونَهَا حِلْيَةً مِنْهُ وَتَسْتَخْرِجُونَ جُودًا طَرِيًّا لِحَمَامٍ مِنْهُ لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ سَخْرًا الَّذِي لَهُ هُوَ
تَشْكُرُونَ. وَلَعَلَّكُمْ فُضِّلْتُمْ مِنْهُ. وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ.

Terjemahnya:

dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan

supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Kementrin Agama RI, 2012).

Menurut tafsir Ibnu Katsir Allah swt. memberikan cara-cara kepada manusia mendapatkan rezeki berupa kekayaan yang ada di lautan. Dalam hal ini memanfaatkan dan berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan baik dalam bidang kesehatan maupun yang lainnya. Laut juga merupakan kawasan yang dikelilingi oleh air dengan demikian tersimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam pada umumnya terbagi atas dua yaitu SDA yang tidak dapat diperbaiki dan SDA yang dapat diperbaiki, SDA yang tidak dapat diperbaiki adalah SDA yang membutuhkan waktu lama dalam proses terbentuknya sedangkan SDA yang dapat diperbaiki adalah yang dapat berkembang biak juga memiliki jumlah yang melimpah sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang (Katsir, 2003).

Sayyid Qutb dalam tafsir ilmiah mengemukakan bahwa Nabi Sulaiman diberikan amanah dari Allah swt. untuk masuk kedalam dasar lautan dan mengeluarkan segala isinya yang sangat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dasar laut terdapat berbagai kekayaan alam yang dapat dieksplor bagi kepentingan kehidupan umat manusia. Allah swt. memudahkan manusia untuk keperluan hidupnya yang amat dibutuhkan, seperti biota laut dan sejenisnya.

Laut merupakan tempat untuk menyimpan kekayaan sumber daya alam yang dapat dieksplorasi, seperti sumber bahan bangunan misalnya pasir, sumber makanan seperti ikan dan berbagai tanaman di laut, sumber bahan kimia seperti posfor, sumber energi untuk tenaga listrik laut pula sebagai sarana rekreasi dan kesehatan. Dari hal tersebut dengan hadirnya kitab suci al-Quran umat manusia haruslah memahami

akan laut agar diketahui bagaimana mengelolah, memanfaatkan dan menjaga kelestarian laut.

Laut merupakan ekosistem yang luas untuk menjadi habitat bagi biota laut berukuran kecil maupun besar. Perubahan lingkungan laut yang terjadi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan interaksi dengan sesama biota laut.

Laut merupakan ekosistem besar yang menjadi tempat hidup biota laut dari yang berukuran kecil hingga yang besar, yang hidup di pesisir pantai hingga lautan dalam. Perubahan kondisi laut yang terjadi dengan berbagai interaksi dengan sesama biota laut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap daya adaptasi pada biota laut. Keragaman faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap kondisi kehidupan biota di dalamnya. Pengaruh tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan beradaptasi. Adaptasi ini diperlukan untuk mempertahankan hidup pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.

Perubahan kondisi laut yang terjadi dimasa lalu hingga saat ini ditambah dengan interaksi biota laut dalam pemangsaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap daya adaptasi pada biota laut. Kemampuan adaptasi biota laut yang berlanjut dalam jangka waktu lama yang akhirnya menjadi sebuah evolusi menjadikan keanekaragaman biota laut menjadi tinggi.

Penggolongan biota laut menurut sifat hidupnya dibedakan menjadi plankton merupakan semua biota yang hidup melayang di dalam air yang pergerakannya ditentukan oleh lingkungannya. Kemudian nekton adalah semua biota yang dapat berenang bebas dan mengatur sendiri arah pergerakannya dan bentos merupakan

semua biota yang hidup didasar perairan baik membenamkan diri, menempel maupun merayap.

Dasar laut merupakan tempat bagi lebih dari 1/3 dari bakteri di permukaan jgd raya ini, tetapi sampai sekarang masih belum jelas apakah biosfer mikroba besar ini masih hidup dan membelah. Sekarang kelompok ilmuwan telah menunjukkan bahwa bakteri dari lingkungan dasar laut yang ekstrim telah beradaptasi dengan cara mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA secara berlebih untuk mengatasi kondisi yang ekstrim.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memberikan banyak nikmat kepada manusia melalui alam yakni adanya lautan. Allah swt. menundukkan laut agar manusia bisa mengambil manfaat dari laut seperti terdapatnya bahan makanan, perhiasan, tempat berlayar dan sebagainya.

Lingkungan laut dicirikan oleh adanya tingkat salinitas yang tinggi, temperatur yang relatif konstan dan tekanan hidrostatis yang tinggi dalam lautan. Mikroorganisme yang tumbuh pada lingkungan ini berbeda dengan mikroorganisme terestrial baik secara fisiologis maupun metabolismenya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan laut merupakan potensi yang besar sebagai sumber substansi biologis yang perlu dieksplorasi lebih lanjut (Imada, 2000).

Lingkungan laut, bakteri memiliki peranan penting dalam mengatur siklus biogeokimia agar selalu stabil dalam proses asimilasi, pengendapan, perpindahan dan transformasi serta remineralisasi unsur karbon yang terjadi dalam perairan laut. Kurang lebih 90% biosfer terdiri dari sejumlah mikroorganisme laut yang

bertanggungjawab atas produksi bahan-bahan utama sebagai kebutuhan makanan untuk mendukung matabolisme bagi habitat lainnya (Ruyitno, 2004).

Penelitian mengenai mikroorganisme penghasil enzim mananase dari darat, seperti actinomycetes, kapang, aspergillus, fungi dan bakteri telah banyak dilakukan sehingga informasi tentang gen yang menyandi enzim mananase yang telah dikloning maupun disekuen berasal dari mikroba darat dapat diperoleh, jenis enzim ini mempunyai kemampuan untuk mengikat β -manan dan aktivitas katalitik yang tinggi dalam mendepolimerisasi substrat polisakarida (Tanaka et al. 2009). Oleh sebab itu timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian, eksplorasi dan isolasi mikroorganisme potensial penghasil enzim mananase dari perairan laut 2 Indonesia yang masih jarang dilakukan. Mikroba mannolitik adalah mikroba yang dapat menghasilkan enzim mananase yang dapat menghidrolisis polisakarida kompleks menjadi molekul sederhana seperti manno-oligosakarida dan manosa. Pada umumnya enzim mananase dihasilkan dari mikroorganisme seperti bakteri, namun adapula yang dihasilkan dari tanaman dan hewan. Enzim mananase yang dihasilkan oleh mikroorganisme mempunyai keunggulan tersendiri yaitu bersifat lebih ekonomis, mudah dan efisien dalam memproduksinya. Proses karakterisasi dan fermentasi enzim mananase dari mikroba mempunyai waktu proses yang lebih cepat dibandingkan dengan enzim dari tanaman dan hewan. Senyawa polisakarida yang terdapat di perairan laut sangat bervariasi karena sesuai dengan jenis monomer yang menyusunnya yaitu agar, kitin, manan, xylan dan selulosa. Pemanfaatan produk polisakarida dalam negeri sangat terbatas walaupun sumbernya berlimpah karena

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan biodiversitas tanaman tropis, tingginya biaya pengembangan produk polisakarida dan sistem pengolahan yang tradisional menyebabkan Indonesia seringkali menjual bahan mentah dan mengimpor produk yang sudah jadi dengan harga impor yang lebih mahal dari ekspor bahan mentah. Diharapkan dari penelitian ini dapat mengembangkan potensi mikroba lokal dan menghasilkan enzim potensial untuk industri serta mulai memanfaatkan teknologi rekayasa genetik dan teknologi enzimatik sehingga dapat dengan maksimal memanfaatkan biomassa polisakarida, karena selain bersifat renewable, teknologi di atas lebih ramah lingkungan. Enzim dari mikroba laut lokal belum banyak diteliti maupun dikembangkan pada tingkat laboratorium maupun komersial. Enzim laut memiliki karakter berbeda dengan enzim dari mikroba biasa sehingga penelitian biodiversitas mikroba laut dan karakter enzim penghidrolisis polisakarida laut menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Biomassa juga mempunyai peranan penting dalam proses produksi enzim yaitu sebagai sumber karbon sedangkan pemanfaatan biomassa yang spesifik dapat mengetahui kemampuan mikroba untuk menghasilkan enzim yang spesifik pula. Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah menghasilkan enzim mananase termofilik laut dari bakteri *Rhodothermus marinus*, mikroba ini diisolasi dari perairan laut yang mempunyai suhu tinggi sehingga mempunyai 3 aktivitas enzim mananase yang cukup unik dalam mendegradasi sumber manan seperti galaktomannan pada substrat locust bean gum, mikroba manolitik laut ini telah diketahui menghasilkan enzim mananase glikosidasi famili 26 yang bersifat termofilik yaitu tahan hingga temperatur 85°C setelah melalui proses karakterisasi

enzim dan analisis sekuen DNA (Politz et al. 2000). Mikroba penghasil enzim mananase dari darat dapat berupa aktinobakteri seperti *Cellulomonas fimi*, *actinomicetes* dari kelompok *streptomicetes* seperti *Streptomyces galbus* dan *Streptomyces lividans* yang mempunyai karakteristik enzim yang unik karena dapat mendegradasi berbagai jenis substrat manan (Stoll et al. 1999)

Bakteri merupakan sumber bahan aktif dan bahan kimia yang sangat berpotensi dalam bidang industri farmasi (seperti anti tumor atau anti kanker, antibiotik, anti inflamasi), bidang pertanian (fungisida dan pestisida), industri kosmetik dan makanan (pigmen dan polisakarida) (Zilinkas, 1993).

Saat ini salah satu penyebab penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Upaya untuk menangani mikroba yang bersifat patogen yaitu dengan menggunakan mikroba lain yang memiliki sifat antagonis yang dapat menghambat metabolisme mikroba lainnya. Agen antimikroba umumnya bersifat selektif toxicity sehingga sering digunakan dalam terapi penyembuhan penyakit yang disebabkan mikroba patogen (Putri, 2013). Antimikroba adalah suatu zat yang dapat mencegah terjadinya pertumbuhan dan reproduksi mikroba yang bersifat patogen. Antibiotik maupun antimikroba sama-sama menyerang mikroba patogen. Antimikroba biasanya dijelaskan sebagai suatu zat untuk membersihkan permukaan dan membunuh mikroba yang berpotensi membahayakan (Volk dan Wheeler, 1993). Menurut Lutfi (2004), antimikroba merupakan bahan yang dapat membunuh atau menghambat aktivitas mikroorganisme dengan berbagai cara. Senyawa antimikroba terdiri atas beberapa kelompok

berdasarkan mekanisme daya kerjanya 7 atau tujuan penggunaannya. Bahan antimikroba dapat berupa secara fisik atau kimia dan berdasarkan penggunaannya dapat berupa desinfektan, antiseptik, sterilizer, sanitizer dan sebagainya.

Rahayu dkk, (2010) telah melakukan penelitian terhadap *Actinomycetes* yang diisolasi dari material vulkanik gunung Merapi erupsi tahun 2010 dan berhasil mendapat 18 isolat tetapi belum diketahui potensi antibiotiknya. *Actinomycetes* mempunyai kemampuan memproduksi senyawa antimikrobia yang bermanfaat. Sebagai contoh, streptomisin dihasilkan dari *Streptomyces griseus* untuk penyembuhan tuberkulosis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. *Streptomyces violaceusniger* berperan antagonistik terhadap beberapa fungi 2 patogen tanaman. Sampai akhir tahun 1974, kurang lebih 95% antibiotik yang dihasilkan *Actinomycetes*, berasal dari genus *Streptomyces*.

Adanya hubungan antara sedimen laut dan bakteri merupakan salah faktor yang sangat diperhatikan. Menurut Reinick (dalam Kennet 1992) jenis sedimen yang dapat dijumpai pada dasar laut yaitu lithoheneus sedimen adalah erosi yang berasal dari erosi material dan erosi pantai. Material ini bisa sampai ke dasar laut melalui transport oleh air sungai atau arus laut. Biogeneus sedimen adalah sedimen yang berasal dari hasil sisa-sisa organisme yang hidup seperti rangka biola laut atau cangkang yang mengalami proses dekomposisi. Hidrogenous sedimen adalah sedimen yang terbentuk melalui proses reaksi kimia dan membentuk partikel yang tidak larut sehingga mengendap dalam air. Cosmogeros sedimen adalah sedimen yang berasal dari berbagai sumber melalui udara.

Kondisi parameter lingkungan yang mempengaruhi jenis dan kelimpahan bakteri seperti suhu, salinitas, arus, kecerahan, kedalaman, pH dan DO. Pada sisi lain diperlukan faktor pengurai atau dekomposer yaitu bakteri pengurai, hal ini disebabkan karena bahan material organik yang ada dalam koloni tersedia dalam jumlah yang banyak. Terkait dengan hal tersebut, hubungan fungsional dan kelimpahan bakteri dalam sedimen laut perlu ditelusuri jenis-jenis bakteri sebagai faktor penunjang terselenggaranya proses penguraian. Perlu diketahuinya jenis dan kelimpahan bakteri pada sedimen tersebut yaitu memberikan informasi kriteria jenis bakteri yang terdapat di sedimen laut tersebut beserta kelimpahan dan faktor yang berpengaruh pada sedimen laut.

Pulau Dutungan merupakan kawasan perairan laut di selatan kota Barru yang memiliki daratan kebun dan ilalang dan dengan keindahan yang ada, pulau ini dijadikan sebagai tempat wisata serta habitat berbagai jenis burung dan hewan lainnya. Kepulauan ini membentuk vegetasi *presceprae* karena terdapatnya tumbuhan yang tumbuh pada gundukan pasir yang terhadap hempasan gelombang. Di kawasan laut kepulauan ini terdapat lumpur yang merupakan tempat dimana organisme berlindung dan beradaptasi, lumpur banyak atau sering berasosiasi dengan mangrove dan lamun yang juga merupakan habitat berbagai hewan laut. Selain itu, kepulauan ini didominasi oleh alga dengan kedalaman laut kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dan juga terdapatnya bebatuan dan pasir sebagai tempat hidup berbagai bivalvia, arthropoda dan sebagainya.

Pulau Dutungan terdapat biota laut yang masih terjaga sehingga memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena belum tercemarnya oleh sampah dan semacamnya serta sedikit sempit bila dibandingkan dengan pulau yang lain sehingga bakteri yang diteliti dapat memungkinkan mewakili pulau tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis bakteri apa saja yang terdapat di pesisir pantai pulau Dutungan kabupaten Barru ?
2. Berapa banyak kelimpahan bakteri yang terdapat di pesisir pantai pulau Dutungan kabupaten Barru ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pesisir pantai merupakan lokasi di pulau Dutungan kabupaten Barru.
2. Bakteri yang telah didapatkan diisolasi kemudian diidentifikasi secara makroskopik dan mikroskopik selanjutnya akan diketahui kelimpahan bakteri tersebut.
3. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai bulan Agustus 2018 yang dilakukan di laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar.

D. Kajian Pustaka

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Alifianita Saputri, dkk (2016) dengan judul Identifikasi dan Kelimpahan Bakteri pada Jenis Karang *Acropora* sp. di *Reef Flat* Terumbu Karang Pulau Panjang Jepara menemukan 3 jenis bakteri yang termasuk jenis bakteri fakultatif yang berfungsi sebagai bakteri perombak bahan organik. Kelimpahan bakteri di karang *Acropora* sp. berkisar antara $1,0 \times 10^4$ Cfu/ml hingga $8,4 \times 10^5$ Cfu/ml. Pada stasiun I kelimpahan bakteri sebesar $2,0 \times 10^4$ Cfu/ml hingga $6,2 \times 10^5$ Cfu/ml, stasiun II kelimpahan bakteri sebesar $1,0 \times 10^4$ Cfu/ml hingga $8,4 \times 10^5$ Cfu/ml, serta pada stasiun III kelimpahan bakteri sebesar $1,0 \times 10^4$ Cfu/ml hingga $1,3 \times 10^5$ Cfu/ml. Kelimpahan bakteri tertinggi ditemukan pada stasiun II. Jenis bakteri *Listeria* sp. mendominasi dengan nilai $8,4 \times 10^5$ Cfu/ml sedangkan bakteri *Micrococcus* sp. memiliki nilai terendah yaitu $1,0 \times 10^4$ Cfu/ml.
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hari Kapli, dkk (2017) dengan judul Pengaruh *Rhizobakteria* Pemacu Tumbuh dan Toleran serta Kelimpahan dan Aktivitas Mikroba Tanah terhadap Tanaman Jagung (*Zea mays*), total kelimpahan bakteri dan *Actynomicetes* didapatkan jumlah kelimpahan tertinggi pada perlakuan formulasi F6 yaitu *Bacillus* (CR 90) dengan total bakteri mencapai 7.9×10^6 dan Jumlah total cendawan terbanyak terdapat pada kontrol sekitar 5.7×10^4 .

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2013) dengan judul Distribusi dan Kelimpahan Bakteri *Enterococcus* spp. di Perairan Terumbu Karang Kepulauan Spermonde Makassar, didapatkan bakteri *Enterococcus* terdapat pada semua lokasi penelitian yaitu Pulau lae-lae ($4,258 \times 10^4$), Pulau Samalona ($0,617 \times 10^4$), Pulau barrang lompo ($4,981 \times 10^4$) dan Pulau Kodingarengkeke ($4,398 \times 10^4$). Keberadaannya dicirikan oleh bahan organik, nitrat dan fosfat yang relatif tinggi. Kelimpahan tertinggi bakteri *Enterococcus* ditemukan di Pulau Barranglompo dan terendah di Pulau Samalona.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Didya Sinatriyani (2014) dengan judul Kelimpahan Bakteri Selulolitik di Muara Sungai Gunung Anyar Surabaya dan Bancaran Bangkalan, didapatkan hasil jumlah total bakteri selulolitik yang diisolasi dari mangrove Gunung Anyar dan Bancaran yaitu $7,8 \times 10^3$ CFU/ml dan $4,1 \times 10^4$ CFU/ml. Wilayah mangrove Bancaran memiliki kelimpahan bakteri selulolitik lebih tinggi dibandingkan wilayah mangrove Gunung Anyar. Faktor lingkungan (suhu, pH, salinitas, unsur Nitrogen dan Phospor) mempengaruhi kelimpahan bakteri selulolitik pada wilayah mangrove Gunung Anyar dan Bancaran.
5. Mikroba yang mempunyai kemampuan mendegradasi minyak telah berhasil diisolasi (Okazaki et al. 2006), serta mekanisme degradasinya telah dipelajari secara intensif. Beberapa bakteri yang dapat mendegradasi hidrokarbon adalah dari jenis *Alcanivorax*, *Cycloclasticus*, *Marinobacter*, *Neptumonas*, *Oleiphilus* dan *Oleispira*, serta dari genus *Planococcus*, yang merupakan bakteri gram

positif . Akan tetapi, mikroba tersebut diisolasi dari daerah subtropis, dengan keadaan geografis dan suhu yang berbeda, sedangkan informasi mengenai mikroba pendegradasi minyak dari perairan daerah tropis masih terbatas. Selain itu, dengan wilayah laut Indonesia yang mencapai 2/3 luas negara, kegiatan pengungkapan biodiversitas mikroba laut pendegradasi minyak menjadi sangat penting.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui jenis bakteri di pesisir pantai pulau Dutungan kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui kelimpahan bakteri di pesisir pantai pulau Dutungan kabupaten Barru.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai jenis dan kelimpahan bakteri yang terdapat di pesisir pantai pulau Dutungan kabupaten Barru dan dapat menjadi bahan referensi untuk dikembangkan melalui penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat Lain

Allah swt. menurunkan al-Quran yang merupakan kitab suci yang berisi perintah dan aturan perilaku bagi setiap umat manusia. al-Quran juga membicarakan sifat-sifat Allah swt., tugas para malaikat dan jin, sejarah para rasul dan berbagai umat, serta berbagai gejala alam seperti penciptaan dan berakhirnya alam semesta, pergantian siang dan malam, perubahan musim, penciptaan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan sebagainya. Penelitian terhadap tujuan dan hasil dari institusi yakni agama dan sains, menunjukkan bahwa keduanya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kebaikan bagi umat. Allah berfirman dalam QS al-Furqan 25/2 yang berbunyi:

فَقَدَرَهُ دُشَىٰ كُلِّ وَاخْلَقَ الْمَلِكِ فِي شَرِيكِهِ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا يَتَّخِذُ وَلَمَّا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُهُ الَّذِي
تَقْدِيرًا

Terjemahnya:

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaanNya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini diciptakan dengan cacat, lalai

atau tidak sempurna. Allah swt. telah memperhitungkan semua ciptaanNya dari ukuran yang paling besar hingga ukurannya yang paling kecil dengan sangat detail dan serapih-rapihnya. Kesemuaya pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tidak ada satu pun yang diciptakan dengan sia-sia. Bahkan bakteri yang dianggap sebagai wabah penyakit di masyarakat yang dianggap merugikan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri (Arifurahman, 2012).

Al-Maraghi (w. 1371 H/1952 M) menjelaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan baik di laut dan di bumi akan diperingatkan langsung oleh Allah, dunia dengan banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan. Agar mereka sudi kembali kejalan yang benar dan bertaubat. Tetapi kalau setelah Allah memberikan peringatan di dunia mereka tidak menghiraukannya, maka Allah memperingatkan mereka menunggu hari pembalasan. 7 Diantara kerusakannya, tercemarnya air laut, rusaknya ekosistem di darat dan di laut. Hal itu terjadi karena pembuangan limbah industri tanpa ada pengelolaan limbah dengan baik, penebangan hutan tanpa reboisasi, membuang sampah sembarangan.

Menunjukkan bahwa Allah swt. kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan obyek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah swt. tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah swt. memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah swt. menciptakan bakteri meskipun memiliki ukuran

yang sangat kecil tetapi keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan (Arifurahman, 2012).

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan tentang “*min kulli syain mauzdun*” yang artinya “segala sesuatu dengan ukuran”. Demikian juga dengan yang dikatakan oleh Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, Abu malik, Mujahid, al-Hakam bin ‘Uyaina, al-Hasan bin Muhammad, Abu Salih dan Qatadah mengatakan bahwa: “*Mauzun*” artinya ditentukan oleh kadarnya. Allah swt. kemudian menuturkan bagaimana Dia mecipatakan bumi dan menjadikannya membentang luas dan datar, menjadikan gunung-gunung yang tegak, lembah-lembah, tanah (dataran), pasir dan berbagai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sesuai. Allah swt. menunjukkan bahwa telah menciptakan keberadaan bentuk-bentuk kehidupan yang manusia sebelumnya tidak mengetahui. Manusia masih mengungkap ayat al-Qur’an tentang keberadaan adanya kehidupan itu, baru kemudian setelah alat mikroskop ditemukan, manusia mulai dapat melihat dengan mata penglihatannya tentang makhluk hidup yang terkecil. Dengan ini termasuk unsur penting dalam kesinambungan kehidupan di bumi. Seperti siklus nitrogen salah satu komponen dasar pembentukan kehidupan di bumi, peran ini dimiliki oleh bakteri, jamur akar merupakan unsur penting dalam penyerapan mineral tanah oleh tumbuhan, bakteri pada lidah kita mencegah keracunan makanan yang mengandung nitrat, bahan-bahan selada, dan daging, bakteri dan alga merupakan unsur terpenting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Sesungguhnya demikian itulah benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang menyadari hal

tersebut. Yakni segala sesuatu selain Dia adalah makhluk lagi dimiliki, sedangkan Dialah Yang Menciptakan segala sesuatu, Yang Menguasai, Yang Memiliki dan Tuhannya, segala sesuatu berada di bawah kekuasaan-Nya, diatur oleh-Nya, tunduk kepada-Nya dan kepada takdir-Nya.

Surah Asy-Su'araa/ 26: 151-152 yang berbunyi:

يُضْلِحُونَ وَلَا الْأَرْضِ فِي يُفْسِدُونَ الَّذِينَ الْمُسْرِفِينَ أَمْرًا تُطِيعُوا وَلَا

Terjemahnya:

(151) dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, (152) yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan perbaikan".(Kementrian Agama RI, 2009).

Pada ayat diatas dalam tafsir ilmiah Sayyid Qutb mengemukakan bahwa salah satu pengkhidmatan jin kepada Nabi Sulaiman yang diberikan Allah swt. adalah kemampuan menyelam ke dasar samudra dan masuk ke lapisan bumi untuk mengeluarkan segala isinya yang sangat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa di dasar laut terkandung banyak sesuatu yang dapat dieksloitasi bagi kepentingan manusia. Allah swt. memudahkan manusia untuk memperoleh sumber daya laut yang amat sangat dibutuhkan, seperti halnya biota laut dan sejenisnya. Laut ataupun samudra merupakan sebuah ekosistem besar yang menjadi tempat hidup berbagai macam biota laut, dari yang berukuran kecil hingga besar yang hidup di pesisir pantai hingga di laut dalam.

Terdapat banyak pelajaran (*mau'iza hasanah*) yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, salah satu diantaranya adalah samudra dijelaskan di dalam al-Quran merupakan salah satu tanda kebesaran Allah swt. yang harus direnungkan

untuk memperdalam dan mempertajam keyakinan kita akan kemahaesaan Allah swt. sebagai *al-Khalik* yang menciptakan dan mengatur seluruh alam.

Di sini Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah menafsirkan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh tindakan yang melampaui batas dari manusia. Kata *al-musrifin* terambil dari kata saraf yakni pelampau batas, yang dimaksud adalah tokoh-tokoh kaum kafir. Jika dipahami demikian, perintah dan nasihat itu ditujukan kepada masyarakat umum, seakan-akan nabi yang mulia itu tidak mengharapkan banyak dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Atau juga dapat dipahami bahwa nasihat nabi sholeh as. Ini ditunjukkan kepada semua pihak baik tokoh maupun orang kebanyakan karena tokoh-tokohpun seringkali saling meneladani dan yang di teladani itulah yang dinilai pelampau batas. Kata *yufsiduna* merusak berfungsi menjelaskan pelampauan batas itu. Kata ini ditampilkan dalam bentuk kata kerja mudhari' untuk mengisyaratkan kesinambungan perusakan. Memang, seseorang tidak dinamai perusak kecuali jika perusakan telah berulang-ulang sehingga membudaya pada kepribadiannya. Perusakan adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga berkurang fungsi dan manfaatnya akibat ulah si perusak. Ia adalah lawan dari perbaikan atau shalah.



B. Tinjauan Umum

1. Pulau Dutungan Kabupaten Barru

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perairan pantai sepanjang 2500 km (Syafiuddin dan Jahi, 2007). Secara geografis provinsi Sulawesi Selatan terletak pada $0^{\circ}12'$ LS dan 8° LU dan antara $116^{\circ}48'$ BB - $122^{\circ}36'$ BT. Secara ekologis, kawasan pesisir dan laut Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat kaya seperti hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, berbagai jenis terumbu karang dan produser primer lainnya. Lokasi penelitian tepat berada di Pulau Dutungan di Kecamatan Mallusetasi. Jarak dari kota Barru adalah 31 km ke arah selatan, 20 km ke arah utara kota Parepare. Jarak antara Tanjung Indah (Daratan Utama) dengan ujung selatan pulau 500 m dengan jarak tempuh 10 menit menggunakan perahu motor. Kondisi topografi secara umum adalah datar dan berbukit dinilai dari kemiringan 0 hingga 30° . Daerah datar merupakan kawasan kebun dan ilalang, sedang daerah berbukit merupakan kawasan hutan yang cukup luas. Daerah kawasan pantai terbagi menjadi dua yaitu kawasan pasir putih dan kawasan hutan bakau. Daerah yang berbukit merupakan kawasan hutan jati. Pada sebelah timur pulau memiliki dasar dengan tekstur berpasir, memiliki vegetasi lamun dengan kedalaman kurang lebih 50 cm, sebelah utara memiliki tekstur pasir berbatu dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dan sebelah barat memiliki tekstur bebatuan, vegetasi alga coklat dan lamun pendek dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Namun demikian berdasarkan informasi dari peta satelit menunjukkan bahwa proses penumpukan sedimen yang ada di daerah ini cenderung berubah dan tidak stabil.

Oleh karena itu diperlukan suatu kajian untuk mengetahui dan mengkaji sebaran sedimen berdasarkan jenis butir dan nilai sortasi di perairan Pulau Dutungan Kabupaten Barru.



Gambar 2.1: Pulau Dutungan, Letak pengambilan sampel (U: stasiun 1, T: stasiun 2, S: stasiun 3).

2. Sedimen Laut

Sedimen pesisir laut umumnya mengurangi lingkungan yang hanya ditutupi oleh lapis tipis yang permukaannya teroksidasi dan kebanyakan organisme sebagian tergantung pada ada atau tidak adanya oksigen, distribusi dan fisiologi yang berbeda kelompok (Jsgensen, 1977). Hancuran bahan organik dari tumbuhan maupun hewan yang sudah mati merupakan sedimen, jenis sedimen lithogenous dan biogenous mendominasi di daerah laut. Sebanyak 90% dari total sedimen berada di daerah pantai berasal dari pecahan batuan atau klastik dan erosi daratan. Terumbu karang

merupakan sedimen biogenous yang berkontribusi dari sejumlah kawasan daerah pantai (Hermanto, 2010).

Milyaran mikroorganisme berada pada permukaan dasar laut tempat dimana mereka berkembang, bereproduksi dan akhirnya mati. Bagian-bagian tubuh organisme akan terakumulasi dan tersebar secara luas pada dasar laut (Ingmanson and Wallace, 1989), Hedges dan Oades (1997) melaporkan bahwa sedimen laut merupakan satu-satunya tempat penampungan jangka panjang bahan organik.

Sedimen merupakan partikel batuan, mineral, atau bahan organik yang terbentuk akibat proses pengendapan melalui perantara angin, air atau es (Gray & Elliot 2009). Menurut Jorgensen (1983), 5 sampai 10 milyar ton partikel bahan organik tenggelam dalam laut dunia dan terakumulasi sebagai sedimen. Sedimen laut menutupi 70% permukaan bumi dan berperan penting dalam siklus karbon dan nutrisi bagi kehidupan di dunia ini (Rochelle *et al.* 1994). Menurut Hedges & Oades (1997), permukaan sedimen laut pada umumnya mengandung akumulasi bahan organik sebesar 0,1-10 %, sedangkan Reimers *et al.* (2001) melaporkan bahwa sedimen dasar benua (<1000 m) memiliki kandungan karbon organik sebesar 2-3% (bobot kering). Berdasarkan laporan Emerson & Hedges (2008) menunjukkan bahwa kecepatan sedimentasi bahan organik sangat dipengaruhi oleh kandungan dalam bahan organik itu sendiri. Bahan organik yang mengandung mineral akan lebih cepat tersedimentasi dibandingkan bahan organik yang tidak mengandung mineral.

Dasar laut adalah rumah bagi lebih dari 1/3 dari bakteri di planet ini, tetapi sampai sekarang masih belum jelas apakah biosfer mikroba besar ini masih hidup

dan membelah. Sekarang kelompok ilmuwan telah menunjukkan bahwa bakteri dari lingkungan dasar laut yang ekstrim telah beradaptasi.

3. Bakteri Laut

Dewasa ini bakteri sedimen masih kurang diekspos. Ekosistem terumbu karang umumnya terdapat di daerah tropis yang rentang terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas dan eutrofikasi. Adanya hubungan antara karang dan bakteri merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Aktivitas dan kelimpahan bakteri dipengaruhi oleh suhu, salinitas, arus, kecerahan, kedalaman, pH dan DO. Pada sisi lain diperlukan pengurai atau dekomposer yaitu bakteri pengurai. Hal ini disebabkan oleh material bahan organik yang ada dalam koloni karang yang tersedia dalam jumlah yang besar. Dan dengan itu, hubungan fungsional dan kelimpahan bakteri yang terdapat dalam sedimen perlu diketahui. Sedimen mengandung populasi mikroorganisme yang melimpah dengan keanekaragaman yang tinggi (Bisset et al., 2007).

Bakteri laut yang memiliki senyawa kimia yang bersifat potensial, umumnya berasal dari metabolit sekunder mikroba. Metabolit adalah suatu reaksi kimia yang berlangsung didalam organisme yang dalam mekanismenya mencakup enzim, atau dengan kata lain metabolit adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan melalui proses metabolisme. Metabolit diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah suatu metabolit atau molekul yang pada produk akhirnya memiliki fungsi yang sangat esensial bagi

kelangsungan hidup organisme tersebut, serta terbentuk secara intraseluler dan dalam jumlah yang terbatas. Contohnya, protein, lemak, karbohidrat dan DNA. Pada sebagian besar mikroorganisme, jika memproduksi metabolit yang berlebihan, maka dapat menghambat pertumbuhannya dan bahkan dapat mematikan mikroorganisme tersebut. Metabolit primer diproduksi pada waktu yang sama dengan pembentukan sel baru dan proses metabolisme tersebut untuk membentuk metabolit primer disebut metabolisme primer (Noviani, 2008). Untuk metabolit sekunder, diproduksi oleh mikroorganisme setelah fase pertumbuhan aktif telah berhenti. Zat tersebut biasanya tidak diperlukan dalam proses metabolisme atau pemeliharaan sel-sel yang penting. Meskipun tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan, namun metabolit sekunder dapat berfungsi sebagai nutrisi darurat untuk bertahan hidup. Metabolit sekunder dibuat dan disimpan secara ekstraseluler dan tidak diproduksi pada saat pertumbuhan sel secara cepat (fase logaritmik) dan pada fase ini, mikroorganisme lebih tahan terhadap keadaan ekstrim (Beksono, 2014).

Pemanfaatan bakteri sedimen laut masih kurang diekspos dan masih terbatas. Sedimen merupakan habitat kompleks bagi bakteri dengan banyaknya material organik yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup suatu bakteri. Material organik salah satunya berasal dari sisa pakan, bangkai hewan mati yang membusuk dan jatuh ke perairan, tumbuhan yang mati kaya akan sumber-sumber senyawa organik, dan nutrisi partikel yang mengendap atau sedimentasi oleh gravitasi (Rampen et al. 2012).

Mikroorganisme sedimen berperan penting dalam berbagai proses biokimia di perairan, antara lain dalam degradasi materi organik, perputaran siklus biogeokimia, mengendalikan kadar amonium, nitrat dan nitrit, sumber makanan bagi fauna, produksi primer dan remediasi pencemaran. Mikroorganisme berperan utama dalam berbagai proses biokimia di alam dibandingkan dengan organisme lain. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme tersebar dimana-mana, memiliki kemampuan metabolik yang luas, memiliki aktivitas enzimatik yang tinggi dan bekerja dalam keadaan aerobik dan anaerobik. Selain itu mikroorganisme mampu mendegradasi biopolimer yang susah didegradasi seperti selulosa dan lignin, mampu mendegradasi material humat, hidrokarbon dan berbagai senyawa sintetik buatan manusia, dan mampu memfiksasi nitrogen dari atmosfer (Atlas & Bartha, 1993).

Menurut Pelczar dan Chan (1988), ada beberapa faktor abiotik yang mempengaruhi penyebaran bakteri laut, yaitu:

a. Suhu

Semua proses makhluk hidup termasuk bakteri, bergantung pada reaksi kimiawi dimana adanya laju yang dipengaruhi oleh suhu. Keragaman suhu dapat mengubah proses metabolisme tertentu pada sel bakteri.

b. Tekanan hidrostatik

Pada tekanan hidrostatik mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Umumnya, pada tekanan 1 – 400 atm tidak mempengaruhi ataupun hanya sedikit yang terpengaruh saat dalam proses metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Tekanan hidrostatik yang lebih tinggi dapat menghambat bahkan menghentikan

pertumbuhan mikroba, karena mempengaruhi proses sintesis RNA, DNA dan protein. Selain itu, juga mengganggu fungsi transport membran sel maupun mengurangi aktivitas berbagai macam enzim.

c. Salinitas

Konsentrasi seluruh bahan padat dalam air laut disebut dengan salinitas, dengan satuan ppt (*Part Per Thousand*). Tingkat salinitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan serta pertumbuhan mikroorganisme diperairan. Sebaran salinitas dilaut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan aliran sungai.

d. pH

Sebagian besar bakteri memiliki tingkat pH minimum dan maksimum antara 4 hingga 9 dalam pertumbuhannya. Umumnya, pH optimum pertumbuhan bakteri 20 terletak antara 6,5 dan 7,5 tetapi beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan asam ataupun basa.

e. Nitrat dan fosfat

Nitrat (NO_3) adalah bentuk utama dari nitrogen diperairan alami serta sangat mudah larut dan bersifat stabil. Senyawa ini merupakan salah satu senyawa yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan biomassa laut, sehingga secara langsung dapat mengontrol perkembangan produksi primer. Fosfat merupakan salah satu unsur esensial bagi metabolisme dan pembentukan protein. Sumber utama fosfat terlarut dalam perairan adalah hasil pelapukan, mineral yang mengandung fosfor serta bahan organik seperti hancuran tumbuh-tumbuhan.

Spesies bakteri sedimen laut umumnya gram positif pada genus *Bacillus* dan *Actinomyces* dan bakteri gram negatif terutama *Pseudomonas* spp, *Alteromonas* sp (Pandey et al, 2002).

4. Perhitungan Jumlah Total Bakteri

Prinsip dari metode perhitungan bakteri adalah jika sel jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat dengan mata langsung tanpa bantuan mikroskop. Dalam hitungan total bakteri, bahan yang akan diinokulasikan mengandung lebih dari 300 sel jasad renik per mililiter atau per gram atau per serta memerlukan perlakuan pengeceran sebelum ditumbuhkan pada media agar (Ferdiaz, 1992).

Penumbuhan dengan metode perhitungan total bakteri dapat dibedakan menjadi dua cara itu metode tuang (*pour plate*) dan metode permukaan (*spread plate*). Hasil analisis mikrobiologi dengan metode hitung koloni digunakan standar yaitu TPC (*Total Plate Count*) (Fardiaz, 1992). Menurut SNI 7545.1;2009, metode penghitungan total bakteri adalah sebagai berikut; mengambil cawan petri yang medianya sudah ditumbuhi oleh bakteri; dihitug secara manual pada koloni yang terlihat menggunakan colony counter; selanjutnya jumlah koloni dapat dihitug menggunakan Total Plate Count (TPC) dengan rumus:

$$N \text{ (cfu/ } \mu\text{l)} = n(\text{cfu})/100(\mu\text{l}) \times 10^x \times 1000 \text{ atau,}$$

$$N \text{ (cfu/ml)} = n(\text{cfu})/0,1(\text{ml}) \times 10^x$$

keterangan: jika volume yang diinokulasikan 0,1 ml

n = jumlah koloni bakteridalam plate agar

10^x = seri pengenceran


Mikroorganisme yang diperoleh dengan menggunakan metode TPC hanya merupakan jumlah perkiraan dan terdapat kemungkinan bahwa jumlah mikroorganisme yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan mikroorganisme sesungguhnya (Singleton, 1992).

5. Morfologi Bakteri

Bakteri berkembang biak dengan membelah diri dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bakteri mempunyai beberapa organel yang dapat melaksanakan beberapa fungsi hidup (Waluyo 2004). Spesies bakteri dapat dibedakan berdasarkan morfologi (bentuk), komposisi kimia (umumnya dideteksi dengan reaksi biokimia), kebutuhan nutrisi, aktivitas biokimia, dan sumber energi (sinar matahari atau bahan kimia) (Pratiwi 2008). Dinding sel bakteri yang kaku dapat mempertahankan bentuknya dan melindungi sel dari perubahan tekanan osmotik antara sel dengan lingkungannya. Dinding sel bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan membran sel, sementara dinding sel bakteri gram negatif memiliki tiga lapisan: membran dalam, membran luar dan lapisan peptidoglikan yang lebih tipis. Bakteri merupakan organisme prokariot yaitu memiliki kromosom tunggal dan tidak memiliki nukleus. Untuk mengemas kromosom di dalam sel, DNA menggulung (coil dan supercoil); suatu proses yang

diperantarai oleh sistem enzim DNA girase. Ribosom bakteri berbeda dengan ribosom eukariot, menjadikannya target untuk terapi antibakteri. Bakteri juga mengandung DNA tambahan dalam bentuk plasmid (Gillespie 2008). Menurut Gillespie (2008) bakteri diklasifikasikan berdasarkan bentuknya: kokus berbentuk sferis, *Bacillus* berbentuk panjang dan tipis, dengan kokobasilus diantara bentuk keduanya dan ada juga *Bacillus* berbentuk melengkung dan spiral dengan panjang lengkungan yang berbeda. Menurut Pratiwi (2008) bentuk-bentuk bakteri yaitu bulat (tunggal: coccus, jamak: cocci), batang atau silinder (tunggal: bacillus, jamak: bacilli), dan spiral yaitu berbentuk batang melengkung atau melingkar-lingkar. Kokus gram positif dibagi menjadi dua kelompok utama: stafilokokus (katalase positif), contoh patogen utamanya yaitu *Staphylococcus aureus* dan *Streptokokus* (katalase negatif), contoh patogen utamanya yaitu *Streptococcus pyrogenes*. Kokus Gram negatif meliputi *Neisseria meningitides*, sedangkan Kokobasilus Gram negatif meliputi patogen saluran nafas *Haemophilus* dan *Bordetella*, agen zoonotik seperti *Brucella* dan *Pasteurella* (Gillespie 2008). *Bacillus* Gram positif dibagi menjadi *Bacillus* yang membentuk spora dan *Bacillus* yang tidak membentuk spora. Kelompok yang membentuk spora dibagi menjadi organisme aerob (*Bacillus*) dan organisme anaerob (*Clostridium*). *Bacillus* bakteri Gram negatif meliputi keluarga bakteri fakultatif *Enterobacteriaceae* yang merupakan bagian dari flora normal pada manusia dan hewan dan dapat ditemukan di lingkungan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia*, *Proteus* dan *Yersinia* (Gillespie 2008).

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu dilakukan dengan tujuan untuk menemukan spesies dan jumlah kelimpahan bakteri dari sedimen laut.

C. Variabel Penelitian

Jenis variabel pada penelitian merupakan variabel tunggal yaitu bakteri sedimen laut.

D. Definisi Operasional Variabel

Isolasi merupakan proses pengambilan mikroorganisme sedimen laut kemudian menumbuhkan pada media NA untuk diperoleh biakan murni. Pengamatan morfologi merupakan proses karakterisasi secara makroskopik dan mikroskopik yang terdapat di sedimen laut. Bakteri sedimen merupakan mikroorganisme yang hidup

pada sedimen pesisir laut pulau dutungan. Perhitungan kelimpahan bakteri merupakan metode yang diterapkan untuk mengetahui jumlah total bakteri menggunakan *colony counter* kemudian dihitung menggunakan TPC (*Total Plate Count*).

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bola arus; pH paper; *Secchi disk*; tongkat kedalaman; botol sampel, *cool box*; refraktometer; botol Winkler, gelas ukur; gelas Erlenmeyer, pipet tetes, centrifuge, mikropipet, cawan petri, spreader, *hotplate magnetic stirrer*, bunsen, autoklaf, inkubator shaker, *colony counter*, tabung reaksi, jarum ose, object glass, beaker glass, mikroskop dan kertas label.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel dari sedimen laut, aluminium foil, plastik buah, karet, masker, sarung tangan, tissue, korek api, alkohol 70%, NA (*Natrium Agar*), akuades steril, larutan pewarnaan gram (alkohol 96%, kristal violet, iodin/lugol, safranin) dan minyak imersi.

F. Prosedur Kerja

1. Sterilisasi alat

Sebelum menggunakan alat-alat dalam penelitian dilakukan sterilisasi alat dengan dicuci dengan menggunakan sabun/detergen kemudian dibilas dengan air mengalir. Kemudian disterilisasi di oven pada suhu 180° C selama 2 jam.

2. Pengambilan sampel

Sampel berupa sedimen laut yang diambil menggunakan metode *porposive* sampling di perairan kepulauan Dutungan kabupaten Barru dengan menggunakan botol kaca yang sebelumnya disterilkan, disimpan dalam *cool box* dan selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Pengambilan sampel dilakukan di tiga stasiun tanpa melakukan pengulangan yang mewakili kepulauan Dutungan (timur: stasiun 1, utara: stasiun 2, barat: stasiun 3).

3. Perhitungan Bakteri

Perhitungan bakteri dilakukan dengan metode agar tuang. Sampel bakteri yang berasal dari substrat pada masing-masing wadah pemeliharaan diambil sebanyak 1 gr ke dalam tabung reaksi dan diencerkan hingga 10^{-5} . Pengenceran dilakukan menggunakan larutan fisiologis (8,5 gr NaCl dalam 1 liter akuades) sebanyak 9 ml dan diaduk menggunakan vortex sehingga homogen. Setiap tahapan tersebut dilakukan secara aseptik untuk menghindari kontaminasi oleh bakteri lain (Hadiroseyani, 2007). Kemudian dihitung Total Plate Count (TPC) dengan rumus:

$$N (\text{cfu}/ \mu\text{l}) = n(\text{cfu})/100(\mu\text{l}) \times 10^x \times 1000 \text{ atau,}$$

$$N (\text{cfu}/\text{ml}) = n(\text{cfu})/0,1(\text{ml}) \times 10^x$$

Keterangan: jika volume yang diinokulasikan 0,1 ml

n = jumlah koloni bakteridalam plate agar

10^x = seri pengenceran

4. Pengamatan morfologi secara makroskopik

Pengamatan makroskopik dengan cara mengidentifikasi bentuk, ukuran, warna, permukaan dan tepi koloni mikroorganisme tumbuh. Koloni dengan ciri-ciri dan bentuk yang berbeda diambil dan dilakukan pewarnaan gram.

5. Pengamatan morfologi secara mikroskopik

Pewarnaan gram dilakukan untuk mengetahui morfologi sel bakteri dan untuk mengetahui kelompok bakteri berdasarkan gram negatif dan gram positif. Kaca objek yang telah dibersihkan dengan menggunakan alkohol diolesi inokulum secukupnya kemudian difiksasi di atas api hingga kering. Kaca objek diletakkan pada rak dan digenangi dengan larutan kristal violet dan didiamkan selama satu menit. Larutan kristal violet dibuang dengan memiringkan kaca objek dan dibilas dengan akuades dan dikeringkan dengan kain tissue. Selanjutnya kaca objek digenangi dengan larutan iodine selama dua menit dan dibilas dengan alkohol 96%. Pengamatan dengan mikroskop dilakukan dengan pembesaran 100 kali pada lensa objek dan pembesaran 10 kali pada lensa okuler (Nurfiaty, 2017).

6. Kemudian dilanjutkan dengan uji biokimia meliputi:

a. Uji indol (media *Sulphide Indole Motility* (SIM))

Inokulasikan secara tusuk tegak (stab) biakan bakteri pada medium sim atau ose pada medium tripton 1% broth. Kemudian biarkan satu tabung tidak diinokulasikan dan gunakan sebagai kontrol, setelah itu inkubasikan pada suhu 37°C selama 48 jam kemudian tambahkan 5 tetes (1 ml) reagen kovac's kedalam setiap tabung termasuk kontrol. Kocoklah perlahan-lahan dan biarkan tabung berada dalam posisi tegak. Amati permukaan medium. Terbentuknya cincin merah tua pada permukaan medium menunjukkan indol positif.

b. Methyl red

Inokulasikan ke dalam medium MR-VP dengan 1 jarum ose biakan bakteri. Inkubasi selama 72 jam pada suhu 37°C. Tetes 3 tetes reagen Methyl Red. Amati permukaan medium. Terbentuknya warna merah menunjukkan uji Methyl Red positif.

c. Uji Voges-proskauer


Inokulasikan medium MR-VP dengan 1 ose biakan yang telah disiapkan. Inkubasi pada suhu 37°C selama 72 jam. Tambahkan 0,6 ml reagen α -naftol 5% dan 0,5 ml KOH 40%. Lalu kocok perlahan-lahan selama beberapa menit. Amati permukaan medium. Terbentuknya warna merah tua menunjukkan uji VP positif.

d. Uji Citrat

Inokulasikan biakan bakteri kedalam medium SCA miring. Biarkan 1 tabung tidak diinokulasikan dan gunakan sebagai kontrol. Inkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C. Amati pertumbuhan mikroba. Perubahan medium dari hijau menjadi biru menunjukkan uji citrat positif.

G. Analisa Data

Hasil analisa ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Parameter lingkungan yang mempengaruhi kelimpahan dan jenis bakteri.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Parameter Lingkungan

Kehidupan mikroba ditentukan oleh kualitas lingkungannya, dengan demikian dilakukanlah pengukuran dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Parameter Lingkungan

No	Parameter	Stasiun		
		A	B	C
1	Kedalaman	120 cm	131 cm	122 cm
2	pH	5	5	5
3	Salinitas	25‰	25‰	25‰
4	Arus (menit)	01:45	03:58	03:52
5	Suhu	31°C	31°C	32°C
6	DO	0,29 mg/l	0,25 mg/l	0,29 mg/l
7	Kecerahan	Sampai dasar	Sampai dasar	Sampai dasar
8	Waktu	10:00	13:45	15:48
9	Arah	Utara	Timur	Selatan

2. Kelimpahan Bakteri Sedimen Laut

Hasil penelitian tentang kelimpahan bakteri ditunjukkan melalui tabel berikut dengan metode TPC (*Total Plate Colony*) dengan mengambil cawan petri berisikan media yang ditumbuhi oleh bakteri dan dihitung secara manual menggunakan *Colony Counter*, hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut:


$$N (\text{cfu}/\mu\text{l}) = n(\text{cfu})/100(\mu\text{l}) \times 10^x \times 1000 \text{ atau,}$$

$$N (\text{cfu}/\text{ml}) = n(\text{cfu})/0,1(\text{ml}) \times 10^x$$

Tabel 4.2 Kelimpahan bakteri

No	Stasiun	Kelimpahan
1	I	$2,4 \cdot 10^6$ Cfu/ml
2	II	$5,9 \cdot 10^6$ Cfu/ml
3	III	$7,6 \cdot 10^6$ Cfu/ml

Gambar 4.2 Diagram lingkaran kelimpahan bakteri di 3 stasiun



3. Pengamatan Makroskopik

Isolat bakteri yang berbeda dimurnikan diinkubasi selama 2x24 jam pada suhu 37° C sehingga diperoleh kultur koloni mikroba murni.

Tabel 4.3 Pengamatan makroskopik

No	Kode Isolat	Ukuran	Bentuk	Warna	Elevasi	Margin	Kerak optik
1	A.1	Besar	<i>Circular</i>	Putih susu	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	Mengkilap
2	A.2	Kecil	<i>Circular</i>	Putih susu	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Mengkilap
3	A.3	Kecil	<i>Irregular</i>	Putih susu	<i>Umbonate</i>	<i>Undulate</i>	Mengkilap
4	A.4	Sedang	<i>Irregular</i>	Putih susu	<i>Convex</i>	<i>Undulate</i>	Mengkilap
5	A.5	Sedang	<i>Irregular</i>	Putih susu	<i>Umbonate</i>	<i>Entire</i>	Mengkilap
6	A.6	Sedang	<i>Circular</i>	Putih tulang	<i>Convex</i>	<i>Undulate</i>	Mengkilap

7	A.7	Sedang	<i>Circular</i>	Putih gelap	<i>Convex</i>	<i>Undunate</i>	Mengkilap
8	B.1	Titik	<i>Circular</i>	Putih susu	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	Mengkilap
9	B.2	Kecil	<i>Circular</i>	Putih susu	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Mengkilap
10	B.3	Sedang	<i>Filamentous</i>	Putih susu	<i>Raised</i>	<i>Rhizoid</i>	Mengkilap
11	B.4	Sedang	<i>Rhizoid</i>	Putih susu	<i>Raised</i>	<i>Rhizoid</i>	Mengkilap
12	B.5	Besar	<i>Filamentous</i>	Putih susu	<i>Raised</i>	<i>Filamentous</i>	Mengkilap
13	B.6	Sedang	<i>Rhizoid</i>	Putih susu	<i>Flat</i>	<i>Filamentous</i>	Mengkilap
14	B.7	Besar	<i>Rhizoid</i>	Putih susu	<i>Flat</i>	<i>Rhizoid</i>	Mengkilap
15	C.1	Besar	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Lobate</i>	Tembus cahaya
16	C.2	Besar	<i>Filamentous</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Filamentous</i>	Tembus cahaya
17	C.3	Sedang	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Raised</i>	<i>Lobate</i>	Tidak tembus cahaya
18	C.4	Kecil	<i>Circular</i>	Abu-abu	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
19	C.5	Sedang	<i>Rhizoid</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Raised</i>	Tidak tembus cahaya
20	C.6	Sedang	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Raised</i>	<i>Undulate</i>	Tidak tembus cahaya
21	C.7	Titik	<i>Circular</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
22	C.8	Kecil	<i>Spindle</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	Tidak tembus cahaya
23	C.9	Sedang	<i>Circular</i>	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
24	C.10	Titik	<i>Circular</i>	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	Bening
25	C.11	Sedang	<i>Circular</i>	Kuning	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
26	C.12	Kecil	<i>Circular</i>	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
27	C.13	Sedang	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	Tembus cahaya
28	C.14	Sedang	<i>Rhizoid</i>	Merah	<i>Raised</i>	<i>Rhizoid</i>	Tidak tembus cahaya
29	C.15	Sedang	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Raised</i>	<i>Lobate</i>	Tidak tembus cahaya
30	C.16	Kecil	<i>Circular</i>	Abu-abu	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
31	C.17	Titik	<i>Circular</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
32	C.18	Kecil	<i>Circular</i>	Merah	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
33	C.19	Kecil	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Raised</i>	<i>Undulate</i>	Tembus cahaya dan berkerut
34	C.20	Sedang	<i>Circular</i>	Bertepung	<i>Undulate</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
35	C.21	Kecil	<i>Circular</i>	Abu-abu	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
36	C.22	Kecil	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	Tidak tembus cahaya
37	C.23	Kecil	<i>Circular</i>	Abu-abu	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
38	C.24	Kecil	<i>Circular</i>	Kuning	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya
39	C.25	Kecil	<i>Irregular</i>	Abu-abu	<i>Convex</i>	<i>Lobate</i>	Tidak tembus cahaya
40	C.26	Kecil	<i>Circular</i>	Putih bertepung	<i>Undulate</i>	<i>Entire</i>	Tembus cahaya bertepung
41	C.27	Sedang	<i>Circular</i>	Putih susu	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	Kasar
42	C.28	Kecil	<i>Circular</i>	Putih susu	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	Tidak tembus cahaya

B. Pembahasan

Kepulauan Dutungan ini merupakan salah satu pulau yang dikategorikan masih asri yang terdapat di kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru dengan jarak dari daratan utama dengan ujung selatan pulau 500 m dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menit menggunakan perahu motor. Daerah daratan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh rumput ilalang hijau. Selain itu ada deretan hutan jati di sekitarnya. Pada daerah pantai terdapat dua kawasan yakni pasir putih dan kawasan hutan bakau, kepulauan ini terdapat biota yang berperan penting menentukan stabilitas kehidupan dan juga sebagai media pertumbuhan mikroorganisme seperti padang lamun, terumbu karang, bulu babi, kerang-kerangan, timun laut serta berbagai jenis ikan dan semacamnya. Lokasi sampling ini dilakukan di 3 stasiun, stasiun I disebelah utara pulau, stasiun II disebelah timur pulau dan stasiun III disebelah selatan pulau.

Setelah dilakukan penelitian kelimpahan bakteri di setiap stasiun didapatkan 42 jenis isolat dan yang paling melimpah adalah stasiun III (11 isolat) dengan yang mendominasi adalah *Actynomicetes*, *Bacillus* dan *Streptococcus*. Pada stasiun II 7 isolat dengan jenis yang mendominasi adalah *Bacillu* dan *Streptococcus* dan pada stasiun I yang mendominasi adalah *Streptococcus* dengan jumlah isolat yang berberda adalah 7. Terjadinya perbedaan koloni disetiap stasiun karena disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik, faktor biotik tidak lain adalah habitat dan faktor biotik adalah pH, kedalaman, salinitas, arus, suhu, DO dan kecerahan.

Pada stasiun I dengan pengenceran 10^{-1} sampai 10^{-5} menghasilkan 7 isolat yang berbeda, pada pengenceran 10^{-3} terdapat 2 isolat, pengenceran 10^{-4} terdapat 3 isolat, pengenceran 10^{-5} terdapat 2 isolat. Pada stasiun II dengan pengenceran 10^{-1} sampai 10^{-5} terdapat 7 isolat, pengenceran 10^{-1} terdapat 2 isolat, pengenceran 10^{-2} terdapat 4 isolat, pengenceran 10^{-3} terdapat 1 isolat. Pada stasiun III dengan pengenceran 10^{-1} sampai 10^{-5} terdapat 28 isolat, pengenceran 10^{-1} terdapat 11 isolat, pengenceran 10^{-2} terdapat 7 isolat, pengenceran 10^{-3} terdapat 1 isolat, pengenceran 10^{-4} terdapat 2 isolat dan pengenceran 10^{-5} terdapat 7 isolat.

1. Stasiun I

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan 7 isolat yang dilanjutkan uji presumtif, uji biokimia dan identifikasi. Pada stasiun ini ditemukan 1 genera yang mendominasi yakni *Streptococcus* yang merupakan struktur sel terdiri dari kapsul asam hialuronidat, dinding sel, fimbriae, dan membran sitoplasma. Kapsul asam hialuronat diperlukan untuk resistensi terhadap fagositosis dan perlekatan bakteri pada sel epitel, bakteri bersifat gram positif, nonmotil dan tidak membentuk spora, pH pada stasiun ini adalah 5. Menurut Lamont (2006) *Streptococcus* umumnya memiliki kisaran toleransi asam pada nilai pH 4 – 5,7, (pH optimal untuk pertumbuhan) sehingga dapat dikategorikan bahwa bakteri yang terdapat pada stasiun ini cukup baik untuk pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri pada umumnya, nilai pH berkisar 7,68 – 8,05. Seperti yang disebutkan Sidharta (2000) bakteri tahan terhadap perubahan kecil pH dalam rentang 6-9

(Sidharta, 2000). Nilai pH optimum pertumbuhan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Berbagai kelompok mikroba yang mampu hidup pada kondisi ekstrim, baik pada pH rendah (asidofilik), pH tinggi (alkalofilik). Menurut Srikandi (1992) sebagian besar bakteri akan tumbuh optimal pada pH sekitar 6,5-7,5 dan pada pH dibawah 5 dan diatas 8,5 sebagian besar bakteri tidak mampu tumbuh kecuali bakteri asam asetat dan bakteri oksidasi sulfur. Bakteri laut dapat tumbuh pada pH 6.5- 8.5 namun pertumbuhan optimumnya 7.2-8.5 (Salle, 2000). Hasil penelitian diperoleh kisaran pH dari 4 stasiun yaitu 6.77-7.23, sangat mendukung pertumbuhan bakteri coliform dan E. coli. Nilai pH berada pada kisaran asam lemah disebabkan buangan dari pemukiman penduduk yang berada di sekeliling pantai.

Oksigen yang terlarut pada stasiun 1 yakni 0,25 mg/l dengan demikian oksigen yang terlarut juga dibutuhkan oleh bakteri pengurai untuk menguraikan bahan pencemar organik dalam air karena semakin tinggi konsentrasi DO maka bahan organik dalam air juga tinggi. Hal tersebut berperan penting dalam kelangsungan hidup mikroorganisme, kandungan oksigen terlarut pada umumnya dengan tujuan untuk mengetahui perubahan proses perubahan kimia dan biologi yang berlangsung. Pada stasiun ini memiliki kedalaman 120 cm, hal tersebut berkaitan dengan pengukuran oksigen terlarut bahwasanya pada lapisan permukaan, kandungan oksigen cenderung meningkat kemudian semakin bertambah kedalaman, kandungannya semakin berkurang. Rendahnya DO di sekitar dasar karena adanya dekomposisi bahan organik yang dimanfaatkan oksigen di dasar perairan. Proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen di lapisan permukaan juga merupakan faktor

yang mempengaruhi tingginya kadar oksigen di permukaan. Oksigen terlarut menurut Effendi (2003), oksigen terlarut sangat diperlukan untuk respirasi tumbuhan dan hewan selain dari pada itu oksigen terlarut diperairan juga diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi bahan organik. Pengukuran salinitas pada stasiun ini adalah 25‰ hal tersebut sesuai dengan pernyataan Narulita (2011) bahwa salinitas optimal yang baik untuk pertumbuhan bakteri laut adalah antara 25-40 ‰. Pada tingkat kecerahan pada stasiun ini sampai ke dasar dengan kedalaman 120 cm, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya aktivitas manusia di perairan ini.

Dari hasil penelitian pada stasiun ini *Streptococcus* merupakan genera yang mendominasi dengan sifat gram positif. Bakteri ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi pencernaan pada manusia. Patogenitas disebabkan toksin ekstra selular yang berasal dari aktivitas enzim kolagenase, hyaluronidase dan deoxyribonuclease. Levkovska dan Zasipka (2013) menyatakan bahwa berbagai mikroorganisme indikator digunakan untuk monitoring sosio-higienis, misalnya jumlah coliform, fekal coliform, dan fekal *Streptococcus*. Hal ini untuk menganalisis kontaminasi fekal di perairan untuk keperluan rekreasi dan sebagai indikator resiko kesehatan. Pada stasiun ini *Streptococcus* telah mendominasi diduga karena pintu utama untuk masuk ke pulau Dutungan ini, limbah domestik berkaitan dengan bakteri tersebut. Bakteri yang dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran suatu perairan antara lain *Coliform*, *Salmonella* dan *Streptococcus* (Wolff dalam Feliatra, 2002). Bakteri

Streptococcus dapat dijumpai pada perairan yang telah terkontaminasi oleh kotoran hewan berdarah panas, manusia atau perairan yang tercemar oleh bahan organik.

Hasil kelimpahan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada stasiun I $2,4 \cdot 10^6$ Cfu/ml, dengan dilakukannya pengukuran parameter lingkungan merupakan faktor ketertarikan untuk menetap pada lingkungan tersebut namun jumlah kepadatan pada stasiun ini paling terendah.

Dari hasil penelitian sebelumnya telah menemukan adanya bakteri *Streptococcus* yang dilakukan oleh Sunaryanto (2012) dari perairan atau sedimen laut di Pantai Selatan Yogyakarta. Selain itu peneliti juga berhasil memurnikan 93 isolat *Actynomicetes*, 41% masuk dalam genus *Streptomycineae*, 18% genus *Micromonosporineae* dan 17% *Corynebacterineae*, serta beberapa isolat teridentifikasi sebagai *Micrococcineae*, *Streptosporangineae*, *Frankineae*, *Propionibacterineae*, *Pseudonocardineae*, dan *Proteobacteria*. Hasil uji sitotoksisitas menggunakan sel kanker A549 menunjukkan bahwa sebanyak 17 isolat *Actynomicetes* memiliki sifat sitotoksik terhadap sel kanker A549. Dari 17 isolat yang aktif terhadap sel kanker A549, sebagian besar teridentifikasi sebagai *Streptomyces* sp.

Dengan berhasilnya diisolasi bakteri genus *Streptococcus* ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk, 2009 bahwa kemampuan bakteri ini dapat melakukan dekonjugasi yang berpotensi sebagai probiotik yang dapat menurunkan kolestrol, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Tanaka (1999), empedu merupakan mekanisme utama dalam melakukan dekonjugasi.

2. Stasiun II

Dari hasil penelitian pada stasiun ini parameter lingkungan hampir sama dengan stasiun sebelumnya dengan kedalaman 131 cm sebagaimana telah dinyatakan bahwa tingkat oksigen terlarut tergantung pada tingkat kedalaman air, semakin dalam air laut maka semakin rendah oksigen terlarut (Riley dan Chester, 1971). Sebagaimana pada stasiun ini oksigen yang terlarut adalah 0,29. Salinitas, suhu dan kedalaman serta pH tetap sama pada stasiun sebelumnya.

Selain dari pada itu pada stasiun ini terdapat 2 genus yang mendominasi *Bacillus* dan *Streptococcus*. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwasanya (Hatmanti, 1998) *Bacillus* yang berhasil diisolasi dari habitat laut dan rawa diantaranya meliputi *B. badius*, *B. firmus*, *B. marinus*, *B. psychrosaccharolyticus*. Keempat jenis tersebut diisolasi dari sedimen maupun air laut atau rawa. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapatnya *Bacillus* jenis lain yang dapat diisolasi dari habitat tersebut, baik pada sedimen, air, biota maupun pada produk makanan yang berasal dari perairan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya enam jenis pada hasil penelitian dari perairan Pantai Meru Betiri Jawa Timur, yaitu *B. licheniformis*, *B. macquariensis*, *B. apiarius*, *B. macerans*, *B. marinus*, dan *B. circulans*. Keenam jenis tersebut diisolasi dari daerah hutan, semak, pantai berpasir, serta estuarin.

Bacillus sp. merupakan bakteri laut paling umum yang mampu mengkonsumsi dan membantu mendegradasi bahan organik. Menurut Ruyitno

(2004), *Bacillus* sp. adalah genus bakteri laut yang umumnya mengkonsumsi material organik yang mudah larut dan mudah terurai. Jumlah kepadatan pada stasiun ini yakni $5,9 \cdot 10^6$ Cfu/ml.

Dari identifikasi yang telah dilakukan dan ditemukannya *Bacillus* dalam sedimen laut sejauh ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Thontowi (2013) bahwa bakteri dari genus *Bacillus* dapat digunakan dalam bidang industri seperti pendegradasi alkana. Jenis mikroba pendegradasi minyak berada dalam lingkungan laut. Terkadang mereka terisolasi sebagai bakteri senyawa hidrokarbon aromatik dan pendegradasi alkana (Riffiani, 2010).

3. Stasiun III

Pada stasiun ini dengan kondisi lingkungan atau parameter lingkungan tetap hampir sama dengan stasiun sebelumnya. Tingkat kecerahan, salinitas dan pH sama pada stasiun sebelumnya, berbeda dengan kedalaman yang mencapai 122 cm dan oksigen terlarut 0,29 mg/l sehingga bila dibandingkan dengan stasiun II lebih rendah karena dipengaruhi oleh faktor kedalaman air. Pada stasiun ini ada 3 genus yang mendominasi yakni *Actynomicetes*, *Bacillus* dan *Streptococcus*. Hal yang berbeda dengan kedua stasiun sebelumnya, pada stasiun ini berhasil diisolasi dari genera *Actynomicetes*. Dari ketiga stasiun tempat sampling, hanya pada stasiun ini terdapat genus *Actynomicetes* dengan demikian populasi genus tersebut kurang dijumpai pada pulau Dutungan. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan diteliti oleh Goodfellow et al. (1983) bahwa jumlah *Actynomicetes* yang dapat diisolasi dari laut

cenderung lebih sedikit dibandingkan dari tanah dan sediment air payau. Menurut Goodfellow dan Haynes (1984) *Actynomicetes* hanya mewakili sebagian kecil komponen dari total populasi bakteri dalam sedimen laut. Populasi *Actynomicetes* yang paling banyak ditemukan adalah dari tanah dan sedimen payau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa populasi *Actynomicetes* terbanyak terdapat di daerah payau. Menurut Srivibole (2000) kondisi air payau diduga memberikan kondisi yang optimum untuk kebutuhan hidup *Actynomicetes* seperti struktur tanah, kelembapan, dan pH lingkungan. Kelimpahan pada stasiun ini mencapai $7,6.10^6$ Cfu/ml yang merupakan tingkat kepadatan tertinggi dari ketiga stasiun tersebut. Terdapatnya padang lamun pada stasiun ini juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, sebagaimana pernyataan Chamber (2006) salah satu mikroorganisme yang ditemukan memiliki kepadatan yang melimpah adalah bakteri. Bakteri asosiasi lamun memiliki aktivitas sebagai antimikroba dan antijamur, namun data mengenai jenis-jenis bakteri yang berasosiasi dengan jenis lamun tertentu sangat terbatas untuk itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis lamun dan bakteri asosiasinya.

Dari hasil penelitian didapatkan genus *Actynomicetes* yang membedakan dari kedua stasiun sebelumnya. Dengan demikian *Actynomicetes* merupakan kelompok mikroba yang tersebar luas yang memiliki kemampuan mensintesa metabolit sekunder (Cross, 1998). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryanto, dkk 2009 bahwa *Actynomicetes* laut dapat menghasilkan antimikroba dengan menggunakan metode uji antibakteri dan antijamur dengan kertas cakram serta menggunakan mikroba uji *Eschereschia coli*, *Streptococcus aereus*, *Pseudomonas*

aeruginosa, *Bacillus subtilis*, *Aspergillus niger*, dan *Candida albican*. *Eschereschia coli*, *Streptococcus aereus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis* ditumbuhkan pada media nutrien agar dan *Aspergillus niger*, dan *Candidaalbican* ditumbuhkan pada *Potato Dextrose Agar*. Keduanya dilakukan dengan metode pour plate methods. Dengan hasil diperoleh informasi bbebrapa isolat *Actynomicetes* mampu menghambat mikroba gram bersifat negatif dan positif

Pengecatan gram isolat bakteri sedimen laut dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri agar dapat diklasifikasikan sebagai bekteri gram negatif maupun gram positif, sebelum dilakukan pengecatan terlebih dahulu dilakukan fiksasi, hal ini lakukan untuk merekatkan sel mikroba pada gelas objek, membunuh organisme secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk dan strukturnya, mengubah daya ikat zat warna, membuat sel-sel mikroba lebih kuat dan mecegah pecahnya sel yang disebabkan oleh enzim-enzim yang dikandungnya sendiri penyerapan warna yang dilakukan oleh bakteri gram positif akan lebih kuat karena susunan pepetidoglikan yang lebih tebal dibanding dengan bakteri gram negarif. Warna yang dihasilkan oleh gram positif adalah biru keunguan sedangkan bakteri gram negatif menghasilkan warna ungu muda sampai merah muda (Kristian, 200).

Hasil kelimpahan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada stasiun I $2,4 \cdot 10^6$ Cfu/ml, pada stasiun II yaitu $5,9 \cdot 10^6$ Cfu/ml dan pada stasiun III yaitu $7,6 \cdot 10^6$ Cfu/ml. Stasiun III yang merupakan kelimpahan tertinggi diantara ketiga stasiun sampling dimana daerah tersebut merupakan daerah bebatuan juga

terdapatnya biota lain seperti padang lamun. Ekosistem padang lamun memberikan habitat bagi berbagai makroorganisme dan mikroorganisme laut. Kelimpahan dan keanekaragaman organisme yang hidup di padang lamun umumnya tinggi dibanding dengan dengan habitat lain. Salah satu faktor ketertarikan organisme untuk menetap di lingkungan tersebut adalah padang lamun tergolong habitat yang produktif, sehingga mampu menyediakan makanan untuk kelangsungan hidup organisme yang berasosiasi. Selain itu sangat baik sebagai tempat berlindung dan sebagai daerah asuhan dalam siklus hidup kelompok hewan maupun tumbuhan tersebut (Tomascik et al. 1997). Salah satu mikroorganisme yang ditemukan dalam jumlah yang melimpah ditemukan di padang lamun adalah bakteri. Bakteri merupakan komponen penting dalam proses mineralisasi pada ekosistem padang lamun. Bakteri selain berada di sekitar lamun juga berasosiasi dengan lamun, bakteri tersebut hidup pada helai daun dan cabang-cabang rimpang yang tegak. Beberapa bakteri asosiasi lamun memberikan kontribusi untuk pertahanan inangnya dengan cara mengeksresi antibiotik dan substansi bioaktif lainnya.

Bakteri memainkan peran penting dalam ekosistem mangrove. Keberadaan dan keanekaragaman bakteri dalam ekosistem mangrove dipengaruhi oleh faktor salinitas, pH, fisik, iklim, vegetasi, nutrisi dan lokasi (Hrenovic et al., 2003). Diketahui beberapa bakteri fotosintesis memainkan peranan dalam ekosistem mangrove melalui proses fotosintesis, fiksasi nitrogen, metanogenesis, produksi enzim dan penghasil antibiotik (Lyla dan Ajmal, 2006). Bakteri merupakan penentu dalam siklus nitrogen pada lingkungan mangrove. *Cyanobacteria* laut adalah

komponen mikrobiota penting yang berperan dalam penyusunan sumber nitrogen pada ekosistem mangrove (Kathiresan dan Bingham, 2001). Aktivitas bakteri pada bahan organik adalah memineralisasi dan juga memisahkan karbon organik menjadi bentuk biomassa bakteri (Boulton dan Boon, 1991). Aktivitas bakteri dalam siklus unsur hara pada sedimen adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas bakteri tersebut tergantung pada ketersediaan karbon-karbon yang dioksidasi (Pollard et al., 1993). Daur bahan organik di laut sama dengan daur organik di lingkungan air tawar dan di darat. Karbon bersama-sama dengan unsur lainnya seperti fosfor (P) dan nitrogen (N) melalui proses fotosintesis menghasilkan jaringan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan hewan. Keduanya menghasilkan zat organik, jika mati dan membusuk dihasilkan bahan mentah untuk memulai daur bahan organik (Romimohtarto dan Juwana, 2001). Peran aktif bakteri mutlak diperlukan dalam proses dekomposisi di perairan mangrove. Bakteri akan menguraikan serasah secara enzimatik melalui peran aktif dari enzim proteolitik, selulolitik dan kitinolitik. Bakteri kelompok proteolitik berperan dalam proses dekomposisi protein adalah *Pseudomonas*, sedangkan kelompok bakteri yang berperan dalam proses dekomposisi selulosa adalah bakteri *Cytophaga*, *Sporocytophaga*, kelompok bakteri yang mendekomposisi kitin meliputi *Bacillus*, *Pseudomonas* dan *Vibrio* (Lyla dan Ajmal, 2006).

Menurut Kurniawan (2016), mikroba yang diisolasi dari tumbuhan yang menghasilkan bahan bioaktif telah diketahui memiliki aktivitas yang lebih besar dibandingkan aktivitas tumbuhan inangnya. Salah satu potensi bakteri tersebut

adalah sebagai sumber anti-bakteri patogen dan anti jamur patogen (anti-mikroba patogen). Bakteri endofit masuk ke dalam jaringan tanaman umumnya melalui akar, namun bagian tanaman yang terpapar udara langsung seperti bunga, batang dan kotiledon, juga dapat menjadi jalur masuk bakteri endofit. Mikroorganisme ini dapat hidup di dalam pembuluh vaskular atau di ruang intersel, akar, batang, daun dan buah (Simarmata, 2007). Lamun hidupnya menetap tidak dapat bergerak bebas, sehingga untuk melawan organisme pemangsa dan pelekatan mikro dan makroorganisme patogenik sangat tergantung pada mekanisme pertahanan kimia (Chamber et al., 2006). Selanjutnya dinyatakan bahwa terdapat asosiasi mikroorganisme dengan organisme laut yang diduga juga mensintesa metabolit sekunder dan mikroba yang diisolasi dari tumbuhan yang menghasilkan bahan bioaktif telah diketahui memiliki aktivitas yang lebih besar, bahkan dapat memiliki aktivitas yang lebih besar dibandingkan aktivitas tumbuhan inangnya. Jumlah isolat yang ditemukan berbeda pada setiap lokasi penelitian, perbedaan ini kemungkinan diakibatkan oleh perbedaan parameter lingkungan yang mendukung kehidupan bakteri. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Fardiaz (1989) bahwa jumlah populasi dan pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia dan struktur makanan yang tersedia pada lingkungan mikroorganisme tersebut.

Semua proses pertumbuhan bergantung pada reaksi kimiawi pertumbuhan bakteri juga sangat dipengaruhi suhu. Setiap spesies bakteri tumbuh pada suatu kisaran suhu tertentu. Atas dasar ini maka bakteri dapat diklasifikasikan sebagai: psikofil, yang tumbuh pada 0 sampai 30°C; mesofil, yang tumbuh pada 25 sampai

40°C; dan termofil, yang tumbuh pada suhu lebih dari 50°C (Pelczar dan Chan, 2010). Dengan demikian ketiga genus bakteri tersebut dapat dikategorikan sebagai bakteri mesofil yang tumbuh dengan baik pada suhu 31°C.

Berdasarkan pH-nya mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu (a) mikroba asidofil, adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 2,0 – 5,0, (b) mikroba mesofil (neutrofil), adalah mikroba yang dapat hidup pada pH 5,5 – 8,0, dan (c) mikroba alkalifil, adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8,4 – 9,5. Dengan demikian bakteri dapat digolongkan sebagai bakteri asidofil yang dapat hidup pada pH 5 (Keswandani, 2007).

Oksigen memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Selain itu, oksigen juga menentukan biologis yang dilakukan oleh organisme aerobik atau anaerobik (Salmin, 2005). Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari ketiga stasiun tersebut merupakan mikroba aerobik karena masih terdapatnya oksigen terlarut didalamnya.

Bakteri di lingkungan salinitas tinggi terbagi atas tiga kategori, yaitu organisme halo-resistant terdiri atas bakteri gram positif yang dapat mentoleransi konsentrasi kadar garam di perairan sebesar 6- 12%., organisme halo-tolerant terdiri atas bakteri yang mampu mentoleransi konsentrasi kadar garam di perairan sebesar 0,5-30%., dan organisme halo-obligatory terdiri atas bakteri yang mampu merombak urea, pembentukan nitrogen, nitrifikasi, denitrifikasi, oksidasi sulfur, *decomposing selulose*, dan organisme fibrinolitik (Borin dkk. 2009; Nissenbaum, 1975; Kirkwood,

2007). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mikroba tersebut merupakan halo-tolerant yang dapat hidup pada 0,25 %.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis bakteri yang diperoleh pada penelitian ini yaitu *Streptococcus*, *Bacillus* dan *Actynomicetes*.
2. Kelimpahan bakteri di pesisir pantai kepulauan Dutungan Kabupaten Barru Pada stasiun I kelimpahan bakteri sebesar $2,0 \times 10^6$ Cfu/ml, stasiun II kelimpahan bakteri sebesar $5,9 \times 10^6$ Cfu/ml, serta pada stasiun III kelimpahan bakteri sebesar $7,6 \times 10^6$ Cfu/ml. Kelimpahan bakteri tertinggi terletak pada stasiun III. Dari ketiga stasiun tersebut diperoleh 42 isolat yang dimurnikan.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui spesies pada bakteri tersebut sehingga dengan detail dapat dilakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang kedokteran, industri, lingkungan dan sebagainya.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad Musthofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Semarang, Toha Putra, t.t, h 100
- Arifurahman. “Uji Viabilitas Bakteri *Indigenous* Air Perendaman Kenaf dalam Media Tepung Beras dan Lama Penyimpanan dengan Metode *Freeze Driying*”. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Astuti., Bachruddin, Z., Supadmo., Harmayani. E. “Pengaruh Pemberian Bakteri Asam Laktat terhadap Kadar Kolesterol Darah Ayam Broiler Strain Lohman”. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan, Fakultas FMIPA UNY, **)Fak. Peternakan UGM,***)Fak. Teknologi Pertanian UGM, MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.*
- Apriantono, A. dan D. Fardiaz. Analisa Pangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi PAU Pangan dan Gizi IPB. Bogor. 1989.
- Atlas, R.M., & Bartha, R. Fundamental and Applications. Philippines. *Microbial Ecology*. Addison-Wesley Publishing Company. 1993.
- Bissett, A., Burke, C., Cook, P.L.M., Bowman, J.P. Bacterial community shifts in organically perturbed sediments. *Environmental Microbiology*, 9 no. 1 (2007): p. 46 – 60.
- Borin, Sara, L. Brusetti, F. Mapelli, G. D’Auria, T. Brusa, M. Marzorati, A. Rizzi, M. Yakimov, D. Marty, G. J. de Lange, Paul van der Wielen. Sulfur cycling and methanogenesis primarily drive microbial colonization of the highly sulfidic urania deep hypersaline basin. 2009.
- Boulton, A.J. & P.I. Boon. A Review of Methodology Used to Measure Leaf Litter Decomposition on Lotic Environment: Time to Turn Over an Old Leaf. *Aust. J. Mar. Freshwater Res.* (1991)42:1–43.
- Chamber, L.D., K.R. Stokes, F.C. Walsh, R.J.K. Wood. Modern Approaches to Marine Antifouling Coatings. *Surface & Coatings Technology*, (2006), P:3642–3652.

- Cross, T. “*Actinomycetes: A Continuing Sources of New Metabolites*”. Invitation ONR Lecture . Postgraduate School of Studies in Biological Science, University of Bradford, Bradford DB7 1DP, Great Britain. 1988.
- B.B Jørgensen. “Bacterial Sulfate Reduction within Reduced Microniches of Oxidized Marine Sediments”. *Marine Biology* no. 41 (1977): p.7-17.
- Beksono, Hanindyo Riezky. “Uji Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Biji Kopi Robusta (*Coffea canophea*) Dengan Metode DPPH”. Skripsi. Jakarta. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Bogor: Pusataka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Duc, P.T.H. dkk. *Modelisation of Nitrification under Inhibited Environment by Moving Bed Bio-Film Reactor Technique*. Vietnam: Laboratory of Environmental Chemistry, Institute of Chemistry, Vietnamese Academy for Science and Technology. 2010.
- Effendi, H. *Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2003.
- Fachrul, M.F. Metode Sampling Bioekologi, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007.
- Fardiaz, S. Mikrobiologi Pangan I. Penerbit Gramedia Pusaka Utama. Jakarta: 1992.
- Fithriani, Dini. “Potensi Antioksidan *Caulerpa racemosa* di Perairan Teluk Hurun Lampung”. *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Gillespie, Stephen, Kathleen Bamford. At a Glance Mikrobiologi Medis dan Infeksi Edisi Ketiga. Jakarta (ID) : Erlangga. 2008.
- Goodfellow, M., William, S.T., & Mordarski. M., 1988. *Actinomycetes in Biotechnology*. Academic Press New York. p. 43-45
- Goodfellow.M. & Haynes J.A. 1984. *Actinomycetes* in marine sediment. In L.Ortiz-ortiz., L.F. Bojalil., V.Yakoleff (ed). Biological, Biochemical, and Biomedical aspect of *Actinomycetes*. Academic Press, Inc. Orlando.Fla. p. 457-472.
- Hakim N, et.al. Vegetasi, Karakteristik Tanah, dan Kolonisasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada lahan bekas tambang timah di Pulau Bangka. Analisis [tesis]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor-Bogor, 2008.

- Hatmanti.A. “Isolasi dan Identifikasi *Bacillus* spp Penghasil Enzim Amilase di Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur”. *Laporan Kerja Praktek*. Purwokerto: Fakultas Biologi-Universitas Jenderal Sudirman, 1998.
- Hedgesa J.I, Oadesb JM. Comparative organic geochemistries of soils and marine sediments.
- Hendrawati, T.H. Prihadi, N.N. Rohmah.. Analisis kadar Fosfat dan N-Nitrogen (Amonia, Nitrat, Nitrit) pada Tambak Air Payau Akibat Rembesan Lumpur Lapindo di Sidiarjo. 2007.
- Hrenovic, J., Damir, V., & Bozidar, S. 2003. Influence of Nutrients and Salinity on Heterotrophic and Coliform Bacteria in the Shallow, Karstic Zrmanja Estuary (Eastern Adriatic Sea). *Cevre Dergisi*. 46:29-37.
- Imada, C. *Isolation of Protase Inhibitor Producing Marine Micoorganism and General Propertis of Inhibitors*. Internasional Symposium on Marine Biotechnology, (2000): p. 29-31.
- Ingmanson, D.E. dan W.J. Wallace, 1989. *Oceanography: An Introduction*. Fourth edition. Wadsworth Publishing Company Belmont. California.
- Kennet, J.P.. *Marine Geology*. Printice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey. (1982): p. 752.
- Keswandani,R. Indentifikasi Titik Pengendalian Kritis Pengolahan Produk Daging Dan Ikan Industri Jasa Boga Golongan A – 2 Terhadap Cemaran Bakteri Salmonella Sp. *Skripsi*. Jurusan pengolahan hasil pertanian, Fakultas Pertanian. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2007.
- Kurniawan P. B., Radjasa, O. K., Aryani QQ. S. “Uji Antibakteri Patogen dan Jamur Patogen Dari Bakteri Lamun”. *Center of Marine Resource Studies*. 2010.
- Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag dan Diklat dengan Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia. *Samudra dalam Persfektif al-Quran dan Sains*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Lamont R.J., Burne,Lantz MS., and LeBlanc DJ. *Oral Microbiology and Immunology*. ASM Press.Washington DC (2006):. p 223-250.
- Lyla, P.S. & K.S. Ajmal. 2006. Marine Microbial Diversity and Ecology: Importance and Future Perspectives. *Current Science*. 90:1325-1335.
- Kathiresan, K. & B.L. Bingham. 2001. *Biology of Mangrove and Mangrove Ecosystems*. Centre of advanced Study in Marine Biology, Annamalai

University. Huxley College of Environmental Studies, Western Washington University. Annamalai, India.

Levkovska, V. Y and L. G. Zasiyka. "Decision making criteria and indicators for monitoring of sea water quality in the recreational zones". *Journal of Health Science*. 3 no. 1(2013): p. 675-682.

Lutfi. *Kimia Lingkungan*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2004.

Millero, F. J. & Sohn, M. L. *Chemical Oceanography*. CRC Press Inc. Boca Raton. Ann Arbor, 1992.

Musdalifah. "Distribusi dan Kelimpahan Bakteri *Enterococcus* spp. di Perairan Terumbu Karang Kepulauan Spermonde". *Skrpsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, 2013.

Narulita, D.S. "Analisis Tingkat Pencemaran Bakteri Coliform dan Kaitannya dengan Parameter Oseanografi pada Perairan Pantai Kab. Maros". *Skrpsi*. Makassar: Jurusan Ilmu Kelautan, FIKP UNHAS, 2011.

Noviani, Risa. Urgensi dan Mekanisme Biosintesis Metabolit Sekunder Mikroba Laut. *Dikti* 5 no. 2 (2008).

Okazaki S., N. Kishimoto, & T. Fujita.. Isolation and phylogenetic characterization of microbial consortia able to degrade aromatic hydrocarbons at high rates. *Microbes. Environ.* (2006). no 21. p:44-52.

Pandey R, et al. Analysis of histone acetyltransferase and histone deacetylase families of *Arabidopsis thaliana* suggests functional diversification of chromatin modification among multicellular eukaryotes. *Nucleic Acids Research*, 30 No 23, (1 December 2002): p. 5036–5055.

Pelczar, M.J., E.C.S. Chan, and N.R. Krieg, *Microbiology*. Me Graw Hill Book Company, New York: 1976.

Politz OM et al. 2000. A highly thermostable endo-(1.4)-b-mannanase from the marine bacterium *Rhodothermus marinus*. *Appl Microbiol Biotechnol* 53: 715-721.

Pollard, P.C. & K. Kogure. 1993. Bacterial Decomposition of Detritus in a Tropical Seagrass (*Syringodium isoetifolium*) Ecosystem, Measured with Methyl-3H) Thymidine. *Aust. J. Mar. Freshwater Res.* 44:155-172.

- Puspitasari, D. Pramono H. Oedjijono. "Identifikasi Bakteri Pengoksidasi Besi dan Sulfur Berdasarkan Gen rRNA Dari Lahan Tambang Timah Di Belitung". Fakultas Biologi. 1 no.1 (2014). H: 8-14.
- Putri, Azmi Utami."Uji Potensi Antifungi Ektrask Berbagai Jenis Lamun Terhadap Fungi *Candida albicans*". *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS Makassar, 2013.
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volum 9. Op.cit., h. 311.
- Rahayu, S., Lee,S.S., Nor Aini, A.S. 2010. *Uromycladium tepperianum*,the gall rust fungus from *Falcataria moluccana* in Malaysia and Indonesia. *Mycoscience* (2010) 51. p:149-153.
- Rampen SW, Sinninghe Damste JS, Schouten S, Middelburg JJ. 2012. Characterization of the deep-sea microbial community and investigation of their carbon sources using lipid biomarkers. *American Geophysical Union, Fall Meeting 2012: Oceanogr Biol Chem* 84: 204-216. doi:10.1016/j.gca.2012.01.024.
- Rheinheimer. "Aquatic Microbiology", A. willey Inter Science Publication Chichester: 1980.
- Riley, J. P., & Chester, R. *Introduction to Marine Chemistry*. Academic Prees. London. Schlitzer. (1971).
- Riffiani R.. Isolasi Bakteri Pendegradasi Phenanthrene dari Batanta-Salawati Raja Ampat Papua. *J. Biol. Indon.* (2010). 6 no. 2. h: 153-161.
- Rozak. A. Pengaruh Salinitas Terhadap Biodegradasi Cemaran Zat Organik. 27 no. 3, (2002). h: 29-35.
- Romimohtarto, K. & S. Juwana. *Biologi Laut: Ilmu Pengetahuan tentang Biologi Laut*. Penerbit Djambatan. Jakarta. 2001.
- Ruyitno. 2004. *Bakteri laut dan peranannya dalam mendukung aktivitas manusia*. Jakarta; Pusat Penelitian Oseanografi lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Salmin. Oksigen Terlarut dan Kebutuhan Oksigen Terlarut Biologi (BOD) sebagai Salah Satu Indikator untuk Menentukan Kualitas Perairan. *Oseana*. 30 No. 3, (2005), h: 21 – 26.
- Saputri, R.A., Widyorini, N., Purnomo, P.W. "Identifikasi dan Kelimpahan bakteri pada Jenis Karang *Acropora* sp. di Reef Flat Terumbu Karang Pulau Panjang

- Jepara". *Laporan Hasil Penelitian*. Semarang: Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2016.
- Sidharta BR. Pengantar mikrobiologi kelautan. Universitas Atmajaya. Yogyakarta: 2000.
- SNI 7545.1:2009. Metode Identifikasi Bakteri pada Ikan secara Konvensional-bagian 1: *Edwardsiella ictaluri*, Badan Standarisasi Nasional.
- Sinatryani, D., "Kelimpahan Bakteri Selulolitik di Muara Sungai Gunung Anyar Surabaya dan Bancaran Bangkalan." *Srkripsi*. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. 2014.
- Singleton, P. Introduction to Bacteria : for Student of Biology, Biotechnology and Medicine. Second edition. John Wiley and Sons Ltd. Chicester. England: 1992.
- Srikandi, F. (1992). Mikrobiologi Pangan. Jakarta: Gramedia
- Stoll D, Stalbrand, Warren A. 1999. Manna degrading enzyme from *Cellulomonas fimi*.
- Sukiman, N. Isolasi dan Identifikasi Molekuler Bakteri Sedimen Makroalga *Caulerpa rasemosa* di Perairan Puntondo Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi IUN Alauddin Makassar. 2017.
- Susana. Tingkat Keasaman (pH) dan Oksigen Terlarut Sebagai Indikator Kualitas Perairan Sekitar Muara Sungai Cisadane/ JTL, 5 no. 2, (Desember 2009), h: 33-39.
- Syafiuddin & A. Jahi. "Hubungan Karakteristik Individu dengan Kompetensi Wirausaha Petani Rumput Laut di Sulawesi Selatan". Bogor (ID): Jurnal Penyuluhan, 3 no.1 (2007): h. 35-44.
- Sunaryanto, R., Marwoto B., Irawadi, T.T., Mas'ud Z.A., Hartoto, L. Isolasi dan Penapisan *Aktynomycetes* lat Penghasil Antimikroba. (Juni 2009). 14 no 2. H:98-101.
- Sunaryanto., R. Diversitas dan Bioaktivitas Aktinomisetes Laut Dari Pantai Selatan Yogyakarta, JPB Perikanan. 7 no. 1. (2012): h. 31-38.
- Srivibole, R.. "A collection of *Actinomycetes* from mangrove soils and screening for antimicrobial producing strains". 6 (2000): p. 23-33.

- Tanaka M et al. 2009. Cloning and characterization of a β -1.4 mannanase 5C possessing family 27 carbohydrate-binding module from marine bacterium. *Vibrio Sp.* Strain MA-138. *Biosci. Biotech. Biochem.* 7 (1): 109-116.
- Tomascik, et.al. *The Ecology of the Indonesian Sea part 2*. Singapore: Peripilus Edition. 1997.
- Tresnawati, Tika. *Aktivitas Bakteri Pengoksidasi Amonium Isolat ASR1 dan ASR2 Asal Tambak Udang pada Sumber Karbon dan Salinitas yang Berbeda*. Bogor: Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. 2006.
- Waluyo, L. *Mikrobiologi Umum*. Malang (ID). Universitas Muhammadiyah Press: Malang. 2004.
- Welch, E. BE. *Cological Effect of Waste Water*. Cambridge University Press, Cambridge. 1980.
- Wills Ari Setyati dan Subagiyo. Seleksi Potensial Bakteri Laut dari Perairan Pulau Panjang Sebagai Agen Pengendali Hayati Penyakit Vibriosis pada Budidaya ikan dan Udang. *Indonesian Journal of Marine Science* (2008) 13 no.1. h: 57-60.
- Waluyo L.. *Teknik dan Metode Dasar dalam Mikrobiologi*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang:. 2008.
- Y. Hadiroseyani, Nurjariah dan D. Wahjuningrum. “Kelimpahan Bakteri Dalam Budidaya Cacing *Limnodrilus sp.* yang Dipupuk Kotoran Ayam Fermentasi”. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 6 no. 1 (2007)): h. 79–87.
- Yusron M.. “Pengolahan air asam tambang menggunakan biofilm bakteri pereduksi sulfat”. *tesis*. 2009
- Zilinkas, R.A, Lundin, C.G. “Marine Biotechnology and Developing Countries”. *World Bank Discussion Papers*. 1993.
- Volk W, A., Wheeler M, F. *Mikrobiologi Dasar*. Ed: Markham. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1993.
- Wall, G. & Mathieson, A.. *Tourism: change, impacts and oportunites*. London: Person Education Ltd. 2006.

LAMPIRAN



Lampiran-lampiran

A. Lokasi penelitian



B. Pengukuran parameter lingkungan



C. Sampling



D. Perhitungan jumlah total bakteri



E. Uji IMVIC

1. Uji Methyl-Red



2. Voges-Proskauer




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Citrat




4. SIM




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


5. TSIA




F. Pengamatan makroskopik

No	Kode Isolat	Jenis bakteri	Keterangan (bentuk)	Sifat gram
1	A.1		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
2	A.2		<i>Streptococcus</i>	+(positif)



3	A.3		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
4	A.4		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
5	A.5		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
6	A.6		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
7	A.7		<i>Coccus</i>	+(positif)
8	B.1		<i>Coccus</i>	+(positif)

9	B.2		<i>Bacilli</i>	+(positif)
10	B.3		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
11	B.4		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
12	B.5		<i>Coccus</i>	-(negatif)
13	B.6		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
14	B.7		<i>Coccus</i>	-(negatif)

15	C.1		<i>Coccus</i>	-(negatif)
16	C.2		<i>Coccus</i>	+(positif)
17	C.3		<i>Streptococcus</i>	-(negatif)
18	C.4		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
19	C.5		<i>Coccus</i>	-(negatif)
20	C.6		<i>Coccus</i>	-(negatif)

21	C.7		<i>Coccus</i>	-(negatif)
22	C.8		<i>Coccus</i>	+(positif)
23	C.9		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
24	C.10		<i>Actynomicetes</i>	+(positif)
25	C.11		<i>Coccus</i>	+(positif)
26	C.12		<i>Coccus</i>	+(positif)
27	C.13		<i>Coccus</i>	+(positif)

28	C.14		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
29	C.15		<i>Bacilli</i>	+(positif)
30	C.16		<i>Coccus</i>	-(negatif)
31	C.17		<i>Coccus</i>	+(positif)
32	C.18		<i>Diplococcus</i>	-(negatif)
33	C.19		<i>Bacilli</i>	+(positif)
34	C.20		<i>Coccus</i>	+(positif)

35	C.21		<i>Coccus</i>	+(positif)
36	C.22		<i>Coccus</i>	+(positif)
37	C.23		<i>Coccus</i>	+(positif)
38	C.24		<i>Coccus</i>	+(positif)
39	C.25		<i>Streptococcus</i>	+(positif)
40	C.26		<i>Actynomicetes</i>	+(positif)

41	C.27		<i>Bacilli</i>	-(negatif)
42	C.28		<i>Coccus</i>	-(negatif)



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nuraeni. Lahir di Bone-Bone, pada tanggal 06 Mei 1996 yang merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bustamin. Dg. Tiro dan Saga Dg. Ti'no .

Adapun jenjang pendidikan yang telah dilalui diantaranya pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Bolo No. 177 pada tahun 2002 hingga lulus 2008 . pada tahun 2008 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 MARBO hingga lulus pada tahun 2011. Tahun 2011 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 TAKALAR hingga lulus pada tahun 2014. Tahun 2014 hingga dengan penulisan Skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Selama penulis mengabdikan, penulis terdaftar sebagai asisten praktikum biologi terapan dan asisten praktikum mikrobiologi.

