

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA
IBU AKSEPTOR KB SUNTIK DEPO MEDROKSIPROGESTERON
ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI BPM SRIKANDI GOWA TAHUN 2017**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

UIN Alauddin Makassar

Oleh

ELMA YULIANTI
NIM. 70400114073

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elma Yulianti
Nim : 704001140703
Tempat,Tanggal Lahir : Bulukumba, 27 September 1996
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan VII
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana
Pada Ibu Akseptor KB Suntik Depo
Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan
Amenorhea di BPM Srikandi Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, Februari 2018

Penyusun

Elma Yulianti
70400114073

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis ilmiah yang berjudul "Manajemen ASsuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ibu Akseptor KB Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di BPM Srikandi Gowa Tanggal 22 April 2017" yang disusun oleh Elma Yulianti, Nim: 70400114073, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan.

Samata, 19 Februari 2018 M

03 Jumadil-Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SIT.,SKM.,M.Keb(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.SIT.,M.Keb (.....)
Pembimbing II	: dr. Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes (.....)
Penguji I	: dr. Nadyah, M.Kes (.....)
Penguji II	: Dr. H. Supardin, M.Hi (.....)

Ant
Pekan


Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa sinar iman dan islam untuk menerangi ummatnya dari kegelapan menuju alam yang terang-benderang.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan proses studi mata kuliah pokok pada jenjang Diploma III Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ibu Akseptor KB Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di BPM Srikandi Gowa Tahun 2017”**, penulis tentunya mengalami banyak hambatan dan kesulitan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun berkat bimbingan, bantuan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Takdir dan Ibunda Hj. Juharti, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik pikiran, tenaga, waktu, biaya serta dukungan do'a dalam studi penulis khususnya dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengarahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya, yang telah memberikan fasilitas selama masa pendidikan.
4. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb, selaku Ketua Prodi Kebidanan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama masa pendidikan.
5. Ibu Firdayanti, S.ST., M.Keb, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk serta senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai.
6. Ibu dr. Dewi Setiawati Sp.OG., M.Kes, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dan bersedia mengoreksi secara teliti Karya Tulis Ilmiah ini sehingga dapat

terselesaikan dengan baik. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai.

7. Ibu dr. Nadyah Haruna, M.Kes, selaku penguji I yang telah banyak memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini sehingga menjadi lebih layak dan berarti.
8. Bapak Dr. H. Supardin, M.Hi, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Para Dosen dan segenap Staf Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa mengajar dan membimbing penulis selama proses perkuliahan.
10. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Bupati Gowa, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
11. Kepala BPM Srikandi Gowa beserta Seluruh staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan banyak membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Teristimewa Suami tercinta Sawaluddin, SE, yang telah setia mendampingi dan memberikan begitu banyak bantuan kepada penulis terutama dalam

penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, terimah kasih atas semangat dan dukungannya.

13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan angkatan 2014 yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa hasil yang dituangkan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik penulis nantikan, tentunya dengan harapan karya ini setidaknya menjadi inspirasi bagi penulis atau peneliti yang lainnya.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Samata, Februari 2018

Penyusun

ELMA YULIANTI
NIM:70400114073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penulisan.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin ..	20
C. Tinjauan Khusus Tentang Amenorhea akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan.	26
D. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam	30
E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	37
BAB III STUDI KASUS.....	44
A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	44
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa dan Masalah Aktual.....	48

	C. Langkah III. Identifikasi Masalah Potensial.	49
	D. Langkah IV. Tindakan Segera dan Kolaborasi	49
	E. Langkah V. Rencana Tindakan dan Asuhan Kebidanan.....	49
	F. Langkah VI. Implementasi Tindakan.....	51
	G. Langkah VII. Evaluasi	52
	H. Pendokumentasian.....	53
BAB	IV PEMBAHASAN	70
	A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	70
	B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa dan Masalah Aktual.....	76
	C. Langkah III. Identifikasi Masalah Potensial.	80
	D. Langkah IV. Tindakan Segera dan Kolaborasi	82
	E. Langkah V. Rencana Tindakan dan Asuhan Kebidanan.....	83
	F. Langkah VI. Implementasi Tindakan.....	89
	G. Langkah VII. Evaluasi	93
BAB	IV PENUTUP.....	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1: Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Obat Suntik.....	20
Gambar 2.2: Patofisiologi Amenorhea.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lampiran kegiatan penelitian
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran III : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Bupati Kabupaten Gowa Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga.
- Lampiran IV : Surat izin rekomendasi penelitian dari Bupati Kabupaten Gowa/Kepala Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga kepada Pemerintahan Kabupaten Gowa Dinas Kesehatan dan kepada Bidan Praktek Mandiri (BPM) Srikandi Gowa.
- Lampiran V : Surat izin meneliti dari Bidan Praktek Mandiri (BPM) Srikandi Gowa.
- Lampiran VI : Surat keterangan selesai penelitian dari Bidan Praktek Mandiri (BPM) Srikandi Gowa.

Lampiran VII : Daftar riwayat hidup

Lampiran VIII : Lembar Kegiatan Konsul



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2018

Elma Yulianti

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Dewi Setiawati

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di BPM Srikandi Gowa Tahun 2017”

Amenorhea didefinisikan sebagai ketidakhadiran atau penghentian siklus menstruasi pada wanita selama masa reproduksi. *Amenorhea* didefinisikan primer ketika *menarche* tidak terjadi pada usia 16 tahun pada seorang gadis dengan perkembangan seksual sekunder yang lengkap, atau pada usia 14 tahun pada seorang gadis tanpa perkembangan seksual sekunder. *Amenorhea* didefinisikan sekunder saat siklus haid menghilang selama 6 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi tidak teratur atau selama 3 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi teratur

Karya Tulis Ilmiah ini memaparkan aplikasi Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di BPM Srikandi Gowa Tahun 2017” sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akseptor KB Suntik DMPA mengalami efek samping yaitu *amenorhea* dan pada pemantauan lanjutan ditemukan efek samping lain yaitu *spotting* dan kenaikan berat badan akibat pemakaian KB Suntik DMPA. Kesimpulan dari penelitian studi kasus ini yaitu data subjektif dan objektif mendukung ditegakkannya diagnosis *amenorrhea*, *spotting* dan kenaikan berat badan. *Amenorhea*, *spotting* dan kenaikan berat badan merupakan salah satu efek samping yang sering terjadi pada penggunaan KB Suntik DMPA. Kenaikan berat badan yang dialami oleh akseptor juga disebabkan karena ibu tidak menjaga pola makan dan olahraga secara teratur.

Kata kunci: Amenorhea, Spotting, Kenaikan Berat Badan, Tujuh Langkah Varney, SOAP

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, FEBRUARY 2018

Elma Yulianti

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Dewi Setiawati

“Family Planning Midwifery Care Management on Mothers of Family Planning Acceptors of Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) with Amenorrhea Injection at BPM Srikandi Gowa in 2017”

Amenorrhea is defined as the absence or cessation of the menstrual cycle in women during the reproductive period. Amenorrhea is defined as primer when menarche does not occur at the age of 16 years in a girl with complete secondary sexual development, or at 14 years of age in a girl without secondary sexual development. Amenorrhea is defined as secondary when the menstrual cycle disappears for 6 consecutive months in a girl with irregular menstruation or for 3 consecutive months in a girl with regular menstruation

This Scientific Paper describes the application of Family Planning Midwifery Care Management on Mothers of Family Planning Acceptors of Depo Medroksiprogesteron Acetate (DMPA) with Amenorrhea Injections at BPM Srikandi Gowa in 2017 " in accordance with 7 steps of Varney and SOAP.

The results of the study indicate that family planning acceptors of DMPA injection experience side effects of amenorrhea and on the follow-up monitoring found other side effects of spotting and weight gain due to the use of DMPA Injecting FP. The conclusions of the case study are the subjective and objective data support the diagnosis of amenorrhea, spotting and weight gain. They are one of the most common side effects of using DMPA injection. The weight gain experienced by acceptors is also due to the fact that mothers do not keep their diet and doing exercises on a regular basis.

Keywords: Amenorrhea, Spotting, Weight Gain, Seven Step of Varney, SOAP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi atau melekat dan berkembang di dalam rahim (Purwoastuti, TE, dan Walyani, ES, 2015:182).

KB merupakan salah satu program pemerintah yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Hal ini terdapat dalam UU No 10 Tahun 1991 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. KB juga memberikan keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat. Perencanaan KB harus dimiliki oleh setiap keluarga termasuk calon pengantin, misalnya kapan usia ideal, bagaimana perawatan kehamilan, serta tanda-tanda bahaya dalam kehamilan (Purwoastuti, TE, dan Walyani, ES, 2015: 182-183).

Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program KB untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam

mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang: usia ideal perkawinan; usia ideal untuk melahirkan; jumlah ideal anak; jarak ideal kelahiran anak; dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Hal ini terdapat dalam UURI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas (UU RI No 52 Tahun 2009 pasal 20:16-17).

Semakin berkembangnya tugas BKKBN sesuai UU Nomor 52 Tahun 2009 itu. Kesadaran masyarakat mewujudkan keluarga lebih sejahtera melalui program Keluarga Berencana telah tumbuh dengan baik, sebagai buah kampanye BKKBN “Dua Anak Cukup, Laki-Laki- Perempuan Sama Saja” selama ini di seluruh penjuru Indonesia (BKKBN, 2017: 3).

KB termasuk dalam salah satu program pemerintah yang menjadi bahan perdebatan para ulama mengenai hukumnya dalam pandangan Islam, namun pada dasarnya Islam memperbolehkan penggunaan KB, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam al-Quran Surah An-Nisa’/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar” (Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, 2013).

Berdasarkan ayat tersebut terdapat petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup

yang bertujuan untuk mensejahterahkan ibu dan anak dalam rumah tangga. Ayat di atas juga dikuatkan oleh hadist sebagai berikut:

إنك تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عالة لتكففون الناس

Artinya:

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.”(H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Hadist ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama. Hal ini termasuk dalam tujuan program KB untuk mengatur kelahiran bayi demi kesejahteraan ibu dan anak.

Program KB yang kurang berhasil di beberapa kabupaten atau kota berdampak terhadap jumlah kelahiran bayi yaitu mencapai sekitar 4,5 juta kelahiran bayi setiap tahunnya. Tentu hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu dan anak dalam rumah tangga karena di kabupaten atau kota yang masih mempunyai jumlah kelahiran yang besar akan menghadapi konsekuensi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar atas kelahiran bayi saat ini dan seterusnya hingga bayi mendapatkan pekerjaan dan menjadi ibu yang melahirkan generasi penerus (Yuhedi, LF dan Kurniawati, T, 2015:14).

Jumlah kelahiran bayi yang dimaksud yaitu bayi lahir hidup (fertilitas) Secara demografis, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atau sekelompok wanita (Tim Penulis Lembaga Demografi

FEUI, 2010). Dalam demografi, fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup. Fertilitas adalah suatu ukuran yang diterapkan untuk mengukur hasil reproduksi wanita yang diperoleh dari statistik jumlah kelahiran hidup (Budijanto, Didik, 2013: 26).

Pengetahuan tentang fertilitas atau kelahiran dan KB serta berbagai indikator terkait sangat berguna bagi para penentu kebijakan dan perencanaan program untuk merencanakan pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak (Yuhedi, LF dan Kurniawati, T, 2015:14). Untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak diperlukan kesadaran dan kerjasama dari masyarakat terutama dalam hal penggunaan kontrasepsi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suparyanto metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah kontrasepsi suntikan. Tingginya peminat suntikan oleh karena aman, sederhana, efektif, tidak menimbulkan gangguan dan dapat dipakai pasca persalinan (Rahmawati dan Yayuk, N, 2014: 2).

Efektifitas kontrasepsi suntik adalah antara 99% dan 100% dalam mencegah kehamilan. Kontrasepsi suntik adalah bentuk kontrasepsi yang sangat efektif karena angka kegagalan penggunaannya lebih kecil. Hal ini karena wanita tidak perlu mengingat untuk meminum pil (Everet, S, 2012:168-169).

Kontrasepsi suntikan memiliki efek samping diantaranya yaitu berat badan meningkat, perdarahan tidak teratur dan *amenorhea* (Everet, S, 2012:170). Pemberian kontrasepsi suntikan paling sering menimbulkan *amenorhea*. Gangguan haid ini biasanya bersifat sementara dan sedikit sekali mengganggu kesehatan (Soekaemi, S, 2010:MK-45).

Amenorhea dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi yang berbeda. evaluasi sistematis termasuk riwayat rinci, pemeriksaan fisik, dan penilaian laboratorium terhadap kadar hormon serum yang dipilih biasanya dapat mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya. *Amenorhea* primer, yang menurut definisinya adalah kegagalan mencapai *menarche*, seringkali merupakan hasil penyimpangan kromosom yang menyebabkan insufisiensi ovarium primer (misalnya, *sindrom Turner*) atau kelainan anatomis (misalnya *agenesis Müllerian*). *Amenorhea* sekunder didefinisikan sebagai penghentian menstruasi reguler selama tiga bulan atau penghentian menstruasi tidak teratur selama enam bulan (Klein, AD, 2013:1).

Amenorhea dapat terjadi akibat pemakaian kontrasepsi suntik yang berisi *Depo Medroksiprogesteron Asetat* (DMPA). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara lama pemakaian DMPA dengan Siklus menstruasi, lama menstruasi dan kejadian *spotting*. Semakin lama penggunaan maka jumlah darah menstruasi yang keluar juga semakin sedikit dan bahkan sampai terjadi *amenorhea* (Sety, L M, 2014: 61).

Secara umum, pada tahun 2015, 76% wanita usia reproduksi yang sudah menikah memilih KB dengan metode modern, sementara 9 dari 10 wanita usia reproduksi yang telah menikah di Wilayah Pasifik Barat yang menggunakan KB, mereka memiliki kepuasan yang lebih sedikit dibanding yang menggunakan KB di wilayah Afrika (WHO, 2016: 68)

Peserta KB baru dan KB aktif menunjukkan pola yang sama dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi. Persentase peserta KB baru terhadap pasangan usia

subur di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 13,46%. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebesar 16,51%. Tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi yaitu Maluku Utara sebesar 57,85%, DKI Jakarta sebesar 31,14%, dan Maluku sebesar 25,07%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 9,45%, Jawa Timur sebesar 10,8%, dan Banten sebesar 11,21% (Kementerian Kesehatan RI, 2016:121-122).

Presentase metode kontrasepsi yang terbanyak digunakan di Sulawesi-Selatan oleh peserta KB baru adalah suntikan, yakni sebesar 75,04%. Metode terbanyak ke dua adalah pil, sebesar 36,69%. Metode yang paling sedikit dipilih oleh para peserta KB baru adalah metode operasi pria (MOP) sebanyak 0,23%, kemudian metode operasi wanita (MOW) sebanyak 2,51%, dan IUD (5,57%). Adapun metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntikan (46,89%) dan terbanyak ke dua adalah pil (28,55%). Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metoda Operasi Pria (MOP), yakni sebanyak (0,21%), kemudian MOW sebanyak (2,06%) (Kementerian Kesehatan RI, 2016: 82-88).

Data dari kementerian kesehatan RI tersebut yang menunjukkan bahwa akseptor KB terbanyak adalah akseptor KB suntik sesuai dengan data yang didapatkan dari BPM Srikandi Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan yang menunjukkan bahwa jumlah klien yang menggunakan kontrasepsi dari tahun 2012-2016 sebanyak 1160 orang. Dari jumlah tersebut akseptor KB yang menggunakan KB Suntik depo progestin memiliki presentase terbanyak yaitu sebanyak 634 orang (54,7%) dan 526 orang (45,3%)

menggunakan jenis kontrasepsi lain, penggunaan kontrasepsi suntik DMPA dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu tahun 2012 sebanyak 86 orang (13,5%), tahun 2013 sebanyak 93 orang (14,6%), tahun 2014 sebanyak 109 orang (17,2%), tahun 2015 sebanyak 115 orang (18,2%) dan tahun 2016 terjadi peningkatan drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 231 orang (36,5%) (Rekam Medik BPM Srikandi Gowa, 2012-2016).

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang proses manajemen asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa dalam bentuk karya ilmiah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan *Amenorhea* di BPM Srikandi Gowa.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakannya Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ibu Akseptor KB Suntik DMPA dengan keluhan *Amenorhea* di BPM Srikandi Gowa dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengakajian dan analisis data keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada Ibu keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan pada keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa 2017.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah:

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di BPM Srikandi Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program KIA.

2. Manfaat Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan Keluarga Berencana.

3. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang Keluarga Berencana.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang Keluarga Berencana.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan Keluarga Berencana khususnya ibu akseptor KB suntik DMPA dengan keluhan *amenorhea*.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.

- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi, adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum kontrasepsi dan kontrasepsi suntik depo progestin, tinjauan khusus tentang *amenorhea*, tinjauan kontrasepsi menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di BPM Srikandi Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu *amenorhea* akibat efek samping dari kontrasepsi suntikan depo progestin.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi

1. Pengertian

Kontrasepsi adalah segala macam alat atau cara yang digunakan oleh satu pihak atau kedua belah pihak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan sel sperma dan sel telur (*ovum*) yang sudah matang. Manfaatnya yaitu mencegah terjadinya kematian, mengurangi angka kesakitan ibu dan anak, mengatur kelahiran anak sesuai yang diinginkan dan dapat menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (Sety, L M, 2014:60).

Secara umum (KB) dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarga yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan menjadi suatu hal yang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi (Suratun, dkk, 2013: 19).

2. Tujuan Kontrasepsi

a. Tujuan Umum

Sulistiyawati mengatakan program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang

berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas (Nuriyanah, T E, dan Rejeki, W S,2015: 8).

b. Tujuan khusus

Mansjoer mengatakan, dalam pemilihan jenis kontrasepsi didasarkan pada tujuan penggunaan kontrasepsi, yaitu:

- 1) Fase Menunda kehamilan. Pasangan dengan istri berusia dibawah 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya (Amalia,2012:4).
- 2) Fase Menjarangkan kehamilan (mengatur kesuburan) Masa saat istri berusia 20-30 tahun adalah masa usia yang paling baik untuk melahirkan 2 anak dengan jarak 3-4 tahun (Amalia,2012:4).
- 3) Fase Mengakhiri kesuburan (tidak ingin hamil lagi) Saat usia istri diatas 30 tahun, dianjurkan untuk mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 anak (Amalia,2012:4).

3. Macam-macam Metode Kontrasepsi

a. Metode Amenore Laktasi (MAL)

MAL adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. Metode Amenore Laktasi (MAL) atau *Lactational Amenorrhea Method* (LAM) dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain (Purwoastuti, E, dan Walyani, ES, 2015:203).

b. Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA)

- 1) Metode Lendir Serviks atau lebih dikenal dengan *Metode Ovulasi Billings* (MOB), dilakukan dengan wanita memantau lendir serviksnya setiap hari. Lendir bervariasi selama siklus, mungkin tidak ada lendir atau mungkin terlihat lengket dan jika direntangkan diantara kedua jari, akan putus lendir tersebut dikenal dengan lendir tidak subur (Everett, S, 2012:43).
- 2) Metode Kalender atau Pantang Berkala, yaitu senggama dihindari pada masa subur, yaitu dekat dengan pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda adanya lendir encer dari liang vagina. Untuk perhitungan masa subur dipakai rumus siklus terpanjang dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18. Antara kedua waktu senggama dihindari (Koesno, H, 2012:MK-8).
- 3) Metode Suhu Basal, ibu dapat mengenali masa subur ibu dengan mengukur suhu badan secara teliti dengan thermometer khusus yang bisa mencatat perubahan suhu sampai $0,1^{\circ}$ C untuk mendeteksi, bahkan suatu perubahan kecil suhu tubuh anda (Koesno,H, 2012: MK-13).
- 4) Metode Kombinasi, metode ini sering disebut dengan *simtomtermal* atau metode cek-ganda yaitu menggabungkan metode lendir serviks, suhu tubuh dan metode kalender, yang menyebabkan metode ini lebih efektif sebagai kontrasepsi (Everett, S, 2012:47).
- 5) Senggama Terputus (*Koitus Interruptus*), ialah penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Hal ini berdasarkan kenyataan, bahwa akan terjadinya ejakulasi disadari sebelumnya oleh sebagian besar laki-laki, dan

setelah itu masih ada waktu kira-kira “detik” sebelum ejakulasi terjadi. Waktu yang singkat ini dapat digunakan untuk menarik penis keluar dari vagina. Keuntungan, cara ini tidak membutuhkan biaya, alat-alat ataupun persiapan, tetapi kekurangannya adalah untuk menyukseskan cara ini dibutuhkan pengendalian diri yang besar dari pihak laki-laki (Prabowo, P, 2011:438).

- 6) Pembilasan Vagina Pasca Koitus, metode ini adalah membersihkan cairan semen dari vagina sebelum sperma dapat memasuki serviks. Karena sperma ditemukan dalam lendir serviks dalam waktu 90 detik setelah ejakulasi, keefektifan metode kontrasepsi ini sangat kecil (Benson, RC, dan Pernoll, ML, 2013:644).

c. Metode *Barrier*

- 1) Kondom Pria, merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual (Koesno, H, 2012:MK-17).
- 2) Kondom Wanita, alat ini merupakan plastik polyuterhane yang lunak berbentuk tabung dengan panjang kira-kira 15 cm dan diameter 7 cm, salah satu ujungnya tertutup, ujung bawah yang terbuka dilingkari cincin lunak yang ditempatkan pada (Firdayanti, 2012:74).
- 3) Diafragma, adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan kedalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks (Koesno, H, 2012:MK-21).

- 4) Spermisida, adalah bahan kimia (biasanya non oksinol-9) digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Dikemas dalam bentuk aerosol (busa), tablet vagina, *suppositoria* atau *dissolvable film* dan krim (Koesno, H, 2012:MK-24).

d. Kontrasepsi Hormonal

Adapun pengertian kontrasepsi hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan dimana bahan bakunya mengandung preparat estrogen dan progesteron (Rahma, AS, 2012:179). Berdasarkan jenis dan cara pemakaiannya dikenal tiga macam kontrasepsi hormonal yaitu kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral (pil) dan kontrasepsi implant.

1) Kontrasepsi Suntikan

Jenis-jenis KB suntik yang sering digunakan di Indonesia antara lain:

- a) Suntikan 1 bulan contohnya *cyclofem*.
- b) Suntikan 3 bulan contohnya *depo provera*, *depo progestin* (Rahma, AS, 2012:179).

2) Kontrasepsi Oral

Jenis-jenis KB suntik yang beredar terbagi dua:

- a) Pil KB kombinasi berisi dua hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron.
- b) Pil KB progesteron berisi hormon progesterone (Rahma, AS, 2012:181)

3) Kontrasepsi Implan

Kontrasepsi implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit. Implant adalah suatu alat kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul *silastic silicon polidymetri* dan disusukkan dibawah kulit (Rahma, AS, 2012:183).

4) Kontrasepsi AKDR dengan Progesteron

Jenis AKDR yang mengandung hormon steroid adalah Prigestate yang mengandung Progesteron dari Mirena yang mengandung Levonorgestrel

e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik (*polyethylene*). Ada yang dililit tembaga (Cu), ada pula yang tidak, ada pula yang dililit tembaga bercampur perak (Ag). Selain itu ada pula yang dibatangnya berisi hormon progesteron (Suratun, dkk, 2013:87).

f. Kontrasepsi Mantap

1) Tubektomi

Tubektomi adalah metode kontrasepsi untuk perempuan yang tidak ingin anak lagi. Perlu prosedur bedah untuk melakukan tubektomi sehingga diperlukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan lainnya untuk memastikan apakah seorang klien sesuai untuk menggunakan metode ini (Koesno, H, 2012:MK-89).

2) Vasektomi

Vasektomi adalah metode kontrasepsi untuk lelaki yang tidak ingin anak lagi. Perlu prosedur bedah untuk melakukan vasektomi sehingga diperlukan pemeriksaan

fisik dan pemeriksaan tambahan lainnya untuk memastikan apakah seorang klien sesuai untuk menggunakan metode ini (Koesno, H, 2012:MK-95).

B. Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi Suntikan DMPA

1. Pengertian

- a. Kontrasepsi Suntikan DMPA yaitu suntikan kontrasepsi diberikan setiap 3 bulan sekali (Purwoastuti, E dan Walyani, ES, 2015:203).
- b. Kontrasepsi Suntikan DMPA yaitu KB suntik yang berisi hormon progesteron saja. Jenis kontrasepsi ini sangat efektif, aman dan dapat dipakai oleh semua wanita usia reproduksi. Kontrasepsi ini juga cocok untuk ibu menyusui karena tidak menekan produksi ASI. Akan tetapi kembalinya kesuburan cukup lama yaitu rata-rata 4 bulan (Yuhedi, LT dan Kurniawati, T, 2015:80).
- c. Kontrasepsi Suntikan DMPA mengandung 150 mg *Depo Medroksiprogesteron Asetat* yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik *intramuscular* (di daerah bokong) (Koesno, H, 2012:MK-43).

Contoh obat suntik yang mengandung 150 mg *Depo Medroksiprogesteron Asetat* bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1: Obat Suntik (Sumber:

<http://klikharryblog.wordpress.com/2012/02/23/tidak-menstruasi-lagi-selepas-berhenti-kb-suntik/comment-page-2/>)

2. Patofisiologi Suntikan DMPA Membuat Tidak Subur

- a. Mencegah ovulasi.
- b. Mengentalkan lender serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma.
- c. Menjadikan selaput lender rahim tipis dan atrofi.
- d. Menghambat transportasi gamet oleh tuba

(Koesno, H, 2012: MK-43).

3. Indikasi dan Kontra-indikasi Suntikan DMPA

- a. Indikasi
 - 1) Usia reproduksi, yaitu wanita dengan keadaan organ reproduksi yang berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun.
 - 2) Nulipara (belum pernah melahirkan janin yang mampu hidup di luar rahim) dan yang telah memiliki anak.
 - 3) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektifitas tinggi.
 - 4) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai.
 - 5) Setelah melahirkan dan tidak menyusui.
 - 6) Setelah abortus atau keguguran.
 - 7) Telah banyak anak, tetapi belum menghendaki tubektomi.
 - 8) Tekanan darah < 180/100 mmHg, dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit.
 - 9) Tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen.
 - 10) Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi.

11) Anemia defisiensi besi yaitu berkurangnya penyediaan besi untuk *eritropoesis*, karena cadangan besi kosong yang mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang (Koesno, H, 2012:MK-45).

b. Kontra-indikasi

- 1) Hamil atau dicurigai hamil (risiko cacat pada janin 7 per 100.000 kelahiran).
- 2) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- 3) Tidak dapat menerima gangguan haid terutama *amenorhea*.
- 4) Menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
- 5) Diabetes mellitus (tingginya kadar glukosa darah) disertai komplikasi (Koesno, H, 2012:MK-45).

4. Cara Penggunaan

DMPA disuntikkan intra muskular setiap 12 minggu. Dengan kelonggaran batas waktu suntik, bisa diberikan kurang dari 1 minggu atau lebih 1 minggu dari patokan 12 minggu (Suratun, dkk, 2013:69).

5. Kelebihan dan Kekurangan suntikan DMPA

a. Kelebihan

- 1) Sangat efektif.
- 2) Pencegahan kehamilan jangka panjang.
- 3) Tidak berpengaruh pada hubungan suami-istri.
- 4) Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI (Koesno, H, 2012:MK-44).

b. Kekurangan

- 1) Sering ditemukan gangguan haid seperti: siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak (*spotting*), tidak haid sama sekali.
- 2) Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan (harus kembali untuk suntikan).
- 3) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut.
- 4) Permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering.
- 5) Tidak menjamin terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus atau infeksi virus HIV.
- 6) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian (bukan karena kerusakan/kelainan pada organ genitalia, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari deponya (Koesno, H, 2012:MK-44).

6. Efek Samping Suntikan DMPA

a. Gangguan haid

- 1) *Amenorhea*, adalah tidak datangnya haid selama akseptor mengikuti KB selama 3 bulan berturut-turut atau lebih (Suratun, dkk, 2013: 72).
- 2) *Spotting*, adalah bercak-bercak perdarahan di luar haid yang terjadi selama akseptor mengikuti KB suntik. Suntikan DMPA pada umumnya menyebabkan ketidak seimbangan hormon yaitu hormon progesteron meningkat sedangkan estrogen menurun, menurunnya estrogen mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan folikel dan menghambat penebalan dinding endometrium

sehingga menimbulkan perdarahan bercak dengan durasi yang bervariasi (Suratun, dkk, 2013: 72).

3) *Metrorrhagie*, adalah perdarahan yang berlebihan diluar siklus haid. Perdarahan ini terjadi karena rendahnya kadar hormon estrogen sementara hormon progesteron tetap terbentuk. karena persistensi folikel yang tidak pecah sehingga tidak terjadi ovulasi pada siklus haid dan pembentukan corpus luteum. Dalam situasi tertentu terjadilah hiperplasia endometrium atau endometrium yang terus menebal sehingga terjadi perdarahan yang berlebihan diluar siklus haid. Pada umumnya akseptor KB suntikan depo progestin akan mengalami hal ini pada awal pemakaian, hal tersebut merupakan mekanisme penyesuaian diri terhadap hormone (Suratun, dkk, 2013: 72).

4) *Menometorrhagie*, adalah datangnya darah haid yang berlebihan jumlahnya tetapi masih dalam siklus haid. *Menometorrhagie* terjadi akibat ketidak seimbangan hormon. Pada umumnya akseptor KB suntikan DMPA akan mengalami hal ini pada awal pemakaian, hal tersebut merupakan mekanisme penyesuaian diri terhadap hormon (Suratun, dkk, 2013: 72).

b. Perubahan berat badan (Suratun, dkk, 2013:75).

Penggunaan alat kontrasepsi hormonal dapat menimbulkan berbagai efek samping yang salah satu di antaranya adalah perubahan berat badan akseptor. Hal ini disebabkan oleh hormon progesteron yang mempermudah terjadinya perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak di bawah jaringan kulit bertambah. Penambahan berat badan merupakan salah satu efek samping yang sering

dikeluarkan oleh akseptor kontrasepsi hormonal terutama kontrasepsi hormonal suntik KB DMPA (Sari, NR, 2015: 68).

Kelebihan zat-zat gizi oleh hormon progesteron dirubah menjadi lemak dan disimpan di bawah kulit. Perubahan berat badan ini akibat adanya penumpukan lemak yang berlebih hasil sintesa dari karbohidrat menjadi lemak (Rahmawati, I dan Yayuk, 2014: 2).

Beberapa studi penelitian didapatkan peningkatan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi DMPA berkaitan dengan peningkatan lemak tubuh dan adanya hubungan dengan regulasi nafsu makan. Salah satu studi menemukan peningkatan nafsu makan yang dilaporkan sendiri oleh wanita yang menggunakan kontrasepsi DMPA setelah 6 bulan. Hal ini dapat dihubungkan dengan kandungan pada DMPA yaitu hormon progesteron, yang dapat merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan (Sari, NR, 2015: 68).

7. Komplikasi dan Penanggulangan

a. Komplikasi

Gejala dan keluhan:

1. Hematoma: warna biru dan rasa nyeri pada daerah suntikan akibat perdarahan dibawah kulit.
2. Infeksi dan Abses: rasa sakit dan bengkak di daerah suntikan. Bila terdapat abses teraba adanya benjolan yang nyeri di daerah suntikan dan adanya demam.

b. Penanggulangan

1. Hematoma: Kompres pada daerah yang membiru dengan kompres hangat hingga warna biru hilang.
2. Infeksi dan Abses: Pemberian antibiotik jika terjadi abses, bila ada fluktuasi pada abses, dapat dilakukan insisi abses setelah itu berikan tampon dan drain. Jangan lupa berikan antibiotic seperti pada perlukaan infeksi (Suratun, dkk, 2013: 76).


C. Tinjauan Khusus tentang Keluhan Amenorhea akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan.

1. Pengertian Amenorhea

Amenorhea didefinisikan sebagai ketidakhadiran atau penghentian siklus menstruasi pada wanita selama masa reproduksi. Hanya dalam tiga situasi *amenorhea* dianggap fisiologis: selama kehamilan, menyusui dan menopause. Dalam semua situasi lainnya, *amenorhea* dapat disebabkan oleh banyak kondisi patologis dan patut mendapat penilaian yang cermat (Chiavaroli, V. 2011:427).

Amenorhea diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder. *Amenorhea* didefinisikan primer ketika *menarche* tidak terjadi pada usia 16 tahun pada seorang gadis dengan perkembangan seksual sekunder yang lengkap, atau pada usia 14 tahun pada seorang gadis tanpa perkembangan seksual sekunder. *Amenorhea* didefinisikan sekunder saat siklus haid menghilang selama 6 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi tidak teratur atau selama 3 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi teratur (Chiavaroli, V. 2011:427).

2. Patofisiologi Amenorhea



Gambar 2.2: Patofisiologi Amenorhea (Sumber: Sherwood Lauralee, 2012:840)

Kita mulai dengan fase folikular siklus ovarium. Faktor-faktor yang memulai pembentukan folikel masih belum dipahami. Tahap-tahap awal pertumbuhan memerlukan dukungan hormon untuk pembentukan antrum, perkembangan folikel dan sekresi estrogen. Estrogen, FSH dan LH, semuanya dibutuhkan. Pembentukan antrum diinduksi oleh FSH. Baik FSH dan LH diperlukan untuk sintesis dan sekresi estrogen oleh folikel, tetapi kedua hormon ini bekerja pada sel yang berbeda dan pada tahap yang berbeda dalam jalur pembentukan estrogen (Sherwood Lauralee, 2012:839).

Baik sel granulosa maupun sel teka ikut serta dalam produksi estrogen. Perubahan kolesterol menjadi estrogen memerlukan sejumlah langkah berurutan, dengan yang terakhir berupa konversi androgen menjadi estrogen (Sherwood Lauralee, 2012:839). Sebagian dari estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh dikeluarkan ke dalam darah dan merupakan penyebab terus meningkatnya kadar estrogen plasma selama fase folikuler. Estrogen sisanya tetap berada dalam folikel, ikut membentuk cairan antrum dan merangsang proliferasi lebih lanjut sel granulosa (Sherwood Lauralee, 2012:839).

Selanjutnya terjadi ovulasi, luteinisasi folikel yang dipicu oleh peningkatan sekresi LH yang mendadak dan besar. Lonjakan LH ini dipicu oleh efek umpan balik positif. Sementara kadar estrogen yang meningkat pada awal fase folikuler menghambat sekresi LH, kadar estrogen yang tinggi selama puncak sekresi estrogen pada akhir fase folikuler merangsang sekresi LH dan memulai lonjakan LH (Sherwood Lauralee, 2012:839).

Karena itu, LH meningkatkan produksi estrogen yang memuncak merangsang sekresi LH. Konsentrasi estrogen dalam plasma yang tinggi bekerja secara langsung pada hipotalamus untuk meningkatkan GnRH sehingga sekresi LH dan FSH meningkat. Hal ini juga secara langsung bekerja pada hipofisis anterior untuk secara spesifik meningkatkan kepekaan sel penghasil LH terhadap GnRH. Efek yang terakhir ini berperang dalam lonjakan LH yang jauh lebih besar dari pada peningkatan sekresi FSH pada pertengahan siklus (Sherwood Lauralee, 2012:840-841).

Setelah ovulasi, ketika korpus luteum terbentuk, uterus masuk ke fase sekretorik yang bersamaan waktunya dengan fase luteal ovarium. Korpus luteum mengeluarkan sejumlah besar progesteron dan estrogen. Progesteron mengubah endometrium tebal yang telah dipersiapkan estrogen menjadi jaringan kaya vaskular dan glikogen, merujuk pada lapisan subur endometrium yang mampu menopang kehidupan mudigah. Jika pembuahan dan implantasi tidak terjadi maka korpus luteum berdegenerasi dan fase haid baru dimulai (Sherwood Lauralee, 2012: 844).

Mekanisme kerja kontrasepsi suntikan depo progestin yaitu kadar progestin di dalam sirkulasi cukup tinggi sehingga kadar FSH dan LH menurun dan tidak terjadi lonjakan LH. Pada keadaan normal terjadi puncak sekresi LH pada pertengahan siklus sehingga menyebabkan pelepasan ovum dari folikel. Sedangkan dengan kadar LH yang menurun maka tidak akan terjadi lonjakan folikel dan produksi sel telur akan berkurang sehingga menyebabkan tidak terjadinya pelepasan ovum dari folikel dan menyebabkan tidak terjadi ovulasi.

Selain itu hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH. Sehingga meskipun terjadi produksi progesteron yang berasal dari korpus luteum menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga menyebabkan penghambatan implantasi.

3. Penanganan

a. KIE

Memberikan penjelasan kepada klien bahwa pemakaian suntikan dapat menyebabkan gejala tersebut dan gejala tersebut akibat pengaruh hormonal suntikan.

b. Tindakan medis

- 1) Tindakan dilakukan yaitu dengan memberikan konseling pada akseptor DMPA
- 2) Bila klien atau pasangan tidak dapat menerima dan menginginkan haid setiap bulan, sebaiknya ganti cara dengan pil atau kontrasepsi lainnya. Suntikan jangan dilanjutkan, anjurkan pemakaian jenis kontrasepsi lainnya (Suratun, dkk, 2013: 72).

D. Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam

Keluarga Berencana adalah merupakan program pemerintah yang masih *debatable* kebolehannya dalam Islam. Bahkan golongan Islam ekstrim menganggap KB merupakan propaganda orientalis agar umat Islam tidak menjadi besar jumlahnya serta menjadi kuat dan sulit ditaklukan. Sehingga, ada sebahagian umat islam yang

menganggap KB haram dalam bentuk apapun (Pajarianto, H dan Ahmad, M, 2011: 187-188).

Para ulama yang menafsirkan larangan keluarga berencana dengan merujuk pada al-Quran Surah al-An'am/6: 151 dan al-Quran Surah Al-Isra'/17: 31

1. al-Quran Surah al-An'am/6: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

Terjemahnya:

"...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka..." (Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, 2013).

2. al-Quran Surah al-Isra'/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"(Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, 2013).

Pencegahan kehamilan adalah tindakan mencegah mani lelaki bercampur dengan ovum si wanita, dan ini bukanlah pembunuhan. Yang dimaksud oleh ayat diatas adalah kebiasaan jahiliah tentang penguburan anak hidup-hidup karena takut akan kemiskinan. Salah satu keburukan masyarakat Jahiliah adalah membunuh anak perempuan karena Faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, ayat ini melarang pembunuhan itu (Shihab, M Q, 2002: 77).

Pencegahan kehamilan bukanlah pembunuhan dan bukan pula pengguguran janin, karena mani (*nuthfah*), yang darinya suatu janin diciptakan, bukanlah suatu makhluk manusia dengan sendirinya. dalam Hadist Riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya kamu dikumpulkan selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian alaqah selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus malaikat diperintahkan untuk menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan dan kesensaraannya, kemudian meniupkan roh kedalam tubuhnya" (Ali, Z, 2010: 248).

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah (2009) juga dibahas mengenai KB. Dalam HPTM tersebut diputuskan bahwa:

1. Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula dengan KB yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan.
2. Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan mensyaratkan persetujuan suami isteri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan ruhani.

(Pajarianto, H dan Ahmad, M, 2011: 189-190).

Sehingga dapat dikatakan bahwa, sebenarnya dalam Islam tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan KB. Dalam Himpunan Putusan Tarjih kriteria darurat yang membolehkan KB adalah:

1. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan.

2. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempitan penghidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang diharamkan agama karena terdorong oleh kepentingan anak isteri.
3. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak jika kelahiran terlalu rapat (Pajarianto, H dan Ahmad, M, 2011: 190-191).

Segala macam bentuk dan cara kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan, tidak membatasi jumlah anak dan tidak mengakibatkan pemandulan abadi (Shihab, M Q, 2008: 459). Menurut PP Muhammadiyah, 2009. Membatasi jumlah keturunan adalah menghentikan kelahiran (secara permanen) setelah mencapai jumlah anak tertentu, dengan menggunakan berbagai saran yang diperkirakan bisa mencegah kehamilan (Pajarianto, H dan Ahmad, M, 2011: 191).

Selama ini sterilisasi dipahami oleh Ulama sebagai pemandulan abadi, sehingga mereka membedakannya dengan alat kontrasepsi yang lain, misalnya semacam spiral yang berfungsi untuk menghalangi pertemuan sperma dan ovum, dan sewaktu-waktu bila dikehendaki dapat dicabut. Akan tetapi jika perkembangan ilmu menemukan cara yang tidak mengakibatkan hal tersebut maka tentu hukumnya dapat berubah dari terlarang (haram) menjadi boleh (mubah) (Shihab, M Q, 2008: 459).

Praktek KB harus dijalankan menurut pilihan dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam. Vasektomi (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan tubektomi (pemotongan saluran telur pada wanita) dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus emergensi, semisal untuk mencegah penyebaran

penyakit atau untuk menyelamatkan kehidupan seseorang melalui jalur vasektomi atau tubektomi (Ulum,Khozainul, 2014: 172).

Menariknya persoalan hukum vasektomi, karena selama kurun waktu lebih kurang 30 tahun (1979 sampai dengan 2012) ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak empat kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Yang terakhir inilah menegaskan kebolehan (*ibāḥah*) vasektomi dengan syarat (Muhyiddin, 2014: 71).

Sesuai dengan Fatwa MUI tentang Keluarga Berencana. Pada tanggal 17-20 Oktober 1983 di Jakarta, MUI mengadakan Musyawarah Nasional Ulama dengan tema Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang dihadiri oleh lima puluh ulama dan empat dokter medis. Dalam Munas tersebut, diputuskan bahwa Islam membenarkan praktek Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak, dan untuk perhatian pendidikan anak (Ulum,Khozainul, 2014: 171-172)

Dalil yang dipakai dalam keputusan fatwa di atas hanya merujuk kepada al-Quran dan hadits, tanpa merujuk kepada teks-teks fiqh. Jumlah ayat al-Quran yang dipakai dasar dalam fatwa tersebut adalah 15 ayat, sedangkan hadits berjumlah enam. Ayat-ayat al-Quran yang dikutip pada dasarnya berkenaan dengan nilai-nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan jika tidak diurus dan dipelihara dengan baik, kenyataan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan memunculkan benih-benih kasih sayang pada mereka, dan bahwa para ibu dapat menyusui bayi-bayinya selama dua tahun penuh atau hingga 30

bulan yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki (Ulum,Khozainul, 2014: 172)

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Quran Surah al-Baqarah/2: 233).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, 2013).

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah al-Quran Surah An-Nisa’/4:9.

وَلْيَحْضِرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2013).

Suami istri harus mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain (masyarakat). Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Kepala klinik keluarga berencana Muhammadiyah, Dr Koesnadi sangat mendukung program ini. Ia menulis: “Motivasi melakukan keluarga berencana adalah hal yang paling penting bagi kaum

muslimin, bila hal itu dilakukan karena alasan keadaan darurat baik pada tingkat keluarga atau bangsa, maka hal itu perlu dikhawatirkan (Firdayanti, 2012: 226)

Kongres Nasional Muhammadiyah tahun 1971 memperbolehkan penggunaan kontrasepsi untuk maksud menjarangkan kelahiran. Pada tahun 1973, Muhammadiyah mendirikan Pusat Keluarga Berencana, tanda diterimanya dengan penuh program keluarga berencana (Firdayanti, 2012: 226).

E. *Proses Manajemen Asuhan Kebidanan*

1. *Pergertian Manajemen Asuhan Kebidanan*

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan, dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang berfokus pada klien

Proses manajemen terdiri dari 7 langkah berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik.

2. *Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan*

Varney mengatakan bahwa seorangbidan perlu lebih kritis melakukan analisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis dan masalah potensial.

Adapun tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney adalah

a. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1) Anamnese, meliputi:

Melakukan Tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: riwayat kesehatan, riwayat reproduksi: riwayat haid, riwayat obstetri, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Amenorhea pada umumnya akan dikeluhkan seorang akseptor pada penggunaan 12 bulan. Pada awal pemakaian sebagian ibu akan mengeluh perdarahan yang tidak teratur yang tidak dapat diprediksi dan bercak darah yang berlangsung selama 7 hari atau lebih atau perdarahan hebat selama beberapa bulan pertama penggunaan DMPA. Semua kejadian ini secara bertahap menjadi lebih jarang dengan durasi lebih pendek sampai klien mengalami *amenorhea*. Ibu akan mengeluh tidak haid sampai tiga bulan berturut-turut bahkan lebih. Mungkin juga akan disertai dengan keluhan lainnya, diantaranya kenaikan berat badan.

2) Pemeriksaan fisik, meliputi:

keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

b. Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan interpretasi atas data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah dan diagnosa. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat terselesaikan, tetapi sudah membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah *amenorhea* ditetapkan berdasarkan interpretasi data dasar yang dikumpulkan bahwa akseptor tidak mengalami haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih sejak pemakaian kontrasepsi suntikan DMPA.

c. Identifikasi Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah aktual dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

d. Tindakan Segera/ Kolaborasi

Merupakan tindakan segera terhadap kondisi yang diperkirakan akan membahayakan klien. Tindakan ini dilaksanakan secara kolaborasi dan rujukan sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus *amenorrhea* tidak diperlukan adanya tindakan segera dan atau kolaborasi, jika dalam keadaan tertentu terjadi keluhan maka perlu dilakukan tindakan bergantung keadaan klien.

e. Rencana Tindakan Asuhan yang menyeluruh

Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan dengan semua aspek asuhan kebidanan. Rencana dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta *evidence* terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Adapun penatalaksanaan *amenorhea* adalah menjelaskan kepada klien penyebab terjadinya *amenorhea* yaitu *amenorhea* terjadi karena merupakan efek samping dari pemakaian suntikan tiga bulan yaitu suntikan hormonal (DMPA) menghambat ovulasi dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada dinding rahim dan selaput rahim menipis, sehingga rahim tidak mengalami penebalan dan memungkinkan klien tidak mendapatkan haid dalam jangka waktu tertentu. Biasanya klien akan mengalami *spotting*, *metrorrhagia*, atau *menomethoragia* pada awal pemakaian dan bertahap kemudian mengalami *amenorhea*.

Klien perlu memahami bahwa gejala atau keluhan tersebut merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan karena merupakan proses penyesuaian diri dan bersifat sementara, memastikan bahwa klien tidak merasa cemas dan tetap ingin memakai kontrasepsi suntikan. Pada kondisi tertentu, jika klien tidak dapat menerima kelainan tersebut, sebaiknya ganti cara dengan pil atau kontrasepsi lainnya. Suntikan jangan dilanjutkan, anjurkan pemakaian jenis kontrasepsi lainnya

Jika terjadi komplikasi (Infeksi dan Abses) pada daerah suntikan maka perlu dilakukan pemberian antibiotik, bila ada fluktuasi pada abses, dapat dilakukan insisi abses setelah itu berikan tampon dan drain. Diberikan kompres pada daerah yang membiru dengan kompres hangat hingga warna biru hilang.

f. Pelaksanaan (Implementasi)

Melaksanakan rencana tindakan secara efisien dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efisien terhadap waktu, biaya dan kualitas pelayanan.

g. Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan asuhan yang diberikan. Hasil evaluasi dapat menjadi data dasar untuk menegakkan diagnosa dan rencana selanjutnya. Yang dievaluasi adalah apakah diagnosa sesuai, rencana asuhan efektif, masalah teratasi, masalah telah berkurang, timbul masalah baru, dan kebutuhan telah terpenuhi.

Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan.

Metode 4 langkah pendokumentasian SOAP yaitu:

1. Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnese dengan klien.

2. Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

3. Assesment (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

4. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan

evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien.

SOAP ini dilakukan pada asuhan akseptor KB pada tahap berikutnya, dan atau kunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan klien. kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.



BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA
IBU AKSEPTOR KB SUNTIK DEPO MEDROKSIPROGESTERON
ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA DI BPM SRIKANDI
GOWATANGGAL 22 APRIL-22 JUNI 2017**

No. Register : 56xxxx
Tanggal Kunjungan : 22 April 2017 Pukul : 09.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 22 April 2017 Pukul : 09.35 WITA

A. Langkah 1. Identifikasi Data Dasar

1. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "W" / Tn "A"
Umur : 28 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ±6 Tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Honorer
Alamat : Jl. Malino

2. Data Biologis

a. Keluhan utama

Selama ber-KB ibu mengalami haid yang tidak teratur, ibu tidak haid selama 3 bulan berturut-turut dan kadang lebih dari 3 bulan.

b. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM dan penyakit lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit menular, ibu tidak pernah menderita penyakit menurun, tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan.

c. Riwayat kesehatan keluarga

Tidak ada riwayat penyakit menular, tidak ada riwayat penyakit menurun.

d. Riwayat reproduksi

Ibu mendapatkan haid pertama atau menarche pada usia 13 tahun, siklus haid ibu teratur, lamanya sekitar 5-7 hari, ibu tidak pernah mengalami nyeri yang hebat saat haid (*Disminorhea*), ibu mempunyai 3 anak dan tidak pernah mengalami keguguran.

e. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.

Anak -ke	Tahun/umur	JK	Tempat	Penolo ng	BBL (gr)	UK	Persalin an	Laktasi
1	2012/ 5 tahun	P	PKM	Bidan	2900	42 mg	Normal	tidak
2	2015/ 2 tahun	L	RS	Dokter	2500	40 mg	SC	Tidak
3	2015/ 2 tahun	P	RS	Dokter	2600	40 mg	SC	Tidak

(Tabel 3.1: Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas)

f. Riwayat ginekologi

Ibu tidak pernah mengalami penyakit kelamin, tumor dan sistem reproduksi.

g. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama ± 2 tahun.

3. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Ibu makan sebanyak 3 kali sehari dan minum air sebanyak 7-8 gelas sehari, nafsu makan baik. Ibu tidak mengalami gangguan sistem pencernaan dan sistem perkemihan, ibu BAB 1-2 kali sehari dan BAK 3-4 kali sehari. Ibu menjaga kebersihan dirinya dengan caramandi dan sikat gigi sebanyak 2 kali sehari dan ibu mencucirambutnya sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Ibu juga selalu menjaga kesehatan dan istirahat yaitu tidur siang sebanyak ± 1 jam dan tidur malam $\pm 7-8$ jam.

4. Data Psikologi dan Spiritual

Ibu belum ada rencana untuk hamil lagi, ibu dan suaminya bersama dalam mengambil keputusan untuk berKB, ibu berkeyakinan bahwa tidak ada larangan dalam agama untuk berKB, ibu menjalankan shalat 5 waktu sehari.

5. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum ibu baik.
- b. Kesadaran composmentis.
- c. Tanda-tanda vital.

TD : 120/80 mmHg

N : 80 x/menit

P : 24 x/menit

S : 36,6°C

d. BB : 56 kg

e. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

f. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

g. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, Gigi tampak bersih, tidak ada caries.

h. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

i. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

j. Abdomen

Inspeksi : Terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

k. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

6. Pemeriksaan Laboratorium

Tidak dilakukan.

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual**1. Diagnosa/Masalah Aktual : Akseptor KB suntik DMPA dengan Amenorhea.****a. Data Subjektif**

Ibu menjadi akseptor KB DMPA sejak: Februari 2015, Ibu mengeluh tidak haid selama 3 bulan berturut-turut dan kadang lebih dari 3 bulan. Ibu cemas dengan keadaan yang dialaminya.

b. Data Objektif**1. Tinjauan kartu KB**

Suntikan I : tanggal 02 April 2016

Suntikan II : tanggal 25 Juni 2016

Suntikan III : tanggal 17 September 2016

Suntikan IV : tanggal 10 Desember 2016

Suntikan V : tanggal 04 Februari 2017

2. Siklus haid : tidak teratur

c. Analisa dan Interpretasi Data

1) DMPA disuntikkan intra muskular setiap 12 minggu dengan kelonggaran batas waktu suntik, bisa diberikan kurang dari 1 minggu atau lebih 1 minggu dari patokan 12 minggu.

2) Amenorhea atau tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor KB DMPA karena

hal tersebut tidak membahayakan kesehatan dan bersifat sementara. Ketika suntikan dihentikan maka kesuburan akan kembali secara berangsur-angsur.

- 3) Penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA biasanya menyebabkan terlambanya kesuburan kembali oleh karena itu penjelasan perlu diberikan pada ibu usia muda yang ingin menunda kehamilan dan dalam waktu dekat ingin merencanakan kehamilan.

C. Langkah III. Identifikasi Masalah Potensial

Antisipasi terjadinya Drop Out

D. Langkah IV. Tindakan Segera atau Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan segera dan atau kolaborasi.

E. Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

1. Tujuan

- a. Agar ibu tetap menjadi akseptor KB selama waktu yang ditentukan

2. Kriteria

- a. Keadaan umum ibu baik.
- b. Tanda-tanda vital dalam batas normal.
- c. Ibu mendapat suntikan KB secara teratur.
- d. Ibu datang pada kunjungan berikutnya dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan suntikan ulang tanggal 15 Juli 2017.

3. Rencana Tindakan

Tanggal 22 April 2017

- a. Sambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).

Rasional : Dengan 5S, akan terjalin hubungan baik antara klien dan petugas kesehatan selain itu ibu akan merasa nyaman.

- b. Tanyakan keluhan ibu

Rasional : Agar klien diberikan penjelasan terkait keluhannya dan diberikan tindakan yang sesuai.

- c. Jelaskan kepada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian KB suntik DMPA.

Rasional : Agar ibu tidak cemas apabila timbul efek samping lain.

- d. Lakukan *informed consent* sebelum melakukan suntikan.

Rasional : Agar ibu merasa nyaman.

- e. Berikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur.

Rasional : Agar kebutuhan klien terpenuhi dalam kesinambungan pelayanan KB.

- f. Anjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Rasional : Agar klien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu.

g. Anjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 15 Juli 2017.

Rasional : Suntikan diberikan setiap 90 hari atau 12 minggu untuk mencegah kehamilan sebagai akibat dari pemberian suntikan yang terlambat.

F. Langkah VI. Implementasi Tindakan

Tanggal: 22 April 2017

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).
2. Menanyakan keluhan ibu
3. Menjelaskan kepada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian KB suntik DMPA.
4. Melakukan *informed consent* sebelum melakukan suntikan.
5. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur.
6. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.
7. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal :15 Juli 2017.

G. Langkah VII. Evaluasi

Tanggal: 22 April 2017

1. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan kepadanya.
2. Ibu mengerti tentang penyebab amenorhea dan tidak merasa cemas dengan hal tersebut.
3. Ibu masih ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA.
4. Ibu bersedia datang kembali pada tanggal 15 Juli 2017 untuk mendapatkan suntikan ulang.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “W” AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA
DENGAN AMENORHEA DI BPM SRIKANDI GOWA
TANGGAL 22 APRIL 2017**

Identitas istri/suami

Nama : Ny “W” / Tn “A”

Umur : 28 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ±6 Tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Honorer

Alamat : Jl. Malino

Subjektis (S)

Ibu menjadi akseptor KB suntik DMPA sejak: Mei 2012, ibu mengeluh haidnya tidak teratur sejak ber-KB, ibu tidak mendapatkan haid selama 3 bulan berturut-turut dan kadang lebih dari 3 bulan, ibu cemas dengan keadaan yang dialaminya,ibu dan suaminya bersama dalam mengambil keputusan untuk ber-KB.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Tanda-tanda vital:
 - TD : 120/80 mmHg
 - N : 80 x/menit
 - P : 24 x/menit
 - S : 36,6°C
3. BB : 56 kg
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah
 - Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.
 - Palpasi : Tidak ada edema.
 - b. Mata
 - Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.
 - c. mulut
 - Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, Gigi tampak bersih, tidak ada caries.
 - d. Leher
 - Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
 - e. Payudara
 - Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.
 - Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

5. Pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan DMPA 150 mg.

Assesment (A)

Akseptor KB Suntikan DMPA dengan *Amenorhea*.

Planning (P)

Tanggal :22 April 2017

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).

Hasil : Ibu telah disambut dengan 5S.

2. Menanyakan keluhan ibu

Hasil : Ibu mengatakan haidnya tidak teratur, kadang haid lebih dari 3 bulan sekali

3. Menjelaskan kepada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian KB suntik DMPA.

Hasil : Sudah dilakukan

4. Melakukan *informed consent* sebelum melakukan suntikan.

Hasil : Ibu setuju untuk disuntik.

5. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur.

Hasil : Ibu telah disuntikkan DMPA 150 mg secara IM.

6. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang kembali jika ada masalah.

7. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 15 Juli 2017.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “W” AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA
DENGAN AMENORHEA DI BPM SRIKANDI GOWA
TANGGAL 23 APRIL 2017**

Identitas istri/suami

Nama : Ny “W” / Tn “A”

Umur : 28 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ±6 Tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Honorer

Alamat : Jl. Malino

Subjektis (S)

Ibu mendapatkan haid terakhir pada bulan 12 tahun 2016 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang, ibu merasa cemas.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.

2. Tanda-tanda vital:

TD : 120/80 mmHg

N : 80 x/menit

P : 24 x/menit

S : 36,6°C

3. BB : 56 kg

4. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

c. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, Gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, tidak tampak perubahan warna dan pengeluaran cairan

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

Assesment (A)

Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

Planning (P)

Tanggal :23 April 2017

1. Melakukan pemeriksaan ttv

Hasil : TD : 120/80 mmHg, N : 80 x/menit, P: 24 x/menit, S : 36,6 °C

2. Menimbang BB ibu

Hasil : BB : 56 kg

3. Melakukan pemeriksaan fisik payudara dan leher ibu

Hasil : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan pada payudara, tidak ada perubahan warna dan tidak ada pengeluaran cairan. Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid pada leher.

4. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan *amenorrhea* yang dialaminya merupakan hal yang wajar dialami oleh akseptor KB suntikan DMPA dan tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu kesehatan.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

5. Menjelaskan kembali kepada ibu tentang efek samping lain yang bisa timbul dari pemakaian DMPA

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Menggali masalah atau keluhan yang dialami ibu yaitu menanyakan apakah ibu tidak mengalami sakit kepala, spotting (haid sedikit-sedikit), perdarahan, kenaikan berat badan, perubahan warna kulit atau timbulnya jerawat dan keluhan lainnya

Hasil : Ibu mengatakan semenjak pemakaian suntikan DMPA terkadang mengalami haid sedikit-sedikit dan merasa badannya semakin gemuk

7. Menanyakan kepada ibu tentang pola makannya, apakah nafsu makan ibu berbeda sebelum dan sesudah memakai suntikan DMPA.

Hasil : Ibu merasa nafsu makannya baik bahkan mengalami peningkatan setelah memakai suntikan DMPA.

8. Menjelaskan kepada ibu bahwa hal yang dialaminya merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak perlu dicemaskan

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tetap ideal.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.

10. Menjelaskan kepada ibu tentang SADARI dan mengajarkan cara melakukan SADARI

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melakukan SADARI.

11. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “W” AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA
DENGAN AMENORHEA DI BPM SRIKANDI GOWA
TANGGAL 20 MEI 2017**

Identitas istri/suami

Nama : Ny “W” / Tn “A”

Umur : 28 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ±6 Tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Honorer

Alamat : Jl. Malino

Subjektis (S)

Setelah berKB ibu mengalami haid yang tidak teratur, ibu mendapatkan haid pada bulan 12 tahun 2016 dan mendapatkan haid kembali pada tanggal 13 mei 2017. Ibu haid dalam jumlah yang sedikit berupa bercak dan berlangsung selama 2 hari, ibu merasakan badannya terasa berat dan ibu lebih sering makan karena cepat lapar dan nafsu makan bertambah.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.

2. Tanda-tanda vital:

TD : 120/90 mmHg

N : 80 x/menit

P : 24 x/menit

S : 36,6°C

3. BB : 57 kg

4. Pemeriksaan fisik

1. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

h. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

i. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, Gigi tampak bersih, tidak ada caries.

j. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan vena jugularis.

k. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, tidak tampak perubahan warna dan pengeluaran cairan.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

l. Abdomen

Inspeksi : Terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

m. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

Assesment (A)

Akseptor KB Suntik DMPA dengan kenaikan berat badan dan *spotting*

Planning (P)

Tanggal : 20 Mei 2017

1. Menjelaskan kepada ibu seperti yang dijelaskan pada kunjungan sebelumnya bahwa akseptor KB suntik DMPA bisa saja mengalami efek samping lain seperti *spotting* dan kenaikan berat badan seperti yang dialami ibu saat ini.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab dari kenaikan berat badan dan *spotting* akibat penggunaan KB suntik DMPA.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Menganjurkan kepada ibu untuk mengatur pola makan dan rutin melakukan olahraga agar berat badan ibu tidak terus bertambah.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

4. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut adalah hal yang normal dan biasa terjadi pada pengguna kontrasepsi suntik DMPA.

Hasil : Ibu mengerti.

5. Menanyakan kepada ibu apakah sudah melakukan SADARI dan apakah tidak menemukan kelainan saat melakukan SADARI

Hasil : Ibu telah melakukannya dan ibu tidak mendapatkan kelainan.

6. Menggali masalah atau keluhan yang dialami ibu yaitu menanyakan apakah ibu tidak mengalami pusing (sakit kepala), dan keluhan lain yang biasa timbul akibat pemakaian DMPA

Hasil : Ibu tidak mengalami keluhan lainnya.

7. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “W” AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA
DENGAN AMENORHEA DI BPM SRIKANDI GOWA
TANGGAL 22 JUNI 2017**

Identitas istri/suami

Nama : Ny “W” / Tn “A”

Umur : 28 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ±6 Tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Honorer

Alamat : Jl. Malino

Subjektis (S)

Haid terakhir ibu tanggal 13 mei 2017, ibu telah mengatur pola makan dan melakukan olahraga.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.

2. Tanda-tanda vital:

TD : 120/90 mmHg

P : 24 x/menit

N : 80 x/menit

S : 36,6°C

3. BB : 57 kg

4. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

c. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, Gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

Assesment (A)

Akseptor KB Suntik DMPA dengan kenaikan berat badan.

Planning (P)

Tanggal : 22Juni 2017

1. Mengukur ttv

Hasil : TD : 120/90 mmHg, N : 80 x/menit, P: 24 x/menit, S: 36,6°C

2. Menimbang BB ibu

Hasil : 57 kg.

3. Menjelaskan kepada ibu agar tetap mempertahankan pola makan dan melakukan olahraga secara teratur agar BB ibu tidak terus bertambah.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Menjelaskan kepada ibu bahwa semua keluhan yang dialaminya ada hal yang tidak perlu dicemaskan karena merupakan hal yang normal dan tidak mengganggu kesehatan.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

5. Menjelaskan kepada ibu agar datang kapan saja ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan kontrasepsinya.

Hasil : ibu bersedia.

6. Mengingatkan kembali kepada ibu bahwa jadwal suntikan ulangnya adalah tanggal 15 juli 2017.


Hasil : Ibu mengerti.

7. Memastikan bahwa ibu akan datang untuk suntikan ulangnya dan tetap ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA

Hasil : Ibu bersedia datang kembali dan ingin tetap menjadi akseptor KB suntik DMPA.

8. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti

Hasil : Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil studi pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny “W” akseptor KB suntik DMPA dengan *amenorhea* di BPM Srikandi Gowa tanggal 22 April – 22 Juni 2017.

Dalam pembahasan ini penulis akan menerapkan asuhan sesuai dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan langkah pertama dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan terfokus.

Pada langkah ini penulis melakukan pengkajian asuhan kebidanan pada Ny “W” yaitu menanyakan identitas klien, menanyakan keluhan utama termasuk riwayat rinci dan melakukan pemeriksaan fisik.

Dari hasil pengkajian data awal didapatkan data bahwa ibu datang dengan keluhan haid tidak teratur yaitu ibu tidak mendapatkan haid selama 3 bulan berturut-

turut dan kadang lebih dari 3 bulan semenjak ibu menjadi akseptor KB suntik DMPA. Ibu menjadi akseptor KB suntik DMPA sudah lebih dari 2 tahun. Keluhan ibu tersebut menandakan bahwa ibu mengalami *amenorhea*. Tahap selanjutnya, penulis melakukan kunjungan pertama ke rumah klien pada keesokan harinya yaitu tanggal 23 April 2017. Dari hasil pengkajian yang dilakukan diperoleh data yaitu tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, berat badan ibu yaitu 56 kg, pemeriksaan fisik dalam batas normal dan ibu masih mengalami *amenorhea*.

Kunjungan berikutnya yaitu pada tanggal 20 Mei 2017, penulis mengkaji keadaan klien dan diperoleh data yaitu hasil penimbangan berat badan Ny “W” yaitu 57 kg, Ny “W” sudah mendapatkan haid pada tanggal 13 Mei 2017 dengan jumlah darah yang keluar sangat sedikit dan berlangsung selama 2 hari. Dari data yang diperoleh, ibu mengalami *spotting* dan kenaikan berat badan. Ibu tidak menemukan kelainan saat melakukan SADARI. Kunjungan ketiga yaitu pada tanggal 22 Juni 2017, diperoleh data bahwa hasil penimbangan berat badan Ny “W” yaitu 57 kg hal ini menunjukkan bahwa berat badan ibu masih sama pada kunjungan sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas yaitu pada penemuan awal Ny “W” mengalami *amenorhea* kemudian pada kunjungan berikutnya Ny “W” mengalami *spotting* yang berlangsung selama 2 hari dan kenaikan berat badan sebanyak 1 kg yaitu dari 56 kg menjadi 57 kg sampai pada kunjungan ketiga.

Menurut teori, kontrasepsi hormonal DMPA atau kontrasepsi suntik 3 bulan mengandung 150 mg progesteron yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik secara IM dibokong ibu, pada akseptor KB Suntik DMPA sering ditemukan gangguan

haid salah satunya *Spotting* (bercak-bercak perdarahan) dan *amenorhea* (suatu kondisi dimana seorang wanita tidak mengalami haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih) (Koesno, H, 2012: MK 43-MK 44). Hormon progesterone yang ada didalam Kontrasepsi suntik 3 bulan terhadap endometrium menyebabkan sekretorik, hal inilah yang menyebabkan terjadinya spotting pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan. Semakin lama akseptor menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan maka tidak akan mengalami spotting lagi tetapi akan cenderung tidak akan mengalami haid (Susanti, LW, 2015 :37).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina catur setyaningrum, terdapat hubungan antara lama pemakaian kontrasepsi suntikan DMPA dengan kejadian *amenorhea* dan *spotting* dimana dari 25 akseptor yang menggunakan DMPA kurang dari 1 tahun, 8 orang mengalami *spotting* dan yang menggunakan DMPA lebih dari 1 tahun, hanya 1 orang yang mengalami *spotting*. Akseptor mengalami *spotting* selama lebih dari 7 hari setelah tidak mendapatkan haid selama lebih dari 90 hari kemudian secara bertahap kejadian *spotting* menjadi semakin singkat yaitu selama kurang dari 7 hari hingga tidak mendapatkan haid sama sekali. (Setyaningrum, AC, 2008:153-154).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Darmawati, tentang hubungan kontrasepsi suntikan terhadap kenaikan berat badan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati yaitu dari 38 akseptor yang menggunakan kontrasepsi suntikan DMPA, 37 diantaranya mengalami kenaikan berat badan dan hanya 1 akseptor yang tidak mengalami kenaikan berat badan (Darmawati, 2012:4). Sehingga Darmawati menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi suntikan

dengan kenaikan berat badan pada akseptor kontrasepsi hormonal di Desa Batoh, kecamatan Lueng Bata, sehingga direkomendasikan bagi perawat, bidan dan petugas kesehatan lain agar memberikan konseling tentang efek samping dari kontrasespsi hormonal serta cara mengatasi kenaikan berat badan yang berlebihan sehingga tidak ada kekhawatiran dari akseptor kontrasepsi tersebut (Darmawati, 2012:7).

Zahera Ibrahim juga melakukan penelitian menggunakan chi-square diperoleh hasil $P = 0,226$ ($P > 0,05$) artinya tidak ada hubungan antara lama pemakaian alat kontrsepsi hormonal dengan kenaikan berat badan di wilayah kerja Puskesmas Pembantu Sungai Mengkuang kabupaten Bungo. Pada penelitian ini Zahera Ibrahim mengatakan penelitian yang ia lakukan tidak sesuai teori yang mengatakan penggunaan jangka panjang KB hormonal turut memicu terjadinya peningkatan berat badan. Dimana hasil peneliti ini responden yang menggunakan KB hormonal $>3-4$ tahun dan $>4-5$ tahun tidak mengalami kenaikan berat badan sehingga Zahera Ibrahim memberikan kesimpulan bahwa kemungkinan efek samping KB hormonal tersebut tergantung kepada individu yang menggunakan (Ibrahim, Z, 2015:23).

Pemakaian KB DMPA juga meningkatkan resiko terkena tumor payudara, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setowati, D dkk, 2016 mengatakan bahwa memakai KB hormonal berisiko 2,990 kali lebih besar terkena kanker payudara dibandingkan yang tidak memakai KB hormonal dengan nilai $p=0,001$ setelah dihitung menggunakan analisis regresi logistik dengan metode backward. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Al-Amri, Fahad et al., pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang bermakna antara pemakaian kontrasepsi hormonal dengan terjadinya kanker payudara. Penelitian tersebut dilakukan di Saudi Arabia menggunakan desain penelitian kasus *control*. Dalam penelitian ini diberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pemakaian KB Hormonal dengan kejadian kanker payudara (Setiowati, D, 2016 : 16).

Hasil ini didukung oleh landasan teori tentang ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen yang notabene digunakan untuk bahan alat KB hormonal. Ada dua teori yang membahas tentang cara estrogen dan progesteron menyebabkan kanker payudara. Yang pertama, risiko mutasi sel saat pembelahan meningkat karena proliferasi sel oleh peningkatan estrogen dan progesteron juga meningkat. Teori yang kedua, estrogen dan progesteron merangsang pertumbuhan sel-sel punca kanker payudara (Setiowati, D, 2016 : 16).

Pengguna kontrasepsi hormonal perlu mengetahui apa itu SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) dan cara melakukannya agar masalah yang berkaitan dengan payudara akibat pemakaian kontrasepsi hormonal dapat terdeteksi lebih dini.

SADARI merupakan pemeriksaan payudara yang dilakukan sendiri dengan belajar melihat dan memeriksa perubahan payudaranya sendiri setiap bulan. Dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara teratur akan diketahui adanya benjolan atau masalah lain sejak dini walaupun masih berukuran kecil sehingga lebih efektif untuk diobati (Depkes RI, 2009:14).

SADARI sebaiknya dilakukan oleh setiap perempuan tiap bulan pada usia 20 tahun atau sejak menikah. Pemeriksaan klinis oleh petugas kesehatan terlatih

sebaiknya dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun setiap 3 tahun sekali. Waktu yang baik untuk melakukan SADARI yaitu pada hari ke 7-10 yang dihitung sejak hari ke-1 mulai haid saat payudara sudah tidak mengeras dan nyeri atau bagi yang telah menopause pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama setiap bulannya misalnya setiap tanggal 1 atau tanggal lahirnya (Depkes RI, 2009:13-14).

Cara melakukan pemeriksaan SADARI pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat payudara dalam hal ukuran, warna, bentuk atau jika ada kerutan dan lekukan seperti lesung pipi pada kulit. Perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan diatas kepala dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan pada pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi (Depkes RI, 2009:15-16).

Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Kemudian dilakukan perabaan payudara, pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa sambil berbaring diletakkan bantal dibawah pundak sisi payudara yang akan diperiksa (Depkes RI, 2009:16).

Angkat tangan kiri keatas kepala. Gunakan tangan kanan untuk menekan payudara kiri ketiga jari tangan. Mulailah dari daerah puting susu dengan gerakan memutar di seluruh permukaan payudara. Rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada diantara payudara, di bawah

lengan dan dibawah tulang selangka. Angkat tangan kanan ketatas kepala lalu ulangi prosedur dengan menggunakan tangan kiri pada payudara kanan (Depkes RI, 2009:17).

Jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut pada bulan sebelumnya. Jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah, pada ibu yang tidak menyusui maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut (Depkes RI, 2009:17-18).

Dari penjelasan teori dan hasil penelitian yang mendukung diatas maka dapat disimpulkan bahwa penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada.

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Manajemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang diperoleh dari hasil pengkajian Ny “W” pada tanggal 22 April-22 Juni 2017, maka penulis merumuskan diagnosa masalah aktual: Akseptor KB Suntik DMPA dengan *amenorhea*, kenaikan berat badan dan *spotting*.

Masalah/diagnosa *amenorhea* pada Ny “W” ditetapkan berdasarkan pada penemuan awal tanggal 22 April 2017 dan dilanjutkan pada kunjungan rumah klien pada tanggal 23 April 2017 yaitu Ny “W” mengeluh haidnya tidak teratur yaitu tidak haid selamat 3 bulan berturut-turut bahkan lebih sejak pemakaian KB suntik DMPA.

Hal yang dialami oleh Ny “W” ini pada umumnya dialami oleh akseptor KB suntik DMPA Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriatun Nur Laely dimana akseptor suntik DMPA paling banyak mengalami gangguan menstruasi berupa *amenore* (Laely, FN dan Fajarsari, D, 2011:11).

Masalah/Diagnosa *Spotting* ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh pada kunjungan kedua yaitu Ny “W” mengalami haid dalam jumlah yang sangat sedikit berupa bercak-bercak darah yang berlangsung selama 2 hari. Keluhan yang dialami oleh Ny “W” ini merupakan hal yang biasa dialami oleh akseptor KB suntik DMPA. Hal ini sesuai hasil penelitian Setyaningrum yaitu ada hubungan antara lama pemakaian Depo Medroksiprogesteron Asetat dengan kejadian spotting. ($r = -0,382$, $P \text{ value} = 0,004$) (Setyaningrum, AC, 2008:156).

Pada kasus Ny “W” didapatkan bahwa ibu mengalami *amenorhea* yaitu tidak haid selama kurang lebih 5 bulan dan kemudian mengalami *spotting* selama 2 hari. Hal ini disebabkan karena komponen yang terkandung dalam DMPA menyebabkan gangguan haid yaitu pemanjangan siklus menstruasi yang secara bertahap menjadi tidak menstruasi sama sekali. Hal ini sejalan dengan berkurangnya darah menstruasi pada akseptor DMPA. Meskipun penelitian setyanungrum menunjukkan adanya hubungan antara lama pemakaian dengan gangguan haid. Akan tetapi gangguan haid juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain (Setyaningrum, AC, 2008:155).

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi diantaranya adalah stres, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin C Tombokan

yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan moderat yang bermakna antara stres dan pola siklus menstruasi (Tombakan, KC dkk, 2017:6).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitoayu yaitu stress berhubungan dengan siklus menstruasi. Pada responden yang mengalami stress terdapat resiko 7, 27 kali gangguan siklus menstruasi dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami stres. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara stres dengan gangguan menstruasi (Sitoayu, L dkk, 2017:126).

Pada kasus Ny “W” didapatkan bahwa ibu tidak mengalami stres dan tidak sedang menghadapi masalah, sehingga pada kasus ini stres bukan merupakan faktor ibu mengalami gangguan haid, melainkan karena pengaruh hormonal akibat pemakaian kontrasepsi suntikan DMPA.

Status gizi juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitoayu yang mengatakan bahwa Hubungan status gizi dengan siklus menstruasi memiliki nilai *p-value* 0,004 dan *prevalence ratio* 14,59. Sebagian besar responden (73,5%) memiliki status gizi normal dan 22% responden mengalami status gizi lebih. Siklus menstruasi tidak normal memiliki persentase yang tinggi pada status gizi tidak normal (43,4%) dan pada status gizi lebih (25,3) (Sitoayu, L, 2017:123).

Aktivitas fisik yang berat juga dapat berpengaruh terhadap kejadian gangguan menstruasi seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Mahitala yaitu Berdasarkan kaitan aktivitas fisik dengan gangguan menstruasi wanita Pasangan Usia Subur

menunjukkan bahwa persentase kejadian gangguan menstruasi lebih besar pada aktivitas berat (75,8 %), sedangkan persentase tidak terjadi gangguan menstruasi lebih besar pada aktivitas ringan dan sedang (66,7 %). Aktivitas fisik dilakukan dengan beban berat atau secara berlebihan setiap harinya dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan wanita. Beban berat yang dilakukan akan menimbulkan kelelahan fisik dan mental. Keadaan fisik yang lelah dan emosi yang tidak menentu dapat berpengaruh terhadap siklus menstruasi yaitu terlambatnya menstruasi (Mahilata, A, 2015:78).

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anandita yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara aktifitas fisik dengan gangguan menstruasi (Anandita, P, 2016:525). Disimpulkan bahwa Aktifitas fisik tidak selamanya berpengaruh terhadap gangguan menstruasi, hal ini tergantung individu masing-masing.

Masalah/Diagnosa kenaikan berat badan ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh pada kunjungan kedua dan ketiga yaitu hasil pemantauan BB Ny “W” meningkat dari 56 kg menjadi 57 kg. ibu merasakan badannya terasa berat, nafsu makan bertambah dan ibu jarang melakukan olahraga.

Masalah kenaikan berat badan memang pada umumnya dialami oleh seorang akseptor KB Suntik DMPA hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormone yang terjadi didalam tubuh. Peneletian yang dilakukan oleh Haryani sejalan dengan penelitian ini dimana Berdasarkan pada hasil penelitian dari 76 akseptor, rata-rata Kenaikan berat badan akseptor setelah menggunakan KB suntik DMPA sebanyak 6,8

kg. Pengaruh frekuensi kontrasepsi suntik DMPA terhadap kenaikan berat badan pada akseptor kontrasepsi suntik DMPA adalah 16,1% dengan persamaan garis regresi $Y=4,830+0,112X$. Sehingga semakin banyak akseptor melakukan suntik DMPA maka berat badan juga cenderung akan meningkat. (Haryani, DD,2010:71).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atania Rachma A dimana pengguna KB Suntik 3 bulan mengalami penambahn berat badan lebih banyak dari pada yang tidak mengalami penambahan berat. Pada umumnya perubahan berat badan tergantung dari kondisi hormonal, usia, kejiwaan, psikologis, hereditas, makanan dan lingkungan fisik dari masing-masing individu (Rahmah, A dan Widatiningsih, S,2016:44).

Pada kasus Ny “W” didapatkan bahwa ibu merasakan nafsu makannya bertambah dan tidak rutin melakukan olahraga sehingga dapat disimpulkan bahwa selain faktor hormonal, status gizi dan aktivitas fisik juga mempengaruhi siklus menstruasi dan kenaikan berat badan yang dialami oleh Ny “W”. Pada tahap ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada.

C. Langkah III. Identifikasi Masalah Potensial

Merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian, yaitu Ny “W” mengalami *amenorhea*, *spotting* dan kenaikan berat badan, maka perlu diantisipasi terjadinya Drop Out (DO).

DO atau putus pemakaian merupakan suatu kondisi dimana peserta KB tidak melanjutkan penggunaan kontrasepsi. Kasus DO tidak termasuk yang ganti cara. Menurut SDKI angka DO cukup tinggi yaitu 20,7 % dimana sebagian besar penyebabnya adalah karena ingin hamil lagi, mengalami efek samping, ingin metode yang lebih efektif, dan kurangnya akses. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka petugas kesehatan dapat meningkatkan kualitas konselingnya agar klien tidak DO. Apabila konseling yang diberikan berkualitas maka seharusnya tidak terjadi DO bagi klien yang mengalami efek samping karena semua obat kontrasepsi pasti ada efek samping yang tidak membahayakan kesehatan klien (Depkes RI, 2012:24).

Penelitian juga dilakukan oleh Putri, RA dan Chunaeni, S yang mengatakan bahwa sebesar 30% akseptor KB suntik mengalami keluhan berupa *amenorhea*. Banyak kejadian drop out pada akseptor KB suntik, terutama KB progestin akibat adanya efek samping yang tidak dimengerti oleh akseptor, salah satunya adalah efek samping berupa gangguan haid *amenorhea* (Putri, RA dan Chunaeni, S, 2015:58).

Berdasarkan data yang didapatkan dari pengkajian pada Ny “W” penulis menemukan adanya kesamaan antara teori dan kenyataan dilahan dan juga dari hasil penelitian orang lain. Dimana masalah potensial (masalah yang mungkin terjadi) ditetapkan berdasarkan masalah aktual atau masalah yang dialami ibu saat ini.

D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian tidak ada data yang mendukung untuk melakukan tindakan segera dan atau kolaborasi.

Jika seorang akseptor mengalami hal lain seperti perdarahan yang banyak akibat pemakaian suntikan DMPA maka lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status ginekologi, pemeriksaan laboratorium, dan kaji apakah terdapat kelainan? Jika iya, Tatalaksana sesuai penyebab kelainan. Jika tidak, lakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi lini pertama Anti Inflamasi Non-Steroid (ibuprofen 800 mg 3x /hari atau asam mefenamat 3x500mg perhari Selama 1-2 minggu/sampai pendarahan berhenti tambahkan asam traneksamat 3-4x 500mg/1g dan estrogen 1-2 minggu atau sampai pendarahan berhenti. Bila pendarahan menetap, tambahkan Pil Kontrasepsi Kombinasi dosis rendah selama 2-3 bulan/ suntik DMPA tiap 2 bulan. Bila pendarahan berlanjut setelah 6 bulan Berikan estrogen jangka pendek (EEK 1.25 mg) 4 x sehari selama 7 hari. Prosedur tersebut dapat diulang jika pendarahan abnormal terjadi kembali. pertimbangkan untuk pemilihan metode kontrasepsi lain jika pendarahan pervaginam menetap dan mengganggu (HIFERI, POGI,2013 : 60).

Untuk sakit kepala, berikan Antalgin 3x500 mg per hari selama 3-5 hari. Hal ini sesuai dengan pengobatan dan penanggulangan efek samping kb suntik menurut Depkes RI (Saifuddin, 2006) dalam jurnal amalia tahun 2012 yaitu untuk amenorea tidak perlu dilakakukan tindakan apapun, cukup konseling saja. Untuk sakit kepala berikan Antalgin 3x500 mg per hari selama 3-5 hari. Bila pemberian obat tidak

menolong dan keadaan tambah berat, hentikan pemakaian suntikan dan ganti cara kontrasepsi non-hormonal (Amalia, 2012 : 6)

E. Langkah V. Rencana Tindakan

Dalam membuat rencana tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial).

Berdasarkan masalah aktual dan masalah potensial yang dialami oleh Ny “W” maka penulis merencanakan asuhan kebidanan. Pada penemuan awal didapatkan masalah *amenorrhea*. Adapun rencana tindakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: menyambut ibu dengan 5s, menanyakan keluhan ibu, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, menimbang berat-badan ibu, memberikan konseling pada ibu tentang efek samping apa saja yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA, melakukan *informed consent* sebelum melakukan tindakan, memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur, menganjurkan ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya, menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 Juli 2017.

Pada saat kunjungan rumah pertama, didapatkan masalah aktual yaitu *amenorhea* dan ibu merasa cemas. Adapun rencana tindakan yang dilakukan yaitu: melakukan pemeriksaan ttv; menimbang berat badan ibu; melakukan pemeriksaan fisik payudara dan leher ibu; menjelaskan kepada ibu bahwa *amenorhea* yang dialaminya merupakan hal yang wajar dialami oleh akseptor KB suntik DMPA dan

merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu kesehatan; menjelaskan kembali kepada ibu efek samping lain yang bisa timbul dari pemakaian KB suntik DMPA.

Setelah itu berusaha menggali masalah atau keluhan yang dialami ibu yaitu menanyakan apakah ibu tidak mengalami sakit kepala, spotting (haid sedikit-sedikit), perdarahan, kenaikan berat badan, perubahan warna kulit atau timbulnya jerawat dan keluhan lainnya; menanyakan kepada ibu tentang pola makannya, apakah nafsu makan ibu berbeda sebelum dan sesudah memakai suntikan DMPA; menjelaskan kepada ibu bahwa hal yang dialaminya merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak perlu dicemaskan; menganjurkan kepada ibu untuk menjaga pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tetap ideal; menjelaskan kepada ibu tentang SADARI dan cara melakukannya; menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Pada kunjungan berikutnya didapatkan masalah aktual dengan kenaikan berat badan dan *spotting*. Adapun rencana tindakan yang dilakukan yaitu: melakukan pemeriksaan ttv; menimbang berat badan ibu; menjelaskan kepada ibu seperti yang dijelaskan pada kunjungan sebelumnya bahwa akseptor KB suntik DMPA bisa saja mengalami efek samping lain seperti *spotting* dan kenaikan berat badan seperti yang dialami ibu saat ini; memberikan konseling pada ibu tentang penyebab dari kenaikan berat badan dan *spotting* akibat penggunaan KB suntik DMPA; menganjurkan kepada

ibu untuk mengatur pola makan dan rutin melakukan olahraga agar berat badan ibu tidak terus bertambah.

Sehubungan dengan mengatur pola makan menyampaikan kepada ibu untuk diet rendah kalori dan makanan berlemak dan mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan serat; menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut adalah hal yang normal dan biasa terjadi pada pengguna kontrasepsi suntik DMPA; menanyakan kepada ibu apakah sudah melakukan SADARI dan apakah tidak menemukan kelainan saat melakukan SADARI; menggali masalah atau keluhan yang dialami ibu yaitu menanyakan apakah ibu tidak mengalami pusing (sakit kepala), dan keluhan lain yang biasa timbul akibat pemakaian DMPA; menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Pada kunjungan rumah ketiga, didapatkan masalah aktual kenaikan berat badan. Adapun rencana tindakan yang dilakukan yaitu: melakukan pemeriksaan ttv; menimbang berat badan ibu; menjelaskan kepada ibu agar tetap mempertahankan pola makan dan melakukan olahraga secara teratur agar BB ibu tidak terus bertambah; menjelaskan kepada ibu bahwa semua keluhan yang dialaminya adalah hal yang tidak perlu dicemaskan karena merupakan hal yang normal dan tidak mengganggu kesehatan.

Setelah itu Menjelaskan kepada ibu agar datang kapan saja ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan kontrasepsinya; mengingatkan kembali kepada ibu bahwa jadwal

suntikan ulangnya adalah tanggal 15 juli 2017; memastikan bahwa ibu akan datang untuk suntikan ulangnya dan tetap ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA; memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti.

Pada tahap ini rencana tindakan disusun berdasarkan masalah aktual dan masalah potensial, dimana pada saat melakukan kunjungan ke rumah klien dilakukan pemeriksaan TD dan menimbang BB ibu. Hal ini dilakukan untuk memantau tekanan darah dan berat badan ibu karena kenaikan berat badan dan tekanan darah merupakan salah satu efek samping dari penggunaan KB Suntik DMPA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah, A dan Fachri, M mengatakan bahwa didapatkan akseptor yang memakai KB Suntik DMPA mengalami peningkatan berat badan sebanyak 31 orang (38,8%) dibandingkan yang tidak yaitu sebanyak 10 orang (12,5%), hal ini sesuai dengan teori dan hasil penelitian bahwa perubahan berat badan ini disebabkan karena hormon progesteron yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak banyak yang bertumpuk di bawah kulit dan bukan merupakan karena retensi (penimbunan) cairan tubuh, selain itu *depoprovera* juga merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus yang dapat menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya (Ardiansyah, A & Fachri, M, 2017: 58).

Penelitian yang dilakukan Bella Tendenan di Puskesmas Ranotana Weru bahwa penggunaan alat kontrasepsi suntik Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) pada ibu di Puskesmas Ranotana Weru yang paling banyak yaitu penggunaan

alat kontrasepsi suntik > 12 bulan, perubahan tekanan darah pada ibu di Puskesmas Ranotana Weru yang paling banyak yaitu tekanan darah dengan kategori hipertensi dan terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan alat kontrasepsi suntik Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Tekanan Darah pada Ibu di Puskesmas Ranotana Weru (Tendenan, B dkk, 2017:5)

Selain memantau berat badan ibu, perlu disampaikan kepada ibu untuk mengatur pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tetap seimbang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahitala A yang mengatakan bahwa ada hubungan aktivitas fisik dengan gangguan menstruasi wanita Pasangan Usia Subur. Melakukan aktivitas fisik akan meningkatkan metabolisme tubuh akibat cadangan energi yang tertimbun dalam tubuh berupa lemak dapat terbakar sebagai kalori. Adanya keseimbangan antara aktivitas fisik dan status gizi akan mempengaruhi siklus alami menstruasi dan berat badan (Mahitala, A, 2015:79).

Selain hal diatas, juga dilakukan pemeriksaan fisik pada payudara dan leher ibu, karena kontrasepsi suntikan DMPA juga meningkatkan resiko terkena kanker payudara sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen yang notabene digunakan untuk bahan alat KB hormonal. Ada dua teori yang membahas tentang cara estrogen dan progesteron menyebabkan kanker payudara. Yang pertama, risiko mutasi sel saat pembelahan meningkat karena proliferasi sel oleh peningkatan estrogen dan progesteron juga meningkat. Teori yang kedua, estrogen dan progesterone merangsang pertumbuhan sel-sel punca kanker (Setiowati, D dkk, 2016:16). Sehingga perlu juga diajarkan kepada ibu untuk

melakukan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) untuk mendeteksi adanya kelainan pada payudara secara dini.

Pemeriksaan fisik pada leher ibu untuk menilai apakah terdapat pembesaran kelenjar tyroid atau tidak, hal ini dilakukan karena dari hasil anamnese yang dilakukan ibu mengeluh mengalami gangguan haid atau siklus menstruasinya tidak teratur. Menurut teori, terdapat hubungan antara siklus menstruasi tidak teratur dengan kejadian hipertiroid, dimana hormon tiroid terlibat dalam mengatur siklus menstruasi dan kesuburan termasuk mengatur *Follicel Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteining Hormone* (LH) pada biosintesis hormon steroid oleh *Triiodothyronin* (T3) di oosit. Hormon tiroid berpengaruh pada semua aspek reproduksi (Sukandar, P, dkk, 2015: 184).

Selain hal diatas, juga dilakukan penilaian terhadap kulit ibu (warna dan jerawat), serta menanyakan apakah ada keluhan lain seperti sakit kepala karena perubahan warna kulit (kloasma) dan jerawat serta sakit kepala (pusing) merupakan salah satu efek samping yang bisa timbul akibat pemakaian kontrasepsi suntikan DMPA.

Hasil survey awal yang dilakukan oleh Wulandari, F dan Kusumaningrum, A pada tanggal 31 Januari 2013 di desa kecamatan Duduk Sampeyan kabupaten Gresik dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 15 ibu yang menggunakan KB suntik di dapatkan 9 (60%) mengalami efek samping dari KB suntik berupa kehitaman pada wajah (*Cloasma*) dan ingin berhenti ber Kb, sedangkan pada 15 ibu yang

menggunakan KB pil kombinasi di dapatkan 10 (66%) mengalami efek samping yang sama (Wulandari, F & Kusumaningrum, A, 2013: 57).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari adalah lebih dari sebagian akseptor KB Suntik 3 bulan di Desa Glanggang Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik yang mengalami kloasma (Wulandari, F & Kusumaningrum, A, 2013: 62).

Pada tahap ini rencana tindakan disusun berdasarkan masalah aktual dan masalah potensial dan sesuai dengan teori sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan.

F. Langkah VI. Implementasi

Berdasarkan teori, implementasi dalam melaksanakan rencana tindakan harus dilakukan secara efisien dan menjamin rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efisien terhadap waktu, biaya, dan kualitas pelayanan.

Tindakan asuhan kebidanan berdasarkan dengan perencanaan asuhan kebidanan yang telah dibuat dilaksanakan seluruhnya dengan baik di BPM Srikandi Gowa dan di rumah klien. Sehingga penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari ibu dan keluarga serta dukungan dari lahan praktek.

Pada pemeriksaan awal, Ny “W” telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan hasilnya ttv ibu dalam batas normal, berat-badan ibu telah ditimbang yaitu 56

kg, telah dijelaskan kepada ibu efek samping apa saja yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA dan ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan, ibu telah dijelaskan bahwa keluhan yang dialaminya merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu kesehatan hasilnya kecemasan ibu telah berkurang.

informed consent telah dilakukan sebelum melakukan tindakan dan ibu bersedia untuk disuntik, ibu telah diberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur, ibu telah diberitahu agar datang kembali pada tanggal 15 juli 2017 untuk jadwal suntikan ulangnya dan datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya dan ibu bersedia datang kembali.

Pada kunjungan rumah pertama, setelah dilakukan konseling tentang efek samping dari pemakaian kontrasepsi suntik DMPA pada Ny "W", ibu masih merasa cemas, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, berat badan ibu 56 kg, setelah dilakukan pemeriksaan payudara dan leher ibu tidak ditemukan adanya kelainan. Setelah masalah berusaha digali ibu mulai terbuka dan mengatakan keluhannya yaitu selain *amenorhea* ibu juga biasa mengalami spotting dan kenaikan berat badan semenjak pemakaian suntikan DMPA selain itu ibu juga merasa nafsu makan ibu meningkat sehingga ibu lebih sering makan dan jarang olahraga, kemudian ibu diberikan penjelasan bahwa penggunaan KB Suntik DMPA bisa menimbulkan berbagai macam efek samping salah satunya adalah yang ibu alami sekarang ini.

keluhan yang dialami ibu merupakan hal yang wajar dialami oleh akseptor KB suntik DMPA dan merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu kesehatan. Akan tetapi meskipun kenaikan berat badan merupakan hal yang umum terjadi, ibu tetap dianjurkan untuk menjaga pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tetap ideal dan tidak terus meningkat sampai terjadi obesitas, selain itu juga dijelaskan kepada ibu tentang SADARI dan cara melakukannya agar jika terdapat keluhan bisa terdeteksi lebih dini dan ibu dianjurkan agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya, ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan dan tidak merasa cemas lagi.

Pada kunjungan berikutnya berat badan ibu meningkat yaitu dari 56 kg menjadi 57 kg, tanda-tanda vital ibu baik dan ibu mengalami *spotting*. Setelah diberikan konseling pada ibu tentang penyebab *spotting* dan kenaikan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA dan dijelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada pengguna kontrasepsi suntik DMPA, ibu mulai mengerti dengan keadaan *spotting* yang dialaminya tapi merasa cemas dengan kenaikan berat badannya, sehingga ibu diberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak perlu dicemaskan karena merupakan hal yang wajar dan tidak mengganggu kesehatan.

Ibu dianjurkan untuk menjaga pola makan dan olahraga secara teratur agar berat badannya tidak terus bertambah. Sehubungan dengan mengatur pola makan ibu dianjurkan untuk diet rendah kalori dan makanan berlemak dan mengonsumsi

makanan yang mengandung protein dan serat, selain itu juga diingatkan kepada ibu untuk melakukan SADARI dan ibu mengatakan telah melakukan sadari dan tidak menemukan kelaiana. Setelah ditanya mengenai keluhan lain yang bisa timbul dari pemakaian DMPA ibu mengatakan tidak mengalami keluhan lain seperti pusing (sakit kepala), dan perubahan warna kulit atau timbulnya jerawat. Ibu dianjurkan agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan sehubungan dengan alat kontasepsinya dan ibu bersedia.

Pada kunjungan rumah ketiga setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil berat badan tetap 57 kg, ibu dianjurkan agar tetap mempertahankan pola makan yang sehat dan olahraga secara teratur agar BB tidak bertambah lagi, ibu tetap diberikan penjelasan bahwa semua keluhan yang dialaminya merupakan hal yang biasa terjadi pada pengguna kontrasepsi suntik DMPA dan tidak mengganggu kesehatan, ibu dianjurkan untuk tetap mengatur pola makan karena sewaktu-waktu berat badan ibu bisa terus meningkat.

ibu dianjurkan agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan sehubungan dengan alat kontasepsinya, kemudian ibu diingatkan kembali bahwa jadwal suntikan ulangnya yaitu tanggal 15 Juli 2017 dan ibu bersedia datang untuk suntikan ulangnya dan tetap ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA, setelah diberikan kesempatan kesempatan kepada ibu untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti dan diberikan bimbingan dan penjelasan mendalam tentang kontrasepsi suntikan DMPA ibu mengerti dan ingin tetap menjadi akseptor KB suntikan DMPA.

Pada tahap ini implementasi disusun berdasarkan rencana tindakan yang telah dibuat, hal ini sesuai dengan teori sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan.

G. Langkah VII. Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada klien dengan pedoman dan tujuan serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kasus Ny “W” dilakukan evaluasi yaitu pada penemuan awal ibu mengeluh tidak haid selama lebih dari 3 bulan, hal ini disebabkan karena adanya ketidak seimbangan hormon, dimana dalam keadaan normal. tahap-tahap awal pertumbuhan memerlukan dukungan hormon untuk pembentukan antrum, perkembangan folikel dan sekresi estrogen. Estrogen, FSH dan LH, semuanya dibutuhkan. Pembentukan antrum diinduksi oleh FSH. Baik FSH dan LH diperlukan untuk sintesis dan sekresi estrogen oleh folikel, tetapi kedua hormon ini bekerja pada sel yang berbeda dan pada tahap yang berbeda dalam jalur pembentukan estrogen (Sherwood Lauralee, 2012: 839).

Baik sel granulosa maupun sel teka ikut serta dalam produksi estrogen. Perubahan kolesterol menjadi estrogen memerlukan sejumlah langkah berurutan, dengan yang terakhir berupa konversi androgen menjadi estrogen (Sherwood Lauralee, 2012: 839). Sebagian dari estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh dikeluarkan ke dalam darah dan merupakan penyebab terus meningkatnya kadar estrogen plasma selama fase folikuler. Estrogen sisanya tetap

berada dalam folikel, ikut membentuk cairan antrum dan merangsang proliferasi lebih lanjut sel granulosa (Sherwood Lauralee, 2012: 839).

Selanjutnya terjadi ovulasi, luteinisasi folikel yang dipicu oleh peningkatan sekresi LH yang mendadak dan besar. Lonjakan LH ini dipicu oleh efek umpan balik positif. Sementara kadar estrogen yang meningkat pada awal fase folikuler menghambat sekresi LH, kadar estrogen yang tinggi selama puncak sekresi estrogen pada akhir fase folikuler merangsang sekresi LH dan memulai lonjakan LH (Sherwood Lauralee, 2012: 839).

Karena itu, LH meningkatkan produksi estrogen yang memuncak merangsang sekresi LH. Konsentrasi estrogen dalam plasma yang tinggi bekerja secara langsung pada hipotalamus untuk meningkatkan GnRH sehingga sekresi LH dan FSH meningkat. Hal ini juga secara langsung bekerja pada hipofisis anterior untuk secara spesifik meningkatkan kepekaan sel penghasil LH terhadap GnRH. Efek yang terakhir ini berperan dalam lonjakan LH yang jauh lebih besar dari pada peningkatan sekresi FSH pada pertengahan siklus (Sherwood Lauralee, 2012: 840-841).

Setelah ovulasi, ketika korpus luteum terbentuk, uterus masuk ke fase sekretorik yang bersamaan waktunya dengan fase luteal ovarium. Korpus luteum mengeluarkan sejumlah besar progesteron dan estrogen. Progesteron mengubah endometrium tebal yang telah dipersiapkan estrogen menjadi jaringan kaya vaskular dan glikogen, merujuk pada lapisan subur endometrium yang mampu menopang kehidupan mudigah. Jika pembuahan dan implantasi tidak terjadi maka korpus luteum berdegenerasi dan fase haid baru dimulai (Sherwood Lauralee, 2012: 844).

Mekanisme kerja kontrasepsi suntikan depo progesterin yaitu kadar progesterin di dalam sirkulasi cukup tinggi sehingga kadar FSH dan LH menurun dan tidak terjadi lonjakan LH. Pada keadaan normal terjadi puncak sekresi LH pada pertengahan siklus sehingga menyebabkan pelepasan ovum dari folikel. Sedangkan dengan kadar LH yang menurun maka tidak akan terjadi lonjakan folikel dan produksi sel telur akan berkurang sehingga menyebabkan tidak terjadinya pelepasan ovum dari folikel dan menyebabkan tidak terjadi ovulasi.

Selain itu hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH. Sehingga meskipun terjadi produksi progesteron yang berasal dari korpus luteum menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga tidak ada penebalan dinding endometrium dan terjadilah amenorhea.

Setelah diberikan penjelasan mengenai efek samping KB Suntik DMPA dan juga penjelasan bahwa hal yang dialami ibu merupakan hal yang biasa dialami oleh akseptor KB Suntik DMPA dan tidak membahayakan kesehatan, kecemasan ibu mulai berkurang. Kemudian pada kunjungan rumah didapatkan masalah aktual ibu mengalami spotting dan kenaikan berat badan yang sebelumnya 56 kg menjadi 57 kg. Spotting yang dialami oleh ibu terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon akibat penggunaan KB Suntik DMPA.

Dimana hormon progesteron meningkat sedangkan estrogen mengalami penurunan oleh karena adanya umpan balik negative akibat terlalu melonjaknya progesterone sehingga pertumbuhan folikel terhambat dan juga tidak terjadi penebalan

dinding endometrium sehingga pada keadaan tertentu akseptor KB DMPA akan mengalami perdarahan bercak dengan durasi yang bervariasi (Suratun, dkk, 2013:72).

Sedangkan kenaikan berat badan yang dialami oleh ibu karena ibu tidak menjaga pola makan dan melakukan olahraga secara teratur. Penggunaan alat kontrasepsi hormonal pada dasarnya dapat menimbulkan berbagai efek samping yang salah satu di antaranya adalah perubahan berat badan akseptor. Hal ini disebabkan oleh Alat kontrasepsi hormonal suntik DMPA yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dapat merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan akseptor. (Sari, NR, 2015: 68).

Akseptor KB suntik 3 bulan yang paling banyak mengalami penambahan berat badan antara 1–3 kg yaitu sebanyak 24 orang (52,2%) sedangkan penambahan berat badan yang paling sedikit adalah >5 kg sebanyak 2 orang (4,3%). (Rahmawati, I dan Yayuk, 2014: 4).

Setelah diberikan pengertian kepada ibu bahwa keluhan yang dialaminya adalah hal yang umum dialami oleh akseptor KB Suntik DMPA, penulis juga menyampaikan kepada klien untuk menjaga pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tetap ideal sehingga kecemasan ibu mulai berkurang dan ibu bersedia untuk mengatur pola makan dan olahraga teratur agar berat badannya tidak mengalami peningkatan secara terus-menerus. Karena akumulasi asupan karbohidrat, protein dan lemak yang berlebihan akan diubah menjadi simpanan lemak. Dengan melakukan aktivitas fisik maka akan meningkatkan metabolisme tubuh akibat cadangan energy

yang tertimbun dalam tubuh berupa lemak dapat terbakar sebagai kalori, sehingga dengan adanya keseimbangan antara aktivitas fisik dan status gizi akan mempengaruhi berat badan agar tetap ideal.

Kemudian pada tanggal 22 juni 2017, dilakukan kunjungan rumah kembali dan didapatkan hasil yaitu ibu berat badan ibu tetap 57 kg, hal ini terjadi karena ibu sudah mulai mengatur pola makan dan olahraga teratur, ibu tetap dianjurkan untuk mempertahankan pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tidak mengalami peningkatan. Upaya untuk mengatasi agar tidak terjadi peningkatan berat badan yaitu petugas kesehatan melakukan observasi berat badan setiap kali kunjungan dan menganjurkan ibu untuk mengatur pola makan dan olahraga secara teratur.

Kemudian menganjurkan kepada ibu agar memahami semua efek samping dari suntikan DMPA agar jika terjadi efek samping lain ibu tidak merasa cemas dan menganjurkan kepada ibu menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti mengenai suntikan DMPA serta memastikan bahwa ibu akan tetap menjadi akseptor KB Suntik DMPA dan menganjurkan kepada ibu untuk memperhatikan jadwal kunjungan ulangnya untuk mendapatkan suntikan ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- a. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan.
- b. Ibu mengerti dengan efek samping dari suntikan DMPA 150 mg.
- c. Ibu masih ingin menjadi akseptor suntikan DMPA.
- d. Ibu bersedia datang kembali pada tanggal yang telah ditentukan untuk mendapatkan suntikan ulang.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep dan prinsip-prinsip asuhan pada akseptor KB suntik dan pengalaman langsung di lahan praktek studi kasus Ny “W” akseptor KB suntik DMPA dengan amenorhea maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada Ny “W” didapatkan bahwa sejak menggunakan suntikan DMPA mengalami *amenorhea*, *spotting* dan kenaikan berat badan.
2. Diagnosa Ny “W” ditegakkan berdasarkan adanya keluhan haid tidak teratur yaitu ibu tidak mengalami haid 3 bulan berturut-turut atau lebih, saat mendapatkan haid ibu hanya mengalami sedikit perdarahan berupa bercak-bercak darah dan dari hasil pemantauan berat badan ibu meningkat dari 56 kg menjadi 57 kg.
3. Pada Ny “W” masalah yang mungkin terjadi adalah terjadinya Drop Out (DO), ditegakkan berdasarkan masalah aktual yang dialami ibu.
4. Pada Ny “W” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi.
5. Rencana tindakan yang disusun pada Ny “W” bertujuan agar ibu tetap mempertahankan untuk menjadi akseptor KB suntik DMPA dan melakukan suntikan ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang dilakukan tercapai dengan adanya kerja sama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.
7. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah asuhan yang diberikan berhasil atau tidak. Dan dari hasil pemantauan, didapatkan bahwa tindakan yang dilakukan pada Ny “W” berhasil dan terlaksana dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan yaitu ibu ingin tetap menjadi akseptor KB suntik DMPA.
8. Pendokumentasian dilaksanakan pada tanggal 22 April s/d 22 Juni 2017. Pengkajian pertama dilakukan di BPM Srikandi Gowa pada tanggal 22 April 2017 dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah sebanyak 3 kali, kunjungan pertama tanggal 23 April 2017, kunjungan kedua tanggal 20 Mei 2017 dan kunjungan ketiga pada tanggal 22 Juni 2017.

B. Saran

1. Untuk Klien
 - a. Mengingatkan pada ibu agar memperhatikan kapan ibu harus kembali untuk mendapatkan suntikan ulang.
 - b. Ibu harus mengerti dan mengetahui dengan jelas apakah efek samping dari alat kontrasepsi yang digunakan.
2. Untuk Bidan
 - a. Bidan dalam memberikan konseling kepala akseptor KB lebih diarahkan kepada mekanisme kerja dan efek samping yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi.

- b. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam penerapan kasus keluarga berencana pada umumnya dan metode kontrasepsi suntikan pada khususnya.
- c. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kotrasepsi dan penanggulangan efek samping secara dini yang dialami oleh akseptor.

3. Untuk Institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya pembelajaran tentang penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. *Agama, Kesehatan dan Keperawatan*. Jakarta: Trans Info Medika (TIM). 2010
- Amalia. "Penanganan Efek Samping Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Oleh Ibu Primipara Di Wilayah Kerja Puskesmas 23 Ilir Palembang Tahun 2012." *Jurnal Kesehatan Bina Husada*. vol. 8 no. 3 (Desember, 2012). <http://bpm.binahusada.org/userfiles/.pdf> (Diakses tanggal 5 Mei 2017)
- Anindita, P dkk. "Hubungan Aktifitas Fisik Harian dengan Gangguan Menstruasi pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas" *Jurnal Kesehatan Andalas* vol. 5 no. 3 (Desember, 2016) <https://media.neliti.com/media/publications/18576-ID-hubungan-aktivitas-fisik-dengan-gangguan-menstruasi-wanita-pasangan-usia-subur-d.pdf> (Diakses tanggal 23 Agustus 2017).
- Ardiansyah, A & Fachri, M. "Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Suntik Tiga Bulanan selama Satu Tahun dengan Peningkatan Tekanan Darah" *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 11 no. 1 (Maret, 2017) http://journal.uad.ac.id/index.php/KesMas/article/viewFile/6979/pdf_78 (Diakses tanggal 31 Januari 2018).
- Benson, RC dan Pernoll, ML. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Susiani Wijaya (alih bahasa). Edisi 9. Jakarta: EGC. 2013
- BKKBN. "Gates Foundation-Bersama Optimalkan Pemberdayaan Kaum Muda." *Jurnal Keluarga*. 2017
- Chiavaroli, V, dkk. "Primary and Secondary Amenorrhea." *A jurnal of clinical endocrinology and metabolism Department of Pediatrics, University of Chieti, Italy*. <https://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/22073.pdf> (Diakses tanggal 3 Mei 2017).
- Darmawati. "Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kenaikan Berat Badan Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Desa Batoh Tahun 2012" *Jurnal Ilmu Keperawatan* vol. 1 no.1 (Desember, 2012). file:///C:/Users/acer/Downloads/Hubungan_Pengguna_Kontrasepsi_Hormonal_dengan_Kenaikan_Berat_Badan_Pada_Aseptor_Kontrasepsi_Hormonal_di_Desa_Batoh,Kec._Leung_Bata_.pdf (Diakses Tanggal 21 Agustus 2017).
- Depkes, RI 2009. "Buku Saku Pencegahan Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara" Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2009

- Depkes RI 2012. “Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana (Upaya Menuju Pelayanan KB Berkualitas)” Jakarta:Departemen Kesehatan RI. 2012
- Dinas Kesehatan Sul-Sel.“Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014” Makassar:Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan an.2015
- Everet, S. *Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi*. Nike Budhi Subekti (alih bahasa). Edisi 2. Jakarta:EGC. 2012
- Firdayanti. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)*. Makassar:Alauddin University Press. 2012
- Haryani, DD dkk. “Pengaruh Frekuensi Kontrasepsi Suntik DMPA Terhadap Kenaikan Berat Badan pada Akseptor Kontrasepsi Suntik DMPA Tahun 2010” *Jurnal Ilmiah Kebidanan*. vol. 1 no. 1 (Desember, 2010) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=200718&val=6633&title=Pengaruh%20frekuensi%20kontrasepsi%20suntik%20dmpa%20terhadap%20kenaikan%20berat%20badan%20pada%20akseptor%20kontrasepsi%20suntik%20dmpa> (Diakses tanggal 23 Agustus 2017).
- HIFERI, POGI. *Konsensus Tata Laksana Perdarahan Uterus Abnormal Karena Kontrasepsi*. Jakarta:Hiferi Pusat. 2013 (<http://pogijaya.or.id/wp-content/uploads/2013/Konsensus%20Tatalaksana%20PUA%20Cetak.pdf>) (Diakses tanggal 30 Januari 2018)
- Ibrahim, Z. “Kenaikan Berat Badan dengan Lama Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Sungai Mengkuang Tahun 2015” *Jurnal Edurance* vol. 1 no. 1 (Februari, 2015). <file:///C:/Users/acer/Downloads/591-4581-1-PB.pdf>(Diakses Tanggal 21 Agustus 2017).
- Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya.2013
- Kementrian Kesehatan RI. “Profil Kesehatan Indonesia 2015” Jakarta:Kementrian Kesehatan RI.2016
- Khairani.”Pengaruh Pemberdayaan Perempuan terhadap Fertilitas di Provinsi NTT dan DI Yogyakarta (Analisis Data SDKI 2007).”*Bulletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. vol. 2 no. 2 (November, 2013)www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-kespro.pdf(Diakses tanggal 4 juni 2017)

- Klein, AD. "An Approach to Diagnosis and Management." *American Family Physician*, vol.87 no. 3 (Juni 1, 2013). <http://www.aafp.org/afp/2013/0601/p781.pdf> (Diakses 3 Mei 2017).
- Laely, FN dan Fajarsari, D."Perbedaan Pengaruh KB Suntik Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) dengan KB Implan Terhadap Gangguan Menstruasi di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011" *Jurnal Academy of Midwifery*. (Desember, 2011). <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=200704&val=6633&title=PERBEDAAN> (Diakses tanggal 23 Agustus 2017).
- Mahitala, A. "Hubungan Aktifitas Fisik Harian dengan Gangguan Menstruasi Wanita Pasangan Usia Subur di Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015" *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)* vol. 3 no. 3 (April, 2015) <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/viewFile/570/460> (Diakses tanggal 23 Agustus 2017).
- Muhyiddin."Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)." *Jurnal pemikiran hukum islam*. vol. 24 no. 1 (April 2014) <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/134/115> (Diakses tanggal 6 juni 2017).
- Nuriyanah, T E dan Rejeki, W S. "Gambaran Lama Penggunaan Kb Suntik Progestin dengan Kejadian Amenorrhea Sekunder Di Dusun Karanglo Desa Driyorejo Gresik" *Jurnal Midwiferia*. Vol. 1 no. 1 (April, 2015). <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/download/67/60.pdf> (Diakses tanggal 5 Mei 2017)
- Pajarianto, H dan Ahmad, M. *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2011
- Perpustakaan Nasional:KDT. *Ilmu Kandungan*. Jakarta:PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Ketiga. 2011
- POGI, IDI, IBI, PKBI, PKMI, BKKBN, Kemkes RI. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta:PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Kedua. 2010
- POGI, IDI, IBI, PKBI, PKMI, BKKBN, Kemkes RI. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta:PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Ketiga. 2012

- Purwoastuti, E dan Walyani, ES. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015
- Putri, RA dan Chunaeni, S. "Kejadian Amenorea Pada Akseptor Kb Suntik Di Bpm Ch Susilowati, Treko, Mungkid Tahun 2014" *Jurnal Kebidanan* vol. 4 no. 8 (April, 2015).
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=437051&val=8457&title=Kejadian%20amenorea%20pada%20akseptor%20kb%20suntik%20di%20bpm%20ch%20susilowati,%20treko,%20mungkid%20tahun%202014>
 (Diakses tanggal 28 Agustus 2017).
- Rachma, AA dan Widatiningsih, S. "Perbedaan Penambahan Berat Badan pada Akseptor Kontrasepsi Suntik 3 Bulan dan 1 Bulan di Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2015" *Jurnal Kebidanan*, vol. 5 no. 10 (April, 2015) file:///C:/Users/acer/Downloads/1145-3370-1-SM.pdf (Diakses Tanggal 21 Agustus 2017).
- Rahma, AS. *Fisiologi Laktasi*. Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Rahmawati dan yayuk, N. "Survey Penambahan Berat Badan Pada Akseptor Kb Suntik 3 Bulan Di Puskesmas Mayong I Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara" *Jurnal Kesehatan dan Budaya*. vol. 7 no. 2 (November, 2014) jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/download/17/17 (Diakses tanggal 5 Mei 2017)
- Sari, NR. "Kontrasepsi Hormonal Suntik Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) Sebagai Salah Satu Penyebab Kenaikan Berat Badan." *Majority*. Vol. 7 no. 2 (Juni 2015) <http://jukeunila.com/wp-content/uploads/2015/11/67-72-I-RATNA-NS.pdf> (Diakses tanggal 6 juni 2017)
- Setiowati, D dkk. "Hubungan Antara Pemakaian KB Hormonal dengan Kejadian Kanker Payudara di Poli Onkologi Satu Atap RSUD Dr. Soetomo Februari-April 2015" *Indonesian Journal Of Cancer* Vol. 10 no. 1 (Maret, 2016). <https://media.neliti.com/media/publications/66170-ID-hubungan-antara-pemakaian-kb-hormonal-de.pdf> (Diakses tanggal 30 Januari 2017)
- Setyaningrum, AC dan Sehmawati. "Hubungan Lama Pemakaian Depo Medroksiprogesteron Asetat dengan Gangguan Menstruasi di Perumahan Petra Griya Indah Purwodadi Tahun 2008" *Jurnal Ilmu Keperawatan* vol. 1 no. 4 (Desember, 2008) file:///C:/Users/acer/Downloads/3726-7889-1-SM.pdf (Diakses Tanggal 21 Agustus 2017).

- Sherwood, Lauralee. *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem*. Alih bahasa, Brahm U, Pedit; editor edisi bahasa Indonesia, Nella Yesdelita. Jakarta: EGC. 2012
- Shihab, M Q. *M Quraish Shihab Menjawab-1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2008
- Shihab, M Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sitoayu, L. "Kecukupan Zat Gizi Makro, Status Gizi, Stres dan Siklus Menstruasi pada Remaja" *Jurnal Gizi Klinik Indonesia* vol. 13 no. 3 (Januari, 2017) file:///C:/Users/acer/Downloads/17867-46391-1-PB.pdf (Diakses tanggal 23 Agustus 2017).
- Sukandar, P dkk. "Hubungan Status Hipertiroid Dengan Siklus Menstruasi Penderita Hipertiroid Di Klinik Litbang Gaki Magelang" *Jurnal* (November, 2015) <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/kespro/article/view/4742/420> (Diakses tanggal 31 Januari 2018).
- Suratun, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: TIM. 2013
- Susanti, LW. "Hubungan Lama Pemakaian Kontrasepsi Suntik 3 Bulan dengan Kejadian Spotting di Bidang Praktik Swasta Tri Erri Boyolali Tahun 2015" *Jurnal Kebidanan dan Ilmu Kesehatan*, vol. 2 no. 2 (November, 2015). file:///C:/Users/acer/Downloads/34-103-1-PB.pdf (Diakses Tanggal 21 Agustus 2017).
- Tendenan B dkk. "Hubungan Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik DMPA Dengan Tekanan Darah Pada Ibu di Puskesmas Ranotana Weru Tahun 2017" *E-Journal Keperawatan* Vol. 5 no. 1 (Mei, 2017). <https://media.neliti.com/media/publications/111537-ID-hubungan-penggunaan-alat-kontrasepsi-sun.pdf> (Diakses tanggal 31 Januari 2017).
- Tombakan, KC dkk. "Hubungan Antara Stres dan Pola Siklus Menstruasi pada Mahasiswa Kepaniteeraan Klinik Madya (*co-assistant*) di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2017" *Jurnal e-Biomedik (eBm)* vol. 5 no. 1 (Januari, 2017) <https://media.neliti.com/media/publications/66824-ID-hubungan-antara-stres-dan-pola-siklus-me.pdf> (Diakses tanggal 23 Agustus 2017).

- Ulum, Khozainul .”Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.”*AKADEMIKA*, vol. 8 no. 2 (Desember 2014)<http://journal.unisla.ac.id/pdf/13822014/3.%20Khozainul%20Ulum;%20Fatwa-Fatwa%20MUI%20Dalam%20Pemikiran%20Hukum%20Islam%20Di%20Indonesia.pdf> (Diakses tanggal 4 juni 2017)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”
- WHO. “Sexual and Reproductive Health.” *Monitoring Health For The SDGS*. 2016
- Wulandari, F & Kusumaningrum, A. “Perbedaan Kb Suntik Depomedroxi Progesteron Asetat (Dmpa) Dan Pil Kombinasi Terhadap Terjadinya Cloasma Pada Akseptor Kb Di Desa Glanggang Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik” *Jurnal Surya* Vol. 3 no. XVI (Desember, 2013) <http://stikesmuhla.ac.id/wp-content/uploads/56-63-andri.pdf> (Diakses tanggal 31 Januari 2018).
- Yuhedi, LT. Kurniawati, T. *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC. 2015

LAMPIRAN KEGIATAN

No	Tanggal kunjungan	BB	TD	Keluhan	Ket
1	22-04-2017	56 kg	120/80	Haid tidak teratur	Di BPM
2	23-04-2017	56 kg	120/80	Haid tidak teratur	Di Rumah Klien
3	20-05-2017	57 kg	120/90	Spotting & kenaikan berat badan	Di Rumah Klien
4	22-06-2017	57 kg	120/90	Berat badan tetap 57 kg	Di Rumah Klien



No	Tanggal Kunjungan	Hasil Pemeriksaan TTV dan BB	Keluhan	Tempat kunjungan	Intervensi	Hasil
1	Kunjungan I Tanggal 22 April 2017	TD : 120/80 mmHg P : 24 x/i N : 80 x/i S : 36,6 °C BB : 56 kg	Ibu tidak haid selama lebih dari 3 bulan berturut-turut	BPM Srikandi Gowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa itu tidak sedang hamil atau mengandung dengan melakukan pemeriksaan <i>Test Pack</i> pada ibu. 2. Menjelaskan kepada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian KB suntik DMPA. 3. Melakukan <i>Informed consent</i> sebelum melakukan suntikan. 4. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur. 5. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya. 6. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal : 15 Juli 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu tidak sedang hamil atau mengandung. 2. Ibu mengerti tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian KB suntik DMPA. 3. Ibu bersedia untuk disuntik. 4. Ibu telah diberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM sesuai prosedur. 5. Ibu bersedia untuk datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya. 6. Ibu bersedia untuk datang kembali pada jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal : 15 Juli 2017.
2	Kunjungan II Tanggal 23	TD : 120/80 mmHg P : 24 x/i N : 80 x/i	Ibu tidak haid selama lebih dari 3 bulan berturut-turut	Rumah Klien di Jl. Malino	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan fisik pada payudara ibu. 2. Menjelaskan kembali kepada ibu tentang efek samping lain yang bisa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada benjolan dan nyeri tekan pada payudara, tidak ada perubahan warna dan

	April 2017	S : 36,6 °C BB : 56 kg			<p>timbul dari pemakaian DMPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menggali masalah atau keluhan yang dialami ibu yaitu menanyakan apakah ibu tidak mengalami sakit kepala, spotting (haid sedikit-sedikit), perdarahan, kenaikan berat badan, perubahan warna kulit atau timbulnya jerawat dan keluhan lainnya 4. Menanyakan kepada ibu tentang pola makannya, apakah nafsu makan ibu berbeda sebelum dan sesudah memakai suntikan DMPA. 5. Menjelaskan kepada ibu bahwa hal yang dialaminya merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak perlu dicemaskan 6. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga pola makan dan olahraga teratur agar berat badan ibu tetap ideal. 7. Menjelaskan kepada ibu tentang SADARI dan mengajarkan cara melakukan SADARI 8. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya. 	<p>tidak ada pengeluaran cairan. Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid pada leher.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu mengerti tentang efek samping KB suntik 3 bulan. 3. Ibu terkadang mengalami haid sedikit-sedikit sejak pemakaian KB suntik. 4. Ibu merasa nafsu makannya baik bahkan mengalami peningkatan setelah memakai suntikan DMPA. 5. Ibu mengerti bahwa hal yang dialaminya tidak perlu dicemaskan. 6. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya. 7. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melakukan SADARI. 8. Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah terkait kontrasepsinya.
3	Kunjungan III	TD : 120/80 mmHg P : 24 x/i	Ibu mengalami haid sedikit-sedikit yang	Rumah klien di Jl. Malino	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kepada ibu seperti yang dijelaskan pada kunjungan sebelumnya bahwa akseptor KB suntik DMPA bisa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

	Tanggal 20 Mei 2017	N : 80 x/i S : 36,6 °C BB : 57 kg	berlangsung selama 2 hari pada tanggal 13 Mei 2017 Ibu merasa badannya terasa berat dan nafsu makan ibu bertambah.		<p>saja mengalami efek samping lain seperti spotting dan kenaikan berat badan seperti yang dialami ibu saat ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab dari kenaikan berat badan dan <i>spotting</i> akibat penggunaan KB suntik DMPA. Menganjurkan kepada ibu untuk mengatur pola makan dan rutin melakukan olahraga agar berat badan ibu tidak terus bertambah. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut adalah hal yang normal dan biasa terjadi pada pengguna kontrasepsi suntik DMPA. Menanyakan kepada ibu apakah sudah melakukan SADARI dan apakah tidak menemukan kelainan saat melakukan SADARI. Menggali masalah atau keluhan yang dialami ibu yaitu menanyakan apakah ibu tidak mengalami pusing (sakit kepala), dan keluhan lain yang biasa timbul akibat pemakaian DMPA. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya. 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Ibu tidak menemukan kelainan saat melakukan SADARI. Ibu tidak mengalami keluhan lain seperti sakit kepala, jerawat ataupun kloasma. Ibu bersedia datang kembali jika ada masalah terkait kontrasepsinya.
4	Kunjungan IV	TD : 120/80 mmHg P : 24 x/i	Ibu merasa nafsu makannya	Rumah klien di Jl. Malino	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan kepada ibu agar tetap mempertahankan pola makan dan melakukan olahraga secara teratur agar 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu bersedia untuk tetap mengatur pola makan diimbangi dengan

	Tanggal 22 Juni 2017	N : 80 x/i S : 36,6 °C BB : 57 kg	meningkat.		<p>BB ibu tidak terus bertambah.</p> <p>2. Menjelaskan kepada ibu bahwa semua keluhan yang dialaminya ada hal yang tidak perlu dicemaskan karena merupakan hal yang normal dan tidak mengganggu kesehatan.</p> <p>3. Menjelaskan kepada ibu agar datang kapan saja ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan kontrasepsinya.</p> <p>4. Mengingatkan kembali kepada ibu bahwa jadwal suntikan ulangnya adalah tanggal 15 juli 2017.</p> <p>5. Memastikan bahwa ibu akan datang untuk suntikan ulangnya dan tetap ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA</p> <p>6. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti</p>	<p>olaraga teratur.</p> <p>2. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.</p> <p>3. ibu bersedia untuk datang kembali jika ada masalah sehubungan dengan kontrasepsinya.</p> <p>4. Ibu bersedia untuk datang pada jadwal suntikan ulangnya yaitu pada tanggal 15 Juli 2017.</p> <p>5. Ibu akan tetap menjadi akseptor KB suntik 3 bulan.</p> <p>6. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan.</p>
5	Kunjungan V	TD : 120/80 mmHg P : 24 x/i	Ibu tidak mengalami haid sudah	Rumah klien di Jl. Malino	<p>1. Menanyakan keluhan ibu.</p> <p>2. Menanyakan kepada ibu apakah suntikan ibu teratur sesuai jadwal</p>	1. Ibu tidak haid selama lebih dari 6 bulan berturut-turut.

	<p>Tanggal 20 Februari 2018</p>	<p>N : 80 x/i S : 36,6 °C BB : 55 kg</p>	<p>lebih dari 6 bulan berturut-turut.</p> <p>Suntikan terakhir ibu yaitu pada tanggal 30 Desember 2017</p>	<p>yang ditentukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan yang dialaminya merupakan hal yang biasa terjadi apada penggunaan KB suntik 3 bulan karena tidak mengganggu kesehatan. 4. Menjelaskan kepada ibu bahwa jika sewaktu-waktu ibu ingin hamil lagi maka perlu ibu ketahui bahwa penggunaan KB suntik 3 bulan bisa menyebabkan kesuburan terlambat kembali yaitu rata-rata 6 bulan sejak penghentian pemakaian (jangka waktu efek pemakaian obat habis). 5. Menggali masalah dengan menanyakan apakah ibu mengalami perubahan warna kulit dan menanyakan efek samping lainnya yang bisa timbul dari pemakaian KB Suntik 3 bulan. 6. Menjelaskan kepada ibu tentang efek samping dari suntikan DMPA. 7. Menanyakan kepada ibu apakah tetap menjaga pola makan dan olahraga teratur. 8. Menanyakan kepada ibu apakah ibu rutin melakukan SADARI dan apakah ada kelainan yang didapatkan. 9. Menjelaskan kepada ibu agar datang kapan saja ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan kontrasepsinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu selalu datang ke tempat pelayanan kesehatan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 3. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. 4. Dalam waktu dekat ini, ibu belum ada rencana untuk hamil lagi. 5. Ibu tidak mengalami keluhan lain. 6. Ibu mengerti 7. Ibu menjaga pola makan dan olahraga teratur. 8. Ibu selalu melakukan SADARI dan tidak menemukan kelainan. 9. Ibu bersedia untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan jika ditemukan masalah terkait kontrasepsinya. 10. Ibu bersedia datang kembali untuk suntika ulangnya sesuai jadwal yang ditentukan. 11. Ibu tetap ingin menjadi akseptor KB Suntik 3 bulan. 12. Ibu mengerti dengan
--	---------------------------------	--	--	---	---

				<p>10. Mengingatkan kembali kepada ibu bahwa jadwal suntikan ulangnya yaitu tanggal 24 Maret 2018.</p> <p>11. Memastikan bahwa ibu akan datang untuk suntikan ulangnya dan tetap ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA.</p> <p>12. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti.</p>	<p>semua penjelasan yang diberikan.</p>
--	--	--	--	--	---

LAMPIRAN KEGIATAN