

**PEMODELAN *GENERALIZED REGRESI POISSON* PADA FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA KEMATIAN BAYI DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika
Jurusan Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh

ALAUDDIN
M A K A S S A R

ANDI RACHMAT SYAM

NIM : 60600112032

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal oleh hukum.

Makassar, Maret 2017

Penyusun



ANDI RACHMAT SYAM
NIM : 60600112032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemodelan Generalized Regresi Poisson Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Kematian Bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014", yang disusun oleh Saudara **Andi Rachmat Syam**, NIM: **60600112032** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **23 Maret 2017 M**, bertepatan dengan **24 Jumadil Akhir 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 23 Maret 2017 M

24 Jumadil Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Haslinda, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
(Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar)

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang hanya kepada-Nyalah, kita harus menghambakan diri dan atas karuniaNya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada program Strata Satu (S-1) Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad saw, keluarga serta para sahabatnya dan akhirnya kepada kita sebagai umat yang tunduk terhadap ajaran yang dibawanya.

Penulis menyadari begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Andi Firdaus** dan Ibu **Rosmini** yang telah membesarkan penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang. Tak lupa pula kepada kakanda dan adinda tersayang yaitu **Aris Sulistyono, S.P., M.P, Andi Chaeriyah, S.Si, Andi Idham Maccirinna, Vira Puslitha dan Viana Puspitha** yang membuat hari-hari penulis begitu menyenangkan.

Kepada Bapak **Irwan, S.Si., M.Si** dan Ibu **Andi Haslinda, S.Pd., M.Si** selaku pembimbing pertama dan kedua, terima kasih penulis ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu kepada penulis. Arah dan bimbingan dari Bapak dan Ibu merupakan pembelajaran berharga yang tidak bisa penulis lupakan. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan selama proses bimbingan.

Terima kasih kepada Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si**, ibu **Ermawati, S.Pd., M.Si** dan Bapak **Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed** selaku tim penguji yang memberikan kritik, saran dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari., M.Si**, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2015-2020.
2. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Irwan, S.Si., M.Si**, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi beserta jajarannya.
4. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi beserta jajarannya yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

5. Staf dan Tim Laboratorium Jurusan Matematika terima kasih atas segala bantuannya.
6. Tak lupa penulis persembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat yaitu **Amirul Mu Minin, M. Zulkifli Warli, Abdul Muthalib, Saddam Husain dan Umar** serta seluruh teman-teman **KURVA angkatan 2012**, terkhusus **KURVA kelas B angkatan 2012** yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu, kalian adalah motivator dan teman luar biasa yang penulis miliki selama hidup.
7. Keluarga besar KKN Reguler Angkatan 51 Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Balang yaitu **Andi Wahyuni Ardi, S.Si, Meutiah Rahmatullah Made, Saenal, Dirham dan Ardiansyah**, terima kasih penulis ucapkan karena telah berbagi suka dan duka.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi selanjutnya.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Maret 2017



ANDI RACHMAT SYAM
NIM : 60600112032

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Rachmat Syam

Nim : 60600112032

Judul : *Pemodelan Generalized Regresi Poisson Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Kematian Bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014*

Skripsi ini membahas tentang pemodelan *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014. Model regresi Poisson mempunyai asumsi equidispersi, yaitu kondisi dimana nilai mean dan variansi dari variabel respon bernilai sama. Pada prakteknya kadang terjadi pelanggaran asumsi dalam analisis data diskrit berupa overdispersi sehingga model regresi Poisson tidak tepat digunakan. Overdispersi adalah kondisi dimana data variabel respon menunjukkan nilai variansi lebih besar dari nilai meannya. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan menggunakan pemodelan *Generalized Regresi Poisson*. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah overdispersi adalah dengan menggunakan model *Generalized Regresi Poisson*. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor persalinan dengan non medis (X_1) paling signifikan yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Model *Generalized Regresi Poisson* yang didapatkan adalah :

$$\mu = \exp(2,6906 + 0,01047X_1 + 0,005992X_2 + 0,000794X_3 - 0,00005X_4 - 0,00045X_5 - 0,00979X_6 - 0,00040X_7 + 0,06563X_8)$$

Kata kunci : *Generalized Regresi Poisson, Regresi Poisson, Overdispersi, Angka*

Kematian Bayi.

ABSTRACT

Name : Andi Rachmat Syam
Nim : 60600112032
Title : **Modeling *Generalized Poisson Regression* to factors affecting the infant mortality rate in south sulawesi province 2014**

This objective of this thesis is to investigate about modeling *generalized poisson regression* on factors affecting the infant mortality rate in the south sulawesi in 2014 . Poisson regression model have the assumption equidispersi, namely condition in which it's mean value and variansi of variable response valued at the same. Infant mortality is death what happened between when after the baby birth to baby have not aged exactly one year. Research aims to understand variables influential to the factors that affect the infant mortality rate in south sulawesi province 2014 by using modeling *generalized poisson regression*. In practice sometimes there was a penalty the assumption in data analysis discrete of overdispersi so that poisson regression model improper used. Overdispersi is a condition where data variable response shows the variansi greater than the mean. One of the models that can be used to overcome the problem of overdispersi is to use the model *generalized poisson regression*. Based on the results of the research has been concluded that the delivery by non medical (X_1) most significant affecting the infant mortality rate in the south sulawesi in 2014 . *Generalized poisson regression* obtained is:

$$\mu = \exp(2,6906 + 0,01047X_1 + 0,005992X_2 + 0,000794X_3 - 0,00005X_4 - 0,00045X_5 - 0,00979X_6 - 0,00040X_7 + 0,06563X_8)$$

Keyword : *Generalized Regresi Poisson*, Regresi Poisson, *Overdispersi*, Mortality Rate.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SIMBOL.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Manfaat Penulisan.....	11
BAB II :TINAUAN PUSTAKA.....	12
A. Distribusi Poisson.....	12
B. <i>Generalized Regresi Poisson</i>	13
C. Penaksiran Paramater Pada Model <i>Generalized Regresi Poisson</i>	18
D. Uji Kesesuaian Model (<i>Goodness of Fit</i>).....	23

E. Kematian Bayi.....	24
BAB III : Metode Penelitian.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	26
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
D. Definisi Operasional Variabel.....	26
E. Prosedur Penelitian.....	30
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Deskripsi Data.....	31
2. Memeriksa Hubungan Antara Variabel (<i>Kolinearitas</i>).....	40
3. Memeriksa <i>Overdispersi</i> dan <i>Underdispersi</i>	41
4. Menentukan Model <i>Generalized Regresi Poisson</i>	42
5. Memeriksa Kesesuaian Model dengan uji <i>Goodness of Fit</i>	45
B. Pembahasan	47
BAB V : Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR SIMBOL

X	: Variabel Prediktor
Y	: Variabel Respon
n	: Banyaknya percobaan
β_0	: Intersep
β_j	: Parameter Regresi Ke-j
$L(\theta)$: Fungsi Likelihood
$l(\theta)$: Fungsi Log-Likelihood
θ	: Parameter Dispersi
α	: Tingkat Signifikansi
$E Y_i x_i$: Ekspektasi dari Kejadian Y_i terhadap x_i
y_i	: Jumlah Kejadian
μ_i	: mean jumlah kejadian
η	: Prediktor Linier

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Data Angka Kematian Bayi (Y)	31
Tabel 4.2 Kategori Angka Kematian Bayi (Y)	32
Tabel 4.3 Deskripsi Persalinan Non Medis (X_1)	32
Tabel 4.4 kategori Persalinan Non Medis (X_1)	33
Tabel 4.5 Deskripsi Presentse pemberian ASI eksklusif (X_2)	33
Tabel 4.6 Kategori Presentse pemberian ASI eksklusif (X_2)	34
Tabel 4.7 Deskripsi Jumlah sarana kesehatan (X_3)	34
Tabel 4.8 Kategori Jumlah sarana kesehatan (X_3)	35
Tabel 4.9 Deskripsi Jumlah Tenga Kesehatan (X_4)	35
Tabel 4.10 Kategori Jumlah Tenga Kesehatan (X_4)	36
Tabel 4.11 Deskripsi Rumah Tangga Yang Memiliki Air Bersih (X_5)	36
Tabel 4.12 Kategori Rumah Tangga Yang Memiliki Air Bersih (X_5)	37
Tabel 4.13 Deskripsi Presentase Penduduk Miskin (X_6)	37
Tabel 4.14 Kategori Presentase Penduduk Miskin (X_6)	38
Tabel 4.15 Deskripsi Presentase Daerah Berstatus Desa (X_7)	38

Tabel 4.16 Kategori Presentase Daerah Berstatus Desa (X_7).....	39
Tabel 4.17 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (X_8).....	39
Tabel 4.18 Kategori Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (X_8).....	40
Tabel 4.19 Nilai VIF Variabel Prediktor	41
Tabel 4.20 Pemeriksaan <i>Oversdispersi</i> atau <i>Underdispersi</i>	41
Tabel 4.21 Uji <i>G</i> Hitung Model <i>Generalized Regresi Poisson</i>	42
Tabel 4.22 Estimasi Parameter Model <i>Generalized Regresi Poisson</i>	43
Tabel 4.23 Nilai <i>Pearson Chi-Square</i>	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi dengan Ibu Kota bertempat di Makassar, dahulu disebut Ujung pandang. Sulawesi Selatan merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Sulawesi yang mempunyai berbagai macam suku mulai dari Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan lainnya menyebar di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.083,94 km persegi yang secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 Kota, dengan 304 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan 3.023. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.365,51 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2014 berjumlah 8.432.163 jiwa yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk terbesar yakni Kota Makassar. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Makassar dimungkinkan karena terjadinya arus urbanisasi dari daerah lainnya di Sulawesi Selatan terutama untuk melanjutkan pendidikan, selain itu Kota Makassar juga merupakan pusat pemerintahan dan konsentrasi kegiatan ekonomi tingkat provinsi.¹

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan “Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2016”.

Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi yang tergolong Metropolitan di Indonesia bagian timur tentu sangat memperhatikan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk mewujudkan Negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur dengan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Derajat kesehatan masyarakat dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Derajat kesehatan masyarakat yang digambarkan yaitu melalui Angka Mortalitas terdiri atas ; Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Indeks Pembangunan Manusia termasuk angka harapan hidup, Angka Morbiditas angka kesakitan beberapa penyakit balita dan dewasa.²

Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia telah turun sebesar 44 persen selama 18 tahun terakhir, dari 57 kematian per 1.000 kelahiran hidup di periode 1990-1994 ke 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup di periode 2008-2012. Angka ini masih jauh dari target MDG'S (23/1000 KH) kalau dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB, walaupun diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Angka kematian menurut hasil survei demografi dan kesehatan 2012 menjelaskan mengalami penurunan meski tak berbeda jauh

² Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan "Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2016".

dengan hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2007, yaitu masing-masing 32 dan 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup.³

Sebagai salah satu indikator derajat kesehatan, angka kematian bayi menjadi menarik untuk diteliti. Maka dari itu pada penelitian ini akan fokus pada studi kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk di Sulawesi Selatan, Angka Kematian Bayi menunjukkan penurunan yang sangat tajam, yaitu dari 161 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1971 menjadi 55 pada tahun 1996, lalu turun lagi menjadi 52 pada tahun 1998 kemudian pada tahun 2003 menjadi 48 (Susenas 2003). Ini berarti rata-rata penurunan AKB selama kurun waktu 1998–2003 sekitar 4 poin. Sedangkan hasil Susenas 2006 menunjukkan AKB di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sebesar 36 per 1.000 kelahiran hidup, dan hasil SDKI 2007 menunjukkan angka 41 per 1.000 kelahiran hidup. Fluktuasi ini bisa terjadi oleh karena perbedaan besar sampel yang diteliti. Sementara laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2010 jumlah kematian bayi mengalami peningkatan sebesar 854 bayi atau 5,8 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2011 jumlah kematian bayi mengalami peningkatan menjadi 868 bayi Per 1000 KH atau 5.90 per 1000 kelahiran hidup. Dari hasil pengumpulan data profil kesehatan tahun 2014 jumlah kematian bayi menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 kelahiran hidup maka masih perlu peran dari semua pihak yang terkait dalam rangka penurunan angka

³ Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. “Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014. h:18”.

tersebut sehingga target (Millennium Development Goals) MDGs khususnya penurunan angka kematian dapat tercapai.

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi adalah dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan jumlah kematian bayi dapat didekati oleh analisis statistik mengenai hubungan variabel prediktor dengan variabel respon yaitu dengan menggunakan pemodelan regresi Poisson. Hal ini merupakan pendekatan standar dalam analisis empiris secara general dari data yang bersifat spasial. Bagaimanapun, model yang dibentuk dari pemodelan dengan menggunakan metode regresi tersebut mungkin cukup merepresentasikan kondisi lokal dari suatu wilayah tertentu dan mampu menyediakan suatu informasi perbedaan data yang menarik dan penting dari suatu wilayah mengenai faktor yang berpengaruh atau faktor yang signifikan terhadap variabel respon yang diamati dalam hal ini jumlah kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kondisi ekonomi dan sosial budaya tentunya akan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila faktor yang berpengaruh atau faktor yang signifikan terhadap variabel respon yang diamati dalam hal ini adalah jumlah angka kematian bayi tentu akan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan

suatu metode pemodelan statistik dengan memperhitungkan faktor spasial. Metode statistik yang telah dikembangkan untuk analisis data dengan memperhitungkan faktor spasial saat ini salah satunya yaitu *Generalized Regresi Poisson*.

Regresi poisson merupakan analisis regresi nonlinier dari distribusi poisson. Model regresi poisson merupakan *Generalized Linier Model (GLM)* yang data responnya diasumsikan berdistribusi poisson. Namun disetiap data yang dipakai dalam penelitian seringkali dijumpai masalah seperti *equidispersi* (nilai rata-rata sama dengan ragamnya). Maka dari itu Penanganan pelanggaran asumsi *equidispersi* pada regresi poisson dilakukan pengembangan model menggunakan *Generalized Regresi Poisson*. Pada model *Generalized Regresi Poisson* selain terdapat parameter juga terdapat θ sebagai parameter dispersi. Jika θ lebih dari 0 maka model *Generalized Regresi Poisson* merepresentasikan data count yang mengandung kasus *overdispersi* (nilai ragam lebih besar dari rata-ratanya) dan jika θ kurang dari 0 merepresentasikan data count yang mengandung *underdispersi* (nilai ragam lebih kecil dari rata-ratanya). Berdasarkan penjelasan di atas Pada penelitian ini penulis menggunakan model *Generalized Regresi Poisson* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.⁴

Alasan mengapa angka kematian bayi dipilih sebagai studi kasus karena datanya merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu untuk menilai keberhasilan program

⁴ John, Netter, dkk. 1996. *Aplied Linier Statistical Models*. WBC McGraw-Hill.

pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun, baik angka kematian bayi, balita, ibu hamil, kecacatan maupun kesakitan. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Kematian bayi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: usia ibu pada saat melahirkan, presentase pemberian ASI pada bayi, tingkat pendidikan ibu, dan jumlah sarana kesehatan.⁵

Usia ibu melahirkan yang ideal adalah usia antara rentan 21-35 tahun. Pada umumnya pada usia ini merupakan usia yang baik untuk hamil dan melahirkan sehingga dapat menekan resiko gangguan kesehatan baik pada ibu dan juga untuk bayi. Untuk tingkat pendidikan dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 yang menyatakan bahwa mayoritas ibu di Indonesia

⁵ Yuyuk Listiani, Purhadi, 2007, pemodelan *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Makassar, h : 3

tidak memiliki ijazah SD, yakni 33,34 persen. Selanjutnya 23,34 persen berijazah SMP atau sederajat dan 7,07 persen berpendidikan setara SMA. Sedangkan untuk jemlah sarana kesehatan masih jauh dari standar, ini dapat dilihat dari hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2010, dimana jumlah sarana kesehatan yang memadai baru mencapai 55,4 persen. Keadaan ini masih kurang dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk pemberian ASI dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar tahun 2014, dimana persentase pemberian ASI pada anak yaitu lama disusui antara umur 1-5 bulan yaitu sekitar 16,17 persen, kemudian lamanya disusui umur 6-11 bulan sekitar 16,91 persen, lama disusui 12-17 bulan sekitar 30,80 persen, lama disusui 18-23 bulan sekitar 7,80 persen dan lamanya disusui 2 tahun lebih terdapat sekitar 17,59 persen balita. Ini berarti bahwa kesadaran ibu akan arti pentingnya ASI bagi bayi sudah relative baik.⁶

Tingginya angka Kematian bayi ini bisa menjadi petunjuk bahwa pelayanan maternal dan neonatal kurang baik. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian bayi yakni banyak kelahiran ditolong petugas non Medis, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, yang kurang terjangkau oleh petugas medis dan kebanyakan ditolong oleh tetangganya, suaminya bahkan oleh dukun beranak yang kurang memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sangat berisiko bagi kesehatan ibu dan bayinya. Hal ini tidak terlepas dari apa yang telah Al-Quran jelaskan dalam Q.S Ar-Ra'd (13 : 11) yaitu :

⁶ Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. "Provil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014. h:19".

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.⁷

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa Allah swt tidak akan mengubah keadaan kita jika tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Keadaan yang dirubah oleh Allah adalah keadaan seseorang terkait hukum sebab akibat. Demikian pula dengan kematian bayi, tentu dengan segala upaya yang dilakukan oleh orang tua dan pemerintah akan berdampak pada tingkat angka kematian bayi disuatu wilayah. Perubahan yang mesti dilakukan adalah secara individu yang dapat berdampak universal, karena perubahan secara bersama inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam surah lain yaitu pada Q.S Al-Isra (17 : 31) dijelaskan tentang larangan membunuh anak :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

⁷ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁸

Ayat diatas menegaskan larangan membunuh anak, tentu yang dimaksud dengan membunuh disini bukan hanya membunuh secara langsung melainkan juga membahas tentang membunuh anak secara tidak langsung, misalnya membiarkan calon ibu tidak mendapat pelayanan kesehatan yang dapat menunjang kehamilan hingga proses persalinan, contoh lain yakni memakai jasa dukun beranak (non medis) dalam proses persalinan. Semua uraian tadi merupakan maksud dari pada Q.S Al-Isra (17 : 31).

Terkait dengan pemberian rezeki, Allah swt juga menjelaskannya dalam Q.S Hud (11 : 6) sebagai berikut :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”.⁹

Dari surah di atas jelas terlihat bahwa rezeki yang diberikan kepada semua makhluk di bumi datangnya hanya dari Allah swt. Sedangkan yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Sedangkan menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir

⁸ Departemen Mushaf Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009)

⁹ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009)

yang lain, maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

Maka dari itu diharapkan dengan penelitian ini akan dihasilkan model yang nantinya bisa memberikan masukan khususnya kepada umat muslim dan umumnya kepada pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka kematian bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan model *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tugas akhir ini dapat lebih terarah maka diberikan batasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.
2. Penelitian ini memodelkan *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.

E. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan penulis mengenai penerapan matematika dibidang kesehatan khususnya dalam memodelkan *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik dalam menangani faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Distribusi Poisson

Distribusi Poisson memberikan suatu model yang realistis untuk berbagai macam fenomena acak selama nilai dari variabel acak Poisson berupa bilangan bulat non-negatif. Salah satu distribusi diskrit yang sangat bermanfaat adalah distribusi poisson. Distribusi ini dapat dipandang sebagai pendekatan distribusi binomial atau bentuk batas dari distribusi binomial. Atau dapat juga dianalisis sesuai dengan distribusi itu sendiri dengan pertimbangan proses poisson (*poisson process*). Dipandang dari distribusinya, Distribusi poisson ini banyak digunakan dalam pengendalian mutu, dalam bidang biologi (sehubungan dengan perhitungan bakteri misalnya), untuk fisika (perhitungan partikel dan zat radioaktif), komunikasi (telepon) dan lain-lain.¹⁰

Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Bentuk umum dari distribusi Poisson diberikan pada persamaan di bawah ini

$$P(W = k) = \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^k}{k!} \quad (1)$$

Dimana:

¹⁰Turmudi, Sri Harini. Metode Statistik Pendekatan Teoritis dan Aplikasi. Uin Malang. 2008

λ = rata-rata kejadian pada waktu t

W = jumlah kejadian yang diobservasi pada waktu t

persamaan di atas digunakan untuk menghitung peluang variabel acak Y , di mana mean dan variansi distribusi Poisson adalah sama, yaitu $E[Y] = \lambda = \text{var}[\lambda]$. Untuk mengetahui apakah data yang diamati berdistribusi Poisson atau tidak, dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov*, di mana hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi Poisson

H_1 : Data tidak berdistribusi Poisson

kriteria pengujian dalam uji *Kolmogorov-smirnov*, tolak H_0 jika nilai signifikansi $< \alpha$.

B. Generalized Regresi Poisson

Regresi poisson merupakan suatu bentuk analisis menggunakan regresi untuk menduga model data seperti jumlah, perubahan nilai (*rate*) atau organisasi data ke tabel. Regresi poisson merupakan model regresi yang dapat digunakan pada data yang berdistribusi poisson sebagai syarat utamanya. Fungsi penghubung untuk model regresi poisson dapat dituliskan sebagai berikut¹¹:

¹¹ John, Netter, dkk. 1996. *Applied Linear Statistical Models*. WBC McGraw-Hill.

Untuk menganalisis data diskrit biasanya digunakan *Regresi Poisson*. Namun, dalam *regresi Poisson* asumsi yang harus dipenuhi adalah adanya equidispersi atau nilai variansinya sama dengan nilai rata-ratanya. *Overdispersi* adalah kondisi dimana data variabel respon menunjukkan nilai variansi lebih besar dari nilai rata-ratanya. *Underdispersi* adalah kondisi dimana data variabel respon menunjukkan nilai variansi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Salah satu metode untuk mendeteksi terjadinya *Overdispersi* atau *Underdispersi* yakni dengan melihat nilai *Deviance* pada model yang kemudian dibagi dengan nilai derajat bebasnya, jika hasilnya lebih dari 1 maka terjadi *Overdispersi* dan jika kurang dari 1 maka terjadi *Underdispersi*. Begitupun dengan nilai *Pearson Chi Square* yang dibagi dengan derajat bebasnya, jika nilainya lebih dari satu maka terjadi *Overdispersi* dan jika kurang dari 1 maka terjadi *Underdispersi*. Berikut ini adalah rumus mendeteksi overdispersi yaitu:

- Nilai Deviance

$$\theta_1 = \frac{D}{db} > 1; D = 2 \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \log \frac{y_i}{\mu_i} \right\} \quad (2)$$

- Nilai Pearson Chi-Square

$$\theta_2 = \frac{x^2}{db} > 1; x^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \mu_i)^2}{\sigma_i} \quad (3)$$

Dimana:

y_i : Nilai peubah respon dari pemngamatan ke-i

μ_i : Penduga bagi respon rata-rata ke-i

σ_i : Penduga bagi ragam respon ke-i

db : n-k-1

k : Banyaknya parameter termasuk konstanta

n : Banyaknya pengamatan

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah *overdispersi* dan *underdispersi* adalah dengan menggunakan model *Generalized Regresi Poisson*.¹²

Model *Generalized Regresi Poisson* merupakan perluasan dari regresi poisson, dapat dilihat dari persamaan berikut:

$$\log(\mu_i(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{pi})) = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_p x_{pi} \quad ; i = 1, 2, \dots, n$$

Atau dapat dituliskan dengan persamaan :

$$\begin{aligned} \mu_i(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}) &= \mu_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_p x_{pi}) \quad ; i = 1, 2, \dots, n \\ &= \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}) \end{aligned} \quad (4)$$

¹² Dewi Nur Pratiwi. "Mengatasi Overdispersi Pada Regrsi Poisson Dengan Generalized Regresi Poisson". Jurnal Matematika.2012

Pada model regresi poisson, fungsi probabilitas bersyarat dari Y_i diberikan nilai $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$ adalah :

$$f(y_i | x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}; \mu_i(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki})) = \frac{[\mu_i(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki})]^{y_i} \exp[-\mu_i(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki})]}{y_i!}$$

untuk $y_i = 0, 1, 2, \dots, n$. (5)

Sedangkan pada model *Generalized Regresi Poisson*, fungsi probabilitas bersyarat dari Y_i diberikan nilai $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$ adalah :

$$P(y_i | x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}; \mu_i \alpha) = \left(\frac{\mu_i}{1 + \alpha \mu_i} \right)^{y_i} \frac{(1 + \alpha y_i)^{y_i - 1}}{y_i!} \exp\left(-\frac{\mu_i(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \mu_i}\right)$$

$y_i = 0, 1, \dots, n$. (6)

Dari persamaan (5) dan (4) terlihat bahwa fungsi probabilitas dari *Generalized regresi poisson* merupakan perluasan dari fungsi probabilitas regresi poisson dimana pada fungsi probabilitas *Generalized regresi poisson* terdapat sebuah parameter tambahan yaitu α yang merupakan parameter dispersi.

Dengan mensubstitusikan $\mu_i = \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})$ ke dalam persamaan (7) maka didapatkan:

$$P(y_i | x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}; \boldsymbol{\beta}, \alpha) = \left(\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)^{y_i} \frac{(1 + \alpha y_i)^{y_i - 1}}{y_i!} \exp\left(-\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})}\right) \quad (8)$$

Dimana $y_i = 0, 1, 2, \dots, n$. sedangkan $\beta = [\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k]^T$ menyatakan vektor dari parameter-parameter yang tidak diketahui.

Pada model *Generalized Regresi Poisson* selain terdapat parameter juga terdapat α sebagai parameter dispersi. Model *Generalized Regresi Poisson* mirip dengan regresi poisson, akan tetapi model *Generalized Regresi Poisson* mengasumsikan bahwa komponen randomnya tidak harus berdistribusi poisson. Dalam analisis *Generalized Regresi Poisson*, jika α sama dengan 0 maka model *Generalized Regresi Poisson* akan menjadi model poisson. Jika α lebih dari 0 maka model *Generalized Regresi Poisson* merepresentasikan data count yang mengandung kasus overdispersi dan jika θ kurang dari 0 merepresentasikan data count yang mengandung underdispersi. Penaksiran parameter model *Generalized Regresi Poisson* menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimator (MLE)*.¹³

Dalam pembentukan model regresi perlu diketahui ada atau tidaknya multikolinearitas antara variabel prediktor. Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dari hubungan linear yang sempurna atau tepat di antara sebagian atau seluruh variabel prediktor (X) dalam sebuah model. Konsekuensi jika dalam sebuah model mengandung multikolinearitas adalah variannya akan terus naik atau membesar. Jika varian semakin naik atau membesar maka standar error β_1 dan β_2 juga naik atau membesar. Pendeteksian kasus multikolinieritas dilakukan menggunakan kriteria nilai VIF dan nilai *Pearson Correlation*. Jika

¹³ Puhadi. "Perbandingan Analisis Generalized Poisson Regression (GPR) dan Regresi Binomial Negatif Untuk Mengatasi Overdispersi Studi Kasus: Pemodelan Jumlah Kasus Kanker Serviks di Jawa Timur". Jurnal Matematika. Vol 2 No 2 (Desember, 2012) ISSN : 1693-1394

nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai *Pearson Correlation* lebih dari 0,95 maka data menunjukkan adanya multikolinieritas antar variabel prediktor. Nilai VIF dinyatakan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1-R_k^2} \quad (k = 1, 2, \dots, p) \quad (9)$$

$$R_k^2 = \frac{\widehat{\beta}_1 \sum x_{1i} y_i + \widehat{\beta}_2 \sum x_{2i} y_i + \widehat{\beta}_3 \sum x_{3i} y_i}{\sum y_i^2}, i = 1, 2, \dots, p$$

Dimana:

k = banyaknya variabel bebas

y_i = nilai peubah respon dari pengamatan ke i

$x_{1i} = x_{1i} - \bar{X}, x_{2i} = x_{2i} - \bar{X}, x_{3i} = x_{3i} - \bar{X}$ dan $y_i = Y_i - \bar{Y}$

R_k^2 adalah koefisien determinasi antara satu variabel prediktor dengan beberapa variabel prediktor lainnya.¹⁴

C. Penaksiran Parameter Pada Model *Generalized Regresi Poisson*

Pada model regresi poisson harus dilakukan penaksiran pada $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ dengan $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ adalah parameter yang tidak diketahui. Untuk menaksir parameter $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ digunakanlah metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Jika diberikan sebuah sampel berisi n buah pasangan pengamatan yang saling bebas, yaitu $\{(X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{ki}, Y_i); i = 1, 2, \dots, n\}$ dengan X_i dan

¹⁴ Rusianti. "Penanganan Data Overdispersi Menggunakan Regresi Poisson Tergeneralisasi (Kasus Presentase Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012). Jurnal Matematika Tahun 2016

Y_i berturut-turut adalah pengamatan ke- i dari variabel X dan Y dan asumsi untuk setiap $X_{1i} = X_{1i}, X_{2i} = X_{2i}, \dots, X_{ki} = X_{ki}$, distribusi dari Y_i adalah poisson dan $E(Y_i|X_i = x_i) = \mu_i(x_i)$, maka fungsi probabilitas bersyarat dari Y_i oleh $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$ (persamaan 6) adalah:

$$f(Y_i|x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}; \boldsymbol{\beta}, \alpha) = \left(\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)^{y_i} \frac{(1 + \alpha y_i)^{y_i - 1}}{y_i!} \exp \left(- \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)$$

Sehingga :

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{i=1}^n f(Y_i|x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}; \boldsymbol{\beta}, \alpha) \quad (10)$$

$$= \prod_{i=1}^n \left(\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)^{y_i} \frac{(1 + \alpha y_i)^{y_i - 1}}{y_i!} \exp \left(- \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)$$

Untuk mendapatkan taksiran maksimum likelihood dari parameter $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ dan parameter α , digunakan fungsi log likelihood sebagai berikut¹⁵:

$$\log L(\boldsymbol{\beta})$$

$$= \log \left\{ \prod_{i=1}^n \left(\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)^{y_i} \frac{(1 + \alpha y_i)^{y_i - 1}}{y_i!} \exp \left(- \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right) \right\}$$

¹⁵Rusianti. "Penanganan Data Overdispersi Menggunakan Regresi Poisson Tergeneralisasi (Kasus Presentase Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012). Jurnal Matematika Tahun 2016.

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \left(\log \left(\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right)^{y_i} \right) + \left(\log \frac{(1 + \alpha y_i)^{y_i - 1}}{y_i!} \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(\log \left(\exp \left(-\frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right) \right) \right) \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \log \left(\exp \left(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji} \right) \right) - y_i \log \left(1 + \alpha \exp \left(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji} \right) \right) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{y_i} (\log(1 + \alpha y_i) - \log(y_i!)) - \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i)}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji} \right) - y_i \log \left(1 + \alpha \exp \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji} \right) \right) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{y_i} (\log(1 + \alpha y_i) - \log(y_i!)) - \frac{(\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i))}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji} \right) - y_i \log \left(1 + \alpha \exp \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji} \right) \right) + \frac{1}{y_i} \log(1 + \alpha y_i) \right. \\
&\quad \left. - \frac{(\exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})(1 + \alpha y_i))}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=i}^k \beta_j x_{ji})} - \log(y_i!) \right\} \tag{11}
\end{aligned}$$

Untuk mencari taksiran maksimum likelihood $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1, \dots, \widehat{\beta}_p, \alpha$, fungsi log likelihood $k(\beta)$ pada persamaan (8) diturunkan secara parsial terhadap parameter

$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ kemudian disamakan dengan nol. Didapatkan persamaan sebagai berikut¹⁶:

- Penaksiran parameter $\widehat{\beta}_0$

$$\frac{\partial k(\beta)}{\partial \beta_0} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{(y_i - \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))}{(1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))^2} \right) = 0$$

- Penaksiran parameter $\widehat{\beta}_1$

$$\frac{\partial k(\beta)}{\partial \beta_1} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_{1i}(y_i - \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))}{(1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))^2} \right) = 0$$

- Penaksiran parameter $\widehat{\beta}_k$

$$\frac{\partial k(\beta)}{\partial \beta_k} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_{ki}(y_i - \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))}{(1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))^2} \right) = 0, \text{ untuk } k = 2, 3, \dots, p$$

- Penaksiran parameter $\widehat{\alpha}$

$$\frac{\partial(\beta)}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^n \left\{ -\frac{y_i \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji})} + \frac{y_i (y_i - 1)}{1 + \alpha y_i} - \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}) y_i - \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji})}{(1 + \alpha \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji}))^2} \right\}$$

¹⁶Rusianti. "Penanganan Data Overdispersi Menggunakan Regresi Poisson Tergeneralisasi (Kasus Presentase Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012). Jurnal Matematika Tahun 2016.

Agar persamaan-persamaan yang didapatkan dapat berupa persamaan linear dalam parameter, maka perlu dilakukan pendekatan numerik dengan menggunakan metode *Newton-Raphson* untuk menyelesaikannya.

Untuk menguji kelayakan model regresi Poisson, terlebih dahulu ditentukan dua buah fungsi *likelihood* yang berhubungan dengan model regresi yang diperoleh. Fungsi-fungsi *likelihood* yang dimaksud $L(\hat{\Omega})$ adalah nilai *likelihood* untuk model lengkap dengan melibatkan variabel prediktor dan $L(\hat{\omega})$, yaitu nilai *likelihood* untuk model sederhana tanpa melibatkan variabel prediktor. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan statistik uji dalam pengujian parameter model regresi Poisson adalah dengan menggunakan metode *Maximum Likelihood Ratio Test* (MLRT) dengan hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{paling tidak ada satu } \beta_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, k$$

Statistik uji untuk kelayakan model regresi poisson adalah sebagai berikut¹⁷:

$$G = -2 \left[\ln \frac{L(\hat{\omega})}{L(\hat{\Omega})} \right] = 2 (\ln L(\hat{\Omega}) - L\hat{\omega}) \quad (12)$$

Tolak H_0 jika $G_{hitung} \geq \chi_{v,\alpha}^2$ dengan v adalah banyaknya parameter model dibawah populasi dikurangi dengan banyaknya parameter dibawah H_0 . Parameter

¹⁷ Puhadi. "Perbandingan Analisis Generalized Poisson Regression (GPR) dan Regresi Binomial Negatif Untuk Mengatasi Overdispersi Studi Kasus: Pemodelan Jumlah Kasus Kanker Serviks di Jawa Timur". Jurnal Matematika. Vol 2 No 2 (Desember, 2012) ISSN : 1693-1394

model regresi Poisson yang telah dihasilkan dari estimasi parameter belum tentu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap model.¹⁸

D. Uji Kesesuaian Model (Uji *Goodness of Fit*)

Pengujian kesesuaian model untuk mengetahui model yang digunakan sesuai atau tidak dengan data yang diamati. Pengujian kesesuaian model ini dilakukan dengan menggunakan uji *goodness of fit*. uji kesesuaian (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengambil kesimpulan tentang sebaran populasi. Suatu contoh acak dipilih dari populasi bersangkutan, kemudian informasi contoh tersebut digunakan untuk menguji kebenaran sebaran populasi tersebut. Uji ini didasarkan pada seberapa baik kesesuaian/kecocokan (*goodness of fit*) antara frekuensi pengamatan yang diperoleh data sampel dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan. Dalam kasus ini akan ditunjukkan bahwa apakah data sudah sesuai atau tidak dengan model yang didapatkan dengan menggunakan software SAS.¹⁹

Pengujian model dengan melihat nilai uji *goodness of fit* menggunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = Model yang didapat sesuai dengan data yang diamati

H_1 = Model yang didapat tidak sesuai dengan data yang diamati

¹⁸Rusianti. “Penanganan Data Overdispersi Menggunakan Regresi Poisson Tergeneralisasi (Kasus Presentase Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012)”. Jurnal Matematika Tahun 2016

¹⁹ Ruliana “Pemodelan Poisson Regression (GPR) Untuk Mengatasi Pelanggaran Equidispersi Pada Regresi Poisson Kasus Campak di Kota Semarang”, Jurnal Matematika Tahun 2015

Dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$

Kriteria H_0 diterima jika nilai *Pearson Chi Square* lebih besar dari $\alpha = 0,05$

E. Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu *endogen* dan *eksogen*. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian

post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Kematian bayi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: usia ibu pada saat melahirkan, jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu pada saat hamil, tingkat pendidikan ibu, jumlah sarana kesehatan, dan persentase daerah yang berstatus desa, dan lain-lain.

Angka Kematian bayi di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator derajat kesehatan bangsa. Tingginya

angka Kematian bayi ini dapat menjadi petunjuk bahwa pelayanan maternal dan neonatal kurang baik, untuk itu dibutuhkan upaya untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2000 Angka Kematian Bayi (AKB) di dunia 54 per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2006 menjadi 49 per 1000 kelahiran hidup..²⁰



²⁰Purhadi. "Pemodelan *Generalized* Regresi Poisson pada faktor- faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur", jurnal matematika, Vol 2. No 3. Mei 2007. ISSN : 1693-1394

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian terapan.

B. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Waktu dan Tempat penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari akhir bulan Juli sampai Desember 2016 di Makassar.

D. Definisi operasional variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel respon (Y) dan prediktor (X). Adapun variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Variabel respon atau *Dependent variable* (Y)

Variabel respon (Y) pada penelitian ini adalah angka kematian bayi Tahun 2014. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Selain itu angka kematian bayi dapat menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan.

2. Variabel bebas (*independent variable*) atau variabel prediktor (X)

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang dianalisis untuk mengamati efeknya terhadap variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas atau variabel independent pada penelitian ini adalah :

a. Persalinan yang dilakukan dengan bantuan non medis (X_1)

Persalinan non medis merupakan persalinan yang dilakukan tanpa bantuan medis seperti dokter, suster atau bidan melahirkan melainkan menggunakan jasa dukun beranak yang tidak mendapat ilmu tentang cara pertolongan medis di bangku kuliah tapi hanya berdasarkan pada pengalaman saja. Hal ini tentu berpengaruh dengan keselamatan kelahiran bayi.

b. Presentase pemberian ASI eksklusif (X_2)

Presentase pemberian ASI eksklusif adalah presentase lama pemberian ASI selama satu tahun atau lebih dari satu tahun. Air susu ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi. *World Health Organization* merekomendasikan pemberian ASI dalam satu jam sejak kelahiran, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, dan pengenalan makanan pendamping ASI dan penuntasan pemberian ASI sampai usia 2 tahun.

c. Jumlah sarana kesehatan (X_3)

Jumlah sarana kesehatan adalah banyaknya jumlah sarana kesehatan yang tersedia pada Kabupaten/Kota. Ketersediaan sarana kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjaga

stabilitas kesehatan masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

d. Jumlah Tenaga Kesehatan (X_4)

Jumlah tenaga kesehatan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya dokter, bidan atau perawat yang terdapat pada rumah sakit puskesmas ataupun sarana kesehatan lainnya yang tersedia pada setiap Kabupaten/Kota. Semakin banyak jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota maka makin baik dan makin cepat pula pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga semua keluhan kesehatan dapat ditangani.

e. Presentase Rumah tangga yang memiliki air bersih (X_5)

Presentase rumah tangga yang memiliki air bersih adalah presentase banyaknya rumah tangga yang memiliki sumber air yang layak konsumsi seperti air dalam kemasan, air isi ulang, ledeng ataupun air sumur.

f. Presentase penduduk miskin (X_6)

Presentase penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk miskin pada setiap Kabupaten/Kota. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

g. Presentse daerah berstatus desa disetiap Kabupaten/Kota (X_7)

Presentase daerah berstatus desa merupakan presentase kemampuan desa dalam membangun indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Daerah yang berstatus desa dimasukkan menjadi salah satu variabel, karena Daerah yang berstatus desa memiliki kesulitan dalam mengakses sarana kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Salah satu faktor penyebabnya adalah jarak dari sarana kesehatan yang jauh dari lokasi desa yang terpencil.

h. Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (X_8)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Kabupaten/Kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda, hal ini mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Dalam aspek kesehatan utamanya dalam menekan angka kematian bayi, pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kondisi finansial setiap masyarakat di Kabupaten/Kota dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan.


E. Prosedur penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengambil data terkait dengan angka kematian bayi yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis data yang telah didapatkan untuk memperoleh model *Regresi Generalized Poisson*, langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - a. Mendeskripsikan dan mengkategorikan data
 - b. Memeriksa hubungan antara variabel prediktor (*kolinieritas*)
 - c. Memeriksa *Overdispersi* dan *Underdispersi*
 - d. Menentukan model *Generalized Regresi Poisson*
 - e. Uji kesesuaian model (*Goodness of Fit*)
3. Interpretasi Model Yang Didapatkan

Dari model *Generalized Regresi Poisson* yang didapatkan, maka dapat diinterpretasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi secara signifikan terhadap angka kematian bayi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.

DIAGRAM ALIR



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data angka kematian bayi Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Y), Persalinan yang dilakukan dengan bantuan non medis (X_1), Presentse pemberian ASI eksklusif (X_2), Jumlah sarana kesehatan (X_3), Jumlah Tenaga Kesehatan (X_4), Presentase Rumah tangga yang memiliki air bersih (X_5), Presentase penduduk miskin (X_6), Presentse daerah berstatus desa disetiap Kabupaten/Kota (X_7), Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (X_8). Berikut ini adalah tabel deskripsi data variabel yang digunakan pada penelitian ini:

a. Deskripsi Angka Kematian Bayi (Y)

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Angka Kematian Bayi (Y)

Statistik	Nilai
Mean	30,9750
Std. Deviasi	7,52042
Minimum	15,30
Maksimum	43,00

Tabel 4.2 Kategori Angka Kematian Bayi (Y)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 42,25	Tinggi	1	4,16
19,69 – 42,25	Sedang	21	87,5
< 19,69	Rendah	2	8,33

Dari Tabel 4.1 dan 4.2, terlihat bahwa angka kematian kategori tinggi dengan interval lebih dari 42,25 kematian per 1000 kelahiran terjadi hanya disatu Kabupaten yaitu Selayar. Angka kematian bayi kategori rendah dengan interval kurang dari 19,69 kematian per 1000 kelahiran terjadi di dua Kabupaten yaitu Toraja Utara dan Tana Toraja dimana yang paling rendah terdapat di Tora Utara dengan 15,3 kematian per 1000 kelahiran. Selebihnya adalah Kabupaten dengan angka kematian bayi kategori sedang dengan interval 19,69 – 42,25 kematian per 1000 kelahiran.

b. Deskripsi Persalinan Non Medis (X_1)

Tabel 4.3 Deskripsi Persalinan Non Medis (X_1)

Statistik	Nilai
Mean	18,5379
Std. Deviasi	11,41063

Minimum	0,00
Maksimum	43,55

Tabel 4.4 Kategori Persalinan Non Medis (X_1)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 35,65	Tinggi	1	4,16
1,42 – 35,65	Sedang	22	91,66
< 1,42	Rendah	1	4,16

Dari Tabel 4.3 dan 4.4 terlihat bahwa persalinan non medis kategori tinggi dengan interval lebih dari 35,65 persalinan yang terjadi hanya disatu Kabupaten yaitu di Jeneponto dengan 43,55 persalinan. Persalinan non medis kategori rendah dengan interval lebih kecil dari 1,42 terjadi di Pare-Pare dengan 0,00 persalinan. Selebihnya adalah persalinan non medis dengan kategori sedang dengan interval 1,42 – 35,65 yang terjadi di 22 Kabupaten.

c. Deskripsi Presentse Pemberian ASI Eksklusif (X_2)

Tabel 4.5 Deskripsi Presentse Pemberian ASI Eksklusif (X_2)

Statistik	Nilai
Mean	24,3604

Std. Deviasi	5,63924
Minimum	15,53
Maksimum	37,67

Tabel 4.6 Kategori Presentse Pemberian ASI Eksklusif (X_2)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 32,81	Tinggi	1	4,16
15,90 – 32,81	Sedang	22	91,66
< 15,90	Rendah	1	4,16

Pada Tabel 4.5 dan 4.6 terlihat bahwa presentase pemberian ASI eksklusif kategori tinggi dengan interval lebih dari 32,81 hanya terjadi di Kabupaten Wajo dengan 37,67. Presentase pemberian ASI eksklusif kategori rendah dengan interval kerang dari 15,90 terjadi di Kabupaten Toraja Utara dengan 15,53. Selebihnya adalah presentase pemberian ASI eksklusif kategori sedang di 22 Kabupaten dengan interval 15,90 – 32,81.

d. Deskripsi Jumlah Sarana Kesehatan (X_3)

Tabel 4.7 Deskripsi Jumlah Sarana Kesehatan (X_3)

Statistik	Nilai
Mean	89,6250
Std. Deviasi	35,28125
Minimum	30,00
Maksimum	166,00

Tabel 4.8 Kategori Jumlah Sarana Kesehatan (X_3)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 138,05	Tinggi	4	16,66
41,20 – 138,05	Sedang	19	79,16
< 41,20	Rendah	1	4,16

Pada Tabel 4.7 dan 4.8 terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan kategori tinggi dengan interval lebih dari 138,05 terdapat di 4 Kabupaten yaitu Gowa, Bone, Luwu dan Makassar, dimana yang tertinggi terdapat di Gowa dengan 166. bahwa jumlah sarana kesehatan kategori rendah dengan interval kurang dari

41,20 hanya terjadi di Kabupaten Bantaeng dengan 30 sarana kesehatan. Selebihnya adalah Kabupaten dengan jumlah sarana kesehatan kategori sedang dengan interval 41,20 – 138,05 sarana kesehatan.

e. Deskripsi Jumlah Tenga Kesehatan (X_4)

Tabel 4.9 Deskripsi Jumlah Tenga Kesehatan (X_4)

Statistik	Nilai
Mean	656,3332
Std. Deviasi	749,92119
Minimum	256,00
Maksimum	4145,00

Tabel 4.10 Kategori Jumlah Tenga Kesehatan (X_4)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 1781,21	Tinggi	1	4,16
468,55 – 1781,21	Sedang	16	66,66
< 468,55	Rendah	7	29,16

Pada Tabel 4.9 dan 4.10 terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan kategori tinggi dengan interval besar dari 1781,21 terjadi di Kota Makassar dengan 4145 tenaga kesehatan. Sarana kesehatan kategori rendah dengan interval kurang dari 468,55 terjadi di 7 Kabupaten yakni di Kabupaten Enrekang, Barru, Sinjai, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar, dimana yang paling rendah terdapat di Kabupaten Bantaeng dengan 256 tenaga kesehatan. Selebihnya adalah Kabupaten yang mempunyai jumlah tenaga kesehatan kategori sedang dengan interval 468,55 – 1781,21 tenaga kesehatan.

f. Deskripsi Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Bersih (X_5)

Tabel 4.11 Deskripsi Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Bersih (X_5)

Statistik	Nilai
Mean	12,2842
Std. Deviasi	9,80070
Minimum	1,31
Maksimum	35,09

Tabel 4.12 Kategori Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Bersih (X_5)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 26,98	Tinggi	2	8,33

2,42 – 26,98	Sedang	20	83,33
< 2,42	Rendah	2	8,33

Pada Tabel 4.11 dan 4.12 terlihat bahwa presentase rumah tangga yang memiliki air bersih kategori tinggi dengan interval lebih dari 26,98 terdapat di Makassar dan Palopo dengan 34,43 dan 35,09. Presentase rumah tangga yang memiliki air bersih kategori rendah dengan interval kurang dari 2,42 terdapat di Kabupaten Pangkep dan Luwu Utara dengan 1,31 dan 2,33. Selebihnya merupakan Kabupaten dengan presentase rumah tangga yang memiliki air bersih kategori sedang dengan interval 2,42 – 26,98.

g. Deskripsi Presentase Penduduk Miskin (X_6)

Tabel 4.13 Deskripsi Presentase Penduduk Miskin (X_6)

Statistik	Nilai
Mean	11,2692
Std. Deviasi	3,60819
Minimum	4,70
Maksimum	17,75

Tabel 4.14 Kategori Presentase Penduduk Miskin (X_6)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 16,68	Tinggi	1	41,66
5,86 – 16,68	Sedang	22	91,66
< 5,86	Rendah	1	41,66

Pada Tabel 4.13 dan 4.14 terlihat bahwa penduduk miskin kategori tinggi hanya terdapat di Kabupaten Pangkep dengan interval lebih dari 16,68. Sedangkan penduduk miskin kategori rendah terdapat di Kota Makassar dengan 4,7. Selebihnya merupakan Kabupaten dengan presentase penduduk miskin kategori sedang dengan interval 5,86 – 16,68.

- h. Deskripsi Presentse Daerah Berstatus Desa Disetiap Kabupaten/Kota (X_7)

Tabel 4.15 Deskripsi Presentse Daerah Berstatus Desa Disetiap Kabupaten/Kota (X_7)

Statistik	Nilai
Mean	11,2692
Std. Deviasi	3,60819
Minimum	4,70
Maksimum	17,75

Tabel 4.16 Kategori Jumlah Daerah Berstatus Desa Disetiap Kabupaten/Kota (X_7)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 16,68	Tinggi	2	8,33
5,86 – 16,68	Sedang	8	33,33
< 5,86	Rendah	14	58,33

Pada Tabel 4.15 dan 4.16 terlihat bahwa jumlah daerah berstatus desa kategori tinggi dengan interval lebih dari 16,68 terdapat di Luwu dan Bone dengan 207 dan 308 desa. Sedangkan daerah berstatus desa kategori rendah terdapat di 14 Kabupaten dengan interval kurang dari 5,86 dimana yang terendah terdapat di Makassar, Pare-Pare dan Palopo karena berstatus Kota. Selebihnya adalah Kabupaten daerah berstatus desa kategori sedang dengan interval 5,86 – 16,68 desa.

- i. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (X_8)

Tabel 4.17 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (X_8)

Statistik	Nilai
Mean	7,6858
Std. Deviasi	1,21327

Minimum	5,23
Maksimum	10,16

Tabel 4.18 Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (X_8)

Interval	Kategori	Frekuensi	%
> 9,50	Tinggi	1	4,16
5,86 – 9,50	Sedang	22	91,66
< 5,86	Rendah	1	4,16

Pada Tabel 4.17 dan 4.18 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kategori tinggi dengan interval lebih dari 9,50 terdapat di Kabupaten Pangkep dengan 10,16, sedangkan pertumbuhan ekonomi kategori rendah dengan interval kurang dari 5,86 terdapat di Kabupaten Maros dengan 5,23. Selebihnya merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi kategori sedang dengan interval 5,86 – 9,50.

2. Memeriksa Hubungan Antara Variabel Prediktor (*Kolinearitas*)

Sebelum pembentukan model *Generalized Regresi Poisson*, sebelumnya harus dilakukan uji *Kolinearitas* untuk mengetahui variabel prediktor telah memenuhi kondisi tidak saling berkorelasi. Beberapa kriteria untuk mengetahui adanya kolinearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF)

yang nilainya juga dapat dilihat pada output deskripsi data angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 pada Lampiran 5 skripsi ini. Berikut nilai koefisien korelasi antara variabel prediktor dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF):

Tabel 4.19 Nilai VIF variabel prediktor

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.267	11.971		.523	.608		
X1	.315	.140	.477	2.253	.040	.573	1.746
X2	.275	.240	.206	1.145	.270	.792	1.263
X3	.021	.063	.096	.327	.748	.296	3.380
X4	-.002	.003	-.184	-.677	.508	.347	2.885
X5	.019	.172	.025	.111	.913	.513	1.950
X6	-.251	.410	-.121	-.612	.549	.663	1.509
X7	-.014	.028	-.128	-.483	.636	.365	2.737
X8	2.007	1.259	.324	1.594	.132	.623	1.605

Pada Tabel 4.19 terlihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) pada semua variabel prediktor bernilai kurang dari 10 yang artinya tidak terjadi kolinearitas antara variabel prediktor sehingga semua variabel dapat digunakan untuk membentuk model *Generalized Regresi Poisson*.

3. Memeriksa adanya kasus *Oversdispersi* atau *Underdispersi* pada model regresi poisson

Adanya kasus *Oversdispersi* atau *Underdispersi* dapat dideteksi dengan memeriksa nilai *deviance* atau nilai *Chi Square* yang dibagi dengan derajat

bebasnya. Jika nilainya lebih dari satu maka terjadi *Overdispersi* dan sebaliknya jika kurang dari satu maka terjadi *Underdispersi*.

Tabel 4.20 Pemeriksaan *Overdispersi* atau *Underdispersi*

Criteria For Assessing Goodness Of Fit			
Criterion	DF	Value	Value/DF
Deviance	15	17.6150	1.1743
Scaled Deviance	15	17.6150	1.1743
Pearson Chi-Square	15	17.1758	1.1451
Scaled Pearson X ²	15	17.1758	1.1451

Terlihat di atas bahwa nilai *Deviance* dari model regresi poisson adalah 17,6150, jika nilai ini dibagi dengan nilai derajat bebasnya yakni 15 maka didapat 1,1743. Sama halnya dengan nilai *Pearson Chi Square* adalah 17.1758, jika dibagi dengan nilai derajat bebasnya yakni 15 maka akan didapatkan 1,1451 yang keseluruhan hasilnya bernilai lebih dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi *overdispersi* pada data. Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan model *Generalized Regresi Poisson*.

4. Menentukan model *Generalized Regresi Poisson*

Berikut ini adalah estimasi parameter *Generalized Regresi Poisson* angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan program SAS (*Statistical Analysis System*) :

Tabel 4.21 Uji G Hitung Model *Generalized Regresi Poisson*

Fit Statistics	
-2 Log Likelihood	142.3
AIC (smaller is better)	162.3
AICC (smaller is better)	179.2
BIC (smaller is better)	174.1

Selanjutnya dilakukan pengujian secara serentak untuk melihat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dengan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_8 = 0$$

H_1 = paling tidak ada satu β_j yang berpengaruh terhadap model

Dari Tabel 4.21 didapatkan nilai G_{hitung} pada analisis ini adalah 142,3 sedangkan nilai $\chi^2_{0,05;7} = 14,067$. Dari hasil ini terlihat bahwa $G_{hitung} > \chi^2_{0,05;7}$ maka H_0 ditolak, yang artinya paling tidak ada satu β_j yang berpengaruh terhadap model.

Dari hasil analisis di atas didapatkan model sebagai berikut:

$$\hat{\mu} = \exp(2,6906 + 0,01047X_1 + 0,005992X_2 + 0,000794X_3 - 0,00005X_4 - 0,00045X_5 - 0,00979X_6 - 0,00040X_7 + 0,06563X_8)$$

Tabel 4.22 Estimasi Parameter Model *Generalized Regresi Poisson*

Parameter Estimates								
Parameter	Estimate	Standard Error	DF	t Value	Pr > t	95% Confidence Limits		Gradient
b0	2.6906	0.3005	24	8.96	<.0001	2.0705	3.3107	-9.6E-6
b1	0.01047	0.003492	24	3.00	0.0062	0.003263	0.01768	0.000104
b2	0.005992	0.006151	24	0.97	0.3397	-0.00670	0.01869	0.000167
b3	0.000794	0.001691	24	0.47	0.6430	-0.00270	0.004283	0.000879
b4	-0.00005	0.000081	24	-0.64	0.5252	-0.00022	0.000115	0.021788
b5	-0.00045	0.004662	24	-0.10	0.9246	-0.01007	0.009177	0.000151
b6	-0.00979	0.01074	24	-0.91	0.3713	-0.03196	0.01238	0.000064
b7	-0.00040	0.000713	24	-0.56	0.5785	-0.00187	0.001071	0.000489
b8	0.06563	0.03265	24	2.01	0.0558	-0.00175	0.1330	0.000054
A	-0.00492	0.003926	24	-1.25	0.2222	-0.01302	0.003182	-0.00029

Hasil estimasi dari data di atas mencapai konvergen setelah mencapai iterasi yang ke 21. Dari Tabel 4.22 didapatkan parameter yang signifikan yaitu β_0 dan β_1 karena memiliki nilai $|T_{hitung}| > t_{0,025;24}$ (2,064) atau nilai P value $< \alpha$ (0,05).

Statistik datanya sebagai berikut:

Untuk β_0 :

$$|T_{hitung}| = |8,96| > t_{0,025:24} (2,064) \text{ (signifikan)}$$

Untuk β_1 :

$$|T_{hitung}| = |3,00| > t_{0,025:24} (2,064) \text{ (signifikan)}$$

Untuk β_2 :

$$|T_{hitung}| = |0,97| < t_{0,025:24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Untuk β_3 :

$$|T_{hitung}| = |0,47| < t_{0,025:24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Untuk β_4 :

$$|T_{hitung}| = |0,64| < t_{0,025:24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Untuk β_5 :

$$|T_{hitung}| = |0,10| < t_{0,025:24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Untuk β_6 :

$$|T_{hitung}| = |0,91| < t_{0,025:24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Untuk β_7 :

$$|T_{hitung}| = |0,56| < t_{0,025:24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Untuk β_8 :

$$|T_{hitung}| = |2,01| < t_{0,025;24} (2,064) \text{ (tidak signifikan)}$$

Dari data di atas diketahui bahwa variabel yang signifikan adalah X_1 yaitu persalinan dengan non medis, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014.

5. Memeriksa Kesesuaian Model Dengan Melihat nilai uji *Goodness Of Fit* Pada Output SAS

Pengujian kesesuaian model untuk mengetahui model yang digunakan sesuai atau tidak dengan data yang diamati. Pengujian kesesuaian model ini dilakukan dengan menggunakan uji *goodness of fit*. hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 = Model yang didapat sesuai dengan data yang diamati

H_1 = Model yang didapat tidak sesuai dengan data yang diamati

Dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$

Kriteria H_0 diterima jika nilai *Pearson Chi Square* lebih besar dari $\alpha = 0,05$

Tabel 4.23 nilai *pearsen chi-square*

Criteria For Assessing Goodness Of Fit			
Criterion	DF	Value	Value/DF
Deviance	15	17.6150	1.1743
Scaled Deviance	15	17.6150	1.1743
Pearson Chi-Square	15	17.1758	1.1451

Pada Tabel 4.6 didapatkan nilai *Pearson Chi Square* 1,1451 yang nilainya lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima yang artinya model yang didapatkan sudah sesuai dengan data yang diamati. Uji ini didasarkan pada seberapa baik kesesuaian/kecocokan (*goodness of fit*) antara frekuensi pengamatan yang diperoleh data sampel dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusinya.

B. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 4.1 dan 4.2 terlihat bahwa rata-rata jumlah angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 adalah sebesar 30,97 per 1000 kelahiran. Dari Tabel 4.1 dan 4.2, terlihat bahwa angka kematian kategori tinggi dengan interval lebih dari 42,25 kematian per 1000 kelahiran terjadi hanya disatu Kabupaten yaitu Selayar. Angka kematian bayi kategori rendah dengan interval kurang dari 19,69 kematian per 1000 kelahiran terjadi di dua Kabupaten yaitu Toraja Utara dan Tana Toraja dimana yang paling rendah terdapat di Tora Utara dengan 15,3 kematian per 1000 kelahiran. Selebihnya adalah Kabupaten dengan angka kematian bayi kategori sedang dengan interval 19,69 – 42,25 kematian per 1000 kelahiran.

Dari Tabel 4.3 dan 4.4 terlihat bahwa persalinan non medis kategori tinggi dengan interval lebih dari 35,65 persalinan yang terjadi hanya disatu Kabupaten yaitu di Jeneponto dengan 43,55 persalinan. Persalinan non medis kategori rendah dengan interval lebih kecil dari 1,42 terjadi di Pare-Pare dengan 0,00 persalinan. Selebihnya adalah persalinan non medis dengan kategori sedang dengan interval

1,42 – 35,65 yang terjadi di 22 Kabupaten. Pada Tabel 4.5 dan 4.6 terlihat bahwa presentase pemberian ASI eksklusif kategori tinggi dengan interval lebih dari 32,81 hanya terjadi di Kabupaten Wajo dengan 37,67. Presentase pemberian ASI eksklusif kategori rendah dengan interval kerang dari 15,90 terjadi di Kabupaten Toraja Utara dengan 15,53. Selebihnya adalah presentase pemberian ASI eksklusif kategori sedang di 22 Kabupaten dengan interval 15,90 – 32,81.

Sarana kesehatan dengan kategori paling sedikit berada pada Kabupaten Bantaeng dengan 30 orang per 1000 penduduk. Terlihat pula Pada Tabel 4.7 dan 4.8 terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan kategori tinggi dengan interval lebih dari 138,05 terdapat di 4 Kabupaten yaitu Gowa, Bone, Luwu dan Makassar, dimana yang tertinggi terdapat di Gowa dengan 166. bahwa jumlah sarana kesehatan kategori rendah dengan interval kurang dari 41,20 hanya terjadi di Kabupaten Bantaeng dengan 30 sarana kesehatan. Selebihnya adalah Kabupaten dengan jumlah sarana kesehatan kategori sedang dengan interval 41,20 – 138,05 sarana kesehatan.

Pada Tabel 4.9 dan 4.10 terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan kategori tinggi dengan interval besar dari 1781,21 terjadi di Kota Makassar dengan 4145 tenaga kesehatan. Sarana kesehatan kategori rendah dengan interval kurang dari 468,55 terjadi di 7 Kabupaten yakni di Kabupaten Enrekang, Barru, Sinjai, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar, dimana yang paling rendah terdapat di Kabupaten Bantaeng dengan 256 tenaga kesehatan. Selebihnya adalah Kabupaten

yang mempunyai jumlah tenaga kesehatan kategori sedang dengan interval 468,55 – 1781,21 tenaga kesehatan.

Pada Tabel 4.11 dan 4.12 terlihat bahwa presentase rumah tangga yang memiliki air bersih kategori tinggi dengan interval lebih dari 26,98 terdapat di Makassar dan Palopo dengan 34,43 dan 35,09. Presentase rumah tangga yang memiliki air bersih kategori rendah dengan interval kurang dari 2,42 terdapat di Kabupaten Pangkep dan Luwu Utara dengan 1,31 dan 2,33. Selebihnya merupakan Kabupaten dengan presentase rumah tangga yang memiliki air bersih kategori sedang dengan interval 2,42 – 26,98. Pada Tabel 4.13 dan 4.14 terlihat bahwa penduduk miskin kategori tinggi hanya terdapat di Kabupaten Pangkep dengan interval lebih dari 16,68. Sedangkan penduduk miskin kategori rendah terdapat di Kota Makassar dengan 4,7. Selebihnya merupakan Kabupaten dengan presentase penduduk miskin kategori sedang dengan interval 5,86 – 16,68.

Pada Tabel 4.15 dan 4.16 terlihat bahwa jumlah daerah berstatus desa kategori tinggi dengan interval lebih dari 16,68 terdapat di Luwu dan Bone dengan 207 dan 308 desa. Sedangkan daerah berstatus desa kategori rendah terdapat di 14 Kabupaten dengan interval kurang dari 5,86 dimana yang terendah terdapat di Makassar, Pare-Pare dan Palopo karena berstatus Kota. Selebihnya adalah Kabupaten daerah berstatus desa kategori sedang dengan interval 5,86 – 16,68 desa. Pada Tabel 4.17 dan 4.18 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kategori tinggi dengan interval lebih dari 9,50 terdapat di Kabupaten Pangkep dengan 10,16, sedangkan pertumbuhan ekonomi kategori rendah dengan interval

kurang dari 5,86 terdapat di Kabupaten Maros dengan 5,23. Selebihnya merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi kategori sedang dengan interval 5,86 – 9,50.

Pemeriksaan kolinearitas dapat dilihat Berdasarkan Tabel 4.19 hasil dari olahan program SPSS terlihat bahwa tidak ada kolinearitas antara variabel prediktor, dapat dilihat dari nilai VIF yang nilainya kurang dari 10, sehingga semua variabel dapat digunakan untuk model *Generalized regresi poisson*. Dalam analisis data, banyak terjadi *Oversdispersi* atau *Underdispersi* (data yang memiliki nilai variansi lebih besar atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya). Salah satu metode untuk mendeteksi terjadinya *Oversdispersi* atau *Underdispersi* yakni dengan melihat nilai *Deviance* pada model yang kemudian dibagi dengan nilai derajat bebasnya, jika hasilnya lebih dari 1 maka terjadi *Oversdispersi* dan jika kurang dari 1 maka terjadi *Underdispersi*. Begitupun dengan nilai *Pearson Chi Square* yang dibagi dengan derajat bebasnya, jika nilainya lebih dari satu maka terjadi *Oversdispersi* dan jika kurang dari 1 maka terjadi *Underdispersi*. Berdasarkan pada Tabel 4.20 terlihat bahwa nilai *Deviance* dari model regresi poisson adalah 17,6150, jika nilai ini dibagi dengan nilai derajat bebasnya yakni 15 maka didapat 1,1743.

Sama halnya dengan nilai *Pearson Chi Square* adalah 17.1758, jika dibagi dengan nilai derajat bebasnya yakni 15 maka akan didapatkan 1,1451 yang keseluruhan hasilnya bernilai lebih dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi *overdispersi* pada data. Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan model *Generalized Regresi Poisson*. Penaksiran parameter Model *Generalized Regresi*

Poisson dilakukan dengan metode *Maximum Likelihood Estimator* (MLE). Metode MLE merupakan suatu penaksiran parameter yang digunakan untuk menaksir parameter suatu model yang diketahui distribusinya. Sebagaimana diketahui bahwa *Generalized Regresi Poisson* mengasumsikan komponen randomnya berdistribusi *Generalized Poisson*. Setelah menaksir parameter Model *Generalized Regresi Poisson* dengan menggunakan *Maximum Likelihood Estimator* (MLE), selanjutnya mendapatkan parameter $\hat{\beta}$ dengan menurunkan model Likelihood terhadap β , sedangkan untuk mendapatkan $\hat{\alpha}$ sebagai parameter dispersi maka model likelihood diturunkan terhadap α kemudian disamakan dengan nol.

Hasil analisis *overdispersi* dan *underdispersi* menyatakan bahwa data pada penelitian ini mengalami *overdispersi* sehingga digunakanlah *Generalized Regresi Poisson* untuk menangani pelanggaran *equidispersi* pada data penelitian ini. Berdasarkan data pada Tabel 4.22 diketahui bahwa koefisien variabel yang signifikan adalah X_1 yaitu persalinan dengan non medis, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014. Berdasarkan penjelasan di atas, maka model yang dihasilkan dinotasikan dalam bentuk simultan atau keseluruhan, yaitu:

$$\hat{\mu} = \exp(2,6906 + 0,01047X_1 + 0,005992X_2 + 0,000794X_3 - 0,00005X_4 - 0,00045X_5 - 0,00979X_6 - 0,00040X_7 + 0,06563X_8)$$

Pengujian kesesuaian model bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan di atas sudah sesuai atau tidak dengan data yang diamati. Salah

satu cara untuk mengetahui kesesuaian model yaitu dengan melihat nilai dari output *Goodness Of Fit* Pada program SAS, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model yang didapat sesuai dengan data yang diamati

H_1 = Model yang didapat tidak sesuai dengan data yang diamati

Dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$

Kriteria H_0 diterima jika nilai *Pearson Chi Square* lebih besar dari $\alpha = 0,05$

Pada Tabel 4.23 didapatkan nilai *Pearson Chi Square* 1,1451 yang nilainya lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima yang artinya model yang didapatkan sudah sesuai dengan data yang diamati. Sehingga semua data dapat dibentuk menjadi model *Generalized Regresi Poisson* pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi Tahun 2014.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemodelan *Generalized Regresi Poisson* adalah sebagai berikut:

1. Model *Generalized Regresi Poisson* pada angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$\hat{\mu} = \exp(2,6906 + 0,01047X_1 + 0,005992X_2 + 0,000794X_3 - 0,00005X_4 - 0,00045X_5 - 0,00979X_6 - 0,00040X_7 + 0,06563X_8)$$

2. Berdasarkan estimasi model *Generalized Regresi Poisson*, diketahui bahwa faktor persalinan dengan non medis (X_1) merupakan faktor signifikan mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai parameter 0,01047.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan kondisi geografi setiap daerah yang berbeda-beda sehingga didapatkan perbandingan hasil analisis utamanya dalam menangani kasus angka kematian bayi ataupun data yang mengalami *overdispersi/underdispersi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anies Hapaserang, Oscar. “*Mortalitas dan Morbiditas Penduduk SULSEL*”. 17 Juli 2014. <http://oscarianieshapaserang.blogspot.co.id/2014/07/mortalitas-dan-morbiditas-penduduk.html?m=1>. (Diakses pada 17 Juli 2016).
- AR Bafadal, Fadhal. 2002. “*Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30*”. Jakarta. Departemen Agama RI
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. “*Provil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014*”
- Erythryna. Juli, 2014. “*Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup Di Indonesia*”. Vol 2. No 2. [Http://www.repository.unand.ac.id/406/](http://www.repository.unand.ac.id/406/). (Diakses pada 5 Juni 2016)
- Fathurrahman, M. September, 2009. “*Pemilihan Model Regresi Terbaik Menggunakan Metode Akaike’s Information Criterion dan Schwarz Information Criterio*”. Vol 4. No 3. [Http:// e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/article/view](http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/article/view). (Diakses pada 5 Juni 2016)
- Ismail, Noriszura & Aziz Jamain, Abdul. Malaysia, 2005. “*Generalized Poisson Regression : An Alternative For Risk Classification*”. Jurnal Teknologi, 43(C).https://www.researchgate.net/publication/275069431_Generalized_Poisson_Regression_An_Alternative_for_Risk_Classification. Univerity Teknologi Malaysia. (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Irawati. Juli 2012. “*Perbandingan Analisis Generalized Poisson Regression (GPR) dan Regresi Binomial Negatif Untuk Mengatasi Overdispersi Studi Kasus: Pemodelan Jumlah Kasus Kanker Serviks di Jawa Timur*”. Vol 2, No 2. [Http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmat/issue/view/949](http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmat/issue/view/949). (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Mamin, Darwis. “*Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Non-Medis*”. 2005. <http://darwismamin.wordpress.com/keperawatan/pertolongan-persalinan-oleh-tenaga-kesehatan-non-medis/>. (Diakses pada 17 Juli 2016).
- Netter, John, dkk. 1996. *Applied Linier Statistical Models*. WCB McGraw-Hill.

- Pratiwi Dewi Nur. 2012. "Mengatasi Overdispersi Pada Regresi Poisson Dengan Generalized Regresi Poisson". *Jurnal Matematika* 2012. (Diakses pada 5 Juni 2016)
- Purhadi. Mei 2007. "Pemodelan Generalized Regresi Poisson pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur". Vol 2. No 2. [Http://digilib.its.ac.id/.../ITS-Undergraduate-9320-Paper.pdf](http://digilib.its.ac.id/.../ITS-Undergraduate-9320-Paper.pdf). (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Putri Sugiantari, Ayuk dan Budiantara, I Nyoman. 2013. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline". Vol 2, No 1. [Http://ejurnal.its.co.id/index.php/sains_seni/article/.../773](http://ejurnal.its.co.id/index.php/sains_seni/article/.../773). (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Ruliana. "Pemodelan Generalized Poisson Regression (GPR) Untuk Mengatasi Masalah EQUIDISPERSI Pada Regresi Poisson Kasus Campak di Kota Semarang". *Jurnal Matematika*. [Http://lib.unnes.ac.id/22508/411411051-S.pdf](http://lib.unnes.ac.id/22508/411411051-S.pdf). (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Rusianti. "Penanganan Data Overdispersi Menggunakan Regresi Poisson Tergeneralisasi (Kasus Presentase Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012)". *Jurnal Matematika*. (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Suprihartiningsih, Erna. "Model Regresi Terbaik : Stepwise Regression, Backward Elimination, dan Forward Selection". 2 Juni 2016. <http://ernasuprihartiningsih.blogspot.com/2011/01/model-regresi-terbaik-stepwise.html>. (Diakses pada 6 Juni 2016)
- Turmudi, Sri Harini. 2008. *Metode Statistik Pendekatan Teoritis dan Aplikasi*. Malang. Uin Malang
- Yudanta Eka Putra, Putu. Mei, 2013. "Penerapan Regresi Generalized Regresi Poisson Untuk Menangani Fenomena Overdispersi Pada Regresi Poisson". Vol. 2 No. 2. [Http://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/6312](http://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/6312). (Diakses pada 6 Juni 2016)

Output Deskripsi Data Angka Kematian Bayi Tahun 2014 Dengan Program SPSS

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y	24	15.30	43.00	743.40	30.9750	7.5204
X1	24	.00	43.55	444.91	18.5379	11.4106
X2	24	15.53	37.67	584.65	24.3604	5.6392
X3	24	30.00	166.00	2151.00	89.6250	35.2812
X4	24	256.00	4145.00	1.58E4	6.5633E2	749.9211
X5	24	1.31	35.09	294.82	12.2842	9.8007
X6	24	4.70	17.75	270.46	11.2692	3.6081
X7	24	.00	328.00	2253.00	93.8750	70.7821
X8	24	5.23	10.16	184.46	7.6858	1.2132
Valid N (listwise)	24					

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.267	11.971		.523	.608		
X1	.315	.140	.477	2.253	.040	.573	1.74
X2	.275	.240	.206	1.145	.270	.792	1.26
X3	.021	.063	.096	.327	.748	.296	3.38
X4	-.002	.003	-.184	-.677	.508	.347	2.86
X5	.019	.172	.025	.111	.913	.513	1.95
X6	-.251	.410	-.121	-.612	.549	.663	1.50
X7	-.014	.028	-.128	-.483	.636	.365	2.73
X8	2.007	1.259	.324	1.594	.132	.623	1.60

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.267	11.971		.523	.608	
	X1	.315	.140	.477	2.253	.040	.573
	X2	.275	.240	.206	1.145	.270	.792
	X3	.021	.063	.096	.327	.748	.296
	X4	-.002	.003	-.184	-.677	.508	.347
	X5	.019	.172	.025	.111	.913	.513
	X6	-.251	.410	-.121	-.612	.549	.663
	X7	-.014	.028	-.128	-.483	.636	.365
	X8	2.007	1.259	.324	1.594	.132	.623

a. Dependent Variable: Y

Aplikasi Program SAS Untuk Menghitung Nilai Deviance dan Pearson Chi Square Model R

```

data AKBS;
input y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 X8;
cards;
43.0 20.71 20.80 94 324 13.14 14.23 81 9.18
39.3 29.70 22.99 98 512 7.63 9.04 109 8.21
36.0 35.36 31.14 30 256 29.24 10.45 46 7.92
41.7 43.55 21.93 92 350 10.17 16.52 82 7.71
37.7 18.68 24.01 80 461 22.71 10.42 76 9.00
25.7 12.83 27.55 166 737 3.90 8.73 122 6.94
40.3 27.28 30.00 96 454 10.68 10.32 67 6.98
28.3 9.60 23.84 55 497 3.61 12.90 80 5.23
38.0 31.11 29.12 98 597 1.31 17.75 65 10.16
32.7 28.64 28.88 52 418 8.76 10.32 40 6.64
39.7 22.58 27.57 153 587 6.85 11.92 328 8.92
27.0 6.54 30.17 79 478 12.03 9.43 49 6.76
34.3 31.73 37.67 103 554 12.78 8.17 142 9.15
29.7 5.33 24.83 71 597 8.25 6.3 0 68 7.76
29.7 19.71 17.22 82 506 6.27 8.86 69 8.11
24.7 8.77 30.47 92 448 13.41 15.11 112 5.88
28.3 25.91 20.28 152 538 2.74 15.1 207 8.73
17.7 18.15 17.41 71 570 7.46 13.81 113 6.56
33.3 13.61 26.58 90 547 2.33 15.52 166 8.47
28.3 17.05 18.54 96 550 3.24 8.38 124 7.54
15.3 7.34 15.53 68 486 16.68 16.53 107 7.39

```

run;



Output Nilai Deviance dan Chi-Square Angka Kematian Bayi 2014

Model Information	
Data Set	WORK AKBS

Number of Observations Read	24
Number of Observations Used	24

Criteria For Assessing Goodness Of Fit			
Criterion	DF	Value	Value/DF
Deviance	15	17.6150	1.1743
Scaled Deviance	15	17.6150	1.1743
Pearson Chi-Square	15	17.1758	1.1451
Scaled Pearson X2	15	17.1758	1.1451
Log Likelihood		1821.8719	
Full Log Likelihood		-71.7516	
AIC (smaller is better)		161.5032	
AICC (smaller is better)		174.3603	
BIC (smaller is better)		172.1056	

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates							
Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald 95% Confidence Limits		Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept	1	2.6593	0.3602	1.9534	3.3652	54.52	<.0001
1	1	0.0105	0.0041	0.0024	0.0186	6.40	0.0114

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates							
Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald 95% Confidence Limits		Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
x5	1	-0.0008	0.0055	-0.0116	0.0100	0.02	0.8830
x6	1	-0.0106	0.0128	-0.0356	0.0145	0.68	0.4081
x7	1	-0.0004	0.0008	-0.0021	0.0013	0.22	0.6359
x8	1	0.0679	0.0387	-0.0079	0.1438	3.08	0.0793
Scale	0	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000		

Aplikasi Program SAS Untuk Estimasi Parameter Model *Generalized Regresi Poisson*

```

data AKBS;
input y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8;
cards;
43.0 20.71 20.80 94 324 13.14 14.23 81 9.18
39.3 29.70 22.99 98 512 7.63 9.04 109 8.21
36.0 35.36 31.14 30 256 29.24 10.45 46 7.92
41.7 43.55 21.93 92 350 10.17 16.52 82 7.71
37.7 18.68 24.01 80 461 22.71 10.42 76 9.00
25.7 12.83 27.55 166 737 3.90 8.73 122 6.94
40.3 27.28 30.00 96 454 10.68 10.32 67 6.98
28.3 9.60 23.84 55 497 3.61 12.9 80 5.23
38.0 31.11 29.12 98 597 1.31 17.75 65 10.16
32.7 28.64 28.88 52 418 8.76 10.32 40 6.64
39.7 22.58 27.57 153 587 6.85 11.92 328 8.92
27.0 6.54 30.17 79 478 12.03 9.43 49 6.76
34 3 31 73 37 67 103 554 12 78 8 17 142 9 15

```

```
33.3 13.61 26.58 90 547 2.33 15.52 166 8.47
28.3 17.05 18.54 96 550 3.24 8.38 124 8.47
15.3 7.34 15.53 68 486 16.68 16.53 107 7.54
22.7 3.77 17.59 143 4145 34.43 4.70 0 7.39
25.0 0.00 22.35 41 602 22.11 6.38 0 6.09
25.0 6.96 18.18 49 538 35.09 9.57 0 6.66
```

```
;
proc nlmixed data=AKBS start hess tech=newrap;
parms b0=2.6593 b1=0.0105 b2=0.0027 b3=0.0007 b4=-0.0000 b5=-0.0000
0.0106 b7=-0.0004 b8=0.0679;
eta=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*x5+b6*x6+b7*x7+b8*x8;
miu=exp(eta);
gpr=y*log(miu/(1+a*miu))+(y-1)*log(1+a*y)-miu*(1+a*y)/(1+a*miu)-log
model y~general(gpr);
run;
```

Output Program SAS Model Generalized Regresi Poisson Angka Kematian Bayi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Specifications	
Data Set	WORK.AKBS
Dependent Variable	y
Distribution for Dependent Variable	General
Optimization Technique	Newton-Raphson
Integration Method	None

Dimensions	
Observations Used	24
Observations Not Used	0
Total Observations	24
Parameters	10

Initial Parameters										
b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	a	Negative Log Likelihood
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	277.388736

Starting Values		
Parameter	Estimate	Gradient
b0	0	-179.850
b1	0	-3677.33
b2	0	-4485.33
b3	0	-16289.0
b4	0	-108827
b5	0	-2128.80
b6	0	-2046.00
b7	0	-108827
b8	0	-108827
a	1	-108827

Starting Hessian Matrix									
	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	
b0	185.85	3788.48	4631.39	16825	112651	2202.47	2114.48	18040	1451
b1	3788.48	100642	97812	347869	1859432	41013	45862	394467	30
b2	4631.39	97812	120652	419225	2655319	53987	52625	460060	36
b3	16825	347869	419225	1733041	11572368	178036	193035	1923949	133
b4	112651	1859432	2655319	11572368	1.43E8	1732812	1128479	9355916	845
b5	2202.47	41013	53987	178036	1732812	41755	22754	151769	16
b6	2114.48	45862	52625	193035	1128479	22754	26261	218028	16
b7	18040	394467	460060	1923949	9355916	151769	218028	2714984	146
b8	1451.72	30710	36329	133365	845057	16863	16750	146605	11
a	179.85	3677.24	4485.22	16288	108713	2128.76	2046.85	17476	1405

Iteration History					
Iteration	Calls	Negative Log Likelihood	Difference	Maximum Gradient	Slope
1	27	168.6056	108.7831	31919.8	-180.085
2	44	149.8261	18.77959	28376.7	-74.9558
3	62	133.1404	16.68562	32374.3	-148.805
4	77	111.8060	21.33443	59927.1	-1938.18

Iteration History					
Iteration	Calls	Negative Log Likelihood	Difference	Maximum Gradient	Slope
8*	133	84.5397399	1.684571	364.215	-1.97744
9*	147	80.9708627	3.568877	404.836	-3.75613
10*	161	73.3925483	7.578314	1137.45	-7.84175
11*	175	72.3757501	1.016798	424.373	-1.68838
12*	189	72.1337820	0.241968	46.6814	-0.27682
13*	203	71.6652083	0.468574	31.7642	-0.55009
14*	217	71.2809671	0.384241	142.282	-0.56579
15*	231	71.2259611	0.055006	31.4287	-0.08786
16*	245	71.2165469	0.009414	3.69663	-0.01170
17*	259	71.1972685	0.019278	3.09053	-0.02132
18*	273	71.1618668	0.035402	26.7967	-0.06079
19*	287	71.1609006	0.000966	4.64341	-0.00177
20*	301	71.1608920	8.525E-6	0.37594	-0.00002
21*	315	71.1608920	2.083E-8	0.021788	-4.06E-8

NOTE: GCONV convergence criterion satisfied.

Fit Statistics	
-2 Log Likelihood	142.3
AIC (smaller is better)	162.3
AICC (smaller is better)	179.2
BIC (smaller is better)	174.1

Parameter Estimates								
Parameter	Estimate	Standard Error	DF	t Value	Pr > t	95% Confidence Limits		Gr
b0	2.6906	0.3005	24	8.96	<.0001	2.0705	3.3107	.
b1	0.01047	0.003492	24	3.00	0.0062	0.003263	0.01768	0.
b2	0.005992	0.006151	24	0.97	0.3397	-0.00670	0.01869	0.
b3	0.000794	0.001691	24	0.47	0.6430	-0.00270	0.004283	0.
b4	-0.00005	0.000081	24	-0.64	0.5252	-0.00022	0.000115	0.
b5	-0.00045	0.004662	24	-0.10	0.9246	-0.01007	0.009177	0.
b6	-0.00979	0.01074	24	-0.91	0.3713	-0.03196	0.01238	0.
b7	-0.00040	0.000713	24	-0.56	0.5785	-0.00187	0.001071	0.
b8	0.06563	0.03265	24	2.01	0.0558	-0.00175	0.1330	0.
a	-0.00492	0.003926	24	-1.25	0.2222	-0.01302	0.003182	-0.

Hessian Matrix									
	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	
b0	1051.27	22134	26431	95501	625386	12344	12003	103052	
b1	22134	597729	581480	2030046	10952928	240201	266324	2306342	
b2	26431	581480	700204	2403799	14971777	307843	299453	2641482	
b3	95501	2030046	2403799	9907783	63874265	976323	1099317	10971466	
b4	625386	10952928	14971777	63874265	7.3541E8	9127530	6410229	54053912	
b5	12344	240201	307843	976323	9127530	233264	128396	878655	
b6	12003	266324	299453	1099317	6410229	128396	149904	1238748	
b7	103052	2306342	2641482	10971466	54053912	878655	1238748	15043121	
b8	8272.52	180748	209558	762049	4755381	94975	95703	839619	
a	-115.50	-7345.13	-13017	-15587	-300764	-363.27	1384.49	-15935	