

**GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN BEROBAT PADA PASIEN  
TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS SAMATA KECAMATAN SOMBA  
OPU KABUPATEN GOWA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**KURNIAWAN JAMALUDDIN**  
NIM : 70100114051

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
SAMATA-GOWA**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Jamaluddin  
NIM : 70100114051  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung pandang / 18 Desember 1995  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Pao-pao Permai, Blok B1 No.4  
Judul : Gambaran Tingkat Kepatuhan Berobat pada Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Januari 2019

Penulis,

Kurniawan Jamaluddin  
NIM: 70100114051

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Gambaran Tingkat Kepatuhan Berobat Pada Pasien Tuberkulosis Di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" yang disusun oleh **Kurniawan Jamaluddin**, NIM: 70100114051, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, di uji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 25 Januari 2019 M** yang bertepatan dengan **19 Jumadil Awal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 25 Januari 2019 M**  
**19 Jumadil Awal 1440 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S. Si., M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Munifah Wahyudin, S.Farm.,M.Sc.,Apt.	(.....)
Penguji I	: Alifia Putri Febriyanti,S.Farm.,M.Farm.Klin.,Apt	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh :

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**  
**UIN Alauddin Makassar**

**Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M. Sc.**  
**NIP. 19530203 198312 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua, yaitu Jamaluddin, dan Suriani yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat saudara-saudaraku tercinta serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada bapak/ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Mukhriani, S.Si, M.Si, Apt., selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. Wahyuddin G., M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
9. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Alifia Putri Febrianti, S.Farm., M.Pharm.Klin., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak arahan, masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, sekaligus selaku pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
12. Bapak dan Ibu dosen, yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasa beliau mendapatkan balasan dari Allah SWT serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, November 2018

Penyusun

Kurniawan Jamaluddin  
NIM : 70100114051

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK INDONESIA .....	xii
ABSTRAK INGGRIS.....	xiii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II_TINJAUAN TEORITIS .....	9
A. Tuberkulosis.....	9
B. Kepatuhan Pasien.....	29
C. Validasi dan Reliabilitas .....	32
D. Uraian Tentang Puskesmas .....	33
E. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan.....	35
BAB III_METODOLOGI PENELITIAN.....	41

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	41
1. Pendekatan Penelitian .....	41
2. Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel .....	41
1. Populasi.....	41
2. Sampel.....	41
<u>D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi .....</u>	<u>42</u>
<u>1. Kriteria Inklusi.....</u>	<u>42</u>
<u>2. Kriteria Eksklusi .....</u>	<u>43</u>
<u>E. Instrumen Penelitian .....</u>	<u>43</u>
<u>F. Variabel Penelitian.....</u>	<u>43</u>
<u>G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</u>	<u>43</u>
<u>1. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data .....</u>	<u>43</u>
<u>2. Analisis Data.....</u>	<u>44</u>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
KEPUSTAKAAN .....	62
LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja .....	65
Lampiran 2. Kuisisioner MMAS .....	66
Lampiran 3. Uji Validitas Kuisisioner .....	68
Lampiran 4. Uji Validitas.....	69
Lampiran 5. Uji Normalitas .....	71
Lampiran 6. Statistik Uji Korelasi .....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. OAT Lini Pertama.....	24
Tabel 2. Kisaran Dosis OAT Pasien Dewasa.....	25
Tabel 3. OAT yang di Gunakan dalam Pengobatan TB MDR .....	25
Tabel 4. Dosis untuk Paduan OAT KDT Kategori 1 .....	27
Tabel 5. Dosis untuk Paduan OAT KDT Kategori 2 .....	28
Tabel 6. Karakteristik Pasien .....	46
Tabel 7. Kepatuhan Pasien.....	47
Tabel 8. Hubungan Karakteristik Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Pasien.....	48
Tabel 9. Hubungan Karakteristik Usia dengan Kepatuhan Pasien .....	48
Tabel 10. Hubungan Karakteristik Pendidikan dengan Kepatuhan Pasien.....	49
Tabel 11. Hubungan Karakteristik Pekerjaan dengan Kepatuhan Pasien .....	49
Tabel 12. Hubungan Karakteristik Penghasilan dengan Kepatuhan Pasien .....	49
Tabel 13. Hubungan Karakteristik Jarak Rumah dengan Kepatuhan Pasien.....	50
Tabel 14. Hubungan Karakteristik dengan Kepatuhan Pasien.....	50

UNIVERSITAS HANANESRI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : KURNIAWAN JAMALUDDIN  
NIM : 70100114051  
Jurusan : FARMASI  
Judul Skripsi : GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN BEROBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

---

Kejadian tuberkulosis (TB) di Kabupaten Gowa masih menjadi masalah kesehatan yang prioritas terutama di wilayah Samata. Puskesmas Samata merupakan puskesmas di Kecamatan Somba Opu yang memiliki angka kejadian TB paling tinggi, angka success rate pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis dalam melakukan pengobatan dan mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan tuberkulosis. Penelitian ini bersifat deskriptif observasional dengan rancangan cross sectional, dan dianalisis dengan uji statistik korelasi spearman, pearson dan eta squared. Populasi penelitian adalah semua pasien TB paru yang berobat ke Puskesmas Samata yaitu sebanyak 66 pasien. Sampel penelitian ini sebanyak 36 orang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan kuesioner yang berisi mengenai karakteristik umum pasien yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan jarak rumah ke pelayanan kesehatan. Informasi yang diperoleh disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil uji statistik spearman didapatkan bahwa ada hubungan antara usia ( $p = 0,000$ ) dengan tingkat kepatuhan berobat pasien TB. Namun, pada penelitian ini tidak terdapat hubungan jenis kelamin ( $p = 0,453$ ), pekerjaan ( $p = 0,310$ ), pendidikan ( $p = 0,785$ ), penghasilan ( $p = 0,478$ ) serta jarak rumah ke pelayanan kesehatan ( $p = 0,795$ ) dengan kepatuhan berobat pasien TB.

**Kata Kunci:** *karakteristik, kepatuhan berobat, tuberkulosis*

## ABSTRACT

Name : KURNIAWAN JAMALUDDIN  
NIM : 70100114051  
Department : PHARMACY  
Title : DESCRIPTION OF THE RATE OF COMPLIANCE IN  
TUBERCULOSIS PATIENTS IN PUSKESMAS SAMATA  
KECAMATAN, SOMBA OPU GOWA DISTRICT

---

The incidence of tuberculosis (TB) in Gowa Regency is still a priority health problem especially in the Samata region. Samata Health Center is a health center in Somba Opu Subdistrict which has the highest incidence of TB, the success rate in 2015 to 2016 has increased. This research was conducted at Samata Health Center, Somba Opu District, Gowa Regency. This study aims to describe the level of compliance of tuberculosis patients in conducting treatment and to know the relationship between the characteristics of patients and the level of patient compliance with tuberculosis treatment. This study was descriptive observational with a cross sectional design, and was analyzed by spearman, Pearson and eta squared statistical tests. The study population was all pulmonary TB patients who were treated at the Samata Health Center as many as 66 patients. The sample of this study was 36 people. This study uses an interview method with a questionnaire that contains the general characteristics of patients, namely gender, age, education, occupation, income and distance of home to health services. Information obtained is delivered in the form of tables and narratives. The results of the Spearman statistical test showed that there was a relationship between age ( $p = 0,000$ ) and the level of adherence to treatment for TB patients. However, in this study there was no sex relationship ( $p = 0.453$ ), occupation ( $p = 0.310$ ), education ( $p = 0.785$ ), income ( $p = 0.478$ ) and distance of home to health care ( $p = 0.795$ ) with treatment compliance TB patients.

**Keywords:** *characteristics, adherence to treatment, tuberculosis*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Penduduk dunia pada tahun 2013 sejumlah kurang lebih 9 juta telah terinfeksi kuman tuberkulosis (WHO, 2014), serta mengalami peningkatan mencapai 9,6 juta pada tahun 2014 (WHO, 2015). Wilayah Afrika merupakan wilayah dengan angka kejadian TB paru paling banyak pada tahun 2014 yaitu sebesar 37%, wilayah Asia Tenggara sebesar 28%, dan wilayah Mediterania Timur sebesar 17% (WHO, 2015).

Indonesia merupakan 5 besar dengan kasus baru terbanyak setelah India, Cina, Nigeria dan Afrika Selatan yaitu 0.4 juta - 0.5 juta jiwa (WHO, 2013). Menurut WHO (2014) estimasi kematian akibat kasus tuberkulosis di Indonesia adalah 25 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2013 dengan range 14-37 orang. Adapun perkiraan kasus baru penderita Tuberkulosis adalah 125-299 per 100.000 penduduk per tahun (WHO, 2013).

Prevalensi TB Paru di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami peningkatan kasus pada tahun 2007 dan 2013 dengan persentase 0,3%. Walaupun masih berada di bawah persentase nasional (0,4%), namun masih dianggap perlu adanya penanggulangan terhadap penambahan kasus setiap tahun (Balitbangkes, 2013). Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah penderita TB Paru BTA Positif di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 masih tinggi yaitu 8.859 kasus. Berdasarkan seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Kota Makassar menduduki peringkat pertama dengan jumlah penderita TB Paru BTA Positif sebanyak 1.866

kasus, menyusul Kabupaten Gowa sebanyak 722 kasus dan Kabupaten Bone sebanyak 587 kasus (Dinkes Provinsi Sulsel, 2014).

Kemudian, data Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Pada tahun 2014 jumlah kasus yang positif terkena penyakit Tuberkulosis ada sebanyak 1021 kasus. Mengalami penurunan pada tahun 2015 jumlah kasus Positif Tuberkulosis sebanyak 1016 kasus dan meningkat drastis menjadi 1229 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Pallangga sebesar 15,12 persen, Kecamatan Bajeng sebesar 9,55 persen, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya kejadian kasus penyakit Tuberkulosis di tiga kecamatan tersebut yaitu pada tahun 2016 jumlah kasus kejadian penyakit Tuberkulosis adalah sebanyak 194 kasus di kecamatan Somba Opu, disusul Kecamatan Palangga sebanyak 134 kasus dan di kecamatan Bajeng sebanyak 94 kasus (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2016).

Penyakit TB ini masih menjadi kasus yang perlu diperhatikan penanggulangannya, sehingga untuk mengoptimalkannya dibuatlah sebuah standar pedoman Penanggulangan TB Nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kemudian menjadi acuan (guideline) bagi para tenaga kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Indonesia, salah satunya adalah "Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa". Program tersebut memiliki fokus dalam penemuan dan penyembuhan pasien sehingga akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian akan menurunkan angka kejadian TB di masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2014).

Pada puskesmas ini, para pasien akan masuk dan menerima pengobatan sesuai dengan prosedur berdasarkan standar pedoman. Mereka rerata merupakan pasien yang tergolong dalam suspek TB terlebih dahulu, kemudian selanjutnya menjalani uji mikroskopis dan diagnosis untuk penentuan status kasus TB dan pemilihan OAT yang harus mereka terima. Umumnya pasien yang terinfeksi bakteri TB dapat menularkan penyakitnya melalui kontak intensif (dalam keluarga) dan kontak pasif (lingkungan), oleh sebabnya faktor yang memungkinkan seseorang terkontaminasi oleh kuman TB ditentukan oleh lamanya dia berada pada lokasi terkontaminasi tersebut (Priyanto, 2009).

Selain itu, mayoritas pasien yang masuk untuk menjalani perawatan di puskesmas ini merupakan pasien TB status kasus baru, yaitu yang belum terpapar TB sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) mayoritas belum pernah mengonsumsi OAT, sehingga hal tersebut membuat pasien memulai pengobatannya dari awal. Pasien yang diberikan OAT akan menjalani pengobatan selama tepat 6 bulan atau lebih sebelum kemudian dinyatakan sembuh berdasarkan standar kesembuhan untuk TB.

Pasien yang masuk untuk berobat pun berusia variatif, mulai dari anak-anak, usia dewasa produktif hingga dari golongan usia senja, namun penderita yang paling banyak adalah dari golongan usia produktif (17-54) (Wibisono, 2010). Pada usia tersebut tergolong pada kelompok sumber daya manusia yang penting, sehingga apabila penderita TB Paru diusia ini tidak ditemukan atautkah diobati

maka akan menjadi penyebab peningkatan insidensi, prevalensi, mortalitas TB dan penurunan angka harapan hidup.

Penekanan dan pemberantasan terkait dengan tingkat keberhasilan pengobatan TB bisa ditentukan dari hasil pengobatan seorang pasien yakni persentase kesembuhan, sehingga dengan demikian pencatatan hasil pengobatan perlu dilakukan. Berkembang atau tidaknya penyakit secara klinik setelah infeksi mungkin dipengaruhi oleh umur, banyaknya penyakit penyerta kronik yang diderita, jenis kelamin, hingga lama pengobatan, sehingga faktor-faktor tersebut mungkin berperan terhadap hasil pengobatan seorang pasien nantinya. Dalam upaya untuk mencapai kesembuhan, salah satunya juga dapat terealisasi dengan penggunaan OAT yang sesuai dengan Standar Pedoman Nasional oleh pasien-pasien yang menjalani pengobatan TB.

Atas semua dasar tersebut diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait gambaran tingkat kepatuhan berobat pada pasien penyakit Tuberkulosis Paru yang dirawat di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang mencakup karakteristik kepatuhan berobat pasien serta yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan jarak rumah ke tempat pelayanan kesehatan.

### ***B.Rumusan Masalah***

1. Bagaimana gambaran tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien Tuberkulosis di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?



2. Adakah hubungan antara karakteristik pasien dengan tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis dalam menjalani pengobatan di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

### ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Defenisi Operasional**

- a. Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular disebabkan oleh kuman tuberkulosis (*Mycobacterium tuberculosis*) umumnya menyerang paru, tetapi bisa juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan persendian, usus, ginjal dan organ tubuh lainnya (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2012).
- b. Kepatuhan adalah suatu perilaku positif penderita dalam mencapaitujuan terapi (Degresi, 2005)
- c. Gambaran adalah uraian, keterangan, penjelasan yang menyangkut sesuatu hal (KBBI)
- d. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung (UU no 29, 2004).
- e. Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakatan yang sangat penting yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian terkait gambaran tingkat kepatuhan berobat pada pasien tuberkulosis ini merupakan bagian dalam penelitian non-eksperimental dengan

mengambil data melalui kuesioner pada pasien Tuberkulosis Paru yang kemudian diolah secara deskriptif.

#### ***D. Tujuan Penelitian***

1. Mengetahui gambaran tingkat kepatuhan pasien Tuberkulosis dalam melakukan pengobatan di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
2. Mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan Tuberkulosis di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

#### ***E. Kajian Pustaka***

1. Penelitian sebelumnya Indah Permata, Kajian Kepatuhan Dan Faktor-Faktor Yang Mendukung Kepatuhan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Paru Di Rs. Khusus Paru Respira (Bp4) Upkpm Minggiran. Penelitian ini melibatkan 40 pasien TB dimana keseluruhan pasien telah menggunakan Fix Dose Combination (FDC) sebagai Obat Anti Tuberkulosis (OAT) selama pengobatan. Sebanyak 36 pasien (90%) dinyatakan memiliki kepatuhan tinggi. Sebanyak 3 pasien (7,5%) dinyatakan memiliki kepatuhan yang berubah-ubah, dan satu pasien (2,5%) dinyatakan tidak patuh. Secara umum kepatuhan pasien di BP4 UPKPM Minggiran cukup tinggi dikarenakan banyak faktor pendukung yang berperan, yakni adanya pengawas menelan obat yang berasal dari keluarga pasien (100%), System, dan pelayanan dari penyedia layanan kesehatan (tersedianya pojok DOTS, waktu tunggu singkat, dan tenaga kesehatan yang kooperatif dan

informatif), serta bentuk OAT yang digunakan sudah berbentuk FDC (100%).

2. Penelitian sebelumnya oleh Lely Manuhara pada tahun 2012 meneliti mengenai evaluasi tingkat kepatuhan penggunaan obat tuberkulosis paru pada programmed management on drug resistant tuberkulosis di puskesmas kota Surakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 25 pasien (83,34%) memiliki kepatuhan tinggi, 4 pasien (13,3%) memiliki kepatuhan sedang, dan 1 pasien (3,3%) kepatuhannya rendah, faktor dominan yang mempengaruhi yaitu faktor dukungan petugas kesehatan yang memberikan informasi tentang pengobatan yang dijalani pasien (78,9%). Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal tempat, waktu, tujuan dan analisa hasil penelitian.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Yamin Darsyah (2014). Tuberkulosis (TBC atau TB) adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh basil tahan asam disingkat BTA dengan nama lengkap bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. TBC menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia sehingga perlu penanganan khusus dalam pencegahan TBC. Data Kesehatan di Kota Semarang menunjukkan TBC menjadi salah satu kontributor terbesar dalam kejadian luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit TBC antara lain faktor lingkungan, jenis pekerjaan, status sosial, kebiasaan merokok dan minuman keras. Dalam menganalisis klasifikasi kasus pasien TBC terinfeksi atau tidak terinfeksi maka digunakan pendekatan Supports Vector Machine

(SVM) dan Regresi logistik. Hasil menunjukkan SVM mampu mengukur ketepatan klasifikasi dengan akurasi lebih tinggi. Hasil akurasi yang diperoleh SVM dengan fungsi kernel RBF sebesar 98%.

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan berobat pasien setelah mengetahui hasil dari evaluasi kepatuhan dan faktor apa saja yang berpengaruh pada kepatuhan pasien dalam pengobatan TB.
2. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pasien & masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pasien dalam menjalani regimen pengobatan.
3. Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai tingkat kepatuhan serta faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pada pasien TB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Tuberkulosis***

##### **1. Definisi Tuberkulosis**

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi akut atau kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberkulosis* (KemenKes, 2014). Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara (pernafasan) ke dalam paru-paru, kemudian kuman tersebut menyebar dari paru-paru ke organ tubuh yang lain melalui darah, kelenjar limfe, saluran pernafasan, penyebaran langsung ke organ tubuh lain (Somantri, 2008).

##### **2. Epidemiologi**

Pada tahun 2014 penderita TB di dunia telah mencapai angka 9,6 juta dengan perbandingan 3,2 juta diderita oleh wanita, 5,4 juta diderita oleh pria dan 1 juta diderita oleh anak-anak. Dilaporkan bahwa terdapat 3 negara dengan penderita TB terbanyak dibandingkan dengan negara lainnya dengan presentase China (23%), India (10%), Indonesia (10%). Dari semua kasus TB di dunia ditemukan 480.000 ribu kasus Multi Drug Resistance (MDR) (WHO, 2015).

Angka case Notification Rate (CNR) menunjukkan jumlah seluruh pasien TB di Indonesia sejak tahun 1999 cenderung meningkat, namun CNR mengalami stagnansi dalam 4 tahun terakhir (2011-2014). Angka keberhasilan pengobatan/Treatment Success Rate (TSR) paru menunjukkan bahwa keberhasilan pengobatan TB paru di Indonesia telah mencapai angka 74%. Provinsi papua merupakan Provinsi dengan TSR terendah dengan angka 24%,

selanjutnya Sumatera Utara 25 % , Jambi 31 % , Yogyakarta 44 % dan tingkat TSR tertinggi terdapat di Gorontalo dengan TSR 96 % (InfoDatin, 2015).

### 3. Patogenesis

Tuberkulosis (TB) disebabkan oleh kuman dari kelompok *Mycobacterium* yaitu *Mycobacterium tuberculosis*. Terdapat beberapa spesies *Mycobacterium*, antara lain : *M. tuberculosis*, *M. africanum*, *M.bovis*, *M.leprae*, dan sebagainya yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Sifat kuman TB secara umum antara lain adalah sebagai berikut (Depkes RI, 2014) :

- a. Berbentuk batang dengan panjang 1–10 mikron, lebar 0,2–0,6 mikron.
- b. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl Neelsen.
- c. Memerlukan media khusus untuk biakan, antara lain Lowenstein Jensen, Ogawa.
- d. Kuman nampak berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop.
- e. Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 40°C sampai dengan minus 70°C.
- f. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar ultraviolet.
- g. Paparan langsung terhadap sinar ultraviolet menyebabkan sebagian besar kuman akan mati dalam waktu beberapa menit.
- h. Dalam dahak pada suhu antara 30 – 37°C akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu.
- i. Kuman dapat bersifat dormant (“tidur”/tidak berkembang).

Infeksi primer TB paru dimulai oleh implantasi alveolar dari organisme (*Mycobacterium tuberculosis*) dalam droplet berukuran cukup kecil yaitu 1-5 mm. Ukuran yang kecil berguna untuk menghindari silia sel epitel dari saluran pernapasan bagian atas sehingga organisme dapat mencapai permukaan alveolar. Organisme kemudian dapat berkembang biak setelah menempel pada permukaan alveoli. Peristiwa tersebut memicu datangnya makrofag di paru – paru untuk mencerna dan mengeliminasi organisme. Makrofag akan diaktivasi oleh sel limfosit CD4 melalui sekresi interferon gamma. Sejumlah besar makrofag yang teraktivasi mengelilingi kaseosa padat dari daerah nekrotik sebagai bagian dari imunitas yang dimediasi oleh sel. Apabila seseorang memiliki kekebalan tubuh yang baik, bakteri yang akan menginfeksi dapat dieliminasi oleh sel – sel makrofag. Namun sebaliknya, bakteri dapat berkembang biak dan memperbanyak diri ketika seseorang tidak memiliki kekebalan tubuh yang cukup baik. Sel – sel makrofag akhirnya pecah dan bakteri akan melepaskan banyak basil (Dipiro et al., 2009).

#### **4. Klasifikasi**

Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien bermanfaat dan bertujuan untuk menentukan paduan pengobatan yang sesuai, registrasi kasus secara benar, standardisasi proses dan pengumpulan data, menentukan prioritas pengobatan TB, analisis kohort hasil pengobatan, dan memonitor kemajuan dan mengevaluasi efektivitas program secara akurat baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, regional maupun dunia (Depkes RI, 2011).

Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB berdasarkan Pedoman Pengendalian Tuberkulosis yang dikeluarkan oleh Depkes RI tahun 2011 memerlukan suatu “definisi kasus” yang meliputi 4 hal, yaitu berdasarkan lokasi atau organ tubuh yang sakit, bakteriologi (hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis), riwayat pengobatan TB sebelumnya, dan status HIV pasien.

a. Klasifikasi berdasarkan organ tubuh (anatomical site) yang terkena:

1. Tuberkulosis paru, adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan (parenkim) paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus.
2. Tuberkulosis ekstraparu adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung (perikardium), kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain – lain. Pasien dengan TB paru dan TB ekstraparu diklasifikasikan sebagai TB paru.

b. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, keadaan ini terutama ditujukan untuk TB paru sebagai berikut :

1. Tuberkulosis paru BTA positif.

Pasien termasuk dalam kategori ini apabila:

- a) Sekurang – kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS (Sewaktu-Pagi-Sewaktu) hasilnya BTA positif.
- b) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan gambaran tuberkulosis.
- c) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB positif.



d) Satu atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT.

## 2. Tuberkulosis paru BTA negatif

Pasien dikategorikan ke dalam kasus tuberkulosis paru BTA negatif apabila tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif. Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi :

- a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif.
  - b) Foto toraks abnormal sesuai dengan gambaran tuberkulosis.
  - c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT, bagi pasien dengan HIV negatif.
  - d) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan.
- c. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya :

1. Kasus baru, adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan (4 minggu). Hasil pemeriksaan BTA dapat positif atau negatif.
2. Kasus yang sebelumnya diobati :
  - a) Kasus kambuh (*relaps*), adalah pasien TB yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan TB dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, namun ketika dilakukan diagnosis kembali, hasilnya menunjukkan BTA positif (apusan atau kultur).
  - b) Kasus setelah putus berobat (*default*), adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat selama 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.

- c) Kasus setelah gagal (*failure*), adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan.
3. Kasus pindahan (*transfer In*), adalah pasien yang dipindahkan ke register lain untuk melanjutkan pengobatannya.
4. Kasus lain, adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas, seperti : tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya, pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya, dan kembali diobati dengan hasil BTA negatif.

Tuberkulosis paru BTA negatif dan tuberkulosis ekstraparu, dapat juga mengalami kambuh, gagal, *default*, maupun menjadi kasus kronik. Meskipun sangat jarang, harus dibuktikan secara patologik, bakteriologik (biakan), radiologik, dan pertimbangan medis spesialistik. Tuberkulosis dapat pula diklasifikasikan sebagai berikut (Punnoose *et al.*, 2013) :

- a. Tuberkulosis aktif, menggambarkan infeksi yang sedang berlangsung dimana seseorang mengalami gejala dan memiliki hasil positif (abnormal) pada tes TB.
- b. Tuberkulosis laten, terjadi ketika seseorang tanpa gejala memiliki hasil positif TB pada tes kulit atau tes darah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah terinfeksi TB di masa lalu namun bakteri dalam keadaan *dormant* atau tidak aktif.
- c. *Multidrug Resistant TB* (MDR TB), adalah bentuk TB aktif yang disebabkan oleh bakteri yang tidak merespon obat yang paling umum digunakan untuk mengobati TB.

## 5. Gejala Klinis

Berdasarkan Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia tahun 2011, gejala klinis yang menandakan infeksi TB adalah sebagai berikut :

### a. Gejala utama

Batuk berdahak selama 2 - 3 minggu atau lebih.

### b. Gejala tambahan

Batuk sebagai gejala utama dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam meriang lebih dari satu bulan.

Pada saat diagnosis, orang dengan TB biasanya memiliki berbagai gejala seperti demam ringan, batuk terus-menerus dengan sputum (dahak), berkeringat di malam hari, dan penurunan berat badan yang tidak disengaja (Punnoose., 2013).

Tanda dan gejala yang umumnya diderita oleh pasien TB adalah berat badan menurun, mudah lelah, batuk terus menerus, demam, dan berkeringat di malam hari (Dipiro et al., 2009).

## 6. Cara Penularan

Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dibawa dalam partikel udara yang disebut droplet nuklei dengan diameter berukuran 1 hingga 5 mikron. Droplet nuklei menular dihasilkan ketika seorang pasien TB batuk, bersin, atau berteriak. Partikel kecil tersebut dapat tetap bertahan di udara selama beberapa jam sehingga memungkinkan bakteri untuk ditransmisikan kepada orang lain. Proses tersebut tergantung dari kondisi lingkungan di sekitar, apabila kondisi lingkungan

mendukung untuk terjadinya transmisi, maka bakteri dapat dengan mudah menular. Penularan terjadi ketika seseorang menghirup droplet nuklei yang mengandung *Mycobacterium tuberculosis* dan droplet melintasi mulut atau hidung, saluran pernapasan bagian atas, dan bronkus untuk mencapai alveoli paru-paru.

Adapun faktor yang mempengaruhi kemungkinan transmisi *Mycobacterium tuberculosis* yaitu kekebalan tubuh dari individu yang terpapar, jumlah basil tuberkulum yang dieliminasi melalui mekanisme batuk atau bersin oleh pasien TB, faktor lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi dari organisme bakteri, dan jarak, frekuensi serta durasi paparan. Semakin lama durasi paparan, maka semakin tinggi risiko penularan. Begitu pula dengan semakin tingginya frekuensi paparan dan jarak paparan yang semakin dekat dapat meningkatkan transmisi (CDC, 2013).

Penemuan penderita Tuberkulosis dilakukan secara pasif, artinya penjarangan tersangka penderita dilaksanakan pada mereka yang datang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan. Penemuan secara pasif tersebut didukung dengan penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat, untuk meningkatkan cakupan penemuan tersangka penderita. Cara ini biasa dikenal dengan sebutan Passive Case Finding. Selain itu semua kontak penderita Tuberkulosis Paru BTA positif dengan gejala sama harus diperiksa dahaknya. Seorang petugas kesehatan diharapkan menemukan tersangka penderita sedini mungkin, mengingat Tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian. Semua tersangka penderita harus diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari berturut-turut, yaitu SPS (Dep Kes RI, 2008).

## 7. Diagnosis

Diagnosis TB paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB. Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto toraks, pemeriksaan biakan dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya. Selain itu, tidak dibenarkan melakukan diagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks karena tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis (Depkes RI, 2011). Diagnosis TB paru meliputi :

### a. Pemeriksaan dahak mikroskopis

Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 contoh uji dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa dahak Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) :

S (Sewaktu) : dahak ditampung pada saat terduga pasien TB datang berkunjung pertama kali ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Pada saat pulang, terduga pasien membawa sebuah pot dahak untuk menampung dahak pagi pada hari kedua.

P (Pagi) : dahak ditampung di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di fasyankes.

S (Sewaktu) : dahak ditampung di fasyankes pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi.

#### b. Pemeriksaan biakan

Pemeriksaan biakan dan identifikasi *Mycobacterium tuberculosis* pada pengendalian TB adalah untuk menegakkan diagnosis pasti TB pada pasien tertentu, misal pasien TB ekstraparu, pasien TB anak, dan pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis langsung BTA negatif.

Pemeriksaan tersebut dilakukan jika keadaan memungkinkan dan tersedia laboratorium yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.

#### c. Uji kepekaan obat TB

Uji kepekaan obat bertujuan untuk menentukan ada tidaknya resistensi *Mycobacterium tuberculosis* terhadap OAT. Untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan, uji kepekaan obat tersebut harus dilakukan oleh laboratorium yang telah tersertifikasi atau lulus uji pemantapan mutu/ Quality Assurance (QA). Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan dalam menetapkan jenis resistensi OAT dan pengambilan keputusan paduan pengobatan pasien kebal obat.

### **8. Pengobatan Pasien TB**

(Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (PNPT), 2014).

#### a. Tujuan Pengobatan

1. Menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktifitas serta kualitas hidup.
2. Mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak buruk selanjutnya.
3. Mencegah terjadinya kekambuhan TB.
4. Menurunkan penularan TB.
5. Mencegah terjadinya dan penularan TB resisten obat

## b. Prinsip Pengobatan

Obat Anti Tuberkulosis (OAT) adalah komponen terpenting dalam pengobatan TB. Pengobatan TB adalah salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari kuman TB. Dengan prinsip :

1. Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya.
2. Diberikan dalam dosis yang tepat.
3. Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO (Pengawas Menelan Obat) sampai selesai pengobatan.
4. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan.

## c. Tahap Pengobatan

(Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (PNPT), 2014).

Pengobatan TB harus selalu meliputi tahap awal dan tahap lanjutan dengan maksud :

1. Tahap Awal yaitu pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Pada umumnya, dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu.

2. Tapap Lanjutan yaitu tahap yang penting untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh khususnya kuman persister sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan.

d. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

1. Isoniazid (H)

Isoniazid dikenal dengan INH, bersifat tuberkulostatik dan tuberkulosid dengan KHM (kadar hambat minimum) sekitar 0,025-0,05 µg/ mL. Efek bakterisidnya hanya terlihat pada kuman yang sedang tumbuh aktif. Mekanisme kerja isoniazid belum diketahui, namun ada pendapat bahwa efek utamanya adalah menghambat biosintesis asam mikolat (mycolic acid) yang merupakan unsur penting penyusun dinding sel mikobakterium (Istiantoro, Setiabudy, 2009). Dosis harian yang dianjurkan 5 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 10 mg/kg BB (Depkes RI, 2002).

Efek samping INH yang ringan dapat berupa tanda-tanda keracunan pada saraf tepi, kesemutan dan nyeri otot atau gangguan kesadaran. Efek ini dapat dikurangi dengan pemberian piridoksin (vitamin B6 dengan dosis 5-10 mg perhari atau dengan vitamin B kompleks). Kelainan yang menyerupai defisiensi piridoksin (syndroma pellagra), dan kelainan kulit yang bervariasi, antara lain gatal-gatal. Bila terjadi efek samping ini, pemberian OAT dapat diteruskan sesuai dosis (Depkes RI, 2002).

Efek samping berat dari INH berupa hepatitis yang dapat timbul pada kurang lebih 0,5 % penderita. Bila terjadi ikterus, hentikan pengobatan sampai



ikterus membaik. Bila tanda-tanda hepatitisnya berat maka penderita harus dirujuk ke UPK (unit pelayanan kesehatan) spesialisik (Depkes RI, 2002).

## 2. Rifampisin (R)

Rifampisin bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman semidormant (persister) yang tidak dapat dibunuh oleh isoniazid. Rifampisin terutama aktif terhadap sel yang sedang tumbuh. Kerjanya menghambat DNA-dependent RNA polymerase dari mikobakteria dan mikroorganisme lain dengan menekan mula terbentuknya rantai dalam sintesis RNA (Istiantoro, Setiabudy, 2009). Dosis rifampisin 10 mg/kg BB diberikan untuk pengobatan harian maupun intermiten 3 kali seminggu (Depkes RI, 2002).

Efek samping rifampisin yang ringan dapat berupa sindrom kulit (gatal gatal kemerahan), sindrom flu (demam, menggigil, nyeri tulang), sindrom perut (nyeri perut, mual, muntah, kadang-kadang diare). Efek Samping ringan sering terjadi pada saat pemberian berkala dan dapat sembuh sendiri atau hanya memerlukan pengobatan simptomatik. Rifampisin dapat menyebabkan warna merah pada air seni, keringat, air mata dan air liur. Hasil ini harus diberitahukan kepada penderita agar penderita tidak khawatir. Warna merah tersebut terjadi karena proses metabolisme obat dan tidak berbahaya (Depkes RI, 2002).

Efek samping rifampisin yang berat berupa sindrom respirasi yang ditandai dengan sesak napas, kadang-kadang disertai dengan kolaps, anemia haemolitik yang akut, syok dan gagal ginjal. Bila salah satu dari gejala ini terjadi, rifampisin harus segera dihentikan dan jangan diberikan lagi meskipun gejalanya

sudah menghilang. Sebaiknya segera dirujuk ke UPK spesialisik (Depkes RI, 2002).

### 3. Pirazinamid (Z)

Pirazinamid bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang berada dalam sel dengan suasana asam. Mekanisme kerja obat ini belum diketahui secara pasti. Dosis harian yang dianjurkan 25 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 35 mg/kg BB (Depkes RI, 2002).

Efek samping utama dari penggunaan pirazinamid adalah hepatitis. Juga dapat terjadi nyeri sendi dan kadang-kadang dapat menyebabkan serangan arthritis gout yang kemungkinan disebabkan berkurangnya ekskresi dan penimbunan asam urat, kadang-kadang terjadi reaksi hipersensitivitas misalnya demam, mual, kemerahan dan reaksi kulit yang lain (Depkes RI, 2002).

### 4. Etambutol (E)

Etambutol bersifat sebagai bakteriostatik. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pemasukan (incorporation) asam mikolat kedalam dinding sel bakteri (Istiantoro, Setiabudy, 2009). Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB sedangkan untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis 30 mg/kg BB (Depkes RI, 2002).

Etambutol dapat menyebabkan gangguan penglihatan berupa berkurangnya ketajaman penglihatan, buta warna untuk warna merah dan hijau. Meskipun demikian keracunan okuler tersebut tergantung pada dosis yang

dipakai. Efek samping jarang terjadi bila dosisnya 15-25 mg/kg BB per hari atau 30 mg/kg BB yang diberikan tiga kali seminggu (Depkes RI, 2002).

Setiap penderita yang menerima etambutol harus diingatkan bahwa bila terjadi gejala-gejala gangguan penglihatan supaya segera dilakukan pemeriksaan mata. Gangguan penglihatan akan kembali normal dalam beberapa minggu setelah obat dihentikan. Karena risiko kerusakan okuler sulit dideteksi pada anak-anak, maka etambutol sebaiknya tidak diberikan pada anak (Depkes RI, 2002).

#### 5. Streptomisin

Streptomisin bersifat bakterisid dengan mekanisme kerja menghambat sintesis protein sel mikroba, yaitu mengubah bentuk bagian 30 S sehingga mengakibatkan salah baca kode mRNA (Istiantoro, Setiabudy, 2009). Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB sedangkan untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis yang sama. Penderita berumur sampai 60 tahun dosisnya 0,75 gram/ hari sedangkan untuk berumur 60 tahun atau lebih diberikan 0,50 gram/ hari (Depkes RI, 2002).

Efek samping utama dari streptomisin adalah merusakkan syaraf kedelapan yang berkaitan dengan keseimbangan dan pendengaran. Risiko efek samping tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan dosis yang digunakan dan umur penderita. Kerusakan alat keseimbangan biasanya terjadi pada 2 bulan pertama dengan tanda-tanda telinga mendenging (tinitus), pusing dan kehilangan keseimbangan. Keadaan ini dapat dipulihkan bila obat segera dihentikan atau dosisnya dikurangi menjadi 0,25 g, jika pengobatan diteruskan maka kerusakan alat keseimbangan makin parah dan menetap (kehilangan keseimbangan dan tuli).

Risiko ini terutama akan meningkat pada penderita dengan gangguan fungsi ekskresi ginjal. Reaksi hipersensitivitas kadang-kadang terjadi berupa demam yang timbul tiba-tiba disertai dengan sakit kepala, muntah dan eritema pada kulit. Hentikan pengobatan dan segera rujuk penderita ke UPK spesialisik (Depkes RI, 2002).

Efek samping sementara dan ringan misalnya reaksi setempat pada bekas suntikan, rasa kesemutan pada sekitar mulut dan telinga yang mendenging dapat terjadi segera setelah suntikan. Bila reaksi ini mengganggu (jarang terjadi) maka dosis dapat dikurangi menjadi 0,25 g. Streptomisin dapat menembus barrier plasenta sehingga tidak boleh diberikan pada wanita hamil sebab dapat merusak saraf pendengaran janin.

Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia merupakan rekomendasi dari WHO dan IUATLD (Internatioal Union Against Tuberculosis and lung Disease). Paduan OAT disediakan dalam bentuk paket berupa obat Kombinasi Dosis Tetap (OAT KDT). Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien dalam satu masa pengobatan (Depkes RI, 2008).

(Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (PNPT), 2014).

**Tabel 1. OAT Lini Pertama**

<b>Jenis</b>	<b>Sifat</b>	<b>Efek samping</b>
Isoniazid	Bakterisidal	Neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan fungsi hati, kejang
Rifampisin	Bakterisidal	Flu sindrome, gangguan gastrointetinal, urine berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopeni, demam, skinrash, sesak nafas, anemia hemolitik

Pirazinamid	Bakterisidal	Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, gout artritis
Streptomisin	Bakterisidal	Nyeri ditempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia, agranulositosis, trombositopeni
Etambutol	Bakteriostatik	Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer

**Tabel 2. Kisaran Dosis OAT Lini Pertama Pasien Dewasa**

OAT	DOSIS			
	Harian		3x / minggu	
	Kisaran dosis (mg/kg BB)	Maksimum (mg)	Kisaran dosis (mg/kg BB)	Maksimum/hari (mg)
Isoniazid	5 ( 4 – 6 )	300	10 ( 8 – 12 )	900
Ripamfisn	10 ( 8 – 12 )	600	10 ( 8 – 12 )	600
Pirazinamid	25 ( 20 – 3 )	-	35 ( 30 – 40 )	-
Etambutol	15 ( 15 – 20 )	-	30 ( 25 – 35 )	-
Streptomisin	15 ( 12 – 18 )	-	15 ( 12 – 18 )	1000

**Tabel 3. OAT yang digunakan dalam Pengobatan TB MDR**

Jenis	Sifat	Efek samping
<b>Golongan 1 : OAT Lini pertama oral</b>		
Pirazinamid	Bakterisidal	Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, gout artritis
Etambutol	Bakteriostatik	Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer
<b>Golongan 2 : OAT Suntikan</b>		
Kanamycin (Km)	Bakterisidal	Km, Am, Cm memberikan efek samping seperti streptomycin
Amikacin (Am)	Bakterisidal	
Capreomycin (Cm)	Bakterisidal	

<b>Golongan 3 : Fluorokuinolon</b>		
Levofloksasin	Bakterisidal	Mual, muntah, sakit kepala, pusing, sulit tidur
Moksifloksasin	Bakterisidal	Mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri sendi
<b>Golongan 4 : OAT Lini Kedua Oral</b>		
Para-aminosalicylic acid (PAS)	Bakteriostatik	Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati dan pembekuan darah
Cycloserine	Bakteriostatik	Gangguan ssp, sulit konsentrasi dan lemah, depresi, psikosis, neuropati perifer
Ethionamide	Bakterisidal	Gangguan gastrointestinal, anoreksia, gangguan fungsi hati, jerawat, rambut rontok, ginekomasti, gangguan siklus menstruasi
<p><b>Golongan 5</b> : obat yang masih belum jelas manfaatnya dalam pengobatan TB resisten obat Clofazimin, Linezolid, Amoxicillin, Thioacetazone, Cilastatin, Isiniazid dosis tinggi, Clarithromycin, Bedaquilin</p>		

Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia, Depkes RI tahun 2011 terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3

Paduan OAT terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), dan Etambutol (E). Regimen tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan (2HRZE) pada tahap intensif, sedangkan Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) diberikan setiap 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan (4(HR)3) pada tahap lanjutan. Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru :

- a. Pasien baru TB paru BTA positif

b. Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif

c. Pasien TB ekstra paru

**Tabel 4. Dosis untuk paduan OAT KDT kategori 1 (Depkes RI, 2011)**

Berat Badan (kg)	Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275)	Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150)
30 – 37	2 tablet 4 KDT	2 tablet 2 KDT
38 – 54	3 tablet 4 KDT	3 tablet 2 KDT
55 – 70	4 tablet 4 KDT	4 tablet 2 KDT
≥ 71	5 tablet 4 KDT	5 tablet 2 KDT

2. Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE) / 5(HR)3E3

Paduan OAT diberikan dengan regimen pengobatan sebagai berikut:

- a. Fase intensif diberikan selama 3 bulan yang terdiri dari 2 bulan dengan Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), dan Etambutol (E) dan suntikan Streptomisin setiap hari. Setelah itu dilanjutkan 1 bulan dengan Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), dan Etambutol (E) setiap hari.
- b. Fase lanjutan dilakukan selama 5 bulan dengan HRE yang diberikan tiga kali dalam seminggu. Perlu diperhatikan bahwa suntikan streptomisin diberikan setelah penderita selesai menelan obat.

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya yaitu pasien kambuh, pasien gagal, dan pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (default).

**Tabel 5. Dosis untuk paduan OAT KDT kategori 2 (Depkes RI, 2011)**

Berat Badan (kg)	Tahap intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275) + S		Tahap lanjutan 3 x seminggu selama 16 minggu RH (150/150) + E (275)
	Selama 56 hari	Selama 28 hari	Selama 20 minggu
30 – 37	2 tab 4 KDT + 500 mg Streptomisin injeksi	2 tab 4 KDT	2 tab 2 KDT + 2 tab Etambutol
38 – 54	3 tab 4 KDT + 750 mg Streptomisin injeksi	3 tab 4 KDT	3 tab 2 KDT + 3 tab Etambutol
55 – 70	4 tab 4 KDT + 1000 mg Streptomisin injeksi	4 tab 4 KDT	4 tab 2 KDT + 4 tab Etambutol
≥ 71	5 tab 4 KDT + 1000 mg Streptomisin injeksi	5 tab 4 KDT	5 tab 2 KDT + 5 tab Etambutol

### **B. Kepatuhan Pasien dan Teknik Analisa Data**

Secara umum, istilah kepatuhan (compliance atau adherence) dideskripsikan dengan sejauh mana pasien mengikuti instruksi-instruksi atau saran medis (Sabate, 2001; Düsing, Lottermoser & Mengden, 2001). Terkait dengan terapi obat, kepatuhan pasien didefinisikan sebagai derajat kesesuaian antara riwayat dosis yang sebenarnya dengan rejimen dosis obat yang diresepkan. Oleh karena itu, pengukuran kepatuhan pada dasarnya merepresentasikan perbandingan antara dua rangkaian kejadian, yaitu bagaimana nyatanya obat diminum dengan bagaimana obat seharusnya diminum sesuai resep (Düsing, Lottermoser, & Mengden, 2001). Dalam konteks pengendalian tuberkulosis, kepatuhan terhadap pengobatan dapat didefinisikan sebagai tingkat ketaatan pasien-pasien yang



memiliki riwayat pengambilan obat terapeutik terhadap resep pengobatan (WHO, 2003). Kepatuhan rata-rata pasien pada pengobatan jangka panjang terhadap penyakit kronis di negara maju hanya sebesar 50% sedangkan di negara berkembang, jumlah tersebut bahkan lebih rendah (WHO, 2003).

Kepatuhan (adherence) adalah perilaku patuh terhadap pengobatan yang membutuhkan kesediaan dari pasien dan membentuk sebuah aturan yang telah disepakati antara penyedia layanan kesehatan dengan pasien berdasarkan prinsip bahwa pasien harus menjadi mitra aktif dari tenaga kesehatan profesional dalam perawatan diri mereka sendiri. Selain itu, untuk menciptakan praktek klinis yang efektif harus terjadi komunikasi yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatan. Sedangkan kesesuaian (compliance) lebih kepada kepatuhan terhadap hal yang telah disampaikan penyedia layanan kesehatan secara sepihak tanpa persetujuan pasien (WHO, 2003). Namun ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa adherence dan compliance adalah kata lain dengan makna yang sama (McDonald, et al., 2002).

Tipe-tipe ketidakpatuhan pasien antara lain (University of South Australia, 1998):

1. Tidak meminum obat sama sekali.
2. Tidak meminum obat dalam dosis yang tepat (terlalu kecil atau besar).
3. Meminum obat untuk alasan yang salah.
4. Jarak waktu meminum obat yang kurang tepat.
5. Meminum obat lain di saat yang bersamaan sehingga menimbulkan interaksi obat.

Kepatuhan merupakan fenomena multidimensi yang ditentukan oleh lima dimensi yang saling terkait, yaitu faktor pasien, faktor terapi, faktor sistem kesehatan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi. Semua faktor adalah faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan sehingga tidak ada pengaruh yang lebih kuat dari faktor lainnya (WHO, 2003).

Untuk mencapai keberhasilan pengobatan, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pasien, namun harus dilihat bagaimana faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melengkapi pengobatannya dan mematuhi pengobatan mereka (WHO, 2003). Secara umum, hal-hal yang perlu dipahami dalam meningkatkan tingkat kepatuhan adalah bahwa (WHO, 2003) :

1. Pasien memerlukan dukungan, bukan disalahkan.
2. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap terapi jangka panjang adalah tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan kepatuhan pasien dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat.
4. Kepatuhan merupakan faktor penentu yang cukup penting dalam mencapai efektifitas suatu sistem kesehatan.
5. Memperbaiki kepatuhan dapat merupakan intervensi terbaik dalam penanganan secara efektif suatu penyakit kronis.
6. Sistem kesehatan harus terus berkembang agar selalu dapat menghadapi berbagai tantangan baru.

7. Diperlukan pendekatan secara multidisiplin dalam menyelesaikan masalah ketidakpatuhan.

Kepatuhan dapat diukur dengan menggunakan dua definisi, yaitu definisi yang berorientasi pada proses dan definisi yang berorientasi pada dampak pengobatan. Indikator-indikator yang berorientasi pada proses menggunakan variabel-variabel seperti penepatan janji untuk bertemu (antara dokter dan pasien) atau pengambilan obat digunakan sebagai ukuran kepatuhan. Sedangkan definisi definisi yang berorientasi pada dampak menggunakan hasil akhir pengobatan, seperti angka kesembuhan sebagai salah satu indikator keberhasilan pengobatan TB paru (WHO, 2003).

Dalam hal kepatuhan Carpenito L.j. (2000) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh positif sehingga penderita tidak mampu lagi mempertahankan kepatuhannya, sampai menjadi kurang patuh dan tidak patuh (Suparyanto, 2010).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diantaranya:

Tidak seorangpun mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang instruksi yang diberikan padanya. Ley dan Spelman tahun 1967 menemukan bahwa lebih dari 60% responden yang di wawancarai setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang instruksi yang diberikan kepada mereka. Kadang kadang hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional kesalahan dalam memberikan informasi lengkap, penggunaan istilah medis dan memberikan banyak instruksi yang harus diingat oleh penderita.

Menurut Stein 1986, tingkat pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif yang diperoleh secara mandiri, lewat tahapan-tahapan tertentu (Suparyanto, 2010).

Menurut Gunarso 1990 mengemukakan bahwa semakin tua umur seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berusia belasan tahun, dengan demikian dapat disimpulkan faktor umur akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang yang akan mengalami puncaknya pada umur tertentu dan akan menurun kemampuan penerimaan atau mengingat sesuatu seiring dengan usia semakin lanjut. Hal ini menunjang dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah (Suparyanto, 2010).

### ***C. Validasi dan Reliabilitas***

Untuk dapat digunakan sebagai instrumen pengumpul data, kuesioner harus disusun sedemikian rupa dan melalui suatu uji pendahuluan. Penyusunan kuesioner dilakukan sesuai tujuan yang akan diukur dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas atau kesahihan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan dengan menggunakan alat ukur yang sama pula (Siregar, 2008).

### ***D. Uraian Tentang Puskesmas***

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kementrian Kesehatan RI, 2014).

Puskesmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas berwenang untuk (Kementrian Kesehatan RI, 2008) :

1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerj asama dengan sektor lain terkait.
5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
6. Melaksanakan peningkatan pembangunan agar berwawasan kesehatan

7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan.
8. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan. Tetapi apabila di satu Kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (Desa atau Kelurahan atau RW). Masing-masing Puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.

Puskesmas adalah suatu pelaksanaan fungsional yang berfungsi sebagai alat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan meliputi Promotif (peningkatan kesehatan), Preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan terdepan yang berfungsi sebagai alat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu kerja tertentu.

### **E. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan**

Dalam Islam, manusia yang sakit dianjurkan untuk berobat kepada yang ahlinya. Obat yang dianjurkan oleh syariat islam ialah obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Sebagaimana sebuah hadist dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي  
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah dari Rasulullah beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga” (HR. Bukhari)

Ada pula sebuah hadist dalam riwayat imam muslim yang menjelaskan tentang memberikan obat atau pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ,  
فَإِذَا

أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ, بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. (HR. Muslim)

Dalil diatas memberikan pengertian bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah akan menurunkan obatnya. Kadang ada orang yang

menemukannya, ada juga yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha mencari obat yang sesuai ketika sakit menyimpannya. Namun sekarang sangat disayangkan di masa sekarang, terkadang seorang terjatuh pada kesalahan dalam mencari obat. Itu semua disebabkan karena lemahnya kesabaran dan kurangnya ilmu pengetahuan. Baik ilmu tentang agamanya, maupun ilmu tentang pengobatan. Karena kurang ilmu agama, sehingga berobat pun digunakan cara yang bertentangan dengan syariat. Bahkan ada pula yang menggunakan metode yang syirik dan kufur dalam pengobatan. Dan jika kurang ilmu pengetahuannya, maka akan menimbulkan kesalahan dalam pengobatan yang dapat berujung pada ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien adalah pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki penghasilan yang kurang atau rendah biasanya akan lebih mengutamakan kebutuhan primer dari pada pemeliharaan kesehatan seperti yang disampaikan Amira (2005) bahwa umumnya individu yang mempunyai penghasilan kurang menyebabkan kemampuan memperoleh status gizi menjadi kurang baik dan kurang seimbang sehingga berdampak pada menurunnya status kesehatan. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 216.

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)

Terjemahan :

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalil diatas bersifat umum, yang mencakup semua perkara. Kata *asa* yang diterjemahkan *bisa jadi* dan yang mengandung makna ketidakpastian, tentu saja



bukan dari sisi pengetahuan Allah karena tiada sesuatuyang tersembunyi atau tidak pasti bagi-Nya. Ketidakpastian adalah dari sisi manusia dalam arti bila seseorang menghadapi perintah Ilahi yang harus ia indahkan atau ketetapan-Nya yang tidak dapat ia elakkan, sedang hal-hal tersebut tidak menyenangkannya, ketika itu manusia hendaknya menanamkan rasa optimisme dalam jiwanya dan berkata bisa jadi dalam ketetapan yang tidak berkenan dihati itu ada sesuatu yang baik. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang sedang menikmati kebahagiaan hidup hendaknya pula tidak bergembira sampai batas lupa diri. Karena bisa jadi, dibalik yang disenangi itu ada mudharad. Nah, sikap semacam ini hanya bisa diraih bila manusia mengingatkan dirinya bahwa bisa jadi dibalik yang disenangi ada sesuatu yang disenangi ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan sebaliknya. Ini mengingatkan manusia agar berserah diri kepada Allah sekaligus mendorongnya untuk hidup seimbang, tidak kehilangan optimisme ketika ditimpa kesedihan dan sekaligus tidak larut dalam kegembiraan yang menjadikannya lupa daratan (Tafsir Al-Mishbah).

Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi kaum Muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Isra/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahan

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Al-Qur'an telah membebaskan kaum Muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka kembali menjadi umat yang terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Qur'an, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum Muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia, jika mau mengikuti Al-Qur'an dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan.

Sebaliknya jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri. Cukup pahit pengalaman kaum Muslimin akibat mengabaikan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah, tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah khilafiah yang kecil dan remeh, sedangkan masalah-masalah yang penting dan besar diabaikan.

Ayat ini juga mengingatkan kaum Muslimin bahwa bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang ingkar, syirik, dan munafik, Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian bagi diri mereka, karena setiap ajaran yang dibawa Al-Qur'an akan mereka tolak. Padahal, jika diterima, pasti akan menguntungkan mereka (Tafsir KEMENAG).

Seorang Muslim harus meyakini bahwa Islam senantiasa membawa petunjuk demi kebahagiaan umat manusia secara individu maupun bermasyarakat, baik di dunia dan di akhirat kelak. Tujuan pokok agama Islam adalah untuk menjaga/memelihara beberapa hal seperti agama, akal, jiwa, kehormatan dan juga kesehatan. Terkait dengan kesehatan, Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga diri dengan berusaha dari hal yang bisa menganiaya diri sendiri. Karena kehidupan yang sehat secara jasmani merupakan modal tiap umat untuk melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Terkait dengan makananpun telah diatur dalam Al-Qur'an yang harus memenuhi dua perkara yaitu "halal" dan "baik". Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah/2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Terjemahan:

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Berdasarkan tafsir (Al-Mishbah), Allah SWT menyiapkan bumi untuk manusia, mukmin atau kafir. Tidak semua yang ada didunia otomatis halal digunakan atau dimakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Dengan demikian tidak semua yang ada dibumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Perlu digarisbawahi bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman wahai orang-orang kafir,

makanlah yang halal bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimental secara deskriptif observasional.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Ditinjau dari waktu pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yaitu penelitian yang diadakan dalam waktu bersamaan tapi dengan subjek yang berbeda-beda (Arikunto, 2006).

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien yang didiagnosis Tuberkulosis Paru dan melakukan rawat jalan di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

##### **2. Sampel**

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah semua populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel dengan metode probably sampling dengan teknik simple random sampling. Dengan menggunakan rumus :

$$n = \left( \frac{N}{N.d^2+1} \right)$$

Keterangan : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi (10%)

Jumlah populasi pasien TB yang didapatkan di Puskesmas Samata 56

pasien :

$$n = \left( \frac{N}{N.d^2+1} \right)$$

$$n = \left( \frac{56}{56(0.1^2)+1} \right)$$

$$n = \left( \frac{56}{0,56+1} \right)$$

$$n = 36$$

#### **D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

##### **1. Kriteria Inklusi**

Kriteria inklusi merupakan gambaran umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah :

- a. Pasien Tuberkulosis Paru dengan usia  $\geq 17$  tahun
- b. Pasien Tuberkulosis Paru pada tahap awal/intensif yang aktif menjalani pengobatan di Instalasi Rawat Jalan Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
- c. Bersedia menandatangani informed consent pasien TB Paru

##### **2. Kriteria Eksklusi**

Pasien Tuberkulosis yang tidak bersedia menjadi subjek penelitian.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tingkat kepatuhan adalah :

1. Formulir Informed consent
2. Kuesioner MMAS
3. Software PASW Statistics 18 untuk memvalidasi kuesioner MMAS
4. Data Pengobatan Pasien

### ***F. Variabel Penelitian***

#### **1. Variabel Bebas**

Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan jarak rumah dengan pelayanan kesehatan.

#### **2. Variabel Terikat**

Tingkat kepatuhan

### ***G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data***

#### **1. Pengolahan Data**

Dalam melakukan analisis, data terlebih dahulu harus diolah dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam penelitian ini proses pengolahan data melalui empat langkah yaitu :

##### **a. Editing**

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan (Dahlan,2012).

#### b. Coding

Coding adalah kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori (Dahlan, 2012).

#### c. Entri Data

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau database komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi (Dahlan, 2012).

#### d. Melakukan teknik analisis

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian akan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis (Dahlan, 2012).

### **2. Analisis Data**

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data yang nantinya hal ini menjadi penting diketahui karena berkaitan dengan pemilihan uji statistik yang tepat untuk digunakan (Saeful Baharuddin, 2014).

#### b. Uji Validitas dan Realibilitas

Kuesioner harus melalui uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai alat untuk memperoleh data. Tujuan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner adalah agar kuesioner yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk memperoleh data



yang akurat. Kuesioner yang valid adalah kuesioner yang digunakan memiliki skala pengukuran yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu (Sarwono, 2006). Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan program PASW (Predictive Analytics Software) Statistics 18.

c. Analisis deskriptif karakteristik responden

Data yang dianalisis deskriptif adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga per bulan, jarak rumah ke tempat pelayanan kesehatan, dan kepatuhan berobat penderita Tuberkulosis paru. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan program PASW Statistics 18.

c. Analisis hubungan karakteristik dengan tingkat kepatuhan pasien

hubungan karakteristik dengan tingkat pada kepatuhan pasien dalam menjalani terapi dianalisis dari hasil wawancara yang dikembangkan dari pertanyaan MMAS yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhadap 36 pasien tuberkulosis paru diperoleh data tentang karakteristik pasien yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan jarak rumah ke tempat pelayanan kesehatan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner pada pasien.

#### 1. Karakteristik Responden

Tabel karakteristik pasien Tuberkulosis di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Tabel 6. Karakteristik Pasien

Karakteristik	N (Total)	Persentase %
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-laki	20	56,6 %
Perempuan	16	44,4 %
<b>Usia (Tahun)</b>		
17 - 25	6	16,7 %
26 - 50	20	55,6 %
> 50	10	27,8 %
<b>Pendidikan</b>		
SMP	8	22,2 %
SMA	20	55,6 %
S1	8	22,2 %
<b>Pekerjaan</b>		
Ibu rumah tangga	7	19,4 %
Pegawai / Wiraswasta	17	47,2 %
Pelajar / Tidak bekerja	12	33,3 %
<b>Penghasilan</b>		
< 1 juta	17	47,2 %
1 - 3 juta	16	44,4 %

> 3 juta	3	8,3 %
<b>Jarak Rumah ke Pelayanan Kesehatan</b>		
< 5 km	17	47,2 %
> 5 km	19	52,8 %

## 2. Tingkat Kepatuhan

Tabel tingkat Kepatuhan pasien Tuberkulosis di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Tabel 7. Tabel Hasil Kuesioner

Variabel	Tingkat Kepatuhan					
	Renda h	%	Sedan g	%	Tingg i	%
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	11	73,33%	7	38,89 %	2	66,67 %
Perempuan	4	26,67%	11	61,11 %	1	33,33 %
<b>Usia (Tahun)</b>						
17 - 25	2	0,00%	6	31,58 %	2	66,67 %
26 - 50	10	71,43%	12	63,16 %	1	33,33 %
>50	2	14,29%	1	5,26%	-	-
<b>Pendidikan</b>						
SMP	2	14,29%	4	21,05 %	2	66,67 %
SMA	10	71,43%	10	52,63 %	-	-
s1	2	14,29%	5	26,32 %	1	33,33 %
<b>Pekerjaan</b>						
Ibu rumah tangga	1	6,25%	6	35,29 %	-	-
Pegawai/Wiraswasta	10	62,5%	6	35,29 %	1	33,33 %
Pelajar/Tidak bekerja	5	31,25 %	5	29,41 %	2	66,67 %
<b>Penghasilan (bulan)</b>						

< 1 juta	5	35,71%	10	52,63 %	2	66,67 %
1 - 3 juta	8	57,14%	7	36,84 %	1	33,33 %
> 3juta	1	7,14%	2	10,53 %	-	-
<b>Jarak rumah ke Puskesmas</b>						
< 5 km	7	50,00%	8	42,11 %	2	66,67 %
> 5 km	7	50,00%	11	57,89 %	1	33,33 %

### 3. Hubungan Karakteristik dengan Tingkat Kepatuhan

Hasil Uji Statistik Karakteristik hubungan antara Jenis Kelamin dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 8. Hubungan Jenis Kelamin dan Tingkat Kepatuhan**

Jenis Kelamin	Kepatuhan			Total	<i>p</i> -value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
Laki-laki	2	7	11	20	0,453
Perempuan	1	11	4	16	
Jumlah				36	

Ket: Korelasi Uji Eta Squared

Hasil Uji Statistik Karakteristik hubungan antara Usia dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 9. Hubungan Usia dan Tingkat Kepatuhan**

Usia	Kepatuhan			Total	<i>p</i> -value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
17 – 25	2	6	-	8	0.000
26 – 50	1	12	6	19	
>50	-	1	8	9	
Jumlah				36	

Ket: Korelasi Uji Spearman rho

Hasil Uji Statistik Karakteristik hubungan antara Jenis Pendidikan dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 10. Hubungan Pendidikan dan Tingkat Kepatuhan**

Pendidikan	Kepatuhan			Total	<i>p</i> -value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
SMP	2	4	2	8	0,785
SMA	-	10	10	20	
S1	1	5	2	8	
Jumlah				36	

Ket: Korelasi Uji Spearman rho

Hasil Uji Statistik Karakteristik hubungan antara Pekerjaan dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 11. Hubungan Pekerjaan dan Tingkat Kepatuhan**

Pekerjaan	Kepatuhan			Total	<i>p</i> -value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
IRT		6	1	7	0,310
Pegawai/Wiraswasta	1	6	10	17	
Pelajar/Tidak Bekerja	2	5	5	12	
Jumlah				36	

Ket: Korelasi Uji Eta Squared

Hasil Uji Statistik Karakteristik hubungan antara Penghasilan dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 12. Hubungan Penghasilan dan Tingkat Kepatuhan**

Penghasilan	Kepatuhan			Total	<i>p</i> -value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
<1 juta	2	10	5	17	0,478
1 – 3 juta	1	7	8	16	
>3 juta		2	1	3	
Jumlah				36	

Ket: Korelasi Uji Spearman rho

Hasil Uji Statistik Karakteristik hubungan antara Jarak Rumah dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 13. Hubungan Jarak dan Tingkat Kepatuhan**

Jarak	Kepatuhan			Total	p-value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
<5 km	2	8	7	17	0,795
>5 km	1	11	7	19	
Jumlah				36	

Ket: Korelasi Uji Spearman rho

Hasil Uji Statistik hubungan antara Karakteristik dan Tingkat Kepatuhan, sebagai berikut :

**Tabel 14. Hubungan Karakteristik dengan Tingkat Kepatuhan Pasien**

Karakteristik	Uji Statistik (p-value)	keterangan
Jenis Kelamin	0,453	p > 0,05
Usia	0,000	p < 0,05
Pendidikan	0,785	p > 0,05
Pekerjaan	0,310	p > 0,05
Penghasilan	0,478	p > 0,05
Jarak rumah dengan Pelayanan Kesehatan	0,795	p > 0,05

## B. Pembahasan

### 1. Karakteristik Pasien

Karakteristik penderita Tuberkulosis yang diteliti terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta jarak rumah ke pelayanan kesehatan. Penderita Tuberkulosis yang menjadi responden sebanyak 36 orang dengan tipe pasien kasus lama.

Berdasarkan data diatas, responden terdiri dari 20 laki-laki (56,6 %) dan 16 perempuan (44,4 %). Proporsi responden laki-laki dan perempuan didapatkan tidak seimbang. Di negara berkembang, diperkirakan jumlah penderita laki-laki

dan perempuan sama banyaknya, kendati data belumlah memadai. Di Indonesia, kasus baru tuberkulosis hampir separuhnya adalah perempuan dan tuberkulosis membunuh sedikitnya dua kali lebih banyak perempuan daripada kematian akibat kehamilan atau persalinan (Aditama, 2004).

Angka kasus penderita laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor resiko yaitu seperti kebiasaan merokok sehingga lebih meningkatkan resiko terjangkit penyakit. Long et al. (1999) dalam Vetreany Simamora (2010) melaporkan bahwa prevalensi kasus tuberkulosis paru di negara berkembang dua pertiga pada laki-laki dan sepertiga pada perempuan. Hasil ini didukung oleh Profil Kesehatan Indonesia (2012), menunjukkan bahwa perbandingan kasus laki-laki (0,4%) dan perempuan (0,3%). Laki-laki 1,5 kali lebih rentan daripada perempuan. Sebesar 59,4% kasus BTA positif yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (40,6%).

Sesuai dengan Riskesdas (2007) yang menyatakan bahwa prevalensi TB Paru pada laki-laki 20% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih sering terkena TB Paru dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki memiliki aktifitas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga kemungkinan terpapar lebih besar dibandingkan perempuan. selain itu kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol pada laki-laki dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah terkena TB Paru.

Berdasarkan data pengobatan pasien, usia responden yang paling muda adalah 17 tahun, sedangkan yang paling tua berusia 63 tahun. Sebagian besar

responden berada pada kelompok usia produktif (15 – 54 tahun), yaitu sebanyak 6 responden (17 – 25 tahun) (16,7 %), 20 responden (26 – 50 tahun) (55,6 %), dan 10 responden (> 50 tahun) (27,8 %). Hal yang sama terjadi pada tahun 2005 dimana kasus tuberkulosis paru di Indonesia lebih banyak terjadi pada kelompok usia produktif, terutama pada kelompok usia 25 – 34 tahun (Depkes RI, 2008).

Kelompok responden untuk kategori jenis pekerjaan berturut-turut dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit adalah Ibu Rumah Tangga sebanyak 7 responden (19,4 %), Pelajar/tidak bekerja sebanyak 12 responden (33,3 %), dan Pegawai/wiraswasta sebanyak 17 responden (47,2 %). Sebagian besar responden penelitian adalah wiraswasta hal ini diduga karena responden yang bekerja sebagai wiraswasta memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengambil sendiri obatnya ke puskesmas dibandingkan dengan seorang Ibu rumah tangga, Pegawai, Pelajar/mahasiswa. Hal ini juga yang menjadi alasan perbandingan pasien yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Kelompok responden yang tidak bekerja terdiri dari penderita yang memiliki usia diatas 50 tahun dan atau penderita yang memutuskan untuk beristirahat total dirumah.

Sebanyak 20 responden (55,6 %) adalah tamatan SMA, 8 responden adalah tamatan S1 (22,2 %) dan 8 responden adalah tamatan SMP (22,2 %). Hal ini sesuai dengan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Samata yang menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SMA memiliki jumlah paling besar.



Tuberkulosis biasanya menyerang orang-orang yang sulit dijangkau seperti tunawisma, pengangguran dan fakir miskin (WHO, 2003). Hal tersebut terbukti pada hasil penelitian ini, bahwa sebagian besar responden yang penghasilan dibawah 1 juta sebanyak 17 responden (47,2 %), penghasilan 1 sampai 3 juta sebanyak 16 responden (44,4 %) dan penghasilan 3 juta keatas sebanyak 3 responden (8,3 %). Hal ini menggambarkan bahwa keadaan ekonomi pasien tuberkulosis masih sangat rendah.

Jarak dapat mempengaruhi kepatuhan pasien dalam berobat ke tempat pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak rumah pasien ke puskesmas lumayan dekat. Jarak rumah ke tempat pelayanan kesehatan < 5 km sebanyak 17 responden (47,2 %) dan seorang responden dengan jarak rumah ke pelayanan kesehatan > 5 km sebanyak 19 (52,8 %).

## **2. Hasil Kuesioner**

Pada kuesioner MMAS yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 8 poin pertanyaan yang jawabannya terdapat skor 1 untuk jawaban Ya dan skor 0 untuk jawaban Tidak. Responden yang memiliki jumlah jawaban Ya nol berarti memiliki tingkat kepatuhan tinggi, jumlah jawaban Ya 1 sampai 2 berarti tingkat kepatuhan sedang dan jumlah jawaban Ya diatas 2 berarti tingkat kepatuhan rendah.

Dari tabel hasil kuesioner yang telah didapatkan, tingkat kepatuhan pasien Tuberkulosis paru yang diolah berdasarkan kuesioner MMAS dengan jumlah responden sebanyak 36 orang didapatkan sebanyak 3 responden dengan tingkat

kepatuhan tinggi (8,3 %), 18 responden dengan tingkat kepatuhan sedang (50,0 %) dan 15 responden dengan tingkat kepatuhan rendah (41,7 %).

Responden dengan tingkat kepatuhan sedang rata-rata menjawab pertanyaan kuesioner pada poin pertanyaan ke 5 yaitu apakah pasien masih meminum obatnya kemarin dengan jawaban Ya. Darinya itu didapatkan persepsi bahwa pada saat sehari sebelum kuesioner diberikan kepada responden, responden tetap masih mengonsumsi obatnya. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan rendah, rata-rata responden menjawab kuesioner pada poin pertanyaan pertama bahwa responden pernah lupa minum obatnya.

Menurut Soeparman (1995) ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan penderita, salah satunya menghentikan minum obat disebabkan karena adanya rasa bosan yang disebabkan pengobatan yang begitu lama, sudah merasa sehat setelah mendapat pengobatan beberapa lama lalu menghentikan pengobatannya, kesadaran penderita masih kurang karena kurangnya pengetahuan tentang Tuberkulosis Paru, dan jarak yang terlalu jauh antara rumah penderita.

Pemberian informasi obat kepada pasien adalah salah satu bentuk interaksi tenaga kesehatan dengan pasien. Informasi obat yang disampaikan kepada pasien harus benar, jelas, mudah dimengerti, akurat dan tidak bias. Informasi obat tersebut diharapkan dapat membantu pasien dalam mengonsumsi obat secara teratur sehingga kesembuhan pasien dapat diperoleh (Kemenkes, 2004).

### **3. Hubungan Karakteristik dengan Tingkat Kepatuhan**

Hubungan antara karakteristik dengan tingkat kepatuhan pasien ditentukan dengan Uji Korelasi. Uji korelasi yang digunakan adalah pearson bila salah satu

variabel berdistribusi normal. Jika sebaran data tidak normal, gunakan Uji Spearman. Hubungan tersebut digambarkan oleh nilai signifikansi yang dihasilkan. Jika nilai signifikansi  $<0,05$  maka ada hubungan antara karakteristik dengan kepatuhan berobat penderita TB paru. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $>0,05$  maka tidak ada hubungan antara faktor karakteristik dengan kepatuhan berobat penderita TB paru.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, jumlah sampel yang dipilih sebanyak 36 orang. Berdasarkan karakteristik pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas ini didapatkan frekuensi kasus penderita berjenis kelamin laki-laki (56,6 %) lebih tinggi dari penderita berjenis kelamin perempuan (44,4 %).

Hasil analisis korelasi menunjukkan hasil dari uji Eta Square 0,453 jenis kelamin dengan kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai  $p > 0,05$ , sehingga tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan berobat pasien TB.

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepatuhan. Sebagian penyakit sering dijumpai pada kaum pria dan sebagiannya lagi pada kaum wanita. Akan tetapi pria dan wanita memiliki perbedaan dalam banyak hal, antara lain : hubungan sosial, pengaruh lingkungannya, kebiasaan hidup dan segi-segi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Wanita lebih taat atau patuh daripada pria dalam hal menjalani terapi atau pengobatan dari penyakit yang dideritanya (Azhar,2000).

Hasil analisis korelasi menunjukkan hasil dari uji spearman 0,000 usia dengan kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai  $p < 0,05$ , sehingga ada hubungan antara usia dengan kepatuhan berobat pasien TB.

Kementrian Kesehatan RI (2012) menyatakan, sekitar 75 % pasien Tuberkulosis kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis (15-54 tahun), diperkirakan seorang dengan TB dewasa, akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan. Sehingga diperkirakan dapat merugikan secara ekonomis, TB juga memberikan dampak buruk secara sosial stigma bahkan dikucilkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kasus terbanyak berada pada usia produktif. Usia produktif merupakan usia yang aktif beraktivitas diluar lingkungan rumah sehingga lebih beresiko mudah menularnya penyakit TB paru terutama di lingkungan yang padat.

Berdasarkan jumlah usia terbanyak pasien TB paru yang didapatkan sesuai dengan isi Buku Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, menunjukkan bahwa usia terbanyak pasien TB paru yang mengalami penyakit TB paru adalah kelompok usia yang paling produktif. Beberapa penelitian menunjukkan kecenderungan penderita TB Paru terdapat pada umur produktif antara 15-55 tahun (Depkes RI, 2002).

Pendidikan merupakan suatu kegiatan, usaha manusia atau proses perubahan perilaku menuju kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan manusia. Tolak ukur pendidikan seseorang dapat diketahui dari pengetahuan dan sikapnya.

Hasil analisis korelasi menunjukkan hasil dari uji spearman 0,785 pendidikan dengan kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai  $p > 0,05$  sehingga tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan berobat pasien TB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% lebih responden sudah lulus pendidikan sekolah menengah atas sehingga responden dinilai sudah mampu menerima informasi tentang suatu penyakit, terutama penyakit tuberkulosis paru, dimana panyakit tuberkulosis paru membutuhkan pengetahuan yang baik untuk membantu keberhasilan pengobatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka semakin baik penerimaan informasi tentang pengobatan penyakitnya sehingga akan semakin teratur pengobatannya.

Azhar (2000) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola berpikir seseorang dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan dirinya. Orang yang berpendidikan tinggi akan lebih cepat menerima penjelasan dari petugas kesehatan. Tingkat pendidikan merupakan unsur penting bagi sumber pengetahuan seseorang, maka makin besar pula tingkat kepatuhannya dalam melakukan program pengobatannya terhadap penyakitnya.

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam menerapkan perilaku hidup sehat, terutama dalam mencegah terjadinya penyakit Tuberkulosis. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi kemampuan seseorang dalam menjaga dan mengatur pola hidupnya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah juga

kemampuan seseorang dalam menjaga dan mengatur pola hidupnya, sehingga mudah terkena penyakit (Notoadmodjo, 2010).

Seperti halnya apa yang disebutkan oleh Depkes RI (2001), yang menyatakan bahwa Pendidikan umum yang tinggi akan memudahkan masyarakat menyerap informasi dan pengetahuan untuk menuju hidup sehat serta mengatasi masalah kesehatannya.

Hasil analisis korelasi menunjukkan hasil dari uji Eta Square 0,310 pekerjaan dengan kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai  $p > 0,05$ , sehingga tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepatuhan berobat pasien TB.

Salah satu faktor struktur sosial yaitu pekerjaan akan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan, pekerjaan seseorang dapat mencerminkan sedikit banyaknya informasi yang diterima, informasi tersebut akan membantu seseorang dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada (Amin Z, 2006).

Hasil analisis korelasi menunjukkan hasil dari uji spearman 0,478 penghasilan dengan kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai  $p > 0,05$ , sehingga tidak ada hubungan antara penghasilan dengan kepatuhan berobat pasien TB.

Penelitian ini didukung oleh teori Kartono (2006) bahwa Faktor ekonomi berkaitan erat dengan konsumsi makanan atau dalam penyajian makanan keluarga. Kebanyakan penduduk dapat dikatakan mampu mencukupi kebutuhan dirinya masing-masing. Keadaan umum ini dikarenakan tingkat pendapatan yang

mereka peroleh dan banyaknya anggota keluarga yang harus diberi makan dengan jumlah pendapatan cukup. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Ketika penghasilan sudah mampu mencukupi dalam memenuhi kebutuhan pokok dan untuk berobat maka dapat dikatakan tingkat penghasilan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan minum obat.


Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian kesehatan individu atau masyarakat adalah keterjangkauan sarana kesehatan (Sarwono, 1993). Jarak tempat tinggal dengan tempat pelayanan kesehatan merupakan faktor penghambat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut serta berpengaruh terhadap kepatuhan penderita.

Hasil analisis korelasi menunjukkan hasil dari uji spearman 0,795 jarak rumah ke pelayanan kesehatan dengan kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai  $p > 0,05$ , sehingga tidak ada hubungan antara jarak rumah ke pelayanan kesehatan dengan kepatuhan berobat pasien TB.

Hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan seseorang dalam pengobatan atau minum obat bukan hanya dipengaruhi oleh jarak saja tetapi faktor lain seperti sikap, keyakinan, kehendak dan motivasi sehingga jarak bukanlah menjadi masalah dalam menjalani pengobatan (Kusuma, 2012).

Usia dan jenis kelamin berhubungan dengan kepatuhan pasien di beberapa tempat (WHO, 2003). Seperti disebutkan sebelumnya, pada penelitian ini, hasil

Uji Spearman rank, uji pearson maupun uji eta range memperlihatkan bahwa usia memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan berobat penderita TB paru. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh nilai probabilitas (p) yang lebih kecil dari 0,05. Dan sebaliknya, analisis terhadap jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jumlah pendapatan keluarga per bulan dan jarak rumah ke pelayanan kesehatan tidak mempengaruhi kepatuhan penderita TB paru dalam menjalankan program pengobatannya. penelitian BPOM RI (2006) faktor umur dan jenis kelamin dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam menjalankan terapi diet.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 36 responden mengenai tingkat kepatuhan berobat pasien Tuberkulosis di Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, tingkat kepatuhan berobat pasien tuberkulosis di Puskesmas Samata berada pada tingkat kepatuhan yang sedang sebanyak 18 responden (50,00 %), lalu diikuti kepatuhan yang rendah sebanyak 15 responden (41,7 %) dan tingkat kepatuhan tinggi sebanyak 3 responden (8,3 %).
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik usia responden terhadap tingkat kepatuhan, sedangkan untuk karakteristik jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan jarak rumah ke pelayanan kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan

#### ***B. Saran***

Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan berobat pasien tuberkulosis paru dan disarankan juga untuk dilakukan pengambilan lokasi observasi di 2 tempat atau lebih sebagai pembanding sehingga hasil yang didapat lebih variatif.


## KEPUSTAKAAN

- Aditama, T.Y. *Tuberkulosis Paru Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: UI Press. 2014
- Alfian. *Tuberculosis*. Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta. 2005
- Amin Z , Bahar A. *Tuberkulosis Paru. Buku ajar Ilmu Penyakit Dalam. 4th ed.* Jakarta: Pusat penerbitan Departemen Ilmu penyakit Dalam FKUI;. 1005-9. 2006
- Azhar, Z. *Epidemiologi Tuberculosis*. Banjarmasin : Pusat Study Tuberculosis FK UNLAM/RSUD ULIN. 2000
- Amaliah, Rita. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kegagalan Konversi Penderita TB Paru BTA Positif Pengobatan Fase Intensif Di Kabupaten Bekasi Tahun 2010*. Tesis FKM UI Program Studi Epidemiologi. 2012
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberculosis*, Edisi 2, 30-31, Depkes RI, Jakarta. 2014
- Dhewi, G. I, Armiyati, Y, dan Supriyono, M. *Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap Pasien dan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien TB Paru di BKPM Pati*. Artikel Ilmiah. 2011
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*. Makassar
- Dipiro, J.T., Wells, B.G., Schwinghammer, T.L., dan Dipiro, C.V. *Pharmacotherapy Handbook, Seventh Edition, 532-533* , McGraw-Hill Medical, New York. 2009
- Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes), *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 2015
- Dr. Sylvia RP, dr.Noor.DE, dr.Hilda T. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka suspek tuberkulosis di Puskesmas Perawatan Ratu Agung*. Bengkulu:Universitas Bengkulu. 2011
- Hasriani, Sewang, N. dan Muzakkir, H. *Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Merokok Siswa Kelas II SMP Negeri 30 Makassar*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis, Vol 5(5) : 601-604. 2014
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta. 2012
- Kementrian Kesehatan (Kemenkes), *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberculosis*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta. 2014

- Kementrian Kesehatan (Kemenkes), *InfoDatin*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta. 2015
- Kementrian Kesehatan RI. *Strategi Nasional Penanggulangan TB di Indonesia 2010 - 2014* : Kemenkes RI. 2011
- Kementrian Kesehatan RI.. *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Menular*. Jakarta. 2011
- Manuhara, Lely. *Evaluasi Kepatuhan Penggunaan Obat Tuberkulosis Paru, pada Programmed Management On-Drug Resistant Tuberkulosis di Puskesmas Kota Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2012
- McDonald, H.P., Amit, X.G., Brian, H., *interventions to Enhance Patient Adherence to Medication Prescriptions: Scientific Review*, JAMA, 288(22), 2868-2879. 2002
- Notoatmodjo S, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta, Jakarta. 2007
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010
- Pambudi U. *Evaluasi tingkat kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat tuberkulosis di Puskesmas Kartasura Sukoharjo pada Desember 2012*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013
- Pasek, made S. *Hubungan Persepsi dan Tingkat Pengetahuan Penderita TB dengan Kepatuhan Pengobatan di Kecamatan Buleleng*. Jurnal Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Volume 2 No 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. 2013
- Punnoose, A.R., Lynn, C. dan Golub, R.M. *Tuberculosis JAMA*, 309(9), 938. 2013
- Sarwono. *beberpa konsep serta aplikasinya sosiologi kesehatan*. Jakarta : gadjah mada university Press.1993
- Setyowati DRD. *Evaluasi tingkat kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta:Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah. Diunduh dari : [http://eprints.ums.ac.id/20688/1/1/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20688/1/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf). 2012
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati. 2009
- Somantri I, *Keperawatan medikal bedah: asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan*, Salemba Medika, Jakarta. 2008
- Sukana, B. dkk. *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Penderita TB Paru di Kabupaten Tangerang*. Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 2(3) : 282-289. 2003

- Suparyanto. Konsep Kepatuhan. <http://drsuparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-kepatuhan.html> (diakses pada 18 Mei 2011). 2010
- Widagdo, W. *Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penderita Mengenai Pengobatan Tuberkulosis dalam Konteks Keperawatan Komunitas di Wilayah Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Tahun 2002*. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Indonesia: Jakarta. 2002
- World Health Organization (WHO), *Global Tuberculosis Report*, WHOPress, Geneva. 2015
- World Health Organization South-East Asia Regional Office, *Tuberculosis Control in the South-East Asia Region, Annual TB Report 2014*, 4, WHO SEARO Publishing and Sales, New Delhi. 2014



**Lampiran 1. Skema Kerja**

## Lampiran 2 : Kuisisioner MMAS

Kuisisioner MMAS untuk mengukur tingkat Kepatuhan Pasien TB

Pertanyaan	Jawaban Pasien		Skor Ya=1/Tidak=0
	Ya	Tidak	
1. Pernahkah Anda lupa minum obat TB ?			
2. Selain lupa, mungkin Anda tidak minum obat TB karena alasan lain. Dalam 2 minggu terakhir, apakah anda pernah tidak minum obat ?			
3. Pernahkah Anda mengurangi atau berhenti minum obat tanpa sepengetahuan dokter karena Anda merasa obat yang diberikan membuat keadaan Anda menjadi lebih buruk?			
4. Pernahkah Anda lupa membawa obat ketika bepergian ?			
5. Apakah Anda masih meminum obat Anda kemarin ?			
6. Apakah Anda berhenti minum obat ketika Anda merasa gejala yang dialami telah teratasi?			
7. Meminum obat setiap hari merupakan sesuatu ketidaknyamanan untuk beberapa orang. Apakah Anda merasa terganggu harus minum obat setiap hari?			
8. Berapa sering Anda lupa minum obat a. Tidak pernah b. Sese kali c. Kadang-kadang d. Biasanya e. Selalu Ket : Selalu : 7 kali dalam seminggu Biasanya : 4-6 kali dalam seminggu Kadang-kadang : 2-3 kali dalam seminggu Sese kali : 1 kali dalam seminggu Tidak pernah : Tidak pernah lupa			
	Total Skor		

- 0 : Tinggi
- 1-2 : Sedang
- > 2 : Rendah



## KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama responden :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan terakhir :

- SD       - S1

- SMP       -S2

- SMA       - lain – lain

5. Pekerjaan :

6. Penghasilan :

< 1.000.000

1.000.000 sampai 3.000.000

-> 5.000.000

7. Jarak rumah ke rumah sakit :

< 5 km

-5 – 10 km

-> 10 km



### Lampiran 3. Uji Validitas Kuesioner

Responden	No Butir Kuesioner								Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	2	4	2	3	3	4	4	3	25
4	3	4	3	4	4	4	4	4	30
5	4	4	4	3	3	4	4	3	29
6	3	4	3	5	5	4	4	5	33
7	5	4	5	4	4	4	4	4	34
8	4	5	4	4	4	5	5	4	35
9	4	5	4	3	3	5	5	3	32
10	3	5	3	3	3	5	3	3	28
11	4	3	4	4	4	3	3	4	29
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	3	4	3	3	3	4	4	3	27
15	2	4	2	4	4	4	4	4	28
16	4	4	4	3	3	4	4	3	29
17	4	5	4	4	4	5	5	4	35
18	3	5	3	4	4	5	5	4	33
19	3	3	3	4	4	3	3	4	27
20	4	2	4	4	4	2	2	4	26
21	3	4	3	4	4	4	4	4	30
22	4	3	4	3	3	3	3	3	26
23	3	5	3	4	4	5	5	4	33
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	3	3	4	3	3	3	3	3	25
27	3	5	3	5	5	5	5	5	36
28	4	4	4	3	3	4	4	3	29
29	4	4	4	5	5	4	4	5	35
30	4	3	4	4	4	3	3	4	29

## Lampiran 4. Uji Validitas

		Correlations								
		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	VAR00001
p1	Pearson Correlation	1	,042	,971**	,234	,234	,042	,114	,234	,539**
	Sig. (2-tailed)		,825	,000	,214	,214	,825	,547	,214	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	,042	1	-,019	,211	,211	1,000**	,892**	,211	,687**
	Sig. (2-tailed)	,825		,919	,264	,264	,000	,000	,264	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	,971**	-,019	1	,178	,178	-,019	,058	,178	,475**
	Sig. (2-tailed)	,000	,919		,347	,347	,919	,762	,347	,008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	,234	,211	,178	1	1,000**	,211	,321	1,000**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,214	,264	,347		,000	,264	,084	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	,234	,211	,178	1,000**	1	,211	,321	1,000**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,214	,264	,347	,000		,264	,084	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	,042	1,000**	-,019	,211	,211	1	,892**	,211	,687**
	Sig. (2-tailed)	,825	,000	,919	,264	,264		,000	,264	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	,114	,892**	,058	,321	,321	,892**	1	,321	,751**
	Sig. (2-tailed)	,547	,000	,762	,084	,084	,000		,084	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	,234	,211	,178	1,000**	1,000**	,211	,321	1	,743**
	Sig. (2-tailed)	,214	,264	,347	,000	,000	,264	,084		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00001	Pearson Correlation	,539**	,687**	,475**	,743**	,743**	,687**	,751**	,743**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,008	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reliabilitas

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,765	9

### Lampiran 5. Tabel Uji Normalitas

#### Pendidikan

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,67461251
Most Extreme Differences	Absolute	,264
	Positive	,264
	Negative	-,250
Kolmogorov-Smirnov Z		1,582
Asymp. Sig. (2-tailed)		,013

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Jenis kelamin

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,48092881
Most Extreme Differences	Absolute	,279
	Positive	,279
	Negative	-,256
Kolmogorov-Smirnov Z		1,676
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Usia

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,46070044
Most Extreme Differences	Absolute	,316
	Positive	,176
	Negative	-,316
Kolmogorov-Smirnov Z		1,897
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Pekerjaan

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,72304157
Most Extreme Differences	Absolute	,226
	Positive	,226
	Negative	-,221
Kolmogorov-Smirnov Z		1,353
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Penghasilan

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,64047176
Most Extreme Differences	Absolute	,232
	Positive	,232
	Negative	-,213
Kolmogorov-Smirnov Z		1,393
Asymp. Sig. (2-tailed)		,041

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Jarak rumah

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,50541288
Most Extreme Differences	Absolute	,336
	Positive	,293
	Negative	-,336
Kolmogorov-Smirnov Z		2,016
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Lampiran 6. Statistik Uji Korelasi Spearman

Jenis kelamin dan Tingkat Kepatuhan

Directional Measures				Value
Nominal by Interval	Eta	jenis kelamin	Dependent	,453
		Tingkat Kepatuhan	Dependent	,299

Usia dan Tingkat Kepatuhan

Correlations			Tingkat Kepatuhan	Usia
Spearman's rho	Tingkat Kepatuhan	Correlation Coefficient	1,000	,742**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	36	36
Usia	Tingkat Kepatuhan	Correlation Coefficient	,742**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	36	36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pendidikan dan Tingkat Pendidikan

Correlations			Tingkat Kepatuhan	Tingkat Pendidikan
Spearman's rho	Tingkat Kepatuhan	Correlation Coefficient	1,000	,047
		Sig. (2-tailed)	.	,785
		N	36	36
Tingkat Pendidikan	Tingkat Kepatuhan	Correlation Coefficient	,047	1,000
		Sig. (2-tailed)	,785	.
		N	36	36

## Pekerjaan dan Tingkat Kepatuhan

## Directional Measures

			Value
Nominal by Interval	Eta	Pekerjaan Dependent	,310
		Tingkat Kepatuhan Dependent	,217

## Penghasilan dan Tingkat Kepatuhan

## Correlations

			Tingkat Kepatuhan	Tingkat Penghasilan
Spearman's rho	Tingkat Kepatuhan	Correlation Coefficient	1,000	,122
		Sig. (2-tailed)	.	,478
		N	36	36
	Tingkat Penghasilan	Correlation Coefficient	,122	1,000
		Sig. (2-tailed)	,478	.
		N	36	36

## Jarak rumah ke pelayanan kesehatan dan Tingkat Pendidikan

## Correlations

			Tingkat Kepatuhan	Jarak rumah ke Pelayanan Kesehatan
Spearman's rho	Tingkat Kepatuhan	Correlation Coefficient	1,000	,045
		Sig. (2-tailed)	.	,795
		N	36	36
	Jarak rumah ke Pelayanan Kesehatan	Correlation Coefficient	,045	1,000
		Sig. (2-tailed)	,795	.
		N	36	36



## RIWAYAT HIDUP



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Perkenalkan penulis bernama lengkap Kurniawan Jamaluddin, lahir di Makassar 18 Desember 1995 dari kedua orang tua bernama Jamaluddin dan Suriani. Sejak kecil saya

tinggal di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur. Mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SDN 221 Malili pada saat berumur 7 tahun. Kemudian tahun 2008 melanjutkan Sekolah di SMP Negeri 1 Malili dan tamat pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malili dan tamat pada tahun 2014.

Selanjutnya pendidikan kemudian dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan Saya berhasil lulus di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Farmasi pada tahun 2014. Masuk di jurusan ini membuat proses belajar menjadi lebih ekstra dan teratur. Tugas perkuliahan dilengkapi dengan penambahan praktikum yang berlangsung di laboratorium membuat waktu bermain menjadi lebih sedikit. Namun kesibukan di jurusan ini tidak membuat Saya untuk tidak mencoba organisasi kemahasiswaan. Saya kemudian sempat masuk bergabung dalam HMJ Farmasi UIN Alauddin Makassar dan organisasi kedaerahan yang banyak sedikitnya memberikan pengalaman yang begitu berharga.

Kuliah pun Saya jalani selama 4,5 tahun dan alhamdulillah dapat meraih predikat dengan IPK yang memuaskan.