

**PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL DENGAN
KEWASPADAAN UMUM DI RUMAH SAKIT
(Integrasi Nilai Islam dalam Membangun Derajat Kesehatan)**

Hasbi Ibrahim



Alauddin University Press

All Rights Reserved

**PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL DENGAN
KEWASPADAAN UMUM DI RUMAH SAKIT
(Integrasi Nilai Islam dalam Membangun Derajat Kesehatan)**

Penulis:
Hasbi Ibrahim

Editor:

Cetakan: I 2019
viii + 173 halaman, 15,5 cm x 23 cm
ISBN : 978-602-328-248-7

Alauddin University Press

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Somba Opu Gowa

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mengawali kata pengantar ini penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena petunjuk dan ridha-Nya tulisan ini dapat diselesaikan menjadi sebuah buku.

Buku ini membahas mengenai pengenalan infeksi nosokomial di RS serta salah bentuk pengendaliannya dengan penerapan Kewaspadaan Umum dan dibagian akhir buku ini penulis mengintegrasikan dengan semangat islam dalam membangun derajat kesehatan.

Penulis sangat mengharapkan agar buku ini bermanfaat terhadap orang-orang yang tertarik mempelajari pengendalian infeksi di RS, terutama bagi yang sering berinteraksi di RS yakni semua petugas kesehatan yang bertugas di RS, agar tingkat pengetahuan serta persepsi terhadap infeksi di RS dapat di kendalikan dengan baik, dengan tujuan akhirnya terciptanya perilaku yang aman oleh semua petugas kesehatan di RS terkait dengan pengendalian infeksi.

Penulis sangat yakin kedepan dengan perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan semakin maju akan banyak pula menghadapi persoalan baru sebagai konsekwensi dari kemajuan teknologi yang digunakan. Penulis mengharapkan bagi pembaca yang menemukan kelemahan-kelemahan dari buku ini, kiranya di berikan saran yang bersifat konstruktif demi sempurnanya buku ini. Insya Allah, semua saran dan kritik tersebut akan berguna terhadap penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Makassar, 1 Mei 2019

Hasbi Ibrahim

BAB I PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia, telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu Kewaspadaan Umum atau *Universal Precaution* merupakan upaya pencegahan infeksi berupa infeksi nosokomial (infeksi yang ditimbulkan dari tindakan medis) yang terus menjadi ancaman bagi petugas kesehatan dan pasien.

Infeksi di Rumah Sakit (RS) adalah infeksi yang terjadi di RS atau di tempat pelayanan kesehatan lain atau infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari RS. Infeksi bisa menular dari penderita ke penderita, dari penderita ke petugas kesehatan, dari penderita ke pengunjung disebut infeksi nosokomial dan yang terjadi pada petugas kesehatan termasuk infeksi yang berhubungan dengan pekerjaan.

Infeksi nosokomial mempunyai angka kejadian 2-12% (rata-rata 5%) dari semua penderita yang dirawat di rumah sakit. Angka kematian 1-3% dari semua kasus yang dirawat di rumah sakit.

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh seorang penderita saat dirawat di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan lain. Penularan

infeksi rumah sakit, sama dengan infeksi pada umumnya, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, sumber penularan mikroorganisme penyebab, tuan rumah yang suseptibel, dan cara penularan mikroorganisme.

Di rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sumber penularan infeksi adalah penderita dan petugas tempat pelayanan tersebut. Tuan rumah bisa penderita yang sedang sakit parah, orang-orang tanpa gejala tetapi dalam masa inkubasi atau dalam window period dari satu penyakit, atau orang-orang yang karier khronik dari satu mikroba penyebab infeksi. Sumber infeksi lain adalah flora endogen penderita sendiri, atau dari benda-benda di lingkungan penderita termasuk obat-obatan, alat-alat kedokteran dan devices yang terkontaminasi.

Manusia mempunyai tingkat kekebalan yang berbeda-beda terhadap infeksi, tergantung pada usia, penyakit yang dideritanya, dan faktor lain yang mungkin ada, misalnya karena sistim kekebalannya terganggu, akibat pengobatan dengan obat-obat immun-suppressive atau radiasi. Risiko infeksi juga lebih tinggi pada penderita yang menjalani pembedahan dan narkose, dan pada penderita yang tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. Alat yang di masukkan ke tubuh penderita, misalnya kateter, terutama bila digunakan dalam waktu yang lama, juga bisa meninggikan resiko infeksi nosokomial.

Penularan infeksi bisa melalui udara (lewat saluran nafas), kontak langsung melalui sentuhan kulit, atau lewat saluran cerna. Mikroba yang sama bisa ditularkan melalui lebih dari satu rute penularan. Penularan lewat udara secara langsung bisa juga terjadi misalnya melalui droplet, atau melalui partikel debu dalam udara di ruangan. Penularan lewat udara termasuk aerosol (partikel kolloidal dalam gas), yang bisa dihasilkan pada berbagai prosedur tindakan, antara lain mencuci alat medis dan peralatan lain secara manual, pem-buangan sampah pada tempat sampah yang dipakai tanpa penutup.

Mikroorganisme yang dibawa dengan cara ini bisa disebarkan oleh udara sampai jauh, melalui ventilasi atau mesin penyejuk ruangan.

Penyebaran lewat droplet bisa terjadi saat bersin, batuk, berbicara, atau saat melakukan prosedur medis misalnya bronkhoskopi, dan mengisap (suctioning). Jarak penyebaran droplet ditentukan oleh kekuatan eksplosif dan gaya gravitasi, sedang distribusi partikel udara ditentukan oleh gerakan udara. Kontak kulit bisa langsung atau tidak langsung, dan biasanya disebarkan oleh tangan atau via kontak dengan darah dan bagian tubuh. Penyebaran infeksi bisa juga lewat common vehicle (makanan, air, obat-obatan, devices dan peralatan yang terkontaminasi). Penularan via vector (lewat nyamuk, lalat, tikus dan binatang lain) mungkin bisa terjadi, walaupun jarang.

Beberapa prinsip dasar yang penting dalam kriteria infeksi nosokomial adalah Informasi yang digunakan untuk menentukan adanya infeksi yang diklasifikasi berdasar kombinasi antara hasil pemeriksaan klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium atau tes-tes lainnya. Bukti klinis adanya infeksi didapat dari observasi langsung pada lokasi infeksi pada pasien atau dari sumber-sumber data yang lain, misalnya dari status pasien. Bukti laboratorium adalah hasil biakan, tes deteksi antigen atau antibodi, atau visualisasi mikroskopis.

Infeksi pada neonatus dan anak kecil, dimana manifestasi kliniknya berbeda dengan orang dewasa, diberlakukan kriteria khusus yakni diagnose infeksi oleh dokter atau ahli bedah, yang didapat dari observasi langsung pada waktu pembedahan, pemeriksaan endoscopy dan prosedur lainnya, atau juga dari pemeriksaan klinis merupakan kriteria yang dapat diterima, kecuali terdapat bukti kuat yang tidak mendukung. Untuk lokasi-lokasi tertentu untuk bisa memenuhi kriteria infeksi, maka diagnosis klinis dari dokter tanpa data-data pendukung harus disertai dengan pemberian anti-mikroba.

Di negara maju infeksi yang didapat dalam rumah sakit terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Di AS ada 20.000 kematian setiap tahun akibat infeksi nosokomial. Di seluruh dunia sekitar 10 % pasien rawat inap di rumah sakit mengalami infeksi yang baru selama dirawat (1,4 juta infeksi setiap tahun). Di Indonesia, penelitian yang dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 9,8 % pasien rawat inap mendapat infeksi yang baru selama dirawat.

Di suatu rumah sakit pernah terjadi semua bayi dalam satu ruangan terkena infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Pseudomonas* hanya karena bak mandi yang dipakai cuma satu. Bak mandi itu dipakai secara bergiliran dari pasien satu ke pasien lain tanpa dibersihkan secara baik. Akibatnya, bakteri tersebut tetap singgah di dalamnya. Bahkan tahun 1992 di Amerika Serikat ada 13.000 kasus penderita infeksi nosokomial karena dirawat di rumah sakit, tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik yang tersedia dan akhirnya meninggal. Itulah contoh kasus yang menggambarkan betapa ancaman infeksi nosokomial tidak bisa dianggap enteng.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan Balai Pustaka belum ada entri istilah nosokomial ini. Nosokomial berasal dari kata Yunani *nosocomium*, yang berarti rumah sakit. Maka, kata nosokomial artinya "yang berasal dari rumah sakit". Sementara kata infeksi cukup jelas artinya, yaitu terkena hama penyakit.

Penerapan Kewaspadaan umum pada setiap pasien dapat menggantikan sebagian tindakan isolasi yang berlaku selama ini, namun untuk kasus-kasus tertentu isolasi masih diperlukan misalnya untuk pasien yang diduga atau yang diketahui terinfeksi oleh kuman pathogen yang dapat menular melalui udara atau kontak dan juga tidak berlaku untuk kasus-kasus yang memerlukan isolasi ketat.

Bagi petugas kesehatan, perlindungan terhadap infeksi akibat terpapar darah maupun cairan tubuh yang infeksius merupakan bagian dari upaya kesejahteraan pegawai. Di Negara berkembang dimana jumlah petugas kesehatan professional tidaklah banyak, apabila mereka menjadi korban kecerobohan penanganan infeksi maka kegiatan system kesehatan maupun pasien yang memerlukan tenaganya akan lebih besar daripada di Negara maju, dimana risiko petugas kesehatan dibandingkan jumlah penduduk yang dilayani jauh lebih baik

Petugas kesehatan pada umumnya dan terlibat langsung pada pelayanan klinik pada khususnya merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga di masyarakat manapun dan merupakan ujung tombak perawatan pasien atau pelayanan kesehatan. Keterampilan dan pengalaman mereka tidak hanya berguna bagi *institute* dimana mereka bekerja namun juga bagi masyarakat pada umumnya, keluarga dan teman-temannya. Untuk menjadi dan mendapatkan seorang petugas kesehatan yang handal memerlukan investasi yang besar dari segi materi maupun waktu. Sistem pelayanan kesehatan merupakan resiko untuk kehilangan tenaganya karena terjadi penyebaran infeksi di tempat kerja yang tidak menutup kemungkinan akan menimpa seorang tenaga khususnya pada *blood borne viral infection* seperti HIV (*Human immunodeficiency Virus*), Hepatitis B, dan C .

Berdasarkan data yang dikeluarkan UNAIDS (*United Nations Acquired Immuno Deficiency Syndrom*) pada 2006 yang lalu, dari prevalensi (angka kejadian) HIV/AIDS yang mencapai 40 juta orang, sekitar 75 persennya berada di Asia dan Afrika. Prevalensi kasus HIV/AIDS yang terjadi di Indonesia periode Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar 440 orang tertular virus HIV dan 794 orang lainnya menderita penyakit AIDS dengan jumlah kematian sebesar 123 orang. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Jawa Barat periode Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar 1105 orang dengan jumlah kematian sebesar 173

orang yang menempati urutan ketiga tertinggi di Indonesia (Ditjen PPM dan PL Depkes R.I, 2007). Kasus penyakit hepatitis B menurut Lesmana (2007) menyatakan bahwa, jumlah penderita hepatitis B di Cina sebesar 123,7 juta orang, di India sebesar 30-50 juta orang, sedangkan di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 13,3 juta penderita, dengan tingkat prevalensi mencapai 5-10%.

Perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan sangat beresiko terpapar infeksi yang secara potensial membahayakan jiwanya, karena perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien akan kontak langsung dengan cairan tubuh atau darah pasien dan dapat menjadi tempat dimana agen infeksius dapat hidup dan berkembang biak yang kemudian menularkan infeksi dari pasien satu ke pasien yang lainnya. Menurut penelitian apabila tenaga medis terkena infeksi akibat kecelakaan maka risikonya 1% mengidap hepatitis fulminan, 4% hepatitis kronis (aktif), 5% menjadi pembawa virus .

Tahun 1997 CDC (*Center For Disease Control*) melaporkan ada 52 kasus petugas kesehatan lain HIV akibat kecelakaan di tempat kerja, sedangkan 114 orang petugas kesehatan lain di duga terinfeksi ditempat kerja. ICN (2005) melaporkan bahwa estimasi sekitar 19-35% semua kematian pegawai kesehatan pemerintah di Afrika disebabkan oleh HIV/AIDS. Sedangkan di Indonesia data ini belum dilaporkan. Namun dari kejadian tersebut, resiko perawat mempunyai andil yang paling besar untuk tertular akibat terpapar cairan dan tertusuk jarum, sehingga berkembang upaya untuk mencegah terinfeksi dari paparan HIV.

Universal Precaution yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan. Dasar Kewaspadaan umum ini meliputi, pengelolaan alat kesehatan,

cuci tangan guna mencegah infeksi silang, pemakaian alat pelindung diantaranya sarung tangan untuk mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius yang lain, pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan, pengelolaan limbah. Dalam menggunakan kewaspadaan universal petugas kesehatan memberlakukan semua pasien sama dengan menggunakan prinsip ini, tanpa memandang penyakit atau diagnosanya dengan asumsi bahwa risiko atau infeksi berbahaya.

Dalam tindakan kewaspadaan universal diperlukan kemampuan perawat sebagai pelaksana, ditunjang oleh sarana dan prasarana, serta SOP yang mengatur langkah langkah tindakan kewaspadaan universal. Kemampuan perawat sebagai pelaksana perawatan dipengaruhi oleh unsur pengetahuan dan unsur sikap dalam memberikan pelayanan perawatan. Kedua unsur tersebut akan mempengaruhi perilaku perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan yang tercermin pada pelaksanaan tindakan perawatan.

Dari data dari bagian kesehatan kerja RS. DR. Wahidin Sudirohusodo tahun 2006 menunjukkan jumlah petugas yang terpajang benda tajam sebesar 10% atau sekitar 12 orang dari seluruh petugas yang berada di ruang perawatan penyakit dalam dan bagian bedah (K3 RS. Wahidin, 2006).

Upaya pencegahan penularan infeksi di RS melibatkan berbagai unsur mulai dari peran pimpinan sebagai petugas kesehatan itu sendiri. Peran pimpinan adalah penyediaan system, sarana, dan pendukung lainnya. Peran petugas adalah sebagai pelaksana langsung dalam upaya pencegahan infeksi. Dengan berpedoman pada perlunya pada peningkatan mutu pelayanan di RS dan sarana lainnya, maka perlu dilakukan pelatihan yang menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam pencegahan infeksi di RS. Salah satu strategi yang terbukti bermanfaat dalam pengendalian infeksi nosokomial adalah peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam metode *Universal precaution* atau Kewaspadaan standar yaitu suatu cara penanganan baru untuk

meminimalkan pajanan darah dan cairan tubuh dari semua pasien tanpa memperdulikan status infeksi.

Kewaspadaan umum merupakan upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kepada pasien, setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah. Dalam pengendalian infeksi penerapan kewaspadaan standar merupakan hal yang sangat mendasar dalam asuhan keperawatan bagi setiap orang tanpa memandang status infeksinya. Kewaspadaan standar harus merupakan kegiatan rutin. Perlu dilakukan penyediaan bahan dan alat yang cukup, pengawasan serta pemantauan untuk memastikan penerapan kewaspadaan standar tersebut. Setiap perawat secara pribadi harus menjaga *higiene* perorangan, selalu mencuci tangan dengan benar sebelum dan setelah melakukan tindakan. Selain itu perlu diperhatikan peralatan kesehatan telah melalui proses dekontaminasi, pencucian dan disinfeksi dengan baik dan benar. Limbah dipilah dan dikelola sesuai peraturan. Hindari kontak dengan darah dan cairan tubuh lain, cuci tangan segera setelah menangani benda yang tercemar. Semua perawat dan tim medis harus memahami dan menerapkan kewaspadaan standar bagi semua pasien, setiap saat dan dimana saja tanpa memandang status infeksi pasien.

BAB II

INFEKSI NOSOKOMIAL

Virus, yang berarti racun dalam bahasa Latin, merupakan mikroorganisme (jasad renik) penyebab penyakit infeksi seperti AIDS, cacar, hepatitis, influenza, polio, dan rabies. Ia hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dan bila berdiri sendiri merupakan benda mati. Virus hidup dalam sel manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bakteri yang hidup. Di dalam sel-sel tersebut ia dapat berkembang biak dengan subur, selanjutnya menguasai tuan rumahnya, dan menyebabkan penyakit. Meskipun ada juga "virus diam", yang tidak memperlihatkan keberadaannya walaupun bertahun-tahun berdiam dalam sel tuan rumahnya.

Bakteri yang dalam bahasa Yunani, *bacterion*, berarti tongkat kecil, adalah tanaman bersel satu; besarnya 1 - 10 mikrometer (seperseribu milimeter). Ia dapat ditemukan pada suhu rendah maupun suhu panas, baik di udara, tanah, air, atau bersimbiosis pada makhluk hidup seperti manusia, binatang, maupun tanaman.

Hingga kini telah dikenal sekitar 1.600 spesies bakteri, 200 di antaranya merupakan bakteri patogen penyebab infeksi pada manusia. Ada dua golongan besar bakteri, saprofit (yang hidup dari bahan organik yang sudah mati) dan simbiot (yang hidup dan mendapat makan pada manusia, hewan, dan tanaman hidup).

Pada manusia bakteri simbiot antara lain ada pada saluran cerna serta kulit, dan terbagi dalam tiga golongan, yaitu mutualistik (membantu dalam proses-proses fisiologis sambil hidup pada tuan rumah), komensal (hidup pada tuan rumah tanpa menyebabkan penyakit), dan patogen potensial atau oportunistik (dapat menyebabkan penyakit bila ketahanan tubuh tuan rumah

berkurang, misalnya pada pascabedah besar atau penyakit berat seperti kanker dan AIDS).

Fungi atau jamur penyebab infeksi pada manusia juga berukuran sangat renik dan hanya bisa terlihat dengan mikroskop. Dari ribuan spesies fungi yang diketahui saat ini hanya kurang dari 50 spesies yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia maupun binatang, dan tidak sampai 15 spesies yang dapat menyebabkan penyakit mematikan pada manusia. Infeksi karena fungi dapat timbul pada permukaan kulit, dalam kulit, pada selaput lendir, maupun organ tubuh seperti paru-paru. Umumnya cara pencegahan dan pengobatan infeksi fungi sudah diketahui dan tersedia. Begitu juga parasit berupa cacing dan protozoa penyebab infeksi. Infeksi nosokomial sebenarnya bukan barang baru. Menjelang paruh kedua abad XIX Ignaz Phillip Semmelweis, seorang dokter ahli kebidanan di Wina, Austria, telah mengamati 30% dari para ibu yang melahirkan di rumah sakit menderita demam setelah melahirkan dengan angka kematian sebesar 12,24%. Sedangkan mereka yang melahirkan di rumah sendiri umumnya tidak terserang demam demikian.

Semmelweis melihat pula bahwa para dokter muda yang memeriksa para ibu tersebut di rumah sakit umumnya tidak mencuci tangannya sebelum melakukan pemeriksaan. Ketika kemudian salah seorang dokter itu meninggal karena demam setelah tangannya terluka akibat terkena pisau bedah, Semmelweis menyimpulkan demam pada para ibu yang melahirkan itu akibat sepsis (terkena hama) dan dapat menular.

Kemudian ia mewajibkan para dokter yang akan memeriksa pasien agar terlebih dahulu mencuci tangan mereka dengan cairan kaporit. Dengan cara ini angka kematian para ibu yang melahirkan di rumah sakit dapat diturunkan sampai 1,27%. Celakanya, Semmelweis tidak mendapat pengakuan atas penemuannya itu, bahkan banyak ditentang oleh para dokter di zamannya.

Akhirnya, ia meninggal di rumah sakit jiwa di Wina pada tahun 1865. Nasib Semmelweis sebagai pelopor antiseptis dalam dunia kedokteran tidak secemerlang Joseph Lister, seorang ahli bedah asal Inggris. Berkat penemuannya mengenai anestesia, pembedahan berkembang pesat. Sayangnya, perkembangan itu tidak diikuti pula dengan turunnya angka kematian pascabedah yang tinggi. Akhirnya, pada tahun 1865 Lister menerapkan cara untuk mencegah terjadinya infeksi yakni dengan jalan membersihkan luka, perban, dan peralatan bedah dengan cairan asam karbol. Cara yang dilakukannya ini didasarkan pada penemuan Louis Pasteur bahwa peragian dan pembusukan terjadi akibat kontak jasad renik dengan bahan organik. Cara ini kemudian dinamakan cara antiseptis, yaitu membunuh jasad renik penyebab penyakit yang terdapat pada luka atau peralatan yang digunakan. Kemudian cara ini dia perbaiki. Bukan lagi membunuh jasad renik setelah pembedahan, namun ia sudah mematikannya sebelum pembedahan. Pembedahan tanpa adanya jasad renik penyebab infeksi itu lalu disebut pembedahan aseptis. Dalam hal ini ruang bedah yang digunakan telah disucihamakan atau disterilisasi, dan sebelum pembedahan ahli bedah dan stafnya membersihkan diri serta menggunakan pakaian, sarung tangan, masker, topi, dan peralatan yang steril, serta membersihkan dan menjaga kebersihan bagian tubuh pasien yang dibedah. Atas penemuannya pada tahun 1893 itu Lister dianugerahi bintang jasa dan diangkat sebagai bangsawan oleh ratu Inggris.

Selain itu, infeksi nosokomial menjadi ancaman besar terhadap kesehatan karena sekarang banyak ditemukan bakteri yang resisten (kebal) terhadap pelbagai jenis antibiotik. Kini sekitar 40% dari bakteri *Staphylococcus aureus* yang dapat diisolasi di rumah sakit, diketahui kebal terhadap semua antibiotik, kecuali terhadap vankomisin. Tapi suatu saat bakteri ini akan membentuk mutan (bakteri yang bermutasi dan mempunyai sifat-sifat baru) yang juga kebal terhadap gempuran vankomisin. Kalau itu terjadi, penderita

pneumonia (radang paru-paru) ataupun infeksi pascabedah akibat infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* tidak dapat lagi diobati dengan antibiotik mana pun. Seperti sudah disebut, dalam tahun 1992 di Amerika Serikat ada 13.300 kasus penderita infeksi nosokomial karena dirawat di rumah sakit, tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik yang tersedia dan akhirnya meninggal.

Para pakar yakin, suatu saat akan terbentuk bakteri super yang tidak dapat dilawan dengan antibiotik apa pun. Superbakteri ini mungkin dari jenis *Enterococcus* karena sekarang ini saja sudah ada kira-kira 20% infeksi bakteri ini yang ditemukan di rumah sakit di Amerika Serikat yang sudah kebal terhadap vankomisin. Jumlah ini pasti meningkat tiap tahun, dan sifat resisten terhadap vankomisin dari bakteri itu dalam tahun 1992 terbukti dapat dipindahkan pada bakteri *Staphylococcus aureus*. Pertukaran *plasmid* (bahan genetik dalam sel bakteri) resisten di antara aneka jenis bakteri mudah sekali terjadi karena bakteri-bakteri ini selalu hidup berdampingan pada kulit atau saluran cerna manusia, dan selalu terjadi interaksi antara bakteri aneka jenis. Dengan timbulnya resistensi terhadap antibiotik pada bakteri oportunistik ini, pengobatan dengan antibiotik yang tersedia tidak dapat diandalkan lagi dan menjadi tidak efisien.

Faktor-faktor yang dibicarakan di atas antara lain menjadi penyebab pentingnya penanganan infeksi nosokomial secara khusus. Di sinilah mungkin salah satu peranan RS Prof. Dr. Sulianti yang baru didirikan itu. Namun kita semua, masyarakat umum maupun dokter, paramedis, dan semua yang bekerja di bidang kesehatan, dapat ikut serta mencegah menjalarnya dan meningkatnya infeksi nosokomial dengan secara disiplin dan sesuai standar perawatan selalu memperhatikan kebersihan tangan, pakaian, peralatan, dan segala sesuatu yang dapat membawa bakteri penyebab infeksi pada pasien. Misalnya, jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah memeriksa pasien. Tidak menggunakan satu alat secara berturut-turut pada beberapa pasien tanpa dibersihkan dengan baik lebih dahulu setelah dipakai pada seorang pasien. Memandikan dan

membersihkan pasien jangan dianggap pekerjaan rutin yang harus diselesaikan secepatnya, tetapi harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab akan keselamatan pasien terhadap ancaman infeksi nosokomial.

A. Faktor Resiko Infeksi Nosokomial

Penularan infeksi rumah sakit, sama dengan infeksi pada umumnya, dipengaruhi oleh 3 faktor utama :

1. Sumber penularan mikroorganisme penyebab
2. Tuan rumah yang suseptibel
3. Cara penularan mikroorganisme

Di rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sumber penularan infeksi adalah penderita dan petugas tempat pelayanan tersebut. Tuan rumah bisa penderita yang sakit parah, orang-orang tanpa gejala tetapi dalam masa inkubasi atau dalam window period dari suatu penyakit, atau orang-orang yang karier khronik dari satu mikroba penyebab infeksi. Sumber infeksi lain adalah flora endogen penderita sendiri atau dari benda-benda di lingkungan penderita termasuk obat-obatan, dan alat kedokteran dan devices yang terkontaminasi.

Manusia mempunyai tingkat kekebalan yang berbeda-beda terhadap infeksi, tergantung pada usia, penyakit yang dideritanya, dan faktor lain yang mungkin ada, misalnya karena sistem kekebalan terganggu, akibat pengobatan dengan obat-obat immuno suppressant atau radiasi. Risiko infeksi juga lebih tinggi pada penderita yang menjalani pembedahan dan narkose, dan pada penderita yang tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. Alat yang dimasukkan ke tubuh penderita, misalnya kateter, terutama bila digunakan dalam waktu yang lama, juga bisa meninggikan resiko infeksi nosokomial.

Penularan infeksi bisa melalui udara (lewat saluran nafas), kontak langsung melalui sentuhan kulit atau lewat saluran cerna. Mikroba yang sama bisa ditularkan melalui lebih dari satu rute penularan. Penularan lewat udara

secara langsung bisa juga terjadi misalnya melalui droplet, atau melalui partikel debu dalam udara di ruangan. Penularan lewat udara termasuk aerosol (partikel kolloidal dalam gas) yang bisa dihasilkan pada berbagai prosedur tindakan, antara lain mencuci alat medis dan peralatan lain secara manual, pembuangan sampah pada tempat sampah yang dipakai tanpa penutup. Mikroorganisme yang dibawa dengan cara ini bisa disebarkan oleh udara sampai jauh, melalui ventilasi atau mesin penyejuk ruangan. Penyebaran lewat droplet bisa terjadi saat bersin, batuk, berbicara, atau saat melakukan prosedur medis misalnya bronkhoskopi, dan mengisap (suctioning). Jarak penyebaran droplet ditentukan oleh kekuatan eksplosif dan gaya gravitasi, sedang distribusi partikel udara ditentukan oleh gerakan udara.

Kontak kulit bisa langsung atau tidak langsung, dan biasanya disebarkan oleh tangan atau via kontak dengan darah dan bagian tubuh lain. Penyebaran infeksi bisa juga lewat common vehicle (makanan, air, obat-obatan, devices dan peralatan yang terkontaminasi). Penularan melalui vektor (lewat nyamuk, lalat, tikus dan binatang lain) mungkin bisa terjadi, walaupun jarang. Juga ada keadaan khusus dimana infeksi dianggap **bukan nosokomial**, bila:

1. Infeksi yang ada hubungannya dengan penylit atau kelanjutan dari infeksi yang sudah ada pada saat masuk rumah sakit, kecuali bila ditemukan bakteri atau gejala-gejala yang jelas membuktikan bahwa ini infeksi baru.
2. Pada anak kecil, infeksi yang diketahui atau dibuktikan menular liwat plasenta (misalnya: toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, atau sifilis) dan terjadi sebelum 48 jam kelahiran

Ada juga dua keadaan yang **dianggap bukan infeksi**, yaitu:

1. Adanya kolonisasi, yaitu adanya bakteri (pada kulit, mukosa, luka terbuka, atau dalam ekskret atau sekret) tetapi tidak ada tanda-tanda yang membuktikan adanya infeksi.
2. Inflamasi (peradangan), yaitu keadaan yang terjadi akibat reaksi jaringan terhadap cedera (injury) atau stimulasi oleh zat-zat non-infektious misalnya bahan kimia.

Defenisi-defenisi di bawah ini diambil dari NNIS manual, terdiri atas 13 tempat utama dan 48 tempat spesifik infeksi sesuai dengan kriteria-kriterianya, disusun berurutan mulai dari yang paling sering terjadi di rumah sakit (Infeksi saluran kemih, Infeksi luka operasi, Pneumonia, infeksi primer aliran darah), diikuti infeksi di tempat-tempat lain yang disusun secara alfabet sesuai dengan kategori lokasi infeksi (misalnya Bone and Joint Infection, Central Nervus System Infection).

B. Daftar Kode-kode Major Specific Site dan Deskripsinya:

UTI	Urinary Tract Infection
	SUTI Symptomatic Urinary Infection
	ASB Asymptomatic bacteriuria
	OUTI Other Infection of the Urinary Tract
SSI	Surgical Site Infection
	KIN Superficial Incisional site (ILO superfisial), kecuali setelah CBGB (Coronary Artery Bypass Graft)
	KNC Setelah CBGB, laporkan SKNC untuk superficial incisional site infection pada dada/chest.

KNL	Setelah CBGB, laporkan SKNL untuk superficial incisional site infection pada kaki/leg (donor).
ST	Deep Incisional Surgical site Infection (ILO profunda), kecuali setelah CBGB.
STC	Setelah CBGB, laporkan sebagai STC untuk deep incisional surgical site infection pada dada.
STL	Setelah CBGB, laporkan sebagai STL untuk deep incisional surgical site infection pada kaki donor.

PNEU Pneumonia

PNEU Pneumonia

BSI Bloodstream Infection

LCBI Laboratory Confirmed Bloodstream Infection.

CSEP Clinical sepsis.

BJ Bone and Joint Infection

BONE Osteomyelitis

JNT Joint and Bursa

DISC Space

CNS Central Nervous System Infection

IC Intracranial Infection
MEN Meningitis atau Ventriculitis
SA Surgical abscess, tanpa meningitis

CVS Cardiovascular System Infection

VASC Arteria and Venous Infection
ENDO Endocarditis
CARD Myocarditis atau Pericarditis
MED Mediastinitis

EENT Eye, Ear, Nose, Throat, or Mouth Infection

CONJ Conjunctivitis
EYE Semua yang bukan conjunctivitis
EAR Mastoiditis
ORAL Cavity infection (mulut, lisah, atau gusi)
SINU Sinusitis
UR Upper Respiratory Tract, pharyngitis, laryngitis, epiglottitis

GI Gastrointestinal System Infection

GE Gastroenteritis
GIT GI Tract infection
HEP Hepatitis

IAB Intraabdominal, yang tidak disebutkan di tempat lain

NNEC Necrotizing Enterocolitis

LRI Low Respiratory Tract Infection, selain Pneumonia

BRON Bronchitis, Tracheobronchitis, Tracheitis, tanpa bukti adanya pneumonia.

REPR Reproductive Tract Infection

EMET Endometritis

EPIS Episiotomy Infection

VCUF Vaginal Cuff Infection

OREP Infeksi lain pada Reproductive Tract, baik pada laki-laki maupun pada wanita.

SST Skin and Soft Tissue Infection

SKIN Skin infection

ST Decubitus

DECU Decubitus ulcer

BURN Luka bakar

BRST Absces buah dada atau Mastitis

UMB Omphalocele

PUST Infant Pustulosis

CIRC Sirkumsisi neonatus

C. Kriteria Infeksi Nosokomial yang sering terjadi

1. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

a. Infeksi Saluran Kemih Simtomatik

Letak infeksi : Infeksi saluran kemih (ISK) simtomatik

Kode : UTI-SUTI

Defenisi : Infeksi saluran kemih (ISK) simtomatik harus memenuhi paling sedikit **satu** kriteria berikut ini:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4
<p>Didapatkan paling sedikit satu dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) - nyeri supra pubik - urine keruh - atau biakan urin porsi tengah (midstream) $>10^5$ kuman per ml urin dengan jenis bakteri tidak lebih dari dua spesies. 	<p>Ditemukan paling sedikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya :</p> <p>Salah satu dari hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demam ($>38^{\circ}\text{c}$) - nyeri supra pubik - Urine keruh <p>dan salah satu dari hal-hal berikut:</p>	<p>Pada pasien berumur ≤ 1 tahun di-temukan paling se-dikit satu dari tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demam ($>38^{\circ}\text{c}$) - hipotermia ($<37^{\circ}\text{c}$) - apnea - bradikardia $<100/\text{menit}$ - letargia - muntah-muntah <p>dan</p>	<p>Pada pasien ber-umur ≤ 1 tahun di temukan paling sedikit satu dari tanda-tanda dan gejala-gejala be-rikut tanpa ada penyebab lain-nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demam ($>38^{\circ}\text{c}$) - hipotermia ($<37^{\circ}\text{c}$) - apnea - bradikardia $<100/\text{menit}$ - letargia - muntah-muntah <p>dan</p>

	<p>a. Tes carik ce-lup (dipstik) positif untuk leukosit este-rase dan atau nitrit</p> <p>b. Piuria (terda-pat \geq 10 leu-kosit per ml atau terdapat \geq 3 lekosit per LPB dari urin yang tidak di-pusing).</p> <p>c. Ditemukan bak-teri dengan pe-warnaan gram dari urin yang tidak dipusing</p>	<p>hasil biakan urin 10^5 bakteri/ml u-rin dengan tidak lebih dari dua jenis bakteri.</p>	<p>paling sedikit satu dari berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Test carik celup (dipstick) positif untuk leukosit esterase dan atau nitrit 2. Piuria (terdapat >10 leukosit per ml atau terdapat >3 leukosit per LPB dari urin yang tidak di-pusing). 3. Ditemukan bak-teri
--	--	--	--

	<p>(dicentrifug e).</p> <p>d. Biakan urin paling sedikit dua kali berturut-turut menunjukkan jenis bakteri yg sama (gram-negatif atau <i>S. saprophitica</i>) dengan jumlah > 100 koloni bakteri per ml urin yang diambil dengan keteter.</p> <p>e. Biakan urin menunjukkan satu jenis uro-patogen</p>		<p>dengan pe-wanaan gram dari urin yang tidak dipusing (disentrifuge)</p> <p>4. Biakan urin pa-ling sedikit dua kali berturut-turut menunjukkan jenis bakte-ri yang sama (gram-negatif atau <i>S. sapro-phyti-cus</i>) de-ngan jumlah > 100 koloni ku-man</p>
--	---	--	--

	<p>(gram-negatif atau <i>S. saprophyticus</i>) dengan jumlah > 10⁵ per ml urine penderita yang telah mendapat pengobatan antimikroba yang sesuai.</p> <p>f. Diagnosis ISK oleh dokter yg menangani</p>		<p>per ml urin yang diambil dengan keteter.</p> <p>5. Biakan urin menunjukkan satu jenis uropatogen (gram-negatif atau <i>S. saprophyticus</i>) dengan jumlah > 10 per ml pada penderita yang telah mendapat pengobatan antimikroba yang sesuai.</p>
--	--	--	---

			6. Didiagnosa ISK oleh dokter yang menanganani
--	--	--	--

CATATAN:

- Biakan positif dari ujung keteter urin bukan test laboratorium yang dimaksud pada kriteria ISK.
- Biakan urin harus diambil dengan tehnik yang sesuai, seperti cara koleksi clean catch atau kateterisasi .

- Pada anak kecil biakan urin harus diambil dengan kateterisasi buli-buli

Faktor Resiko Infeksi Saluran kemih Kateterisasi menetap:

a. Kateterisasi menetap

- Cara pemasangan kateter
- Lama pemasangan
- Kualitas perawatan kateter

b. Kerentanan pasien (Usia)

c. Decubitus

d. Pasca persalinan

Petunjuk Pengembangan Surveilans Infeksi Saluran Kemih

Faktor risiko harus dicatat dengan lengkap pada catatan pasien oleh dokter, perawat atau anggota tim kesehatan lainnya yang menangani pasien (kategori I).

- a. Pelaksanaan Surveilans menghitung *rate* menurut faktor risiko spesifik (pemasangan kateter) minimal setiap enam bulan sekali dan melaporkan pada Komite Dalin dan K3, dan sekaligus menyebar luaskannya dalam buletin rumah sakit (Kategori II)
- b. Pelaksana surveilans membuat laporan ISK kasar pada bulletin rumah sakit tiga bulan sekali (Kategori I)

Pencegahan Infeksi Saluran Kemih

Untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih nosokomial perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemasangan kateter urin.

a. **Tenaga Pelaksana**

1. Pemasangan kateter hanya dikerjakan oleh tenaga yang betul-betul memahami dan terampil dalam teknik pemasangan kateter secara aseptik. (Kategori I)
2. Personil yang memberikan asuhan pada pasien dengan kateter harus mendapat latihan secara berkala khusus teknik yang benar tentang prosedur pemasangan kateter kandung kemih dan pengetahuan tentang komplikasi potensi yang timbul (Kategori II).

b. **Pemasangan Kateter**

1. Pemasangan kateter dilakukan hanya bila perlu saja dan segera dilepas bila tidak diperlukan lagi. Alasan pemasangan kateter tidak boleh hanya untuk kemudahan personil dalam memberikan asuhan pada pasien. (Kategori II)
2. Cara drainase yang lain seperti: kateter kondom, kateter suprapubik, kateterisasi selang-seling (intemitten) dapat digunakan sebagai ganti kateterisasi menetap bila dimungkinkan. (Kategori III).
3. Cuci tangan: Sebelum dan sesudah manipulasi kateter harus cuci tangan (Kategori I)

c. **Teknik Pemasangan Kateter**

1. Gunakan drain yang terkecil tetapi aliran tetap lancar dan tidak menimbulkan kebocoran dari samping kateter (Kategori II).
2. Pemasangan secara aseptik dengan menggunakan peralatan steril (Kategori II).
3. Peralatan seperti sarung tanag, kain penutup (duk) kain kasa dan antiseptik untuk disinfeksi hanya digunakan untuk satu kali pemasangan kateter (Kategori II).
4. Kateter yang sudah terpasang harus difiksasi dengan baik untuk mencegah tarikan pada uretra (Kategori I).

d. Sistem Aliran Tertutup

1. Irigasi hanya dikerjakan apabila diperkirakan ada sumbatan aliran, misalnya karena bekuan darah pada operasi prostat atau kandung kemih. Untuk mencegah hal ini digunakan irigasi kontinu secara tertutup. Untuk menghilangkan sumbatan akibat bekuan darah dan sebab lain dapat digunakan irigasi selang-seling. Irigasi dengan larutan antibiotik sebagai tindakan pencegahan infeksi tidak dianjurkan. (Kategori II).
2. Sambungan kateter harus didisinfeksi sebelum dilepas (Kategori II).
3. Gunakan spuit besar yang steril untuk irigasi dan setelah irigasi selesai spuit ini dibuang secara aseptik (Kategori I)
4. Jika kateter sering tersumbat dan irigasi harus sering dilakukan, maka kateter harus diganti (Kategori II).

e. **Pengambilan Bahan Urin**

1. Bahan pemeriksaan urin segar dalam jumlah kecil dapat diambil dari bagian proksimal kateter secara steril. Dengan spoelit steril, urine diisap dari bagian proksimal kateter yang terlebih dahulu telah didisinfeksi dengan betadin dan alkohol 70%.
2. Bila diperlukan urin dalam jumlah besar (untuk pemeriksaan patologi klinik), maka urine bisa diambil secara aseptik dari kantong penampungan urine (Kategori I).

f. **Kelancaran Aliran Urine**

1. Aliran urine harus lancar sampai ke kantong penampungan. Penghentian aliran sementara hanya dengan maksud pengambilan bahan pemeriksaan yang direncanakan untuk dilakukan (Kategori II).
2. Untuk menjaga kelancaran aliran harus diperhatikan:
 - Pipa jangan sampai tertekuk.
 - Kantong penampungan harus dikosongkan secara teratur ke wadah penampung urin yang terpisah bagi tiap-tiap pasien. Saluran urin dari kantong penampungan tidak boleh menyentuh wadah penampungan.

- Kateter yang kurang lancar/tersumbat harus diirigasi dengan teknik No.5, bila perlu diganti dengan yang baru.
 - Kantong penampungan harus selalu terletak lebih rendah dari kandung kemih (Kategori II).
- g. **Perawatan Meatus**
Dianjurkan membersihkan dan merawat meatus (selama kateter dipasang) dengan larutan povidone iodine, walaupun tidak mencegah kejadian infeksi saluran kemih. (Kategori I).
- h. **Penggantian Kateter**
Kateter urin menetap tidak harus diganti meneurut waktu tertentu/secara rutin (Kategori II)
- i. **Ruang perawatan**
Untuk mencegah infeksi silang antara pasien pemakai kateter menetap dengan pasien yang terinfeksi, maka yang terinfeksi harus dipisahkan
- j. **Pamantauan Bakteriologik**
Pemantauan bakteriologi secara rutin pada pasien yang memakai kateter tetap tidak dianjurkan (Kategori III).

2. INFEKSI LUKA OPERASI (ILO)

a. Superficial Incisional	b. Operasi Profunda / Deep incisional.	c. Organ / rongga
--------------------------------------	---	--------------------------

<p>Letak Infeksi :</p> <p>Infeksi luka operasi superficial</p>	<p>Letak Infeksi :</p> <p>Infeksi luka operasi profunda</p>	<p>Letak infeksi :</p> <p>ILO Organ / Rongga</p>
<p>Kode : SSI-(SKIN)</p> <p>SSI-(SKIN) Surgical Site Infection Superficial incisional Site.</p>	<p>Kode : SSI-(ST)</p> <p>SSI-ST (soft tissue) selain prosedur pembedahan NNIS berikut, CBGB (coronary artery bypass graft termasuk irisan dada dan kaki)</p>	<p>Kode : SSI-(Letak spesifik pada organ /rongga)</p>
<p>Defenisi :</p> <p>Infeksi luka operasi superficial harus memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut ini</p>	<p>Defenisi :</p> <p>Infeksi luka operasi pro-funda harus memenuhi pa-ling sedikit satu criteria berikut:</p>	<p>Defenisi :</p> <p>ILO Organ/rongga mengenai badan manapun, kecu-ali insisi kulit, fascia, atau lapisan-lapisan otot, yang dibuka atau dimanipulasi selama pembedahan. Tem-pat-tempat spesifik dinya-takan pada ILO Organ/ rongga untuk</p>

		menentukan lokasi infeksi lebih lanjut:
KRITERIA	KRITERIA	KRITERIA
<p>Infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Hanya meliputi kulit, subkutan atau jaringan lain di atas pascia.</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Terdapat paling sedikit satu keadaan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pus keluar dari luka operasi atau dari drain yang dipasang di atas fascia. 	<p>Infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah atau sampai satu tahun pasca bedah (bila ada implant berupa non-human derived implant yang dipasang permanen).</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Meliputi jaringan lunak yang dalam (mis : lapisan fascia dan otot) dari insisi.</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Terdapat paling sedikit</p>	<p>Infeksi timbul jangka 30 hari setelah prosedur pembedahan, bila tidak dipasang implant atau dalam waktu satu tahun bisa dipasang implant dan infeksi tampaknya ada hubungannya dengan prosedur pembedahan.</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Infeksi mengenai bagian tubuh manapun, kecuali insisi kulit, fascia, atau lapisan-lapisan otot, yang dibuka atau dimanipulasi selama prosedur pembedahan.</p>

<p>2. Biakan bakteri po-sitif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptis.</p> <p>3. Sengaja dibuka oleh dokter karena terdapat tanda peradangan, kecuali jika hasil biakan negatif (paling sedikit terdapat satu dari tanda-tanda infeksi berikut : nyeri, bengkak lokal, kemerahan dan hangat lokal)</p> <p>4. Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.</p>	<p>satu keadaan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pus keluar dari luka insisi dalam tetapi bukan berasal dari komponen organ/rongga dari daerah pembedahan 2. Insisi dalam secara spontan mengalami dehisens atau dengan sengaja dibuka oleh ahli bedah bila pasien mempunyai paling sedikit satu dari tanda-tanda atau gejala-gejala berikut: demam ($>38^{\circ}\text{C}$), atau nyeri lokal, terkecuali biakan insisi negatif. 3. Ditemukan abses atau bukti lain adanya infeksi yang 	<p><i>Dan</i></p> <p>Pasien paling sedikit mempunyai salah satu dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drainage purulent dari drain yang dipasang melalui luka tusuk kedalam organ/ rongga. 2. Diisolasi bakteri dari biakan yang diambil secara aseptik dari cairan atau jaringan di dalam organ atau ruangan. 3. Abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai organ/rongga yang ditemukan pada pemeriksaan langsung waktu pembedahan ulang, atau dengan pe-
---	--	---

	<p>mengenai insisi dalam pada pemeriksaan langsung, waktu 4. pemeriksaan pembe-dahan ulang, atau de-ngan pemeriksaan his-topatologis atau radio-logis.</p> <p>4. Dokter yang menangani menyatakan terjadi in-feksi.</p>	<p>meriksaan histopatolo-gis atau radiologis.</p> <p>4. Dokter menyatakan se-bagai ILO organ/ rongga</p>
PETUNJUK PELAPORAN		
<p>1. Jangan laporkan se-bagai infeksi luka operasi: Abses jahitan (inflmasi dan dischar-ge terbatas hanya pa-da titik jahitan).</p> <p>2. Laporkan infeksi lo-kal pada tempat tu-sukan (stab wound)</p>	<p>1. Masukkan sebagai infeksi luka operasi profunda bila me-ngenai baik surfisial maupun profunda.</p> <p>2. Laporkan bahan pe-meriksaan dari insisi superficial sebagai ID = incisional drainage.</p>	<p>1. Kadang-kadang cairan dari infeksi rongga mengalir melalui insi-si. Ini diklassifikasi sebagai ILO profunda.</p> <p>2. Laporkan hasil biakan sebagai ID</p>

<p>sebagai infeksi kulit atau soft tissue tergantung kedalaman-nya.</p> <p>3. Laporkan infeksi pa-da circumsisi bayi sebagai SST-CIRC.</p> <p>4. Laporkan infeksi pa-da episiotomi seba-gai REPR-EPIS.</p> <p>5. Laporkan luka bakar yang terinfeksi seba-gai SST-BURN</p>		
--	--	--

TEMPAT SPESIFIK ILO ORGAN / RONGGA

KODE	LETAK
Bone	Osteomyelitis
BRST	Breast Abscesses atau mastitis
CARD	Myocarditis atau pericarditis
DISC	Disc space
EAR	Ear, mastoid

MET	Endometritis
ENDO	Endocarditis
EYE	Eye, selain conjunctivitis
GIT	GI tract
IAB	Intraabdominal, tidak disebutkan di tempat lain
IC	Intracranial, brain abscess atau durameter
JNT	Joint and Bursa
LUNG	Infeksi lain di tractus respiratorius bagian bawah
MED	Mediastinitis
MEN	Meningitis atau ventriculitis
ORAL	Oral cavity (mulut, lidah, atau gusi)
OREP	Other male atau female reproductive
OUTI	Otherinfections of the urinary tract
SA	Spinal abscess tanpa meningitis
SINU	Sinusitis
UR	Upper respiratory tract, pharyngitis
VASC	Arterial aatau venous infection
VCUF	Vaginal cuff

Faktor Risiko Infeksi Luka Operasi

A. Tingkat kontaminasi luka

B. Faktor tuan rumah

- Usia ekstrim (sangat tua atau sangat muda)
- Obesitas
- Infeksi preoperative
- Terapi kortikosteroid
- Diabetes mellitus
- Malnutrisi berat

C. Faktor pada lokasi luka

- Pencukuran daerah operasi (Cara dan waktu pencukuran)
- Devitalisasi jaringan
- Benda asing
- Suplai darah yang buruk ke lokasi operasi
- Lokasi luka yang udah tercemar (mis. Daerah perineum)

D. Lama operasi

E. Lama perawatan

Petunjuk Pengembangan Surveilans ILO

- a. Semua faktor risiko harus dicatat dengan lengkap pada catatan pasien oleh dokter, perawat atau anggota Tim Dalin yang menangani pasien (Kategori I)
- b. Klasifikasi operasi harus dicatat pada laporan operasi atau pada catatan pasien oleh ahli bedah segera setelah pasien dioperasi (Kategori I).
- c. Pelaksanaan surveilans harus menghitung *rate menurut klasifikasi luka operasi* minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya pada Komite Dalin dan pada bagian bedah (Kategori I)

- d. Pelaksana surveilans menghitung *rate menurut prosedur spesifik* setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya pada Komite Dalin dan pada bagian bedah (Kategori II)
- e. Pelaksana surveilans menghitung *rate kasus ILO* pada bulletin rumah sakit setiap 3 bulan sekali (Kategori I).

Pencegahan Infeksi Luka Operasi

Tindakan pencegahan dikelompokkan pada pencegahan:

a. Kala sebelum masuk rumah sakit

1. Semua pemeriksaan dan pengobatan untuk persiapan operasi hendaknya dilakukan sebelum rawat inap, agar saat pra-bedah menjadi pendek (< 1 hari) (Kategori II).
2. Perbaiki keadaan yang memperbesar kemungkinan terjadinya ILO antara lain:
 - Diabetes mellitus
 - Malnutrisi
 - Obesitas
 - Infeksi
 - Pemakaian kortikosteroid (Kategori II).

b. Kala pra-operasi

1. Perawatan pra-operasi satu hari untuk operasi berencana. Apabila terdapat keadaan yang bisa memperbesar kemungkinan terjadinya ILO tidak dapat dilakukan di luar rumah sakit (misalnya malnutrisi berat yang memerlukan oral atau parenteral hiperalimentasi) maka pasien dapat dirawat lebih awal (Kategori I).

2. Mandi antisptik dilakukan malam sebelum opearsi (Kategori III).
3. Pencukuran rambut daerah operasi dilakukan hanya bila perlu, misalnya daerah operasi ditutupi rambut yang lebat.

Cara pencukuran adalah sebagai berikut:

- Jangan menggunakan pisau cukur, tapi gunakan gunting.
 - Bila menggunakan pisau cukur listrik dapat dilakukan lebih lama sebelum operasi dari pada pisau cukur biasa.
 - Setelah dicukur diolesi antiseptik (Kategori III).
4. Daerah operasi harus dicuci dengan antiseptik kulit memakai teknik dari bagian tengah kearah luar.
Antiseptik kulit yang dipakai dianjurkan khlorheksidin, larutan jodium, atau iodofor (Kategori I).
 5. Dikamaar operasi pasien ditutupi duk steril sehingga yang terbuka hanya daerah operasi saja (Kategori I).
 6. Antibiotik proflaksis diberikan secara sistemik, harus memenuhi persyaratan:
 - Tepat dosis
 - Tepat indikasi (hanya untuk operasi bersih terkontaminasi, pemakaian implant dan protese, atau operasi resiko tinggi seperti bedah vaskuer, bedah jantung atau bedah otak)
 - Tepat cara pemberian (harus diberikan secara I.V. dua jam sebelum operasi dilakukan, dan dilanjutkan tidak lebih dari 48 jam).

Tepat jenis (sesuai dengan mikroba yang paling sering menjadi penyebab ILO dilokasi pada operasi kolorektal, dan diberikan tidak lebih dari 24 jam (Kategori I).

Catatan:

Antimikroba yang diberikan pada luka operasi kotor dimasukkan dalam kelompok terapeutik.

c. Persiapan Tim Bedah

1. Setiap orang yang masuk kamar operasi harus:
 - Memakai masker yang efisien, menutupi hidung dan mulut dengan baik.
 - Memakai tutup kepala yang menutupi seluruh rambut.
 - Memakai sepatu khusus untuk kamar operasi atau pembungkus sepatu (kategori I).
2. Anggota tim bedah sebelum setiap operasi harus mencuci tangan dengan antiseptik ditambah dengan penyikatan selama 5 menit atau lebih, dengan posisi jari-jari lebih tinggi dari siku (Kategori II).
3. Antiseptik yang dianjurkan untuk cuci tangan adalah khlorheksidin, Iodor, atau heksaklorofen (Kategori II).
4. Setiap cuci tangan, keringkan dengan handuk steril (Kategori I).
5. Setiap anggota tim harus memakai jubah/gaun steril (Kategori I).
6. Setiap anggota tim harus memakai sarung tangan steril, apabila sarung tangan tersebut kotor, harus diganti dengan

yang baru. Sarung tangan steril tidak boleh dipakai lebih dari satu jam.

7. Sarung tangan dipakai dengan metode tertutup. (Kategori I).
8. Untuk operasi tulang atau pemasangan implant harus memakai sarung tangan steril berlapis dua (Kategori II).

d. Saat Operasi

1. Teknik Operasi

Harus dilakukan dengan sempurna untuk menghindari kerusakan jaringan lunak yang berlebihan, menghilangkan rongga, mengurangi perdarahan dan menghindari tertinggalnya benda asing yang tidak diperlukan dan menghindari tertinggalnya benda asing yang tidak diperlukan (Kategori I).

2. Lama Operasi

Operasi harus dilakukan secepat-cepatnya dalam batas yang aman (Kategori II)

3. Pemakaian drain.

Pemakaian drain harus dengan sistim tertutup, baik dengan cara pnghisapan atau dengan cara memakai gaya tarik bumi (gravitasi) dan drain harus mela-lui luka tusukan di luar luka operasi (Kategori I)

e. Perawatan Pasca Operasi

1. Untuk luka kotor atau infeksi, kulit jangan ditutup primer (Kategori I).

2. Petugas harus mencuci tangan sebelum dan setelah merawat luka, dengan standar cuci tangan yang baku. Petugas tidak boleh menyentuh luka secara langsung dengan tangan, kecuali setelah memakai sarung tangan steril (Kategori I).
3. Kasa penutup luka diganti apabila:
 - Basah
 - Menunjukkan tanda-tanda infeksi (Kategori I).Jika terlihat cairan keluar dari luka, lakukan pewarnaan Gram dan biakan (Kategori I).

f. Pengendalian Lingkungan

1. Semua pintu kamar operasi harus tertutup rapat dan jumlah personil yang ke-luar masuk kamar operasi harus dibatasi (Kategori I).
2. Ventilasi kamar operasi haruslah diperhatikan:
3. Alat-alat operasi harus didekontaminasi dengan khlorin 0,5% selama 5 –10 menit, sebelum dicuci. Pencucian dilakukan dengan detergen dan air pada alat-alat yang sebelumnya telah dibuka, semua jaringan, darah dan sekret harus dihilangkan dengan sikat gigi. Alat kemudian dikeringkan dan dima-sukkan dalam tromol untuk disterilkan di Instalasi CSSD. Kesempurnaan ker-ja otoklaf harus dimonitor minimal sekali seminggu (Kategori I).
4. Kamar Operasi harus dibersihkan:
 - Antara dua operasi
 - Tiap hari walaupun kamar operasi tidak dipakai,

- Tiap minggu (satu hari tanpa operasi untuk pembersihan menyeluruh) (Kategori I).
- 5. Pemakaian keset dengan antiseptik pada pintu masuk kamar operasi tidak dianjurkan (Kategori I).
- 6. Biakan udara dan biakan yang diambil dari personil kamar operasi secara rutin tidak diperlukan (Kategori I).

3. PNEUMONIA

Adalah infeksi saluran nafas bagian bawah (ISPB)

Letak infeksi : paru-paru

K o d e : PNEU-PNEU

Definisi : Pneumonia harus memenuhi paling sedikit *satu* dari kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4
<p>Pada pemeriksaan fisik terdapat ronkhi basah atau pekak pada perkusi</p> <p><i>Dan</i> Salah <i>satu</i> di antara keadaan</p>	<p>Foto torak menunjukkan adanya infiltrat, konsolidasi, kavitasi, efusi pleura baru atau progressif.</p> <p><i>Dan</i> Salah <i>satu</i> di antara keadaan</p>	<p>Pada penderita berumur 1 tahun didapatkan <i>dua</i> diantara keadaan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apnea - takipnea - bradikardia - mengik (wheezing) - ronki basah 	<p>Gambaran radiology torak serial pada penderita umur 1 tahun menunjukkan infiltrat baru atau progressif, konsolidasi, atau efusi pleura.</p>

<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjadi perubahan bahan baru berupa sputum purulen atau terjadi perubahan sifat sputum 2. Isolasi bakteri positif pada biakan darah 3. Isolasi bakteri patogen positif dari aspirasi trakea, sikat-an/cuci bronkus atau biopsi. 	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat perubahan baru yaitu sputum purulen, atau terjadi perubahan sifat sputum 2. Isolasi bakteri positif pada biakan darah 3. Isolasi bakteri positif pada biakan aspirasi trakea, sikatan /cuci bronkus atau biopsy. 4. terdapat tanda-tanda pneumonia pada pemeriksaan histopatologi . 	<p>- atau batuk</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit satu di antara keadaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dan sekresi saluran nafas meningkat 2. Timbul perubahan baru berupa sputum purulen, atau terjadi perubahan sifat sputum. 3. Isolasi bakteri positif pada biakan darah. 4. Isolasi bakteri patogen dari aspirasi 	<p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit satu diantara keadaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dan sekresi saluran nafas meningkat. 2. Timbul perubahan baru berupa sputum purulen atau terjadi perubahan sifat sputum, 3. Isolasi bakteri positif pada biakan darah, 4. Isolasi bakteri patogen positif dari aspirasi trakea, sikatan/ cu-ci
--	--	---	---

		trakea, sikatan/ cuci bronkus dan biopsy. 5. Terdapat tanda-tanda pneumonia pada pemeriksaan histopatologi	bronkus atau biopsy, 5. Virus dapat di-isolasi atau ter-dapat antigen vi-rus dalam sekresi saluran nafas, 6. Terdapat tanda-tanda pneumo-nia pada pemer- iksaan histo- patologi.
--	--	---	---

CATATAN	FAKTOR RESIKO PNEMONIA
<ul style="list-style-type: none"> • Sputum yang dibatukkan tidak berguna dalam diagnosis pneu-monia tetapi mungkin membantu mengidentifikasi kuman etiologic dan mem-berikan data suseptibilitas antimikrobia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumentasi saluran nafas 2. Tindakan operasi terutama operasi dada dan abdomen 3. Keadaan yang memudahkan as-pirasi, misalnya pemasangan pipa, lambung, kesadaran yang menurun, dan disfagia. 4. Usia tua

<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan dari pemeriksaan sinar-x dada serial mungkin lebih membantu dari pada pemeriksaan tunggal. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Obesitas 6. Penyakit obstruksi paru menahun 7. Fungsi paru abnormal 8. Intubasi dalam waktu lama 9. Gangguan fungsi imunologi
---	--

Petunjuk Pengembangan Surveilans Pneumonia

Semua faktor resiko harus dicatat dengan lengkap pada catatan pasien oleh dokter, perawat atau anggota Tim Dalin yang menangani pasien yang bersangkutan (Kategori I).

- a. Pelaksanaan Surveilans menghitung *rate menurut faktor resiko spesifik* minimal jenis operasi torak atau abdomen, penggunaan ventilator, serta melaporkannya pada Komite Dalin & K3 RS Dr. Wahidin Sudirohusodo minimal 6 bulan sekali dan sekaligus menyebar-luaskannya melalui bulletin rumah sakit (Kategori II).

4. INFEKSI ALIRAN DARAH PRIMER (IADP)

Letak infeksi : Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) atau
Laboratory confirmed Blood stream infection
(LCBI)

Kode : BSI-LCBI

Defenisi : Infeksi aliran darah primer adalah infeksi aliran darah yang dapat timbul tanpa ada organ atau

jaringan lain yang dicurigai sebagai sumber infeksi

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
<p>Ditemukan bak-teri patogen yang dikenal pada satu kali atau lebih biakan darah</p> <p>Dan Biakan dari darah tersebut tidak ada hubungannya dengan infeksi di tempat lain.</p>	<p>Ditemukan salah satu di-antara gejala berikut tan-pa penyebab lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - demam (>38°C) - menggigil - hipotensi <p>Dan Paling sedikit satu dari hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontaminan kulit biasa (misal, Dipthe-roids, <i>Bacillus</i> sp., proprionibacterium sp, coagulase negati-ve staphylococci atau micrococci) ditemu-an pada dua kali atau lebih biakan darah yang diambil pada waktu yang 	<p>Pasien berumur ≥ 1 tahun dengan paling sedikit satu dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam (>38°C) - hipotermia (<37°C) - apnea - atau bradikardia <p>Dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dua kali atau le-bih biakan darah yang diambil pada waktu yang berbeda, ditemu-kan kontaminan kulit biao (mis., Dipthe-oids, <i>Bacillus</i> sp., proprionibacterium sp, coagulase negative sta-phylococci atau

	<p>berbeda</p> <p>2. Kontaminan kulit biasa (misal: Diptheroids, <i>Bacillus</i> sp, propriobacterium sp) ditemukan pada paling sedikitnya satu biakan darah penderita dengan canula intravascular, dan dokter memberikan antibiotik yang sesuai.</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Tanda-tanda, gejala-gejala, dan hasil laboratorium yang positif tidak ada hubungannya dengan suatu infeksi di tempat lain.</p>	<p>mic-rococci).</p> <p>2. Pada minimal satu kali biakan darah penderita dengan canula intra-ena, ditemukan kontaminan kulit biasa (mis., Dipththeroids, <i>Bacillus</i> sp., propionibacterium sp, coagulase negative staphylococci atau mic-rococci).</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Tanda-tanda, gejala-gejala, dan hasil laboratorium yang positif tidak ada hubungannya dengan suatu infeksi di tempat lain.</p>
--	---	---

PETUNJUK PELAPORAN	FAKTOR RISIKO
- Laporkan phlebitis purulent dengan konfirmasi biakan	a. Pemasangan kateter intravena (I.V.) yang berkaitan dengan:

<p>semi kuantitatif yang positif dari ujung kateter, tapi dengan biakan darah negatif atau tidak dilakukan biakan sebagai BSI-LCBI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporkan sebagai BSI-LCBI bila biakan darah positif tapi tidak ada bukti adanya infeksi di tempat lain. <p>Pseudobacteriemia tidak dilaporkan sebagai infeksi nosokomial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis kanula - Metode pemasangan - Lama pemasangan kanula <p>b. Kerentanan penderita terhadap infeksi.</p>
---	--

Petunjuk Pengembangan Surveilans Infeksi Aliran Darah Primer

- a. Pemasangan kateter intravena (I.V.) yang berkaitan dengan:
 - Jenis kanula
 - Metode pemasangan
 - Lama pemasangan kanula
- b. Kerentanan pasien terhadap infeksi.

Pencegahan Infeksi Aliran Darah Primer

Pencegahan IADP terutama ditujukan pada pemasangan dan perawatan I.V.

- a. **Indikasi pemasangan I.V.** hanya dilakukan untuk tindakan pengobatan dan atau untuk kepentingan diagnostik (Kategori I)
- b. **Pemilihan kanula untuk infus primer:**

Kanula plastik boleh digunakan untuk I.V. secara rutin, pemasangan tidak boleh lebih dari 48-72 jam (Kategori I)
- c. **Cuci tangan.**
 1. Cuci tangan harus dilakukan sebelum melakukan pemasangan kanula (Kategori I).
 2. Pada umumnya cuci tangan cukup dengan menggunakan sabun dan air mengalir, tetapi untuk pemasangan kanula vena sentral dan untuk pemasangan melalui insisi, cuci tangan harus menggunakan antiseptik (Kategori I)
- d. **Pemilihan lokasi pemasangan I.V.**

Pada orang dewasa pemasangan kanula lebih baik pada tungkai atas daripada di tungkai bawah, bila perlu pemasangan dilakukan di daerah subklavia atau pada jugular (Kategori I)
- e. **Persiapan pemasangan I.V.**
 1. Tempat yang ditusuk/dipasang kanula harus terlebih dahulu didisinfeksi dengan antiseptik (Kategori I).
 2. Gunakan Jodium tinctur 1-2% atau bisa juga menggunakan khlorheksidine, iodofor, alkohol 70%. Gunakan antiseptik secukupnya dan tunggu sampai kering minimal 30 detik sebelum melakukan pemasangan kanula (Kategori I).

3. Jangan menggunakan heksaklorofen atau campuran semacam benzal-conidium dalam larutan air untuk disinfeksi tempat tusukan (Kategori I).

f. Prosedur setelah pemasangan I.V.

1. Beri salep antiseptik pada tempat pemasangan terutama pada teknik insisi (Kategori I).
2. Kanula difiksasi sebaik-baiknya (Kategori I).
3. Tutuplah dengan kasa steril (Kategori I).
4. Cantumkan tanggal pemasangan di tempat yang mudah terbaca (misalnya pada plester penutup pipa infus). Pada catatan pasien yang bersangkutan tuliskan tanggal dan lokasi pemasangan (Kategori I).

g. Perawatan tempat pemasangan I.V.

1. Tempat tusukan diperiksa setiap hari untuk melihat kemungkinan timbulnya komplikasi tanpa membuka kasa penutup yaitu dengan cara meraba daerah vena tersebut (Kategori I).

Bila ada demam yang tidak bisa dijelaskan dan ada nyeri tekan pada tempat tusukan, barulah kasa penutup dibuka untuk melihat kemungkinan komplikasi (kategori I)

2. Bila kanula harus dipertahankan untuk waktu lama, setiap 48-72 jam kasa penutup harus diganti dengan kasa steril yang baru (kategori I)
3. Bila pada waktu pemasangan kanula, tempat pemasangan diberi antiseptik, maka pada setiap penggantian kasa

penutup, tempat pemasangan diberi antiseptik kembali (Kategori II).

h. Penggantian kanula.

1. Jika pengobatan I.V. melalui infus perifer (baik menggunakan heparin atau yang dipasang melalui insisi), bila tidak ada komplikasi yang mengharuskan mencabut kanula maka kanula harus diganti setiap 48-72 jam secara aseptis (Kategori I)
2. Jika penggantian tidak mengikuti teknik aseptik yang baik, maka harus diganti secepatnya (Kategori I).

i. Kanula Sentral.

1. Kanula sentral harus dipasang dengan teknik aseptik (Kategori I).
2. Kanula sentral harus segera dilepas bila tidak diperlukan lagi atau diduga menyebabkan sepsis (Kategori I).
3. Kanula sentral dipasang melalui vena jugular dan subklavia kecuali di-gunakan untuk memantau tekanan vena sentral, tidak harus diganti secara rutin (Kategori I).
4. Kanula sentral dipasang melalui vena perifer harus diperlakukan seperti kanula perifer tersebut di atas (Kategori I).
5. Bia kanula sentral dpertahankan lebih lama, kasa penutup harus diperiksa dan diganti setiap 48-72 jam (Kategori II).

j. Pemeliharaan Peralatan.

1. Pipa I.V. termasuk kanula *piggy-back* harus diganti setiap 48 jam (Kategori I).
2. Pipa yang digunakan untuk hiper-alimentasi harus diganti setiap 24-48 jam (Kategori I).
3. Pipa harus diganti sesudah memanipulasi pemberian darah, produk-produk darah, atau emulsi lemak (Kategori III)
4. Pada setiap penggantian komponen sistim I.V. harus dipertahankan tetap tertutup. Setiap kali ingin memasukkan obat melalui pipa, harus dilakukan disinfeksi sesaat sebelum memasukkan obat tersebut (Kategori II).
5. Pengambilan bahan pemeriksaan darah melalui pipa I.V. tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat atau pipa akan segera dilepas (Kategori II).

k. Penggunaan Komponen Sistim Intravena dalam Keadaan Infeksi atau Plebitis

Jika dari tempat tusukan keluar pus atau terjadi sellulitis atau flebitis tanpa gejala-gejala infeksi pada tempat I.V. atau diduga bakteriemia yang berasal dari kanula, maka semua sistim harus dicabut (Kategori II).

l. Pemeriksaan untuk Infeksi yang dicurigai karena I.V.

Bila dicurigai terjadi infeksi karena pemasangan I.V. seperti tromboflebitis purulen, bakteriemia, maka dilakukan pemeriksaan biakan darah dari ujung kanula.

Cara pengambilan bahan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kulit tempat tusukan harus dibersihkan dan didisinfeksi dengan alkohol, biarkan sampai kering.
2. Kanula dilepas, ujung kanula dipotong secara aseptik kira-kira 1 cm untuk dibiak dengan teknik semi-kuantitatif (Kategori II).
3. Jika sistim I.V. dihentikan karena kecurigaan adanya kontaminasi cairan, maka cairan infus harus dibiak dan sisa isi botol diamankan (Kategori I).
4. Jika sistim I.V. dihentikan oleh karena kecurigaan adanya bakteriemia akibat I.V., maka harus dilakukan biakan dari cairan infus (Kategori II).
5. Jika terbukti bahwa cairan terkontaminasi, maka botol lain dan isinya dengan nomor lot yang sama harus dicatat (Kategori I).
6. Jika kontaminasi dicurigai berasal dari pabrik (*Intrinsic contamination*), maka secepatnya harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan (Kategori I).

m. Kendali Mutu Selama dan sesudah pencampuran cairan Parenteral.

1. Cairan parenteral dan hiper-alimentasi harus dicampur di bagian farmasi, kecuali bila karena kepentingan klinis, pencampuran bisa dilakukan di ruangan pasien (Kategori II).
2. Tenaga pelaksana harus mencuci tangan sebelum mencampur cairan parenteral (Kategori I).

3. Sebelum mencampur dan menggunakan cairan parenteral, semua wadah harus diperiksa untuk melihat adanya kekeruhan, kebocoran, keretakan, dan partikel tertentu dan tanggal kadaluwarsa. Bila didapatkan keadaan tersebut di atas, cairan tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke bagian farmasi, yang kemudian dari bagian farmasi tidak boleh dikeluarkan lagi (Kategori I).
4. Ruangan di bagian farmasi tempat mencampur cairan parenteral tersebut harus memiliki pengatur udara laminar (laminar flowhood) (Kategori II).
5. Sebaiknya dipakai wadah yang berisi cairan dengan dosis tunggal (sekali pakai). Bila dipakai bahan parenteral dengan dosis ganda (untuk beberapa kali pakai) dan wadah tempat sisanya harus diberi tanda tanggal dan jam kapan dibuka.
6. Label wadah harus diperiksa untuk mengetahui apakah perlu dimasukkan ke lemari es atau tidak.

5. SEPSIS KLINIS (CLINICAL SEPSIS)

Letak infeksi : Sepsis Klinis

Kode : BSI-CSEP

Defenisi : Sepsis klinis harus memenuhi paling sedikit *salah satu* dari kriteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Ditemukan <i>salah satu</i> diantara	Ditemukan pada pasien berumur satu tahun paling sedikit <i>salah satu</i>

<p>gejala berikut tanpa penyebab lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu > 38 °C, bertahan minimal 24 jam dengan atau tanpa pemberian antipiretika. - Hipotensi (sistolik \geq90 mm Hg - Oliguri dengan jumlah urin (< 20 ml / jam atau <0,5 cc/kg BB/ jam. <p><i>Dan</i></p> <p>Semua gejala/ tanda yang di sebut di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biakan darah tidak dilakukan atau tidak diketemukan kuman atau antigen dalam darah. 2. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi di tempat lain. 3. Telah diberikan anti mikroba sesuai dengan sepsis. 	<p>gejala/tanda berikut tanpa di ketahui ada penyebab lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam (>38°C) - Hipotermia (<37°C) - Apnea - Atau bradikardia <100x/ menit. <p><i>Dan</i></p> <p>Semua gejala/ tanda di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biakan darah tidak di lakukan atau tidak diketemukan kuman atau antigen dalam darah. 2. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi di tempat lain. 3. Diberikan terapi antimikroba sesuai dengan sepsis
--	---

Catatan:

Laporkan infeksi darah dengan kultur yang positif sebagai BSI-LCBI

6. OSTEOMYELITIS

Letak infeksi : Osteomyelitis

Kode : BJ-BONE

Defenisis : Osteomyelitis harus memenuhi paling sedikit *satu* criteria berikut ini :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Terdapat kuman dari hasil biakan tulang.	Terdapat bukti adanya osteomyelitis yang di temukan pada pemeriksaan langsung (di-rect) tulang pa-da waktu pem-bedahan atau pemeriksaan histopatologis	<p>Pada pasien terdapat paling sedikit <i>dua</i> dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam (>38°c) - Bengkak setempat - nyeri tekan - Hangat, atau <p>Terdapat drainase pada tempat yang di curigai infeksi tulang</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit <i>satu</i> dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat kuman dari biakan darah. 2) Bukti radiologis adanya infeksi, misal: tanda abnormal pada X-ray, CT-scan, MRI, radio label scan, (gallium, technetium, dll).

7. INFEKSI SENDI DAN BURSA

Letak Infeksi : Sendi dan bursa

K o d e : BJ - JNT

Definisi : Infeksi sendi atau bursa harus paling sedikit memenuhi **satu** kreteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Ditemukan bakteri pada biakan cairan sendi atau biopsi synovial.	Ditemukan bukti adanya infeksi sendi atau bursa yang terlihat pada waktu pembedahan atau pada pemeriksaan histopatologis.	Pada pasien terdapat paling sedikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya: <ul style="list-style-type: none">- nyeri sendi- bengkak- nyeri tekan- hangat- terdapat effusi atau pembatasan gerak <i>Dan</i> Paling sedikit satu dari berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan bakteri dan sel-sel leu-kosit pada preparat gram dari cairan sendi.2. Bukti radiologis adanya

		infeksi, misalnya: tanda abnormal pada X-ray, CT scan, MRI, radio label scan, (gallium, technetium, dll)
--	--	--

8. INFEKSI RUANG DISKUS

Letak infeksi: Ruang discus

K o d e : BJ-DISC

Definisi : Infeksi discus vertebralis harus memenuhi paling sedikit *satu* kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4
Ditemukan bak-teri pada hasil biakan jaringan discus vertebralis yang dida-pat pada waktu pembedahan atau dengan as-pirasi jarum.	Ditemukan buk-ti infeksi discus vertebralis yang dilihat selama pembedahan atau pemerik-saan histopa-tologis.	Pasien menderita demam (>38°C) tanpa diketahui ada penyebab lain, atau nyeri pada ruang discus vertebralis yang terkena, <i>Dan</i> Tanda infeksi pada	Pasien menderita de-mam (>38°C) tanpa diketahui ada penye-bab lain atau nyeri pada ruang discus ver-tebralis yang terkena,

		pemeriksaan radio-logis X-ray, CT-scan, MRI, radio-label scan dengan gallium atau tech-netium.	
--	--	--	--

9. INFEKSI INTRAKRANIAL

Letak infeksi : Infeksi intrakranial (Abses otak, infeksi subdural atau epidural).

K o d e : CNS-IC

Definisi : Infeksi intrakranial harus memenuhi paling sedikit *satu* kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4
Ditemukan bakteri pada biakan jaringan otak atau durameter.	Terdapat absces atau bukti adanya infeksi intrakranial yang terlihat pada waktu pemeriksaan histopatologis.	Pada pasien terdapat paling sedikit <i>dua</i> dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa adanya penyebab lain: - nyeri/sakit kepala	Pasien berumur > 1 tahun menunjukkan paling sedikit <i>dua</i> tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya: - demam

		<ul style="list-style-type: none"> - pusing - demam (> 38°C) - tanda-tanda neuro-logis yang terlokalisasi. - Atau perubahan derajat kesadaran atau kebingungan. <p><i>Dan</i></p> <p>Bila diagnosis dibuat antemortem, dokter mulai memberikan terapi antimikroba yang sesuai.</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit satu</p>	<p>(>38°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> - hipotermia (<37°C) - Apnea - Bradikardia - Tanda-tanda neurologis yang terlokalisir - Atau perubahan derajat kesadaran. <p><i>Dan</i></p> <p>Bila diagnosis dibuat antemortem, dokter mulai memberikan terapi antimikroba yg sesuai.</p>
--	--	---	---

		<p>dari berikut:</p> <p>Ditemukan bakteri pada pemeriksaan mikroskopis jaringan otak atau abses yang diambil dengan aspirasi jarum atau biopsi pada waktu pembedahan atau otopsi.</p>	<p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit satu dari yang berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan bakteri pada pemeriksaan mikroskopis jaringan otak atau abses yang diambil dengan aspirasi jarum atau biopsi pada saat pembedahan atau otopsi. 2. Bukti radiologis adanya infeksi, misalnya tanda abnormal pada ultrasound,
--	--	---	--

			CT scan, MRI, radio-nuclide brain scan, atau arteriogram.
--	--	--	---

Petunjuk Pelaporan

Bila terdapat meningitis dan abses otak bersamaan, laporkan infeksi sebagai IC.

10. MENINGITIS ATAU VENTRIKULITIS

Letak infeksi : Meningitis atau ventrikulitis

K o d e : CNS-MEN

Definisi : Meningitis atau ventrikulitis harus memenuhi paling sedikit *satu* kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Ditemukan bakteri pada biakan cairan serebro-spinalis (CSF).	Pada pasien diatemukan paling sedikit <i>satu</i> dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - demam (>38°C) - nyeri / sakit kepala 	Pasien berumur ≤ 1 tahun mendapat paling sedikit <i>satu</i> tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - demam (>38°C) - hipotermia (<37°C)

	<ul style="list-style-type: none"> - kaku kuduk - meningeal signs - cranial nerve signs - atau iritabilitas <p><i>dan</i></p> <p>Bila diagnosis dibuat antemor-tem, dokter mulai memberikan terapi anti-microbial yang sesuai.</p> <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sel-sel lekosit meningkat, peningkatan protein dan/ atau penurunan glukosa di CSF, 2. Bakteri terlihat pada pre-parat Gram dari CSF. 3. Ditemukan bakteri pada darah. 	<ul style="list-style-type: none"> - apnea - bradikardia - meningeal signs - cranial nerve signs - atau iritabilitas <p><i>Dan</i></p> <p>Bila diagnosis dibuat ante-mortem, dokter mulai mem-berikan terapi anti-mikroba yang sesuai.</p> <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari yang berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan CSF positif dengan peningkatan sel-sel lekosit, peningkatan protein dan atau penu-runan glukosa dalam CSF. 2. Bakteri ditemukan
--	--	---

		<p>pada preparat Gram CSF.</p> <p>3. Bakteri ditemukan pada darah.</p>
--	--	--

Petunjuk Pelaporan

- Laporkan meningitis pada neonatus sebagai nosokomial, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa meningitis telah didapat secara transplasental.
- Laporkan infeksi CSF shunt (V-P shunt) sebagai **SSI-MEN** bila terjadinya dalam satu tahun pemasangan, bila lebih lama, laporkan sebagai CNS-MEN.
- Laporkan meningoensefalitis sebagai MEN.
- Laporkan abses spinal dengan meningitis sebagai MEN.

11. MATA (Selain Conjunctivitis)

Letak : Mata, selain conjunctivitis

Kode : EENT-EYE

Defenisi : Infeksi pada mata, selain conjunctivitis, harus memenuhi paling sedikit satu criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2
-------------------	-------------------

<p>Terdapat kuman pathogen yang dibiakkan dari cairan vitreous pada kamera anterior dan posterior.</p>	<p>Pada pasien terdapat paling se-dikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyeri pada mata - Gangguan penglihatan - Atau hipopion <p style="text-align: center;">Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter mendiagnosa sebagai infeksi mata. 2. Ditemukan bakteri dari biakan darah.
--	--

12. TELINGA MASTOID

Letak Infeksi : Telinga, mastoid

Kode : EENT-EAR

Defenisi : Infeksi pada telinga dan mastoid harus memenuhi criteria berikut :

- a. **Otitis eksterna harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :**

KRITERIA 1	KRITERIA 2
<p>Terdapat kuman patogen yang di-biarkan dari drainage purulent dari saluran telinga.</p>	<p>Terdapat paling sedikit satu dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab yang lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam ($>38^{\circ}\text{C}$) - Nyeri - Kemerahan - Atau drainase dari saluran telinga <p>Dan</p> <p>Terdapat kuman yang terlihat dengan pengecatan Gram pada drainage purulent</p>

b. Otitis media harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2
<p>Terdapat kuman yang dibiakkan dari drainage purulent dari telinga tengah (middle ear) yang diambil dengan cara tympanocentesis atau pada waktu pembedahan.</p>	<p>Terdapat paling sedikit satu dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab yang lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam ($>38^{\circ}\text{C}$) - Nyeri pada gendang telinga

	<ul style="list-style-type: none"> - Inflamasi - Reaksi atau penurunan gendang telinga - Atau cairan dibelakang telinga - Atau drainase dari cairan
--	---

c. Otitis interna harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Terdapat kuman yang dibiakkan da-ri cairan bagian dalam telinga yang diambil pada waktu pembedahan.	Dokter mendiagnosa sebagai infeksi bagian dalam telinga.

d. Mastoiditis harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Terdapat kuman yang dibiakkan dari drainage purulent dari mastoid.	<p>Terdapat paling sedikit satu dari ta-da-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab yang lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam (>38°C)

	<ul style="list-style-type: none"> - Nyeri - Nyeri tekan - Aritema - Sakit kepala - Atau paralysis facialis <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut :</p> <p>Terdapat kuman pada pengecatan Gram dari bahan-bahan purulent dari mastoid.</p>
--	--

13. RONGGA MULUT (Mulut, lidah, atau gusi)

Letak Infeksi : Rongga mulut (mulut, lidah, atau gusi)

Kode : EENT-ORAL

Defenisi : Infeksi pada rongga mulut harus memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Terdapat kuman patogen yang dibiakkan dari bahan purulent dari jaringan	Pasien menderita abses atau terdapat bukti adanya infeksi rongga mulut yang terlihat	Terdapat paling sedikit satu dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada

<p>atau rongga mulut.</p>	<p>pada pemeriksaan langsung, selama pembe-dahan, atau selama peme-riksaan histopatologis</p>	<p>penyebab lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abses - Ulserasi - Atau bercak putih yang menonjol pada glukosa yang mengalami imflamasi - Atau plague pada mukosa mulut <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kuman pa-da pengecatan gram. 2. Pengecatan KOH (potassium hydroxide) positif. 3. Multinucleated giant cells yang terlihat pada pemeriksaan mikroskopik kerokan mukosa. 4. Dokter mendiagnosa infeksi dan mem-
---------------------------	---	---

		be-rikan pengobatan de- ngan anti jamur topi-cal atau oral.
--	--	--

Petunjuk Pelaporan

Laporkan infeksi nosokomial herpes virus primer sebagai ORAL,
infeksi herpes virus recurrent bukan infeksi nosokomial.

14. INFEKSI SALURAN NAFAS BAGIAN ATAS

Letak infeksi : Infeksi saluran nafas atas, pharyngitis, laryngitis,
epiglottitis

Kode : EENT-UR

Defenisi : Infeksi saluran napas atas harus memenuhi
paling sedikit satu dari kriteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Terdapat paling sedikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya : - Demam (>38°C) - Eritema - Nyeri pharynx,	Terdapat abses yang terlihat pada pemeriksaan langsung selama pembe-dahan, atau pemeriksaan histopatologis	Pada pasien yang ber-umur 1 tahun terdapat dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya : - Demam (>38°C) - Hipotermia (<37°C) - Apnea

<p>tenggorok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batuk - Suara serak <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut:</p> <p>Terdapat kuman pada pembiakan dari tempat yang spesifik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kuman dari biakan darah. 2. Dokter mendiagnosa infeksi dan membe-rikan pengobatan de-ngan antibiotika. 		<ul style="list-style-type: none"> - Bradikardia - Meler (nasal discharge) - Atau eksudat purulen di tenggorok <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bakteri pada pembiakan dari tempat yang spesifik 2. Terdapat kuman dari biakan darah. 3. Dokter mendiagnosa infeksi saluran nafas atas.
--	--	--

15. GASTROENTERITIS

Letak Infeksi : Gastroenteritis

Kode : GI-GE

Defenisi : Gastroenteritis harus memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	UNTUK NEONATUS
<p>Pasien mendapat serangan akut diarrhea (Berak cair selama lebih dari 12 jam) dengan atau tanpa muntah atau demam (>38°C) dan tampaknya disebabkan bukan oleh penyebab non-infeksius (mis: test diag-nostik, regimen pengobat-an, eksaserbasi akut dari keadaan kronis, atau stress psikologis).</p>	<p>Terdapat paling sedikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang berikut tanpa ada penyebab yang lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nausea (mual) - Muntah - Nyeri perut - Sakit kepala <p>Dan Paling sedikit satu dari hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan bakteri pa-togen enterik pada bi-akan tinja (stool) atau hapusan rektum 2. Bakteri patogen en-terik ditemukan pada pemeriksaan mikros-kop rutin atau elek-tron 	<p>Dikatakan menderita gastroenteritis apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hipertermi, suhu > 38° C, rektal atau hi-potermi suhu <37°C, rektal. 2. Kembung 3. Bising usus mening-kat atau menurun . 4. Muntah <p>Pada pemeriksaan mik-roskopis tinja ditemu-kan >5 per lapangan pandang, eriktrosik >2/ lapangan pandang be-sar.</p>

CATATAN	FAKTOR RESIKO GASTROENTERITIS
Gastroenteritis pada neonatus yang lahir di rumah sakit selalu dianggap sebagai gastroenteritis nosokomial.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bayi dan anak usia 6 s/d 24 bulan b. Geriatrik c. Pasien anak dengan pengganti ASI (PASI) d. Gangguan fungsi imunologi e. Debilitas

16. INFEKSI TRAKTUS DIGESTIVUS

Letak infeksi : Infeksi traktus digestifus (esophagus,gaster, usus kecil, usus besar, dan rectum) tidak termasuk gastroenteritis dan appenditis

Kode : GI-GIT

Defenisi : Infeksi traktus digestifus,tidak termasuk gastroenteritis dan appenditis,harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Pasien menderita abses atau bukti lain adanya infeksi yang terlihat	Terdapat paling sedikit dua dari tandatandan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab yang lainnya dan sesuai

<p>pada waktu pembedahan atau pemeriksaan histopatologis.</p>	<p>dengan organ atau jaringan yang terkena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam ($>38^{\circ}\text{C}$) - Neusea (mual) - Muntah - Nyeri perut - Atau nyeri tekan <p>Dan</p> <p>Paling sedikit satu dari berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan bakteri pada biakan drainase atau jaringan yang diambil pada waktu pembedahan atau endoskopi, atau dari drain yang dipasang secara bedah. 2. Bakteri terlihat pada pemeriksaan mikroskopik pada pengecatan Gram atau KOH atau terlihat multinucleated giant cells dari drainase atau jaringan yang diambil pada waktu pembedahan atau endoskopi atau drain yang dipasang secara bedah. 3. Terdapat bakteri dari biakan darah. 4. Bukti kelainan patologis pada
---	---

	<p>pemeriksaan radiologis</p> <p>5. Bukti kelainan patologis pada pemeriksaan endoskopik (mis; Candida esofagitis atau proctitis).</p>
--	--

17. HEPATITIS

Letak infeksi : Hepatitis

Kode : GE-HEP

Defenisi : Hepatitis harus memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut :

KRITERIA
<p>Terdapat paling sedikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa ada penyebab lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam (>38°C) - Anorexia - Neusea (mual) - Muntah - Nyeri perut - Jaundice - Atau riwayat transfusi dalam waktu 3 bulan sebelumnya

Dan

Paling sedikit satu dari berikut

1. Test antigen atau antibody positif untuk hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C atau delta hepatitis
2. Test fungsi liver abnormal (mis: peningkatan ALT/ AST, bilirubin).
3. Cytomegalovirus (CMV) terdeteksi di urine atau sekresi orofaringeal.

Petunjuk Pelaporan:

- Jangan dilaporkan sebagai hepatitis atau jaundice yang non-infeksius (mis: defisiensi alpha-1 anti trypsin).
- Jangan dilaporkan sebagai hepatitis atau jaundice yang disebabkan terpapar oleh hepatotoksin (alcoholik atau acetaminophen – induced hepatitis,dll).
- Jangan dilaporkan sebagai hepatitis atau jaundice yang disebabkan oleh obstruksi bilier (cholecystitis).

18. INTRA-ABDOMINAL

Letak infeksi : Intra-abdominal, termasuk kandungan empedu, ductus chole-dochus, liver (tidak termasuk hepatitis virus), limpa, pancreas, peritoneum, ruang subphrenic atau subdiaphragmatika, atau jaringan intra-abdominal yang lain atau daerah yang tidak di-jelaskan di tempat lain).

Kode : GI-IAB

Defenisi : Infeksi intra-abdominal harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Detemukan bakteri pd biakan cairan purulent dari rongga intra-ab-dominal yang diambil pada waktu pembedah-an atau dengan aspirasi jarum.	Terdapat abses atau bukti lain adanya in-feksi intra-abdominal yg terlihat pada waktu pembedahan atau peme-riksaan histopatologis.	Pasien mengalami pa-ling sedikit dua dari tan-da-tanda atau gejala-ge-jala berikut tanpa di-ke-tahui ada penyebab yang lain : <ul style="list-style-type: none">- Jaundice (>38°C)- Nausea (mual)- Muntah- Nyeri perut Dan Paling sedikit satu dari keadaan berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan bakteri dari biakan cairan yg keluar dari drain yang dipasang secara bedah (misal: redon drain, drain terbuka, T-

		<p>tube drain).</p> <p>2. Ditemukan bakteri dari biakan cairan drain atau jaringan yang diambil waktu pembedahan atau aspirasi jarum.</p> <p>3. Ditemukan bakteri dari biakan darah dan bukti radiografi adanya infeksi, misalnya: gambaran abnormal pada ultrasound, CT scan, MRI, atau radio-label scan (misal: gallium, technetium) atau pada pemeriksaan sinar-x.</p>
--	--	---

Petunjuk Pelaporan

Jangan melaporkan pancreatitis (sindroma peradangan yang khas ditandai dengan nyeri abdomen, mual dan muntah yang disertai

dengan kadar enzim pankreatik yang tinggi) terkecuali dapat ditentukan itu berasal dari infeksi.

19. NECROTIZING ENTEROCOLITIS

Letak infeksi : Necrotizing enterocolitis

Kode : GI-NEC

Defenisi : Necrotizing enterocolitis pada anak harus memenuhi criteria berikut ini :

KRITERIA
Anak mengalami paling sedikit dua tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa diketahui ada penyebab yang lain :
<ul style="list-style-type: none">- Muntah- Distensi abdominal- Atau prefeeding residual
Dan
Terdapat darah (mikroskopis atau gross) dalam tinja yang persisten.
Dan
Paling sedikit satu dari kelainan radiologis abdominal berikut :
<ol style="list-style-type: none">1. pneumoperitoneum2. pneumatosis intestinalis3. “rigid” loop usus kecil yang kecil yang tidak berubah.

20. ENDOMETRITIS

Letak infeksi : Endometritis

Kode : REPR-EMET

Definisi : Endometris harus memenuhi paling sedikit satu criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Ditemukan bakteri dari biakan ca-iran atau jaringan endometrium yg diambil pada waktu pembedahan, dengan aspirasi jarum, atau biopsi sikat (brush biopsy).	Pada pasien terdapat paling sedikit dua dari tanda-tanda dan gejala-gejala be-rikut tanpa diketahui penyebab lainnya : <ol style="list-style-type: none">1. Demam (>38°C)2. Nyeri abdominal3. Nyeri tekan uterus4. Atau cairan purulent keluar dari uterus

Petunjuk Pelaporan

Laporkan endometriosis post partum sebagai infeksi nosokomial, kecuali bila cairan amnion telah terinfeksi pada saat masuk rumah sakit atau penderita masuk rumah sakit setelah ketuban pecah 48 jam sebelumnya.

21. EPISIOTOMI

Letak infeksi : Episiotomi

Kode : REPR-EPIS

Defenisi : Infeksi episiotomia harus memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Nampak drainase purulent dari luka episiotomi pada pasien pasca partus per vaginam.	Pasien pasca partus per vaginam menderita abses pada luka episiotomi.

Petunjuk Pelaporan

Episiotomi bukan proses pembedahan NNIS, jangan laporkan sebagai SSI

22. INFEKSI LAIN PADA SALURAN REPRODUKSI

Letak Infeksi : Infeksi lain pada tractus reproduktif laki-laki dan wanita (epididymitis, testis, protat, vagina, ovarium, uterus, atau jaringan pelvis profunda yang lain, tidak termasuk endometritis atau infeksi vaginal cuff)

Kode : REPR-OREP

Defenisi : Infeksi lain pada tractus reproduktif laki-laki dan wanita harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Ditemukan kuman dari biakan jaringan	Ditemukan abses atau bukti lain adanya in-feksi pada	Pasien mempunyai dua dari tanda-tanda

biakan cairan bagian terkena.	atau dari yang atau pemerik-saan histopatologis	daerah yg terkena yang terlihat pada waktu pembe-dahan atau pemerik-saan histopatologis atau ge-jala-gejala berikut tanpa ada sebab lainnya : - Demam (>38°C) - Mual - Muntah - Nyeri - Nyeri tekan atau disuria Dan Paling sedikit satu dari berikut : 1. Bakteri pada biakan darah 2. Diagnosis dari dokter
-------------------------------	---	---

Petunjuk Pelaporan

- . Laporkan endometritis sebagai EMET
- . Laporkan infeksi vaginal cuff sebagai VCUF

23. INFEKSI JARINGAN LUNAK

Letak infeksi : Soft tissue (necrotizing fasciitis, infectious gangene, necrotizing cellulites, infectious myositis, lymphadenitis, atau lymphangitis)

Kode : SST-ST

Defenisi : Infeksi jaringan lunak harus memenuhi paling sedikit *satu* dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4
Ditemukan bakteri dari biakan jaringan atau drainage dari daerah yg terkena.	Pasien menda-pat drainage pu-rulent dari dae-rah yang terke-na.	Terdapat abses atau bukti lain adanya infeksi yang tam-pak pada waktu pembedahan atau pemeriksaan histo-patologis.	Terdapa paling se-dikit <i>dua</i> dari tan-da-tanda atau ge-jala-gejala pada da-erah yang terkena berikut tanpa dike-tahui adanya penye-bab lainnya: - Nyeri atau nyeri tekan lokal - Kemerahan - Bengkak - Atau hangat <i>Dan</i> Paling sedikit <i>satu</i> dari berikut: Ditemukan bak-teri dari biakan darah

Petunjuk Pelaporan

- Laporkan ulkus yang terinfeksi (decubitus) sebagai DECU.
- Laporkan infeksi jaringan pelvis propunda sebagai OREP
- Laporkan infeksi ditempat pembedahan yang mengenai baik kulit maupun jaringan lunak yang dalam (dada atau dibawah fascia atau lapisan otot) sebagai SSI-ST, terkecuali prosedur pembedahan dalam CBGB. Bila kulit dan jaringan lunak yang dalam pada insisi dada menjadi terinfeksi, tempat spesifik menjadi STC dan jika kulit dan jaringan lunak dalam dari tempat donor pada kaki menjadi terinfeksi, tempat spesifik adalah STL (specific site leg).

24. INFEKSI ULKUS DEKUBITUS

Letak Infeksi : Decubitus ulcer, termasuk superficial dan profunda (dalam)

Defenisi : Infeksi ulcus decubitus harus memenuhi criteria berikut:

KRITERIA
Terdapat paling sedikit <i>dua</i> dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa diketahui ada penyebab lainnya: <ul style="list-style-type: none">- Kemerahan- Nyeri tekan- Atau bengkak pada pinggir luka decubitus <p><i>Dan</i></p>

Paling sedikit *satu* dari berikut:

1. Ditemukan bakteri pada biakan cairan atau jaringan yang diambil secara benar (lihat dibawah).
2. Ditemukan bakteri pada biakan darah

Catatan :

- a. Drainage purulent saja tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya infeksi.
- b. Bakteri yang ditemukan pada biakan permukaan ulkus dekubitus tidak cukup kuat untuk memuktikan bahwa ulkus terinfeksi. Specimen yang diambil secara benar adalah dengan cara aspirasi jarum dari cairan atau biopsi jaringan pada daerah perbatasan ulkus.

25. DESSEMINATED INFECTION

Letak infeksi: Infeksi yang menyebar (disseminated infection)

K o d e : SYS-DI

Definisi : *Disseminated infection* adalah infeksi yang mengenai organ atau sistim yang multipel, tanpa ada infeksi ditempat yang jelas, biasanya penyebabnya viral dandengan tanda-tanda dan gejala-gejala yang tidak diketahui ada penyebab dan menjadi coklat gelapatau hitam atau perubahan warna (diskompatibel dengan keterlibatan yang infeksius dari organ-organ atau sistim multipel.

Petunjuk Pelaporan

- Kode harus digunakan primer untuk infeksi viral yang mengenai sistim organ yang multipel, (misalnya: measles, mumps, rubella, varicella, erythema infectiosum). Infeksi-infeksi dapat diidentifikasi dengan kriteria klinik saja. Jangan menggunakan kode ini untuk infeksi nosokomial dengan tempat-tempat metastatik, seperti bakterial endokarditis, hanya letak primer dari infeksi tersebut harus dilaporkan.
- *Fever of unknown origen* (FUO) sebaiknya tidak dilaporkan sebagai SYS-DI.
- *Neonatal sepsis*, harus dilaporkan sebagai BSI-CSEP
- *Viral exanthem*, atau rash illness sebaiknya dilaporkan sebagai SYS-DI.

26. INFEKSI LUKA BAKAR

Letak infeksi : Luka bakar (burn)

Kode : SST-BURN

Defenisi : Infeksi luka bakar harus memenuhi paling sedikit *satu* dari criteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Terdapat perubahan pada penampakan atau	Terdapat perubahan pada penampakan atau	Terdapat paling sedikit dua dari tanda-tanda dan

<p>karakter luka bakar, seperti pemi-sahan eschar yang cepat atau eschar menjadi coklat gelap atau hitam atau perubahan warna (discoloration) yang hebat atau edema pada perbatasan luka</p> <p>Dan</p> <p>Pemeriksaan histologis dari diopsi luka bakar menunjukkan invasi kuman ke-dalam jaringan berdekatan yang sehat.</p>	<p>karakter luka bakar seperti pemi-sahan, eschar yang cepat atau eschar menjadi cok-lat gelap atau hitam atau perubahan warna (discoloration) yang hebat atau edema pada perbatasan luka</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Terdapat kuman dari biakan darah dan tidak terdapat infeksi lain.</p>	<p>gejala-gejala berikut tanpa diketahui ada penyebab lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demam ($>38^{\circ}\text{C}$) - Hipotermia ($<36^{\circ}\text{C}$) - Oliguria (<20 ml/jam) - Hipotensi - Hiperglikemia dengan diet karbohidrat pada lefel yang sebelumnya dapat ditolelir dengan mental confusion <p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit <i>satu</i> dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bakteri dari biakan darah
--	--	---

		<p>dan ti-dak terdapat infeksi lain.</p> <p>2. Bakteri dari biakan darah.</p>
--	--	---

Catatan

- Purulent saja pada tempat luka bakar tidak cukup kuat untuk diagnosis infeksi luka bakar, purulent seperti itu mungkin menunjukkan perawatan luka yang kurang baik.
- Demam saja pada pasien luka bakar tidak cukup kuat untuk diagnosis infeksi luka bakar karena demam mungkin merupakan akibat trauma jaringan atau mungkin pasien mendapat infeksi ditempat lain.
- Ahli bedah pada regional burn center yang eksklusif merawat pasien luka bakar, mungkin memerlukan kriteria satu untuk diagnosis infeksi luka bakar.
- Rumah sakit dengan regional burn center mungkin membedakan infeksi luka bakar lebih lanjut sebagai berikut :
 - Burn wound site
 - Burn graft site
 - Burn donor site
 - Burn donor site-cadaver
 - Tetapi sistim NNIS hanya memberi kode semuanya Sebagai BURN.

27. ABSCES BUAH DADA ATAU MASTITIS

Letak Infeksi : Breast abscess atau Mastitis

Kode : SST-BRST

Defenisi : Abses buah dada atau mastitis harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Biakan positif dari ja-ringan buah dada yang terkena atau cairan yang diambil dengan cara insisi dan drainase atau aspirasi jarum.	Pasien menderita abses buah dada atau bukti lain adanya infeksi yang tam-pak pada waktu pembe-dahan atau pemeriksaan histopatologis.	Pasien mengalami de-mam ($>38^{\circ}\text{C}$) dan ke-radangan lokal pada buah dada Purulent saja pada tem-pat luka, tidak cukup kuat untuk diagnosis infeksi <i>Dan</i> Dokter mendiagnosa seba-gai abses buah dada.

Catatan :

Abses buah dada yang timbul dalam waktu 7 hari setelah melahirkan harus dianggap sebagai infeksi nosokomial.

28. OMPHALITIS

Letak infeksi : Omphalitis

Kode : SST-UMB

Defenisi : Omphalitis pada neonatus (umur 30 hari) harus memenuhi paling sedikit satu criteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2
<p>Pasien mengalami eritema dan atau drainage serous dari umbilicus</p> <p><i>Dan</i></p> <p>Paling sedikit dari satu berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bakteri ditemukan dari biakan drainage atau aspirasi jarum2. Bakteri ditemukan dari biakan darah.	<p>Pasien mengalami baik eritema maupun drainage purulent pada umbilicus.</p>

Petunjuk Pelaporan

Laporkan infeksi dari arteria umbilicalis atau vena yang berhubungan dengan kateterisasi sebagai CVS-VASC bila biakan darah negatif atau tidak dikerjakan

29. PUSTOLOSIS PADA ANAK

Letak infeksi : Infant pustulosis

K o d e : SST-PUST

Definisi : Pustulosis pada anak (Umur 12 bulan) harus memenuhi paling sedikit *satu* kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Anak menderita satu atau lebih pustules	Anak menderita satu atau lebih pustule
<i>Dan</i>	<i>Dan</i>
Dokter mendiagnosis sebagai infeksi kulit.	Dokter memberikan terapi antimikrobal yang sesuai.

Petunjuk Pelaporan

- Jangan melaporkan eritema toksikum dan oleh penyebab non-infeksius dan pustulosis.
- Laporkan sebagai nosokomial apabila pustulosis timbul dalam waktu 7 hari setelah keluar dari rumah sakit.

30. INFEKSI PADA SIRKUMSISI NEONATUS

Letak infeksi : Newborn circumcision

Kode : SST-CIRC

Defenisi : Infeksi sirkumsisi pada neonatus (umur <30 hari) harus memenuhi paling sedikit satu dari criteria berikut :

KRITERIA1	KRITERIA 2	KRITERIA 3
Pasien mengalami drain-age purulent dari tempat sirkumsisi	Pasien neonatus men-dapat paling sedikit sa-tu dari tanda-tanda dan gejala-gejala berikut tanpa diketahui ada penyebab lainnya pada tempat sirkumsisi : <ul style="list-style-type: none">- Eritema- Bengkak- Atau nyeri tekan Dan Ditemukan bakteri dari lokasi luka sirkumsisi	Pasien neonatus men-dapat paling sedikit satu dari tan-da-tanda dan gejala-gejala berikut pada tempat sirkumsisi, tanpa diketa-hui ada penyebab lain-nya: <ul style="list-style-type: none">- Eritoma- Bengkak- Atau nyeri tekan Dan Ditemukan kontami-nan kulit (coagulase negatif streptococci, diphtheroid, bacillus sp, atau micro-cocci) dari biakan dilokasi sirkumsisi

		<p>Dan</p> <p>Dokter mendiagnosa infeksi atau dokter memulai terapi yang sesuai.</p>
--	--	--

Petunjuk Pelaporan

Newborn circumcision bukan merupakan prosedur pembedahan NNIS, jangan dilaporkan sebagai SSI.

31. KULIT

Letak infeksi : Kulit

Kode : SST-SKIN

Defenisi : Infeksi kulit harus paling sedikit memenuhi *satu* kriteria berikut:

KRITERIA 1	KRITERIA 2
Pasien mempunyai drainage purulent, pustula, vesicula, tau furunkel.	

D. Epidemiologi Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial banyak terjadi di seluruh dunia dengan kejadian terbanyak di negara miskin dan negara yang sedang berkembang karena

penyakit-penyakit infeksi masih menjadi penyebab utama. Suatu penelitian yang dilakukan oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik tetap menunjukkan adanya infeksi nosokomial dengan Asia Tenggara sebanyak 10,0%.

Walaupun ilmu pengetahuan dan penelitian tentang mikrobiologi meningkat pesat pada 3 dekade terakhir dan sedikit demi sedikit resiko infeksi dapat dicegah, tetapi semakin meningkatnya pasien-pasien dengan penyakit immunocompromised, bakteri yang resisten antibiotik, super infeksi virus dan jamur, dan prosedur invasif, masih menyebabkan infeksi nosokomial menimbulkan kematian sebanyak 88.000 kasus setiap tahunnya walaupun.

Laporan-laporan rumah sakit di Indonesia yang menunjukkan infeksi nosokomial berupa infeksi luka operasi adalah di R.S. Hasan Sadikin Bandung 9,9% (1991, Warko), di R.S. Pirngadi Medan 13,92% (1987), R.S. Dr. Karyadi Semarang 7,3% (1984), R.S.Dr. Soetomo Surabaya 5,32% (1988) dan RSCM 5,4% (1989). Infeksi luka operasi ini semuanya untuk kasus-kasus bersih dan bersih tercemar yang dioperasi.

E. Etiologi

a. Agen Infeksi

Pasien akan terpapar berbagai macam mikroorganisme selama ia dirawat di rumah sakit. Kontak antara pasien dan berbagai macam mikroorganisme ini tidak selalu menimbulkan gejala klinis karena banyaknya faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial. Kemungkinan terjadinya infeksi tergantung pada karakteristik mikroorganisme, resistensi terhadap zat-zat antibiotika, tingkat virulensi, dan banyaknya materi infeksius (Ducel, G, 2002).

Semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur dan parasit dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Infeksi ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang didapat dari orang lain (*cross infection*) atau disebabkan oleh flora normal dari pasien itu sendiri (*endogenous infection*). Kebanyakan infeksi yang terjadi di rumah sakit ini lebih disebabkan karena faktor eksternal, yaitu penyakit yang penyebarannya melalui makanan dan udara dan benda atau bahan-bahan yang tidak steril. Penyakit yang didapat dari rumah sakit saat ini kebanyakan disebabkan oleh mikroorganisme yang umumnya selalu ada pada manusia yang sebelumnya tidak atau jarang menyebabkan penyakit pada orang normal.

Tabel 1. Bakteri Penyebab Infeksi Nosokomial (Tortora *et al.*, 1995)

Bakteri	Persentase(%)
Enterobacteriaceae	>40
S. aureus	11
Enterococcus	10
P. aeruginosa	9

Tabel 2. Mikro organisme Penyebab Infeksi Nosokomial(Tortora *et al.*, 2001)

Mikro organisme	Persentase(%)
<i>S. aureus</i> , Staphylococci koagulase negatif, Enterococci	34
<i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>Enterobacter</i> spp., & <i>K. pneumonia</i>	32
<i>C. difficile</i>	17
Fungi (kebanyakan <i>C. Albicans</i>)	10
Bakteri Gram negatif lain (<i>Acinetobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Haemophilus</i>)	5

b. Respon dan toleransi tubuh pasien

Faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat toleransi dan respon tubuh pasien dalam hal ini adalah umur, status imunitas penderita, penyakit yang diderita, obesitas dan malnutrisi, orang yang menggunakan obat-obatan immunosupresan dan steroid serta intervensi yang dilakukan pada tubuh untuk melakukan diagnosa dan terapi.

Usia muda dan usia tua berhubungan dengan penurunan resistensi tubuh terhadap infeksi kondisi ini lebih diperberat bila penderita menderita penyakit kronis seperti tumor, anemia, leukemia, diabetes mellitus, gagal ginjal, SLE dan AIDS. Keadaan-keadaan ini akan meningkatkan toleransi tubuh terhadap infeksi dari kuman yang semula bersifat oportunistik. Obat-obatan yang bersifat immunosupresif dapat menurunkan pertahanan tubuh terhadap infeksi. Banyaknya prosedur pemeriksaan penunjang dan terapi seperti biopsi,

endoskopi, kateterisasi, intubasi dan tindakan pembedahan juga meningkatkan resiko infeksi.

Bayi mempunyai pertahanan yang lemah terhadap infeksi, lahir mempunyai antibodi dari ibu, sedangkan sistem imunnya masih imatur. Dewasa muda sistem imun telah memberikan pertahanan pada bakteri yang menginvasi. Pada usia lanjut, karena fungsi dan organ tubuh mengalami penurunan, sistem imun jugamengalami perubahan. Peningkatan infeksi nosokomial juga sesuai dengan umur dimana pada usia >65 tahun kejadian infeksi tiga kali lebih sering daripada usia muda.

F. Penilaian yang digunakan untuk Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial disebut juga dengan “*Hospital Acquired Infection*” apabila memenuhi batasan atau kriteria sebagai berikut:

- i. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari infeksi tersebut.
- ii. Pada waktu penderita mulai dirawat tidak dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut.
- iii. Tanda-tanda infeksi tersebut baru timbul sekurang-kurangnya 3×24 jam sejak mulai dirawat.
- iv. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa (residual) dari infeksi sebelumnya.

G. Cara Penularan Infeksi Nosokomial

Cara penularan infeksi nosokomial bisa berupa infeksi silang (*Cross infection*) yaitu disebabkan oleh kuman yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung atau tidak langsung. Infeksi sendiri (*Self infection, Auto infection*) yaitu disebabkan oleh kuman dari penderita itu sendiri yang berpindah tempat dari satu jaringan ke jaringan

yang lain. Infeksi lingkungan (*Environmental infection*) yaitu disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang tidak bernyawa yang berada di lingkungan rumah sakit. Misalnya lingkungan yang lembab dan lain-lain. Menurut James H. Hughes dkk, yang dikutip oleh Misnadiari 1994, tentang model cara penularan, ada 4 cara penularan infeksi nosokomial yaitu kontak langsung antara pasien dan personil yang merawat atau menjaga pasien. Seterusnya, kontak tidak langsung ketika objek tidak bersemangat/kondisi lemah dalam lingkungan menjadi kontaminasi dan tidak didesinfeksi atau sterilkan, sebagai contoh perawatan luka paska operasi. Selain itu, penularan cara *droplet infection* dimana kuman dapat mencapai ke udara (*air borne*) dan penularan melalui vektor yaitu penularan melalui hewan/serangga yang membawa kuman.

H. Pencegahan terjadinya Infeksi Nosokomial

Pencegahan dari infeksi nosokomial ini diperlukan suatu rencana yang terintegrasi, monitoring dan program yang termasuk :

- i) Membatasi transmisi organisme dari atau antara pasien dengan cara mencuci tangan dan penggunaan sarung tangan, tindakan septic dan aseptik, sterilisasi dan disinfektan.
- ii) Mengontrol resiko penularan dari lingkungan.
- iii) Melindungi pasien dengan penggunaan antibiotika yang adekuat, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi.
- iv) Membatasi resiko infeksi endogen dengan meminimalkan prosedur invasif.
- v) Pengawasan infeksi, identifikasi penyakit dan mengontrol penyebarannya.

Terdapat pelbagai pencegahan yang perlu dilakukan untuk mencegah infeksi nosokomial. Antaranya adalah dikontaminasi tangan dimana transmisi penyakit melalui tangan dapat diminimalisasi dengan menjaga hygiene dari tangan. Tetapi pada kenyataannya, hal ini sulit dilakukan dengan benar, karena banyaknya alasan seperti kurangnya peralatan, alergi produk pencuci tangan, sedikitnya pengetahuan mengenai pentingnya hal ini, dan waktu mencuci tangan yang lama. Penggunaan sarung tangan sangat dianjurkan apabila melakukan tindakan atau pemeriksaan pada pasien dengan yang dirawat di rumah sakit.

Simonsen et al (1999) menyimpulkan bahwa lebih dari 50% suntikan yang dilakukan di negara berkembang tidak aman contohnya adalah jarum, tabung atau keduanya yang dipakai secara berulang-ulang. Untuk mencegah penyebaran infeksi melalui jarum suntik maka diperlukan, penggunaan jarum yang steril dan penggunaan alat suntik yang *disposable*. Masker digunakan sebagai pelindung terhadap penyakit yang ditularkan melalui udara. Sarung tangan, sebaiknya digunakan terutama ketika menyentuh darah, cairan tubuh, feses maupun urine. Sarung tangan harus selalu diganti untuk setiap pasiennya, baju khusus juga harus dipakai untuk melindungi kulit dan pakaian selama kita melakukan suatu tindakan untuk mencegah percikan darah, cairan tubuh, urin dan feses.

Pembersihan yang rutin sangat penting untuk meyakinkan bahwa rumah sakit sangat bersih dan benar-benar bersih dari debu, minyak dan kotoran. Administrasi rumah sakit harus ada waktu yang teratur untuk membersihkan dinding, lantai, tempat tidur, pintu, jendela, tirai, kamar mandi, dan alat-alat medis yang telah dipakai berkali-kali. Usahakan pemakaian penyaring udara, terutama bagi penderita dengan status imun yang rendah atau bagi penderita yang dapat menyebarkan penyakit melalui

udara. Kamar dengan pengaturan udara yang baik boleh menurunkan resiko terjadinya penularan tuberkulosis. Selain itu, rumah sakit harus membangun suatu fasilitas penyaring air dan menjaga kebersihan pemrosesan serta filternya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri. *Toilet* rumah sakit juga harus dijaga, terutama pada unit perawatan pasien diare untuk mencegah terjadinya infeksi antar pasien. Permukaan toilet harus selalu bersih dan diberi disinfektan.

Penyebaran dari infeksi nosokomial juga dapat dicegah dengan membuat suatu pemisahan pasien. Ruang isolasi sangat diperlukan terutama untuk penyakit yang penularannya melalui udara, contohnya tuberkulosis, dan SARS, yang mengakibatkan kontaminasi berat. Penularan yang melibatkan virus, seperti HIV serta pasien yang mempunyai resistensi rendah seperti leukimia juga perlu diisolasi agar terhindar dari infeksi. Ruang isolasi ini harus selalu tertutup dengan ventilasi udara yang menuju keluar.

Yang perlu diperhatikan dalam pencegahan infeksi nosokomial luka operasi adalah harus melakukan pemeriksaan terhadap pasien operasi sebelum pasien masuk/dirawat di rumah sakit yaitu dengan memperbaiki keadaan pasien, misalnya gizi. Sebelum operasi, pasien operasi dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur, misalnya pasien harus puasa, desinfeksi daerah operasi dan lain-lain. Pada waktu operasi semua petugas harus mematuhi peraturan kamar operasi yaitu bekerja sesuai SOP (*standard operating procedure*) yaitu dengan perhatikan waktu/lama operasi. Seterusnya, pasca operasi harus diperhatikan perawatan alat-alat bantu yang terpasang sesudah operasi seperti kateter, infus dan lain-lain.

BAB III

KEWASPADAAN UMUM DI RUMAH SAKIT

Kewaspadaan Umum merupakan bagian dari upaya pengendalian infeksi disarana pelayanan kesehatan. Upaya lain yang merupakan kemampuan pengendalian infeksi disarana pelayanan adalah surveilans, upaya penanggulangan KLB, pengembangan kebijakan dan prosedur kerja serta pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dalam hal pencegahan infeksi yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Kebijakan Departemen Kesehatan RI, Kewaspadaan Umum merupakan salah satu upaya pengendalian infeksi di RS yang oleh Departemen Kesehatan telah dikembangkan sejak tahun 1980-an melalui program di Sub Direktorat Isolasi di bawah Direktorat Epidemiologi dan Imunisasi Ditjen P3M saat itu. Dalam perkembangannya program pengendalian Infeksi Nosokomial dikendalikan oleh Sub Direktorat Surveilans dibawah Direktorat yang sama. Mulai tahun 2001 Departemen Kesehatan telah memasukkan Pengendalian Infeksi Nosokomial sebagai salah satu tolak ukur akreditasi RS dimana termasuk didalamnya adalah penerapan Kewaspadaan Standar.

Penerapan Kewaspadaan Umum merupakan bagian pengendalian infeksi yang tidak terlepas dari peran masing-masing pihak yang terlibat didalamnya yaitu pimpinan termasuk staf administrasi, staf pelaksana pelayanan termasuk staf penunjangnya dan juga para pengguna yaitu pasien dan pengunjung sarana kesehatan tersebut. Program ini hanya dapat berjalan bila masing-masing pihak menyadari dan memahami peran dan kedudukan masing-masing.

Tenaga kesehatan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dan orang lain serta bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan pimpinan. Tenaga kesehatan juga bertanggung jawab dalam

menggunakan sarana yang disediakan dengan baik dan benar serta memelihara sarana agar selalu siap pakai dan dapat dipakai selama mungkin. Kewajiban dan tanggung jawab itu meliputi :

- a. Bertanggung jawab melaksanakan dan menjaga keselamatan kerja di lingkungannya, wajib mematuhi instruksi yang diberikan dalam rangka kesehatan, keselamatan kerja, dan membantu mempertahankan lingkungan bersih dan aman.
- b. Mengetahui kebijakan dan menerapkan prosedur kerja, pencegahan infeksi dan mematuhi dalam pekerjaan sehari - hari.
- c. Tenaga kesehatan yang menderita penyakit yang dapat meningkatkan resiko penularan infeksi baik dari dirinya ke pasien atau sebaliknya tidak merawat pasien secara langsung..

Bagi tenaga kesehatan yang mengidap HIV mempunyai kewajiban moral untuk memberitahu atasannya tentang status serologi bila dalam pelaksanaan pekerja status serologi tersebut dapat menjadi resiko pada pasien , misalnya tenaga kesehatan dengan status HIV positif dan menderita eksim basah.

Prinsip utama prosedur kewaspadaan umum dalam hal ini pelayanan kesehatan adalah menjaga hygiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan. Kegiatan prinsip tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan pokok yaitu : Cuci tangan guna mencegah infeksi silang, pemakaian alat pelindung diantaranya pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius yang lain, pengelolaan alat kesehatan bekas pakai, Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan, pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan.

A. Cuci Tangan

Mikroorganisme pada kulit manusia dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu flora risiden dan flora transien. Flora risiden adalah mikroorganisme yang secara konsisten dapat diisolasi dari tangan manusia, tidak mudah dihilangkan dengan gesekan mekanis yang telah beradaptasi pada kehidupan tangan manusia. Flora transien yang juga disebut flora transit atau flora kontaminasi. Mikroorganisme ini dengan mudah dapat dihilangkan dari permukaan dengan gesekan mekanis dan pencucian dengan sabun atau deterjen. Oleh karena itu cuci tangan adalah cara pencegahan infeksi yang paling penting.

Cuci tangan harus selalu dilakukan dengan benar sebelum dan sesudah melakukan tindakan perawatan walaupun memakai sarung tangan atau alat pelindung lain untuk menghilangkan/ mengurangi mikroorganisme yang ada pada tangan sehingga penyebaran penyakit dapat dikurangi dan lingkungan terjaga dari infeksi. Tangan harus dicuci sebelum dan sesudah memakai sarung tangan.

Tiga cara cuci tangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu :

1. Cuci tangan higienik atau rutin, mengurangi kotoran dan flora yang ada ditangan dengan menggunakan sabun atau detergen.
2. Cuci tangan aseptik, sebelum tindakan aseptik pada pasien dengan menggunakan antiseptik.
3. Cuci tangan bedah (*surgical handscrub*), sebelum melakukan tindakan bedah cara aseptik dengan antiseptik dan sikat steril.

Indikasi cuci tangan

Cuci tangan harus dilakukan pada saat yang diantisipasi akan terjadi perpindahan kuman melalui tangan, yaitu sebelum melakukan suatu tindakan

yang seharusnya dilakukan secara bersih dan setelah melakukan tindakan yang memungkinkan terjadi pencemaran, seperti :

1. Sebelum melakukan tindakan, misalnya sebelum memeriksa, sebelum memakai sarung tangan, sebelum melakukan injeksi dan lain-lain.
2. Setelah melakukan tindakan, misalnya setelah memeriksa pasien, setelah memegang alat-alat bekas pakai, setelah menyentuh selaput mukosa, darah dan cairan tubuh lainnya, setelah membuka sarung tangan dan lain-lain.

Sarana cuci tangan :

1. Sabun
2. Wadah sabun yang berlubang
3. Air mengalir dan wastafel
4. Handuk atau lap sekali pakai

B. Penggunaan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai oleh tenaga kerja dengan maksud menekan atau mengurangi penyakit akibat kerja (Suma'mur 1967). Penggunaan alat pelindung perorangan merupakan alternatif lain untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan. Namun perlu diperhatikan bahwa alat pelindung perorangan harus sesuai dan adekuat untuk bahaya tertentu, resisten terhadap kontaminan-kontaminan udara, dibersihkan dan dipelihara dengan baik serta untuk pekerja yang memakainya.

Sekali kebutuhan alat – alat pelindung diri telah tertanamkan maka pemelihan tipe yang baik dan sesuai untuk melakukan sesuatu pekerjaan perlu dilaksanakan. Sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk mencegah bahaya – bahaya lingkungan kerja, baik secara fisik maupun kimiawi, alat pelindung diri tersebut terlebih dahulu perlu dipilih secara hati – hati agar dapat memenuhi beberapa ketentuan yang diperlukan, antara lain:

1. Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap bahaya yang spesifik yang dihadapi oleh tenaga kerja
2. Berat alat hendaknya sesring mungkin dan alat tersebut tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan
3. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel
4. Bentuknya cukup menarik
5. Harus tahan untuk pemakaian yang cukup lama
6. Tidak menimbulkan bahaya – bahaya tambahan bagi pemakainya dikarenakan bentuk dan bahannya kurang tepat, atau salah dalam penggunaannya
7. Tidak membatasi gerak dan penglihatan pemakainya

Untuk tenaga kerja yang telah memiliki sikap selamat yang tinggi, maka persiapan – persiapan ke arah itu dapat dilihat, dengan kemungkinan tenaga kerja mengalami kecelakaan sangat kecil, perlindungan tenaga kerja melalui usaha – usaha teknis pengaman tempat, peralatan dan lingkungan kerja dalam sangat perlu diperhatikan. Penggunaan alat pelindung diri merupakan kewajiban dimana setiap tenaga kerja aka memulai suatu pekerjaan . adapun jenis – jenis alat pelindung diri tersebut:

Jenis-jenis alat pelindung diri

1. Sarung tangan

Sarung tangan diperlukan untuk melindungi tangan dan jari – jari dari kuman mikroorganisme, bakteri dan paparan darah. Adapun macam – macamnya yaitu:

1. Hand gloves: sarung tangan dari bahan karet
2. Mitten: sarung tangan dengan ibu jari terpisah dengan jari lainnya
3. Hand pad: melindungi tapak tangan

4. Sleeve: untuk pergelangan tangan sampai lengan, biasanya di gabung dengan sarung tangan

2. Alat pelindung pernapasan

Alat pelindung pernapasan berupa masker yang biasanya terbuat dari kain atau masker khusus yang Pakaian pelindung dapat digunakan untuk melindungi dari percikan darah dan zat kimia lainnya.

3. Sepatu pelindung

digunakan untuk membersihkan udara yang telah terkontaminasi sebelum terhirup.

4. Penutup Kepala

Tujuan pemakaian alat penutup kepala tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dari zat kimia, perubahan iklim, untuk menjaga kebersihan kepala dan rambut serta dapat melindungi dari benda yang jatuh dari atas.

5. Pelindung mata

Diperlukan untuk perlindungan sinar laser dan bahaya lainnya yang dapat muncul.


6. Pakaian pelindung (baju kerja / celemek)

Sama halnya dengan sepatu lainnya, namun sepatu yang dimaksud adalah sepatu yang terbuat dari bahan khusus

Tidak semua alat pelindung tubuh harus dipakai. Jenis pelindung tubuh yang dipakai tergantung pada jenis tindakan yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, untuk tindakan bedah minor cukup memakai sarung tangan steril atau DDT (desinfeksi tingkat tinggi) saja. Namun untuk kegiatan operatif di kamar bedah, atau melakukan pertolongan persalinan sebaiknya semua pelindung tubuh dipakai oleh petugas untuk memerangi kemungkinan terpajan darah / cairan tubuh lainnya.

C. Pengelolaan Alat Kesehatan

Pengelolaan alat-alat kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat kesehatan atau untuk menjamin alat tersebut dalam kondisi steril dan siap pakai. Semua alat, bahan dan obat yang dimasukkan ke dalam jaringan di bawah kulit harus dalam keadaan steril. Proses penatalaksanaan peralatan dilakukan melalui empat tahap, yaitu : Dekontaminasi, pencucian, sterilisasi atau DTT, penyimpanan. **Bagan alur pengelolaan alat kesehatan**



Catatan :

1. alat yang terbungkus dalam bungkus steril dapat disimpan sampai satu minggu bila tetap kering
2. Alat yang tidak terbungkus harus disimpan dalam tempat (tromol) steril
3. Alat yang diolah dengan disinfeksi tingkat tinggi disimpan dalam wadah tertutup yang tidak mudah terbuka atau segera dipakai

Dekontaminasi adalah menghilangkan mikroorganisme patogen dan kotoran suatu benda sehingga aman untuk pengelolaan selanjutnya dan dilakukan sebagai langkah pertama bagi pengelolaan alat kesehatan bekas pakai sebelum atau pengelolaan pencemaran lingkungan, seperti tumpahan darah / cairan tubuh. Juga sebagai langkah pertama pengelolaan limbah yang tidak dimusnahkan dengan cara insinerasi atau pembakaran dengan alat insenerator yaitu sebelum alat tersebut dikubur dengan cara kapurisasi.

Pembersihan dengan cara mencuci alat adalah menghilangkan segala kotoran yang kasat mata dari benda dan permukaan benda dengan sabun atau detergen, air, dan sikat. Kecuali menghilangkan kotoran pencucian akan semakin menurunkan jumlah mikroorganisme yang potensial menjadi penyebab infeksi melalui alat kesehatan atau suatu permukaan benda dan juga mempersiapkan permukaan alat tubuh untuk kontak langsung dengan desinfektan atau bahan sterilisasi sehingga proses dapat berjalan secara sempurna. Jika tidak dicuci lebih dahulu, proses sterilisasi atau DDT menjadi tidak efektif.

Disinfeksi dapat diartikan sebagai proses menurunkan jumlah mikroorganisme penyebab penyakit atau yang berpotensi patogen dengan cara fisika atau kimiawi. Proses ini biasanya tidak termasuk penghacuran spora. Setiap proses disinfeksi harus selalu didahului dengan proses kontaminasi atau pencucian yang memadai, karena proses itu akan menghilangkan sebagian besar kuman yang terdapat pada permukaan benda dan sisa kuman yang sedikit akan lebih mudah dibunuh oleh zat bahan disinfektan.

Pada proses disinfeksi dikenal tiga tingkatan aktivitas, yaitu :

1. Disinfeksi tingkat tinggi yaitu proses disinfeki yang mampu membunuh spora, kuman *Mycobacterium tuberculosis* varian bovis, bakteri, jamur, virus non lipid, virus kecil, virus lipid dan virus ukuran sedang.

2. Disinfeksi tingkat menengah adalah proses disinfeksi yang tidak perlu membunuh spora tetapi mampu membunuh *Mycobacterium tuberculosis* varian bovis yang lebih resisten terhadap zat deinfeksi dibanding kuman-kuman lain, bakteri, jamur, virus non lipid, virus kecil. Disinfeksi tingkat menengah mampu membunuh virus hepatitis A, B dan C serta virus AIDS (HIV).
3. Disinfeksi tingkat rendah adalah proses disinfeksi yang hanya mampu membunuh bakteri tetapi tidak mampu membunuh spora, *Mycobacterium tuberculosis* varian bovis, jamur, virus, virus kecil, virus non lipid.

Sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme dari alat kesehatan termasuk endospora bakteri.

Secara umum prinsip dasar yang digunakan untuk proses sterilisasi adalah :

1. Dekontaminasi / memperkecil derajat kontaminasi dan perlengkapan yang akan disterilkan.
2. pemilihan metode / cara sterilisasi yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan sarana yang ada.
3. Adanya sarana penunjang pengaman untuk menjaga mutu hasil produk steril.

Macam-macam sterilisasi, yaitu :

1. Sterilisasi dengan pemanasan dibagi dua yaitu :
 - a. Sterilisasi dengan pemanasan kering
 - b. Sterilisasi dengan pemanasan basah
2. Sterilisasi dengan penyinaran, ada tiga macam yaitu :
 - a. Sterilisasi dengan sinar Ultra Violet (UV)
 - b. Sterilisasi dengan sinar Gamma
 - c. Sterilisasi dengan sinar X dengan sinar Katoda

3. Sterilisasi dengan penyaringan
4. Sterilisasi dengan bahan kimia /gas.

Barang-barang yang sudah disterilkan sebaiknya disimpan di ruangan steril. Apabila kondisi tersebut tidak dapat dicapai maka setidaknya barang steril harus disimpan ditempat bersih dengan koreksi :

1. Bebas dari debu
2. Bebas dari serangga
3. Mempunyai tekanan positif, sedapat mungkin dilengkapi dengan AC, pengatur kelembaban dan sinar UV .

D. Pengelolaan Benda tajam

Benda tajam sangat beresiko untuk menyebabkan perlukaan sehingga meningkatkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak darah. Untuk menghindari perlukaan atau kecelakaan kerja maka semua benda tajam harus digunakan sekali pakai dengan demikian jarum suntik bekas tidak boleh digunakan lagi. Kecelakaan yang sering terjadi pada prosedur penyuntikan adalah pada saat petugas berusaha memasukkan kembali jarum suntik bekas pakai kedalam tutupnya. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan untuk menutup kembali jarum jarum suntik tersebut melainkan langsung saja di buang ke tempat penampungan sementara tanpa menyentuh atau memanipulasi bagian tajamnya seperti dibengkokkan, dipatahkan atau ditutup kembali. Jika jarum terpaksa ditutup kembali, gunakan cara penutupan jarum dengan satu tangan (single handed recapping method) untuk mencegah jari tertusuk jarum.

E. Pengelolaan Limbah Ruangan

Pembuangan limbah yang berjumlah cukup besar ini paling baik jika dilakukan dengan memilah-milah limbah ke dalam berbagai kategori. Untuk masing-masing jenis kategori diterapkan cara pembuangan limbah yang

berbeda. Prinsip umum pembuangan limbah RS adalah sejauh mungkin menghindari resiko kontaminasi dan trauma.

Limbah berasal dari RS / saran kesehatan secara umum dibedakan atas :

1. Limbah rumah tangga dan limbah non-medis, yaitu limbah yang tidak kontak dengan darah atau cairan tubuh sehingga disebut sebagai resiko rendah.
2. Limbah medis yaitu bagian dari sampah RS / sarana kesehatan yang berasal dari bahan yang mengalami kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien dan dikategorikan sebagai limbah beresiko tinggi dan bersifat menularkan penyakit. Limbah ini dapat berupa :
 - a. Limbah klinis
 - b. Limbah laboratorium
3. Limbah berbahaya adalah limbah kimia yang mempunyai sifat beracun. Limbah jenis ini meliputi produk pembersih, disinfeksi, obat-obatan sitotoksik dan senyawa radioaktif.

Upaya penanganan limbah di pelayanan kesehatan meliputi penanganan limbah cair dan limbah padat (sampah). Adapun teknik penanganan sampah meliputi :

1. Pemilihan, ini dilakukan dengan menyediakan wadah yang sesuai dengan jenis sampah medis.
2. Penanganan, dilakukan dengan cara wadah tidak boleh penuh atau luber, wadah berupa kantong plastik dapat diikat rapat pada saat pengangkutan dan dibuang dengan wadahnya, pengumpulan sampah dari ruang perawatan atau pengobatan harus tetap pada wadahnya dan jangan dituangkan pada gerobak yang terbuka, dan petugas yang menanganinya harus menggunakan sarung tangan dan sepatu.

3. Penampungan sementara, dapat ditempatkan pada daerah yang mudah dijangkau, harus ditutup dan kedap air serta tidak mudah bocor, hanya bersifat sementara dan tidak boleh lebih dari satu hari. Pembuangan / pemusnahan, sistemnya adalah dengan pembakaran (insinerasi) dengan suhu tinggi akan membunuh mikroorganisme dan mengurangi volume sampah sampai 90%.

F. Kesehatan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dengan berbagai fasilitas dan peralatan kesehatannya. Rumah sakit sebagai tempat kerja yang unik dan kompleks tidak saja menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan tempat pendidikan dan penelitian kedokteran. Semakin luas pelayanan kesehatan dan fungsi suatu rumah sakit maka semakin kompleks peralatan dan fasilitasnya.

Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cedera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anestesi, gangguan psikososial, dan ergonomi. Semua potensi-potensi bahaya tersebut jelas mengancam jiwa bagi kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit.

Rumah sakit mempunyai karakteristik khusus yang dapat meningkatkan peluang kecelakaan. Misalnya, petugas acapkali menggunakan dan menyerahkan instrumen benda-benda tajam tanpa melihat atau

membiarkan orang lain tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ruang kerja yang terbatas dan kemampuan melihat apa yang sedang terjadi di area operasi bagi sejumlah anggota tim (perawat instrumen atau asisten) dapat menjadi buruk. Hal ini dapat mempercepat dan menambah stres kecemasan, kelelahan, frustrasi dan kadang-kadang bahkan kemarahan. Pada akhirnya, paparan atas darah acapkali terjadi tanpa sepengetahuan orang tersebut, biasanya tidak diketahui hingga sarung tangan dilepaskan pada akhir prosedur yang memperpanjang durasi paparan. Pada kenyataannya, jari jemari acap kali menjadi tempat goresan kecil dan luka, meningkatkan risiko infeksi terhadap patogen yang ditularkan lewat darah. Kondisi gawat darurat dapat terjadi setiap waktu dan mengganggu kegiatan rutin. Mencegah luka dan paparan (agen yang menyebabkan infeksi) pada kondisi ini sesungguhnya suatu yang menantang.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dilihat berbagai macam ancaman terhadap kesehatan. Sementara dari sudut pandang Islam, sangat ditekankan pentingnya pemeliharaan kesehatan. Quraish Shihab (1994) dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa Tuhan memang telah menetapkan takdir manusia, namun tidak berarti manusia harus pasrah pada takdirnya. Di dalam bingkai takdir tersebut terdapat berbagai pilihan bagi manusia, dan manusia bebas memilih sepanjang ia masih tetap dalam bingkai tersebut. Demikian halnya dengan takdir sakit, sehat dan ajal, manusia tetap diwajibkan berusaha menjaga kesehatan agar ia dapat berumur panjang dan melakukan banyak pengabdian dalam kehidupannya, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhannya.

Pendapat Quraish Shihab tentang kewajiban menjaga kesehatan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
 لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
 وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya.

Diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan suatu perintah yang tidak mampu dipikul oleh setiap diri manusia. Bahkan di dalam melaksanakan ibadah, kita diberi toleransi, jika tidak mampu melakukan shalat berdiri, kita boleh duduk, atau berbaring. Demikian pula, berpuasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, atau dalam perjalanan, dan boleh menggantinya pada saat mereka mampu. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang benar-benar mampu melakukan perjalanan secara aman, baik dari segi kesehatan maupun harta yang dimilikinya.

Manusia memiliki keterbatasan, sehingga untuk tetap menjaga kesehatannya, manusia tidak boleh melampaui batas kemampuan yang telah ditetapkan padanya. Termasuk dalam melakukan pekerjaan, sehingga di dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja dikenal ilmu ergonomi, yaitu suatu upaya

untuk merekayasa peralatan kerja sehingga dapat sesuai dengan manusia yang menggunakannya. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia nyaman dan tak perlu melakukan usaha berlebihan untuk melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk mencapai usaha keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit diperlukan suatu manajemen yaitu SMK3 RS, yang pada prinsipnyamencakup: Komitmen dan kebijakan, Perencanaan K3RS, Pengorganisasian, Penerapan K3RS.

1. Komitmen dan Kebijakan

- a. Kepemimpinan dan Komitmen

Direktur rumah sakit harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumberdaya dan memadai. Direktur dan pengurus rumah sakit harus menunjukkan komitmen terhadap K3 yang diwujudkan dalam:

- 1) Membentuk dan menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan rumah sakit.
- 2) Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3.
- 3) Menempatkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3.
- 4) Perencanaan K3 yang terkoordinasi.
- 5) Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir a sampai dengan e diadakan peninjauan ulang secara teratur.

Setiap tingkat pimpinan dalam rumah sakit harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga penerapan

SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap petugas dan orang lain yang berada di wilayah rumah sakit harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

b. Tinjauan Awal K3RS (Initial Review)

Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan:

- 1) Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan atau standar.
- 2) Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- 4) Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
- 5) Meninjau sebab dan akibat yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3.
- 6) Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

Hasil peninjauan awal K3 merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan SMK3.

c. Kebijakan K3RS

Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja

yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3.

Tempat kerja yang aman dan sehat membutuhkan keterlibatan dan komitmen semua pihak serta melibatkan kemitraan yang sedang berlangsung antara manajemen, dan tenaga kerja atau perwakilannya. Hal ini harus dinyatakan dalam kebijakan umum yang menyatakan komitmen organisasi terhadap K3 dan bagaimana cara untuk mencapai komitmen tersebut. Kebijakan tersebut harus juga memuat tujuan untuk membuat tempat kerja yang bebas dari cedera dan penyakit.

Komitmen diwujudkan dalam bentuk kebijakan (policy) tertulis, jelas dan mudah dimengerti serta diketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit. Manajemen rumah sakit mengidentifikasi dan menyediakan semua sumber daya esensial seperti pendanaan, tenaga K3 dan sarana untuk terlaksananya program K3 di rumah sakit. Kebijakan K3 di rumah sakit diwujudkan dalam bentuk wadah K3RS dalam struktur organisasi rumah sakit.

Penentu kebijakan tidak cukup dengan sekedar menetapkan peraturan tertulis mengenai kebijakan yang diberlakukan, akan tetapi harus pula dipaparkan secara detail tentang aturan dan prosedur-prosedur yang

digunakan untuk mencapai tujuan. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sarana untuk mengevaluasi setiap metode dan prosedur-prosedur yang dijalankan, untuk melihat efektifitas penggunaan metode dan prosedur tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan seharusnya menyatakan tujuan penerapannya dengan jelas untuk menjamin keselamatan dan kesehatan orang-orang yang terlibat atau terkait dengan kegiatan perusahaan, misalnya pekerja, kontraktor, tamu, perusahaan tetangga, masyarakat sekitar dan sebagainya. Kebijakan perlu didiskusikan kepada setiap pekerja, mengindikasikan sumber-sumber pakar keselamatan kerja, disosialisasikan serta menyebutkan bagian-bagian penting yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi kerja yang aman.

Keputusan WHO di Ottawa Kanada tentang promosi kesehatan tahun 1986 (Ottawa Charter) menekankan bahwa advokasi di bidang kesehatan harus dilakukan oleh pimpinan organisasi kesehatan sehingga lembaga pemerintah nonkesehatan akan lebih menyadari perannya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya masing-masing.

Untuk melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 RS, perlu disusun strategi antara lain:

- a. Advokasi sosialisasi program K3 RS.
- b. Menetapkan tujuan yang jelas.
- c. Organisasi dan penugasan yang jelas.

- d. Meningkatkan SDM profesional di bidang K3 RS pada setiap unit kerja di lingkungan RS.
- e. Sumberdaya yang harus didukung oleh manajemen puncak.
- f. Kajian risiko secara kualitatif dan kuantitatif.
- g. Membuat program kerja K3RS yang mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan.
- h. Monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal secara berkala.

2. Planning (perencanaan)

Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Langkah-langkah proses penyusunan perencanaan di antaranya :

- a. Analisis situasi,
- b. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya,
- c. Menentukan tujuan program,
- d. Mengkaji hambatan dan kelemahan program,
- e. Menyusun rencana kerja operasional (RKO)

Rumah sakit harus membuat perencanaan yang efektif agar tercapai keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan K3 di

rumah sakit dapat mengacu pada standar Sistem Manajemen K3RS diantaranya *selfassessment* akreditasi K3RS dan SMK3.

Setiap pekerjaan seharusnya direncanakan dengan baik agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr (59) : 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam firman Allah SWT tersebut kita diingatkan agar memikirkan segala sesuatu yang telah dan akan kita kerjakan, salah satunya melalui perencanaan yang baik. Islam mengajarkan agar kita tidak tergesa-gesa dalam merencanakan dan melaksanakan sesuatu. Hal tersebut dimaksudkan agar tindakan yang dilakukan tidak akan menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang.

Perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit meliputi:

- a. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian faktor risiko.

Rumah sakit harus melakukan kajian dan identifikasi sumber bahaya, penilaian serta pengendalian faktor risiko.

(1) Identifikasi sumber bahaya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang kemungkinan dapat terjadi. Sumber bahaya yang ada di rumah sakit harus diidentifikasi dan dinilai untuk menentukan tingkat risiko yang merupakan tolok ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

(2) Penilaian faktor risiko

Penilaian faktor risiko adalah proses untuk menentukan ada tidaknya risiko dengan jalan melakukan penilaian bahaya potensial yang menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan. Penilaian risiko merupakan upaya yang ditempuh oleh pemilik usaha agar dapat melakukan pengendalian potensi-potensi bahaya yang kemungkinan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Sasaran dilakukannya penilaian risiko adalah guna mempertimbangkan tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.

(3) Pengendalian faktor risiko

Dilaksanakan melalui 4 tingkatan pengendalian risiko yakni menghilangkan bahaya, menggantikan sumber risiko dengan sarana/peralatan lain yang tingkat risikonya lebih rendah/tidak ada (engineering/rekayasa), administrasi dan alat pelindung pribadi (APP).

a. Membuat peraturan

Rumah sakit harus membuat, menetapkan dan melaksanakan *StandardOperationalProcedure* (SOP) sesuai dengan peraturan, perundangan dan ketentuan mengenai K3 lainnya yang berlaku. SOP ini harus dievaluasi, diperbaharui dan harus dikomunikasikan serta disosialisasikan pada karyawan dan pihak yang terkait.

b. Tujuan dan sasaran

Rumah sakit harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, bahaya potensial dan risiko K3 yang bisa diukur, satuan/indikator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian.

c. Indikator kinerja

Indikator harus dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3 rumah sakit.

d. Program K3

RS harus menetapkan dan melaksanakan program K3RS, untuk mencapai sasaran harus ada monitoring, evaluasi dan dicatat serta dilaporkan.

3. Organizing (Organisasi)

Pengorganisasian menurut Holt (1993) adalah "...organizing... the function of gathering resources, allocating resources, and structuring tasks to fulfill organizational plan". Organisasi efektif, sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material, menyebabkan meningkatnya produktivitas. Hal tersebut dilaksanakan melalui apa yang dinamakan "sinergisme" (synergism), di mana anggota-anggota suatu

organisasi, mengkombinasikan upaya mereka secara kolektif guna melaksanakan tugas-tugas, yang akan jauh melampaui jumlah dari upaya-upaya individual mereka. Sinergi dicapai melalui pengintegrasian tugas-tugas yang terspesialisasi.

Pada inti organisasi, terdapat pembagian kerja guna mendesain tugas-tugas secara logikal dan untuk menjelaskan espektasi-espektasi kinerja individual. Pembagian kerja merupakan kekuatan fundamental dalam bidang industrialisasi yang menerangkan bagaimana cara pekerjaan keorganisasian harus dilaksnakan.

Sementara menurut Samuel C. Certo, pengorganisasian (organizing) ialah: Suatu proses di mana ditetapkan penggunaan teratur, semua sumber-sumber daya di dalam sistem manajemen yang ada. Penggunaan tersebut, menekankan pencapaian sasaran-sasaran sistem manajemen yang bersangkutan, dan ia bukan saja membantu membuat sasaran-sasaran menjadi jelas, tetapi ia menjelaskan pula sumber-sumber daya macam apa yang akan digunakan untuk mencapainya.

Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsinya adalah untuk memadukan (sinkronisasi) dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan personil, finansial, material, dan tata cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan K3 di rumah sakit sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan petugas, terhadap tugas dan

kewajiban masing-masing serta kerja sama dalam pelaksanaan K3. Tanggung jawab ini harus ditanamkan melalui adanya aturan yang jelas. Pola pembagian tanggung jawab, penyuluhan kepada semua petugas, bimbingan dan latihan serta penegakkan disiplin. Ketua organisasi/satuan pelaksana K3 RS secara spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab timbulnya masalah bersama unit-unit kerja, kemudian mencari jalan pemecahannya dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit kerja, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program, untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berhasil. Apabila hasil evaluasi mengindikasikan ketidakberhasilan, maka perlu diidentifikasi penyimpangannya serta ditetapkan solusianya.

Islam pun sangat menganjurkan umatnya untuk bekerjasama dalam kebaikan dan memberikan suatu pekerjaan kepada orang yang mengerti atau ahli dengan pekerjaan tersebut. Mengenai anjuran untuk saling tolong menolong banyak hadits yang menerangkan gambaran kaum muslim antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW;

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ
بَعْضًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya

Diberitakan Khalid bin Yahya berkata Diberitakan Suftan Abi Burdah Ibnu Abdullah Ibnu abi Burdah oleh kakeknya Abi Musa oleh Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain (Riwayat Muslim).

Hadits riwayat Muslim di atas menjelaskan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya akan kuat ketika saling memenuhi kekurangan satu dengan yang lainnya. Untuk itu Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerjasama dalam melakukan kebajikan. Demikian pula halnya dalam penerapan SMK3 di rumah sakit harus dilaksanakan bersama dengan membentuk organisasi yang baik.

Sistem K3 hanya dapat dikelola secara efektif jika ada tanggungjawab yang rinci, teridentifikasi dan ditugaskan kepada orang yang mewakili manajemen dengan jabatan supervisor. Tanggungjawab tersebut yang ditugaskan kepada setiap jabatan harus sesuai dengan kewenangan jabatannya. Karyawan juga memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan tempat kerja yang aman dan sehat. Hal ini harus termuat dalam uraian tugas.

- a. Tugas dan fungsi organisasi/unit pelaksana K3RS
 - 1) Tugas unit pelaksana K3 di rumah sakit diantaranya:
 - a) Memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada direktur rumahsakit mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan K3.

- b) Merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan prosedur.
 - c) Membuat program K3RS
- 2) Fungsi unit pelaksana K3RS:
- a) Mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan K3.
 - b) Membantu direktur RS mengadakan dan meningkatkan upaya promosi K3, pelatihan dan penelitian K3 di RS.
 - c) Pengawasan terhadap pelaksanaan program K3.
 - d) Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif.
 - e) Koordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3RS.
 - f) Memberi nasehat tentang manajemen k3 di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan.
 - g) Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.

b. Struktur organisasi K3 di Rumah Sakit

Posisi organisasi K3 berada satu tingkat di bawah direktur dan bukan merupakan kerja rangkap.

Model 1 : Merupakan organisasi yang terstruktur dan bertanggung jawab kepada Direktur RS, bentuk organisasi K3 di RS merupakan organisasi struktural yang terintegrasi ke dalam

komite yang ada di RS dan disesuaikan dengan kondisi/kelas masing-masing RS, misalnya Komite Medis/Nosokomial.

Model 2 : Merupakan unit organisasi fungsional (non struktural), bertanggung jawab langsung ke Direktur RS. Nama organisasinya adalah unit pelaksana K3 RS, yang dibantu oleh unit K3 yang beranggotakan seluruh unit kerja di RS.

Keanggotaan :

- 1) Organisasi/unit pelaksana K3 RS beranggotakan unsur-unsur dari petugas dan jajaran direksi RS.
 - 2) Organisasi/unit pelaksana K3 RS terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan anggota. Organisasi/unit pelaksana K3 RS dipimpin oleh ketua.
 - 3) Pelaksanaan tugas ketua dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris serta anggota.
 - 4) Ketua organisasi/unit pelaksana K3 RS sebaiknya adalah salah satu manajemen tertinggi di RS atau sekurang-kurangnya manajemen dibawah langsung direktur RS.
 - 5) Sedang sekretaris organisasi/unit pelaksana K3 RS adalah seorang tenaga profesional K3 RS, yaitu manajer K3 RS atau ahli K3.
4. Penerapan K3RS

Penerapan K3 di rumah sakit meliputi tahap-tahap:

a. Tahap Persiapan

- 1) Menyatakan komitmen

Komitmen harus dimulai dari direktur utama/direktur rumah sakit (manajemen puncak). Pernyataan komitmen

oleh manajemen puncak tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus dengan tindakan nyata, agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan petugas rumah sakit.

2) Menetapkan cara penerapan K3 di Rumah Sakit.

Penetapan cara yang akan digunakan dalam penerapan K3 di rumah sakit dapat dilakukan dengan bantuan konsultan atau personil rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengarahkan orang.

3) Membentuk kelompok kerja penerapan K3.

Anggota kelompok kerja sebaiknya terdiri atas seorang wakil dari setiap unit kerja, biasanya manajer unit kerja. Peran, tanggung jawab dan tugas anggota kelompok kerja perlu ditetapkan. Sedangkan mengenai kualifikasi dan jumlah anggota kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan RS.

4) Menetapkan sumber daya yang diperlukan

Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia dalam hal ini tenaga ahli K3. Selain SDM juga dibutuhkan sarana, waktu dan dana.

c. Tahap Pelaksanaan

Penyuluhan K3 ke semua petugas RS, pelatihan K3 yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kelompok di dalam organisasi RS. Fungsinya memproses individu dengan perilaku tertentu agar berperilaku sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai produk akhir dari pelatihan.

Melaksanakan program K3 sesuai peraturan yang berlaku diantaranya :

- 1) Pemeriksaan kesehatan petugas (prakarya, berkala dan khusus),
- 2) Penyediaan alat pelindung diri dan keselamatan kerja,
- 3) Penyiapan pedoman pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat,
- 4) Penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai kondisi kesehatan,
- 5) Pengobatan pekerja yang menderita sakit,
- 6) Menciptakan lingkungan kerja yang higienis secara teratur, melalui monitoring lingkungan kerja dari hazard yang ada,
- 7) Melaksanakan *biological monitoring*,
- 8) Melaksanakan surveilans kesehatan pekerja

d. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi K3 di rumah sakit adalah salah satu fungsi manajemen K3 rumah sakit yang berupa suatu langkah yang diambil untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana proses kegiatan K3 rumah sakit itu berjalan, mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu kegiatan K3 rumah sakit dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pemantauan dan evaluasi meliputi :

- 1) Pencatatan dan pelaporan K3 terintegrasi ke dalam sistem pelaporan RS (SPRS).
 - Pencatatan dan pelaporan K3,
 - Pencatatan semua kegiatan K3,
 - Pencatatan dan pelaporan kecelakaan akibat kerja (KAK),
 - Pencatatan dan pelaporan penyakit akibat kerja (PAK).
- 2) Inspeksi dan pengujian

Inspeksi K3 merupakan suatu kegiatan untuk menilai keadaan K3 secara umum. Inspeksi K3 merupakan suatu kegiatan untuk menilai keadaan K3 secara umum dan tidak terlalu mendalam. Inspeksi K3 di rumah sakit dilakukan secara berkala, terutama oleh petugas K3 RS sehingga kejadian PAK dan KAK dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan lain adalah pengujian, baik terhadap lingkungan maupun pemeriksaan terhadap pekerja berisiko seperti *biological monitoring* (pemantauan secara biologis).

1. Melaksanakan audit K3

Audit K3 yang meliputi falsafah dan tujuan, administrasi dan pengelolaan, karyawan dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan karyawan dan program pendidikan, evaluasi dan pengendalian.

Tujuan Audit K3:

- Untuk menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan.
- Memastikan dan menilai pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial serta pengembangan mutu.
- Untuk menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan.
- Memastikan dan menilai pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial serta pengembangan mutu.

- Perbaikan dan pencegahan didasarkan atas hasil temuan dari audit, identifikasi, penilaian risiko direkomendasikan kepada manajemen puncak.

e. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan peninjauan ulang dan peningkatan terhadap kebijakan, perarturan, pedoman, prosedur, program dan kegiatan yang dilakukan secara periodik.

BAB IV

NILAI ISLAM DALAM MEMBANGUN DERAJAT KESEHATAN

Dalam sejarah diterangkan pelbagai peristiwa di masa lalu yang terjadi menurut hukum sebab akibat dengan dukungan data yang valid, sehingga sejarah juga bisa berfungsi untuk mendobrak kebekuan generasi sekarang. Pengenalan terhadap sejarah bermakna penelusuran terhadap data – data di lapangan dalam mengenal suatu peristiwa di masa lampau, membawanya dalam konteks sekarang. Atau dengan kata lain, kekurangan di masa lalu harus dibenahi di masa sekarang ini dan kelebihan di masa lampau harus senantiasa dipertahankan. Mengungkap sejarah adalah upaya untuk menggali ikhtiar generasi pada masa lalu agar spiritnya dapat dilestarikan.

Oleh karena itu mengemukakan kembali apa yang terjadi di masa lalu adalah upaya melakukan kontekstualisasi terhadap ide, gagasan, atau karya orang lain dalam memajukan tingkat kehidupan manusia saat ini. Eksistensi para generasi pendahulu adalah telah mengukir sejarah bagi kelangsungan kehidupan manusia. Semangat perjuangan dan keuletan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang serba sulit adalah khasanah untuk dilestarikan dan diteruskan kepada generasi penerus. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui proses perjuangan dan sejarah generasi pendahulu untuk menjadi inspirasi dalam memajukan peradaban manusia sekarang dan yang akan datang.

Dalam sejarah peradaban Islam adalah warisan dunia yang diliputi keberhasilan di berbagai bidang. Jauh sebelum dunia barat mengalami renaissance, para cendekiawan dan ilmuwan muslim telah terlebih dulu mewujudkan dunia islam sebagai center of excellen. Ilmuwan Islam telah meletakkan dasar – dasar kedokteran moderen hingga berkembang sampai saat sekarang ini. Bahkan Karya – karya ilmuwan tersebut dijadikan sebagai literatur pokok dalam mengembangkan ilmu kedokteran modern.

Tetapi, nampaknya kontribusi besar ilmuwan muslim tersebut mulai dilupakan, bahkan oleh orang islam sendiri. Dokter maupun perawat lebih mengenal sosok Florence Nightingale bahkan menjulukinya The Lady With The Lamp (Bidadari yang memiliki lampu) ketimbang Rufaidah Binti Sa'ad seorang dokter dan perawat yang hidup pada zaman Nabi dan telah mengembangkan rumah sakit lapangan pada saat terjadi peperangan antara umat islam dan orang – orang kafir.

Untuk mengenang dan meneladani ilmuwan muslim di bidang kesehatan berikut dikemukakan beberapa muslim yang memiliki prestasi cemerlang khususnya di bidang kesehatan

A. Ilmuwan Muslim Di Bidang Kesehatan

1. Ibnu Sina

Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali al-Husayn bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina Afsyahnah daerah dekat Bukhara, Sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian persia), dan meninggal di Hamadan, persia (Iran). Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai ”bapak kedokteran modern”. George Sarton menyebut Ibnu Sina ”ilmuwan paling terkenal dari islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu” pekerjaannya yang paling terkenal The book of Healing dan The canon of medicine.

Ibnu sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah ”bapak pengobatan moderen” dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya – karyanya di

bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad - abad.

Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal. Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni, dan menuju kearah barat ke Urgench di Uzbekistan modern, dimana vizier, dianggap sebagai teman seperguruan, memberinya gaji kecil bulanan. Tetapi gajinya kecil, sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan, mencari suatu opening untuk bakat – bakatnya . Shams al-ma'li Qabiz, sang dermawan pengatur dailam, seorang penyair dan sarjan, yang mana Ibnu Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung, dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. Akhirnya, di Gorgan, dekat laut kaspis, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman, yang membeli sebuah rumah didekat rumahnya sendiri tempat Ibnu Sina belajar logika dari astronomi, beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini dan permulaan dari buku Canon of medicine juga dikerjakan sewaktu di tinggal di Hyrcania.

Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan, Iran, karena penyakit maag yang kronis. Ia wafat ketika sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras untuk mengajar anak – anak, saat di wafat murid – muridnya tersebut merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu Ibnu Sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa kerumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong.

2. Rufaidah Binti Sa'ad

Rufaidah Binti Sa'ad memiliki nama lengkap Rufaidah binti Sa'ad Al Bani Al khazraj, yang tinggal dimadinah, dia lahir di Yastrib dan termasuk kaum

ansar (golongan pertama kali menganut islam di madinah). Ayahnya seorang dokter, dan dia mempelajari ilmu keperawatan saat bekerja membantu ayahnya. Dan saat kota madinah berkembang, Rufaidah mengabdikan diri merawat kaum muslim yang sakit, dan membangun tenda di luar masjid nabawi saat damai. Saat perang Badr, Uhud, Khandak dan perang khaibar dia menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang.

Rufaidah Binti Sa'ad adalah salah satu perawat muslim yang mulai populer ketika terjadi perang khandak. Dia mendirikan perkemahan yang disebut perkemahan Rufaidah yang dibuat dekat masjid untuk menampung dan merawat pasukan kaum muslim yang terluka. Rufaidah sangat mahir dan syarat pengalaman dalam meracik obat, dan memperbaiki tulang yang patah. Perkemahannya mirip rumah sakit lapangan di dalam istilah kemiliteran saat ini.

Rufaidah melatih pula beberapa kelompok wanita untuk menjadi perawat, dan dalam perang Khaibar mereka meminta ijin Nabi muhammad SAW, untuk ikut di garis belakang pertempuran untuk merawat mereka yang terluka, dan Nabi mengijinkannya. Tugas ini digambarkan mulia untuk Rufaidah, dan merupakan pengakuan awal untuk pekerjaannya di bidang keperawatan dan medis. Kontribusi Rufaidah tidak hanya merawat mereka terluka akibat perang. Namun juga terlibat dalam aktifitas sosial di komunitas. Dia memberikan perhatian kepada setiap muslim, miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Dia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula. Sentuhan sisi kemanusiaan adalah hal yang penting bagi perawat, sehingga perkembangan sisi teknologi dan sisi kemanusiaan (human touch) mesti seimbang.

Omar Hasan Kasule (1998) dalam tulisannya yang berjudul Rufaidah binti sa'ad: Historical Roots of The Nursing professional in Islam menyatakan

Rufaidah adalah perawat profesional dalam sejarah islam. Beliau hidup di masa nabi Muhammad saw di abad pertama hijriah dan diilustrasikan sebagai perawat teladan, baik dan bersifat empati. Ahmad syawqi (1980) dalam bukunya Rufaidah, Awwal Mumarridat fi al islam juga menggambarkan rufaidah sebagai seorang pemimpin, organisatoris, dan mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Rufaidah memiliki pengalaman klinik yang dapat ditularkan kepada perawat lain, yang dilatih dan bekerja dengannya. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam aspek klinikal semata, namun juga melaksanakan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Rufaidah adalah public health nurse dan social worker yang menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia islam.

3. Abu Bakar Muhammad Bin zakaria

Ar-razi atau dikenal sebagai razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864-930. Ia lahir di Rayy, Teheran pada tahun 251 H/865 dan waafat pada tahun 313/925. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah sakit Muqtadari di baghdad. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap salah satu ilmuwan terbesar dalam islam.

Saat masih kecil, ar-razi tertarik menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke 30, ar-razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya, dan dari sinilah ar-razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu sahal

at-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Dahulu, gurunya merupakan seorang yahudi kemudian berpindah agama menjadi islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan di bawah kekuasaan khalifah Abbasyiah, Al-mu'tashim. Ar-Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Kemudian dia menjadi kepala rumah sakit di Rayy pada masa Mansur ibnu Ishaq, penguasa Samania. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Beberapa tahun kemudian, ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Mukhtafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad dan dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya yang berobat kepadanya.

Diagnosa ar-Razi tentang cacar dan campak dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: ” pernyataan pertama yang paling akurat dan terpercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter persia pada abad ke 9 yaitu Rhazes, dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas, patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut.” Buku ar-Razi yaitu Al-judari walhasbah(Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam latin dan bahasa Eropa lainnya.

4. Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi

Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi dikenal di barat sebagai abulcasis atau ”bapak operasi moderen”, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Abul Qasim lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Kordova, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor

Andalusia dia dikenal dengan nama "el Zahrawi". Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakim II dari kekhalifaan Umayyah.

Kitab at-Tasrif adalah Ensiklopedia medis Arab yang berpengaruh dalam bidang medis dan operasi, ditulis oleh Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, Karya sebanyak 30 jilid ini termasuk deskripsi anatomi, kalsifikasi penyakit, informasi nutrisi dan operasi, dan seksi pengobatan, ortopedik, oftalmologi, farmakologi, nutrisi dan terutama operasi. At- Tasrif berisi berbagai topik yang mengenai kedokteran, termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh gerardo dari Cremona pada abad ke-12, dan selama lima abad Eropa pertengahan, buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di eropa.

B. Ajaran Islam Tentang Kebersihan Jasmani

Dari bukti – bukti yang otentik diyakini bahwa islam adalah agama yang berasal dar Allah yang Maha Suci. Oleh karena itu, ajaran islam senantiasa berorientasi pada kesucian jasmani dan ruhani. Kesucian jasmani dan ruhani merupakan indikator utama manusia yang sehat. Sehat fisiknya, dan sehat jiwanya. Misalnya dalam salah satu ayat Al-Qur'an dengan sangat apik Islam menjelaskan bahwa istri yang sedang haid dilarang disetubuhi, karena darah haid itu kotor dan berpotensi terjangkit penyakit endometrisis dan lainnya. Bahkan larangan menyetubuhi istri saat haid selain sebagai kebersihan jasmani, juga terkait dengan kesucian jiwa seseorang.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah:222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dari ayat diatas dapat diambil dua kesimpulan penting, yakni: taubat dalam merupakan proses penyucian jiwa manusia dari dosa –dosa yang diperbuat, karena dosa tidak hanya dapat dibersihkan dengan memohon ampunan kepada Allah SWT. Sedangkan bersuci adalah proses mensucikan jasmani dari segala hadas dan najis sesuai dengan air atau benda lain yang disyariatkan agama Islam. Dengan demikian, kebersihan menjadi salah satu bagian dari ajaran islam yang sangat penting.

Ada beberapa keutamaan agam islam sebagai tatanan nilai yang menjunjung kebersihan, yakni :

Islam mengedepankan pencegahan penyakit.

Islam sangat memperhatikan pencegahan penyakit serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit yang di sebabkan oleh kemalasan dalam mencegah penyakit. Misalnya perintah khitan serta larangan menggauli istri ketiak sedang haid dan nifas adalah bentuk langkah nyata dalam mencegah penyakit – penyakit tertentu demikian juga larangan melakukan seks bebas juga adalah wujud perhatian islam pada pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis maupun HIV/AIDS yang samapai saat ini belum ditemukan obatnya.

Rasulullah saw mengajarkan pencegahan penyakit seperti salah satu sabdanya :

نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسَاوُ قُسْطًا وَرَيْثًا
يُلْدُ بِهِ

Artinya:

Rasulullah saw menyebutkan wars (sejenis tumbuhan), qush (kayu hindi) dan minyak zaitun bahwa itu semua dapat mencegah penyakit lambung.” (HR. Ibnu majah)

Ditinjau dari ilmu kesehatan moderen, terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Seperti yang populer dalam Ilmu Kesehatan masyarakat Preventif Is Better Than Cure ”Mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati

Islam mengajarkan kebersihan

Perhatian islam atas dua jenis kesucian jasmani dan rohani merupakan bukti tentang konsistensi islam atas kesucian dan kebersihan. Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan kebersihan dan keindahan. Beberapa contoh misalnya perintah atau kewajiban mandi junub setelah haid, nifas, dan berhubungan suami istri adalah ajaran yang sangat relevan dengan kebersihan. Allah swt adalah ajaran mengancam siksa bagi orang yang tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya sendiri.

Rasulullah bersabda:

عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ
إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي النَّوْلِ وَأَمَّا
الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْعَيْبَةِ

Artinya:

Dari kakeknya Abu Bakrah berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: “Keduanya sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah. (HR Ibnu Majah)

3. Orang yang menjaga kebersihan dicintai Allah

Allah swt telah memuji orang – orang yang selalu menjaga kesucian.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Firman Allah dalam QS At-taubah:108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang dalam hal kesucian positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan. Baik kesucian zahir maupun batin. Sebagaimana sabda rasulullah saw kepada jamaah dari sahabatnya:

إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَىٰ إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّىٰ تَكُونُوا فِي
النَّاسِ كَأَنَّكُمْ سَامَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ

Artinya :

Sesungguhnya kalian akan menemui saudara – saudara kalian, maka perbaikilah kendaraan dan pakaian kalian hingga berada di tengah – tengah manusia dalam keadaan indah, sesungguhnya Allah azza

wajalla tidak menyukai sesuatu yang keji atau melakukan perbuatan kotor dan keji,” (HR. Ahmad)

4. Kebersihan itu sebagian dari iman

Rasulullah saw telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannyapun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya:

“Kebersihan itu sebagian dari iman”

5. Kesucian adalah syarat ibadah

Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan sah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian baik *hakiki* maupun *maknawi*.

Rasullulah saw bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Artinya:

Dari Ali Bin Thalib ra bahwa Rasulullah saw. Bersabda kunci shalat itu adalah kesucian, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam” (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah)

Dari uraian diatas, jelas bahwa islam sangat menjunjung tinggi perilaku hidup bersih. mengantarkan manusia pada kesehatan jasmani.

C. Ajaran Islam Tentang Kesehatan Mental

Sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, manusia menyadari adanya problem yang mengganggu kejiwaannya, oleh karena itu sejarah manusia juga mencatat adanya upaya mengatasi problema tersebut.

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturuna. Setidaknya tiga yang disebut diatas berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika dikemukakan bahwa islam amat kaya dengan tuntunankesehatan. Namun demikian para ahli belum ada kesepakatan terhadap batasan atau definisi kesehatan mental (mental health). Hal itu di sebabkan antara lain karena adanya pelbagai sudut pandang dan system pendekatan yang berbeda.

Dengan tiadanya kesatuan pendapat dan pandangan tersebut, maka menimbulkan adanya perbedaan konsep kesehatan mental. Lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya perbedaan implementasi dalam mencapai dan mengusakan mental yang sehat. Perbedaan itu wajar dan tidak perlu merisaukan mental, karena sisi lain adanya perbedaan itu justru memperkaya khasanah dan memperluas pandangan orang mengenai apa dan bagaimana kesehatan mental.

D. Pandangan islam terhadap etika dokter dan perawat

Islam adalah dasar dalam hidup kita .. apapun pekrjaan dan profesinya. Baik seorang muslim itu seorang pedagang, dokter atau pegawai. Karena sikapnya akan selalu menunjukkan keislaman. Oleh karena itu Allah berfirman,

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً^ط وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٧٨﴾

“shibghat Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghanya daripada Allah? Dan banya kepada-Nya-lah kami menyambah.”(Q.S. Al-baqarah : 138).

Islam menjadi landasan hidup kita seluruhnya dan Islam menjadi cermin atas semua yang kita lakukan, bahkan Islam juga cerminan pada pekerjaan kita.

Sebelum kita menginjak pembicaraan tentang etika yang harus dimiliki seorang muslim, seperti dokter maka kita akan menegaskan terlebih dahulu bahwa dokter mempunyai tugas memberi dan profesi member. Seorang dokter selalu member- memberi nasihat serta memberi obat. Oleh karena itu kita menjadikan seorang dokter sebagai inspirasi tentang kearifan bagi kita, karena seorang dokter bertugas meringankan rasa sakit yang kita derita.

1. Tugas seorang dokter muslim

Profesi seorang dokter adalah antara bertugas dan memberi. Seorang dokter masih bekerja keras disaat orang lain istirahat nyenyak. Seorang dokter bekerja keras agar kamu dapat beristirahat. Akan tetapi akhir-akhir ini profesi dokter dijadikan pekerjaan. Oleh karena itu kami mengingatkan saudara-saudara kami para dokter dengan firman Allah,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. Az-Zukhruf: 32).

Setiap orang harus mempunyai profesi dan ketrampilan. Maka seseorang dapat dikatakan sebagai pengrajin, dokter, pengajar dan seterusnya. Ketika kita dilahirkan dan ketika kita pergi meninggalkan kehidupan dunia, kita dalam keadaan tidak paham apapun dan tidak mengerti apapun, "*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun.*" (Q.S. An-Nahl: 78). Akan tetapi setelah kita dilahirkan ke dunia ini menjadikan kita belajar tentang suatu hal dan melakukan pekerjaan dengan pengetahuan yang kita dapat tersebut.

Ketika Allah Ta'ala berfirman, yang terjemahnya:

"Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain." (Q.S. Az-Zukhruf :32).

Ayat ini menegaskan bahwa satu dengan lainnya dari kita saling membutuhkan. Aku bekerja untukmu dan kamu *bekerja* untukku .. begitulah keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu tidak ada seorang pun dari kita yang mampu lepas dari bantuan orang lain. Misalkan, seorang dokter menyembuhkan orang sakit dan orang-orang pergi berobat kepadanya, sedangkan dokter juga akan pergi ke montir untuk memperbaiki mobilnya. Dan seorang montir akan membutuhkan tukang servis saluran air, sedangkan tukang servis saluran air akan minta bantuan penjahit dan seorang penjahit membeli kebutuhannya dari pedagang. Begitu seterusnya.

Sungguh benar, Nabi ketika mengatakan, "*Ajaklah orang-orang mencari rezeqi Allah saling membantu sebagian dari sebagian yang lain.*"

2. Allah yang menurunkan penyakit dan memberikan obat

Dari sini dokter mempunyai peran antara tugas dan pekerjaan. Dan kita dituntut untuk berobat. Siapa yang berhak memberikan obat dan penyembuhan?! Ia adalah seorang dokter. Oleh karena itu Nabi memerintahkan kepada setiap muslim, "Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Allah tidak menjadikan suatu penyakit kecuali Allah menjadikan pada penyakit tersebut obat selain penyakit pikun."¹¹² Orang yang mempunyai penyakit karena tua (pikun) atau orang yang akan mati, maka penyakitnya tersebut tidak ada obatnya. Namun selain penyakit tersebut selalu ada obatnya.

Penyembuhan. Nabi saw bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Maka ketika seseorang mendapat obat untuk penyakitnya, maka ia sembuh dengan izin Allah. Oleh karena itu Alquran menyebutkan cerita tentang Nabi Ibrahim

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً
 ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا
 بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ
 وَعِبَادُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي
 فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
 وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

"Ketika ia Berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. " Berkata Ibrahim, "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?" Mereka menjawab, "(Bukan Karena

itu) Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?, Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musubku, kecuali Tuhan semesta A/am, (yaitu Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka Dia-lah yang menunjuki aku, dan Tubanku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku, Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. "(Q.S.Asy-Syuara : 70-82).

"Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. "(Q.S. Asy-Syuara': 80).. aku pergi ke dokter untuk menyembuhkanku dengan izin Allah. Ini termasuk perintah dari Nabi.

3. Landasan-landasan etika seorang dokter muslim yang harus dijalankan.

Seorang dokter harus mempunyai landasan-landasan dasar pada kepribadian dan etika seorang muslim yang selalu menjalankan ajaran agamanya. Landasan-landasan ini sebagiannya tumbuh pada permulaan pembentukan dan persiapan. Dan sebagiannya lagi tumbuh di tengah praktiknya sebagai dokter. Aku akan menyebutkan hal-hal khusus dan penting yang membangun etika seorang dokter muslim;

Bersungguh-sungguh belajar dan berprestasi

Pembentukan kepribadian ini dimulai sebelum ia keluar dari bangku kuliah kedokteran, bahkan harus ia mulai sejak pertama kali ia masuk di fakultas kedokteran. Seorang muslim harus mempersiapkan dirinya untuk menjalani profesi ini. Sebab tugas pada profesi ini sangat membutuhkan persiapan diri yang baik dan mengabdikan dirinya secara penuh untuk keilmuan. Hal tersebut

dapat dilakukan dengan kesungguhan dalam belajarnya. Seorang dokter muslim harus selalu bersikap tenang, karena profesinya berurusan dengan nyawa manusia dan orang-orang sakit. Maka kesalahan sekecil apapun akan berhubungan dengan hidup mati seorang pasien.

Seorang dokter tidak berurusan dengan tembok maupun pagar, ketika dalam pekerjaannya terjadi kesalahan atau tindakan yang membahayakan, maka akan datang pekerja lainnya untuk memperbaikinya. Kerugian yang diakibatkan saat itu tidak akan merembet, karena kerugian yang diakibatkannya tersebut bernilai harta benda. Artinya bahwa kerugian yang diakibatkan tidak akan begitu sangat berarti sebab kerugiannya hanya materi.

Akan tetapi profesi seorang dokter dapat merugikan hidup seseorang. Mungkin tindakannya akan menyebabkan terjadinya penyakit fisik akut karena kurangnya pengetahuan. Dalam hal ini kurang pengetahuan sedikit saja dapat mengakibatkan musibah. Islam adalah agama pengetahuan. Bukti tentang itu telah cukup bahwa kalimat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi saw, adalah kalimat "Bacalah." Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. " (Q.S. Al-Alaq : 1-5).

Dalam Alquran juga terdapat surat yang bernama surat Al-Qalam yang berarti "Pena." Allah berfirman,

" Nun, demipena dan apa yang mereka tulis. "(Q.S. Al-Qalam : 1). Dalam ayat tersebut di atas Allah bersumpah dengan menggunakan qalam (pena). Allah Taala berhak bersumpah dengan menggunakan apa saja yang dikehendaki-Nya

dari seluruh makhluknya. Namun makhluk Allah tidak boleh membuat sumpah kecuali dengan nama Sang Pencipta, yaitu Allah Taala. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman,

أَمَّنْ هُوَ قَنِيَّتْ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. "(Q.S. Az-Zumar: 9). Apakah orang yang berilmu sama seperti orang yang tidak berilmu?! Tentu tidak sama.

Kenapa seorang dokter harus belajar? Seorang dokter tidak belajar untuk menjadi terkenal, tidak pula agar orang-orang datang kepadanya. Ia harus belajar karena pekerjaannya nanti berhubungan dengan nyawa manusia. Mungkin dia akan mendapat ketenaran dan menghasilkan banyak uang dengan keikhlasannya dan ilmunya. Ketika seorang dokter menjadi terkenal dengan keilmuannya apa yang terjadi?! Kamu akan menemukan orang-orang yang saling berdesakan untuk berobat kepadanya. Walaupun tarif pembayarannya mahal, orang-orang akan tetap datang berobat kepadanya, karena keilmuannya telah terbukti. Pada saat itulah dapat dilihat betapa tidak samanya antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, tidak saja dalam pandangan manusia maupun Allah.

Allah mengisyaratkan dalam Alquran tentang orang-orang yang berilmu dengan kebajikan. Dan yang dimaksud dengan ilmu disini adalah

semua ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis maupun praktis, yang terjemahnya:

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Q.S. Al-Mujadalah : 11).

Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan tinggikan derajatnya oleh Allah. Mahabena Allah yang telah berfirman, yang terjemahnya:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, banyalah ulama." (Q.S. Fathir : 28).

Kata Allah dalam ayat ini adalah *Maf'ul bih* yang didahulukan, sedang kata Ulama adalah *fa 7*/yang diakhirkan. Maksudnya adalah bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Manakala ilmu pengetahuan mereka bertambah, maka bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Taala.

Dari semua itu lalu apa yang wajib atas seorang dokter muslim?! Kewajiban seorang dokter muslim adalah berusaha keras untuk belajar dan berprestasi, sehingga dapat terwujud tujuan yang dimaksud dari keilmuannya dan menjadi seorang muslim teladan yang dapat menjadi panutan bagi generasi muda.

Ketika seorang dokter muslim mulai membuka klinik apa yang harus dilakukan pada saat itu?! Seorang dokter muslim yang mulai membuka klinik janganlah memasang biaya perawatan yang mahal, sehingga ia akan mendapatkan rida Allah, terlebih pada saat-saat sulit dalam kehidupan kita seperti saat ini. Banyak kebutuhan pokok yang harganya melambung, hingga memberatkan rakyat kecil. Jika ini ditambah dengan biaya perawatan kesehatan yang mahal bukankah rakyat akan semakin tercekik?!

Oleh karena itu kami memohon kepada para dokter muslim-semoga Allah memuliakan mereka- untuk dapat meringankan biaya perawatan kesehatan-. Seorang muslim harus memiliki sifat pemurah. Karena orang yang ingin mendapatkan uang dan kekayaan tidak seharusnya masuk dalam dunia kedokteran. Karena pada dasarnya dokter bukanlah jenis pekerjaan yang bertujuan untuk menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu merupakan satu kesalahan jika ada rumah sakit yang disebut rumah sakit berbunga. Apa artinya berbunga?! Apakah ia akan mengambil keuntungan dari menolong orang-orang sakit?! Kemana lagi kita akan pergi?! Apa yang harus aku lakukan jika aku sakit misalkan?! Apakah itu artinya bahwa aku akan mati dengan penyakitku hanya karena permasalahan biaya?

Subhanallah .. kita harus memiliki rasa kasih sayang dalam hati kita, karena dokter sekarang menjadi jalan untuk meraih kekayaan.

Dokter bukanlah jalan meraih kekayaan

Barangsiapa ingin menumpuk kekayaan, maka banyak cara-cara dan pekerjaan lain di luar sana untuk mendapatkan kekayaan, akan tetapi menumpuk kekayaan dari jalan menekan orang sakit merupakan hal yang tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima jika kamu mengambil keuntungan dengan menolong orang sakit. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melakukan hal tersebut. Wahai orang muslim berilah rasa kasih sayang pada hatimu. Maha benar Allah yang telah berfirman, yang terjemahnya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. "(Q.S. At-Taubah : 71). A

Apa yang dimaksud dengan Wali?! Maksudnya adalah kekasih .. penolong .. teman .. artinya bahwa sesama orang mukmin harus ada rasa kasih sayang antara satu dengan lainnya. Nabi bersabda,

"Sungguh Allah akan mengasih dari hamba-hamba-Nya yang mempunyai rasa kasih sayang. " Hadis lain yang diriwayatkan oleh At Thabari menyebutkan, *"Orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang akan dikasih oleh Allah yang Maha Pengasih, maka kasihilah orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasih oleh makhluk yang berada di langit. "*

Kita harus mempunyai rasa kasih sayang. Harga yang realistis menjadi mahal bagi masyarakat, bagi saya dan bagi seorang dokter. Oleh karena itu tidak masuk akal jika seorang dokter tidak mengambil upah dari kerjanya, akan tetapi dalam mengambil upah kerjanya harus dengan pertimbangan kasih sayang. Tidak meninggikan upahnya. Kenapa!! Karena orang sakit ketika pergi kepada seorang dokter dan mendapati bahwa harga periksanya cukup murah dalam batas kemampuannya, maka ia akan mendoakan agar Allah memberkati pada dokter tersebut.

Tidak tinggi hati dan takabur

Etika seorang dokter muslim yang selalu menjalankan ajaran agamanya tidaklah tinggi hati dan sombong. Karena setanlah yang menggerakkan jiwa-jiwa pada saat kesombongan muncul. Seorang dokter ketika melihat pandangan dan penghargaan masyarakat kepadanya mungkin hatinya akan bergetar dan ia akan merasa berbeda. Dan disinilah hal yang memungkinkan adanya bahaya.

Benar, ia seorang dokter, akan tetapi seharusnya ia merenung dengan baik, apakah ia dilahirkan dalam keadaan langsung menjadi dokter. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Malaikat ketika menanyainya, maka ia akan berkata kepadanya : apa yang kamu kerjakan?!

Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Yang wajib adalah bahwa kita tidak bersifat takabur dan tidak tinggi hati .. kita harus rendah hati.

Seorang muslim yang semacam ini ketika bertambah kemuliaannya, maka bertambah pula kerendahan hatinya. Oleh karena itu ketika ia rendah hati kepada Allah, maka Allah akan meninggikan kemampuannya dan kemuliaannya. Rasulullah saw bersabda, *"Tidaklah seseorang berendah hati kepada Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya."*

Kemudian kenapa kita harus tinggi hati dan takabur. Allah Taala berfirman, yang terjemahnya:

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setingggunung "(Q.S. Al-Israa' : 37).

Sahabat Ali berkata memberi tanda tentang keadaan manusia, "Pertama keadaan kamu adalah air mani yang jorok dan berakhir dengan mayat yang busuk. Kamu pada saat antara awal dan akhir kehidupan, kamu akan membawa beban." Seorang muslim tidak tinggi hati.

Subhanallah, mereka mengatakan : Sesungguhnya bau terbusuk adalah bau manusia ketika mati. Maha Suci Engkau wahai Tuhan, lihatlah hewan-hewan ketika mati .. bagaimana baunya?! Oleh karena itu Allah menjadikan alam kubur sebagai rahmat bagi kita. Allah berfirman, " Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur."(Q.S. 'Abasa: 21).

Tempat kembali kita adalah kematian. Maka tidak seharusnya kita tinggi hati dan takabur.namun seharusnya kita rendah hati kepada sesama hamba Allah. Seorang dokter ketika rendah hati kepada orang yang sakit, maka

berarti ia telah rendah hati kepada Allah. Orang sakit termasuk hamba-hamba Allah. Dia adalah nyawa yang telah Allah ciptakan.

Kamu wahai dokter .. kamu adalah seorang muslim. Berikan rasa kasih sayana dalam hatimu dan rendah hatilah kamu kepada Allah. Baginda Lukman ketika hendak berwasiat kepada anaknya, beliau berkata kepada anaknya,

“Hai anakku, dirikanlah salat dan surublah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang divajibkan (Olen Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Q.S. Lukman :17-18).

Apa yang dimaksud dengan semua ini?! Maksudnya bahwa seorang muslim seharusnya rendah hati kepada sesama saudaranya yang muslim, tidak boleh congkak dan sombong; karena Allah berfirman, " *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*"

Kemudian Allah berfirman,

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ



Yang terjemahnya:

"Dan sederbanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Q.S. Lukman : 19)

Semua ini adalah perilaku dan etika yang menunjukkan pada kesombongan dan kecongkakan. Nabi bersabda, *"Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat setitik sifat sombong."* Orang yang sombong tidak akan masuk surga dan kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Seorang muslim seharusnya berjalan dengan rendah hati dan tidak sombong.

Amanah

Seorang dokter haruslah seorang yang dapat dipercaya. Apa yang dimaksud dengan dokter harus dapat dipercaya?!. Sesungguhnya seorang dokter harus dapat dipercaya dalam memberikan nasihat kesehatan. Termasuk sifat amanah adalah dengan menjelaskan sebab-sebab penyakit kepada orang yang sakit. Lalu ia akan menjelaskan bagaimana cara penyembuhannya, maka inilah yang dimaksud dengan sifat amanah. Inilah pekerjaan orang yang dapat dipercaya. Allah berfirman,

"Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zâtim dan amat bodoh." (Q.S. Al-Ahzab : 72).

Allah juga berfirman, yang terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Allah Taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Lalu siapa yang berhak menerima amanah disini?! Orang yang sakit .. karena orang sakit adalah amanah yang dibebankan pada seorang dokter, maka seorang dokter sudah seharusnya menyampaikan amanah itu kepada orang yang sakit. Bagaimana ia menjadi orang yang dapat dipercaya bersama orang sakit?!

Seorang dokter harus dapat dipercaya untuk menjaga auratnya. Tidak boleh membuka auratnya kecuali jika memang hal itu sangat dibutuhkan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan aurat yang telah ia lihat, maka ia harus menjaganya untuk tidak membukanya pada orang lain. Termasuk sifat amanah adalah menjelaskan kepadanya bagaimana seseorang dapat terkena penyakit ini sehingga orang yang sakita tidak mengulangi kesalahannya lagi dan kembali berobat sebab sakit yang sama untuk kedua kalinya.

Termasuk sifat amanah lagi adalah jika seorang dokter menjelaskan kepada pasien bagaimana cara penyembuhannya. Jika ia melihat bahwa pemberitahuannya dengan beberapa kenyataan yang mungkin dapat mempengaruhi kejiwaannya dan perasaannya, maka sebaiknya ia menutupinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Akan tetapi tanpa berlebihan dalam menganggap ringan kondisi yang dideritanya. Mungkin ia dapat menyampaikan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak ringan, sehingga si pasien tidak menganggapnya ringan. Ini termasuk dari sifat-sifat amanah.

Kebalikan dari sifat amanah adalah sifat khianat. Nabi bersabda, *"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; ketika berbicara ia bohong, ketika berjanji mengingkari dan ketika dipercaya mengehianati."*

Ketika seorang dokter mengkhianati pasiennya -kita berlindung kepada Allah dari sifat khianat-, maka seolah-olah ia telah mengkhianati Allah Taala. Karena Allah memberikan amanah-Nya melalui si pasien. Amanah-sebagaimana telah kami katakan sebelumnya- ada empat macam; Amanah dari seorang hamba untuk disampaikan kepada Allah, amanah dari seorang hamba untuk disampaikan kepada hamba yang lain, amanah yang diberikan Allah kepada seorang hamba dan amanah anggota tubuh seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Amanah yang kita bicarakan adalah amanah seorang hamba yang harus disampaikan kepada hamba lain, maksudnya amanah yang diberikan kepada seorang dokter untuk disampaikan kepada pasien.

Berpenampilan menarik

Ini adalah titik yang sangat penting, sebab kamu seorang muslim. Dan termasuk etika seorang muslim yang harus dijalani adalah berpenampilan dengan penampilan yang islami dan bagus. Allah Taala berfirman, "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.*" (Q.S. Al-A'raf : 31). Begitu juga Alquran memerintahkan untuk menutup aurat dalam surat yang sama, yang terjemahnya:

"Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perbiasan. Dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudab-mudahan mereka selalu ingat. " (Q.S. Al-A'raf: 26).

Kita telah membicarakan masalah penampilan dalam pembahasan sebelumnya. Kami telah sampaikan kepada seorang muslim dari segala aspek hidupnya dan penampilannya. Bagaimana rasa itu ada?!

Penampilan seorang dokter menjadi teladan sekaligus sebagai media dakwah.

Imam Malik bin Anas berkata, "Ambil sebagian jenggot apa yang dianggap bagus oleh lingkungan." Gigi seorang dokter harus tampak putih dan berbau wangi, penampiannya indah dan pakaian-pakaiannya bersih; pakaian putih bersih. Sesungguhnya agama memerintahkan kepada kita untuk tampil indah dan Islam juga mengajak kita berhias untuk istri. Abdullah bin Abbas berkata, "Sungguh aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang jika istriku berhias untukku."

Lihatlah sampai seberapa tinggi derajatmu!! Jika untuk berhadapan dengan orang asing saja kamu harus berhias, maka lebih berhak lagi jika kamu berhias untuk pasien. Maka seharusnya pasien melihat dokternya dengan kondisi bersih dan harum dalam berpakaianya serta tampak rapi dan indah. Nabi bersabda, "*Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebijiisawi sifat sombong.*" Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, sungguh aku senang jika pakaianku dalam keadaan bersih dan imamahku juga dalam keadaan bersih. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah itu Dzat yang Maha Indah yang mencintai keindahan .. sifat sombong meninggalkan kebenaran dan jauh darinya serta menjadikan tinggi hati kepada manusia. "Karena penampilan yang bagus sangat dituntut seperti profesi seorang dokter. Benar, jika seorang dokter perempuan muslimah, maka apa yang lebih indah dan mempesona tampilan luarnya yang memakai gamis panjang dengan setelan jas panjang putih yang bersih, sehingga jika jas putihnya lebih pendek dalam beberapa bagian, maka pakaian dibawahnya akan tetap tampak panjang dan menutup auratnya.

Menjadi teladan yang baik

Seorang dokter muslim harus menjadi teladan yang baik bagi pasien. Bagaimana seorang dokter menjadi teladan yang baik? Untuk menjadi teladan bagi pasien, seorang dokter harus berusaha untuk tidak melakukan kesalahan di depan pasien. Seorang dokter adalah teladan bagi pasien, maka tidak seharusnya si pasien melihat dokternya sedang melakukan kesalahan.

Salah seorang penyair berkata :

Jika sang pemilik rumah memukul rebana

Maka pembawaan anggota keluarga semuanya adalah penari

Apabila seorang dokter merokok di depan pasien misalkan. Maka pasien akan menemukan pada diri sang dokter teladan baginya ia akan dirasuki beberapa tindakan dan pemahaman serta dia akan bertanya : Jika rokok itu berbahaya dan haram, sedang ada seorang dokter yang sedang merokok di depannya, maka pengertian dan pemahaman dia pada saat itu akan mengatakan bahwa merokok tidaklah berbahaya dan juga tidak haram. Terlebih jika dokter yang melakukan hal tersebut, penampilannya menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang taat.

Oleh karena itu kami ingin menegaskan kembali bahwa seorang dokter harus menjadi teladan di depan pasien dengan tidak merokok dan tidak memakai perhiasan dari emas. Ia juga tidak melakukan tindakan-tindakan atau perkataan-perkataan yang dapat mengurangi keteladanannya itu.

Allah Taala berfirman, yang terjemahnya:

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, |, sedang kamu me]upakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?" (Q.S. Al-Baqarah : 44).

Baginda Nabi Syau'aib berkata kepada kaumnya,

"Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezekiyang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesang-gupan. Dan tidak ada tawfik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan Hanya kepada-Nya-lah aku kembali." (Q.S. Huud : 88).

Alquran menyebutkan hal tersebut kepada kita dalam beberapa ayat. Dalam surat Al Shaff Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Wahai orang-orangyang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. "(Q.S. Al Shaff :2-3).

Maka pada saat itulah seorang dokter harus menjadi teladan dengan tidak merokok. Sebab merokok itu hanya menghambur-hamburkan uang dan berlebih-lebihan, sebagaimana bahwa dalam rokok terdapat zat yang membahayakan bagi kesehatan fisik kita. Walaupun jika sebagian orang menganggap hukum merokok secara mutlak adalah makruh bukan haram. Apakah banyak melakukan hal-hal makruh dan membiasakanya menjadikannya melakukan hal yang diharamkan.

Adapun mengenai perhiasan yang terbuat dari emas, sebagaimana adanya nas yang menyatakan keharamannya dalam hadis nabi. Sungguh Nabi telah mengharamkan memakai perhiasan emas sebagaimana diharamkannya kain sutra ketika beliau mengatakan, *"Kain sutra dan perhiasan emas itu bukurmya*

haram bagi kaum lelaki umatku." Akan tetapi perhiasan emas dan kain sutra halal bagi kaum perempuan. Dalam kitab *Shahih Muslim* menyebutkan bahwa Nabi melihat cincin yang terbuat dari emas pada jari tangan seseorang, lalu Nabi melepas dan membuangnya seraya berkata, "*Salah seorang kalian akan menjadi tiang batu dari api neraka lalu ia akan menjadikannya dalam tangannya.*" Setelah Nabi pergi, lalu dikatakan kepada laki-laki tersebut, "Ambil cincinmu dan ambil manfaat dengannya." Lalu ia berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil apa yang telah Rasulullah buang."

Seorang dokter adalah teladan bagi pasien dan jika tidak, maka ia akan termasuk dalam golongan yang dalam hadis Nabi -|f. menyebutkan, "*Seorang laki-laki akan didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, lalu isiperutnya akan menariknya lalu ia akan berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar dikobaran api, lalu penduduk neraka berkumpul dan berkata, "Hat Man, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran?" Ia menjawab, "iya, aku memerintahkan pada kebajikan namun aku sendiri tidak melaksanakannya dan aku mencegah kemungkaran namun aku sendiri melakukannya."*

Menjaga Salat

Ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Seorang dokter akan banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dalam ruang praktiknya, rumah sakit atau klinik. Dari sinilah adanya kemungkinan yang sangat berbahaya. Setan akan selalu menggodanya dan marayunya di dalam hatinya. Setan akan membuatnya sibuk melayani para pasien dan bahwa bekerja itu juga ibadah. Dan setan akan merayunya untuk meninggalkan salat yang pada dasarnya merupakan inti ibadah. Dan setan juga menggodanya dengan pekerjaan yang dapat menghasilkan harta dengan dalil bahwa bekerja adalah ibadah!!

Bekerja adalah ibadah, akan tetapi salat adalah kewajiban. Benar, bahwa bekerja adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah, akan tetapi ketika datang waktu menjalankan ibadah, maka kita harus melaksanakannya. Karena Allah Taala memerintahkan hal tersebut. Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat mustbaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk "(Q.S. Al-Baqarah :238).

Allah juga berfirman,

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١١٣﴾

"Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nisaa' : 103).

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. ketika bertanya kepada Nabi saw, "Pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah, wahai Rasulullah? Rasulullah saw berkata, "*Salat tepat pada waktunya.*"

Maksudnya bahwa seorang muslim agar mendirikan salat sendirian ketika la mendengar suara azan. Jika ia tidak melakukannya, maka sesungguhnya la akan di cap atasnya. Perkataan Nabi saw, "*Janji yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka barangsiapa meninggalkan salat berarti telah kafir.*"

Nabi saw juga mengatakan, "*Sesungguhnya yang membedakan seorang laki-laki antara syirik dan kafir adalah meninggalkan salat.*"

Lalu apa solusinya sekarang?! Islam adalah solusi yang tepat ..Bagaimana?!

Akan kita wajibkan bahwa seorang dokter yang hendak masuk ruangan praktik sebelum asar dan jangan keluar kecuali setelah magrib. Lalu apa solusinya dengan melakukan itu?! Sebelum ia masuk ruang praktiknya, ia melakukan salat zuhur dan Asar terlebih dahulu dengan di *jamak Taqdim*. Dan ketika ia masuk sebelum magrib, maka ia melaksanakan salat maghrib dan Isya setelah keluar dari ruang praktik dengan *jamak Takhir*.

Tidak berdua-duaan dengan wanita

Jika tidak boleh berdua-duaan dengan wanita, lalu bagaimana seorang dokter akan memeriksa pasien perempuan?! Untuk menjaga terjadinya, hal tersebut harus ada perempuan muslimah lain yang menemaninya, baik perempuan itu adalah saudara perempuan, tetangga atau temannya. Dan yang lebih utama pasti jika seorang perempuan pergi berobat kepada seorang dokter perempuan. Akan tetapi jika tidak mudah menemukan seorang dokter perempuan atau dokter perempuan spesialis berhalangan datang atau jika seorang dokter laki-laki yang ia datangi untuk berobat memang lebih pintar dalam bidang spesialisasinya, maka tidak ada yang dapat melarang untuk mendatanginya dan periksa kepadanya. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak boleh berdua-duaan.

Apa yang dimaksud dengan tidak boleh berdua-duaan?! Maksudnya adalah bahwa seorang dokter laki-laki tidak berada dalam satu kamar yang tertutup hanya berdua dengan pasien perempuannya. Dalam proses pemeriksaan si pasien perempuan tersebut tetap harus ditemani oleh orang yang mempunyai mahram dengannya atau ditemani wanita muslimah yang dapat dipercaya.

Perkataan Nabi saw, "*Sungguh tidak berdua-duaan seseorang dari kalian dengan seorang perempuan dan seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali ia bersama seseorang yang*

memiliki hubungan mahram. " Maksudnya bahwa ia harus ditemani oleh mahramnya atau mahramnya menemaninya. Seperti saudara laki-lakinya, paman, keponakan atau anak dari istrinya. Nabi saw. ketika mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan berkata, "Takutlah kalian masuk dalam rumah yang hanya ada perempuan. " Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat saudara laki-laki suaminya?" Rasulullah menjawab, "Saudara laki-laki suaminya akan menimbulkan kematian, Saudara laki-laki suaminya akan menimbulkan kematian, Saudara laki-laki suaminya akan menimbulkan kematian." Rasulullah mengulangi jawabannya tersebut sebanyak tiga kali.

Kita telah menjelaskan tentang hal tersebut pada pembicaraan kita tentang *"Etika Seorang Muslim Dalam Berkunjung."* Dan kami menyebutkan bagaimana seharusnya adab berkunjung itu sehingga tidak ada *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan! Nabi saw telah bersabda, *"Ingatlah bahwa laki-laki dengan perempuan tidak berdua-duaan, maka sesungguhnya orang ketiganya adalah setan. 'Sebagaimana Nabi saw bersabda, "Tidak aku tinggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas fitnah laki-laki dan perempuan."*

Kenapa kami menegaskan atas kewajiban tidak boleh adanya khalwat antara dokter dengan pasiennya?! Apakah karena kami meragukan integritas seorang dokter?! Apakah kami tidak percaya sepenuhnya kepada seorang dokter? Kami hanya ingin melaksanakan syariat Allah dan ajaran agama-Nya serta menjalankan semua perintah-perintah-Nya. Adapun masalahnya adalah bahwa dokter itu seorang yang taat menjalankan ajaran agamanya, begitu pula si pasien. Maka ini adalah hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Dan kami hanya sekadar melaksanakan syariat Allah dan ajaran-ajaran Islam.

Selama Nabi saw memerintahkan hal tersebut, maka tidak ada pilihan bagi kita selain mendengarkannya dan taat melaksanakannya. Dan dalam perintah Nabi ;|f. tidak ada lagi perdebatan maupun bantahan. Perkaranya tidak hanya khusus untuk laki-laki saja. Seorang perempuan pun juga tidak seharusnya melakukan tindakan berduaan dalam ruangan tertutup bersama seorang pria. Apabila seorang dokter perempuan yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki, maka harus ada orang yang mempunyai hubungan mahram dengan si pasien untuk menemaninya.

Menjaga pandangan mata

Ini juga termasuk hal yang sangat penting hubungannya dengan para dokter, baik ia bersama pasien, perawat maupun dengan sekretaris

di dalam sebuah lembaga medis. Seorang dokter harus selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Dengan begitu tidak ada celah pintu yang terbuka untuk setan menggoda, tidak ada khalwat dan *ikhtilath*.

Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. " Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. " (Q.S. An-Nuur :-30-31).

Nabi saw memberi wasiat kepada Ali bin Abu Thalib sebagaimana telah diketahui bahwa Ali bin Abu Thalib terkenal dengan sebutan *Karamallahu wajhab* (Allah telah memulyakan mukanya)-, "*Jangankamu ikuti pandangan pertama*

dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya kamu hanya mempunyai hak pada pandangan pertama dan pandangan berikutnya bukanlah hakmu. "

Sebagaimana orang-orang mengatakan Pandangan, lalu senyuman, lalu berkirin salam, lalu saling berbicara, kemudian membuat janji bertemu. Dasar dari semua ini adalah berawal dari pandangan. Nabi saw ditanya tentang pandangan refleksi. Nabi saw, berkata, "*Jagalab pandangan matamu. "* Hal tersebut karena pandangan pertama adalah hakmu dan pandangan selanjutnya bukanlah hakmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan pandangan pertama pada hawa nafsunya. Yang dimaksud dengan pandangan pertama disini adalah pandangan sekilas yang menimpa seorang perempuan dan laki-laki sebagai tabiat sesuatu yang ia lihat padanya.

Bagaimana menjaga pandangan mata seorang dokter dari pasien? Kita mengetahui bahwa fisik seorang perempuan semuanya adalah aurat kecuali apa yang tampak pada muka dan telapak tangannya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa muka dan telapak tangan juga termasuk aurat. Ketika kita mengambil pendapat kebanyakan ulama fikih yang berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan boleh ditampakkan, maka seorang dokter ketika hendak melakukan pemeriksaan pada bagian apapun dari tubuh pasien perempuannya, maka si pasien haru ditemani oleh seseorang yang mempunyai hubungan mahram.

Bagi pasien perempuan agar menjaga auratnya dan tidak menampakkan kecuali bagian yang akan diperiksa oleh dokter. Apabila seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan, maka ia harus menjaga pandangan matanya dari aurat pasien. Jika tidak demikian, mnkn ia akan terkena hadis Nabi saw "*Setiap anak keturunan Adam melakukan zina. Kedua mata melakukan zina dan zinanya adalah pandangan. Kedua tangan melakukan zina dan*

zinanya adalah memukul tanpa alasan yang benar. Kedua kaki melakukan zina dan zinanya adalah berjalan dalam kerusakan. Mulut berzina dan zinanya adalah berduman. Hati menginginkan dan condong. Sedang alat kelamin yang akan membenarkan hal tersebut atau mengingkarinya. "

Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, Lidah dan dua buah bibir. Dan kami Telah menunjukkan kepadanya dua jalan. " (Q.S. Al-Balad : 8-10).

Kedua mata adalah nikmat dari Sang Pencipta yang Mahakuasa mengambil nikmat yang diberikan tersebut. Oleh karena itu kita seharusnya menjaga kenikmatan yang telah diberikan dan menggunakannya sesuai dengan perintah-Nya.

Oleh *karena* itu seorang dokter muslim harus menjaga pandangan matanya, baik ia sedang bersama pasien-pasien perempuan, perawat-perawat maupun terhadap sekretaris ia harus menjaga pandangan matanya dan selalu bertakwa kepada Allah dalam menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya.

Memohon pertolongan kepada Allah

Seharusnya seorang dokter muslim selalu ingat bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebab atas kesembuhan yang terjadi ini. Dengan jalan resep obat yang ia tuliskan untuk si pasien. Bukan obat yang membuat si pasien sembuh, akan tetapi kekuasaan Allah dan rahmat-Nya lah yang diberikan untuk kesembuhan-nya dengan jalan obat tersebut.

Seorang dokter harus selalu mengatakan kepada pasien bahwa Allah lah yang sebenarnya menyembuhkan dan mengingatkan pasien untuk selalu berdoa sebelum meminum obat. Dengan *menyebut nama Allah yang Maha Menyembuhkan*.

Termasuk hal yang baik jika seorang dokter menuliskan pada resep doa tersebut. Imam Muslim meriwayatkan Hadis Nabi saw dalam kitab *Shahihnya*, " letakkan tanganmu pada tempat yang terasa sakit dari anggota tubuhmu dan katakan : tiga kali. Dan ucapkan tujuh kali :

(Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaan-Nya dari buruknya penyakit yang aku rasakan dan aku takutkan).

Kemudian ia menulis resep obat yang yang diberikan kepada pasien setelah huruf R dan dua hal. Ia juga dapat menuliskannya dalam cetakan di bawah resep doa Nabi saw

(Aku memohon kepada Allah Tuhan 'Arasy yang Agung agar menyembuhkanmu).

Sebagaimana ia juga dapat menuliskan hadis Nabi saw "*Dengan menyebut nama Allah aku mengobatimu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu, dari jiwa yang punya niat buruk atau mata yang iri dengki. Dengan nama Allah aku mengobatimu dan Allah yang akan menyembuhkanmu. "*

Jika dokter tidak dapat menulis hadis tersebut di atas dengan baik dalam nota resep, maka ia dapat memesan pada percetakan untuk mencetak hadis tersebut di atas dalam kertas yang terpisah yang akan diberikan kepada pasien bersama dengan resep yang diberikan seraya berkata kepada pasien : Ambil resep obat ini dan tebuslah di apotik. Adapun obat lainnya adalah apa yang telah diberikan oleh Rasulullah saw.

d) Yakin dalam pekerjaan

Apa yang dimaksud dengan yakin dalam pekerjaan?! Maksudnya adalah bahwa seorang dokter harus benar-benar teliti dalam melakukan diagnosis. Dan ia juga harus mempunyai jawaban yang cepat serta akurat dalam menemukan jenis penyakit pasien, sebagaimana ia harus mencegah sedini mungkin merembetnya penyakit pasien.

Ketelitian dalam mendiagnosis adalah pekerjaan yang akan mengakibatkan kepada telitinya pengobatan dan keberhasilannya. Namun jika diagnosis salah atau tidak akurat, maka hal itu akan mengakibatkan pada hasil yang mengecewakan. Islam mengajarkan kepada kita untuk teliti dalam bekerja. Dalam Alquran Allah berfirman,

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

Yang terjemahnya:

"Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"(Q.S. Al-Kahfi : 94).

Apa yang dikatan oleh Dzulkarnain kepada mereka,

"Berilah Aku potongan-potongan besi. " Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu). " hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata, "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar Aku kutuangkan ke atas besi panas itu. " Maka

mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya." (Q.S. Al-Kahfi : 96-97).

Kenapa mereka tidak mampu naik ke atas gunung dan tidak mampu melubanginya? Ini termasuk dari ketelitian dalam bekerja. Islam mengajarkan kepada kita tentang ketelitian dan yakin dalam pekerjaan. Teliti dalam bekerja akan mendapat hasil yang besar sebagaimana dalam kisah baginda Nabi Sulaiman dengan Bilqis yang diceritakan dalam surat An-Naml. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman terhadap Ratu Bilqis? Nabi Sulaiman membuat bangunan yang terbuat dari kaca yang dipersembahkan untuk Ratu Bilqis dan dibawahnya terdapat kolam air yang mengalir sehingga tampaklah ikan-ikan yang berenang di dalam kolam tersebut. Karena ketelitian dalam membuatnya sehingga orang yang melihat akan mengira bahwa itu adalah air. Oleh karena itu Ratu Bilqis mengiranya bahwa itu hanyalah air dan ketika ia berjalan di atasnya tampaklah kedua betisnya. Dalam Alquran Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana. "Makatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." berkatalah Bilqis, "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta a/am. "(Q.S. An-Naml :44).

Sungguh itu semua adalah hasil dari kerja yang teliti dan penuh keyakinan. Nabi saw| bersabda, *"Sesungguhnya Allah mencintai ketika salah satu kalian melakukan pekerjaan agar melakukannya dengan penuh keyakinan."*

Melakukan langkah ilmiah yang lebih maju dan riset-riset baru

Ini adalah hal yang sangat penting dalam kaitannya kepada seorang dokter. Seorang dokter harus selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, terlebih dalam bidang yang ia tekuni dan melakukan riset-riset tentang ilmu kedokteran. Sehingga ia akan mempunyai hasil penelitian dan pengetahuan tentang obat-obatan baru dan perkembangan teknologi dan menemukan alat-alat kedokteran serta cara-cara diagnosis baru. Karena semua itu akan memberikan keyakinan kepadanya serta kemampuan dalam profesinya akan diakui oleh kalangan dokter. Nabi saw bersabda, *"Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dalam semua pekerjaan ada kebaikan, maka semangatlah pada pekerjaan yang memberi manfaat kepadamu dan kamijangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka katakan: Allah telah menentukan dan apa yang Allah kehendaki, maka Allah lakukan. Takutlah kamu dengan kata "andai", karena kata "andai" itu membuka pekerjaan setan. "*

Seorang mukmin yang kuat adalah kuat dalam keilmuan, kuat dalam kehidupan di dunia, kuat harta benda dan kesehatannya. Oleh karena itu seorang dokter harus selalu bersemangat melakukan penelitian ilmiah dan semangat membuat prestasi dalam bidang kedokteran.

Membantu orang fakir miskin dan bersedekah

Bagaimana melakukan hal tersebut?! Ketika seorang dokter menemukan seseorang yang fakir, seharusnya ia tidak memungut apapun dari pemeriksaannya. Atau ketika ia mereka bahwa pasien yang masuk dalam ruang praktiknya adalah orang fakir, maka seharusnya ia mengembalikan biaya periksa lain kali. Atau ia menjadikan klinik miliknya satu hari untuk pemeriksaan gratis bagi kaum fakir miskin. Atau ia membantu pasien miskin yang tidak mampu membeli obat. Berikan kepadanya obat dengan gratis yang diproduksi oleh

pabrik obat yang dibuat oleh para dokter. Semua itu akan dihitung sebagai sedekah yang sangat dianjurkan oleh Islam.

Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Q.S, Adz-Dzariyat : 19).

Sebagaimana seorang muslim mengeluarkan zakat harta bendanya, sedekah juga bertujuan membersihkan jiwa dan harta benda. Menghilangkan rasa iri dan dengki dari hati orang-orang miskin. Sedekah juga menebarkan rasa cinta kasih dan kerelaan di antara manusia.

Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang Telah beriman, "Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezekiyang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan." (Q.S. Ibrahim : 31).

Seorang dokter harus selalu ingat bahwa rezeki yang diberika Allah kepadanya dari profesinya sebagai dokter terdapat bagian untuk para fakir miskin. Maka seharusnya ia menjadikan satu hari saja untuk pengobatan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan atau membebaskan biaya pengobatan pada kondisi-kondisi tertentu sebelum datang hari dimana tidak lagi bermanfaat harta benda, pangkat maupun derajat.

Nabi saw memberikan berita gembira bagi orang yang menafkahkan hartanya dalam kebaikan. Nabi saw bersabda, *"Tidak satu hari pun kecuali dua malaikat turun dari langit dan salah satunya berkata : Ya Allah berikan orang yang menafkahkan hartanya untuk kebaikan ganti yang lebih baik. Dan yang lainnya berkata :*

Ya Allah berikan pada orang yang tidak menafkan hartanya untuk kebaikan kerusakannya."

Mengalihkan pemeriksaan pada dokter yang lebih ahli

Mengalihkan beberapa situasi dimana keilmuannya tidak mampu lagi ketika menghadapi pada situasi-situasi tersebut kepada orang yang lebih berkompeten dan lebih ahli daripada dia manakala dia tidak mampu lagi melakukan diagnosis yang mendalam pada situasi-situasi tersebut. Tidak ada alasan untuk tetap melakukan pengobatan pada saat ia tidak mampu melakukannya, karena jika ia tetap melakukannya berarti ia lakukan itu hanya demi kesombongan dan menjadikan pasien sebagai percobaan saja.

Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui. "
(Q.S. Yusuf: 76).

Sebaiknya ia jujur pada dirinya sendiri dan pada Tuhannya. Ia akui saja bahwa situasi ini membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam dan memberitahukan pada pasien bahwa ia membutuhkan dokter lain yang lebih berkompeten dan merekomendasikan si pasien kepada seseorang yang dipandanginya sesuai dalam melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Dan ia sebaiknya mengembalikan biaya pemeriksaan kepada pasien yang telah membayarkannya walaupun ia telah melakukan pemeriksaan.

Contoh semacam ini jika dilakukan oleh seorang dokter, maka tidak ada yang dapat menambahnya kecuali pertama ia akan mendapat derajat yang tinggi disisi Allah kemudian disisi manusia. Dan orang-orang akan mengetahui bahwa dokter ini orang yang dapat dipercaya dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Allah telah memberikan kita contoh dalam masalah tersebut di atas

dalam surat Al-Kahfi, dalam kisah tentang baginda Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika baginda Nabi Musa berdiri di tengah-tengah Bani Israil mengingatkan pada mereka tentang nikmat-nikmat Allah pada mereka, lalu berdirilah seorang laki-laki dari Bani Israil dan berkata kepada Musa, "Apakah di tempat lain ada orang yang lebih pandai dari kamu yang hidup di muka bumi ini?"

Nabi Musa menjawab : "Tidak ada."

Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya bahwa di tempat lain ada seseorang yang lebih pandai daripada dia. Nabi Musa pun meminta kepada Allah untuk dapat pergi kepadanya di tempat yang telah Allah beritahukan kepadanya agar Nabi Musa belajar darinya. Dan kita mengetahui kisah ini, yaitu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir.

Mengajak kepada jalan Allah

Bagaimana seorang dokter menjadi dai yang mengajak kepada jalan Allah? Masalah ini sebenarnya sangat mudah. Seorang dokter ketika mengobati pasien selalu membaca nama Allah dan mengingatkan pasien untuk selalu mengucapkan seperti apa yang ia ucapkan, misalnya ;

" Insya Allah penyakitnya ringan dan dapat cepat sembuh dengan izin Allah."

" Insya Allah, Allah akan memberi kesembuhan padamu."

"Apakah kamu sudah salat?!"

Dan ia mengajaknya untuk senantiasa menjaga shalatnya sehingga Allah akan memuliakannya. Ini adalah dakwah yang langsung dan jett perbuatan. Pasien yang diperiksa kepada dokter tidak butuh diomongi, namun kondisi dan

perilaku seorang dokter sudah merupakan dakwah langsung untuk menuju Islam. Dengan budi pekerti yang baik dan teladmi dalam tindakan serta moral yang baik, semua itu adalah bentuk ajakmi kepada Allah.

Allah berfirman, yang terjemahnya:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-nya dengan hikmah dan pelajaran yang baik."
(Q.S. An-Nahl: 125).

Allah juga berfirman, yang terjemahnya:

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." (Q.S. An-Nisaa' : 144).

Apabila pasiennya seorang perempuan yang tidak berjilbab, maka ia dapat berbicara kepadanya tentang jilbab dan menjelaskan kepadanya tentang haramnya memperlihatkan rambut dan leher. Mungkin ia juga dapat meminjamkan buku atau kaset tentang jilbab dan keutamaannya, dengan harapan ia akan mengembalikannya ketika ia kembali memeriksakan kesehatannya agar ia dapat memberikan manfaat dari buku tersebut kepada saudaranya yang lain.

Tidak memberikan obat-obat yang diharamkan atau menganjurkan untuk membelinya

Obat-obat yang diharamkan adalah obat-obatan yang dalam susunan materinya terdapat zat-zat yang diharamkan oleh syariat. Seorang dokter

muslim seharusnya tidak memberikan obat-obatan semacam ini, karena Allah Taala berfirman, yang terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. "(Q.S. Al-Maidah : 3).

Semua ini adalah termasuk hal-hal yang diharamkan. Seorang dokter muslim tidak seharusnya memberikan obat yang mengandung apapun dari semua yang diharamkan tersebut. Dia harus memberikan obat pengganti yang tidak mengandung sesuatu dari barang-barang haram tersebut. Karena Nabi saw bersabda, *"Allah tidak menjadikan obat pada sesuatu yang najis."*

Allah Taala tidak mengharamkan sesuatu pun kepada kita yang di dalamnya terdapat manfaat atau obat. Dan semua yang diharamkan oleh Allah pasti berbahaya dan tidak memberi manfaat. Oleh karena itu Allah mengharamkannya. Namun apabila terpaksa harus memberikannya karena tidak ada lagi pengantinya, maka hal tersebut masuk dalam kriteria terpaksa.

Allah Taala berfirman, yang terjemahnya:

"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. "(Q.S. Al-Baqarah : 173).

Seorang dokter muslim juga masuk dalam kriteria mufti, dengan keberadaannya sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, yaitu orang-orang yang dijadikan rujukan sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita,

"Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahu. "(Q.S. Al-Anbiya' : 7).

Dokter adalah orang yang paling berhak menentukan kepada seorang wanita muslimah apakah ia boleh berbuka saat puasa Ramadan jika ia sedang hamil atau tidak? jika kehamilannya menyebabkan bahaya pada kehidupannya. Ini merupakan fatwa dari dokter, karena ia termasuk orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam profesinya. Oleh karena itu takwa kepada Allah dan merasa selalu diawasi merupakan hal yang sangat penting dalam tugas seorang dokter, kehidupan dan pekerjaannya.

Seorang dokter harus memberikan tempat khusus dalam kliniknya sebagai ruang tunggu antara laki-laki dan perempuan. Atau memisahkan antara ruang tunggu pria dan wanita dengan kain pemisah sehingga tidak terjadi *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan.

Kedua; menyediakan beberapa majalah atau kaset islami;

Untuk mengisi waktu menunggu para pasien yang mengantri di ruang tunggu, mereka dapat memanfaatkan waktu menunggu gilirannya dipanggil dengan hal yang bermanfaat, yaitu dengan memberikan kepada mereka beberapa majalah islami yang dapat diambil manfaatnya oleh para pasien. Atau beberapa kaset islami yang dapat diambil manfaatnya oleh para penunggu dan memberikan pengetahuan yang benar tentang Islam kepada mereka.

Ketiga; Disiplin datang tepat waktu di klinik ;

Seorang dokter muslim harus menjadi teladan dalam hal disiplin dengan datang tepat waktu yang telah ditentukan oleh klinik. Ia harus menghargai waktu. Ketika terjadi hal yang darurat misalkan yang mengakibat ia

datang terlambat dari waktu yang telah dijadwalkan, maka ia harus menghubungi pihak klinik dan memberitahukan sekretaris untuk memintakan maaf kepada orang-orang yang telah menunggu. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, karena Nabi saw berkata dalam hadisnya tentang sifat-sifat orang munafik -kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat munafik-, *"Dan ketika berjanji mengingkari."* Ini adalah tiga hal terakhir yang khusus untuk seorang dokter muslim yang mempunyai klinik sendiri. Kita memohon kepada Allah Taala agar memberikan berkah pada saudara-saudara dan saudari-saudari kita para dokter agar menjadikan mereka semua sebagai teladan yang baik. Dan semoga Allah memberikan berkah pada mereka serta menjadikan obat pada tangan-tangan mereka. Aku katakan perkataanku ini dan aku memohon ampunan Allah untukku dan kalian semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Dan Terjemahan. CV Penerbit Al Jumanatul Ali Art, 2001
- Abdurrahman, et.al. *Upaya Pengendalian Infeksi Nosokomial di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI (RSCM)*, Majalah Kedokteran Indonesia, 1991
- Anonim, Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS). Departemen Kesehatan RI. Jakarta; 2009
- Anonim, Infeksi “ Rumah Sakit “ *mengancam pasien*, Intisari Jakarta. www.handoko.net/keluarga.org/infeksi_rs.html. 2003
- Anonim, *Infeksi Nosokomial Masalah Besar*, (online), ([Http : // www. Suara Merdeka.Com](http://www.SuaraMerdeka.Com), diakses tanggal 7 Oktober 2005
- Anonim, *Petunjuk Pengendalian Infeksi Nosokomial RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo*. Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Edisi 2. Jakarta; 1999
- Arthur Pohan, et.al. *Mikrobiologi Kedokteran Versi 2.0 Volume 1*
- Bhisma Murti, Metode Riset dan Penelitian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998
- Gapte S; *Nosokomial Infection, The Short Textbook of Medical*, terjemahan Julius E.S Binarupa Aksara, Jakarta 2000
- Guntur A, H., *The Role of Cefepime: Empirical Treatment in Critical Illness*, Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Moewardi - Fakultas Kedokteran UNS Surakarta, 2007
- Iskak, Rusdiyanto, *Infeksi Nosokomial dan Staphylococcus epidermis*, www.republika.com, 2004
- Kusmanto N, *Pengendalian Infeksi Nosokomial*, Mitra Benua Company, Yogyakarta, 1997
- Kusnadi, CS, *Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu (Vektor Control Manual)*, Instalasi Penerbitan Jurusan Kesling Poltekkes Makassar, 2004
- Madjid Baedah, *Infeksi Nosokomial*, bahan kuliah Fakultas Kedokteran Unhas Makassar , 2001
- Mughoni Wahyu, *Etika Seorang Muslim Jalan Untuk Meraih Kebahagiaan*, Bandung: Mizan, 2009.
- Muhammad Abdullah, *Shahih Bukhari Kitab Shalat halaman 159*, Darul Kitab Alamiyah, Beirut Lebanon Tth.
- Musadari DA, Agustin L, Kasnodihardjo. *Kebiasaan cuci Tangan Petugas Rumah Sakit dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial*. Cermin Dunia Kedokteran; 1993; 82: 28-31.
- Nata Abuddin, *Tafsir Ayat – Ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Noor Nur Nasry, A. Arsunan Arsin, *Epidemiologi penyakit menular*, Epidemiologi FKM Unhas Makassar 2002
- Pajarianto dkk, *Integrasi Islam Dalam Praktek Keperawatan dan Kebidanan*, Makassar: Refleksi, 2001
- Pudjarwoto Triatmodjo. *Gambaran Higiene Lingkungan Beberapa Rumah Sakit di Jakarta Ditinjau dari Sudut Mikrobiologi dalam Kaitannya dengan Infeksi Nosokomial*. Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tahun XXI; 1993; 1.
- Pramono, *Faktor -Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Islam Samarinda Tahun 2003*, Tesis Pasca Sarjana unhas, 2003
- Sardjito R, Rahim A, Suharto. *Penelitian Mengenai Populasi Kuman (Ruangan, Udara, Peralatan, Beban Makananl Minuman dan Petugas) di Beberapa Rumah Sakit den Laboratorium di Jakarta*. Jakarta; Penerbit FKUI; 1985.Surbakti R, Survei Prevalensi Infeksi nosokomial di WRSUD Indonesia, Berita Epidemiologi, 1999
- Shaleh Abdullah, *Intisari Tafsir Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, Jakarta: Daarut Tarbiyah, 2006
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1992.
- Suryadia, *Pengendalian Infeksi Nosokomial di bagian Bedah, Pelatiban Pengendalian Infeksi nosokomial*, RSUD dr. Sardjito, Yogyakarta, 2000
- Sutoto dan Soerachmad S; *Masalah Infeksi Nosokomial dan Usaha Pencegahannya di Indonesia*, Depkes RI.
- Syahrul F, *Faktor -Faktor Yang mempengaruhi Kejadian Infeksi Luka Nosokomial di Lab UPF Bedah RS Dr. Sutomo Surabaya tahun 1994 – 1996*, Hasil Penelitian tidak dipublikasikan Surabaya, 1996
- Utama, Harry Wahyudhy, *Infeksi Nosokomial*, www.klikharry.com, 2006
- Widodo, W, *Analisa Situasional Pelaksanaan Program Kebersihan dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di SMF Rawat Inap RSUD dr. Sardjito*, 1996.