

# HEALTH LITERACY SEBAGAI PREDIKTOR RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA MAKASSAR

*by* Novita Medyati, Ridwan Amiruddin, Arsunan, A.a, Muhammad  
Syafar,saifuddin Sirajuddin,risnah

---

**Submission date:** 09-Sep-2019 10:10AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1169305525

**File name:** LITERACY\_SEBAGAI\_PREDIKTOR\_RISIKO\_PENYAKIT\_-\_Februari\_2019.docx (69.72K)

**Word count:** 2130

**Character count:** 15984

**HEALTH LITERACY SEBAGAI PREDIKTOR RISIKO PENYAKIT  
KARDIOVASKULAR PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA MAKASSAR**

Novita Medyati<sup>1</sup>, Ridwan Amiruddin<sup>2</sup>, Arsunan, A.A<sup>3</sup>,  
Muhammad Syafar<sup>4</sup>Saifuddin Sirajuddin<sup>5</sup>Risnah<sup>6</sup>

Corresponding author : (novitauncen@gmail.com, 085344101041)

**ABSTRAK**

*Health literacy* merupakan sebuah konsep yang dapat memberikan pengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *health literacy* dengan risiko penyakit kardiovaskular pada tukang masak sektor informal di Kota Makassar. Metode Studi kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea pada 80 tukang masak sektor informal yang ditentukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan HLS-EU pencegahan penyakit kardiovaskular, dan formulir isian *Jakarta Score Cardiovascular*. Pengolahandata dengan SPSS versi 20 for Windows, analisis data dengan uji *Chi Square* pada CI 95% dan  $p < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah tukang masak sektor informal memiliki tingkat *health literacy* rendah (63,7%) dan berada pada kategori risiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskular (52,5%). Terdapat hubungan yang signifikan antara *health literacy* yang rendah dengan risiko penyakit kardiovaskular ( $p = 0,006$ ). Sebagai kesimpulan bahwa *health literacy* yang rendah sangat berpengaruh terhadap risiko penyakit kardiovaskular. Disarankan agar menggunakan Model tindakan pencegahan berbasis *health literacy* yang perlu dilakukan pada pekerja sektor informal agar dapat mandiri dalam mengupayakan kesehatannya.

Keyword: *Health literacy*, Risiko penyakit kardiovaskular

**PENDAHULUAN**

Menurut WHO (2016), kematian akibat penyakit kardiovaskular telah menyerang lebih dari 75% penduduk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah(1). Kondisi ini disebabkan oleh karena oleh karena program perawatan kesehatan primer terpadu untuk deteksi dini dan pengobatan bagi masyarakat yang memiliki factor risiko sering tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga penyakit lambat terdeteksi dan akhirnya mengalami kematian(2).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko kematian prematur yang tinggi. Menurut WHO (2016), penyakit tidak menular diperkirakan 75% sebagai penyebab kematian dari semua kematian, sebanyak 35% proporsi kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan(3).

Dunia internasional terus berusaha mengurangi kejadian penyakit tidak menular. *World Heart Federation* (WHF) telah mencetuskan sebuah program

pengecahan dan pengendalian penyakit kardiovaskular dinamakan *25 by 25 Global Target*. Program ini dibuat dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian prematur akibat PKV sebesar 25% pada tahun 2025(4).

Untuk skala nasional, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan pengendalian terhadap risiko penyakit kardiovaskular, seperti membuat pedoman pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah(5), program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), dan imbauan CERDIK (cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres) (6), namun hasilnya belum maksimal. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) membuktikan meningkatnya kasus penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular tahun 2018 dibandingkan tahun 2013 (7).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawidjaja (2007) pada beberapa perusahaan di Indonesia, menemukan 40% - 58,3 % disebabkan oleh penyakit kardiovaskular(8). Tukang masak sektor informal merupakan pekerja dengan angka prevalensi yang tinggi terhadap kejadian hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh Bosu(2015) menemukan prevalensi hipertensi tertinggi pada tukang masak di daerah Africa barat yaitu sebesar 68,9% dibandingkan jenis pekerjaan lainnya(9).

Faktor penyebab penyakit kardiovaskular pada pekerja, dapat diakibatkan oleh lingkungan kerja seperti kebisingan(10-13), stres kerja (14-16), bahan kimia berupa polutan (17, 18), beban kerja(19, 20), serta perilaku hidup sehat(8, 14). Kurniawidjaja melaporkan hasil identifikasi kasus penyakit kardiovaskuler pada pekerja di salah satu pabrikomotif dan menemukan 23 % pekerja yang berisiko tinggi, 50 % berisiko sedang terserang penyakit kardiovaskuler, dimana faktor risiko dominan penyebab gangguan kesehatan tersebut adalah faktor yang dapat diintervensi dengan perilaku hidup sehat(8).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Won *et.al* (2013) menemukan bahwa pengetahuan merupakan salah satu predictor yang signifikan dengan kejadian kardiovaskular pada pekerja(21). Menurut Setyawaty, kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, mengakibatkan pekerja berisiko mendapatkan kecelakaan akibat terjadinya penyakit akibat kerja seperti penyakit akibat hubungan kerja(22).

*Health literacy* merupakan hal yang mendasari pengetahuan kesehatan yang baik dan sangat berpengaruh pada perilaku kesehatan individu(23). Penelitian yang dilakukan oleh Andrade dkk (2017),

untuk mengkaraktisasipengetahuankhusus tentang penyakit kardiovaskular, khususnya stroke dan infark miokard (MI), dan hubungannya dengan faktor sosiodemografi, pengetahuan kesehatan dan sejarah klinis, pada 1624 penduduk Portugal, menemukan adanya kesenjangan penting dalam pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan kardiovaskular pada masyarakat Portugal. Andrade dkk (2017), menyarankan perlunya strategi dan praktik pendidikan kesehatan yang untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan kardiovaskular di kalangan penduduk Portugal (24).

## METODE

Penelitian ini menggunakan *studi cross sectional* mulai dari Januari sampai Februari 2018 pada 80 tukang masak sektor informal yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner HLS-EU pencegahan penyakit kardiovaskular, terdiri atas 15 pertanyaan untuk pencegahan penyakit untuk para pekerja (23). Kuesioner *health literacy* merupakan kuesioner standar namun peneliti memodifikasi kuesioner sehingga lebih mudah dimengerti oleh responden tanpa merubah tujuan dari tiap pertanyaan.

Hasil uji validitas dengan membandingkan nilai  $r$  tabel dengan  $r$  hitung diperoleh nilai  $r$  hitung (0,635 – 0,853) >  $r$  tabel, sehingga kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*, diperoleh nilai koefisien reliabilitas 0,943 > 0,60 maka pernyataan dikatakan reliabilitas. Penentuan risiko penyakit kardiovaskular menggunakan formulir isian *Jakarta Score Cardiovascular*. *Jakarta Score Cardiovascular* merupakan kuesioner standar sehingga tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas.


Diperoleh dari nilai risiko pada variabel jenis kelamin, umur, tekanan darah yang diukur menggunakan alat *Sphygmomanometer*, indeks massa tubuh (tinggi badan diukur dengan menggunakan *microtoise* yang mempunyai ketelitian 0,1 cm; berat badan diukur dengan timbangan injak), merokok, diabetes berdasarkan pernyataan responden pernah tidaknya didiagnosa oleh petugas kesehatan serta aktivitas fisik berdasarkan pernyataan responden yang mengacu pada kriteria di dalam *Jakarta Cardiovascular Score*, dengan tingkat sensitivitas 77,9% dan spesifisitas yang tinggi yaitu 90%, terhadap scoring studi Framingham (25). Pengolahan data dengan

SPSS versi 20 for Windows, analisis data dengan uji *Chi Square* pada CI 95% dan  $p < 0,05$ .

## ETIKA PENELITIAN


Berdasarkan rekomendasi persetujuan etik dengan nomor 768/H4.8.4.5.31/PP36-KOMETIK/2017, maka penelitian ini dapat dilaksanakan.

## HASIL



**Gambar 1.**  
Distribusi Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Responden

Pada Gambar 1 nampak hasil pengumpulan data diperoleh persentase risiko penyakit kardiovaskular terbesar pada responden berada pada kategori risiko tinggi (52,5%).



**Gambar 2.**  
Distribusi Tingkat *Health Literacy* Responden

Pada Gambar 2. Menunjukkan Identifikasi *Health Literacy* responden menggunakan kuesioner HLS-EU, diperoleh persentase terbesar responden berada pada kategori tingkat *Health Literacy* rendah (63,8%).

**Tabel 1.**  
 Hubungan *Health Literacy* dengan  
 Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Responden

<i>Health Literacy</i>	Risiko Penyakit Kardiovaskular			Total	p Value
	Tinggi	Sedang	Rendah		
Rendah	33(64,7%)	12(23,5%)	6(11,8%)	51 (100%)	0,006
Cukup	9(31,0%)	9(31,0%)	11(37,9%)	29(100%)	
Total	42(52,5%)	21(26,3%)	17(21,3%)	80 (100%)	

p value < 0,05.

Tabel 1 memperlihatkan persentase yang tinggi pada responden dengan *health literacy* rendah, memiliki risiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskular (64,7%). Terdapat trend peningkatan risiko penyakit kardiovaskular pada responden yang memiliki *health literacy* yang rendah. Tabel 1 juga memperlihatkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat *health literacy* dengan risiko penyakit kardiovaskular.

#### PEMBAHASAN

*Health literacy* atau literasi kesehatan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan kondisi kesehatannya dalam hal pengambilan keputusan yang tepat sehingga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat(26-28). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat *health literacy* responden berada pada kategori kurang (63,7%).

Tingkat *health literacy* yang kurang merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dari pemerintah karena melibatkan aspek pemahaman yang mendasar terhadap risiko suatu penyakit. Tingkat literasi kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa determinan, yang pertama adalah determinan personal yang meliputi usia, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan dan yang kedua yaitu determinan masyarakat dan lingkungan meliputi kondisi demografi, kebudayaan, bahasa dan sistem masyarakat) dan determinan sosial (dukungan keluarga maupun relasi)(28, 29).

Selain itu akses informasi kesehatan juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan dari penyedia layanan kesehatan(30)Khususnya bagi pekerja sektor informal, ciri khas yang melekat seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya akses terhadap

informasi kesehatan dan layanan kesehatan, pada akhirnya akan mengarah pada kesehatan pekerja yang buruk. Hasil survey yang dilakukan oleh ILO bekerjasama dengan Jamsostek ( Jaminan Sosial Tenaga Kerja), menemukan 80% pekerja sektor informal tidak memiliki jaminan kesehatan selain mengharapkan jaminan dari keluarganya(31).

Terkait dengan risiko penyakit kardiovaskular, hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara tingkat *health literacy* dengan risiko penyakit kardiovaskular. Terdapat kecenderungan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular pada pekerja dengan *health literacy* yang kurang dibandingkan dengan pekerja dengan *health literacy* yang kurangpekerja dengan *health literacy* yang cukup.

Penelitian yang dilakukan oleh Ko dkk (2013), menguatkan hasil penelitian ini. Ko dkk melakukan penelitian tentang hubungan antara *health literacy* dengan pengetahuan dan kontrol penyakit pada pasien dengan hipertensi di Singapura, menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *health literacy* pasien dengan hipertensi dan pengetahuan tentang hipertensi(32).

Hubungan *health literacy* dengan kasus penyakit yang berbeda dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Kalichman dan Rompa (2000) serta Giselle dkk (2006). Penelitian ini memberi bukti bahwa *health literacy* merupakan faktor yang memiliki hubungan yang bermakna dengan kesehatan dan pengobatan pasien dengan HIV Aids(26, 33). Menurut Nutbeam, *health literacy* merupakan tujuandarikonseppendidikankesehatandankomunikasiberbasisperilaku yang bertujuan bukan hanya untuk perubahan gaya hidup tetapi juga mencapai kesadaran yang engaruh kesehatan dan mendorong individu dan masyarakat bertindak dalam mengatasi masalah kesehatan(27).

Penelitian ini membuktikan bahwa pekerja sektor informal dengan tingkat *health literacy* yang rendah berpotensi mengalami risiko penyakit kardiovaskular, sehingga perlu dibuat suatu model tindakan pencegahan berbasis *health literacy* upaya pencegahan penyakit kardiovaskular pada pekerja sektor informal agar dapat mandiri dalam mengupayakan kesehatannya.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian ini bahwa *health literacy* yang rendah sangat berpengaruh terhadap risiko penyakit kardiovaskular. Sehingga disarankan agar menggunakan Model tindakan pencegahan berbasis *health literacy* yang perlu

dilakukan pada pekerja sektor informal agar dapat mengupayakan kesehatannya secara mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. Cardiovascular diseases (CVDs). Diakses dari <http://www.who.int> pada tanggal 6 November 2018. 2017.
2. WHO. Cardiovascular Disease. Diakses dari [http://www.who.int/cardiovascular\\_diseases](http://www.who.int/cardiovascular_diseases) pada tanggal 6 November 2018. 2016.
3. WHO. Indonesia, Risk of Premature Death Due to NCDs (%). Diakses dari <http://www.who.int> pada tanggal 6 November 2018. 2016.
4. Rilantono.I.L&Rahajoe.A.U. Penyakit Kardiovaskular pada Perempuan: Tantangan Abad ke - 21. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2014.
5. Depkes.RI. Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2007.
6. Kemenkes R. Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi, Kemenkes Ingatkan Cerdik Artikel ini diambil dari : [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)2017 [cited 2018 6 November].
7. Depkes R. POTRET SEHAT INDONESIA DARI RISKESDAS 2018 [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)2018 [cited 2018 20 November].
8. Kurniawidjaja M. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta: UI Press; 2010.
9. Bosu WK. The prevalence, awareness, and control of hypertension among workers in West Africa: a systematic review. *Global health action*. 2015;8:26227.
10. Assunta C, Ilaria S, Simone de S, Gianfranco T, Teodorico C, Carmina S, et al. Noise and cardiovascular effects in workers of the sanitary fixtures industry. *International journal of hygiene and environmental health*. 2015;218(1):163-8.
11. Ismaila SO, Odusote A. Noise exposure as a factor in the increase of blood pressure of workers in a sack manufacturing industry. *Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences*. 2014;3(2):116-21.
12. Gan WG, et.al. Exposure to loud noise, bilateral high-frequency hearing loss and coronary heart disease. *Occupation and Environmental Medicine*. 2016;73(1).
13. Girard SA, Leroux T, Verreault R, Courteau M, Picard M, Turcotte F, et al. Cardiovascular disease mortality among retired workers chronically exposed to intense occupational noise. *International archives of occupational and environmental health*. 2015;88(1):123-30.
14. Hegg-Deloye S, Brassard P, Prairie J, Larouche D, Jauvin N, Poirier P, et al. Prevalence of risk factors for cardiovascular disease in paramedics. *International archives of occupational and environmental health*. 2015;88(7):973-80.
15. Van Droogenbroeck F, Spruyt B. Do teachers have worse mental health? Review of the existing comparative research and results from the Belgian Health Interview Survey. *Teaching and Teacher Education*. 2015;51:88-100.
16. Backe EM, Seidler A, Latza U, Rosnagel K, Schumann B. The role of psychosocial stress at work for the development of cardiovascular diseases: a systematic review. *International archives of occupational and environmental health*. 2012;85(1):67-79.
17. Burroughs Pena MS, Rollins A. Environmental Exposures and Cardiovascular Disease: A Challenge for Health and Development in Low- and Middle-Income Countries. *Cardiology clinics*. 2017;35(1):71-86.



18. Miller ea. Long-Term Exposure to Air Pollution and Incidence of Cardiovascular Events in Women. *The new england journal of medicine*. 2007;356(5).
19. Black JK, Balanos GM, Whittaker Previously Phillips AC. Resilience, work engagement and stress reactivity in a middle-aged manual worker population. *International journal of psychophysiology : official journal of the International Organization of Psychophysiology*. 2017;116:9-15.
20. Mulyanto. Jumlah Karyawan di Jepang yang Tewas Akibat Kelelahan Bekerja Meningkat. diakses dari <https://internasionalkompascom> pada tanggal 7 November 2018. 2012.
21. Won.JU HO, Hwang.WJ. Actual Cardiovascular Disease Risk and Related Factors A Cross-sectional Study of Korean Blue Collar Workers Employed by Small Businesses *WORKPLACE HEALTH & SAFETY* 2013;61(4).
22. Setyawati L. *Selintas tentang Kelelahan Kerja*. Yogyakarta: Amara Books; 2010.
23. Doyle.G CK, Fullam.J. *The European Health Literacy Survey :Results From Ireland*. Dublin Ireland University. 2012.
24. Andrade N, Alves E, Costa AR, Moura-Ferreira P, Azevedo A, Lunet N. Knowledge about cardiovascular disease in Portugal. *Revista portuguesa de cardiologia : orgao oficial da Sociedade Portuguesa de Cardiologia = Portuguese journal of cardiology : an official journal of the Portuguese Society of Cardiology*. 2018;37(8):669-77.
25. Kusmana D. Pengaruh Tidak/Stop Merokok Disertai Olahraga Teratur, dan/ atau Pengaruh Kerja Fisik terhadap Daya Survival Penduduk di Jakarta. Jakarta: Universitas Indonesia; 2002.
26. Kalichman.SC RD. Functional health literacy is associated with health status and health-related knowledge in people living with HIV-AIDS. *Journal of Acquired Immunity Deficiency Syndromes* 2000;25(4):337-44.
27. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL*. 2006;15(3).
28. Sorensen KVdB, S.Fullam, J.Doyle, G.Pelikan, J.Slonska, Z.Brand, H.Consortium Health Literacy Project, European. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. *BMC public health*. 2012;12:80.
29. Sun ea. Determinants of health literacy and health behavior regarding infectious respiratory diseases: a pathway model. *BMC public health*. 2013;13(261).
30. McNaughton CDJ, T. A.Kripalani, S. Low literacy is associated with uncontrolled blood pressure in primary care patients with hypertension and heart disease. *Patient education and counseling* 2014. p. 165-70.
31. ILO. *Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari program fleksibel yang ditargetkan*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional 2010.
32. Ko YB, T. D.Wong, L.Tan, M. L.Lee, E.Tang, W. E.Chan, S. C.Tan, A. S.Toh, M. P. Health literacy and its association with disease knowledge and control in patients with hypertension in Singapore. *International journal of cardiology*. 2013;168(4):e116-7.
33. Giselle ea. Health Literacy Is a Predictor of HIV/AIDS Knowledge. *Family Medicine*. 2006;38(10).



# HEALTH LITERACY SEBAGAI PREDIKTOR RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA MAKASSAR

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://inthealth.mumc.maastrichtuniversity.nl">inthealth.mumc.maastrichtuniversity.nl</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://www.um.edu.mt">www.um.edu.mt</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://hdq.uswr.ac.ir">hdq.uswr.ac.ir</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.ubplj.org">www.ubplj.org</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov">www.ncbi.nlm.nih.gov</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://ymlib.yonsei.ac.kr">ymlib.yonsei.ac.kr</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%