


**SKRENING FITOKIMIA, KADAR TOTAL FENOL dan ANALISA
SENYAWA dengan GC-MS (*Gas Cromatografy-Mass Spektroskopy*)
CENDAWAN ENDOFIT PENGHASIL ANTIOKSIDAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana (S1 Jurusan Biologi pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SINAR WAHYUNI

NIM : 60300114154

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinar Wahyuni
NIM : 60300114154
Tempat/Tgl Lahir : Mallenreng/07 November 1995
Jurusan/prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Sahrul Yasin Limpo, Pondok
Judul : Skrining Fitokimia, Kadar Total Fenol, dan Analisa Senyawa dengan GC-MS (*Gass Cromatografy-Mass Spektroskopy*) Cendawan Endofit Penghasil Antioksidan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R Makassar, 19 November 2018

Penyusun



Sinar Wahyuni
603001141514

PERSETUJUAN PEMEBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Sinar Wahyuni**, NIM:60300114154, Mahasiswi Jurusan Biologi Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul "*Skrining Fitokimia, Kadar Total Fenol, dan Analisa Senyawa dengan GC-MS (Gass Cromatografy-Mass Spektroskopy) Cendawan Endofit Penghasil Antioksidan*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.


Gowa, 19 November 2018
11 Rabiul Awal 1440 H

Pembimbing I



Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd
NIP:19810912 200912 2008

pembimbing II



Eka sukmaty, S.Si., M.Si
NIP:19860716 201503 2006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Skrining Fitokimia, Kadar Total Fenol dan Analisa Senyawa dengan GC-MS (Gass Cromatografy-Mass Spektroskopy) Cendawan Endofit Penghasil Antioksidan.*", Yang disusun oleh Sinar Wahyuni , NIM: 603001141514, Mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasha yang diselenggarakan pada hari Rabu 21 November 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Gowa, 19 November 2018
11 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T.
Sekertaris : St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.
Munaqisy I : Dra. Sitti Chadijah, M.Si
Munaqisy II : Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag.
Pembimbing I: Dr. Hafsan, S.Si.,M.Pd.
Pembimbing II: Eka Sukmawaty, S.Si.,M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Diketahui oleh
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Arifuddin. M.Ag
NIP:19691203 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatu

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya, Hidayah-Nya, Ilmun-Nya, Kesehatan-Nya, Waktu-Nya dan Kekuatan-Nya, sehingga penulis Mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *“Skrining Fitokimia, Kadar Total Fenol, dan Analisa Senyawa dengan GC-MS (Gass Cromatografy-Mass Spektroskopy) Cendawan Endofit Penghasil Antioksidan.”* Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selanjutnya penulis haturkan ucapan terima kasih doa dan harapan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, kerjasama maupun bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Allah swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, reski yang berlimpa serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
2. Bapak Amiruddin dan Mama Maswati, selaku orang tua penulis, yang kasih sayang dan doakan yang tak terputus untuk penulis, memberikan semangat,

dan memotivasi. Adik- adik dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat dan turut mendoakan.

3. Guru-guruku SDN 76 Baruga Riattang, MTS.s GUPPI Barugae dan MAN 1 TANETE yang pernah penulis jadikan tempat menimba ilmu. Perantara merekalah penulis dapat mengenal baca tulis dan memahami agama dengan benar semoga Allah swt selalu memberikan rahmat, Kesehatan dan hidayahNya kepada beliau.
4. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejarannya.
5. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.
6. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi di Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
7. Hasyimuddin S.Si., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. Hafsan S.Si., M.Pd., sebagai pembimbing I dan Eka Sukmawaty S.Si., M.Si., sebagai pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, mendampingi, memberikan arahan, masukan baik dari keilmuan maupun agama yang dengan tulus hati meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga rahmat dan kasih sayang

Allah swt. selalu menaungi mereka dan kemudian kelak dikumpulkan di Jannah Nya.

9. Dra. Sitti Chadija, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membangun untuk memulai penelitian dan penulisan skripsi.
10. Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membangun untuk memulai penelitian dan penulisan skripsi
11. Ulfa Triyani A. Latif S.Si.,M.Pd., Selaku PA (Pembimbing Akademik) yang selalu memberikan motivasi dan semangat, juga sebagai tempat curhat dan pemberi solusi terbaik.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang penulis belum pernah dapatkan dimana pun, semoga Allah swt selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada beliau.
13. Kepada para Laboran Jurusan Biologi Kaka Kurni, Kaka Nain, Kaka Sidar dan Ibu Faridah yang selalu mendampingi penulis dalam bekerja di laboratorium mulai dari penulis menjadi praktikan hingga penulis melakukan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir, semoga Allah swt selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada beliau.
14. Kak ati selaku staf jurusan yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan persuratan sehingga

15. Karyawan dan Staf dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus surat-menyuratnya.
16. Kepala Perpustakaan Syehk Yusuf UIN Alauddin Makassar dan sejarannya.
17. Terima kasih kepada Pembimbing dan teman-teman PKL di Laboratorium Kesehatan Makassar.
18. Terima kasih kepada Akbar Maulana yang juga selalu memberikan semangat dan turut membantu dan mendoakan penulis.
19. Terima Kasih kepada angkatan saya yang tercinta LACTEAL kalian adalah saudara-saudara yang sangat membantu penulis.
20. Terima kasih kepada rekan kerja paruh waktu penulis, Nini, Anis, Mia, Sidar, yang juga sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
21. Terima kasih kepada teman-teman lab Mikro yang selalu memberi semangat untuk tetap berjuang dan selalu sabar serta tidak cepat putus asa dalam penelitian.
22. Terima kasih kepada Tim Cendawan Endofit Cum-cum dan Eka.
23. Terima kasih kepada Teman-teman KKN Kurrusumanga' Squad,
24. Terima kasih kepada Ibu Desa Kurrusumanga' Ibu Megawati, Kak Puput, Nenek Umma yang bersedia menampung penulis di rumahnya selama 2 bulan berKKN. Semooga diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Semooga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jahu dari sempurna, oleh karena

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Ayat Yang Relevan	9
B. Tinjauan Umum Tentang Cendawan Endofit	11
C. Tinjauan umum tentang Radikal Bebas Dan Antioksidan	13
D. Tinjauan Umum Tentang Skrining Uji Fitokimia.....	16
E. Tinjauan Umum Tentang Senyawa Flavonoid.....	18
F. Tinjauan umum Tentang senyawa Alkaloid	20

G. Tinjauan umum Tentang senyawa Fenol	21
H. Kerangka Fikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
C. Variabel Penelitian	24
D. Defenisi Oprasional Variabel	24
E. Alat dan Bahan.....	25
F. Prosedur Kerja	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	31
1. Skrining Fitokimia	31
2. Pengukuran Kadar Total Fenol	32
3. Analisa Senyawa GC-MS	33
B. Pembhasan	37
1. Skrining Fitokimia	37
2. Pengukuran Kadar Total Fenol	44
3. Analisa Senyawa GC-MS	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Hasil Skrining fitokimia ekstrak	31
Tabel 4.2.1 Panjang gelombang dan waktu maksimum.....	32
Tabel 4.2.2 Serapan Sampel.....	33
Tabel 4.3.1 Senyawa Hasil Analisa Ekstrak <i>Tricoderma</i> sp.....	34
Tabel 4.3.2 Senyawa Hasil Analisa Ekstrak <i>Aspergillus</i> sp.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 Struktur Flavonoid.....	39
Gambar 4.1.2 Reaksi Senyawa Flavonoid dengan NaOH.....	40
Gambar 4.1.3 Struktur Alkaloid.....	41
Gambar 4.1.4 Reaksi Alkaloid dengan Dragendoff.....	42
Gambar 4.1.5 Struktur Penyusun Terpenoid.....	43
Gambar 4.1.6 Struktur dasar Tanin.....	44
Gambar 4.1.7 Reaksi FeCl ₃ pada Tanin.....	45
Gambar 4.3.1 Struktur Senyawa Benzaldehid.....	46
Gambar 4.3.2 Struktur Senyawa Phenol	46
Gambar 4.3.3 Struktur Senyawa Diethyl phthalate ss Benzenedicarboxylic acid ...	47
Gambar 4.3.4 Struktur Senyawa n-Hexyl salicylate	48
Gambar 4.3.4 Struktur Senyawa Octanal.....	48
Gambar 4.3.5 Struktur Senyawa Hexadecanoic acid.....	49
Gambar 4.3.6 Struktur Senyawa 9-Octadecanoic acid.....	50
Gambar 4.3.7 Struktur senyawa 1,2 Benzenedicarboxylic acid.....	51
Gambar 4.3.8 Struktur senyawa Benzyl Benzoic acid	52
Gambar 4.3.9 Struktur Senyawa Benzoic acid	53
Gambar 4.3.10 Struktur Senyawa 11-Octadecanoic Acid.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1 perhitungan serapan sampel kadar total fenol.....	69
Lampiran 2.2 Konfersi bahan pembuatan media.....	69
Lampiran 2.3 Skema penelitian.....	70
Lampiran Hasil analisa senyawa	



ABSTRAK

Nama :Sinar Wahyuni

NIM :60300114154

Judul Skripsi :Skrining Fitokimia,Kadar Total Fenol dan Analisa Senyawa dengan GC-MS (*Gass Cromatografy-Mass Spektroskopis*)
Cendawan Endofit Penghasil Antioksidan

Kayu secang (*Caesalpinia sappan* L) adalah salah satu tanaman hutan yang biasa dijadikan sebagai bahan obat. Kayu secang (*Caesalpinia sappan* L) memiliki senyawa yang bersifat sebagai antioksidan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui senyawa yang terkandung pada cendawan penghasil antioksidan *Tricoderma* sp asal Makroalga (*Euchema* sp) dan *Aspergillus* sp asal Kayu secang (*Caesalpinia sappan* L) dengan cara skrining fitokimia, pengukuran kadar total, dan analisa senyawa dengan GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak cendawan endofit *Tricoderma* sp dan *Aspergillus* sp, memiliki kandungan senyawa Flavonoid, alkaloid, terpenoid dan tanin. Pada pengukuran kadar total fenol yang dimiliki oleh ekstrak *Tricoderma* sp sebanyak 9,49 ppm dan *Aspergillus* sp 1.68 ppm. Analisa senyawa dengan GC-MS menunjukkan hasil bahwa ekstrak *Tricoderma* sp memiliki 40 senyawa yang terkandung dengan 12 diantaranya memiliki % area yang tinggi dan teridentifikasi bersifat antioksidan. Sedangkan pada *Aspergillus* sp ditemukan 10 senyawa 4 diantaranya teridentifikasi bersifat sebagai antioksidan.

Kata kunci: *Antioksidan, Cendawan Endofit, Skrining Fitokimia, Total Fenol, dan GC-MS.*

ABSTRACT

Name :Sinar Wahyuni

NIM :60300114154

Skripsi Title :Phytochemical Screening, Total Phenol Levels and Analysis of Compounds with GC-MS (*Gass Cromatografy-Mass Spektroskopis*) Endophytic Fungus Producing Antioxidants.

Secang wood (*Caesalpinia sappan L*) is one of the forest plants that can be used as medicinal ingredients. Secang wood has compounds that are antioxidant. This study was conducted to determine the compounds contained in *Tricoderma* sp antioxidant fungus from Macroalga (*Euchema* sp) and *Aspergillus* sp from secang wood (*Caesalpinia sappan L*) by phytochemical screening, measurement of total levels, and analysis of compounds with GC-MS. The results showed that the extracts of endophytic fungus *Tricoderma* sp and *Aspergillus* sp had compound contents Flavonoids, Alkaloids, Terpenoids, and Tannins. In this measurement the total phenol content of *Tricoderma* sp extract was 9,49 ppm and *Aspergillus* sp 1,68 ppm. Analysis of compound with GC-MS show that the results of *Tricoderma* sp extract have 40 compounds contained with 12 of them high % area and identified as antioxidant. While *Aspergillus* sp found 10 compounds 4 of which were identified as antioxidants.

Keyword: *Antioxidants, Endophytic fungus, Phytochemical Screening, total phenol, and GC-MS.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia kedokteran dan kesehatan banyak membahas tentang radikal bebas dan antioksidan, dikarenakan sebagian besar penyakit disebabkan oleh adanya reaksi oksidasi yang berlebihan dalam tubuh, dimana radikal bebas ini akan merusak struktur dan fungsi sel dalam tubuh.

Indonesia sendiri sudah banyak penyakit-penyakit yang bermunculan yang diakibatkan oleh adanya radikal bebas, dan jika kondisi ini dibiarkan akan berdampak buruk bagi masyarakat, dan sebagai seorang muslim kita harus mempercayai bahwa segala penyakit pasti ada obatnya. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda bahwasannya segala penyakit adalah kuasa Allah swt. namun Allah swt. adalah Dzat yang Maha Adil dan Bijaksana dalam segala hal. Allah menurunkan penyakit sekaligus menciptakan penyembuhnya.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه المسلم) #

Terjemahnya:

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala (HR. Muslim)

Ibnu Qayyim Al Jauziyah (1994) mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya adalah bersifat umum, mencakup segala macam penyakit obat yang dapat menyembuhkan penderita, karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan segala macam obat penyakit-penyakit mematikan akibat radikal bebas.

Berdasarkan penjelasan hadits tersebut bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit tetapi Dia juga yang menciptakan obat atau penyembuhnya, kita sebagai manusia yang dikaruniakan akal dan pikiran hendaknya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara meneliti dan mencari tau cara mengatasi penyakit akibat radikal bebas.

Menurut Pieta (1999) bahwa manusia memiliki sistem pertahanan terhadap oksidasi yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Pertahanan tubuh dari dalam berupa enzim-enzim peroksidase, katalase, glutathione, tetapi seringkali enzim tersebut tidak mencukupi dikarenakan pengaruh lingkungan yang buruk. Pada kondisi ini manusia membutuhkan antioksidan yang diperoleh dari makanan. tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam upaya pengobatan dan kesehatan karena senyawa-senyawa antioksidan dapat kita temukan dari tumbuhan.

Penyakit kronis yang diakibatkan oleh radikal bebas dapat dikurangi dengan memanfaatkan peran senyawa antioksidan seperti vitamin C, E, A, karoten, fenol, polifenol, dan flavonoid (Okawa *et al*, 2001)

Allah menciptakan berbagai macam tanaman di muka bumi dengan berbagai macam dan manfaatnya sebagai obat. Allah berfirman dalam QS Asy syura/ 26:7-9 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang (Kementerian Agama RI, 2012).

Kata *karim* dalam ayat tersebut digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang bersifat baik dalam hal ini adalah tumbuhan. Menurut Shihab (2002), pengertian tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang dapat tumbuh subur dan bermanfaat. Adapun manfaat yang dimaksud dalam penjabaran kata karim diatas adalah manfaat yang dapat digunakan oleh makhluk lain seperti manusia dan hewan. Oleh manusia tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti, sandang, pangan dan papan, juga digunakan sebagai obat- obatan untuk kesehatan.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia khususnya sebagai obat. Diketahui bahwa salah satu penghasil antioksidan terbesar didapatkan dari tumbuhan.

Aktivitas antioksidan berhubungan dengan golongan senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, antharquinon, fenil propanoaid, fenolik, turunan isokumarin, senyawa alifatik, peptida, dan senyawa lainnya telah diisolasi dan dikarakterisasi dari kultur cendawan endofit (Agusta, 2009).

Salah satu tumbuhan hutan yang banyak digunakan sebagai bahan obat yaitu kayu secang (*Caesalpinia sappan* L). Merupakan tanaman yang tumbuh didaerah tropis yang ketinggian pohonnya mencapai 500-1000 m. Air secang merupakan minuman favorit bagi sebagian besar masyarakat disulawesi selatan khususnya suku bugis soppeng yang berada dipedesaan. Bahkan masyarakat membudidayakan tumbuhan secang, sehingga dikenal sebuah daerah dikecamatan Marioriwawo dengan nama *ale' seppang* yang berarti 'hutan secang'. Masyarakat mencampurkan serpihan kayu secang kedalam minuman sehari-hari dengan memasukkan serpihan tersebut kedalam teko atau tempat air minum. Lalu air yang tercampur tersebut berubah menjadi kemerahan, sehingga air tampak lebih jernih. Selain itu air tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wulandari (2016) yang telah meneliti mengenai adanya aktivitas antioksidan pada kayu secang (*Caesalpinia sappan* L), dan Inna Shintia (2016) yang mengamati tentang adanya aktivitas antioksidan pada kayu secang. Namun belum diketahui senyawa fenol yang dihasilkan oleh cendawan tersebut sehingga penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui senyawa–senyawa antioksidan yang terkandung pada tanaman tersebut dan kandungan total fenolnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Senyawa apa saja yang terdapat pada cendawan endofit penghasil antioksidan?
2. Berapa total kandungan fenol yang terdapat pada kapang penghasil antioksidan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Cendawan endofit yang digunakan dalam penelitian ini diisolasi dari kayu secang (*Caesalpinia sappan*) dan alga laut *Eucheuma* sp yaitu: *Aspergillus* sp dan *Tricoderma* sp.
2. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018- juni 2018 dilakukan di Laboratorium mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Brasti Eka Pratiwi (2015) “*Isolasi dan skrining fitokimia bakteri endofit dari daun rambutan (Nephelium lappaceum L.)*” yang berpotensi sebagai antibakteri, hasil dari penelitian didapatkan 4 isolat bakteri, yaitu DR1, DR2, DR3, dan DR4. Pada isolat DR1, DR2, DR4 menunjukkan aktifitas antibakteri dengan adanya zona bening terhadap bakteri uji, dan isolat DR3 tidak memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. DR1, DR2, DR3, dan DR4 memberikan hasil negative terhadap uji terpenoid/steroid, alkaloid, fenolik, flavonoid, dan tannin.
2. Rendi R. (2015) “*Skrining fitokimia dan uji aktifitas aktioksidan ekstrak etanol daun patikan emas (Euprobia prrunifolia Jacq.) dan bawang laut (Proiphys amboinensis (L.) Herb)*” Skrining fitokimia dan uji antioksidan dengan metode DPPH dari daun patikan emas dan daun bawang laut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tanaman tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder. Daun patikan emas mengandung fenolik, flavonoid, steroid dan tannin, sedangkan daun bawang laut, fenolik, flavonoid, steroid dan tannin, penelitian ini juga melakukan uji kandungan total flavonoid dan kandungan total fenolik dimana daun patikan emas mempunyai nilai lebih tinggi dari daun bawang laut. Untuk hasil pengujian aktivitas antioksidan dari daun patikan emas yaitu memperoleh nilai diatas 50%.
3. Khusnul khotimah (2016) “*skrining fitokimia dan identifikasi metabolit sekunder senyawa karpain pada ekstrak matanol daun Carica pubescens & K. Koch dengan LC/MS (Liquid Chromatograph-tandem Mass Spectrometry)*”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun *Carica pubescens* Lenne & K. Koch positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid dan tannin, adapun hasil identifikasi metabolit sekunder menunjukkan bahwa jenis alkaloid yang terdapat pada daun tersebut adalah senyawa karpain dengan berat molekul sebesar 479 Da.

4. Ahlan hilwiyah (2014) "*skrinning fitokimia dan uji aktifitas antioksidan serta kadar total fenol – flavonoid ekstrak etanol murbei (Morus alba L.)*". Kandungan senyawa aktif ekstrak etanol murbei diketahui melalui skrining fitokimia, uji aktivitas antioksidan dengan metode spektrofotometri menggunakan difenilpikril hidrazil (DPPH), kadar total fenol menggunakan Foolin-Ciocalteu, dan flavonoid menggunakan AlCl₃. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol daun murbei mengandung alkaloid, fenol, flavonoid, dan triterpenoid, sedangkan buah mengandung alkaloid, fenol, flavonoid, dan steroid. Ekstrak etanol daun murbei memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC₅₀ sebesar 77,8565 µg/mL, sedangkan buah sebesar 283,3591µg/mL. Kadar total fenol dan flavonoid adalah 8,601% dan 3,363%, sedangkan buah 8,047% dan 3,061%.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui senyawa apa saja yang terdapat pada kapang endofit penghasil antioksidan.

2. Untuk mengetahui berapa total kandungan fenol yang terdapat pada kapang penghasil antioksidan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai senyawa-senyawa yang terkandung pada cendawan endofit sebagai antioksidan yang bisa dimanfaatkan sebagai sediaan obat.
2. Meningkatkan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang cendawan endofit.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Al-Qur'an merupakan kitab suci Islam yang diturunkan oleh Allah swt. melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu, baik ilmu hukum sampai ilmu alam semua terkandung dalam Al-Qur'an selain memuat segala disiplin ilmu fungsi dari Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk baik bagi orang yang bertaqwa maupun orang yang berakal yang menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan diseluruh jagad raya. Allah berfirman dalam QS Ali-Imran /3:190 yang berbunyi:

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Kementrian agama RI, 2012)

Firman Allah dalam surah Ali-imran ayat 190 menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada umatnya (manusia) supaya mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang kejadian langit dan bumi serta rahasia-rahasiannya dan manfaat-manfaat yang terkandung didalamnya yang menunjukkan pada ilmu yang sempurna sebagaimana kata "*Ulil albab*" yang artinya adalah orang yang mau

menggunakan pikirannya mengambil faeda dariNya, hidayah dariNya, dan menggambarkan keagungan Allah dan mengingat Allah dalam setiap keadaan (Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat tersebut manusia dianjurkan untuk selalu memikirkan tentang kejadian di Langit dan di Bumi, dalam hal ini dapat melalui penelitian, sehingga mereka dapat menegtahui kekuasaan Allah serta manfaat-manfaat dari sesuatu yang diciptakan Allah Swt. tidak hanya itu sebagai umat manusia yang dikaruniakan akal dan pikiran selain melihat merenungkan kebesaran dan keagungan Allah juga mampu mengambil hikmah dan manfaat dari segala ciptaanNya Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia semua memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing, dalam hal ini Allah swt menumbuhkan tanaman agar manusia dapat mengambil manfaat baik sebagai makanan ataupun sebagai obat, demikian itu hanya bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan dan yang memikirkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam QS al-Hijr /15:19-20 yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami

menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya (Kementrian Agama RI, 2012).

Menurut Ash-Shiddieqy (2000), Lafadz “ *wal ardho madadnaahaa*” pada ayat tersebut menjelaskan bahwa semua kekayaan alam yang ada di bumi ini diciptakan Allah hanya untuk manusia dan supaya manusia dapat mengambil manfaat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidupnya, karena semua kekayaan alam yang ada ini baik berupa mhluk hidup maupun benda mati, yang kecil maupun yang besar sudah pasti memiliki manfaat masing-masing. Seperti halnya dengan fungi yang memiliki banyak kegunaan untuk kesehatan dal hal-hal lainnya, dengan jelas bahwa ayat tersebut sangat relevan dengan fenomena yang terjadi yaitu adanya kegunaan dan manfaat dari fungi atau jamur.

B. Tinjauan Umum Tentang Cendawan Endofit

Istilah endofit berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, “endo” yang berarti didalam dan “fit” (*phyte*) yang berarti tumbuhan (Agusta, 2009). Mikroba endofit adalah mikroba yang ada di dalam jaringan hidup tanaman. Mikroorganisme endofit seperti fungi dan bakteri berkolonisasi pada jaringan hidup tanaman secara inter atau intraseluler selama sedikitnya satu fase dari siklus hidup mikroorganisme tersebut (Azevedo, I., 2000; kaneko, *et al.*, 2010 dalam A, Garcia, *et al.*, 2012).

Mikroba endofit adalah mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman pada periode tertentu dan mampu hidup dengan membentuk koloni dalam jaringan

tanaman tanpa membahayakan inangnya (Radji, 2005). Mikroorganisme endofit tersebut merupakan mikroorganisme yang dapat diekstrak dari bagian dalam tanaman atau diisolasi dari biji, akar, batang, dan ranting, serta kulit kayu dari berbagai macam jenis tanaman (Tarabily dkk, 2003).

Mikrobia endofit memiliki potensi besar dalam pencarian sumber-sumber obat baru, hal ini disebabkan karena mikrobia mudah untuk dikembangbiakkan, memiliki siklus hidup yang pendek serta mampu menghasilkan senyawa bioaktif dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat (Andriani, 2015). Kelompok cendawan endofit telah memperlihatkan diversitas metabolit sekunder yang cukup tinggi, termasuk untuk memproduksi komponen kimia karakteristik pada tumbuhan inangnya (Agusta, 2009).

Hubungan simbiosis mutualisme antara mikroba endofit dengan tanaman inang terutama pada perannya yang sangat penting dalam melindungi tanaman inangnya terhadap patogen dan predator (Strobel dan Daisy, 2003). Simbiosis antara fungi (mikroba) endofit dengan tanaman obat, fungi (mikroba) dapat membantu proses penyerapan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dapat digunakan oleh fungi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Petrini *et al.*, 1992).

Keberadaan mikroba endofit tidak menyebabkan kerugian tanaman inangnya, tetapi justru dapat melindungi inang dari faktor diluar tanaman, perlindungan yang diberikan mikroba endofit disebabkan oleh adanya simbiosis tanaman tersebut dengan mikroba endofit, termasuk kapang. Mikroba endofit dapat

membantu proses metabolisme dan menghasilkan metabolit sekunder yang dalam hal ini disebut metabolit bioaktif yang potensial (Kumala, 2014).

Metabolit sekunder adalah suatu molekul atau produk metabolik yang dihasilkan oleh proses metabolisme sekunder mikroorganisme dimana produk metabolit tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok mikroorganisme untuk hidup dan tumbuh (pratiwi, 2008). Beberapa dari endofit diketahui memproduksi metabolit bioaktif dengan aplikasi penting (Desale, *et al.*, 2013). Mikroba endofit tersebut hidup bersama inangnya bersimbiosis dan menghasilkan metabolit sekunder yang mempunyai aktifitas antimikroba, antifungi serta antikanker (kumala & pratiwi 2014).

C. Tinjauan Umum Tentang Radikal Bebas dan Antioksidan

Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa berupa oksigen reaktif dan berbagai senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan serta memiliki reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan senyawa oksidan non radikal. Radikal bebas dapat dibentuk dengan dua cara yaitu secara endogen (sebagai respn normal proses biokimia intrasel maupun ekstrasel) dan secara eksogen (misalnya dari polusi, makanan, serta injeksi atau absorpsi melalui kulit). Searangan radikal bebas terhadap molekul disekeliling akan menyebabkan terjadinya sebuah reaksi berantai yang dapat menghasilkan senyawa radikal baru. Dampak reaktivitas senyawa radikal bebas yaitu kerusakan sel atau jaringan, penyakit autoimun, penyakit degeneratif hingga kanker (Winarsi, 2007). Radikal bebas bersifat sangat reaktif dan dapat menyebabkan

kerusakan pada makromolekul seperti lipid, protein, karbohidrat dan DNA (Murray 2003).

Jumlah radikal bebas yang berlebihan membuat kebutuhan tubuh akan antioksidan juga meningkat. Antioksidan sintetik seperti *butylatedhydroxyanisole* (BHA), *butylatedhydroxytoluene* (BHT), *tetra-butyl hydroxy quinon* (TBHQ) dan α -tokoferol dapat menimbulkan efek samping seperti kanker dan kerusakan hati, sehingga penggunaannya dalam makanan dibatasi sebesar 200 ppm (Hernani dan Rahardjo 2005).

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (elektron donor) atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil, tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif, sehingga kerusakan sel akan dihambat (Winarsi, 2007).

Sumber potensial antioksidan alami adalah buah-buahan, biji-bijian, sayuran, daun, akar, kulit kayu, rempah-rempah, dan bamboo (Velioglu, 1998; Souren 2017, dalam wulan 2017). Makanan herbal kaya akan antioksidan karena kaya akan kandungan fenolik dan bertanggung jawab atas berbagai macam kegiatan pengobatan serta antiviral, anti alergi, anti inflamasi, anti mikrobal, antikarisogenik (Souren, 2017).

Antioksidan juga berfungsi untuk melindungi sel dari pengaruh radikal bebas yang reaktif, radikal bebas dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor eksternal lainnya (Halliwell, 1999).

Menurut Lingga (2012), antioksidan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kinerjanya, yaitu:

1. Antioksidan primer

Berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru dengan cara mengubah molekul radikal yang memapar tubuh menjadi molekul yang bereaksi lemah. Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru dengan cara mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya, sebelum radikal ini sempat bereaksi. Contohnya enzim superoksida dismutase (SOD) yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya sel-sel dalam tubuh serta mencegah proses peradangan karena radikal bebas. Enzim SOD sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita. Namun bekerjanya membutuhkan bantuan zat-zat gizi mineral seperti mangan, seng, dan tembaga. Selenium (Se) juga berperan sebagai antioksidan.

2. Antioksidan sekunder

Berfungsi menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga menghindari kerusakan sel yang lebih parah. Contohnya Vitamin A, C, dan E, serta karotenoid, flavonoid, tannin, dan sejumlah senyawa fitokimia lainnya.

3. Antioksidan tersier

Berfungsi memperbaiki sel dan jaringan yang rusak akibat radikal bebas yang menyebabkan penyimpangan DNA, khususnya pada penderita kanker. Contohnya enzim metionin sulfoksida.

4. *Oxygen scavenger*

Berfungsi mengikat oksigen sehingga mencegah terjadinya oksidasi. Contohnya vitamin C.

5. *Chelator*

Berfungsi mengikat logam yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi, misalnya zat besi (Fe). Contohnya asam sitrat dan asam amino.

Penggunaan senyawa antioksidan juga antiradikal saat ini semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif. Antioksidan mempunyai kemampuan sebagai penghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas yang reaktif (Tahir, et al., 2003, dalam Latifah 2015).

D. Tinjauan Umum Skrining Uji Fitokimia

Skrining fitokimia merupakan uji kualitatif kandungan senyawa kimia dalam bagian tumbuhan, terutama kandungan metabolit sekunder yang di antaranya adalah flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, terpenoid dan sebagainya. Skrining fitokimia harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain sederhana, cepat, dapat dilakukandengan peralatan minimal, bersifat semikuantitatif yaitu memiliki batas

kepekaan untuk senyawa yang bersangkutan, selektif terhadap golongan senyawa yang dipelajari (Ardy Prian, 2015).

Skrining fitokimia merupakan cara untuk mengidentifikasi bioaktif yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode skrining fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu preaksi warna. Hal penting yang berperan penting dalam skrining fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi (Kristianti dkk.,2008, dalam Khusnul 2016).

Fitokimia merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan aspek kimia suatu tanaman. Kajian fitokimia meliputi uraian yang mencakup aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh organisme, yaitu struktur kimianya, biosintesisnya, perubahan serta metabolisemenya, penyebarannya, secara alamiah dan fungsi biologisnya, isolasi dan perbandingan komposisi senyawa kimia dari bermacam-macam jenis tanaman (Harborne, 1987: siarait, 2007).

Menurut (Robinson, 1991 dalam Khusnul 2016) alasan lain melakukan fitokimia adalah untuk menentukan cirri senyawa aktif penyebab efek racun atau efek yang bermanfaat, yang ditunjukkan oleh ekstrak tumbuhan kasar bila diuji dengan sistem biologis. Pemanfaatan prosedur fitokimia telah mempunyai peranan yang


mapan dalam semua cabang ilmu tumbuhan. Meskipun cara ini penting dalam semua telaah kimia dan biokimia juga dimanfaatkan dalam kajian biologis.

E. Tinjauan Umum Senyawa Flavonoid


Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan (Sovia, 2006).

Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, dimana dua cincin benzene (C_6) terikat pada suatu rantai propane (C_3) sehingga membentuk suatu susunan $C_6-C_3-C_6$ susunan ini dapat menghasilkan tiga struktur senyawa flavonoida yaitu:


1. Flavonoida atau 1,3-diarilpropana



2. Isoflavonoida atau 1,2-diarilpropana



3. Neoflavonoida atau 1,2-diarilpropana



Istilah flavonoida diberikan untuk senyawa- senyawa fenol yang berasal dari kata falavon, yaitu nama salah satu flavon, yaitu nama dari salah satu jenis flavonoida yang terbesar jumlahnya dalam tumbuhan. Senyawa flavon ini mempunyai kerangka 2-fenilkroman, dimana posisi orto dari cincin A dan karbon yang terikat pada cincin B dari 1,3- diarilpropana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heteroksik yang baru (Cincin C).

Pola biosintesa pertama kali disarankan oleh Birch, yaitu : pada tahap-tahap pertama biosintesa flavonoida suatu unit C_6-C_3 berkombinasi dengan tiga unit C_2 menghasilkan unit $C_6-C_3-(C_2+C_2+C_2)$. Kerangka C_{15} yang dihasilkan dari kombinasi ini telah mengandung gugus-gugus fungsi oksigen pada posisi-posisi yang diperlukan. Cincin A dari struktur flavonoida berasal dari jalur poliketida, yaitu kondensasi dari tiga unit asetat atau malonat, sedangkan cincin B dan tiga atom karbon dari rantai propana berasal dari jalur fenilpropanoida (jalur shikimat). Sehingga kerangka dasra karbon dari flavonoida dihasilkan dari kombinasi antar dua jenis biosintesa utama untuk cincin aromatik yaitu jalur asetat-malonat. Sebagai akibat dari berbagai perubahan yang disebabkan oleh enzim, ketiga atom karbon dari rantai propane dapat menghasilkan berbagai gugus fungsi seperti ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil dan sebagainya (Sovia, 2006).

Berbagai jenis senyawa, kandungan dan aktivitas antioksidatif flavonoid sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang terdapat pada sereal, sayur-sayuran dan buah, telah banyak dipublikasikan. Flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui

kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon (Cuppett *et al.*, 1954). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara asupan flavonoid dengan resiko munculnya penyakit jantung koroner. Efek kardioprotektif flavonoid sebagai sumber diet telah ditinjau oleh Cook dan S. Samman (1996). Antioksidan alami seperti flavonoid yang banyak terdapat pada minuman dan buah anggur, diketahui memiliki kontribusi dalam menghambat oksidasi LDL (low density lipoprotein) secara *ex-vivo* (Kanner *et al.*, 1994). Produk oksidatif LDL dapat menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner. Tampaknya aktivitas minuman anggur dalam melindungi LDL manusia dari oksidasi terdistribusi cukup luas diantara komponen-komponen fhenolik utamanya (Frankel *et al.*, 1995).

F. Tinjauan Umum Tentang Senyawa Alkaloid

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan dalam sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari atom heterosiklik. Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan biologis tertentu, ada yang sangat beracun tetapi ada pula yang sangat berguna dalam pengobatan. Misalnya kuinin, morfin, dan stiknin adalah alkaloid yang terkenal dan mempunyai efek fisiologis dan

psikologis. Alkaloid dapat ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting dan kulit batang. Alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan (Sovia, 2006).

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Egon, 1985).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, senyawa yang berperan sebagai obat dalam tumbuhan adalah senyawa alkaloid. Dalam praktek medis kebanyakan alkaloid memiliki nilai tersendiri, disebabkan sifat farmakologi dan kegiatan fisiologisnya yang menonjol sehingga dipergunakan luas dalam bidang pengobatan. Manfaat alkaloid dalam bidang kesehatan antara lain adalah memacu system saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah dan melawan infeksi mikrobia (Restu, 2007).


G. Tinjauan Umum Tentang Senyawa Fenol

Fenol adalah senyawa yang mempunyai sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenol pada bahan makanan dapat dikelompokkan menjadi fenol sederhana dan asam folat (Widiyanti, 2006 dalam Oktaviana, 2010). Standar yang digunakan pada analisis kandungan fenolik adalah asam galat, hal ini

karena asam galat bersifat stabil, memiliki sensitivitas yang tinggi, dan harganya cukup terjangkau. Kandungan fenolik dari standar asam galat ditentukan dengan menggunakan metode Folin-Ciocalteu (Xu dan Chang, 2007 dalam Rahayu dkk, 2015).

Beberapa senyawa fenol telah diketahui fungsinya. Misalnya lignin sebagai pembentuk dinding sel dan antosianin sebagai pigmen. Namun beberapa lainnya hanya sebatas dugaan sementara. Senyawa fenol diduga mempunyai aktivitas antioksidan, antitumor, antiviral, dan antibiotik. Semua senyawa fenol merupakan senyawa aromatik sehingga semua menunjukkan serapan kuat terhadap spektrum UV. Fenol dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu fenol sederhana dan polifenol. Contoh fenol sederhana : orsinol, 4-metilresolsinol, 2- metilresolsinol, resolsinol, katekol, hidrokuinon, pirogalol dan floroglusinol. Contoh polifenol adalah lignin, melanin dan tanin (Harborne, 1987 dalam Ristiyana, 2013).

H. Kerangka Fikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui senyawa aktif dan kadar total fenol yang terdapat pada cendawan endofit.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dilakukan penelitian ini yaitu, pada bulan Juli-Oktober 2018 dan bertempat di Laboratorium mikrobiologi, Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal dan senyawa yang terkandung dalam cendawan endofit penghasil antioksidan.

D. Definisi Oprasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Cendawan endofit yang berhasil disolasi dari penelitian sebelumnya dan telah diketahui memiliki senyawa yang bersifat sebagai antioksidan.

2. Skrining fitokima merupakan pengujian untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terkandung pada suatu tanaman, yang meliputi pengujian, senyawa flavonoid, fenol, alkaloid, dan senyawa terpenoid.
3. Pengujian kadar total fenol, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kandungan fenol yang terdapat pada cendawan endofit penghasil antioksidan.
4. Analisa senyawa adalah tehnik mengidentifikasi suatu golongan senyawa.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu, penumbuk, oven, pipet tetes, pipet mikro, neraca analitik, tabung reaksi, pengaduk kaca, spatula, cawan porselen, kertas saring, corong kaca, corong pisah, gelas ukur, sarung tangan, masker, *hotplate*, *rotary*, *vacuum evaporator* dan *spektrofotometer*

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Bahan yang digunakan adalah sampel cendawan endofit yaitu cendawan endofit *Aspergillus* sp. dan *Tricoderma* sp. asal tanaman kayu secang (*Cesalpinia sappan*). Koleksi Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Makassar. Aquades, methanol, kloroform, H₂SO₄ pekat, Nitrogen p.a, bubuk Mg, preaksi mayer, preaksi Dragendorf, amoniak, FeCl₃ 10%, asam asetat, NaOH, asetonitril dan asam format, DMSO, asam galat, folin-ciocalteu, dan Na₂CO₃ (Natrium karbonat).

F. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini yaitu,.

1. Pembuatan media

Adapun media yang digunakan yaitu media PDA (*Potato Dextrosa Agar*) cair, dimana media tersebut sangat bagus untuk media pertumbuhan jamur. Kentang yang sudah dipotong dadu kecil kemudian ditimbang sebanyak 200 gram, kemudian dididihkan dengan aquades 1000 ml, setelah itu disaring lalu ditambahkan dextrosa sebanyak 20 gram dan clorafenicol sebanyak satu butir. Tunggu hingga larut setelah itu disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 5 menit. Setelah itu didinginkan.

2. Fermentasi

Media PDA yang sudah disterilkan kemudian dituang kedalam 4 erlenmeyer masing-masing 250 ml. Isolat cendawan endofit yang tumbuh dicawan petri masing-masing diambil dengan sedotan *bubbel* steril sebanyak 1 potong hifa lalu dimasukkan kedalam media tersebut. Setelah itu keempat erlenmeyer tersebut yang sudah berisi isolat diinkubasi pada *rotary shaker* dengan kecepatan 120 rpm pada suhu ruang (25°C) selama 14 hari, kemudian setelah 14 hari dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan biomassa.

3. Ekstraksi

Filtrasi hasil penyaringan kemudian ditambahkan etil asetat masing masing sebanyak 50 ml (dimeserasi), direndam dengan pelarut untuk menarik senyawa aktif yang terkandung, hal ini dilakukan selama 3x24 jam atau selama tiga hari, selanjutnya di partisi untuk memisahkan biomassa dan filtatnya, kemudian hasil saringan tersebut dipekatkan menggunakan evaporator, ekstrak yang didapatkan tersebut digunakan untuk uji selanjutnya.

4. Skrining fitokimia

Skrining fitokimia meliputi uji flavonoid, uji alkaloid, uji polifenol, dan uji terpenoid.

a. Uji flavonoid

Uji flavonoid dilakukan dengan memanaskan ekstrak etanol cendawan endofit asal kayu secang dan makroalga selama 5 menit kemudian ditambahkan beberapa HCL pekat dan bubuk Mg. Hasil ditunjukkan dengan munculnya merah tua (Rendy R,2015).

b. Uji alkaloid

Uji alkaloid dilakukan dengan menambahkan 1 mL ekstrak etanol cendawan endofit asal kayu secang dan makroalga, dengan beberapa tetes reagen Mayer dan dragendorf. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih pada reagen mayer dan endapan jingga pada reagen Dragendorf (Rendy R,2015).

c. Uji Terpenoid

Uji Terpenoid dilakukan dengan mereaksikan ekstrak cendawan endofit asal kayu secang dan makroalga dengan larutan Liberman Buchard. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, dan biru. (Rendy R,2015).

d. Uji Tanin

Uji Tanin dilakukan dengan mereaksikan ekstrak cendawan endofit asal kayu secang dan makroalga dengan FeCl_3 . Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau pekat atau hijau kehitaman. (Rendy R,2015).

5. Pengukuran kadar total kandungan fenol

Pengukuran kandungan fenol total pada ekstrak dilakukan dengan menggunakan reaksi Folin-Ciocalteu. Standar yang digunakan adalah asam galat. Dalam penetapan kandungan fenol ini dilakukan tiga langkah, yaitu penetapan waktu optimum dan panjang gelombang maksimum asam galat, pembuatan kurva kalibrasi standar asam galat, dan pengukuran serapan sampel. Namun sebelum dilakukan pengukuran fenol terlebih dahulu dilakukan pembuatan larutan Na_2CO_3 7,5% yang akan digunakan.

Pembuatan larutan Na_2CO_3 7,5% dibuat dengan cara melarutkan 7,5 gram Na_2CO_3 kedalam 100 ml aquades bebas CO_2 .

a. Penetapan waktu optimum dan panjang gelombang maksimum asam galat

Terlebih dahulu dibuat larutan induk asam galat dengan konsentrasi 100 ppm. Larutan induk asam galat tersebut diambil 1,0 ml dengan menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Kedalam labu ukur 10,0 ml

kemudian di tambahkan 500 μ l preaksi Folin-Ciocalteu, lalu dikocok hingga homogen selama satu menit. Setelah itu ditambahkan 4,0 ml Na_2CO_3 7,5% kemudian dikocok hingga homogen. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer, sinar tampak pada panjang gelombang maksimum dan dilakukan setiap 15 menit hingga menit ke 150 untuk menentukan waktu optimum.

b. Pembuatan kurva kalibrasi

Dari larutan induk 100 ppm yang telah dibuat sebelumnya, diambil dengan pipet volume masing-masing 1,0 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 3,5 ml, 4 ml dan 4,5 ml kemudian masing masing dimasukkan kedalam botol vial. Kemudian ditambahkan 500 μ l preaksi Folin-Ciocalteu kemudian dikocok selama satu menit setelah itu ditambahkan Na_2CO_3 7,5% kemudian dikocok lagi hingga homogen selanjutnya dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang dan pada waktu optimum yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya.

c. Pengukuran serapan sampel

Larutan ekstrak dibuat 100 ppm, larutan ekstrak tersebut diambil 1,0 ml, dengan menggunakan pipet volume dan kemudian dimasukkan kedalam botol vial, selanjutnya di tambahkan 500 μ l pereaksi Folin-Ciocalteu lalu dikocok selama satu menit. Setelah itu ditambahkan 4,0 ml Na_2CO_3 7,5%, dikocok lagi selama satu menit. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum dan waktu optimum untuk pengukuran asam galat. Hasil pengukuran ini dinyatakan sebagai berat setara dengan asam galat tiap berat ekstrak.

6. Analisa senyawa dengan GC-MS (*Gass Cromatografy-mass Spektrometri*)

Ekstak yang dihasilkan dari *Tricoderma* sp dan *Aspergillus* sp dilarutkan menggunakan methanol sebelum kemudian dilakukan pengujian dengan GC-MS.

GC-MS (*Gass Cromatografy-mass Spektrometri*) merupakan metode untuk membaca spektra yang terdapat pada kedua metode yang digabung tersebut. Pada spektra GC jika terdapat bahwa dari sampel mengandung banyak senyawa yaitu terlihat dari banyaknya puncak (*peak*) dalam spektra GC tersebut. Berdasarkan waktu retensi yang sudah diketahui, sedangkan MS yaitu membaca massa molekul pada sampel.

Prinsip kerja GCMS yaitu, sampel yang diinjeksi ke dalam kromatograf gas akan diubah menjadi fasa uap dan dialirkan melewati kolom kapiler dengan bantuan gas pembawa. Pemisahan senyawa campuran menjadi senyawa tunggal terjadi berdasarkan perbedaan sifat kimia dan waktu yang diperlukan bersifat spesifik untuk masing masing senyawa. Pendeteksian berlangsung didalam spektroskopis massa dengan mekanisme penembakan senyawa oleh elektron menjadi molekul terionisasi dan pencatatan pola fragmentasi yang terbentuk dibandingkan dengan pola fragmentasi senyawa standar yang diindikasikan dengan prosentasi Similarity Index (SI).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Skrining fitokimia

Skrining fitokimia merupakan analisa kualitatif terhadap senyawa-senyawa metabolit, dengan metode melihat reaksi pengendapan dan perubahan warna yang terjadi pada pereaksi dan sampel uji.

Adapun hasil skrining fitokimia pada ekstrak *Aspergillus* sp dan *Tricoderma* sp yaitu:.

Tabel 4.1.1 Skrining fitokimia ekstrak *Tricoderma* sp. dan *Aspergillus*.

Ekstrak	Uji	Reagen	Hasil	Keterangan
<i>Aspergillus</i> sp.	Flavonoid	H ₂ SO ₄	-	Tidak ada perubahan warna
		NaOH	+	Kuning
	Alkaloid	Mayer	-	Tidak ada perubahan warna
		dragendroff	+	jingga
	Terpenoid	Lieberman - Buchard	+	Terbentuk warna hijau
	Tanin	FeCl ₃	+	Hijau pekat/hijau kehitaman
<i>Tricoderma</i> sp	Flavonoid	H ₂ SO ₄	-	Tidak ada perubahan warna
			+	Kuning

		NaOH		
	Alkaloid	Mayer	-	Tidak berubah
		Dragendroff	+	Berwarna jingga
	Terpenoid	Liberman – Buchard	+	Berwarna hijau
	Tanin	FeCl ₃	+	Hijau pekat/hiaju kehitaman

2. Pengukuran kadar total fenol

Pengukuran kadar total kandungan fenol dilakukan dengan menggunakan prekasi Folin-Ciocalteu dan larutan standar asam galat untuk menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer, pembuatan kurva kalibrasi dan kemudian menghitung kadar total fenol sampel .

Tabel 4.2.1 panjang gelombang dan waktu maksimum

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
15 menit	400nm	0,062
	500nm	0,080
	600nm	0,102
	700nm	0,127
	800nm	0,127

Tabel 4.2.2 Hasil serapan sampel pada tiap konsentrasi untuk pembuatan kurva standar.

No	Konsentrasi	Absorbansi
	1 ml	0,176
2	1,5 ml	0,174
1	2 ml	0,252
	2,5 ml	0,263
	3 ml	0,326
	3,5 ml	0,334
	4 ml	0,334
	4,5 ml	0,339

Tabel 4.2.3 penghitungan serapan sampel


Sampel	Absorbansi
<i>Aspergillus</i> sp	0,190
<i>Trichoderma</i> sp	0,750

3. Analisa senyawa GC-MS

GC-MS (Gas Chromatography-Massa spectroscopy) merupakan metode analisa untuk mengukur jenis dan kandungan senyawa pada suatu sampel baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Alat ini merupakan perpaduan dua instrumen yaitu kromatografi gas dimana dia berfungsi untuk memisahkan senyawa

menjadi senyawa tunggal dan spektroskopi massa berfungsi untuk mendeteksi senyawa berdasarkan pola fragmentasinya.

Adapun hasil analisa senyawa Ekstrak *Tricoderma* sp yaitu sebagai berikut:




Tabel 4.3.1 tabel hasil senyawa yang dideteksi pada ekstrak *Tricoderma* sp.

No.	Nama senyawa	Rumus melekul	Waktu retensi	% area	% kesamaan
1.	Benzaldehyde	C_7H_6O	13.550	3.92	96
2.	Phenol	C_6H_6O	15.789	1.11	97
3.	Diethyl Phthalate	$C_{12}H_{14}O_4$	16.859	9.05	98

4.	n-hexyl salicylate ss benzoid acid	C ₁₃ H ₁₈ O ₃	17.841	1.77	94
5.	Octanal	CH ₃ (CH ₂) ₇ OH	18.617	3.44	99
6.	Hexadecanoid acid (CAS)	C ₁₆ H ₃₂ O ₂	20.643	2.66	99
7.	9-octadecenoid acid (z)- oleic acid	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	22.307	1.26	99
8.	1,2- Benzenedicarboxylic acid	C ₈ H ₆ O ₄	25.741	29.99	91
9.	Choloromycetin	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅	27.268	20.55	94
10.	Phthalic acid	C ₆ H ₄ (CO ₂ H) ₂	27.499	1.49	50
11.	Benzyl benzoate	C ₆ H ₅ CH ₂ O ₂ CO ₆ H ₅	18.861	0.20	98
12.	<i>Benzoic Acid</i>	C ₇ H ₆ O ₂	16.177	0.27	94

Adapun hasil analisa senyawa Ektrak *Tricoderma* sp yaitu sebagai berikut:



Tabel 4.3.1 tabel hasil senyawa yang dideteksi pada ekstrak *Aspergillus* sp.

No.	Nama senyawa	Rumus molekul	Waktu retensi	% area	% kesamaan
1.	Benzaldehyde	C_7H_6O	13.550	11.50	97
2.	1,1,2,2-tetramethyl	$C_{22}H_{66}G$	20.800	1.78	89
3.	11-octadecanoic acid	$C_{18}H_{34}O_2$	21.976	0.75	99
4.	7-etoxy-6-chloro- 2,2-dimethyl-4-		23.796	1.45	64

	chromanone				
5.	1-nitro-3-n-hexylbenzene		24.171	0.52	38
6.	Cyclopropylbenzene	C_9H_{10}	24.597	13.52	43
7.	4-chlorofuro		24.997	7.19	52
8.	1,2-Benzenedicarboxylic acid	$C_8H_6O_2$	25.716	4.79	91
9.	Chloramphenicol	$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	27.293	57.77	95
10.	Ethyl-n-Buthyl Phthalate	$C_{20}H_{30}O_4$	28.262	0.74	55

B. Pembahasan


1. Skrining fitokimia

Skrining fitokimia merupakan analisis kualitatif terhadap senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, polifenol, terpenoid dan tanin. Metode skrining fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna.

4.1.1 Senyawa Flavonoid

Flavonoid merupakan golongan senyawa fenol terbesar yang terdiri dari $C_6 - C_3 - C_6$.


Dan sering ditemukan di berbagai macam tumbuhan dalam bentuk glikosida atau gugusan gula bersenyawa pada satu atau lebih grup hidroksil fenolik.



Gambar 1.1 struktur flavonoid C₆-C₃-C₆

Flavonoid juga bersifat sebagai pereduksi yang karena mampu menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzimatik maupun non enzimatik. Flavonoid juga berperan penting dalam menghambat pertumbuhan sel kanker (Lenny, 2006). Pada penelitian yang dilakukan (Brake *ea al.*, 1994) diketahui bahwa suatu senyawa flavonoid yang terdapat pada citrus dapat menghambat sel tumor pada manusia. Kemudian penelitian Manthey dan Najlah (2002) menyatakan bahwa senyawa flavone *Polymethoxylated* pada *citrus* (termasuk senyawa alam dan sejumlah senyawa analog sintesisnya) menunjukkan aktivitas anti-Pliverati terhadap 6 jenis sel kanker.

Berdasarkan hasil uji deteksi senyawa flavonoid pada ekstrak *Aspergillus* sp dan *Tricoderma* sp yang dilakukan menggunakan pereaksi NaOH menunjukkan hasil positif flavonoid, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna kuning pada sampel.



Krisin


asetofenon(kuning)

Gambar1. 2. Dugaan reaksi senyawa flavonoid dengan NaOH (Tik *et,al* ., 2014).

4.1.2 Senyawa Alkaloid

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh tumbuhan dan tersebar luar diberbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid mengandung paling sedikit satu atom Nitrogen yang biasanya bersifat basa dan dalam sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Bracke *el, al.*, 1994).

Alkaloid bersifat basa tergantung pada pasangan elektron pada Nitrogen. Jika guggus fungsional yang berdekatan dengan Nitrogen bersifat melepaskan elektron, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa (Lenny, 2006). Berikut ini merupakan struktur senyawa alkaloid.




Gambar 1.3. Struktur alkaloid (Tik *et,al* ., 2014).

Senyawa alkaloid sebagai antioksidasi juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Fatima *et,al.*, (2015) diketahui bahwa senyawa alkaloid memiliki kemampuan sebagaia antibakteri. Mekanisme antibakteri sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri yaitu dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian pada sel tersebut.

Hasil skrining pada ekstrak *Aspergillus* sp dan *Tricoderma* sp menggunakan pereaksi mayer dan dragendroff. Pada pengujian pereaksi mayer menunjukkan hasil negatif ditandai dengan tidak terbentuknya endapan ataupun perubahan warna. Menurut (Santose *et, al.*, 1998) perkiraan pengujian alkaloid menggunakan mayer , nitrogen akan bereaksi dengan ion K⁺ dari kalium tetraiodomerkurat, membentuk kompleks krium-alkaloid yang mengendap. Menurut lenny (2006) Hasil negatif dikarenakan adanya protein yang mengendap pada preaksi yang mengendap pada preaksi yang mengandung logam (preaksi mayer) dapat memberikan hasil positif palsu pada beberapa senyawa. Sebelum dilakukan pengujian alkaloid menggunakan mayer untuk menghilangkan protein harus ditambahkan NaCl.

Pengujian alkaloid menggunakan pereaksi Dragendoff sampel menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna.




Gambar 1.3. Dugaan reaksi alkaloid dengan dragendroff (Suyono, 2005).

Pada dasarnya prinsip uji alkaloid adalah pengendapan alkaloid dengan logam-logam berat. Pereaksi dragendroff digunakan untuk mendeteksi adanya alkaloid dikarenakan pereaksi ini mengandung bismut yang merupakan logam berat ato tinggi (sirait, 20007). Alkaloid merupakan senyawa yang tersusun dari atom nitrogen yang FEB (Pasangan Elektron Bebas), yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen kordinat dengan ion logam (mariana, 20005).

4.1.3 Senyawa Terpenoid

Terpenoid adalah senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen, atau karbon dan oksigen yang bersifat aromatis, sebagian atom hanya dibangun oleh dua atom atau lebih unit C₅ yang disebut isopren. Susunan kepala ke ekor ini disebut kaida terpen dan merupakan ciri khas sebagian terpenoid yang juga di jadikan sebagi dasar struktur terpenoid. Umumnya terpenoid larut dalam lemak dan terdapat didalam sitoplasma sel. Kebanyakan terpenoid mempunyai struktur yang siklik (achamd, 1986).




Gambar 1.4. Struktur penyusun terpenoid (Tik *et,al* ., 2014).

Untuk mendeteksi senyawa golongan terpenoid pada penelitian ini menggunakan etil asetat karna bersifat semi polar yang mampu menarik,, salah satu senyawa terpenoid yang memiliki efefisiologi bagi manusia adalah taksodon dan fenomenin yang mampu menghambat pembelahan sel sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel tumor. Sifat antiosidan senyawa terpenoid juga di buktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh ayu (2006), mendeteksi kapasitas senyawa golongan terpenoid sebagai antioksidasi, menyatakan bahwa beberapa triterpenoid merupakan komponen aktif dalam tumbuhan obat yang mampu digunakan untuk mengobati penyakit diabetes, kerusakan hati, dan malaria.

Pada pengujian senyawa terpenoid menggunakan pereaski Liberman-Buchard menunjukan hasil yang positif ditandai dengan adanya perubahan warna pada sampel.

4.1.4 Senyawa Tanin

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdpat pada beberpa tanaman. Tanin memiliki kemampuan utuk mengikat protein, sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap enzim protase didalam silo ataupun rumen (kondo, et,al,.2004).




Gambar. 1.5 Struktur dasar senyawa tanin (Widiastuti *et al.*,2014).

Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol dan dapat membentuk kompleks dengan protein membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Terdapat dua jenis tanin yaitu, tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis.

Tanin memiliki sifat bakteristatik dan fungistatik, tanin diketahui memiliki antinutrisi karena kemampuannya dalam membentuk ikatan kompleks protein. Kemampuan tanin dalam menegdapkan protein dikarenakan tanin memiliki sejumlah group fungsional yang dapat membentuk kompleks kuat dengan molekul molekul protein, sehingga tanin disebut sebagai anti-nutrisi yang merugikan.

Pada pengujian tanin menggunakan pereaksi FeCl_3 Menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna hijau pekat pada sampel yang menandakan bahwa adanya senyawa tanin. Reaksi kimi yang terjadi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.6. Reaksi FeCl_3 yang terjadi pada tanin (Widiastuti *et al.*,2014).

Terbentuknya warna hijau atau hitam pekat pada ekstrak setelah penambahan FeCl_3 disebabkan karena tanin membentuk senyawa kompleks ion Fe^{3+} diman ion tersebut merupakan atom pusat sedangkan tanin memiliki atom O yang memiliki pasangan elektron bebas yang bisa mengkoordinasikan atom pusat sebagai ligan.

Karena tanin memiliki elektron bebas yang mampu mengikat ion Fe maka memungkinkan terjadinya perubahan warna.

Tanin merupakan senyawa bioaktif yang memiliki khasiat sebagai astrigen, anti diare, dan antioksidan. Pada penelitian Sa'adah (2010) yang mengidentifikasi senyawa golongan tanin, menyatakan bahwa golongan senyawa ellagitanin dapat membentuk ikatan dengan logam berat. Ikatan tersebut yang membentuk senyawa kompleks yang dapat menyebabkan perubahan fisiologi dalam sel ataupun jaringan pada makhluk hidup. Senyawa ellagitanin memiliki aktivitas biologis sebagai antidiabetes, antimikrobia, antivirus, antihipertensi, antikanker dan antitumor.

2. Pengukuran Kadar Total Fenol

Fenol merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan, memiliki bau yang khas, dengan rumus kimia C_6H_5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil (-OH) yang berikatan dengan cincin fenil. Senyawa fenol banyak digunakan di dunia kesehatan, senyawa fenol biasa digunakan sebagai zat desinfektan. Sedangkan fenol sebagai alkohol aromatik mempunyai sifat yang berbeda dalam air. Fenol sedikit terionisasi menghasilkan anion H^+ dengan $K_a=10^{-10}$. Sifat kimia fenol yaitu tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah atom C-nya sama, karena gugus OH-nya terikat dengan atom C yang sudah terikat dengan atom H. Jika fenol dilarutkan dengan H_2SO_4 pekat tidak membentuk ester melainkan membentuk asam fenol sulfonat.

Fenol merupakan senyawa yang bersifat sebagai antimikroba yang kuat dan digunakan pertama sebagai antiseptik. Senyawa fenol ini merupakan dasar untuk

jumlah besar senyawa organik yang dikenal sebagai fenol kuinon dan senyawa terkait lainnya yang terlibat dalam traspor elektron dalam sel-sel hidup. Polifenol banyak terdapat pada tanaman yang mengandung unit-unit fenol diantaranya yaitu, senyawa tanin yang terkenal karena sifat antioksidan yang dimiliki, selain itu golongan fenol yang juga memiliki sifat antioksidan adalah flavonoid, phenil propanoid, kuinon fenolik, lignin, melanin dan masih banyak senyawa turunan fenol lain yang memiliki potensi antioksidan yang besar.

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kadar total fenol dengan tujuan agar diketahui seberapa besar kadar total fenol yang dimiliki ekstrak cendawan endofit *Tricoderma* sp dan *Aspergillus* sp. pada pengukuran ini menggunakan metode Folin-Ciocalteu untuk mendapatkan kadar total fenol.

Pada pengukuran ini juga perlu dibuatkan kurva standar asam galat, dari kurva ini kita mendapatkan informasi mengenai hubungan antara konsentrasi asam galat dengan absorbansinya. Kurva standar akan menunjukkan hasil konsentrasi dari sampel dengan menggunakan regresi linear. Peneliti menggunakan asam galat sebagai larutan standar karena asam galat merupakan salah satu jenis golongan senyawa fenol.

Berdasarkan kurva standar yang sudah dibuat didapatkan persamaan regresi linear $y = 0,0717 x - 0,0691$ dimana x merupakan variabel absorbansi masing-masing sampel. Pada hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa ekstrak *Tricoderma* sp sebesar 9,49 ppm. Sedangkan pada *Aspergillus* sp 1,68 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa kadar total fenol yang dihasilkan oleh *Tricoderma* sp lebih besar.

3. Analisa Senyawa dengan GC-MS


GC-MS (*Gass Cromatografy-mass Spektrometri*) merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisa senyawa. Kromatografi gas untuk menganalisa jumlah senyawa secara kualitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisa massa molekul senyawa analitik pada spektra. Jika terdapat bahwa dari sampel mengandung banyak senyawa, yaitu terlihat dari banyaknya puncak (peak) dalam spektra GC tersebut berdasarkan waktu retensi yang sudah diketahui senyawa yang sudah diketahui oleh alat tersebut. Informasi yang didapatkan dari kedua tehnik ini yaitu pada GC informasi penting yang didapat adalah waktu retensi dalam tiap-tiap senyawa dalam sampel sedangkan pada MS adalah massa molekul relatif dari senyawa sampel.

Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan pada sampel *Tricoderma* sp didapatkan 40 senyawa dalam retensi waktu yang berbeda, dari hasil analisa sebanyak 11 senyawa yang berhasil diidentifikasi yang memiliki % area tertinggi yang didapatkan berpotensi sebagai antioksidan diantaranya yaitu:

1. Senyawa *Benzaldehida*

Benzelaldehida adalah senyawa organik yang terdiri cincin benzena dengan substituen formil. Dan merupakan aldehida aromatik yang paling sederhana. Senyawa Benzelaldehida pertama kali di ekstrak dari buah almond pahit oleh apoteker Prancis (1803). Dan pertama kali disintesis oleh Ahli kimia Jerman Friedrich Wohler dan Justus Von Liebig pada tahun 1832.


Adapun struktur senyawa *Benzelaldehida* yaitu:



Gambar 4.3.1 struktur senyawa *Benzeldehida*

2. Senyawa *phenol*

Penol merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada tanaman, dan memiliki cincin aromatik satu atau lebih gugus hidroksil (OH-). Struktur kimia senyawa fenol yaitu;




Gambar 4.3.2 struktur senyawa *Phenol*

Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus yang lebih dari satu sehingga disebut folifenol. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam artinya dia mampu melepaskan ion H^+ dari gugus hidroksilnya. Penegeluaran ion tersebut berupa anion fenoksida yang mampu larut dalam air. Turunan senyawa fenol dapat terjadi secara alami sebagai flavonoid, alkaloid dan senyawa lainnya. Senyawa penol banyak digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, antikanker. Dalam bidang farmasi senyawa penol digunakan sebagai obat-obatan seperti, obat antikanker (podofilotoksan) antimalaria (kuinina) dan obat demam (aspirin). Selain itu juga

banyak digunakan sebagai insektisida dan fungisida fenol juga digunakan sebagai antiseptik seperti yang digunakan Joseph Lister saat mempraktikkan pembedahan antiseptik.

3. Senyawa *Diethyl Phthalate ss 1,2 benzenedicarboxylic acid*


Diethyl Phthalate diklasifikasikan sebagai anggota dari ester asam benzoat yang tidak larut dalam air. Senyawa ini banyak digunakan di bidang industri dalam pembuatan produk. Struktur kimianya yaitu:



Gambar 4.3.3 struktur senyawa *Diethyl Phthalate ss 1,2 benzenedicarboxylic acid*

4. Senyawa *n-hexyl salicilate ss benzoat acid*

Senyawa *n-hexyl salicilate* merupakan turunan golongan senyawa organik yang dikenal sebagai ester dan asam benzoat dengan struktur kimia:



Gambar 4.3.4 struktur senyawa *n-hexyl salicilate ss benzoat acid*

Senyawa ini memiliki sifat sebaia antioksidan karena merupakan turunan dari asam benzoat dimana asam benzoat sudah banyak diteliti sebagai senyawa yang memiliki aktifitas sebagai antijamur.

5. Senyawa *Octanal*

Octanal adalah senyawa senyawa organika, aldehida dengan rumus kimia $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CHO}$. Merupakan cairan wangi tidak berwarna dengan bau seperti buah.

Struktur kimianya yaitu:



Gambar 4.3.4 struktur senyawa octanal.

Senyawa ini memiliki sifat antioksidan dengan detoksifikasi aldehida, dapat terlihat pada dasarnya melalui dua rute yang pertama oksidasi untuk menghasilkan asam yang mudah dimetabolisme, yang kedua inaktivasi melalui reaksi dengan gugus sulfhidril terutama glutathione. Dalam kondisi yang baik menguras tingkat glutathione atau yang mengakibatkan penghambatan aldehyd dehidrogenase misalnya, pengobatan antabuse.

6. Senyawa *Hexadecanoic acid*

Asam hexadecanoic atau asam adalah lemak jenuh yang paing umum yang ditemukan pada hewan, tumbuhan dan mikroorganism. Asam lemak palmitat juga merupakan prekursor untuk asam lemak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam palmitat merupakan komponen penyusun utama tubuh hewan. Pada manusia

penelitian juga menunjukkan bahwa 21-30% (molar) asam palmiat berasal dari lemak manusia dan itu merupakan komponen penyusun lemak payudara. Struktur senyawa *Hexadecanoic acid* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3.6 struktur senyawa *Hexadecanoic acid*

Didalam biologi, beberapa proteindimodifikasi oleh penambahan ke kelompok *palmitoy* dalam proses yang dikenal sebagai *palmitoylation* yang penting untuk lokalisasi membran protein. *Hexadecanoic acid* golongan senyawa asam lemak memiliki sifat biologis sebagai antioksidan, antibakteri dan antifungi (Mustapha N, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jhon weibeg (1857) menyatakan bahwa Diantar semau asam lemak yang ada asam hexadecanoad yang memiliki efek paling kuat dalam meningkatkan potensi metastatis CD36+metastatis sel-inisiasi.

7. Senyawa 9-*Octadecanoic acid*

Asam 9-*Octadecenoic* adalah asam lemak tak jenuh yang merupakan asam lemak yang paling banyak didistribusikan dan melimpah di alam. Ini digunakan secara komersial dalam pembuatan oleat dan lotion, dan sebagai pelarut farmasi. (Stedman, edisi ke-26) *Octadec-9-enoic Acid*, juga dikenal sebagai 18: 1, N-9 atau Delta (9) -*Octadecenoic acid*, diklasifikasikan sebagai anggota dari asam lemak

rantai panjang. Asam lemak rantai panjang adalah asam lemak dengan ekor alifatik yang mengandung antara 13 dan 21 atom karbon. Octadec-9-enoic Acid dianggap praktis tidak larut (dalam air) dan asam. *Octadec-9-enoic Acid* dapat disintesis dari *octadec-9-ene*. Ini juga merupakan senyawa induk untuk produk transformasi lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, 1-oktazep-9-enoilglycero-3-fosfat, N- (2-hidroksi-1-methylethil) -9-oktadecenamide, dan asam *sterculic*. Struktur kimia *octadecanoic acid* yaitu:




Gambar 4.3.7 struktur senyawa 9-Octadecanoic acid

8. Senyawa 1,2-Benzenedilcarboxylic acid

Senyawa *Benzenedilcarboxylic acid* atau asam phthalic adalah asam dikarboksilat aromatik, dengan rumus atom $C_6H_4(CO_2H)_2$. Dan merupakan isomer isoftalat dan asam tereftalat. Asam Phthalic pertama kali ditemukan oleh kimiawan perancis Aguste Lauren pada tahun 1836 dengan mengoksidasi naphthalena tetraklorida, ia percaya bahwa zat yang dihasilkan menjadi turunan naftalena, ia menamainya naphthalic acid. Namun setelah kimiawan Swiss Jean Charles Galissard de Marignac menentukan rumus yang benar dan menamainya dengan yang sekarang. 1,2-benzenedicarboxylic acid bersifat sebagai antibakteri.

Meskipun asam phthalic memiliki kepentingan komersial yang sederhana tetapi asam ini berkaitan erat dengan derivatif yang merupakan komoditas kimia yang diproduksi dalam skala besar. Adapun struktur senyawa phthalat yaitu:



Gambar 4.3.12 Struktur Senyawa 1,2-Benzenedicarboxylic acid

9. Chloromycetin

Chloromycetin (chloramphenicol) adalah agen antibiotik kristal putih yang diisolasi berasal dari *Streptomyces venezuelae*.¹ Rumus kimia telah ditentukan, dan pembuatan senyawa oleh sintesis kimia telah dicapai secara komersial praktis. Ini adalah bahan yang sangat pahit, relatif stabil dalam air di berbagai suhu dan pH dan sedikit larut dalam air hingga sejauh 2,5 mg. per sentimeter kubik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan *Chloromycetin* untuk aktif melawan spektrum luas bakteri in vitro,


10. Senyawa Phthalic acid

Asam phthalik merupakan senyawa yang bersifat antioksidan yang sama dengan 1,2-Benzenedicarboxylic acid.

11. Senyawa Benzyl benzoate acid

Senyawa *Benzyl benzoate acid* Senyawa benzil benzoat merupakan ester benzoat yang diperoleh dari kondensasi formal asam benzoat dengan benzil alkohol.

Senyawa benzil benzoat bersifat sebagai antiradikal, berdasarkan penelitian yang dilakukan Ferdiansyah (2010) bahwa minyak kenaga dapat dijadikan sebagai antibakteri karena mengandung gugus fungsi hidroksil dan karbonil, selain itu juga mengandung Benzil benzoat sebagai antioksidan. Karena sifatnya yang sebagai antimikroba Senyawa asam benzil benzoat juga dijadikan sebagai obat kudis. Kudis merupakan penyakit yang disebabkan oleh tungau *Sarcoptes scabiei*. Benzil benzoat diduga mampu mematikan tungau *Sarcoptes scabiei*. Berikut ini merupakan struktur benzil benzoat.




Gambar 4.3.7 Senyawa *Benzyl benzoate acid*

12. Senyawa *Benzoic Acid*

Senyawa asam benzoat adalah padatan kristal berwarna putih dan merupakan asam karboksilat aromatik yang paling sederhana. Nama asam ini berasal dari gum benzoin yang dahulu merupakan yang merupakan satu-satunya sumber asam benzoat. Asam benzoat pertama kali ditemukan pada abad ke -16. Distilasi kering getah kemenyang pertama kali dideskripsikan oleh Nostradamus (1556), dan selanjutnya oleh Alexius pedemontanus (1560) dan Blaise de vigenere (1596). Justus von liebig dan Friedrich wohler berhasil menemukan asam benzoat pada tahun 1832.

Selanjutnya pada tahun (1875) ditemukan bahwa asam benzoat memiliki aktifitas sebagai antijamur.

Adapun struktur kimia asam benzoat yaitu:




Gambar 4.3.4 struktur senyawa asam benzoat

Senyawa hasil analisa yang ditemukan pada ekstrak *Aspergillus* sp sebanyak 10 senyawa diantaranya yaitu:

1. Senyawa *Benzaldehyde*

Benzelaldehyda adalah senyawa organik yang terdiri cincin benzena dengan substituen formil. Dan merupakan aldehida aromatik yang paling sederhana.

Adapun struktur senyawa *Benzelaldehyda* yaitu:



Gambar 4.3.1 struktur senyawa *Benzeldehyda*

Senyawa Benzaldehyda pertama kali di ekstrak dari buah almond pahit oleh apoteker Prancis (1803). Dan pertama kali disintesis oleh Ahli kimia Jerman Friedrich Wohler dan Justus Von Liebig pada tahun 1832.

2. Senyawa 11-Octadecanoic acid

Asam vaccenic, juga dikenal sebagai (E)-otadec-11-enic acid adalah asam lemak trans alami yang biasa ditemukan pada lemak ruminansia dan produk susu seperti susu, mentega dan yogurt. Asam lemak ini juga merupakan asam lemak utama yang terdiri dari lemak trans dalam air susu manusia. Nama IUPAC asam ini yaitu (E)-11-Octadecanoic acid, dan nama singkat lipitnya yaitu 18:1 trans-11 dan struktur kimianya sebagai berikut:




Gambar 4.3.2 Struktur Senyawa 11-Octadecanoic acid

Senyawa ini bersifat sebagai antioksidan, hal ini berdasarkan penelitian pada tahun 2008 di universitas of Alberta menunjukkan bahwa pemberian asam vaccenic pada tikus diatas 16 minggu menghasilkan penurunan kolesterol total, menurunkan kolesterol LDL dan kadar trigliserida.

3. Senyawa 1,2-Benzenedilcarboxylic acid

Senyawa *Benzenedicarboxylic acid* atau asam phthalic adalah asam dikarboksilat aromatik, dengan rumus atom $C_6H_4(CO_2H)_2$. Dan merupakan isomer isoftalat dan asam tereftalat. Meskipun asam phthalic memiliki kepentingan komersial yang sederhana tetapi asam ini berkaitan erat dengan derivatif yang merupakan komoditas kimia yang diproduksi dalam skala besar. Adapun struktur senyawa phthalat yaitu:



Gambar 4.3.3 Struktur Senyawa 1,2-*Benzenedicarboxylic acid*

Asam Phthalic pertama kali ditemukan oleh kimiawan perancis Aguste Lauren pada tahun 1836 dengan mengoksidasi naphthalena tetraklorida, ia percaya bahwa zat yang dihasilkan menjadi turunan naphthalena, ia menamainya naphthalic acid. Namun setelah kimiawan Swiss Jean Charles Galissard de Marignac menentukan rumus yang benar dan menamainya dengan yang sekarang.

4. *Choramphenicol*

Choramphenicol adalah agen antibiotik kristal putih yang diisolasi berasal dari *Streptomyces venezuelae*.¹ Rumus kimia telah ditentukan, dan pembuatan senyawa oleh sintesis kimia telah dicapai secara komersial praktis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. pada pengujian skrining fitokimia pada ekstrak *Aspergillus* sp dan *Tricoderma* sp. menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung senyawa Flavonoid, Alkaloid, Terpenoid, dan Tanin sebagai senyawa yang bersifat antioksidan.
2. Pada pengujian kadar total fenol menggunakan kurva standar didapatkan hasil bahwa ekstrak *Aspergillus* sp memiliki kadar total kandungan fenol sebanyak 1,68 ppm sedangkan pada *Tricoderma* sp. sebanyak 9,49.
3. Pada hasil analisa senyawa dengan GC-MS ditemukan senyawa pada ekstrak *Tricoderma* sp sebanyak 40 dan telah diidentifikasi 12 senyawa yang memiliki % area tinggi dan kemampuan yang bersifat sebagai antioksidan, sedangkan pada ekstrak *Aspergillus* sp sebanyak 10 senyawa dan 4 diantaranya teridentifikasi memiliki sifat sebagai antioksidan dan % area yang tinggi.

B. Saran

saran penulis pada penelitian ini yaitu, agar kedepannya bisa dilanjutkan penelitian mengenai senyawa antioksidan yang dimiliki oleh kayu secang agar terbukti bahwa benar kayu secang bisa dijadikan sebagai obat.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Garcia, A.S Rhoden., J. Wensel, Bernandi., C.R, Orlandelli., L.J, Azevedo., A. J, Phampile. 2012. “*Antimicrobial aktivyty of Crude Extracts Of Endophyttic Fungi isolate From Medical Plant Sapindus Saponaria L*”. Journal Of Applied Pharmaceutical Science 2(10); 2012: Hal. 035-040.
- Abdi Redha. Flavonoid, Struktur, Sifat Antioksidatif dan Peranannya dalam Sistem Biologis. Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak.pontianak 197. Jurnal belian vol.9 No 2. 2010.
- Agusta, Andrian. *Biologi dan kimia jamur Endofit*. Bandung. ITB. 2009
- Andriani. Aktiifitas Antibakterial fungi Endofit *Coulerpa Racemosa* Terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*”. Prosising Seminar Nasional Mikrobiologi Kesehatan dan Lingkungan. Isbn 978-602-72245-0-6. Hal. 11.
- Ardy Prian Nirwana, Oki Parama Astirin, Tetri Widiyani,. Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Benalu Kersen (*Dendrophloe pentandra L. Miq.*) jurnal EL-VIVO. Vol. 3. No. 2, Hal. 9-15. 2015.
- Asy-Shiddieqy, Tengku Muhammad H. Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur. Jilid 3(surah 24-41). Semarang: Pustaka Rizqy Putra. 2000.
- Cook, N. C. and S. Samman. *Review Flavonoids-Chemistry, Metabolism, Cardioprotective Effect, And Dietary Sources*, J. Nutr. Biochem (7): 66-76. 1996.
- Cuppett, S., M. Schrepf and C. Hall III. *Natural Antioxidant – Are They Reality*. Dalam Foreidoon Shahidi: Natural Antioxidants, Chemistry, Health Effect and Applications, AOCS Press, Champaign, Illinois: 12-24. 1954.
- Egon Stahl. Analisis obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi. Penerbit ITB. Bandung. 1985.

- Emilia Rahmawati. *Isolasi dan Identifikasi Fungi Endofit dari Buah dan Daun Strawberry (Fragaria x annanasa) Sebagai Penghasil Senyawa Antioksidan*. Malang. Universitas Islam Negeri Imam Malik Ibrahim. 2017.
- Harborne, J.B., *Metode fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung. Terbit kedua. ITB. 1987.
- Hernani, Rahardjo M. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*. Jakarta (ID): Penebar Swadaya. 2005.
- Khusnul Khotimah. *Skrining Fitokimia dan Identifikasi Metabolit Sekunder Senyawa Karpain pada Ekstrak Methanol Daun Carica piubescens Lenne & K. Koch Dengan LC/MS (Liquid Chromatograph-tandem Mass Spectrometry)*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Latifah, *Identifikasi Golongan Senyawa Flavonoid dan Uji Aktifitas Antioksidan pada Ekstrak Rimpang Kencur Kaempferia galangal L. Dengan Metode DPPH (1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL)*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.
- Lingga, L. *The Healing Power of Antioxidant: Mengenal Lebih Jauh Sumber Antioksidan Unggulan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2012.
- Maslarova, N.V. Yanishlieva. *Inhibiting oxidation* dalam Jan Pokorny, Nedyalka Yanislieva dan Michael Gordon: *Antioxidants in food, Practical applications*. Woodhead Publishing Limited, Cambridge: 22-70. 2001.
- Oktaviana, Prima Riska. 2010. "Kajian Kurkumoid, Total Fenol, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Temulawak pada Berbagai Teknik Pengeringan dan Proporsi Pelarut". Skripsi. Fakultas Pertanian UNS.
- Petrini, O., T.N. Sieber, L. Toti, dan O. Viret. *Ecology Metabolite Production and Utilization in Endophytic Fungi*. *Swiss Naturs Toxins*. 78:196. 1992.
- Pratiwi, T. Sylvia. *Mikrobiologi Farmasi*. Erlangga. 2008.

- Radji, M. *Peranan Bioteknologi dan mikroba Endofit dalam Pengembangan Obat Herbal*. Ilmu kefarmasian. 2(3): 113-126. 2005
- Rajalakshmi, D dan S. Narasimhan. *Food Antioxidants: Sources and Methods of Evaluation dalam D.L. Madhavi: Food Antioxidant, Technological, Toxicological and Health Perspectives*. Marcel Dekker Inc., Hongkong: 76-77. 1985.
- Restu Kartiko Widi dan Titin Andriani. *Screening and Identification of Alkaloid Compounds in Kayu Kuning Stem (Arcangelisia Flava Merr)*. Jurnal Ilmu Dasar. Vol. 8 No. 1, Hal. 24-29. 2007.
- Rendy R. *Skrining Fitokimia dan uji aktifitas antioksidan ekstrak etanol daun Patikan emas (Euphorbia prunifolia Jacq.) Manado*. jurnal online MIPA Universitas samratulangi. 2015
- Ristyana Ika Putranti. *Skrining Fitokimia dan Aktifitas Antioksidan Ekstrak Rumput Laut Sargassum duplikatum dan Turbinaria ornate dari Jepara*. Semarang. 2013.
- Siti Latifa Wulandari. *Uji Aktifitas Antioksidan Kapang Endofit Asal Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.)*. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Sovia Lenny. *Senyawa Flavonoida, Fenil Propanoida dan Alkaloida*. USU Repository. 2006.
- Strobel, G. dan B. Daisy. *Bioprospecting for Mikrobial Endophytes and Their Natural Product*. Microbiology and molecular Biology. 67 (4): 491-502. 2003.
- Tarabily, K, A.H. Nassar, K. Sivasithamparam. *Promotion of Plant Growth By An Auxin-Producing Isolat of The Yeast Williopsis Saturnus Endophytic In Mize Roots*. The Sixth U.A. E University Research Conference. Hal: 60-69. 2003.

- White, P.J. and Y. Xing. *Antioxidants from Cereals and Legumes* dalam Foreidoon Shahidi: *Natural Antioxidants, Chemistry, Health Effect and Applications*. AOCS Press, Champaign, Illinois: 25-63. 1954.
- Widiyanti, 2006 dalam Oktaviana. 2010. “Kajian Kadar Kurkuminoid, Total Fenol dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) pada Berbagai Teknik Pengeringan dan Proporsi Pelarutan”. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Winarsi H. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Yogyakarta (ID): Kanisius. 2007
- Xu dan Chang, 2007 dalam Rahayu dkk, 2015. Total Fenolik, Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan dari Produk Teh Hijau dan Tanaman Teh Hitam Tanaman Bangun dengan Perlakuan Ramuan ETT Rumput Laut.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1


Lampiran Tabel 1.1 Skrining fitokimia ekstrak Tricoderma sp. dan Aspergillus.

Ekstrak	Uji	Reagen	Hasil	Keterangan
<i>Aspergillus sp.</i>	Flavonoid	H ₂ SO ₄	-	Tidak ada perubahan warna
		NaOH	+	Merah jingga
	Alkaloid	Mayer	-	Tidak ada perubahan warna
		dragendroff	+	jingga
	Terpenoid	Lieberman - Buchard	+	Terbentuk warna hijau
Tanin	FeCl ₃	+	Hijau pekat/hijau kehitaman	
<i>Tricoderma sp</i>	Flavonoid	H ₂ SO ₄	-	Tidak ada perubahan warna
		NaOH	+	Merah tua
	Alkaloid	Mayer	-	Tidak berubah
		dragendroff	+	Berwarna jingga
	Terpenoid	Lieberman - Buchard	+	Berwarna hijau
Tanin	FeCl ₃	+	Hijau pekat/hiaju kehitaman	

Lampiran tabel 1.2 Penetapan Waktu Maksimum dan Serapan Maksimum Standar

Asam Galat

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
0 menit	400nm	0,064
	500nm	0,081
	600nm	0,103
	700nm	0,126
	800nm	0,128



Lampiran Grafik 1.1 pengukuran pada 0 menit dengan spektrofotometer


waktu	Panjang gelombang	absorbansi
15 menit	400nm	0,062
	500nm	0,080
	600nm	0,102
	700nm	0,127

	800nm	0,127
--	-------	-------




Lampiran Grafik 1.2 pengukuran pada menit 15 dengan spektrofotometer

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
30menit	400nm	0,062
	500nm	0,080
	600nm	0,103
	700nm	0,126
	800nm	0,129



Grafik 1.3 pengukuran pada menit 30 dengan spektrofotometer

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
45menit	400nm	0,060
	500nm	0,079
	600nm	0,101
	700nm	0,125
	800nm	0,126



Grafik 1.4 pengukuran pada menit 45 dengan spektrofotometer

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
60menit	400nm	0,064
	500nm	0,080
	600nm	0,102
	700nm	0,124

	800nm	0,126
--	-------	-------




Grafik 1.5 pengukuran pada menit 60 dengan spektrofotometer

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
75menit	400nm	0,060
	500nm	0,080
	600nm	0,101
	700nm	0,124
	800nm	0,126




Grafik 1.6 pengukuran pada menit 75 dengan spektrofotometer

waktu	Panjang gelombang	absorbansi
90menit	400nm	0,063
	500nm	0,079
	600nm	0,100
	700nm	0,123
	800nm	0,126



Grafik 1.7 pengukuran pada menit 90 dengan spektrofotometer

Lampiran gambar 1.8 grafik pengukuran asam galat



LAMPIRAN 2

Lampiran 2.1 perhitungan serapa sampel kadar total fenol

1. *Aspergillus* sp =0,190

$$y = 0,0717x + 0,0691$$

$$x = 0,190$$

$$\frac{0,190 - 0,0691}{0,0717} = 1,68 \text{ ppm.}$$

2. *Tricoderma* sp =0,750

$$y = 0,0717x + 0,0691$$

$$x = 0,750$$

$$\frac{0,750 - 0,0691}{0,0691} = 9,49 \text{ ppm}$$

Lampiran 2.2 konversi bahan pembuatan media

Pembuatan media PDA (*Potato Dextrosa Agar*) 1000 ml

Komposisi:

Diketahui dalam pembuatan media PDA untuk 1000 ml yaitu:


Kentang = 200 gram

Dextrosa = 15 gram

Kloramfenicol= 1 biji

Aquades = 1000 ml

Karena media PDA yang digunakan media cair maka tidak ditambahkan agar

Lampiran 2.3 skema penelitian

LAMPIRAN 3

Lampiran Gambar 3.1 pembuatan media PDA



Lampiran Gambar 3.2 pindahan isolat kedalam media PDA (inokulasi)



Lampiran gambar 3.3 diinkubasi selama 14 hari menggunakan incubated shaker



Lampiran gambar 3.4 penyaringan biomassa (memisahkan kapang dengan ekstrak)



Lapiran gambar 3.5 meserasi (penambahan etil asetat)



Lampiran gambar 3.6 partisi menggunakan corong pisah (memisahkan pelarut dengan biomassa)



Lampiran gambar 3.7 dipekatkan



Lampiran gambar 3.8 Ekstrak



Lampiran gambar 3.9 uji fitokimia



Lampiran 3.9 analisa senyawa dengan metode GC-MS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



Nama Sinar Wahyuni biasa dipanggil uni/ Sinwa, saya lahir di Bulukumba pada tanggal 11 November 1995. Saya adalah anak perempuan pertama dari 4 bersaudara. Saya memiliki 4 adik perempuan. Ayah saya bernama Amiruddin dan ibu Saya Maswati. Saya mulai menempu pendidikan dari bangku sekolah dasar di SDN 76 Baruga Riattang, Bululumba. Setelah tamat SD saya melanjutkan Sekolah di MTS s GUPPI Barugae, kemudian melanjutkan lagi ke MAN 1 TANTE BULUKUMBA, dan melanjutkan lagi pendidikan Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R