

**SKRINING DAN IDENTIFIKASI BAKTERI PENGHASIL
HORMON INDOLE-3 ACETID ACID (IAA) DAERAH
PERAKARAN PADI (*Oryza sativa*) DI KELURAHAN BALANG
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI KURNIATI
NIM. 60300114132

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Kurniati
NIM : 60300114132
Tempat/Tgl. Lahir : Campalagian/03September 1995
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. H.M. YasinLimpo (pondokMutmainnah) depanpintu
masuk kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Samata-Gowa
Judul : Skrining dan Identifikasi Bakteri Penghasil Hormon Indole-3
Acetid Acid (IAA) Daerah Perakaran Padi (*Oryza sativa*) di
Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 November 2018

Penyusun

Sri Kurniati

NIM: 60300114132

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Skrining dan Identifikasi Bakteri Penghasil Hormon Indole-3 Acetid Acid (IAA) Daerah Perakaran Padi (*Oryza sativa*) di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, yang disusun oleh Sri Kurniati, NIM: 60300114132, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 19 November 2018

11 Rabiul Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T. (.....)

Sekretaris : St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. (.....)

Munaqisy I : Isna Rasdiana, S.Si., M.Sc. (.....)

Munaqisy II : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. (.....)

Pembimbing II: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi hanya milik Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir penyelesaian masa studi S1. Allah yang telah memberikan kekuatan dan motivasi tertinggi untuk penulis selama masa belajar hingga penyusunan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah ke masa peradaban. Darinya terbuka pemikiran ummat pada setiap sisi kehidupan yang membentuk peradaban baru bermartabat dan berakhlak mulia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena keterbatasan ruang, tidak mungkin bagi penulis untuk menyebutkan satu per satu. Oleh karena itu, hanya beberapa pihak yang penulis cantumkan pada skripsi ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayahanda H. Abd Rauf, S.Pd., M.S dan ibunda Hj. Anace, S.Pd yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga detik ini penulis bisa di posisi ini. Ibunda yang telah menularkan semangat juang menuntut ilmu dan pantang menyerah serta dukungan yang tiada henti kepada penulis dan ayahanda yang telah menjadi motivasi terbesar dalam tiap usaha untuk mengejar cita-cita. Terima kasih karena telah mendekatkan ridho Allah melalui do'a dan keridhoan

ayahanda dan ibunda. Semogarahmat dan kasih sayang Allah swt selalu menaungi mereka dan kemudian kelak dikumpulkan di Jannah-Nya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh staf administrasi yang telah banyak memberikan fasilitas dan bantuan selama masa belajar hingga penyelesaian tugas akhir.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. selaku ketua jurusan Biologi sekaligus sebagai pembimbingII dan Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku sekretaris jurusan Biologi yang telah memberikan banyak fasilitas dan bantuan selama masa belajar hingga penyelesaian tugas akhir.
4. EkaSukmawaty, S.Si.,M.Si.selaku Penasehat Akademik dan sebagai Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan baik dari keilmuan maupun agama yang dengan tulus hati meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah swt. selalu bersamabeliau dan kemudian kelak dikumpulkanbersama di Jannah-Nya.

5. Isna Rasdianah, S.Si., M.Sc. dan Dr. Hasyim Haddade, M.Ag. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membangun untuk memulai penelitian dan penulisan skripsi.
6. Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes. selaku dosen Komprehensif Mikrobiologi dan St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. selaku dosen Komprehensif ilmu biologi yang sangat membantu penulis untuk mengingat kembali ilmu yang penulis dapatkan dan Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I selaku Dosen Komprehensif Agama yang sangat membantu penulis untuk mempelajari agama lebih banyak lagi.
7. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi yang telah mengajarkan ilmu dan mendidik penulis. Semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah swt.
8. Kepala Laboratorium dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing praktikum hingga menyediakan fasilitas selama penelitian, dan memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis untuk menambah pengalaman dalam laboratorium.
9. Kakak Sumiaty, S.Pd., selaku staf Jurusan Biologi yang telah banyak membantu persiapan hingga pelaksanaan kegiatan akademik berupa peminjaman buku, persuratan, dan lain sebagainya.
10. Terimakasih kepada Ibu Handayani, S.Si., M.Kes yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sepenuh hati di Laboratorium Molekuler Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.


11. Kakak Irfan Gunadi dan Faisal Gamal beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
12. Terimakasih kepada teman-teman "The Squad" Almik Agri Lestari Nursalam, MagfiraFatmi, Susan Sugiarti, Samsinar, Hayati, Husnul Hatimah, Sri Wahyuni Hakim yang setia menjadi temanbaik sekaligus sahabat.
13. Saudara seperjuangan penelitian NurAnugrah M. yang senantiasa memberikan semangat serta berjuang bersama-sama menyelesaikan tuga sakhir
14. Saudara seangkatan "14CTEAL" yang telah membersamai perjuangan penulis sejak awal perjalanan perkuliahan, praktikum hingga penyelesaian tugas akhir.
15. Teman-teman KKN angkatan 57 Kecamatan MinasaTe'ne, Kabupaten Pangkep, khususnya PoskoDesa MinasaTe'ne yang selalu memberikan dukungan, hiburan, motivasi, semangatdan do'anya.
16. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat, motivasi dan do'a dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya pula kepada Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf pustakawan yang telah memfasilitasi penulis dalam hal pengumpulan referensi selama penyusunan tugas akhir.

Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membaca dan berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi pada tulisan ini. Pada akhirnya, penulis tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tulisan ini meskipun dalam penyusunannya menerima banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Gowa, 19 November 2018


Sri Kurniati
NIM: 60300114132



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ASTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15-37
A. Ayat dan Hadis yang relevan.....	15
B. Tinjauan UmumBakteriPenghasilhormon IAA	20
C. Tinjauan UmumHormon IAA	23
D. Tinjauan UmumIdentifikasiMolekuler.....	25
E. Tinjauan UmumRizosfer	28
F. Tinjauan UmumPadi (<i>Oryzasativa</i>).....	29
G. Tinjauan Umum Jeneponto.....	35
H. Hipotesis	36
I. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Variabel Penelitian	38
D. Definisi Operasional Variabel.....	38
E. Alat dan Bahan	39
F. Prosedur Kerja.....	40

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48-59
	A. Hasil Penelitian.....	48
	B. Pembahasan.....	52
BAB V	PENUTUP.....	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60
KEPUSTAKAAN	61-67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68-95
RIWAYAT HIDUP	96



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Komposisi Primer Mix.....	45
Tabel 4.1. Pengamatan makroskopik isolat terpilih penghasil hormon IAA	48
Tabel 4.2. Pengamatan mikroskopik isolat terpilih penghasil hormon IAA	49
Tabel 4.3. Pengukuran produksi hormon IAA isolat terpilih.....	50
Tabel 4.4. Hasil Analisis BLAST isolat K7 dan K9	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur kimia <i>Indole-3 Acetid Acid</i>	24
Gambar 2.2. Padi (<i>Oryza sativa</i> L.)	31
Gambar 2.3. Peta Kabupaten Jeneponto	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan sterilisasi alat	67
Lampiran 2. Bagan pembuatan media NA miring	67
Lampiran 3. Bagan dan hasil peremajaan isolat bakteri	68
Lampiran 4. Bagan pembuatan media NB	71
Lampiran 5. Bagan dan hasil pembuatan kultur bakteri pada media NB.....	72
Lampiran 6. Bagan dan hasil skrining bakteri yang menghasilkan IAA.....	73
Lampiran 7. Bagan pembuatan kurva standar IAA.....	75
Lampiran 8. Hasil karakterisasi secara mikroskopik.....	76
Lampiran 9. Gambar alur identifikasi molekuler bakteri rizosfer padi.....	79
Lampiran 10. Gambar hasil analisis BLAST secara online.....	81



ABSTRAK

Nama : Sri Kurniati
NIM : 60300114132
Judul Skripsi : **Skrining dan Identifikasi Bakteri Penghasil Hormon Indole-3 Acetid Acid (IAA) Daerah Perakaran Padi (*Oryza sativa*) di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**

Hormon IAA (*Indole-3 AcetidAcid*) merupakan nama lain dari hormon auksin. Pertanian modern dewasa ini sangat bergantung terha dappenggunaan pupuk kimia yang dalam jangka panjang berpengaruh terhadap sifat kesuburan tanah. IAA dapat bersumber dari bakteri rizosfer tanaman untuk digunakan sebagai tambahan pupuk organik (*biofertilizer*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengetahui jumlah bakteri dan jenis bakteri yang dapat menghasilkan hormon IAA tertinggi daerah perakaran tanaman padi (*Oryza sativa*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 isolat yang menghasilkan hormon IAA yaitu isolat K1, K4, K7, K9, K10, K12, K14 dan K16. Sedangkan bakteri yang menghasilkan IAA tertinggi yaitu isolat K7 dan K9. Hasil analisis BLAST bahwa isolat K7 teridentifikasi sebagai spesies *Stenotrophomonas malthophilia* strain FDAARGOS 92 dan isolat K9 teridentifikasi sebagai spesies *Bacillus safensis* strain U-17 1.

Kata kunci : IAA, padi (*Oryza sativa*), rizosfer, *Stenotrophomonas maltophilia* dan *Bacillus safensis*

ABSTRACT

Name : Sri Kurniati
Student ID Number : 60300114132
Title : Screening and Identification of Bacteria Which Produce 3
Acetid Indole Hormone on Rice (*Oryza sativa*) root areas in
Balang Sub-District, Binamu District, Jeneponto Regency

IAA hormone (*Indole-3 Acetid Acid*) is another term of auxin hormone. Currently, modern agriculture is so depend in long tem use of which influences the soil fertility. IAA can be produced by rhizosphere bacteria of plants which use as additional organic ferlilizer (*biofertilizer*). This research is quantitative method which have purpose to find out the number and kind of bacteria which produce the highest IAA hormone on Rice (*Oryza sativa*) root areas. The result show that there are 8 isolates which produces IAA hormone, they are K1, K4, K7, K9, K10, K12, 14 and K16 isolates. BLAST analysis result show that K7 isolate identified as *Stenotrophomonas malthophilia* species FDAARGOS 92 strain and K9 isolate identified as *Bacillus safensis* species U-17 1 strain.

Keywords: IAA, rice (*Oryza sativa*), rhizosphere, *Stenotrophomonas malthophilia*, and *Bacillus safensis*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia di dalamnya telah dijelaskan tentang segala aspek kehidupan termasuk penciptaan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup lain serta dapat dijadikan bahan penelitian. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al- An'am/06: 95.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ط
تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآنِي تُؤَفِّكُونَ ﴿٩٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? (Kementerian Agama RI, 2007).

Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan Allah berfirman "Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan". Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. adalah satu-satunya pencipta yang dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuhan termasuk tumbuhan berbiji agar dapat dimanfaatkan hewan dan manusia salah satunya sebagai bahan pangan. "Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati". Makna ayat ini menjelaskan tentang kuasa Allah dalam mengatur kehidupan dan kematian makhluk ciptaan-Nya. Hanya orang yang menyakini dan memikirkan

bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan tidak ada yang setara dengan-Nya (Abdullah, 2003).

Ayat tersebut juga dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah firman Allah “Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan” Maksudnya Allah maha kuasa maha bisa membelah berbagai biji sumber bibit untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan baru. Dia juga membelah tunas untuk menumbuhkan pohon- pohon baru. Ayat di atas juga menunjukkan salah satu bukti kekuasaan Allah swt. yaitu penciptaan biji dan embrio tanaman di setiap tempat yang sempit. Sedangkan bagian lain biji itu, terdiri atas zat-zat tidak hidup terakumulasi. Ketika embrio itu mulai bernyawa dan tumbuh, zat-zat yang terakumulasi itu berubah menjadi zat yang dapat memberi makan embrio. Ketika mulai pertumbuhan, dan sel-sel hidup mulai terbentuk, biji kedua berubah pula dari fase biji/bibit ke fase tunas. Saat itu tumbuhan mulai dapat memenuhi kebutuhan makanannya sendiri, dari zat garam yang larut dalam air di dalam tanah dan diserap oleh akar serabut, dan terbentuknya zat hijau daun dari karbohidrat, seperti gula dengan bantuan cahaya matahari. Ketika siklus itu sampai pada titik akhirnya, buah-buahan kembali mengandung biji-bijian yang merupakan bahan kehidupan baru lagi. Dan begitu seterusnya (Shihab, 2002).

Ayat di atas dengan nyata menjelaskan bahwasanya Allah swt. menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan dengan segala bentuk dan jenisnya masing-masing, salah satunya adalah tumbuhan yang tergolong biji-bijian dapat dimanfaatkan makhluk hidup lain baik manusia maupun hewan sebagai bahan makanan, karena

tumbuhan merupakan salah satu penyuplai energi untuk pemenuhan aktivitas sehari-hari. Tumbuhan berbiji yang menjadi bahan pangan utama masyarakat Indonesia adalah padi.

Dalam islam dianjurkan untuk bercocok tanam karena bercocok tanam merupakan pekerjaan mulia. Padi tergolong jenis tumbuhan berbiji yang dapat tumbuh hampir di semua lahan pertanian dengan teknik bercocok tanam. Metode tersebut sudah ada sejak zaman diciptakannya manusia di dunia. Selain Al-Qur'an, umat Islam memiliki pedoman untuk dijadikan petunjuk dalam hidup yaitu hadis yang merupakan perkataan Rasulullah Muhammad saw.

Pentingnya dianjurkan bercocok tanaman disebutkan dalam salah satu hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ وَأَعْرَسًا رِيْزُغٌ زَرَعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ نَسَاءٌ وَأَطْيَرٌ نَّ وَالْإِبِيمَةُ كَانَ لَهُ بِهِ قَدَّ صَدَّ وَقَالَ النَّ ثَنَا بَابَا حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ سَلَّمَ (ه ر و ا
ال بخاري)

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik ra berkata; Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Abantelah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi saw (HR. Al-Bukhari).

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut Poedjiadi (1994), kandungan karbohidrat padi giling sebesar 78,9%, protein 6,8%, lemak 0,7% dan lain-lain 0,6% (Hariningsih, 2016).

Padi merupakan komoditas tanaman pangan paling utama di Indonesia. Penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahanmakanan pokok. Sembilan puluh lima persen penduduk Indonesia mengkonsumsi bahan makanan ini. Karena beras mampu mencukupi 63% total kecukupan energi dan 37% protein (Norsalis, 2011).

Kebutuhan akan beras sebagai salah satusumber pangan utama penduduk Indonesiaterus meningkat, karena selain jumlah penduduk terusbertambah dengan peningkatan sekitar 2%per tahun, disebabkan juga adanya perubahan polakonsumsi penduduk Indonesia dari non beras ke beras.Terjadinya penciutan lahan sawah irigasisubur akibat dari konversi lahan untuk kepentingan non pertanian, serta munculnyafenomena degradasi kesuburan lahan menyebabkan peningkatan produktivitas padi sawah irigasicenderung melandai sehingga mengakibatkan kebutuhan jumlah produksi beras tidak mampu mengimbangi laju peningkatan penduduk (Andriani, 2008).

Produktivitas pertanian merupakan sumber bagi pertumbuhan di sektor pertanian.Adapun peningkatan produksi pertanian dapat dicapai dengan peningkatan teknologi pertanian.Dengan peningkatan teknologi pertanian sangat memungkinkan

tercapainya peningkatan produksi dari faktor produksi yang tetap (Thirtle and Ruttan dalam Hermanto et al., 1992). Dengan demikian pengembangan teknologi pertanian seperti teknologi pemupukan organik merupakan suatu langkah yang strategis bagi peningkatan produktivitas pertanian kedepannya (Maulana, 2004).

Penerapan teknologi pemupukan organik juga sangat penting dalam pengelolaan kesuburan tanah, karena pertanian modern dewasa ini memiliki ketergantungan pada penggunaan bahan-bahan kimia seperti fungisida, pupuk sintetis dan pestisida yang justru dapat mempengaruhi keadaan tanah dan mengakibatkan tekanan pada lingkungan pada penggunaan jangka panjang (Retnowati, dkk., 2012).

Pupuk organik tersebut dapat bersumber dari sisa panen, pupuk kandang, kompos atau sumber bahan organik lainnya. Selain menyumbang hara yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik, seperti unsur hara mikro, pupuk organik juga penting untuk memperbaiki sifat fisik dan biologis tanah. Lahan yang kering akan mampu menyediakan air dan hara yang cukup bagi tanaman bila struktur tanahnya baik sehingga dapat mendukung peningkatan efisiensi pemupukan. Jenis pupuk lain yang mulai berkembang pesat adalah pupuk hayati (*biofertilizer*) seperti, pupuk mikroba pemacu tumbuh dan pengendali hama, mikroflora tanah multigunadan pupuk mikroba pelarut fosfat (Abdurachman dkk, 2008).

Wu *et. al.*, (2005) melaporkan bahwa penggunaan *biofertilizer* yang mengandung mikoriza, bakteri pelarut fosfat (P) (*Bacillus megaterium*), dan pelarut Kalium (K) (*Bacillus mucilaginosus*) telah meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung (*Zea mays*). Komunitas 2 mikroba tersebut dapat berperan dalam

pertumbuhan tanaman melalui beberapa mekanisme seperti peningkatan kemampuan bersaing dengan patogen akar (Weller et al., 2002), penyediaan unsur hara dalam tanah (Lynch, 1990), atau peningkatan kemampuan menyerap unsur hara (Smith and Read, 1997). Sedangkan Pattern and Glick (2005) menyatakan bahwa mikroba dapat memacu produksi hormon pertumbuhan seperti *Indole-3-Acetic Acid* (IAA), sitokinin, dan giberelin. Sebagai tambahan, mikroba dapat mendorong peningkatan pertumbuhan rambut-rambut akar sehingga penyerapan air dan hara mineral menjadi lebih efisien (Lerner et al., 2005).

Menurut (Sukmadi, 2012) Auksin (hormon pertumbuhan) banyak ditemukan pada embrio benih dan jaringan meristematik yang aktif tumbuh seperti pucuk ranting/daun, ujung akar dan tunas tanaman. *Indole-3-Acetic Acid* (IAA) atau yang disebut sebagai hormon auksin berfungsi mengendalikan beberapa mekanisme fisiologi tumbuhan, seperti proses pembelahan sel dan diferensiasi jaringan tumbuhan (Haq and Dahot, 2007).

Bakteri Penghasil IAA mampu menghasilkan fitohormon yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan *xilem* dan *floem*, dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanjangan akar. Widawati dan Suliasih (2006) menyatakan populasi Bakteri pelarut fosfat (BPF) di daerah rizosfer mencapai 10-100 kali lebih banyak dibandingkan daerah nonrizosfer karena akar mengekskresikan bahan organik yang dapat mencukupi dan

merangsang pertumbuhan bakteri. BPF di dalam tanah mempunyai kemampuan melepas Fosfor (P) dari ikatan Besi (Fe), Aluminium (Al), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg), sehingga P yang tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman (Rao, 1994). Salah satu lokasi yang menarik untuk diketahui keberadaan bakteri penghasil hormon IAA pada tanaman padi adalah Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang termasuk daerah yang beriklim kering (Siswantari, 2012). Berdasarkan hal tersebut sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Isolasi dan Identifikasi Bakteri Penghasil Hormon *Indole-3 Acetid Acid* (IAA) Asal Perakaran Padi (*Oryza sativa*L.) di Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Secara In Vitro”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa banyak isolat bakteri asal perakaran tanaman padi (*Oryza sativa*) yang mampu menghasilkan hormon IAA?
2. Bakteri jenis apa yang mampu menghasilkan hormon IAA tertinggi asal perakaran tanaman padi (*Oryza sativa*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sampel isolat bakteri dari penelitian sebelumnya diremajakan pada medium *Nutrient Agar* (NA) miring. Kemudian untuk mengetahui kemampuan bakteri tersebut dalam menghasilkan hormon IAA maka perlu digunakan medium *Nutrient Broth* (NB). Kemampuan bakteri tersebut dideteksi menggunakan spektrofotometer. Bakteri penghasil hormon IAA yang telah didapatkan akan dilakukan kultur bakteridan proses ekstraksi IAA, uji pengukuran konsentrasi IAA secara spektrofotometri, pengukuran uji aktivitas IAA secara kualitatif. Bakteri penghasil hormon IAA dari perakaran tanaman padi (*Oryza sativa* L.) selanjutnya diidentifikasi secara molekuler dengan tujuan mengetahui lebih spesifik spesies dari bakteri tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus–Oktober 2018 bertempat di laboratorium mikrobiologi jurusan biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata-Gowa dan laboratorium molekuler Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Nyoman (2004) dalam penelitiannya Potensi isolat bakteri Penghasil IAA dalam Peningkatan Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau pada Kondisi Hidroponik

Menggunakan Metode Uji IAA dengan mengambil beberapa isolat bakteri dari Laboratorium mikrobiologi kemudian mengekstraksi sebanyak tiga kali menggunakan metode Salkowski bahwa hasil ini menunjukkan kecambah kacang hijau yang ditumbuhkan secara hidroponik mampu meningkatkan panjang kecambah, pada konsentrasi rendah IAA menyebabkan pemanjangan baik pada pucuk maupun akar. Ekstrak kultur yang diencerkan dapat menstimulasi pemanjangan akar utama. IAA yang diekskresikan oleh bakteri meningkatkan pertumbuhan akar tanaman secara langsung dengan menstimulasi pemanjangan sel atau pembelahan sel. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dalam hal mengisolasi bakteri penghasil hormon IAA. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada sampel, penelitian di atas menggunakan sampel kecambah kacang hijau yang diberi bakteri penghasil IAA kemudian diamati pertumbuhannya, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel rizosfer padi untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri penghasil hormon IAA tersebut.

2. Lesta dan Riyanti (2007) dalam penelitiannya Pengaruh Hormon Asam Indol Asetat yang Dihasilkan *Azospirillum* sp. terhadap Perkembangan Akar Padi. Hasil menunjukkan bahwa semakin lama umur kultur, pada semua perlakuan cenderung terjadi penurunan produksi AIA. Hal ini kemungkinan besar nutrisi sudah menurun, di lain pihak AIA yang dihasilkan juga dikonsumsi kembali untuk pertumbuhan. Inokulasi tanaman padi dengan strain-strain *Azospirillum* mampu meningkatkan perkembangan akar lateral dan merangsang kerapatan dan panjang rambut akar,

yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan serapan hara pada tanaman padi. Inokulasi memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan akar tanaman padi, di mana jumlah akar lebih lebat dan rambut akar lebih banyak, jadi kemampuan sekresi AIA lebih banyak. Fitohormon AIA menghasilkan lebih banyak akar lateral, rambut akar, dan cabang rambut akar. Kemampuan *Azospirillum* dalam mensintesis AIA dapat memodifikasi perkembangan akar dan proses pertumbuhan tanaman inang (Tien et al. 1979). Strain-strain *Azospirillum* yang mampu memproduksi AIA tinggi dalam kulturnya sangat mempengaruhi morfologi akar tanaman (Jain dan Patriquin 1985). Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dalam hal pengukuran kadar hormon IAA pada bakteri penghasil hormon IAA. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas sudah diketahui jenis bakteri penghasil hormon IAA dan diinokulasikan pada akar tanaman padi, sedangkan pada penelitian ini mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri penghasil hormon IAA dari rizosfer tanaman padi untuk melihat potensi bakteri yang dapat menghasilkan hormon IAA tanpa diinokulasikan pada akar tanaman padi.

3. Suriaman (2010) dalam penelitiannya potensi bakteri endofit dari akar tanaman kentang (*Solanum tuberosum*) dalam memfiksasi N_2 di udara dan menghasilkan hormon IAA secara in vitro merupakan solusi untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan kualitas tanaman dengan memanfaatkan teknologi alternatif pemupukan secara hayati yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan bakteri endofit. Hasilnya bahwa semua jenis bakteri endofit, baik bakteri

tunggal dan bakteri kombinasi mampu menghasilkan hormon IAA secara in vitro. Bakteri endofit tunggal yang mempunyai kemampuan tinggi menghasilkan IAA adalah bakteri tunggal *K. ozaenae* (0,98 ppm), sedangkan bakteri endofit kombinasi yang memiliki kemampuan tinggi menghasilkan IAA adalah bakteri kombinasi *P. pseudomallei* dengan *B. mycoides* (1,16 ppm). Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dalam hal melihat potensi bakteri yang dapat menghasilkan hormon IAA. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, pada penelitian di atas menggunakan bakteri endofit yang telah diketahui jenisnya dari akar tanaman kentang (*Solanum tuberosum*) dalam memfiksasi Nitrogen serta menghasilkan hormon IAA, sedangkan penelitian ini hanya mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri penghasil hormon IAA dari perakaran tanaman padi.

4. Sukmadi (2012) dalam penelitiannya Aktivitas Fitohormon *Indole-3-Acetic Acid* (IAA) Dari Beberapa Isolat Bakteri Rizosfer dan Endofit, bahwa hasil inimenunjukkan bakteri rizosfer dan bakteri endofit dapat menghasilkan fitohormon IAA. Dari 34 isolat bakteri yang diuji aktivitasnya, 20 isolat bakteri dapat menghasilkan fitohormon IAA dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Isolat bakteri endofit yang diisolasi dari ranting tanaman belimbing (BER1) mempunyai aktivitas tertinggi dalam menghasilkan fitohormon IAA, yaitu dengan konsentrasi IAA sebesar 16,71 ppm. Selain isolat bakteri BER1 terdapat 2 isolat bakteri yang dapat menghasilkan konsentrasi IAA cukup tinggi yaitu isolat bakteri rizosfer tanaman kangkung (KR1) dengan konsentrasi IAA 10,99 ppm dan

isolat bakteri endofit akar tanaman mangga (MEa2) dengan konsentrasi IAA 7,64 ppm. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian penyusun dalam hal produksi hormon IAA, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun terletak pada sampel yakni penelitian di atas menggunakan 3 sampel yaitu tanaman belimbing, kangkung dan mangga. Pada penelitian ini hanya menggunakan 1 sampel yaitu rizorfer tanaman padi (*Oryza sativa*) yang akan diidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan Hormon IAA pada tanaman tersebut.

5. Adi (2016) dalam penelitiannya Efektivitas Beberapa Auksin (NAA, IAA, dan IBA) terhadap Tertumbuhan Tanaman Zaitun (*Olea europea* L.) Melalui Teknik Stek Mikro bahwa konsentrasi jenis auksin yang efektif untuk menumbuhkan tanaman zaitun melalui teknik stek mikro adalah NAA 0,1 ppm untuk persentase stek hidup (%) sebesar 70% dari total ulangan (7 stek hidup dari 10 stek ulangan), persentase stek berakar (%) sebesar 40% (4 stek berakar dari 10 stek ulangan) dan panjang akar rata-rata 1,296 cm dan IBA 0,1 ppm untuk jumlah akar pada stek. Meskipun pada beberapa perlakuan menunjukkan hasil yang sama pada persentase hidup (%), stek berakar (%), jumlah akar dan panjang akar, akan tetapi penggunaan jenis hormon dengan konsentrasi yang rendah memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang memberikan hasil tertinggi sehingga penggunaan hormon dengan konsentrasi rendah lebih efektif untuk digunakan dalam budidaya tanaman zaitun. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dalam hal meneliti tentang hormon

IAA. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada sampel dan perlakuan. Penelitian di atas menggunakan sampel tanaman zaitun (*Olea europea* L.) yang kemudian diberikan hormon NAA, IAA dan IBA untuk diamati pertumbuhannya dengan teknik stek mikro, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel rizosfer tanaman padi. Perbedaan lainnya yaitu penelitian di atas mengukur efektivitas hormon IAA yang diberikan pada stek mikro tanaman bukan mengisolasi bakteri penghasil hormon IAA.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah isolat bakteri asal perakaran tanaman padi (*Oryza sativa*) yang mampu menghasilkan hormon IAA.
2. Mengetahui jenis bakteri yang mampu menghasilkan hormon IAA tertinggi asal perakaran tanaman padi (*Oryza sativa*)?

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat membuktikan secara ilmiah dan memberikan informasi kepada masyarakat penggunaan pupuk hayati dengan memanfaatkan teknologi alternatif menggunakan bakteri penghasil hormon IAA (*Indole-3- Acetic Acid*) dari perakaran tanaman padi lebih ramah lingkungan.
2. Menambah pengetahuan dibidang pertanian, sehingga dari hasil penelitian ini bakteri penghasil hormon IAA dapat dijadikan pengganti pupuk kimia

3. Dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan jenis bakteri yang dapat menghasilkan hormon IAA pada jurusan Biologi dan civitas akademik UIN Alauddin Makassar
4. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Makhluk hidup termasuk tumbuhan dapat tumbuh atas kehendak Allah swt.dengan bantuan air yang turun dari langit. Dengan air tersebut berbagai jenis tumbuhan tumbuh di tanah untuk dapat dimanfaatkan manusia dan hewan.Tanah sebagai media pertumbuhan menyerap air dan unsur hara agar tumbuhan yang tumbuh di atasnya subur tanpa adanya kekeringan karena nutrisi tanah telah terpenuhi.Tanah subur dengan mudah menjadi tidak subur ialah kuasa Allah yang mengatur segala sesuatu di bumi.Oleh karena itu manusia harus mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah swt.Allah swt.berfirman dalam QS Az-Zumar/39:21.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ
بِهِ زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal(Kementerian Agama RI, 2007).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman “Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi”.Maksudnya Allah menceritakan kepada manusia asal mula air yang ada di bumi berasal dari langit. Tak ada satupun air di bumi melainkan berasal dari air yang diturunkan Allah dari langit yang kemudian Allah menjadikan sumber-sumber air tersebut berbeda-beda terdapat di laut, di sungai di danau dan sumber air lainnya”. “Kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya”. Maksudnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan segala bentuk warna, bau dan rasanya masing-masing serta Allah tak lupa memberikan masing-masing manfaatnya agar dapat dimanfaatkan manusia.“Lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai”. Yaitu Allah menjadikan tumbuhan yang semula subur segar menjadi tua sehingga kering dan berwarna kuning kemudian hancur berderai-derai. “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal” Maksudnya supaya manusia menyadari betapa maha kuasa Allah mengatur alam dengan sebaik-baiknya (Abdullah, 2003).

Dalam tafsir Al-Mishbah ayat tersebut juga dijelaskan Allah swt berfirman“Apakah kamu tidak memperhatikan(maksudnya tidak mengetahui) bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit”.Allah maha kuasa atas segala sesuatu mengatur keadaan alam.“Maka diatur-Nya menjadi sumber-sumberair di bumi”. Yakni, Dia memasukkan air itu ke tempat-tempat yang dapat menjadi sumber

air di bumi. “Kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya”. Tanaman yang tumbuh subur dengan bermacam warna yang indah dengan kandungan nutrisinya. “Lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan” Jika kekurangan nutrisi serta unsur penting yang dibutuhkan, tanaman menjadi layu dan kering. “Kemudian dijadikan-Nya hancur berderai” Yakni Allah dengan mudah merontokkan tanaman meskipun manusia berusaha menanamnya jika Allah tak berkehendak maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh. Hal tersebut dapat menjadi perumpamaan kehidupan manusia. “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal”. Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya untuk menyimpulkan keesaan dan kekuasaan Allah swt. (Shihab, 2002).

Ayat di atas secara nyata menjelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu mengalirkannya dalam bentuk mata air di dalam perut bumi. Dia kemudian menumbuhkan tanaman pertanian yang bentuknya sangat beragam lalu menjadi kering dan kuning setelah sebelumnya hijau. Setelah itu, Dia menjadikannya terpecah berpeking-keping. Sungguh, dalam proses perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu, terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal yang cemerlang.

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk ciptaan Allah. Dalam al-Qur'an telah dibahas dan dijelaskan bahwa air memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai unsur hara untuk kesuburan tumbuh-tumbuhan. Selain itu air adalah karunia dan nikmat Allah

termasuk air hujan yang begitu istimewa, oleh karena itu ketika hujan turun sebaiknya manusia tidak mengeluh melainkan berdo'a supaya mendapat kebaikan, berkah dan manfaat dari hujan tersebut. Terdapat sebuah hadis yang berisi anjuran berdo'a ketika hujan turun.

اللَّهُمَّ صَيِّبَانَا فَعَا. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

Terjemahnya:

Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami (HR. Bukhari).

Tanah merupakan unsur hara utama di alam. Bagian terpenting dalam hal penyediaan nutrisi baik organik maupun anorganik disebut sebagai koloid yang bertanggung jawab melepaskan nutrisi ke larutan tanah sehingga tersedia untuk diserap oleh akar tanaman. Kapasitas Tukar Kation (KTK) merupakan sifat kimia yang erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan nilai KTK tinggi mampu menyerap dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah yang memiliki nilai KTK rendah. Allah swt. berfirman dalam QS Al-A'raf/7:58.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرِجُهُ إِلَّا نَكْدًا ۚ

كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (Kementerian Agama RI, 2007).

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah berfirman “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah”.Yakni tanah yang baik mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan cepat dan subur.“Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana”.Maksudnya tanah yang tidak subur ialah seperti tanah yang belum digarap dan belum siap untuk ditanami, serta tanahlainnya yang tidak dapat ditanami (Abdullah, 2003).

Dalam tafsir Al-Mishbah juga dijelaskan bahwa Allah berfirman “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah”.Ayat di atas menjelaskan tentang tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah.“Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana”.Yaitu tanah yang tidak subur, tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi penyebab kerugian pemiliknya.“Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.Maksudnya Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya agar manusia selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Nya dan nikmat-nikmat-Nya (Shihab, 2002).

Ayat tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa Allah swt.menciptakan beberapa tanah untuk digunakan makhluk hidup. Tanah yang baik dapat menumbuhkan tanaman dengan baik dan subur.Sebaliknya tanah yang tidak subur yaitu tandus yang tidak dapat ditumbuhi tanaman dengan subur karena miskin nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman.Yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah swt.bagi orang yang beriman (Shihab, 2002).

Untuk tumbuh subur, tumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup di tanah, sehingga tanah harus dalam kondisi subur. Selain itu tumbuhan membutuhkan fitohormon Indole-3 Acetid Acid (IAA) yaitu senyawa pemacu pertumbuhan tanaman yang juga berperan dalam kesuburan tanah.

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang pentingnya nutrisi untuk kesuburan tanah yang mengandung pengertian bahwa Islam menuntut umat manusia agar mengusahakan sebaik mungkin lahan yang ada di seluruh permukaan bumi untuk dioptimalkan, agar lahan tersebut tidak menjadi terlantar dan kurang produktif.

عَائِشَةَ عَنِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اِتَّمَسُوا الرِّزْقَ مِنْ حَبَائِبِ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

"Dari Aisyah ra. berkata : Rasulullah saw pernah bersabda : “ Galilah rizki dari celah-celah (perut) bumi” (HR. Tarmidzi).

B. Tinjauan Umum Bakteri Penghasil Hormon IAA

Bakteri adalah mikroba prokariotik yang uniseluler dan berkembangbiak dengan cara aseksual dengan pembelahan sel. Bakteri tidak berklorofil namun ada yang bersifat fotosintetik, kemudian bakteri hidup secara bebas, parasit, saprofit, sebagai patogen pada manusia, hewan dan tumbuhan. Habitatnya terdapat di mana-mana misalnya di alam, tanah, laut, atmosfer dan di dalam lumpur. Bentuk tubuhnya ada yang bulat, spiral dan batang. Selain itu bakteri merupakan struktur sel yang tidak mempunyai membran inti sedangkan komponen genetiknya terdapat di dalam

molekul DNA tunggal yang terdapat di dalam sitoplasma. Ukuran sel-sel bakteri sangat bervariasi tergantung masing-masing spesiesnya, namun pada umumnya 0,5-1,0 x 2,0-5 μm . Hal tersebut sama halnya dengan 10.000 bakteri yang panjang selnya 1 μm dari satu ujung ke ujung lainnya (Alimuddin, 2005).

Hormon IAA yang dihasilkan oleh bakteri melimpah pada fase stasioner. Produksi IAA akan meningkat pada kondisi pertumbuhan menurun, ketersediaan karbon yang terbatas dan dalam kondisi lingkungan pH asam. Kondisi tersebut terjadi pada saat bakteri memasuki fase stasioner (Dewi dkk, 2015).

Bakteri yang mampu menghasilkan IAA dapat meningkatkan pertumbuhan dan perpanjangan akar sehingga permukaan akar menjadi lebih luas dan akhirnya tanaman mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah lebih banyak (Kumala dkk, 2016).

Biosintesis mikroba IAA dalam tanah dapat dipicu dengan adanya L-tryptofan yang berasal dari eksudat akar atau sel-sel yang rusak. Bakteri yang mampu memproduksi IAA akan menstimulasi pertumbuhan sistem perakaran inang. Bakteri penghasil hormon tumbuh IAA mensintesis hormon tersebut melalui *jalur tryptophan dependent pathway* dengan senyawa *intermediet indolepyruvic acid* (Pattern dan Glick 2002 in Husen 2003 and Mohite 2013).

Populasi dan komposisi mikroorganisme dalam tanah yang bermanfaat untuk pertanian dapat terganggu (Rajapaksha et al., 2004; Manuel et al., 2008). Kesadaran akan lingkungan yang sehat dan perkembangan di bidang bioteknologi, telah mendorong berkembangnya produk-produk alternatif yang ramah lingkungan,

termasuk di dalamnya pupuk mikroba penghasil senyawa yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan termasuk auksin yang berperan penting dalam membantu pembentukan *Asam Indol-3 Asetat* (AIA). AIA secara kimia mirip dengan asam amino triptofan dimana dianggap sebagai asal dari bentuk molekul AIA (Lestari dkk., 2007).

AIA merupakan hormon kunci bagi berbagai aspek pertumbuhan tanaman yang dapat meregulasi banyak proses fisiologi, seperti pembelahan dan diferensiasi sel serta sintesa protein. Pada konsentrasi auksin optimum, sel-sel penyusun kambium aktif membelah dan terbentuk lapisan xilem yang cukup tinggi. AIA mendukung pemanjangan batang dengan meningkatkan pembesaran ukuran sel serta pembelahannya (Bialek, 1992; Bartel, 1997; Idris et al., 2007).

Penelitian yang dilakukan Patten dan Glick (2002) diperoleh bahwa bakteri yang memproduksi IAA akan menstimulasi pertumbuhan sistem perakaran inang. Keuntungan dari asosiasi tanaman dengan bakteri adalah mensuplai sebanyak produk metabolit fiksasi karbon oleh tumbuhan yang telah hilang ke rizosfer sebagai eksudat. Konsentrasi IAA juga meningkat seiring dengan umur kultur sampai bakteri mencapai fase stasioner (Antonius, dkk., 2014).

(Bolero, et. al., 2007) Menyatakan mikroba yang mampu menghasilkan IAA dapat meningkatkan pertumbuhan dan perpanjangan akarsehingga permukaan akar menjadi lebih luas dan akhirnya tanaman mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah lebih banyak.

C. Tinjauan Umum Hormon IAA


Menurut (Long, et. al., 2008) meningkatnya pertumbuhan tanaman berkaitan dengan produksi fitohormon seperti Indole-3-Acetic Acid (IAA), sitokinin dan hormon pemacu pertumbuhan lainnya, dan atau sebagian endofit dapat meningkatkan penambahan nutrisi seperti nitrogen dan fosfat. Etilen dan IAA terlihat hampir pada semua aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mulai dari perkecambahan biji sampai pada pembentukan tunas dan abscission daun. Oleh karena itu, produksi ACC deaminase dan IAA sangat efisien dan penting bagi endofit untuk merangsang tanaman inang. Bakteri endofit mengandung ACC deaminase yang membantu pertumbuhan tanaman dan pada umumnya berada pada bagian akar tanaman inang dalam apoplas. Bagian sel dinding sel dari keseluruhan bagian tanaman dan pembuluh *xilem* dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal disebut apoplas (Suriaman, 2010).

Menurut Lestari dkk (2007) bahwa pada awal inkubasi sumber nutrisi tinggi sehingga produksi IAA tinggi dan terus meningkat meskipun tidak secara signifikan namun konsisten sampai akhir inkubasi. Pada bakteri terdapat fenomena bahwa pola produksi dan konsumsi IAA berjalan seimbang. Misalnya *Azospirillum* masih mampu memproduksi IAA dan secara simultan bakteri juga mengkonsumsi IAA untuk pertumbuhannya meskipun medium pertumbuhan sudah miskin nutrisi.

Fitohormon auksin alami jenis IAA bersifat sangat labil dan mudah terdegradasi secara enzimatis karena pengaruh aktivitas peroksidase pada tanaman. Selain itu, IAA juga mudah terdegradasi secara non-enzimatis akibat pengaruh intensitas cahaya dan temperatur yang tinggi. Oleh karena itu, larutan

stok IAA sebaiknya disimpan pada botol berwarna coklat/gelap agar terlindung dari intensitas cahaya yang tinggi dan ditempatkan dalam pendingin dengan suhu 2-6°C (Dascaliuc, 2002).

Indole-3-Acetic Acid (IAA) merupakan anggota utama dari kelompok auksin yang mengendalikan banyak proses fisiologis penting termasuk pembesaran dan pembelahan sel, diferensiasi jaringan dan respon terhadap cahaya dan gravitasi. IAA memiliki struktur kimia yang dapat dilihat pada Gambar 1. Fitohormon IAA diketahui dapat menghasilkan lebih banyak akar lateral, rambut akar dan cabang rambut akar. Keberadaan lima jalur biosintesis IAA yang berbeda telah diteliti dengan triptofan (Trp) sebagai precursor. Lima jalur tersebut ialah indole-3-piruvat (IpyA), indole-3-asetamida (IAM), triptamin (TAM), Indole-3-asetonitril (IAN) dan jalur Trp cincin samping oksidase. Eksudat akar merupakan sumber alami L-triptofan untuk mikroorganisme rizosfer yang dapat meningkatkan produksi IAA di daerah rizosfer. Biosintesis IAA dalam tanah dapat dipacu dengan adanya triptofan yang berasal dari eksudat akar atau sel-sel yang rusak atau membusuk (Tahta, 2015).



Gambar 2.1 Struktur Kimia *Indole-3-Acetic Acid* (IAA). (Tahta, 2015).

Zat pengatur tumbuh tanaman adalah senyawa organik selain hara yang ada dalam jumlah kecil dapat mendukung, menghambat, maupun mengubah proses fisiologis tumbuhan. Menurut Wattimena (1998) bahwa zat pengatur tumbuh dari kelompok auksin dapat merangsang pembentukan akar.

Widiarti (2009) dalam Adi (2016) menyatakan bahwa auksin dapat menginisiasi pemanjangan sel dengan cara mempengaruhi fleksibilitas dinding sel dan memacu protein tertentu yang ada di membran plasma untuk memompa ion H^+ ke dinding sel. Ion H^+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuh memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Sel terus tumbuh dengan mensintesis kembali mineral dinding sel dan sitoplasma. Tahap ini kemudian membentuk sel meristem yang menembus korteks kemudian muncul dari epidermis sehingga terbentuk akar.

Peix et al.,(2001) menyatakan bahwa aplikasipupuk hayati akan memperolehkeuntungan ganda yaitu dapatmenyediakan unsur N dan P sertamenghasilkan IAA.

D. Tinjauan Umum Identifikasi Molekuler

Di bidang mikrobiologi, identifikasi mikroorganisme memegang peranan yang sangat penting. Saat ini dikembangkan metode identifikasi berbasis molekuler yang lebih cepat dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Proses identifikasi bakteri secara konvensional berdasarkan karakter fenotip bakteri seperti pewarnaan gram, morfologi koloni, dan aktivitas enzim seringkali tidak bersifat statis serta dapat berubah seiring dengan adanya evolusi. Kesalahan identifikasi seringkali terjadi dikarenakan hadirnya karakteristik fenotip bakteri yang tidak biasa ataupun kurangnya pengalaman dalam menginterpretasikan data karakter fenotip. Hal ini

menimbulkan hadirnya metode identifikasi secara molekuler menggunakan gen 16S rRNA dengan analisis sekuensing gen 16S rRNA (16S *ribosomal Ribonucleic acid*/Asam ribonukleat pengkode ribosom 16S, S menyatakan *Svedberg*, yaitu satuanukuran ribosom).Selain itu dapat mengurangi prasangka penafsiran dan menyingkirkan kebutuhan untuk kemungkinan "pretest" mengenai klasifikasi mikroorganisme untuk pemeriksaan langsung dan pemilihan database (Petti et al., 2005).

Sejak ditemukan pertama kali oleh Woose, sekuens 16S rDNA semakin banyakdigunakan. Pada tahun 1980-an telah dikembangkan standar terbaru dalam mengidentifikasi bakteri. Penelitian woosemenunjukkan bahwa sifat yang *conserved* dari gen 16S rRNA diduga disebabkan karena peran yang sangat esensial dari gen ini terhadap fungsi sel.Gen 16S rRNA adalah gen yang digunakan dalam menentukan filogenetik dan taksonomi dari bakteri secara molekuler. Penggunaan 16S rRNA sekuensing gen di laboratorium klinis menjadi umum untuk mengidentifikasi bakteri biokimia tak dikenal atau menyediakan referensi identifikasi untuk strain yang tidak biasa. (Janda & Abbott, 2007).

Penggunaan gen 16S rRNA dengan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) memungkinkan untuk mengidentifikasi bakteri amilolitik dengan cepat dan spesifik. PCR merupakan suatu metode enzimatik untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuens nukleotida tertentu dengan cara in vitro (Yuwono, 2006).

Gen 16S rRNA juga sering disebut sebagai 16S rDNA (16S *ribosomal deoxyribose nucleic acid*), namun menurut konsensus dari *American Society for Microbiology* (ASM), istilah 16S rRNA dinilai lebih tepat (Rinanda, 2011).

Gen pengkode RNA ribosomal (rRNA) adalah gen yang paling lestari (*conserved*). Porsi sekuens rDNA dari tiap organisme yang secara genetik berkorelasi umumnya adalah sama. Dengan demikian setiap organisme yang memiliki jarak kekerabatan tertentu dapat disejajarkan sehingga lebih mudah untuk menentukan perbedaan dalam sekuens yang menjadi ciri khas organisme tersebut. Daerah yang lestari ini juga yang menyebabkan gen ini dapat digunakan sebagai primer universal yang digunakan dalam Polymerase Chain Reaction (PCR) serta dapat ditentukan urutan nukleotidanya melalui sekuensing^{3,4}. Gen pengkode rRNA digunakan untuk menentukan taksonomi, filogeni (hubungan evolusi) serta memperkirakan jarak keragaman antar spesies (*rates of species divergence*) bakteri. Perbandingan sekuens rDNA dapat menunjukkan hubungan evolusi antar organisme. (Rinanda, 2011).

Metode sekuensing telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan teknologi saat ini telah memungkinkan dilakukannya analisis terhadap jutaan sekuens DNA per tahun. Kualitas analisis sekuensing sangat tergantung pada faktor kecepatan prosedur kerja dan teknologi yang digunakan. Identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dilakukan dengan menumbuhkan bakteri dari berbagai spesimen klinis pada media tertentu (Clarridge et.al, 2004).

E. Tinjauan Umum Rizosfer

Rizosfer merupakan daerah yang ideal bagi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme tanah. Keadaan ini didukung oleh fungsinya, yaitu sebagai penyedia nutrisi dan juga sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme. Beberapa macam nutrisi disekresikan di dalam rizosfer, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan di dalam tanah. Beberapa bakteri penyedia hara yang terdapat pada rizosfer akar disebut sebagai rizobakteri pemacu tanaman (Bashan & Holguin, 1998)

Rizosfer merupakan daerah aktivitas biologis dan kimia tanah, dipengaruhi oleh senyawa yang dikeluarkan oleh akar secara intensif dan merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah (Zare, et. al., 2011).

Rizosfer merupakan zona dalam tanah tempat mikrobiota akar tanaman hidup berinteraksi secara efektif. (Repository IPB, 2010). Mikroorganisme dalam tanah khususnya pada sekitar perakaran atau yang dikenal sebagai rizosfer, merupakan mikroorganisme yang paling besar perannya bagi pertumbuhan tanaman. Mikroorganisme baik jamur ataupun bakteri yang berada pada zona perakaran (rizosfer) berperan dalam menguraikan bahan organik, membantu pertumbuhan tanaman dan beberapa jenis mikroorganisme lainnya diketahui dapat menekan perkembangan patogen tanaman (Murali *et al.*, 2012).

Menurut Hasanudin (2003), secara keseluruhan habitat hidup mikroorganisme yang banyak berperan di dalam pengendalian hayati adalah di dalam tanah, disekitar akar tumbuhan (rizosfer) atau di atas daun, batang, bunga, dan

buah(filosfer). Mikroba tanah akan berkumpul di dekat perakaran tanaman (rizosfer) yang menghasilkan eksudat akar dan serpihan tudung akar sebagai sumber makanan mikroba tanah. Bila populasi mikroba di sekitar rizosfer didominasi oleh mikroba yang menguntungkan tanaman, maka tanaman akan memperoleh manfaat yang besar dengan hadirnya mikroba tersebut (Lugtenberg & Kravchenko, 1999). Rhizobakteria merupakan bakteri yang hidup di daerah perakaran (rizosfer) tanaman yang memiliki kemampuan mengikat nitrogen bebas di udara dan mereduksinya menjadi senyawa amonia (Dwijoseputro, 1998).

Mikroorganisme rizosfer pada umumnya menguntungkan karena dapat dimanfaatkan sebagai agensia pengendali hayati yang bersifat antagonis. Mikroorganisme tersebut antara lain *Rhizobium* sp., *Azospirillum* sp., mikroba pelarut fosfat, *Cytophaga* sp., dan *Trichoderma* sp. (Gunarto, 2000).


F. Tinjauan Umum Padi (*Oryza sativa*)

Padi merupakan salah satu sumber makanan pokok di Indonesia. Kebutuhan akan beras semakin lama semakin meningkat namun kondisi pertanian di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Kendala-kendala yang dihadapi petani di Indonesia sangat banyak, salah satunya adalah penggunaan pupuk kimia yang semakin bertambah menyebabkan kondisi lahan pertanian semakin kritis. Sebagai salah satu upaya peningkatan produktivitas tanaman padi adalah dengan melakukan intensifikasi di bidang pertanian. Intensifikasi pertanian dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil panen tanpa harus memperluas lahan pertanian. Penggunaan pupuk bio organik adalah salah satu upaya intensifikasi pertanian sekaligus dapat

memperbaiki kondisi lahan pertanian yang semakin kritis. Selain hasilnya dapat meningkat juga dapat menjadikan lahan subur kembali dengan pengurangan penggunaan pupuk kimia (Puslitbang Tanaman Pangan, 2012). Konsumsi beras pada tahun 2010, 2015, dan 2020 diproyeksikan berturut-turut sebesar 32,13 juta ton, 34,12 juta ton dan 35,97 juta ton. Jumlah penduduk pada ketiga periode itu diperkirakan berturut-turut 235 juta, 249 juta dan 263 juta jiwa (Desi dkk, 2013).

Menurut Grist (1960), tanaman padi diklasifikasikan ke dalam division Spermatophytae dengan subdivisio Angiospermae, digolongkan ke dalam kelas Monocotyledonae, ordo Poales dengan famili Graminae dengan genus *Oryza Linn* dan nama spesies *Oryza sativa L.* Pertumbuhan akar pada padi dimulai dari proses perkecambahan benih. Akar yang pertama muncul yaitu akar tunggang kemudian setelah 5-6 hari akan tumbuh akar serabut. Akar ini hanya dapat menembus lapisan tanah bagian atas/ lapisan olah tanah yaitu berkisar antara 10-12 cm. Pada umur 30 hari setelah tanam, akar akan dapat menembus hingga kedalaman 18 cm dan pada umur 50 hari akar sudah mulai dapat menembus lapisan tanah di bawahnya (*sub soil*) yaitu berkisar 25 cm (AaK, 1990).

Peningkatan hormon IAA dan tingkat serapan hara dapat memacu khususnya pertumbuhan vegetatif tanaman. Pada tanaman jagung perlakuan pupuk hayati berperan dalam peningkatan tinggi, bobot kering tajuk, menekan persentase senesen/gugur daun, dan mampu memacu produksi biji (Wibowo, dkk., 2009).



Keterangan:

1. Akar
2. Buah
3. Biji
4. Batang
5. Daun

Gambar 2.2 Padi (*Oryza sativa* L.) Sumber: (Slideshare.com)

Tanaman padi dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) tumbuhan padi diklasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledoneae

Ordo : Poales

Family : Poaceae/Graminae

Genus : *Oryza*

Spesies : *Oryza sativa* L. (Tjitrosoepomo, 2013).

a. Sistem PerakaranPadi

Fungsi akar padi antara lain untuk menyerap zat makanan dan air, dan menopang tegaknya batang. Akar padi ada dua macam, yakni akar primer dan

seminal. Akar primer adalah akar yang tumbuh dari kecambah biji padi, sedangkan akar seminal adalah akar yang tumbuh dekat ruas batang.

b. Batang

Padi (*Oryza sativa* L.) termasuk golongan tumbuhan *Graminae* dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas ini merupakan bungkong yang ditutup oleh buku dan panjang ruasnya tidak sama. Ruas terpendek terletak pada pangkal batang, ruas yang kedua dan seterusnya lebih panjang dari ruas-ruas yang paling bawah. Ruas-ruas dan diantara ruas yang satu dengan ruas yang lainnya dipisahkan oleh satu buku. Ruas batang padi didalamnya berongga dan bentuknya bulat, dari atas ke bawah ruas buku itu semakin pendek. Ruas yang terpendek terdapat di bagian bawah dari batang dan ruas-ruas ini praktis tidak dapat dibedakan sebagai ruas-ruas yang berdiri sendiri. Batang padi berfungsi untuk menopang tanaman secara keseluruhan dan mendistribusikan zat makanan ke seluruh bagian tanaman. Berbeda dengan batang tanaman lain, batang padi memiliki rongga dan ruas. Di awal pertumbuhannya bentuk ruasnya pendek dan bertumpuk. Ruas ini kemudian tumbuh lebih panjang dan berongga (De Datta and Yoshida 1981).

c. Daun

Pada buku bagian bawah dari ruas, tumbuh daun pelepah yang membalut ruas sampai buku bagian atas. Tepat pada buku bagian atas ujung daun pelepah memperlihatkan percabangan dimana cabang yang terpendek menjadi ligule (lidah) daun, dan bagian yang terpanjang dan terbesar menjadi helaian daun. Daun pelepah itu menjadi ligule dan pada helaian daun terdapat dua embel sebelah kiri dan kanan

yang disebut auricular. Auricular dan ligule yang kadang-kadang berwarna hijau dan ungu dapat digunakan sebagai alat untuk mendeterminasi dan identifikasi suatu varietas. Daun padi tumbuh pada ruas batang dengan susunan berselang seling. Adapun bagian pada daun padi terdiri atas pelepah daun, helai daun, telinga daun, dan lidah daun (Siregar, 1987).

d. Malai

Malai adalah butir gabah. Letaknya mulai dari ruas batang paling ujung sampai sampai ruas batang terakhir. Biasanya terdiri atas 8-10 ruas batang. Daun pelepah yang membalut ruas yang paling atas batang umumnya disebut sebagai daun bendera. Tepat dimana daun pelepah teratas menjadi ligule dan daun bendera, disitulah timbul ruas yang menjadi bulir padi (De Datta, 1981).

e. Bunga

Bunga padi tergolong jenis bunga berkelamin ganda, setiap bunga mempunyai enam benang sari yang bertangkai pendek dengan dua tangkai putik dan dua kepala putik. Bunga padi adalah bunga telanjang artinya mempunyai perhiasan bunga. Berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang diatas. Jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta mempunyai dua kandung serbuk. Putik mempunyai dua tangkai putik dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu. Pada dasar bunga terdapat lodicula (daun bunga yang telah berubah bentuknya) (Hanum, 2008).

f. Buah


Ladiclea berfungsi mengatur dalam pembuahan palea, pada waktu berbunga ia menghisap air dari bakal buah, sehingga mengembang. Pengembangan ini mendorong lemma dan palea terpisah dan terbuka (Grist 1975). Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau bulir/gabah, sebenarnya bukan biji melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. Lemma dan palea serta bagian lain akan membentuk sekam atau kulit gabah, lemma selalu lebih besar dari palea dan menutupi hampir 2/3 permukaan beras, sedangkan sisipalea tepat bertemu pada bagian sisi lemma. Gabah terdiri atas biji yang terbungkus sekam. Sekam terdiri atas gluma rudimenter dan sebagian dari tangkai gabah (*pedicel*) (Badan Litbang, 2009). Awal penyerbukan dimulai saat serbuk sari menempel pada kepala putik. Hasilnya berupa buah padi yang terdiri atas bagian luar yang disebut sekam dan bagian dalam disebut kariopsis atau yang dikenal dengan nama beras (Simanjuntak, 2005).

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia (Swastika et al., 2007). Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1.49% per tahun menyebabkan kebutuhan beras meningkat. Perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian akan mengurangi produksi beras sehingga kebutuhan beras meningkat. Upaya peningkatan produktivitas padi sawah terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras dalam rangka menunjang target pemerintah agar Indonesia mencapai surplus beras 10 juta ton tahun 2014 (Setyawati, 2012).

Tanaman padi memiliki beragam varietas salah satunya varietas membramo yang tergolong benih varietas unggul.

G. Tinjauan Umum Jeneponto

Kabupaten Jeneponto memiliki luas tercatat 749,79 km² yang meliputi 11 kecamatan. Kabupaten Jeneponto terletak antara 5° 16'13" - 5° 39'35" Lintang Selatan dan 12° 40'19" - 12° 7'31" Bujur Timur. Secara geografis, berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan (BPS Kabupaten Jeneponto, 2018).



Gambar 2.3. Peta Kabupaten Jeneponto (Modifikasi Azman, 2018).

Berdasarkan jenis penggunaan tanah (Land Use) maka penggunaan tanah terluas adalah tegalan/kebun yaitu tercatat 34.154,14 ha (45,56%), persawahan 20.014,08 ha (26,69%), hutan negara tercatat 9.842,65 ha (13,12 %) (BPS Kabupaten Jeneponto, 2018). Beberapa komoditas yang dominan dan mempunyai peluang untuk


dikembangkan melalui;inovasi teknologi, kelembagaan dan pemanfaatan sumberdaya lahanantara lain; padi, jagung, ubi kayu,kacang kedelai, dan buah-buahan (BPS Kabupaten Jeneponto, 2018).

H. Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat bakteri penghasil hormon IAA padarizosfer tanaman padi (*Oryza sativa*L.).



I. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Samata-Gowa dan Laboratorium Molekuler Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif. Dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang mengisolasi bakteri pada rizosfer tanaman padi (*Oryza sativa* L.) untuk mengetahui jenis bakteri penghasil hormon IAA yang terdapat pada *rhizosfer* tanaman padi.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas yaitu bakteri asal perakaran tanaman padi (*Oryza sativa* L.). Sedangkan Variabel terikat yaitu uji produksi hormon IAA oleh bakteri.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel, antara lain:

1. Skrining bakteri merupakan penapisan bakteri untuk mendeteksi adanya kemampuan bakteri menghasilkan senyawa kimia tertentu.

2. Identifikasi merupakan pengamatan karakteristik bakteri, bentuk, isi sel, organel sel serta susunan selnya.
3. Hormon IAA (*Indole Acetic Acid*) merupakan salah satu hormon tumbuh yang berperan untuk memacu pertumbuhan sepanjang sumbu longitudinal. IAA merupakan auksin yang berperan dalam pembelahan dan pembentangan sel. Indikator bakteri dapat menghasilkan hormon IAA dapat dilihat dengan adanya perubahan media dari bening menjadi merah muda.
4. Bakteri penghasil IAA merupakan bakteri yang berasal dari bagian tanaman padi salah satunya rizosfer.

E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Adapun instrumen penelitian (alat dan bahan) yang digunakan sebagai berikut:

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah LAF (*Laminar Air Flow*), autoklaf, oven, cawan petri, jarum ose, bunsen, pengaduk kaca, pipet tetes, inkubator, tabung mikrosentrifuge 1 ml, *spin column*, *collection tube*, aluminium foil (alfol), mikroskop, gelas ukur, tabung reaksi, inkubator shaker, spektrofotometer UV-Vis Genesys, sentrifuge dingin dan tabung sentrifuge, kaca preparat, neraca analitik, mikropipet dan tip, *hotplate* dan *magnetik stirrer*, lemari es, sendok, botol vial, *glass beads*, labu erlenmeyer, gelas kimia, gelas objek, korek api, kapas, *water bath*, vortex,

pH indikator, tabung PCR, mesin PCR, spatula, spidol marker, satu set alat elektroforesis, komputer, Parafilm (Sigma, Cat. No. 7543).

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah bakteririzosfertanaman padi (*Oryza sativa* dari hasil penelitian sebelumnya media *Nutrient Agar*(NA), media *Nutrient Broth* (NB) 4 mL reagen Salkowski (150 mL H₂SO₄ pekat; 7,5 mL FeCl₃.6H₂O 0,5 M dan 250 mL akuades steril) yang berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya kolesterol pada bakteri penghasil hormon IAA, hasil positif ditandai dengan timbulnya warna merah atau merah muda, 50 mL kultur bakteri, 2 mL supernatan, aquadest, medium pewarnaan gram (alkohol 96%, kristal violet, Iodium, Safranin), 200 µl PBS (*Phospat Buffer Saline*), 20 µl Proteinase K, ethanol absolut (96%), 400 µl buffer W1, 600 µl buffer GSB (Geneid), wash buffer (Geneid), 100 µl Elution buffer, agarose (BioRad), 100 µl Tris borate EDTA (100 g Tris base, 27,5 g asam borat, 20 ml 0.5 M EDTA pH 8.0 2gr agarose (BioRad), 1 liter air, 1 µl ethidium bromida (0.2 µg/ml), larutan TBE 0.5%.

F. Prosedur Kerja

1. Sterilisasi Alat

Peralatan yang akan digunakan dicuci dengan deterjen hingga bersih lalu dibilas menggunakan air suling. Sterilisasi panas kering (menggunakan oven) dengan menyiapkan semua alat yang terbuat dari kaca yang akan disterilkan, membungkusnya dengan menggunakan kertas, kemudian memasukkan ke dalam oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Mensterilkan peralatan yang terbuat dari logam dengan cara pemijaran menggunakan lampu spiritus. Mensterilkan peralatan yang

terbuat dari plastik dengan autoklaf (sterilisasi uap) dengan mengisi air ke dalam autoklaf hingga dasar yang berlubang, lalu memasukkan alat yang akan disterilkan, menutup sekrup autoklaf dengan rapat. Meletakkan autoklaf di atas tungku kompor gas kemudian menyalakannya hingga suhu mencapai 121°C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Mematikan kompor gas. Setelah sterilisasi selesai, menunggu autoklaf hingga dingin sebelum membukanya.

2. Pemurnian isolat bakteri terpilih

Sebanyak 8 koloni isolat bakteri terpilih dari penelitian sebelumnya diremajakan diambil dari media NA pada cawan kemudian digoreskan satu ose pada media NA miring dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C.

3. Skrining bakteri penghasil hormon IAA

Isolat bakteri dari rizofertanaman padi yang terpilih dikultur ke dalam medium NB (*Nutrient Broth*) kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam (A'ini, 2013). Kultur kemudian disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 4500 rpm suhu 4°C. 2mL supernatan yang diperoleh dicampur dengan reagen Salkowski dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang. Deteksi IAA dilihat dengan perubahan warna bening menjadi merah muda konsentrasi IAA diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nm dan dibuatkan kurva standar IAA. Berdasarkan metode Patten dan Glick (2002). Waktu inkubasi 48 jam dipilih karena IAA yang dihasilkan oleh isolat paling tinggi pada tahap tersebut yakni tahap akhir logaritmik dan kandungan enzim-enzim yang digunakan dalam biokonversi triptofan menjadi IAA seperti triptofan monooksigenase, IAM hidrolase,

indol-piruvat dekarboksilase dan IAA dehidrogenase yang dihasilkan cukup banyak dan aktif sejalan dengan laju pertumbuhan. Selanjutnya dibandingkan dengan kurva standar IAA (Khairani, 2009).

4. Identifikasi morfologi secara makroskopik

Menginokulasikan koloni bakteri dengan teknik menggoreskan garis tunggal di atas permukaan medium NA miring dan metode kuadran pada NA dalam cawan petri, kemudian menginkubasi pada suhu 28°C selama 24-48 jam. Pengamatan makroskopik pada medium NA miring yaitu pigmentasi dan bentuk pertumbuhan gores tunggal. Pengamatan makroskopik pada medium NA dalam cawan yaitu pigmentasi, bentuk koloni, tepi koloni dan elevasi. Menggunakan media *Nutrient Agar* (NA), karena media ini pada umumnya sering di gunakan untuk membiakkan mikroorganisme yang tidak selektif atau heterotrof (Sukmawaty dan Sari, 2013).

5. Identifikasi morfologi Secara mikroskopik

Pada tahap ini menggunakan metode pewarnaan gram dengan membersihkan gelas objek dengan alkohol 96% kemudian difiksasi di atas lampu spiritus, selanjutnya mengambil isolat aktif secara aseptik dan diletakkan di atas gelas objek lalu diratakan. Kemudian memfiksasi kembali di atas lampu spiritus. Setelah dingin meneteskan cat Gram A (Kristal violet) 2-3 tetes selama 1 menit, kemudian mencuci dengan Gram B (Lugol/Iodium) selama 1 menit, mencuci dengan air mengalir dan mengeringkan di udara atau diangin-anginkan. Kemudian ditetesi dengan Gram C (Alkohol 96%) selama 30 detik, lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Tahap terakhir meneteskan Gram D (Safranin) selama 45 detik,

lalu mencucinya dengan air mengalir dan menghilangkan kelebihan air dengan kertas serap. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat bentuk dan warna sel di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000x. (Sukmawaty dan Sari, 2013).

6. Identifikasi Molekuler Isolat Bakteri penghasil hormon IAA

Identifikasi bakteri penghasil hormon IAA dideterminasi dengan menggunakan sekuens 16S-rRNA. Analisis cluster pada sekuens tersebut dilakukan dengan program *BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)* dari *NCBI (National Center for Biotechnology Information)* dan pohon filogenetik dikonstruksi dengan program *Treecon* (Peer and wacher, 1993) dalam Natsir(2010). Gen 16S-rRNA dianalisis secara lengkap di 1st Base Malaysia. Adapun langkah-langkah analisis gen 16S-rRNA dilakukan sebagai berikut :

a. Ekstraksi DNA

Ekstraksi DNA pada dasarnya merupakan serangkaian proses pemisahan DNA dari komponen-komponen sel lainnya. Pada ekstraksi DNA ini metode yang digunakan adalah metode ekstraksi DNA Kit (*Geneaid DNA Purification Kit*). Ekstraksi DNA pada organisme eukariot dilakukan melalui proses preparasi sampel (*sample preparation*), melisis sel (*cell lysis*), DNA binding, pencucian (*wash*) dan elution.

Langkah-langkah ekstraksi DNA adalah sebagai berikut:

1. Preparasi Sampel

Sampel bakteri penghasil IAA dimasukkan ke dalam tabung mikrocentrifuge 1,5 ml steril yang telah berisi 200µl PBS (*PhospatBuffer Saline*) Homogenkandengan cara pipetting, lalu centrifuge sampel kemudian mengambil pelet.

2. *Cell lysis* (Melisiskan sel)

Masukkan Carrier RNA ke tabung mikrocentrifuge sebanyak 0.6 µl. Tambahkan 200 µl Buffer S2 ke dalam tabung mikrocentrifuge sebanyak 500 µl, lalu vortex. Tambahkan proteinase K sebanyak 200 µl lalu vortex. Inkubasi selama 10 menit. Tambahkan 200 µl GSB buffer lalu vortex, inkubasi selama 10 menit.

3. DNA Binding

Tambahkan ethanol 200 µl lalu vortex selama 10 detik. Memindahkan semua campuran tersebut ke dalam GD Column (*spin column*), sentrifugasi pada 13.000 Rpm selama 1 menit. Buang collection tube yang berada di bawah spin column dan mengganti dengan collection tube yang baru.

4. Wash (Pencucian)

Tambahkan 400µl buffer W1 lalu sentrifuge selama 1 menit dengan kecepatan yang sama kemudian buang cairan yang ada pada collection tube. Tambahkan 600µl wash buffer (Geneid) sentifugeselama 1 menit, lalu buang cairan pada collection tube dan sentrifuge kembali selama 3 menit. Buang collection tube dan letakkan mikrocentrifuge steril pada bagian bawah *spin column*.

5. Elution

Selanjutnya tambahkan 100 μl Elution buffer diamkan selama 3 menit kemudian sentrifuge dengan kecepatan yang sama selama 1 menit. Cairan yang mengandung DNA yang tertampung pada tabung mikrocentrifuge disimpan pada suhu -4°C untuk digunakan sebagai template PCR.

b. Amplifikasi PCR (*Polimerase Chain Reaction*)

Menurut (Hiroaki, 2009). *Polymerase Chain Reaction* (PCR) merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk melipat gandakan sekuens nukleotida tertentu secara *in vitro* (di dalam tabung). Prosesnya meliputi 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing dan extention. Prosedur ini dikerjakan pada sampel DNA yang telah diisolasi, ekstrak DNA dari sampel dan aquadest sebagai kontrol negatif. "PCR mix" dimasukkan ke dalam tabung PCR. Komposisi primer mix sebagai berikut:

Reaksi	(μl)
Enzym KAPA ready mix	25
MgCl	2
Fordward primer	1
Reverse primer	1
DNA template	5
Nuclease free water	16
Total premix	50

Tabel 3.1. Komposisi Primer Mix

Amplifikasi dilakukan dengan menggunakan mesin PCR (DNA thermalCycler). Untuk amplifikasi PCR, tahap awal denaturasi pada suhu 95°C selama 15menit, selanjutnya 94°C selama 1 menit, annealing pada suhu 55°C selama 30 detik, ekstensi 72°C selama 1 menit sebanyak 40 siklus dilanjutkan dengan

ekstensi akhir suhu 72 °C selama 5 menit dan 12 °C ± 30 menit untuk penyimpanan. Jenis primer yang digunakan adalah primer universal dengan urutan squens U1 5'CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3' dan U2 5'ATCGG(C/T)TACCTTGTTACGACTTC-3' (Jang-Jih Lu, 2003).

c. Pembuatan gel agarose 2%

Agarosa dibuat dengan melarutkan 2 g agarose (BioRad) dalam 100 ml 10x Tris borate EDTA (100 g Tris base, 27.5 g asam borat, 20 ml 0.5 M EDTA pH 8.0 dalam 1 liter air). Kemudian dipanaskan sampai mendidih dan larut. Selanjutnya ditambahkan 1 µl ethidium bromida (0.2 µg/ml) dan dimasukkan dalam pencetak gel yang telah dipasang sisir. Tunggu gel agarosa memadat (sekitar 30 menit).

d. Elektroforesis

Gel agarose selanjutnya dimasukkan ke dalam tank elektroforesis yang berisi larutan TBE 0.5%. Lalu masukkan DNA sampel yang telah dicampur dengan cairan "*loading dye*" ke dalam sumur sebagai pemberat dengan perbandingan 2:1, kemudian dimasukkan marker 100bp setelah keseluruhan sampel dimasukkan. Elektroda dihubungkan dengan power supply kemudian dinyalakan selama 1 jam (60 menit) tegangan 100 volt. Setelah itu, alat elektroforesis dimatikan kemudian gel dari alat tersebut diambil. Lalu gel dipindahkan kedalam UV transiluminator kemudian diamati hasilnya pada komputer.

e. Analisis Data Sekuensing

Sekuensing (DNA Sequencing) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan urutan nukleotida aduanin(A), sitosin(C), guanin(G), timin(T)

pada molekul DNA. Analisis data sekuensing dilakukan dengan menggunakan program software DNA star. Untuk analisa sequence alignment, dilakukan dengan membandingkan sekuens yang diperoleh (*query*) dengan yang telah ada pada Gene Bank dengan database searches NCBI internet site (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) menggunakan BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*). Ukuran fragmen hasil amplifikasi PCR ditentukan dengan cara dibandingkan antara posisi ukuran penanda DNA (Marker) dengan ukuran fragmen sampel. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya band pada ukuran 996 bp (Basri, 2016).



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Skrining bakteri penghasil hormon IAA sampel rizosfer tanaman padi (*Oryza sativa* L.)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, isolat bakteri yang digunakan pada penelitian ini adalah isolat hasil penelitian sebelumnya yang telah mendapatkan 8 isolat bakteri penambat nitrogendi rizosfer padi. Kedelapan isolat tersebut selanjutnya diuji kemampuannya dalam menghasilkan hormon IAA. Adapun morfologi kedelapan isolat tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pengamatan makroskopik isolat terpilih penghasil hormon IAA

Kode Isolat	Ukuran	Karakteristik Optik	Bentuk	Elevasi	Permukaan (Kerak optik)	Margin
K1	Kecil	Opaque	Spindle	Raised	Halus mengkilap	Entire
K4	Sedang	Opaque	Spindle	Raised	Halus mengkilap	Entire
K7	Besar	Translucent	Spindle	Flat	Halus mengkilap	Undulate
K9	Besar	Translucent	Rhizoid	Flat	Halus mengkilap	Rhizoid
K10	Sedang	Opaque	Filamentous	Flat	Halus mengkilap	Filamentous
K12	Besar	Transparant	Spindle	Flat	Halus mengkilap	Undulate
K14	Titik	Opaque	Spindle	Raised	Halus	Entire

K16	Sedang	Opaque	Irreguler	Raised	mengkilap Halus mengkilap	Undulate
------------	--------	--------	-----------	--------	---------------------------------	----------

Keterangan:

Opaque : Tidak dapat ditembus cahaya

Transparant : Dapat ditembus cahaya sebagian

Spindle : Kumparan

Undulate : Berombak-ombak

Circular : Bundar

Entire : Seluruh

Raised : Dibesarkan

Setelah dilakukan pengamatan makroskopik maka dilakukan pengamatan mikroskopik dengan metode pewarnaan gram dan disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pengamatan mikroskopik isolat terpilih penghasil hormon IAA

Kode Isolat	Ciri sel		
	Warna	Bentuk	Gram
K1	Merah muda	Basil	Negatif
K4	Merah muda	Basil	Negatif
K7	Merah muda	Basil	Negatif
K9	Ungu	Basil	Positif
K10	Merah muda	Basil	Negatif
K12	Merah muda	Basil	Negatif

K14	Merah muda	Basil	Negatif
K16	Merah muda	Basil	Negatif

Untuk mengetahui kemampuan bakteririzosfer tanaman padidalam menghasilkan hormon IAA maka dilakukan uji menggunakan media *Nutrient Broth* (NB) dan reagen salkowski. Hasil bakteri penghasil IAA diidentifikasi dengan melihat perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Kemudian untuk mengetahui konsentrasi IAA yang dihasilkan dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer dan dibandingkan dengan kurva standar IAA. Konsentrasi IAA yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pengukuran produksi hormon IAA isolat terpilih penghasil hormon IAA

Kode Isolat	Produksi IAA (ppm)
K1	0.136
K4	0.203
K7	0.295
K9	0.304
K10	0.201
K12	0.200
K14	0.184
K16	0.178

- Identifikasi molekuler isolat bakteri terpilih penghasil hormon IAA tertinggi.

Isolat bakteri yang dipilih untuk dilakukan identifikasi molekuler yaitu isolat yang menghasilkan IAA tertinggi. Isolat tersebut adalah K7 dan K9 dengan konsentrasi IAA berturut-turut yaitu 0,295 ppm dan 0,304 ppm.

Setelah dilakukan uji molekuler, berdasarkan hasil elektroforesis diketahui panjang fragmen DNA menggunakan marker 1kb isolat K7 dan K9 terletak pada 996 bp.

1. Sampel kode isolat K7 dengan panjang kueri 977:

CGGANNCTGGGCGTAAGCGTGCGTAGGTGGTCGTTTAAAGTCCGTTGTGAA
 AGCCCTGGGCTCAACCTGGGAAGTGCAGTGGATACTGGGCGACTAGAATG
 TGGTAGAGGGTAGCGGAATTCCTGGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATC
 AGGAGGAACATCCATGGCGAAGGCAGCTACCTGGACCAACATTGACACTG
 AGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCA
 CGCCCTAAACGATGCGAACTGGATGTTGGGTGCAATTTGGCACGCAGTATC
 GAAGCTAACGCGTTAAGTTCGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGA
 AACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGTATGTGGTTT
 AATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCCTTGACATGTCGAGAACT
 TTCCAGAGATGGATGGGTGCCTTCGGGAAGTTCGAACACAGGTGCTGCATG
 GCTGTCGTCAGCTCGTGTGCGTGTGAGATGTTGGGTAAAGTCCCGCAACGAGC
 GCAACCCTTGTCCCTTAGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGAAGTCTAAGGAG
 ACCGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCAT
 GGCCCTTACGGCCAGGGCTACACACGTAACAATGGTAGGGACAGAGGG
 CTGCAAGCCGGCGACGGTAAGCCAATCCCAGAAACCCTATCTCAGTCCGG
 ATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAG
 ATCAGCATTGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGT
 CACACCATGGGAGTTTGTGACCAGAAGCAGGTAGCTTAACCTTCGGGA
 GGGCGCTTGCCACGGTGTGGCCGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAGGGT
 ACAAAAAG

2. Sampel kode isolat K9 dengan panjang kueri 967

TGCGGATTATTGGGCGTAAGGGCTCGCACGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTG
 AAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAAACTTGA
 GTGCAGAGTAGGAGATAGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAG
 ATGTGGAGGAACACAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAAGTACG
 CTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGT
 CCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCTTAGT
 GCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGAC
 TGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTG
 GTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTG
 ACAACCCTAGAGATAGGGCTTCCCTTCGGGGACAGAGTGACAGGTGGTG
 CATGGTTGTGTCGTCAGCTCGTGTGCGTGTGAGATGTTGGGTAAAGTCCCGCAACG
 AGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTG
 ACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG

CCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAGAACAAAGGGC
 TGCAAGACCGCAAGGTTTAGCCAATCCCATAAATCTGTTCTCAGTTCGGAT
 CGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGA
 TCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGGCCTTGTACACACCGCCCGT
 CACACCACGAGAGTTTGC AACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTATGG
 AGCCGCCGCCAAAGGNGGGGCAGATGATTGAGGTGAAGTCGTAACAAG
 GTACCCGGAAAATAAA

Berdasarkan hasil sekuen gen DNA K7 dan K9 tersebut selanjutnya dianalisis pada program *Basic Local Alignment Search Tool* (BLAST) di NCBI. Hasil sampel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil analisis BLAST isolat K7 dan K9

Kode isolat	Spesies	Max score	Total score	Query Cover	Ident (Kemiripan)
K7	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> strain FDAARGOS 325	1731	6925	96%	99%
K9	<i>Bacillus safensis</i> strain U-17 1	1690	15176	97%	99%

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Anugrah (2018) menyatakan bakteri penghasil Nitrogen bebas memiliki ciri-ciri basil gram negatif termasuk jenis bakteriseperti penambat nitrogen non simbiotik yang juga mampu menghasilkan hormon IAA. Berdasarkan identifikasi mikroskopik dengan metode pewarnaan gram maka isolat K1, K4, K7, K10, K12, K14 dan K16 teridentifikasi bakteri gram negatif, sedangkan isolat K9 teridentifikasi bakteri gram positif.

Penelitian ini mengisolasi bakteri pada media NA dari hasil pengenceran 10^{-1} sampai 10^{-7} dan diinkubasi pada inkubator suhu 37°C selama 24 jam. Isolat-isolat yang tumbuh kemudian dilakukan uji makroskopik di mana ciri sel yang didapatkan

berukuran kecil, sedang dan besar. Memiliki bentuk *Spindle*, *Raised* dan *Flat*, tepian *Entire*, *Undulate*, *Rhizoid Filamentous*.

Selanjutnya bakteri dipindahkan pada media NA miring, yang kemudian diinkubasi pada inkubator menggunakan suhu 37°C selama 24 jam untuk dijadikan stok isolat murni pada uji deteksi IAA.

Isolat bakteri yang didapatkan yaitu K1, K4, K7, K9, K10, K12, K14 dan K16 selanjutnya dikultur dalam media NB, kemudian diuji menggunakan spektrofotometer untuk melihat kadar IAA pada semua isolat. Produksi IAA pada masing-masing isolat K1, K4, K7, K9, K10, K12, K14 dan K16. Terlihat bahwa produksi IAA pada isolat K1, K4, K10, K12 dan K16 menghasilkan hanya sedikit IAA terlihat pada warnanya yang berwarna merah muda pudar. Isolat-isolat tersebut kemudian dilakukan pewarnaan gram dan didapatkan karakteristik optik basil, warna ungu dan merah muda, hampir seluruhnya gram negatif.

Pemilihan terhadap 2 isolat bakteri yang menghasilkan hormon IAA tertinggi asal rizosfer tanaman padi yaitu sampel K7 (0.295 ppm) dan K9 (0.304 ppm). Hal tersebut karena adanya perubahan warna pada media dari bening menjadi merah muda berdasarkan metode Pattern dan Glick (2002). Menurut Widyawati, (2008). Produksi IAA setiap bakteri berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan jalur atau mekanisme dalam menghasilkan IAA. Menurut Kawaguchi dan Syono (1996) biosintesis IAA oleh prokariotik bisa terjadi melalui dua jalur yaitu *Indole-3-Acetamide Pathway* (IAM) dan *Indole-3-Pyruvate Pathway* (IPyA), teori tersebut juga menurut Speapen dan Vanderleyden (2010). Selain itu, kedua isolat bakteri

dipilih berdasarkan tingkat produksi IAA tertinggi serta kepekatan warna setelah diinkubasi selama 48 jam.

Produksi IAA diukur dengan metode kolorimetri yang mengindikasikan adanya IAA dari tingkatan kepekatan warna yang terbentuk karena adanya cincin indol (Lindow et al. 1998). Cincin indol terbentuk setelah supernatan isolat K7 dan K9 direaksikan dengan reagen Salkowski yang menandakan bahwa isolat tersebut mampu menghasilkan IAA yang tinggi. Salkowski merupakan reagen pewarna yang dapat digunakan untuk menguji senyawa indol dan turunannya. Reagen Salkowski akan mengoksidasi senyawa indol dan turunannya. Data mengenai kurva tumbuh serta konsentrasi IAA yang diperoleh dalam penelitian dapat digunakan sebagai data awal sebelum isolat digunakan sebagai formulasi pupuk hayati.

Menurut Dommergues dan Magnetok (1970), bakteri pemacu tumbuh dapat bereaksi secara langsung terhadap tanaman dengan menghasilkan fitohormon, vitamin, atau molekul organik yang mudah diserap akar atau secara tidak langsung melalui ameliorasi nutrisi mineral dengan cara pelarutan dan mineralisasi unsur hara tertentu. Bakteri dalam tanah tersebut dapat menempel pada akar kecambah, kemudian memanfaatkan eksudat akar berupa triptofan untuk menghasilkan hormon IAA. Senyawa IAA yang dihasilkan bakteri tersebut dapat digunakan kembali oleh tanaman sebagai pemacu tumbuh. Aplikasi bakteri IAA yang telah ditemukan ini dapat dicampur dengan tanah gambut untuk menanam benih tanaman. Diperolehnya isolat bakteri penghasil IAA memberikan keuntungan bagi industri khususnya bidang pertanian.

Populasi mikroba di daerah rizosfer tanaman padi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan bintil akar (nodulasi) sehingga dapat mempengaruhi produktivitas tanaman yang dibudidayakan (Bagus, dkk., 2017).

Untuk mengetahui lebih lanjut spesies bakteri penghasil IAA tertinggi maka dilakukan uji molekuler terhadap isolat K7 dan K9.

Identifikasi molekuler terhadap 2 isolat yang mampu menghasilkan IAA tertinggi yaitu K7 dan K9 dengan teknik PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dipilih karena prosesnya yang lebih cepat dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, yaitu dengan analisis sekuensing gen 16S rRNA (16S *ribosomal Ribonucleic acid*/Asam ribonukleat pengkode ribosom 16S, S menyatakan *Svedberg*, yaitu satuan ukuran ribosom), namun menurut konsensus dari *American Society for Microbiology* (ASM), istilah 16S rRNA dinilai lebih tepat^{1,2}. pemilihan gen 16S r DNA sebagai target sekuensing gen pengkode rRNA adalah gen yang mampu mempertahankan kelestariannya selama jutaan tahun keanekaragaman evolusi. Dalam proses identifikasi molekuler mikroorganisme, terdapat 3 proses utama yang paling dasar yaitu ekstraksi DNA, amplifikasi PCR, dan elektroforesis serta tahap sekuensing. Sebagian besar prokariot memiliki 3 jenis rRNA, yaitu 5S, 16S dan 23S.

Dari hasil penelitian pada isolat K7 didapatkan hasil dengan spesies *Stenotrophomonas maltophilia* yang memiliki hasil elektroforesis terletak pada 996 bp. dengan panjang kueri 976.

1. Spesies pada isolat K7

Setelah dilakukan analisis BLAST pada web NCBI (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) maka diperoleh bakteri spesies *Stenotrophomonas maltophilia* strain FDAARGOS 325 *complete genom* artinya genom bakteri tersebut komplit yang berarti juga kromosomnya komplit karena genom merupakan kumpulan beberapa kromosom pada organisme seperti bakteri. Bakteri ini memiliki *max score* 1731, *Total score* 6925, *Query cover* 96% dan *Ident* 99%. Menurut Beneduzi, et.al., (2013) konsentrasi IAA yang dihasilkan berbeda-beda walaupun isolat termasuk ke dalam genus yang sama. Selain itu genus bakteri *Stenotrophomonas* walaupun termasuk ke dalam satu genus yang sama akan tetapi kemampuan dalam memproduksi IAA berbeda-beda pada medium kultur cair.

Stenotrophomonas adalah jenis bakteri aerobik *non-fermentatif*, *non-sporulating*, berbentuk basil gram negatif berukuran antara 0,5 – 1,5 μm (Denton dan Kerr 1998) dan motil, bakteri ini banyak ditemukan pada lingkungan perairan, tanah dan tanaman (Fawzya, dkk., 2009). Selain itu, selulosa dari *Stenotrophomonas maltophilia* memiliki kemampuan untuk mendegradasi bahan limbah agro yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini menunjukkan aplikasi potensial dalam biofuel, makanan, industri tekstil dan pengolahan limbah. *Stenotrophomonas maltophilia* merupakan bakteri yang sering ditemukan pada *rhizosphere* atau di tanah sekitar akar tanaman. Bakteri ini dapat ditemukan secara luas di lingkungan alami (Pages, et.al., 2008). Menurut (Yosmaniar, dkk., 2017), bakteri *Stenotrophomonas*

malthophilia juga berperan sebagai kandidat probiotik pengendali senyawa nitrogen yang termasuk dalam kelompok nitrifikasi.

Adapun klasifikasi bakteri *Stenotrophomonas malthophilia* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria
 Filum : Proteobacteria
 Kelas : Gammaprotobacteria
 Ordo : Xanthomonadales
 Famili : Xanthomonaceae
 Genus : *Stenotrophomonas*
 Spesies : *Stenotrophomonas malthophilia* (Palleroni, et.al., 1993).

Dari hasil penelitian didapatkan bakteri isolat K9 dengan spesies *Bacillus safensis* dengan panjang kueri 977 yang memiliki hasil elektroforesis terletak pada 996 bp

2. Spesies pada isolat K9

Setelah dilakukan analisis BLAST pada website NCBI (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) maka diperoleh bakteri spesies *Bacillus safensis* strain U17-1 *complete genom* artinya genom bakteri tersebut lengkap yang berarti juga kromosomnya lengkap karena genom merupakan kumpulan beberapa kromosom pada organisme seperti bakteri. Bakteri ini memiliki *max score* 160, *total score* 15176, *query cover* 97% dan *ident* 99%.

Adapun klasifikasi bakteri *Bacillus safensis* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Procaryotae
Filum : Bacteria
Kelas : Schizomycetes
Ordo : Eubacteriales
Famili : Bacillaceae
Genus : Bacillus
Jenis : *Bacillus safensis* (Tirumalai, et.al., 2018).

Marga *Bacillus* merupakan bakteri yang berbentuk batang dapat dijumpai di tanah dan air termasuk pada air laut. Beberapa jenis penhasil enzim ekstraseluler yang dapat menghidrolisis protein dan polisakarida kompleks. *Bacillus* membentuk endospora, merupakan gram positif, bergerak dengan adanya flagel peritrikus, dapat bersifat aerobik atau fakultatif anaerobik serta bersifat katalase positif (Pelczar, et.al., 1976). Dua sifat utama yang membedakan *Bacillus* dari bakteri pembentuk endospora lainnya adalah kemampuan *Bacillus* untuk hidup aerob (walaupun beberapa bersifat fakultatif anaerob) dan mayoritas jenisnya memproduksi katalase (bersifat katalase positif) (Doi & Mc Gloughlin, 1992). Marga *Bacillus* mampu tumbuh pada temperatur 10-50°C, merupakan saprofit ringan yang tak berbahaya, mudah tumbuh dalam kerapatan tinggi dan mampu membentuk endospora yang tahan panas (Salle, 1984).

Menurut Satomi, et.al., (2006) dan Kohari, et.al., (2013). *Bacillus safensis* merupakan bakteri berbentuk batang dan termasuk bakteri gram positif. *Bacillus*

safensis bersifat motil dan mampu membentuk endospora. *Bacillus safensis* mampu menghidrolisis pati dan termasuk dalam kelompok bakteri katalase positif. *Bacillus safensis* mampu menghasilkan asam pada medium tertentu. Menurut Kothari et al., (2013) *Bacillus safensis* merupakan kelompok bakteri yang berpotensi sebagai PGPR dan kuat menghasilkan fitohormon IAA.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak delapan isolat bakteri daerah perakaran tanaman padi (*Oryza sativa* L.) terpilih yang mampu menghasilkan hormon IAA yaitu isolat K1, K4, K7, K9, K10, 12, 14 dan K16.
2. Jenis bakteri daerah perakaran tanaman padi (*Oryza sativa* L.) yang didapatkan mampu menghasilkan hormon IAA tertinggi terdapat pada dua isolat terpilih yaitu isolat K7 teridentifikasi sebagai spesies *Stenotrophomonas malthophilia* strain FDAARGOS 92 dan isolat K9 teridentifikasi sebagai spesies *Bacillus safensis* strain U17-1.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan aplikasi bakteri sebagai *biofertilizer* dari hasil isolat yang didapatkan.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah sampel dengan menggunakan lokasi daerah yang berbeda agar dapat dijadikan perbandingan penelitian.

Lampiran 1. Bagan sterilisasi alat

Menyiapkan alat berupa labu erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, batang pengaduk, gelas kimia dan tabung reaksi.



Mencuci alat-alat tersebut lalu dikeringkan kemudian semua alat dibungkus menggunakan kertas bekas kemudian dimasukkan ke dalam oven disterilisasi suhu 180°C selama 2 jam. Setelah alat steril maka siap untuk digunakan.

Lampiran 2. Bagan pembuatan media NA miring

Media NA ditimbang dengan neraca analitik sebanyak 5 gr, media lalu dilarutkan dengan *aquadest* ke dalam erlenmeyer 250 mL. Kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf suhu 121°C selama 15 menit. Disiapkan tabung reaksi, rak tabung dan mikropipet



Dimasukkan media NA ke dalam LAF yang telah di UV selama 1 jam. Lalu UV alat dan bahan di dalam LAF selama 15 menit. Kemudian pindahkan ke dalam tabung reaksi secara aseptis sebanyak 10 mL menggunakan mikropipet. Miringkan tabung reaksi dan tunggu sampai media padat.

Lampiran 3. Bagan peremajaan isolat bakteri

Menyiapkan media NA miring yang telah disterilkan, tabung reaksi, mikropipet dan jarum inokulum (ose).






Media NA miring yang telah steril dimasukkan ke dalam LAF yang telah di UV selama 1 jam. Kemudian alat dan bahan di UV selama 15 menit.








Menyiapkan isolat kemudian diambil satu ose dengan metode aseptis lalu goreskan ke media dengan NA miring metode goresan sinambung pada tabung reaksi. Kemudian diinkubasi suhu 37°C selama 24 jam.

Hasil peremajaan isolat bakteri

Kode Isolat	Koloni Bakteri
K1	

K4	 A test tube labeled 'K4' containing a yellowish liquid and a white precipitate.
K7	 A test tube labeled 'K7' containing a yellowish liquid and a white precipitate.
K9	 A test tube labeled 'K9' containing a yellowish liquid and a white precipitate.

K10	 A test tube labeled 'K10' containing a yellow liquid and a white, irregular solid mass. The tube is set against a dark background with a faint watermark of a university logo.
K12	 A test tube labeled 'K12' containing a yellow liquid and a white, irregular solid mass. The tube is set against a dark background with a faint watermark of a university logo.
K14	 A test tube labeled 'K14' containing a yellow liquid and a white, irregular solid mass. The tube is set against a dark background with a faint watermark of a university logo.

K16	
8 isolat terpilih	


Lampiran 4. Bagan pembuatan media NB

Media NB ditimbang dengan neraca analitik kemudian dilarutkan dengan *aquadest* ke dalam erlenmeyer lalu diautoklaf suhu 121°C selama 15 menit.



Media NB steril dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar tidak kontaminasi


Lampiran 5. Bagan pembuatan kultur bakteri pada media NB




Hasil kultur bakteri pada media NB





Lampiran 6. Bagan skrining bakteri yang mampu menghasilkan IAA



Hasil Skrining isolat yang mampu menghasilkan IAA








Lampiran 7. Bagan pembuatan kurva standar IAA

larutan IAA 100 ppm (stok). Sebanyak 0.001 gram IAA dilarutkan dalam 10 mL aquadest. Larutan IAA 100 ppm tersebut yang telah dibuat di erlenmeyer kemudian dijadikan bahan untuk membuat larutan IAA konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100 ppm. Penurunan nilai ppm dengan cara pengenceran melalui penambahan aquadest di dalam wadah berupa tabung reaksi. Kesepuluh tabung reaksi tersebut kemudian divortex.

Selanjutnya penambahan 2 mL reagen salkowski ke dalam tabung reaksi yang telah diisi 0,5 mL larutan IAA berbagai konsentrasi. Langkah selanjutnya campuran tersebut diinkubasi dalam ruang gelap selama 15 menit lalu dihomogenkan dengan vortex. Setelah itu dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer panjang gelombang 520 nm. Hasil dari pengukuran tersebut lalu dibuat tabel dan grafik





Kurva Standar IAA






Konsentrasi IAA	Absorbansi
90 ppm 1/9 mL	0,742
80 ppm 2/8 mL	0,680
70 ppm 3/7 mL	0,532
60 ppm 4/6 mL	0,563
50 ppm 5/5 mL	0,312
40 ppm 6/4 mL	0,267
30 ppm 7/3 mL	0,243
20 ppm 8/2 mL	0,111
10 ppm 9/1 mL	0,047
0 ppm 10 mL	-0,055





Lampiran 8. Hasil karakterisasi secara mikroskopik

Kodeisolat	Warna	Gambar
K1	Merahmuda	

K4	Merahmuda	
K7	Merahmuda	
K9	Ungu	
K10	Merahmuda	

K12	Merahmuda	
K14	Merahmuda	
K16	Merahmuda	

Lampiran 9. Gambar alur indentifikasi molekuler bakteri rizosfer tanaman padi penghasil IAA tertinggi





Keterangan: Marker: 1kb, 8: isolat K7, 9: isolat k9.

Keterangan:

- 1) Menyiapkan isolat bakteri K7 dan K9
- 2) Ekstraksi DNA
- 3) Sampel dimasukkan ke dalam mesin PCR (*Polymerase Chain Reaction*)
- 4) Amplifikasi menggunakan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) (DNA thermal Cycler).
- 5) Pembuatan Gel Agarosa
- 6) Elektroforesis
- 7) Hasil elektroforesis sampel

Lampiran 10. Gambar hasil analisis BLAST secara online pada website resmi**NCBI (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>)**

a. Isolat K7

The image shows the homepage of the NCBI BLAST website. At the top, there is a navigation bar with the NIH logo, "U.S. National Library of Medicine", "NCBI National Center for Biotechnology Information", and a "Sign in to NCBI" link. Below this is the "BLAST" logo and a navigation menu with "Home", "Recent Results", "Saved Strategies", and "Help".

The main content area features a "Basic Local Alignment Search Tool" section. It includes a description: "BLAST finds regions of similarity between biological sequences. The program compares nucleotide or protein sequences to sequence databases and calculates the statistical significance." and a "Learn more" link. To the right of this section is a "NEWS" box with the title "Learn how to use BLAST", a sub-header "See our collection of webinars and tutorials designed to help you.", a date "Wed, 17 Oct 2018 15:00:00 EST", and a "More BLAST news..." link.

Below the "Basic Local Alignment Search Tool" section is the "Web BLAST" section. It contains three main options:

- Nucleotide BLAST**: nucleotide → nucleotide (represented by a DNA double helix icon).
- blastx**: translated nucleotide → protein (represented by a blue arrow icon).
- tblastn**: protein → translated nucleotide (represented by a blue arrow icon).
- Protein BLAST**: protein → protein (represented by a protein ribbon icon).

At the bottom of the page, there is a "BLAST Genomes" section with a search input field.

Keterangan: Tampilan awal website resmi NCBI.

NIH U.S. National Library of Medicine NCBI National Center for Biotechnology Information Sign in to NCBI

BLAST » blastn suite Home Recent Results Saved Strategies Help

Standard Nucleotide BLAST

blastn blastp blastx tblastn tblastx

Enter Query Sequence BLASTN programs search nucleotide databases using a nucleotide query. [more...](#) [Reset page](#) [Bookmark](#)

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [Clear](#) [Query subrange](#)

From

To

Or, upload file No file chosen

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search

Align two or more sequences

Choose Search Set

Database Human genomic + transcript Mouse genomic + transcript Others (nr etc.)

Nucleotide collection (nr/nt)

Organism Exclude

Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown

Exclude Models (XM/XP) Uncultured/environmental sample sequences

Limit to Sequences from type material

Keterangan: Tampilan setelah mengklik Nucleotide BLAST pada sisi kir ihalaman web resmi NCBI.

U.S. National Library of Medicine **NCBI** National Center for Biotechnology Information [Sign in to NCBI](#)

BLAST [®] » [blastn suite](#) [Home](#) [Recent Results](#) [Saved Strategies](#) [Help](#)

Standard Nucleotide BLAST

[blastn](#) [blastp](#) [blastx](#) [tblastn](#) [tblastx](#)

BLASTN programs search nucleotide databases using a nucleotide query. [more...](#) [Reset page](#) [Bookmark](#)

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [Clear](#) [Query subrange](#)

From

To

Or, upload file No file chosen [No file chosen](#)

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search [No file chosen](#)

[Align two or more sequences](#)

Choose Search Set

Database Human genomic + transcript Mouse genomic + transcript Others (nr etc.);
 [Nucleotide collection \(nr/nt\)](#)

Organism [Optional](#)
 [exclude](#) [+](#)
 Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown [Optional](#)

Exclude [Optional](#)
 Models (XM/XP) Uncultured/environmental sample sequences

Limit to [Optional](#)
 Sequences from type material

Entrez Query [Optional](#)
 [YouTube](#) [Create custom database](#)
 Enter an Entrez query to limit search [Optional](#)

Keterangan: Tampilan setelah ditempelkan basa nukleotida yang telah dicopy pada kolom sudut kiri atas.

Program Selection

Optimize for

- Highly similar sequences (megablast)
- More dissimilar sequences (discontiguous megablast)
- Somewhat similar sequences (blastn)

Choose a BLAST algorithm

BLAST Search database Nucleotide collection (nr/nt) using Megablast (Optimize for highly similar sequences)

Show results in a new window

[Algorithm parameters](#)

BLAST is a registered trademark of the National Library of Medicine

[Support center](#) [Mailing list](#)

NCBI
National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Keterangan: Tampilan setelah urutan basa nukleotida ditempelkan lalu diklik **BLAST** pada kolom berwarna biru.

 U.S. National Library of Medicine
NCBI National Center for Biotechnology Information
Sign in to NCBI

BLAST [®] » [blastn suite](#) » RID-YFFY8PXJ014

[Home](#)
[Recent Results](#)
[Saved Strategies](#)
[Help](#)

Format Request Status

[\[Formatting options\]](#)

Job Title: Nucleotide Sequence (976 letters)

Request ID	YFFY8PXJ014
Status	Searching
Submitted at	Sun Nov 11 00:36:08 2018
Current time	Sun Nov 11 00:36:13 2018
Time since submission	00:00:04

This page will be automatically updated in 2 seconds

BLAST is a registered trademark of the National Library of Medicine

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

NCBI

[Support center](#)
[Mailing list](#)


National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA





[Policies and Guidelines](#) | [Contact](#)

Keterangan: Setelah klik BLAST proses sekuensing berlangsung.

NIH U.S. National Library of Medicine NCBI National Center for Biotechnology Information Sign in to NCBI

BLAST® » blastn suite » RID-YFFY8PXJ014 Home Recent Results Saved Strategies Help

BLAST Results

[Edit and Resubmit](#) [Save Search Strategies](#) [Formatting options](#) [Download](#) [YouTube](#) [How to read this page](#) [Blast report description](#)

Job title: Nucleotide Sequence (976 letters)

RID YFFY8PXJ014 (Expires on 11-12 12:36 pm)

Query ID	Id Query_83509	Database Name	nr
Description	None	Description	Nucleotide collection (nt)
Molecule type	nucleic acid	Program	BLASTN 2.8.1+ Citation
Query Length	976		

Other reports: [Search Summary](#) [Taxonomy reports](#) [Distance tree of results](#) [MSA viewer](#)

Graphic Summary

Distribution of the top 132 Blast Hits on 100 subject sequences

Mouse over to see the title, click to show alignments

Color key for alignment scores

<40	40-50	50-80	80-200	>=200
-----	-------	-------	--------	-------

Query

1 150 300 450 600 750 900

Questions/comments

Keterangan: Analisis BLAST berhasil dengan tampilan panjang query pada isolat K7

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected:0

Alignments Download GenBank Graphics Distance tree of results

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain 257-B 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1736	1736	96%	0.0	99%	KP993216.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain Dh 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1736	1736	96%	0.0	99%	HQ200414.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain JAKL10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1733	1733	96%	0.0	99%	KU707913.1
<input type="checkbox"/> Uncultured bacterium clone FOX361C08 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1733	1733	96%	0.0	99%	EU491344.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas sp. Pemsol chromosome	1731	1731	96%	0.0	99%	CP025780.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain APBDSDB153 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	MG706699.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain NCTC10498 genome assembly, chromosome: 1	1731	5194	96%	0.0	99%	LS493406.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain NCTC10258 genome assembly, chromosome: 1	1731	6925	96%	0.0	99%	LS493377.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain FNS2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	MH000623.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain FDAARGOS_325 chromosome, complete genome	1731	6903	96%	0.0	99%	CP022053.2
<input checked="" type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain FDAARGOS_92 chromosome, complete genome	1731	6925	96%	0.0	99%	CP014014.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain Al-Khrif5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KY123858.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain C_1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KT748642.1
<input type="checkbox"/> Bacterium enrichment culture clone JYJ-9 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KR986766.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas sp. CanR-73 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KT580665.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas sp. CanR-47 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KT580654.1
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas sp. RZS7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KP862608.2
<input type="checkbox"/> Stenotrophomonas maltophilia strain 173-B 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1731	1731	96%	0.0	99%	KT580665.1

Keterangan: Hasil sekuensing K7 diperoleh bakteri spesies *Stenotrophomonas maltophilia* strain FDAARGOS 92

b. Isolat K9

NIH U.S. National Library of Medicine NCBI National Center for Biotechnology Information Sign in to NCBI

BLAST Home Recent Results Saved Strategies Help

Basic Local Alignment Search Tool

BLAST finds regions of similarity between biological sequences. The program compares nucleotide or protein sequences to sequence databases and calculates the statistical significance. [Learn more](#)

NEWS
 Learn how to use BLAST
 See our collection of webinars and tutorials designed to help you.
 Wed, 17 Oct 2018 15:00:00 EST [More BLAST news...](#)

Web BLAST

Nucleotide BLAST
nucleotide ▶ nucleotide

blastx
translated nucleotide ▶ protein

Protein BLAST
protein ▶ protein

BLAST Genomes

Keterangan: tampilan awal website resmi NCBI.

NIH U.S. National Library of Medicine NCBI National Center for Biotechnology Information Sign in to NCBI

BLAST® » blastn suite Home Recent Results Saved Strategies Help

Standard Nucleotide BLAST

blastn blastp blastx tblastn tblastx

BLASTN programs search nucleotide databases using a nucleotide query. [more...](#) [Reset page](#) [Bookmark](#)

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [Clear](#) [Query subrange](#)

From

To

Or, upload file No file chosen [?](#)

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search [?](#)

Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database Human genomic + transcript Mouse genomic + transcript Others (nr etc.):
 [?](#)

Organism [Optional](#) Exclude [+](#)
Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown [?](#)

Exclude [Optional](#) Models (XMP) Uncultured/environmental sample sequences

Limit to [Optional](#) Sequences from type material

Entrez Query [Optional](#) [YouTube](#) [Create custom database](#)
Enter an Entrez query to limit search [?](#)

Keterangan: Tampilan setelah mengklik Nucleotide BLAST pada sisi kiri halaman web resmi NCBI.

NIH U.S. National Library of Medicine NCBI National Center for Biotechnology Information Sign in to NCBI

BLAST » blastn suite Home Recent Results Saved Strategies Help

Standard Nucleotide BLAST

blastn blastp blastx tblastn tblastx

BLASTN programs search nucleotide databases using a nucleotide query. [more...](#) [Reset page](#) [Bookmark](#)

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) Clear Query subrange

From

To

```

TCATGCCCTTATGACTGGGCTACACAGTGTACAAATGGACAGAACAAAGGGCTGCAAGACCGCAGGTTT
AGCCATCCCATAAATCTGTCTCTAGTTGGATGGCAGTCTGCACCTGACTGCTGGTGAAGCTGGAAATCCTAG
TAATCGGGATCAGCATGCCCGGATAGCTTCCCGGGCTTGTATACACACCCCGCTACACCACGAGAGT
TTGCACACCCGAGTCTGTGGAGTAACTTTATGGAGCCACCCCAAGAGGGGACAGAGGATTTGGGGTG
ANNICTTACAGGTACGGGAAAAA

```

Or, upload file No file chosen

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search

Align two or more sequences

Choose Search Set

Database Human genomic + transcript Mouse genomic + transcript Others (nr etc.):
Nucleotide collection (nr/nt)

Organism Optional exclude
Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown

Exclude Optional Models (X/M/X/P) Uncultured/environmental sample sequences

Limit to Optional Sequences from type material

Entrez Query [YouTube](#) [Create custom database](#)
Optional Enter an Entrez query to limit search

Keterangan: Tampilan setelah ditempelkan basan ukleotida yang telah dicopy pada kolom sudut kiri atas.

Program Selection

Optimize for

- Highly similar sequences (megablast)
- More dissimilar sequences (discontiguous megablast)
- Somewhat similar sequences (blastn)
- Choose a BLAST algorithm

BLAST Search database Nucleotide collection (nr/nt) using Megablast (Optimize for highly similar sequences)

Show results in a new window

[Algorithm parameters](#)

BLAST is a registered trademark of the National Library of Medicine

Support center Mailing list

NCBI
National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NIH USA.gov

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Keterangan: Tampilan setelah urutan basa nukleotida ditempelkan lalu diklik
BLAST pada kolom berwarna biru.

 U.S. National Library of Medicine
Sign in to NCBI

BLAST® » *blastn suite* » RID-YGPYZ90014
Home Recent Results Saved Strategies Help

Format Request Status

[\[Formatting options\]](#)

Job Title: Nucleotide Sequence (977 letters)

Request ID	YGPYZ90014
Status	Searching
Submitted at	Sun Nov 11 11:42:05 2018
Current time	Sun Nov 11 11:42:07 2018
Time since submission	00:00:02

This page will be automatically updated in 2 seconds

BLAST is a registered trademark of the National Library of Medicine

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

NCBI

National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA

[Policies and Guidelines](#) | [Contact](#)

[Support center](#) [Mailing list](#)



Keterangan: Setelah klik BLAST proses sekuensing berlangsung.

U.S. National Library of Medicine | NCBI National Center for Biotechnology Information | Sign in to NCBI

BLAST® » blastn suite » RID-YGPYXZ90014 | Home | Recent Results | Saved Strategies | Help

BLAST Results

[Edit and Resubmit](#) | [Save Search Strategies](#) | [Formatting options](#) | [Download](#) | [How to read this page](#) | [Blast report description](#)

Job title: Nucleotide Sequence (977 letters)

RID [YGPYXZ90014](#) (Expires on 11-12 23:42 pm)

Query ID	Id Query_49827	Database Name	nr
Description	None	Description	Nucleotide collection (nt)
Molecule type	nucleic acid	Program	BLASTN 2.8.1+ Citation
Query Length	977		

Other reports: [Search Summary](#) | [Taxonomy reports](#) | [Distance tree of results](#) | [MSA viewer](#)

Graphic Summary

Distribution of the top 150 Blast Hits on 100 subject sequences

Mouse over to see the title, click to show alignments

Color key for alignment scores

■ <40	■ 40-50	■ 50-80	■ 80-200	■ ≥200
-------	---------	---------	----------	--------

1 150 300 450 600 750 900

Questions/comments

Keterangan: Analisis BLAST berhasil dengan tampilan panjang query pada isolat K9

Sequences producing significant alignments:

Select: [All](#) [None](#) Selected:0

Alignments [Download](#) [GenBank](#) [Graphics](#) [Distance tree of results](#)

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/> Bacillus sp. IHB B 3460 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1696	1696	97%	0.0	99%	KF562256.1
<input type="checkbox"/> Uncultured bacterium clone 04DI4CB11 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1694	1694	97%	0.0	99%	KP243082.1
<input type="checkbox"/> Bacillus pumilus strain UBT3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1692	1692	97%	0.0	99%	KR780583.1
<input type="checkbox"/> Bacillus cereus strain UBT4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1692	1692	97%	0.0	99%	KR709243.1
<input type="checkbox"/> Bacillus sp. S22324 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1692	1692	97%	0.0	99%	KF956694.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain sami chromosome	1690	1690	97%	0.0	99%	CP032830.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis FC-36b genome	1690	13520	97%	0.0	99%	CP010405.1
<input type="checkbox"/> Bacillus sp. strain HL2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1690	1690	97%	0.0	99%	MF423450.1
<input type="checkbox"/> Bacillus sp. strain TIM 04 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1690	1690	97%	0.0	99%	KU566317.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain BRM1, complete genome	1690	13526	97%	0.0	99%	CP018100.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis partial 16S rRNA gene, isolate ARS27	1690	1690	97%	0.0	99%	LT797526.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain MMD02 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1690	1690	97%	0.0	99%	KY495152.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain U17-1, complete genome	1690	15176	97%	0.0	99%	CP015611.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain U41, complete genome	1690	13520	97%	0.0	99%	CP015610.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain U14-5, complete genome	1690	13476	97%	0.0	99%	CP015607.1
<input type="checkbox"/> Bacillus safensis strain KCTC 12796BP, complete genome	1690	13471	97%	0.0	99%	CP018197.1
<input type="checkbox"/> Bacillus sp. MD-C14 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1690	1690	97%	0.0	99%	
<input type="checkbox"/> Bacillus pumilus strain IHB B 15516 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1690	1690	97%	0.0	99%	

Keterangan: Hasil sekuensing K9 diperoleh bakteri spesies *Bacillus safensis* strain U17-1.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sri Kurniati. Dengan nama panggilan Sri atau Kurni. Lahir di Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Campalagian pada 03 September 1995. Penulis merupakan bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd. Rauf, S.Pd.,M.Si dan Ibu Hj. Anace, S.Pd.

Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai pada SDN 007 Sidodadi Kec. Wonomulyo 2002-2008, SMPN 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar tahun 2008-2011, SMAN 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar tahun 2011-2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014-2018. Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis aktif di organisasi HMJ Biologi FST UIN Alauddin Makassar. Selain itu, penulis juga pernah menjadi asisten praktikum pada praktikum Mikrobiologi.