

**PENENTUAN SIFAT FISIK DAN KIMIA TANAH DI WILAYAH
PERKOTAAN MAKASSAR SERTA POTENSINYA SEBAGAI
BAHAN PEMBERSIH AIR LIUR ANJING**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar
Sarjana Sains Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ELMIKA NESTI AMIR
NIM: 60500115050

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elmika Nesti
NIM : 60500115050
Tempat/Tgl Lahir : Bantaeng/18 Desember 1997
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Perm. Mutiara Indah Village blok J/22
Judul : Penentuan Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Wilayah Perkotaan
serta Potensinya sebagai Bahan Pembersih Air Liur Anjing

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Samata-Gowa, Agustus 2019
Penyusun

Elmika Nesti
60500115050

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penentuan Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Wilayah Perkotaan Makassar serta Potensinya sebagai Bahan Pembersih Air Liur Anjing", yang disusun oleh **Elmika Nesti**, NIM: **60500115050**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Agustus 2019 bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).


Samata-Gowa, 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Aan Farhani, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini yang berjudul “ **Penentuan Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Wilayah Perkotaan Makassar Serta Potensinya Sebagai Pembersih Air Liur Anjing**” dapat terselesaikan dengan baik. salam dan shalawat penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad saw yang telah menjadi reladan bagi umat Islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana kimia sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun atas pertolongan Allah swt yang disertai dengan doa dan usaha serta bantuan dari semua pihak kepada penulis sehingga semua ini dapat teratasi sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Hariani yang senantiasa mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhani M.A., Ph.D. selaku Rektor universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr.Muh. Khalifah Mustami, M.pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si,M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Kimia Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si. Selaku Pembimbing II. yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian proposal sampai skripsi ini.

4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan.
6. Ibu Dra. Sitti Chadijah M.Si. selaku Penguji I. dan Bapak Aan Parhani Lc selaku penguji II yang telah memberi saran dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Segala Bantuan demi Kelancaran Pengurusan Selama Berada di Kampus ini.
8. Partner penelitianku Hardianty Hamrullah dan Indah Islamiah Hasanuddin terima kasih atas usaha yang dilalui bersama mulai dari proposal, penelitian sampai skripsi ini selesai serta teman-teman seperjuangan di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Teman-teman Mahasiswa Kimia Angkatan 2015 Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membantu Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk skripsi ini sehingga bisa menjadi lebih baik.

Samata-Gowa, Agustus 2019

Penulis

Elmika Nesti


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii-iv
DAFTAR ISI	v-vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah	6
B. Mikroba Tanah	11
C. Tinjauan Umum Tentang Anjing	13
D. Bersuci (Thaharah)	15
E. . Spektrofotometri UV-VIS	19

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Waktu dan Tempat Penelitian	18
B. Alat dan Bahan	18
1. Alat	18
2. Bahan	18
C. Prosedur Penelitian	19
1. Pengujian Sampel Tanah	19
2. Uji Sifat Fisik Tanah	19
3. Uji Sifat Kimia Tanah	21
4. Pengujian Tanah Terhadap Air Liur Anjing	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	27
1. Tabel Pengamatan Uji Sifat Fisik	27
2. Tabel Pengamatan Uji Sifat Kimia	27
3. Tabel Pengamatan Uji Swab	28
B. Pembahasan	28
1. Uji sifat Fisika	29
2. Uji sifat Kimia	31
3. Uji swab	36
BAB V PENUTUP	38
1. Kesimpulan	38
2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	42-54
RIWAYAT HIDUP


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanah kota	10
Gambar 2.2 Anjing Liar.....	14
Gambar 2.3 Spektrofotometri UV-VIS.....	18



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil uji sifat fisik tanah wilayah perkotaan.....	30
Tabel 4.2. Hasil uji sifat kimia tanah wilayah perkotaan.....	30
Tabel 4.3 Hasil analisis uji swab.....	31



ABSTRAK

Nama : Elmika Nesti
NIM : 60500115050
Judul : **Penentuan Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Wilayah
Perkotaan Makassar Serta Potensinya Sebagai Bahan
Pembersih Air Liur Anjing**

Anjing merupakan hewan mamalia yang memiliki air liur berbahaya yang dapat menurunkan kekebalan tubuh, infeksi paru-paru dan meningitis. Pada penelitian ini digunakan air liur anjing liar dan tanah dari wilayah perkotaan makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sifat fisik dan kimia tanah pada wilayah perkotaan dan potensinya sebagai pembersih air liur anjing yang merujuk pada hadits Rasulullah riwayat Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk sifat fisik tanah pada kedalaman 0 yaitu warna abu-abu sangat gelap (*very drak gray*), tekstur lempung berpasir, dan kadar air 2,13%. Pada kedalaman 30 mempunyai warna hitam (*black*), tekstur lempung berpasir, dan kadar air 1,62%. Sedangkan untuk sifat kimia pada kedalaman 0 yaitu pH 7,03; N-total 0,08%; C-Organik 2,81%; KTK 7,98 cmol/kg; Ca 14,89 cmol/kg; Mg 2,22 cmol/kg; P₂O₅ 9,76 ppm. Pada sifat kimia pada kedalaman 30 yaitu pH 6,88; N-total 0,17%; C-Organik 2,77%; KTK 7,98 cmol/kg; Ca 2,77 cmol/kg; Mg 1,98 cmol/kg; P₂O₅ 7,93 ppm. Sifat fisika dan kimia yang dimiliki pada tanah kota berpengaruh pada hasil pembersihan air liur anjing. Hasil uji swab pembersihan air liur anjing merujuk hadits riwayat Rasulullah menunjukkan tanah di wilayah kota memiliki potensi sebagai pembersih air liur anjing.

Kata Kunci: Air liur anjing liar, sifat kimia, sifat fisika, tanah perkotaan.

ABSTRACT

Name : Elmika Nesti
NIM : 60500115050
The Title : **Determination of the Physical and Chemical Properties of Soil in the Makassar Urban Area and its Potential as a Dog Saliva**

Dogs are mammals that have dangerous saliva which can reduce immunity, lung infections and meningitis. In this study used saliva of wild dogs and soil from the urban area of makassar. The purpose of this study was to determine the physical and chemical characteristics of soil in urban areas and their potential as a dog saliva cleanser that refers to the hadith of the prophet's muslim history. The results of this study indicate that for the physical properties of soil at a depth of 0 that is very dark gray, sandy clay texture, and water content of 2.13%. On the 30th it has black, texture of sandy clay, and water content of 1.62%. While the chemical properties at depth 0 are ph 7.03; n-total 0.08%; organic c-2.81%; cec 7.98 cmol/kg; ca 14.8 cmol/kg; mg 1.98 cmol/kg; P₂O₅ 7.93 ppm. The physical and chemical properties possessed on municipal land have an effect on the results of cleaning the dog's saliva. The results of the swad cleansing test of the dog's saliva refer to the hadith of the apostle's history showing the land of the area of the city has the potential as a dog saliva cleaner.

Key Words: Wild Dog Saliva, Chemical Properties, Physical Properties, Urban Soil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan mamalia merupakan hewan yang memiliki kedekatan dengan sebagian orang salah satunya adalah anjing. Anjing telah memiliki berbagai jenis variasi seperti warna bulu, ukuran badan, karakter mulai dari jinak sampai liar (Hakim: 2008). Anjing memiliki banyak kemampuan seperti dapat dilatih sebagai anjing pelacak, anjing penjaga serta dapat dengan mudah berinteraksi dengan hewan lainnya. Anjing tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari manusia, disebabkan karena peranan anjing masih sangat dibutuhkan. Misalnya, dijadikan sebagai anjing penjaga rumah maupun ternak serta sebagai anjing pemburu. (Imbran, 2010).

Anjing dalam kehidupan sehari-harinya banyak mengeluarkan air liur karena anjing tidak mempunyai kelenjar keringat, sehingga hawa panas tubuhnya dikeluarkan melalui air liur. Air liur anjing dihasilkan oleh kelenjar saliva yang termasuk di dalam sistem pencernaan Anjing memiliki air liur yang berbahaya karena mengandung bakteri, salah satunya yaitu *micrococcus sp* yang dapat menurunkan kekebalan tubuh, infeksi paru-paru dan meningitis (Handi, 2008). Bakteri yang terdapat pada air liur anjing ini dapat dihambat dengan menggunakan tanah dikarenakan terdapat anti bakteri di dalamnya.

Sebagaimana Allah swt tidak akan menciptakan apa yang ada di muka bumi ini tanpa hikmah atau manfaat seperti yang telah dijelaskan pada Q.S.sad/38:27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۖ

Terjemahnya:

dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah swt. menciptakan langit dan bumi juga segala yang ada diantara keduanya dengan tata aturan yang demikian rapi, indah serta harmonis. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak bermain-main yakni tidak menciptakannya secara sia-sia tanpa arah dan tujuan yang benar. Seandainya penciptaan alam ini tanpa tujuan yang baik, maka berarti apa yang dilakukan Allah swt. menyangkut kehidupan dan kematian makhluk, serta penciptaan dan pemusnahannya, semua dilakukan-Nya tanpa tujuan. Tetapi karena itu bukan permainan, bukan tanpa tujuan, maka pasti Allah yang Maha Kuasa itu membedakan antara yang berbuat baik dan buruk, lalu memberi ganjaran balasan sesuai amal perbuatan masing-masing (Tafsir Al-Mishbah, 2002:135).

Ayat tersebut berkaitan dengan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt tidak ada yang sia-sia. Seperti salah satu contoh ciptaan Allah swt yang memiliki manfaat adalah tanah. Manfaat tanah selain untuk tanaman juga dapat digunakan untuk menghilangkan najis yang terdapat pada air liur anjing.

Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan produksi tanaman karena tanah berfungsi sebagai tempat atau media tumbuh tanaman dan menyediakan air bagi tanaman. Disamping itu, juga berperan dalam menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah memiliki sifat bervariasi yaitu sifat kimia, fisika dan biologi. Sifat yang bervariasi tersebut menyebabkan tanah memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda (Taufaila dan Syamsu, 2014). Salah satu contohnya yaitu tanah di wilayah perkotaan Makassar.

Tanah digunakan untuk membersihkan najis dan bakteri dari air liur anjing karena tanah memiliki kemampuan adsorpsi sehingga tanah dapat menyerap atau mengadsorp bakteri juga virus dari air liur anjing yang terkena pada bagian permukaan bejana atau kulit. Selain itu bakteri dalam tanah dapat menghasilkan antibakteri yaitu tetrasiklin dan tetraolit yang dapat menghambat bakteri patogen yang terdapat pada air liur anjing (Suryani dkk., 2013).

Air liur anjing berbahaya bagi manusia karena mengandung berbagai kuman jenis penyakit termasuk virus rabies yang dapat menular melalui sistem terbuka. Tanah dapat dikombinasikan dengan tanah steril untuk lebih memudahkan dalam menghilangkan bakteri air liur anjing (Suryani dkk., 2013). Salah satu contoh mikroorganisme yang terdapat didalam tanah yaitu *Streptomyces*. (Yaqin,2014).

Streptomyces merupakan kelompok *Actinomycetes* yang banyak diteliti karena memproduksi berbagai senyawa bioaktif. Adapun senyawa bioaktif yang dihasilkan dari isolasi *streptomyces* yaitu antibiotik, antikanker, antitumor, dan immunorepresan. Pemanfaatan *Streptomyces* ini banyak dilakukan dikarenakan senyawa bioaktifnya dapat diaplikasikan dalam bidang pangan, farmasi dan industri (Krisnawati, dk., 2015).

Streptomyces dapat menghasilkan antibiotik yaitu tetrasiklin yang umumnya digunakan untuk melawan bakteri. Tetrasiklin bekerja secara bakteriostatik dan dapat mencegah penyakit yang ditimbulkan baik oleh bakteri Gram positif maupun negative. Tetrasiklin bekerja dengan cara menghambat kuman. Tetrasiklin memiliki kemampuan melawan sejumlah bakteri patogen (Suryani, 2013).

Jumlah bahan organik yang terdapat pada tanah perkotaan berpengaruh pada sifat fisika dan kimia tanah seperti kelembapan tanah, tekstur tanah, unsur hara, serta kapasitas tukar kation (Rahmah, 2014). Sifat-sifat tanah tersebut dijadikan sebagai

medium pembersih untuk bertayammum serta membersihkan air liur anjing, Kalista dalam Suhendar, (2017) menyatakan partikel tanah atau debu yang terkecil dapat mengikat kandungan keringat, kotoran serta mikroorganisme lain pada saat bertayammum.

Pemadatan tanah dapat terjadi karena injakan manusia dan hewan, penumpukan benda-benda berat dan juga pencucian tanah yang dapat menyumbat pori dan dapat memadatkan tanah pada lapisan bagian bawah. Kekuatan tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda akan menghasilkan kekuatan tanah yang berbeda-beda pula, seperti pada kedalaman 20-40 cm memiliki kekuatan tanah lebih besar disbanding tanah dengan kedalaman 0-20 cm. sifat fisik tanah berdasarkan strukturnya, tanah dengan kedalaman 0-20 cm termasuk tanah lemah, yang menyebabkan tanah tersebut lemah yaitu butir dikarenakan melalui pengolahan tanah struktur tanah yang semula sudah berkembang (gumpal dan tiang) menjadi hancur oleh permukaan mekanis (wijanarko, dkk., 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan suatu penelitian tentang karakteristik sifat fisika dan kimia tanah diwilayah perkotaan Makassar kaitannya sebagai bahan pembersih air liur anjing yang disebabkan oleh kandungan berupa tertasiklin dan tetraolit sebagai antibiotika dari bakteri tanah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitin yaitu

1. Bagaimana sifat fisika dan kimia tanah pada wilayah perkotaan?
2. Bagaimana potensi tanah pada wilayah perkotaan sebagai pembersih air liur anjing yang merujuk pada hadits Rasulullah riwayat Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu

1. Untuk menentukan sifat fisik dan kimia tanah pada wilayah perkotaan.
2. Untuk menentukan potensi tanah pada wilayah perkotaan sebagai pembersih air liur anjing yang merujuk pada hadits Rasulullah riwayat Muslim.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sifat fisik dan kimia pada tanah wilayah kota dan kaitannya sebagai pembersih air liur anjing berdasarkan hadits Rasulullah riwayat Muslim.
2. Menjadi rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan tanah sebagai agen pembersih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah

Kehidupan di dunia tidak terlepas dengan yang namanya tanah karena tanah dapat digunakan sebagai media pertumbuhan untuk tanaman yang akan dikonsumsi oleh manusia, hewan dan mikroorganisme (Alwie, dkk., 2012). Tanah merupakan lapisan kerak bumi yang berupa batuan dan akan mengalami pelapukan sehingga membentuk lapisan partikel yang halus. Pelapukan tersebut akan terus terjadi dan akan dipengaruhi oleh faktor iklim, mikroorganisme dan faktor genetika (Handi, 2008). Tanah memiliki tingkat keasaman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi garam dan karbondioksida dalam larutan tanah dan aktivitas mikroba (Williams, dkk., 1971).

Tanah memiliki beberapa lapisan yaitu lapisan atas, tengah, bawah dan induk. Lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari sisa-sisa hasil pelapukan dan makhluk hidup yang telah mati. Air pada lapisan atas sangat mudah menyerap ke dalam tanah. Tanah pada lapisan ini merupakan tanah yang paling subur. Lapisan tengah merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk karena lapisan atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan bawah merupakan lapisan yang terdiri dari bongkahan-bongkahan batu. Pada sela-sela bongkahan terdapat hasil dari pelapukan batuan, masih terdapat batu yang belum melapuk secara sempurna. Adapun pada lapisan batuan induk yang merupakan lapisan dimana batuan pada lapisan ini sulit meresap air. Lapisan ini berbentuk bebatuan yang padat (Tama, 2015; Yaqin, 2014).

Tanah juga merupakan habitat bagi banyak populasi mikrobiologis yang terdiri dari golongan flora dan fauna. Golongan flora meliputi bakteri (heterotrof dan autototrof), actinomycetes, fungi dan ganggang (alga), sedangkan golongan fauna yaitu protozoa, binatang berderajat lebih tinggi, nematoda dan cacing tanah. Bakteri adalah mikroorganisme yang terbanyak di tanah yang dapat mencapai miliaran g^{-1} pada tanah. Terdapat lebih dari 400 genus dan 10.000 spesies mikroba (Hakim, 2008; Ambarwati, 2009).

Tanah memiliki sifat bervariasi yaitu sifat kimia, fisika dan biologi. Sifat yang bervariasi tersebut menyebabkan tanah memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda (Taufilia dan Syamsu, 2014). Sifat fisik tanah yang merupakan indikator kualitas tanah, salah satu sifat fisik yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan proporsi masing-masing pasir, debu dan liat dalam jumlah persen. Kondisi tekstur tanah sangat berpengaruh pada pemanfaatan lahan tanah seperti pemanfaatan pada perkembangan tanaman yang ditumbuhkan, serta berperan dalam ketersediaan air di dalam tanah (Harahap, 2014; Tufaila, 2014).

Sifat kimia tanah meliputi diantaranya: pH Tanah merupakan penunjukan jumlah konsentrasi ion H^+ pada tanah. Secara umum pH normal tanah berkisar rata-rata 6-7 dimana reaksi pada tanah dalam keadaan seimbang dan ketersediaan unsur hara pada pH normal dalam keadaan optimal (Tufaila, 2014). Sifat keasaman dan alkalinitas tanah juga berhubungan dengan kedalaman tanah, semakin dalam tanah maka sifat tanah semakin masam. Sifat asam disebabkan oleh banyaknya kandungan ion positif (H^+) pada tanah (Tufaila, 2014).

Nilai pH pada tanah dapat diketahui dengan banyaknya konsentrasi hidrogen (H^+) di dalam tanah. Apabila kadar ion (H^+) di dalam tanah tinggi maka tanah tersebut semakin masam. Adapun terdapat ion OH^- di dalam tanah yang jumlahnya

berbanding terbalik dengan banyaknya ion H^+ . pada tanah yang masam jumlah ion H^+ lebih tinggi daripada OH^- sedangkan pada tanah alkalis kandungan OH^- lebih banyak dari H^+ . sedangkan jika keduanya sama maka tanah tersebut netral yaitu = 7 (Luhung, 2014). Di Indonesia pada umumnya tanah dikatakan asam apabila pHnya berkisar antara 4,5-5,5 sehingga tanah dengan pH 6,0-6,5 dapat dikatakan netral meskipun sebenarnya masih dapat dikatakan asam. Pada daerah rawa-rawa biasanya ditemukan tanah dengan pH kurang dari 3,0 sedangkan pada daerah yang kering pH tanah biasanya sangat tinggi yaitu sekitar 9,0 hal ini dikarenakan terdapat banyak garam Na pada tanah (Utami, 2009).

Kadar air dilakukan dengan mengatur panas, kelembaban dimana oven dapat digunakan sebagai dehidrator. Waktu yang diperlukan dalam uji kelembabaan yaitu 5-12 jam lebih lama dari dehidrator biasanya. Pengeringan dapat diatur sesuai dengan keinginan dan tidak berpengaruh cuaca. Sedangkan kelemahan dari pengeringan buatan yaitu memerlukan keterampilan dan peralatan khusus dan biaya yang mahal dibandingkan pengeringan secara alami (Aventi, 2015).

Nitrogen (N- total) merupakan unsur hara makro utama yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak yang akan diserap oleh tanaman dalam bentuk ammonium NH_4^+ dan nitrat (NO_3^-). Nitrogen di dalam tanah terdapat dalam berbagai bentuk yaitu protein (bahan organik), senyawa-senyawa amino (NH_4^+) dan Nitrat (NO_3^-) (Utami, 2009).

Unsur nitrogen sangat penting bagi tanaman yang dapat diperoleh melalui pemupukan. Nitrogen umumnya diserap dalam bentuk NO_3^- dan NH_4^+ , walaupun urea (H_2NCONH_2) dapat juga dimanfaatkan oleh tanaman karena urea secara cepat dapat diserap melalui epidermis daun. Nitrogen di dalam tanah ada yang berbentuk

protein (bahan organik), senyawa-senyawa amino, ammonium (NH_4^+) dan nitrat (NO_3^+) (Utami, 2009).

Kalsium (Ca) merupakan unsur-unsur mineral sekunder. Kalsium dalam larutan dapat habis karena diserap tanaman, diambil jasad renik, terikat oleh kompleks adsorbs tanah, mengendap kembali sebagai endapan-endapan sekunder dan tercuci. Kalsium bermanfaat untuk mengaktifkan bulu-bulu akar dan biji serta menguatkan batang dan membantu kebersihan penyerbukan, membantu pemecahan sel dan membantu beberapa aktivitas enzim (Jovita, 2018).

Tanah termasuk material yang sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, baik pemanfaatannya sebagai media pertumbuhan tanaman maupun dimanfaatkan oleh manusia untuk pembangunan dan industri. Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خُبَّتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Sayyid Quthb menafsirkan bahwa hati yang baik didalam al-Qur'anul Karim diserupakan dengan negeri yang baik dan tanah yang subur. Dan hati yang buruk diserupakan dengan negeri yang buruk dengan tanah yang tandus. Keduanya, hati dan tanah, merupakan tempat tumbuhnya tanaman dan penghasil buah. Tanah juga dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam rasa, warna dan jenisnya (Tafsir Fi Zhilalil Qur'an) .

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tanaman dapat tumbuh subur pada tanah yang baik. Tanah sebagai media tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman yang

dapat menghasilkan buah-buahan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah zat hara yang terdapat pada tanah yang menunjukkan tingkat kesuburan tanah, misalnya kandungan organik dan kandungan mineral tanah. Banyaknya mikroba yang terdapat pada tanah dapat diindikasikan bahwa tanah tersebut memiliki kesuburan yang baik.



Gambar 2.1. Tanah Kota

Ada beberapa sifat fisik tanah yang sangat berpengaruh terhadap ketersediannya di air dan di udara sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi ketersediaan unsur hara (Kurniawan, 2011). Tanah perkotaan adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan (Riyadi, 2016). Adapun pada tanah di wilayah perkotaan dengan kedalaman 0-30 cm memiliki tekstur tanah agak halus sampai halus (berdebu) dan kurangnya kadar besi. Apabila tanah ini digenangi air akan mengubah morfologi dan sifat fisika dan kimia tanah sehingga dari perubahan tersebut dapat pula merubah klasifikasi dari tanah asalnya, begitu pula peran zat-zat organik yang ditanami pada tanah yang dapat mempengaruhi sifat-sifat tanah (Wijanarko, 2007).

B. Mikroba Tanah

Bakteri merupakan mikroorganisme yang memiliki kedudukan terbanyak ditanah yang jumlahnya dapat mencapai miliaran g^{-1} . Bakteri memiliki 400 genus dan 10^4 spesies. Kelompok bakteri terdiri dari bakteri ungu, bakteri sulfur hijau, Actinomycetes, Sporogenic, Bacili dan Cyanobacteria. Bakteri tanah terdiri atas 2 yaitu bakteri aototropik atau bakteri autotropik dan bakteri heterotropik. Perbedaan dari keduanya yaitu bakteri aototropik karbon yang diperoleh berasal dari CO_2 sedangkan bakteri heterotropik karbon yang diperoleh yaitu dari senyawa-senyawa organik. Bakteri dapat diidentifikasi berdasarkan morfologi, sifat biakan dan sifat biokimiawi karena mikroba tidak memiliki ciri anatomi yang nyata. Mikroba yang akan diisolasi berupa biakan murni atau populasi campuran. Jika biakan yang akan diisolasi berasal dari populasi campuran, maka dilakukan pemurnian terlebih dahulu (Hakim, 2008).

Antimikroba merupakan senyawa kimia dari hasil organisme hidup yang dapat menghambat proses penting dalam satu spesies atau mikroorganisme dengan konsentrasi yang rendah. Senyawa antimikroba merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas dan pertumbuhan mikroba (Handi, 2008: 7). Banyak faktor yang mempengaruhi penghambatan mikroorganisme yaitu kepekaan terhadap bahan antimikrobia, kepadatan populasi dari mikroorganisme, volume bahan yang di sterilkan, lama bahan anti mikrobial yang diaplikasikan pada mikroorganisme, suhu bahan organik, kandungan bahan organik dan konsentrasi bahan antimikrobia (Hakim, 2008).

Mekanisme kerja antimikroba dapat dilakukan dengan cara uji pengenceran dan uji difusi. Pengukuran daya antimikroba dengan cara uji pengenceran yaitu antibiotik diencerkan dan ditambahkan bakteri penguji sehingga akan diketahui

jumlah terendah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara invitro. Sedangkan uji difusi dilakukan dengan cara menggunakan metode cakram kertas. Cakram kertas yang digunakan yaitu mengandung antibiotik dengan konsentrasi tertentu, (Handi, 2008).

Actynomicetes yang memiliki sifat anaerob ini dapat hidup di lapisan bawah permukaan tanah, berbeda dengan bakteri lain yang terdapat di tanah yang hanya dapat hidup di horison permukaan tanah. Tingginya populasi bakteri yang terdapat di lapisan rizosfer tanah diduga karena pada permukaan tanah memiliki zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, ketersediaan substrat dan suplai makanan dari sistem perakaran tumbuhan di dalam tanah berpengaruh terhadap populasi bakteri tanah (Irfan, 2014).

Streptomyces merupakan salah satu genus bakteri gram positif dari filum Actinobacteria. Bakteri *Streptomyces* dapat berkembang biak dengan cara sporalisasi atau pembentukan *hyfa* seperti layaknya jamur. Cara perkembangbiakan melalui spora merupakan keunikan dari bakteri genus *Streptomyces*, sehingga pada awalnya digolongkan ke dalam kelas jamur. *Streptomyces* sangat menarik perhatian para ahli bakteriologi karena kemampuannya dalam mensintesis metabolit sekunder berupa antimikroba atau antibiotik, (Puryatiningsih, 2009).

Streptomyces memiliki antibiotik yang dapat melawan bakteri. Seperti pada streptomisin, tetrasiklin dan kloromafenikol. Isolate dari *streptomyces* menghasilkan koloni-koloni kecil yang berdiameter 1-10 mm, terpisah-pisah seperti liken, permukaannya sangat licin dan lama kelamaan akan terbentuk tenunan meselium udara yang dapat menampakkan granulanya seperti bubuk, bludru atau flokos dan akan menghasilkan sebagai macam warna pada pigmen vegetative, miselium udara dan substansi (Puryatiningsih, 2009).

Streptomyces memiliki misel dengan bau yang sangat kuat, berkembang dan mengandung hifa udara, dari bentuk ini terjadi konstruksi lurus, mirip spiral, bergelombang, dapat mengurai selulosa, kitin dan zat lain sukar dipecah. *Streptomyces* ini pada dasarnya digunakan untuk manusia pada bidang kedokteran, pertanian dan dapat juga sebagai agen antiparasit, metabolisme aktif, herbisida, farmakologi serta beberapa enzim penting pada makanan dan industry lain (Puryatiningsih, 2009).

C. Tinjauan Umum Tentang Anjing

Anjing adalah mamalia karnivora yang telah mengalami evolusi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Penelitian lain mengungkap sejarah evolusi anjing yang belum begitu lama. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi, mulai dari anjing yang tinggi badannya hanya beberapa puluh sentimeter seperti Chihuahua hingga *Irish Wolfhound* yang tingginya lebih dari satu meter (Handi, 2008).

Di Indonesia, terdapat empat provinsi yang populasi anjingnya sangat padat yakni Bali, NTT, Nias, dan Jawa Barat, selain itu masih ada banyak provinsi yang juga belum bebas dari wabah rabies. Di Bali jumlah anjing liar diperkirakan mencapai 540.000 ekor, dan dari 2008 – 2012 sudah 131 orang meninggal karena gigitan anjing yang terinfeksi rabies (Santoso, 2015).

Air liur anjing dihasilkan oleh kelenjar saliva yang termasuk didalam bagian sistem pencernaan. Apparatus digestivus terdiri dari rongga mulut, *pharynx*, *alimentary canal* dan kelenjar aksesorius. Kelenjar aksesorius terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, pankreas dan kantung anal (Hakim, 2008). Menurut Sjuhada (dalam Handi 2008) fungsi dari air liur pada setiap spesies berbeda, umumnya air liur

berfungsi sebagai pelumat makanan menjadi bolus agar mudah dicerna, membasahi makanan, anti bakteri, mencerna polisakarida (α -amilase), menetralkan asam dari makanan anjing air liur berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas dalam tubuhnya.

Ada lima tipe anjing yang telah dikenal sebagai ras awal hasil pembiakan selektif yang dilakukan oleh manusia yaitu *mastiff*, *wolflike dog (spitz)*, *greyhounds*, *pointers* dan *sheepdogs*. Kemudian 5 ras-ras awal ini berkembang menjadi berbagai ras baru melalui penyebaran dan campur tangan manusia di dalam proses pembiakan mereka. Kedekatan anjing dan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia serta bersosialisasi secara intens dengan manusia, anjing maupun hewan lain (Imbran, 2010).



Gambar 2.2. Anjing Liar

Menurut *American Kennel Club* dalam Handi (2008) klasifikasi anjing adalah sebagai berikut:

- Kingdom : Animalia
- Filum : Chordata
- Kelas : Mamalia
- Ordo : Canidae
- Genus : *Canis*
- Spesies : *Canis lupus familiaris*

Anjing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling digemari manusia. Loyalitas dan berbagai karakter anjing telah membuat banyak manusia memilih anjing sebagai hewan peliharaan. Saat ini sebagian besar populasi anjing berfungsi sebagai hewan peliharaan. Anjing peliharaan memiliki beberapa peran terhadap manusia antara lain sebagai anjing pemburu, anjing penjaga atau pengawas dan anjing SAR (*Search and Rescue Dog*) (Imbran, 2010).

Anjing gembala penjaga hewan ternak menunjukkan sifat-sifat anjing pemburu, namun secara terkendali. Anjing pemburu merupakan teman manusia saat berburu. Anjing pelacak mempunyai pola tingkah laku membuntuti mangsa dengan cara mengikuti jejak baunya. Anjing SAR melakukan deteksi terhadap keberadaan tubuh manusia melalui penciuman terhadap bau manusia. Keutamaan dari anjing jenis ini adalah pelatihan untuk mendeteksi keberadaan seseorang melalui bau yang ditinggalkan orang tersebut dan mengikuti jejak (Handi, 2008; Imbran, 2010).

Anjing liar dikenal sebagai agen penularan virus rabies. Fakta penting yang perlu diketahui adalah hanya dalam kurun waktu 6 tahun seekor anjing betina berpotensi mempunyai keturunan sejumlah 67.000 ekor, sehingga jikalau disuatu daerah terjadi overpopulasi anjing liar, maka kasus penularan rabies terhadap manusia pun akan meningkat tajam. Selain kecepatan reproduksi anjing, kepadatan populasi anjing liar diperparah lagi dengan banyaknya pemelihara anjing yang membuang anjingnya ke jalanan karena berbagai alasan (Yuliani dkk., 2007; Santoso, 2015).

D. Bersuci (*Thaharah*)

Air liur anjing dalam Islam merupakan najis besar (*mughallazah*) sehingga proses pembersihannya harus menggunakan bilasan air dan tanah, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim no. 420 dan Ahmad 427:

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالْتَّرَابِ

Terjemahnya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sucinya bejana kalian apabila ia dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah."

Hakim (2008) telah melakukan penelitian identifikasi bakteri pada air liur anjing dan mendapatkan hasil yaitu bakteri genus *micrococcus* sp., demikian juga pada penelitian Handi (2008) bakteri genus *Micrococcus* dengan spesies *Micrococcus antarcticus*, *Micrococcus nevus*, *Micrococcus luteus*, *Micrococcus lylae*, *Micmoccus mucilaginosus*, dan *Micrococcus roseus*. *Micrococcus* merupakan bakteri Gram positif yang memiliki ukuran 0,5-3 mikrometer, dan mempunyai dinding sel sebesar 50% dari berat tubuhnya.

Kebersihan merupakan syarat yang utama dalam melakukan ibadah kepada Allah swt. sehingga bersuci dari najis adalah hal yang harus dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.


Sayyid Quthb menafsirkan bahwa thaharah adalah tindakan untuk memebersihkan fisik dan menyucikan ruh sekaligus dalam satu aktivitas. Juga dalam sebuah ibadah yang dengannya seorang mukmin menghadapkan dirinya kepada Allah. Akan tetapi, dari segi kesucian ruhani lebih kuat karena apabila berhalangan menggunakan air maka diharuskan mengganti dengan tayamum yang tidak lain kecuali untuk mewujudkan bagian kedua (aspek ruhani) yang lebih kuat itu (Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan ibadah kepada Allah swt. harus bersuci terlebih dahulu yaitu berwudhu menggunakan air, dan apabila kesulitan mendapatkan air maka dapat bertayammum dengan tanah. Tanah merupakan salah satu media untuk bersuci selain menggunakan air. Beberapa kandungan yang ada di dalam tanah mempunyai sifat membersihkan najis. Allah memberi kemudahan kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dan sungguh nikmat Allah sangat luas apalagi kepada hamba yang banyak bersyukur.

E. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometri Sinar Tampak (UV-Vis) adalah pengukuran energi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu. Sinar ultraungu (*ultra violet*) mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, dan sinar tampak (*visible*) mempunyai panjang gelombang 400-750 nm. Pengukuran panjang

gelombang dan absorbansi analit menggunakan alat spektrofotometer yang melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis (Khuluk, 2016: 27-28).



Gambar 2.3 Spektrofotometer UV-Vis
(Sumber: Lubis, 2015: 52)

Prinsip dasar Spektrofotometer UV-Vis yaitu jika suatu material disinari dengan gelombang elektromagnetik maka cahaya akan diserap oleh elektron dalam material sehingga menyebabkan elektron akan meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron tidak sanggup meloncat dari pita valensi jika energi cahaya yang diberikan kurang dari lebar celah pita energi. Jika energi cahaya yang diberikan lebih besar maka elektron akan mengarah pada pita konduksi (Amri, 2016: 25).

Pada umumnya spektrofotometri ultraviolet dalam analisis senyawa organik digunakan untuk menentukan jenis khromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan auksokhrom dari suatu senyawa organik, menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang serapan maksimum suatu senyawa dan mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Alwi, 2017: 33).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 - Februari 2019 dilaboratorium kimia analitik, laboratorium biokimia, laboratorium mikrobiologi Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas pertanian Universitas Hasanuddin

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Sequoia Turner 340 spektrofotometer, neraca analitik (Kern ABJ), seperangkat alat Kjeldahl (Kjeltec™ 2200), *Laminar Air Flow* (Posco), buret asam 50 ml, oven (Memmert), inkubator (Thermo scientific), autoklaf (Thermo Scientific), *sieve shaker* (Retsch), *Colony counter*, desikator, tanur, *thermometer*, *hydrometer*, pH meter, erlenmeyer 250 mL, labu ukur 100 mL, gelas ukur 1000 mL, gelas piala 250 mL, cawan petri, cawan poselin, Sekop, kantong plastik, karet, trayek pH, saringan pengayak, lumpang, botol kocok 100 mL, pipet volume 10 mL, pipet ukur 5 mL, tabung reaksi, batang pengaduk, statif, klem dan corong.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu tanah di wilayah perkotaan Makassar, air liur anjing liar (species *Labrador Retriever*), aquadest, Amonium asetat ($\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$) 1 N, asam borat (H_3BO_3) 1%, asam klorida (HCl) 0.0997 N, asam sulfat (H_2SO_4) p.a dan H_2SO_4 0.0997 N, alkohol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), ammonium ferrosulfat $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 0,2 N, calgon (NaPO_3) 0.05%, campuran selenium, *Etilen*

diamin tetra acetic acid (EDTA) ($C_{10}H_{16}N_2O_8$) 0.0198 N, indikator Eriochrome Black T (EBT), indikator *Conway*, indikator diphenilamin , kalium sianida (KCN) 4%, Kalium dikromat ($K_2Cr_2O_7$) 1 N, magnesium oksida, media *buffered pepton water* (BPW), media *plate count agar* (PCA), natrium hidroksida (NaOH) 4%, pewarna fosfat , trietanolamin (TEA), .

C. Prosedur kerja

1. Pengambilan sampel tanah

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah metode komposit dimana dilakukan pengambilan sampel dari 3 titik yang berbeda kemudian digabungkan berdasarkan kedalaman. Pada penelitian ini digunakan 2 variasi berdasarkan tingkat kedalaman yakni 0 cm dan 30 cm. Waktu, Tempat dan Suhu dicatat. Kemudian sampel tanah dimasukkan kedalam wadah tertutup (Evianti, 2012).

2. Preparasi Sampel

Sampel diratakan di atas permukaan datar yang bersih kemudian di beri kode untuk tiap sampel. Akar, sisa tanaman, bebatuan dan kotoran lain dibersihkan dari sampel. Disimpan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari. Sampel yang akan dianalisa diayak terlebih dahulu menggunakan lumpang agar teksturnya menjadi lebih halus (Eviati dan Sulaeman 2009).

3. Uji sifat fisik tanah

a. Warna tanah

Mengambil tanah kota sebanyak 5 gram lalu mencocokkan tanah dengan warna pada buku munsell soil colour chart dan mencatat kode warna tanah di mulai dari hue, value dan croma (Margolang, 2015).

b. Tekstur tanah

Metode yang digunakan pada uji tekstur ialah metode pipet. Tanah kota ditimbang sebanyak 20 gram dan dimasukkan ke dalam botol tekstur. Larutan calgon 0,05% ditambahkan sebanyak 10 mL dan aquades hingga batas leher botol lalu didiamkan sampai semalam. Setelah itu sampel tanah dipindahkan kedalam gelas ukur 1000 mL menggunakan saringan berdiameter 0,05 mm dan dibersihkan dengan botol semprot yang berisi aquades untuk memisahkan pasir. Ampas pasir yang tertinggal di saringan dipindahkan ke dalam cawan dan dikeringkan selama 24 jam pada oven dengan suhu 105°C. Setelah itu dihomogenkan sampel yang berada di dalam gelas ukur menggunakan pengaduk besi selama 1 menit dan hidrometer dimasukkan ke dalam suspensi setelah beberapa detik hidrometer dibaca dan dicatat H1, lalu termometer dimasukkan dibaca dan dicatat suhu sebagai T1. Setelah di dapatkan H1 dan T1 suspensi tanah didiamkan selama 8 jam untuk mendapatkan H2 dan T2 (Evianti, 2012).

Perhitungan:

a) Berat debu liat

$$= H1 + 0.3 \times (T1 - 19.8) - 0.5$$

b) Berat liat

$$= H2 + 0.3 \times (T2 - 19.8) - 0.5$$

c) Berat debu

$$= \text{Berat debu liat} - \text{Berat liat}$$

d) % Pasir = $\frac{\text{massa pasir}}{\text{massa pasir} + \text{liat} + \text{debu}} \times 100\%$

$$e) \% \text{ Debu} = \frac{\text{massa debu}}{\text{massa pasir} + \text{liat} + \text{debu}} \times 100\%$$

$$f) \% \text{ Liat} = \frac{\text{massa debu}}{\text{massa pasir} + \text{liat} + \text{debu}} \times 100\%$$

Keterangan:

H1= Pembacaan pada hydrometer sebelum didiamkan

H2= Pembacaan pada hydrometer setelah didiamkan

S1= Suhu sebelum didiamkan

S2= Suhu setelah didiamkan

0.3, 19.8, dan 0.5= titik kesalahan skala pada gelas ukur

c. Kadar Air Tanah

Sebanyak 1,000 gram sampel tanah kebun ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C sampai bobot konstan tercapai, Pengerjaan dilakukan sebanyak tiga kali ((Evianti, 2012).

Perhitungan:

$$\% \text{ Kadar air} = \frac{(\text{bobot cawan+sampel}) - (\text{bobot cawan+sampel stlh pmnsan})}{\text{bobot sampel}} \times 100\%$$

Uji sifat kimia tanah

a. pH tanah

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Sampel tanah ditimbang seberat 10 g kemudian dimasukkan ke wadah yang berisi aquades 50 mL, dihomogenkan selama 30 menit kemudian pH suspensi diukur menggunakan pH meter. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali (Irfan, 2014).

b. Analisis N-Total

Metode yang digunakan pada analisa ini ialah metode kjehldal, Sampel tanah kebun ukuran (<0,5) mm ditimbang 0.500 gram dan dimasukkan ke dalam tabung digest. Sebanyak 1 gram campuran selen dan 3 mL asam sulfat pekat ditambahkan, lalu dilakukan dekstruksi selama 3-4 jam hingga suhu 350°C. Ketika uap putih mulai muncul dekstruksi dapat dihentikan sehingga ekstrak jernih didapatkan. Tabung diangkat dan didinginkan. Setelah itu ekstrak didinginkan lalu diencerkan dengan 50 mL aquades dan diaduk hingga homogen. Setelah itu dilakukan proses destilasi, hasil dekstruksi dimasukkan kedalam kjeltec tabung dan di masukkan beberapa batu didih. Penampung hasil destilasi disiapkan dengan menggunakan erlenmeyer yang berisi 10 mL asam borat 1% dan ditambahkan 3 mL indikator Conway lalu dihubungkan dengan alat destilasi, proses destilasi dilakukan hingga volume mencapai 50-75 mL dan terjadi perubahan warna larutan menjadi hijau. Hasil destilat dititrasi menggunakan H₂SO₄ 0,0997 N hingga warna merah muda. volume titar contoh (V_c) dan blanko (V_b) dicatat, pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali (Eviati, 2012).

Perhitungan:

$$\%N\text{-total} = \frac{(V_c - V_b) \times N_{H_2SO_4} \times Bst\ N}{Mg\ sampel} \times 100\%$$

Keterangan:

V_c: volume titrasi sampel (mL)

V_b: volume titrasi blanko (mL)

N: Normalitas H₂SO₄ (meq/mL)

Bst N: Berat equivalen Nitrogen (14.007 mg/meq)

c. Penetapan C-Organik

Metode yang digunakan pada analisa ini ialah walkley & Black dengan cara sampel tanah kebun ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. Setelah itu ditambahkan larutan $K_2Cr_2O_7$ sebanyak 5 mL dan H_2SO_4 sebanyak 5 mL, lalu didiamkan selama beberapa menit hingga dingin, setelah dingin ditambahkan aquades sebanyak 100 mL dan 3 tetes indikator *diphenilamin*. Selanjutnya dititrasi dengan larutan ammonium ferosulfat 0.2 N hingga terjadi perubahan warna menjadi hijau. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali (Eviati, 2012).

Perhitungan:

$$\% \text{ C-Organik} = \frac{(\text{mL blanko} - \text{mL titrasi}) \times N \times 1.33 \times 3}{\text{mg sampel}} \times 100\%$$

Keterangan:

- N : Normalitas ammonium ferosulfat 0.2 meq/mL
- 1.33 : Faktor koreksi C
- 3 : Berat equivalen Carbon 3 mg/meq

d. Kapasitas tukar kation (KTK)

Sebanyak 5 gram tanah kebun ditimbang dan dimasukkan kedalam roll film. Amonium asetat sebanyak 20 mL ditambahkan dan didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring, filtrat pada hasil saringan digunakan untuk pengukuran Ca dan Mg sedangkan residu pada hasil saringan digunakan untuk analisis nilai KTK yang dilanjutkan dengan metode destilasi. Residu dipindahkan ke dalam labu didih dan ditambahkan alkohol 25 mL, magnesium oksida 25 mL dan NaOH 4% 25 mL. Penampung untuk NH_3 yang dibebaskan disiapkan dengan erlenmeyer yang berisi 10 mL asam borat 1% dan ditambahkan 3 tetes indikator Conway lalu dihubungkan dengan alat destilasi. Hentikan destilasi selama 5-7 menit atau sampai terjadinya perubahan warna dari

merah tua ke biru. Setelah itu dititrasi menggunakan HCl 0.0997 N hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda dan dicatat volume titrasi. dilakukan sebanyak 3 kali (Eviati, 2012).

Perhitungan:

$$\text{KTK} = (\text{mL penitar} - \text{mL blanko}) \times \text{N HCl} \times 0.1 \times \left(\frac{1000}{\text{g sampel}}\right)$$

Keterangan:

0.1 = konversi mmol ke cmol
 1000/g sampel= konversi dari gram ke kilogram contoh
 N HCl = Normalitas HCl 0.0997 N

e. Penentuan kandungan Ca dan Mg

Hasil filtrat dari saringan KTK dimasukkan kedalam erlenmeyer dan dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) untuk analisis Ca dan (2) untuk analisis Mg. Masing-masing ditambahkan larutan EDTA sebanyak 1 mL, kalium sianida (KCN) 4% 1 mL dan trietanolamin (TEA) sebanyak 1 mL ke dalam erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan indikator calgon untuk uji Ca dan indikator EBT untuk uji Ca dan Mg. Larutan dititrasi dengan EDTA 0.0198 N hingga terjadi perubahan warna dari biru ke ungu untuk Ca dan ungu ke biru untuk Mg, dicatat hasil volume yang diperoleh. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali (Eviati, 2012).

Perhitungan:

$$\text{Ca} = \frac{\text{mL penitar Ca} \times \text{N EDTA} \times \text{fp} \times \text{fk}}{\text{g sampel}}$$

$$\text{Mg} = \frac{\text{mL penitar Ca Mg} - \text{mL penitar Ca} \times \text{N EDTA} \times \text{fp} \times \text{fk}}{\text{g sampel}}$$

Keterangan:

N EDTA: Normalitas EDTA 0.0198 NS

Fp : Faktor pengenceran

Fk : Faktor koreksi

f. Penentuan P_2O_5

Metode yang digunakan pada analisa ini ialah metode olsen. sampel tanah kebun sebanyak 1 gram ditimbang kemudian ditambahkan 20 ml pengeksrak olsen, lalu dikocok selama 30 menit setelah itu disaring. Jika larutan masih terlihat keruh maka larutan dikembalikan lagi ke atas saringan semula. Sebanyak 2 ml ekstrak dipipet ke dalam tabu reaksi selanjutnya bersama deret standar ditambahkan 10 mL pereaksi pewarna fosfat lalu dihomogenkan dan dibiarkan 30 menit. Absorbansi larutan diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 889 nm (Eviati., dkk, 2009).

Perhitungan:

$$P_2O_5 = \text{Ppm kurva} \times \frac{\text{mL ekstrak}}{1000\text{mL}} \times \frac{1000 \text{ g}}{(1 \text{ gram})} \times \text{fp} \times \frac{\text{Mr } P_2O_5}{\text{Mr } 2 PO_4} \times \text{fk} \times 5$$

Keterangan:

Ppm kurva: kadar sampel yang diperoleh dari kurva hubungan antara kadar deret standar dengan pembacaanya setelah dikoreksi blanko

Fp : faktor pengenceran

142/190 : faktor konversi bentuk PO_4 menjadi P_2O_5

5 : g contoh

g. Pengujian tanah terhadap air liur anjing menggunakan metode swab

Sampel yang akan di swab ialah bejana yang telah dijilat oleh anjing. Melakukan swab pada jilatan air liur anjing sebelum dilakukan pembilasan kemudian dilakukan pembilasan pertama dengan campuran tanah dan aquadest lalu diswab. Pada bilasan kedua dibilas dengan menggunakan aquadest lalu dilakukan seterusnya pembilasan dengan aquadest sampai bilasan ke 7 lalu diswab. Hasil dari swab dimasukkan ke 3 tabung reaksi yang didalamnya berisi 10 mL larutan 0.1% buffered pepton water lalu dihomogenkan. Selanjutnya tiap-tiap tabung reaksi dibuat pengenceran 1:10. Selanjutnya 1 mL larutan pengenceran 10^{-1} dipipet lalu dibiakkan pada media PCA dengan metode agar tuang (40-50%) dan diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam dan dilanjutkan dengan perhitungan jumlah bakteri yang tersisa pada bilasan ke 1,2 dan 7 (Handi, 2008).

$$\text{Jumlah koloni (cfu/mL)} = \text{jumlah koloni} \times \text{faktor pengenceran}$$

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik sifat fisik tanah wilayah perkotaan

Sifat fisika merupakan suatu perubahan yang dapat dilihat langsung dengan indra penglihatan. Hasil uji sifat fisika tanah di wilayah perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Uji Sifat fisik tanah wilayah perkotaan

Parameter	Kedalaman cm	
	0	30
Warna	Very dark gray	Black
Tekstur	Lempung berpasir	Lempung berpasir
Kadar air	2.13% ± 0,43	1.62% ± 0,04

2. Karakteristik sifat kimia Tanah wilayah perkotaan

Sifat kimia merupakan sifat yang dihasilkan dari perubahan kimia yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Hasil uji sifat kimia tanah di wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Sifat kimia tanah wilayah perkotaan

Parameter	Kedalaman cm	
	0	30
pH	7.03 ± 0.63	6.88 ± 0.85
N-Total	0.88% ± 0.04	0.17% ± 0.04
C-Organik	2.81% ± 0.02	2.77% ± 0.02
KTK	7.98 cmol/kg ± 1.42	7.98 cmol/kg ± 1.94
Ca	14.89 cmol/kg ± 1.14	2.77 cmol/kg ± 0.02
Mg	2.22 cmol ± 0.52	1.98 cmol/kg ± 0.33
P2O5	9.76 ppm ± 1.02	7.93 ppm ± 1.35

3. Hasil Uji SWAB pembersihan air liur anjing menggunakan tanah

Hasil uji swab pembersihan bekas jilatan air liur anjing pada bejana menggunakan tanah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3. Hasil Analisis Uji Swab

Kedalaman Tanah cm	Jumlah Bakteri		
	Perlakuan 1	Perlakuan 2	Perlakuan 3
0	50	10	-
30	70	-	-

Ket. Perlakuan 1 = tanpa bilasan
 Perlakuan 2 = bilasan 1 kali tanah
 Perlakuan 3 = bilasan air 6 kali

B. Pembahasan

Tanah kota merupakan lapisan permukaan bumi yang terletak di wilayah padat penduduk atau yang sering disebut tanah perkotaan. Tanah kota juga memiliki sifat yang bervariasi antara lain sifat kimia, fisika, dan biologi akibat dari berbagai variasi tersebutlah yang menyebabkan tanah mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda-beda (Taufaila dan Syamsu, 2014). Secara fisik tanah kota selain berperan sebagai tempat pemukiman, tanah wilayah kota juga berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan produksi berbagai macam tumbuh-tumbuhan karena tanah kota mengandung banyak unsur hara maupun mineral (Taufaila dan Syamsu, 2014).

Anjing merupakan salah satu jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan peliharaan oleh manusia. Hal tersebutlah yang mengakibatkan potensi terkontaminasi oleh air liur anjing yang lebih besar. Air liur anjing dalam pandangan islam merupakan najis besar sehingga disyariatkan untuk membersihkan dengan air dan tanah. Tanah yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah perkotaan. Tanah

perkotaan adalah salah satu jenis tanah yang ada di seluruh Indonesia yang tergolong lempung berpasir. Tanah perkotaan yang digunakan sebagai sampel diambil dari daerah jalan Sunu kota Makassar.

Tanah perkotaan diambil pada dua titik dan dua kedalaman kemudian dikompositkan pada tiap kedalaman yaitu lapisan atas (0 cm), dan kedalaman (30 cm). Pengambilan sampel pada dua lapisan tanah ini bertujuan untuk diperoleh antibakteri dari jenis *Actinomycetes* terutama *Streptomyces* yang dapat menghambat aktivitas bakteri dari air liur anjing. Tanah dalam islam memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu dapat menghilangkan najis yang ada pada air liur anjing. Tanah digunakan karena di dalam tanah terdapat antibakteri (Alwi, dkk., 2012). Untuk mengetahui kandungan pada tanah dilakukan uji pendahuluan terlebih dahulu.

1. Sifat fisika Tanah Kota

a. Warna Tanah

Warna tanah merupakan sifat morfologi yang paling mudah di bedakan. Warna merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah seperti warna hitam menunjukkan kandungan bahan organik yang tinggi. Hal ini sesuai berdasarkan pernyataan Hakim, dkk (1986) adanya bahan organik yang berlebih pada permukaan tanah akan memberikan warna tanah yang semakin gelap. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat tanah yang berada di permukaan memiliki warna yang cenderung gelap dibanding dengan lapisan tanah yang lebih bawah, pada tanah kota kedalaman 0 cm memiliki warna abu-abu sangat gelap dengan value 3/1 Very dark grey (7,5 YR) berarti nilai hue = 7,5 YR, value 3 dan chroma 1 sedangkan pada kedalaman 30 cm memiliki warna hitam dengan value 2,5/1 Black (7,5 YR) berarti nilai hue = 7,5 YR, value 2,5 dan chroma 1.

Berdasarkan nilai yang diperoleh tanah perkotaan (0 cm) memiliki nilai value dan chroma yang lebih besar dibandingkan dengan tanah kota (30 cm). hal tersebut mengindikasikan bahwa tanah kota pada permukaan (0 cm) memiliki warna yang lebih terang dibandingkan dengan tanah kota 30 cm. hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilyin (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisik warna tanah pada lahan kebun tanaman karet cenderung gelap. Sehingga, perbedaan warna tersebut diprediksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, kandungan bahan organik, sehingga warna yang semakin gelap memiliki kandungan bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang lebih terang.

b. Tekstur tanah

Tekstur tanah merupakan perbandingan antara jumlah kandungan pasir, debu dan liat pada tanah (Harahap, 2014). Pengujian tekstur dapat ditentukan dengan beberapa metode salah satunya dengan metode pipet. Metode pipet merupakan metode pengambilan contoh sampel tanah dalam suspensi langsung menggunakan pipet berdasarkan kedalaman h dan waktu t (Agus, dkk, 2006).

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa tanah perkotaan 0 dan 30 cm memiliki tekstur lempung berpasir. Pada tanah lempung berpasir rentang lebih rendah akan bahan organik (Sunardji, 2012). Berdasarkan penelitian (Sinaga, 2014) tanah tekstur pasir memiliki luas permukaan yang kecil oleh karena itu tingkat menahan dan menyerap air cukup rendah.

c. Kadar Air

Kadar air dilakukan untuk mengetahui banyaknya air yang terkandung di dalam suatu sampel yang dinyatakan dalam persen (Winarti, 2014). Prinsip dari uji kadar air yaitu dengan menggunakan oven, air yang terdapat pada sampel akan menguap apabila dipanaskan pada suhu 105°C dengan waktu tertentu. Sehingga

untuk mengetahui jumlah kadar air yang dihasilkan yaitu perbedaan antara berat sebelum dengan sesudah dipanaskan (Aventi, 2015).

Berdasarkan tabel 4.1 hasil yang diperoleh untuk kedalaman 0 cm yaitu 2,13% dan kedalaman 30 cm yaitu 1,62%. Hasil ini menunjukkan kadar air pada tanah perkotaan termasuk besar sehingga dapat menyebabkan kurangnya *Actinomyces* yang tumbuh dalam tanah, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Jannah, dkk (2013) yang menggunakan sampel tanah sawah kadar air yang diperoleh rendah yaitu 0,94%. *Actinomyces* pada tanah yang berfungsi sebagai antibakteri pada tanah akan tumbuh sempurna dengan nilai kelembaban atau kadar air yang rendah yaitu kurang dari 0,98% (Jannah, dkk., 2013). Sedangkan adapun hasil yang diperoleh dari analisis kadar air atau kelembaban tanah perkotaan yaitu lebih dari 0,98%.

2. Sifat Kimia Tanah Kota

a. pH

Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H^+ dalam larutan tanah. Adapun nilai pH optimum pada bakteri umumnya yaitu 4 - 9, namun ada beberapa spesies bakteri yang dapat tumbuh pada keadaan asam atau alkalin (Hajoeningtjas dalam Irfan 2014). Penentuan pH tanah perkotaan merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas ion hydrogen dalam larutan air tanah dan mengukur keasaman tanah. Tanah asam dapat disebabkan karena tingginya H^+ daripada OH^- , sedangkan apabila OH^- lebih tinggi dari H^+ maka tanah akan menjadi basa. Ion H^+ yang tinggi disebabkan dari hasil dekomposisi anaerob oleh mikroba tanah (Irfan, 2014). Analisis pH dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap mikroorganisme yang ada pada tanah salah satunya *Actinomyces* (Sari, 2012 dalam Jannah, 2013).

Hasil penelitian yang diperoleh, rata-rata nilai pH tanah perkotaan pada tanah permukaan yaitu 7,03, tanah kedalaman 30 cm yaitu 6,88 (Tabel 4.2). Nilai pH tanah perkotaan ini menunjukkan nilai pH yang hampir netral. Tanah perkotaan yang mempunyai rata-rata pH tersebut disebabkan karena daerah pembentukan tanah tersebut yang berada di dekat aliran air warga. Air pada umumnya mempunyai pH yang netral sehingga air tersebut juga dapat mempengaruhi tanah yang berada di sekitarnya. pH tersebut dapat mendukung pertumbuhan Actinomycetes karena actinomycetes lebih menyukai daerah pH netral dan asam daripada alkalin dengan rentan pH 6.5-8.0 (Ambarwati, 2010).

Berdasarkan penelitian Irfan (2014) yang mengukur pH tanah gambut perkebunan kelapa sawit 6 tahun di kab. Kampar Riau yang hampir sejenis dengan tanah perkotaan menunjukkan hasil nilai pH yang lebih dalam lapisan tanahnya menunjukkan nilai pH semakin asam. Tingginya ion H^+ pada tanah dapat disebabkan oleh hasil dekomposisi bakteri anaerob yang menghasilkan asam-asam sehingga pH tanah menjadi asam. Seperti halnya pada penentuan nilai pH tanah perkotaan ini, semakin dalam lapisan tanah maka nilai pH tanah tersebut akan semakin asam (Suwondo dalam Irfan, 2014).

b. N- Total

Nitrogen adalah unsur yang kebanyakan bersumber dari dekomposisi bahan organik, dimana besarnya kadar nitrogen dari proses dekomposisi tergantung pada kualitas dan kuantitas bahan organik yang ada dalam tanah. Selain itu nitrogen juga banyak berasal dari hujan dan irigasi (Fahmi, 2013; Luhung, 2014).

Penentuan kadar N-total pada tanah perkotaan dilakukan dengan menggunakan metode Kjeldhal. Analisis ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap destruksi, destilasi dan titrasi. Tahap destruksi yaitu senyawa nitrogen organik akan

teroksidasi dalam lingkungan asam sulfat dengan bantuan katalis campuran selenium yang akan membentuk $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Setelah itu sampel didestilasi dengan menggunakan NaOH 40% sehingga ekstrak tanah menjadi basa. Larutan hasil destilasi ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi asam borat 4% dan indikator BCG:MM yang akan mengikat NH_3 yang bebas. Kemudian menentukan jumlahnya dengan cara titrasi menggunakan HCl (Eviati dan sulaeman, 2009).

Kadar nitrogen pada tanah memiliki keterkaitan dengan pH yaitu apabila kadar nitrogen pada tanah sekitar 0,21% - 0,50% maka kadar nitrogen dapat dikatakan sedang dengan pH netral, jika nilai berkisar antara 0,10% - 0,20% kadar nitrogen dikatakan rendah dengan pH agak asam, sedangkan apabila kadar nitrogen kurang dari 0,10% maka dapat dikatakan kadar nitrogen sangat rendah dengan pH asam (Suhariyono, 2005 dan Yumani, 2010).

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk tanah kedalaman 0 cm kadar nitrogen yang diperoleh yaitu 0,08 % kadar ini termasuk rendah dengan pH netral, kedalaman 30 cm kadar nitrogen yang diperoleh yaitu 0,17 % kadar ini termasuk rendah dengan pH yang hampir netral.

c. C-Organik

C organik bersumber dari bahan organik yaitu sisa-sisa tanaman maupun fosil hewan. Banyaknya c-organik berpengaruh pada aktifitas mikroorganisme dalam mendekomposisi tanah dan nantinya akan menghasilkan unsur hara seperti nitrogen namun kandungan c-organik jika dalam keadaan berlebih maka akan menghambat aktifitas mikroorganisme (Sukaryorini, 2016).

Berdasarkan pada Tabel 4.2 tanah kota didapatkan kadar c organik sebesar 2.81% dan kedalaman 30 sebesar 2.77%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kandungan c organik pada setiap tanah tergolong sedang yang menunjukkan kualitas

tanah yang baik. Berdasarkan pernyataan Lowery (1996) dalam Irundu (2008) bahwa tanah dengan nilai bahan organik $<2\%$ dan $>8\%$ dikategorikan sebagai tanah yang tidak sehat.

d. Kapasitas Tukar Kation

Kapasitas tukar kation ialah kemampuan tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation. Jika nilai KTK semakin besar maka semakin besar ikatan ion antara ion positif pada dinding sel bakteri dan ion negatif pada permukaan tanah (Eriatna, 2017). Berdasarkan Tabel 4.1 pada tanah kota didapatkan nilai KTK pada kedalaman 0 cm dan 30 cm sebesar 7.98 cmol/kg. Dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa kandungan KTK pada tanah pada kedalaman 0 dan 30 cm memiliki kandungan KTK yang rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan nilai KTK rendah ialah disebabkan kurangnya kandungan liat pada tekstur yang dimiliki (Suleman, 2016), sehingga tanah kota yang bertekstur lempung berpasir memiliki kandungan KTK yang rendah sedangkan tanah sawah dan kebun yang bertekstur liat memiliki kandungan KTK yang tinggi.

e. Kadar Ca, Mg

Ca dan Mg merupakan unsur alkalis tanah yang sebagian besar termasuk unsure hara esensial. Unsur ini berperan dalam berbagai metabolisme enzim dalam tanaman yang akan habis karena diserap tanaman, terikat oleh kompleks adsorpsi tanah, diambil jasad renik, mengendap kembali sebagai endapan-endapan sekunder dan tercuci. Selain memenuhi kebutuhan tanaman, unsur ini juga akan mempengaruhi kebutuhan unsur lainnya seperti unsure hara mikro. Unsur di dalam tanah berasal dari mineral penyusun tanah dan berada dalam bentuk anorganik,

namun akan berasosiasi dengan materi organik dalam humus serta berhubungan dengan kemasaman tanah (Supriyadi, 2009 dan Utami, 2009).

Berdasarkan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kadar kalsium pada tanah perkotaan untuk kedalaman 0 cm diperoleh 14.89 cmol/kg, kedalaman 30 cm diperoleh 2.77 cmol/kg yang menyatakan semakin dalam tanah maka kadar kalsium pada tanah semakin meningkat. Adapun kadar magnesium pada tanah perkotaan yang diperoleh pada kedalaman 0 cm sebanyak 2.22 cmol/kg, kedalaman 30 cm sebanyak 1.98 cmol/kg. Sehingga semakin dalam tanah maka kadar magnesium pada tanah semakin berkurang. Kehilangan kalsium lebih besar daripada kehilangan magnesium, disebabkan karena bahan koloid tanah hampir selalu mengandung kalsium jauh lebih banyak daripada magnesium dalam keadaan dapat tertukar (Mulyono, dkk., 2015).

f. P_2O_5

Unsur fosfor merupakan unsur hara makro terpenting yang dibutuhkan bagi tanaman. Phosphor diserap tanaman dari tanah dalam bentuk fosfat, jumlah P tersedia dalam tanah ditentukan oleh besarnya P dalam kompleks jerapan yang ketersediaannya bergantung pada pH dan Jumlah bahan organik (Supangat, 2013). Pada tabel 4.2 memperlihatkan bahwa tanah kota pada kedalaman 0 cm kandungan fosfor sebesar 9.76 ppm dan pada kedalaman 30 cm sebesar 7.93 ppm. Dari data tersebut tanah kota memiliki jumlah P yang rendah. Rendahnya P diduga disebabkan karena rata-rata pH yang agak masam dan kandungan bahan organik yang tergolong tidak tinggi (Supangat, 2013).

3. Hasil Uji SWAB pembersihan air liur anjing menggunakan tanah di wilayah kota.


Uji swab merupakan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan swab steril atau cottombath yang dicelupkan kedalam media BPW (buffer pepton water) dan ditumbuhkan di dalam media PCA (plate count agar). Kedua media ini mengandung nutrisi di dalamnya sehingga bakteri dapat tumbuh. Kemudian bakteri dalam media tersebut diinkubasi dan selanjutnya bakteri yang tumbuh pada media yang telah diinkubasi dihitung jumlah koloninya. Metode pencucian berdasarkan hadits HR.Muslim yaitu membilas 1 kali dengan tanah dan 6 kali dengan air.

Sebelum melakukan pengujian sampel tanah perkotaan yang akan digunakan dihaluskan terlebih dahulu agar mempermudah melakukan pembilasan pada bejana yang akan digunakan. Tanah digunakan karena tanah memiliki banyak antibakteri didalamnya salah satunya adalah *Actinomycetes*. *Actinomycetes* hidup sebagai solfofit dan aktif mendekomposisi bahan organik sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. *Actinomycetes* yang terdapat pada tanah akan dipengaruhi oleh karakteristik fisik, kadar bahan organik dan pH lingkungan (Kanti, 2005).

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh hasil akhir yang diberikan perlakuan berupa pencucian menunjukkan pada kedalaman 0 cm dan 30 cm bakteri pada media menghilang, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pencucian maka jumlah koloni semakin berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa tanah di wilayah perkotaan memiliki kemampuan dalam membersihkan air liur anjing akibat dari sifat fisik seperti warna tanah serta sifat kimia berupa nilai kapasitas tukar kation (KTK), C-organik dan pH pada tanah.

Warna tanah memiliki warna yang cenderung gelap sehingga akan mempengaruhi tingginya bahan organik (C-organik) (Hakim, dkk., 1986).kadar

c-organik akan mempengaruhi keberadaan aktifitas mikroorganisme. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses dekomposisi bahan dan sisa-sisa tanaman yang berfungsi sebagai nutrisi bakteri (Sukaryorini, 2016). Kadar pH juga mempengaruhi perkembangan suatu bakteri salah satunya bakteri actinomycetes yang memiliki rentang pH rata-rata 6,5-8 (Kanti, 2005). Bakteri ini terdapat pada tanah yang dapat menghasilkan senyawa antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lainnya, jadi hasil yang diperoleh berdasarkan sifat fisika dan kimia bahwa tanah di wilayah perkotaan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri air liur anjing berdasarkan hadis riwayat muslim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik sifat fisik dan kimia tanah di wilayah perkotaan bergantung pada iklim, jenis tanah, curah hujan serta fungsi pemanfaatan warga.
2. Tanah wilayah perkotaan berpotensi sebagai pembersih air liur anjing yang berkaitan berdasarkan sifat fisik dan kimia yang dimiliki.

B. Saran

Perlunya pada penelitian selanjutnya menggunakan tanah yang lebih segar agar berpotensi sebagai pembersih air liur anjing dengan karakteristik sifat fisik dan kimia yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Alwi, Muhammad, dkk. "Identifikasi Actinomycetes yang Terdapat pada Tanah di Sekitar Danau Lindu Sulawesi Tengah". *J. Biocelebes* 6, no 1 (2012): h. 1-10.

Ash-Shiddieq, Teungku Muhammad Hasbi. "Koleksi hadis – Hadis Hukum 1"

Ambrawati dkk. "Uji Aktivasi Antibakteri Isolat Actinomycetes dari Tanah Pekarangan terhadap *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*". *Laporan Penelitian Dosen* (2010): h. 1-12.

Aventi. "Penelitian Pengukuran Kadar Air Buah.". Penelitian Pengukuran Kadar Air Buah". *J. Seminar Nasional Cendekiawan Nasional*. ISSN: 2460-8696.(2015).h: 12-27.

Eviati dan Sulaeman. "Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk". Bogor. Balai Penelitian Tanah. 2009.

Fahmi, Arifin dan Bostang "Peran Gembut Terhadap Nitrogen Total Tanah di Lahan Rawa". *J. Berita Biologi* 12 (2). (2013):h. 223-2230.

Faturrahmi. "Analysis Of Mineral Contents Ca, Mg, Fe and Na in Natural Bentonite Clay". *J. Natural* 12, no 1 (2012):h.32-36.

Hakim, Jefry. "Tanah dan Sabun Tanah Sebagai Antimikroba Terhadap Air Liur Anjing". Skripsi Bogor: Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor, 2008.

Handi Abdullah. "Tanah Steril dan Sabun Cair Tanah Steril Sebagai Anti Mikroba Terhadap Air Liur Anjing" Skripsi. Bogor: Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, 2008.

Harahap, Elli, Nur Azizah dan Ahmad Affandi NST. "Menentukan tekstur tanah dengan metode perasaan di lahan politani". *Ecopedon* 2. No. 2 (2014): h. 13-15.

Imbran, Fierlan Febrian. "Dog Shelter Yogyakarta dengan Pendekatan Perilaku Lingkungan". Skripsi. Yogyakarta: Teknik. Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Irfan, Mokhamad. "Isolasi dan Enumerasi Bakteri Tanah Gambur di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tambang Hijau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" *J. Agroteknologi* 5, no 1 (2014): h. 1-8.

- Jannah, Fatah Miftakhul. Uji Aktivasi Isolat Actinomyces dari Tanah Sawah Sebagai Penghasil Antibiotik". *Naskah Publikasi*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Jovita, Deborah. "Analisis Unsur Makro (K, Ca, Mg) Mikro (Fe, Zn, Cu) pada Lahan Pertanian dengan Metode Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrofotometry (ICp-OES). *Skripsi*. Bandar Lampung: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Lampung, 2018.
- Krisnawati, Hana, dkk. "Streptomyces Penghasil Antibiotik yang Berasosiasi dengan Rhizofe Beberapa Spesies Mangrove". *J. Plasma* 1, no 2 (2015): h.59-70.
- Kristianingrum, Susila. "Kajian Berbagai Proses Destruksi Sampel dan Efeknya". *J. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*.(2012):h. 195-202.
- Kurniawan, Sheva Handy. "Pengaruh penggunaan Serat Plastik Terhadap Nilai Daya Dukung Tanah". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya, 2011.
- Luhung, Blendina. "Pengamatan Kandungan Unsur Hara Nitrogen, Fosfor, Kalium, Kalsium dan Magnesium serta pH tanah pada Kedalaman 60 cm di Hutan Sekunder Tua Bukit Soeharto". *Skripsi*. Manajemen Hutan. Samarinda: Manajemen Pertanian Politeknik Pertanian Negri Samarinda, 2009.
- Puryatiningsih, Retno Ayu. Isolsi Streptomyces dari Rizosfer Familia Poaceae yang Berpotensi menghasilkan antibiotic Terhadap *Escherichia coli*" *Farmasi*. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.
- Rahmah. Siti, Yusran dan Husain Umar. "Sifat kimia tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan di desa bobo kecamatan palopo kabupaten sugi". *Wartarimba* 2. No. 1 (2014): h. 88-95.
- Riyadi, Agung. "Analisis Hara Makro Tanah Satu Tahun Pasca Kebakaran pada Kawasan Hutan Konservasi Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan". *Skripsi*. Pekanbaru: Pertanian dan Peternakan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Baru. 2016.
- Sari, Tuti, dkk "Pembuatan sabun Padat dan sabun Cair dari Minyak Jarak". *Teknik Kimia* 17, no 1 (2010):h. 28-31.
- Suryani, Pika Sari dkk. "Sabun Tanah Berbentuk Kertas Ramah Lingkungan Sebagai Alternatif Praktis Penghilang Najis Air Liur Anjing". *Skripsi Bogor*: Institut Pertanian Bogor. 2013.
- Suhendar,dede."Fikih (Fiqh) air dan tanah dalam taharah (Thaharaj) menurut prespektif ilmu kimia.ISSN 1979-8911. X No. 1 (2017): h. 171-193

- Santoso, Irfan Pramudya dan Nedina Sari. "Desain *mobile Clinic* untuk Hewan pada Kawasan Urban (Objek Studi Hewan: Anjing)". *J. Tingkat Sarjana Senirupa dan Desain*, no. 1 (2015): h. 1-7
- Suharyono, Gatot dan Yulizon Menry. "Analisis Karakteristik Unsur-unsur dalam Tanah di Berbagai Lokasi dengan Menggunakan XRF". *J. Prosiding PPI-PDIPTN* (2012):h. 197-206.
- Supriyadi, Slamet. "Status Unsur-Unsur Basa (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , and Na^+) di Lahan Kering Madura" .*J. Agrovigor* 2, no. 1 (2009):h 35-41.
- Tama, Sukur Kusuma. "Struktur Bawah Pemukaan Tanah di Kota Lama Semarang Menggunakan Metode Geolistrik Resistivity Konfigurasi Schlumberger". Skripsi . Semarang: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Utami, Nur Hikmah. "Kajian Sifat Fisik, Sifat Kimia dan Sifat Biologi Tanah Paska Tambang Galian C pada Tiga Penutupan Lahan (Studi Kasus Pertambangan Pasir (Galian C) di Desa Gumulung Tinggoh, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat)". *Skripsi*. Bogor: Kehutanan Institut Pertanian Bogor'. 2009.
- Wijanarko, Andi, dkk. "Karakteristik Sifat Kimia dan Fisika Tanah Alfisol di Jawa Timur dan Jawa Tengah". *J. Iptek Tanaman Pangan* 2, no 2 (2007):h. 214-224.
- Williams, S.T, dkk. "Studies On The Ecology of Actinomicetes In Soil II. The pH Requirements Of Streptomyces From Two Acid Soils". *J. Soil Biol* 3 (1971): h. 187-195.
- Winarti, Eni. "Karakteristik Fisik Tanah dan Dinamika Kadar Air Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kebun Percobaan Cikabayan)". *Skripsi*. Bogor Pertanian. Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Yakin, Farid Nurul."Lapisan Tanah di Ruas Jalan Sampangan-Banaran Kecamatan Gunungpati Semarang Berdasarkan Data Geolistrik". Skripsi. Semarang: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Yuliani, M. Gandul Atik dkk. "Deteksi Virus Rabies Dalam Air Liur dan Otak Menggunakan Antibodi Protein G Sebagai Bahan Diagnostik dengan Teknik *Indirect Double Antibody Sandwich* ELISA". *J. Media Kedokteran Hewan* 3, no 3 (2007): h. 192-196.
- Yamani, Ahmad, "Analisis Kadar hara Makro dalam Tanah pada Tanaman Agroforestri di Desa Tambun Raya Kalimantan Tengah". *J. Analisis Kadar Hara*. 11, no 30 (2010): h. 37-46.

LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI



Gambar Tanah




Hasil Uji Swab tanah permukaan (0 cm)



Hasil Uji Swab kedalaman tanah 30 cm




Proses penjilatan anjing



Proses Pembilasan

LAMPIRAN 2
BAGAN KERJA PENELITIAN



LAMPIRAN 3
PERHITUNGAN

1. Penentuan Tekstur Tanah

Kode Sampel	Skala Pengukuran				Pasir
	H1	T1	H2	T2	
Tanah 0 cm	0	27.5	-1	29.3	8.8
Tanah 30 cm	0	27.5	-1	29.3	8.2

Tanah Kebun 0 cm

a. Berat debu liat

$$\begin{aligned}
 &= H1 + 0.3 \times (T1 - 19.8) - 0.5 \\
 &= 0 + 0.3 \times (27.5 - 19.8) - 0.5 \\
 &= 1.81
 \end{aligned}$$

b. Berat liat

$$\begin{aligned}
 &= H2 + 0.3 \times (T2 - 19.8) - 0.5 \\
 &= -1 + 0.3 \times (29.3 - 19.8) - 0.5 \\
 &= 1.35
 \end{aligned}$$

c. Berat debu

$$\begin{aligned}
 &= \text{Berat debu liat} - \text{Berat liat} \\
 &= 1.81 - 1.35 \\
 &= 0.46
 \end{aligned}$$

d. % Pasir

$$= \frac{\text{massa pasir}}{\text{massa pasir} + \text{liat} + \text{debu}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.8 \text{ gram}}{8.8 \text{ gram} + 1.35 \text{ gram} + 0.46 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 83\%$$

e. % Debu

$$= \frac{\text{massa debu}}{\text{massa pasir} + \text{liat} + \text{debu}} \times 100\%$$

$$= \frac{0.46 \text{ gram}}{8.8 \text{ gram} + 1.35 \text{ gram} + 0.46 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 4.3 \%$$

f. % Liat

$$= \frac{\text{massa liat}}{\text{massa pasir} + \text{liat} + \text{debu}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.35 \text{ gram}}{8.8 \text{ gram} + 1.35 \text{ gram} + 0.46 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 13\%$$

2. Penentuan pH Tanah

Perlakuan	pH Kedalaman (cm)	
	0	30
Simplo	6.96	6.79
Duplo	7.07	6.92
Triplo	7.07	6.95
Rata-Rata	7.03	6.88

Perhitungan :

$$\text{pH rata-rata} = \frac{\text{simplo} + \text{duplo} + \text{triplo}}{3}$$

$$= \frac{6.96 + 7.07 + 7.07}{3}$$

$$= 7.03$$

-Perhitungan yang sama dilakukan untuk pH kedalaman 30 cm.

3. Perhitungan kadar air tanah

Kedalaman	Perlakuan	Bobot cawan	Bobot cawan + Sampel	Bobot cawan + sampel setelah dipanaskan	Hasil
0 cm	Simplo	27,2393 gram	28,2437 gram	28,2254 gram	1,82%
	Duplo	40,7894 gram	45,7897 gram	45,6743 gram	2,30%
	Triplo	48,3580 gram	53,3585 gram	53,2328 gram	2,51%
30 cm	Simplo	32,3785 gram	33,8809 gram	33,3639 gram	1,6%
	Duplo	33,5748 gram	34,5775 gram	34,5610 gram	1,6%
	Triplo	48,3525 gram	49,3559 gram	49,3391 gram	1,6%

Perhitungan:

Simplo, tanah kedalaman 0 cm

$$\% \text{ Kadar air} = \frac{\text{bobot cawan+sampel}-\text{bobot cawan+sampel stlh pmnsan}}{\text{bobot sampel}} \times 100\%$$

$$\frac{28,2437 \text{ gram}- 28,2254 \text{ gram}}{1,0044 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 1,82\%$$

Perhitungan yang sama dilakukan untuk kadar air kedalaman 30 cm.

4. Perhitungan kadar N-total

Kode contoh	Vol titrasi sampel (mL)	Vol titrasi Blanko	Massa sampel (mg)	N	BST N	% N
Simplo (0cm)	0.3	0.1	500.00	0.0997	14.007	0.06
Duplo (0cm)	0.29	0.1	500.00	0.0997	14.007	0.05
Triplo (0cm)	0.6	0.1	500.00	0.0997	14.007	0.14
Simplo (30 cm)	0.68	0.1	500.00	0.0997	14.007	0.16
Duplo (30cm)	0.88	0.1	500.00	0.0997	14.007	0.22
Triplo (30 cm)	0.59	0.1	500.00	0.0997	14.007	0.14

Perhitungan:

Kode sampel (simplo, kedalaman 0 cm)

$$\begin{aligned} \% \text{ N-Total} &: \frac{(\text{mL titrasi} - \text{mL blanko}) \times \text{Normalitas} \times \text{Bst N}}{\text{mg sampel}} \times 100\% \\ &: \frac{(0.3 \text{ mL} - 0.1 \text{ mL}) \times 0.0997 \text{ N} \times 14.007 \text{ mg/meq}}{500 \text{ mg}} \times 100\% \\ &: 0.06\% \end{aligned}$$

-Perhitungan yang sama dilakukan untuk kedalaman 30 cm\

5. Perhitungan kadar C-Organik

Kode Sampel	mL blanko	mL penitar	mg sampel	Normalitas	% C organik
Simplo(0cm)	36.50	1.5	1000 mg	0.2000	2.79
Duplo(cm)	36.50	1.3	1000 mg	0.2000	2.81
Triplo (cm)	36.50	1	1000 mg	0.2000	2.83
Simplo(30 cm)	36.50	2	1000 mg	0.2000	2.75
Duplo (30 cm)	36.50	1.6	1000 mg	0.2000	2.79
Triplo (30 cm)	36.50	1.6	1000 mg	0.2000	2.79

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \% \text{ C-Organik} &: \frac{(\text{mL blanko} - \text{mL titrasi}) \times \text{N} \times 1.33 \times 3}{\text{mg sampel}} \times 100\% \\ &: \frac{(36.50 \text{ mL} - 1.5 \text{ mL}) \times 0.2 \frac{\text{meq}}{\text{mL}} \times 1.33 \times 3}{10000 \text{ mg}} \times 100\% \\ &: \frac{27.93}{1000} \times 100\% \\ &: 2.79\% \end{aligned}$$

Perhitungan yang sama dilakukan untuk tanah 30 cm

6. Kapasitas Tukar Kation

Kode sampel	mL penitar	mL blanko	Normalitas	gram sampel	KTK (cmol/kg)
Simplo (0cm)	5.53	1.2	0.0997 N	5	8.63
Duplo (0cm)	4.39	1.2	0.0997 N	5	6.35
Triplo (0cm)	5.71	1.2	0.0997 N	5	8.98
Simplo (30 cm)	6.04	1.2	0.0997 N	5	9.65
Duplo (30cm)	5.44	1.2	0.0997 N	5	8.45
Triplo (30 cm)	4.14	1.2	0.0997 N	5	5.85

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{KTK} &: (\text{mL penitar} - \text{mL blanko}) \times \text{Normalitas} \times 0.1 \times \frac{1000}{\text{mg}} \\ &: (5.53 \text{ mL} - 1.2 \text{ mL}) \times 0.0997 \text{ N} \times 0.1 \times \frac{1000}{5} \\ &: 4.33 \text{ mL} \times 0.0997 \text{ N} \times 0.1 \times 200 \\ &: 8.63 \text{ cmol/kg} \end{aligned}$$

7. Penentuan Ca dan Mg

Kode Contoh	mL penitar Ca (a)	mL penitar Ca + Mg (b)	N	FP	FK	Gram Sampel	b-a	Ca	Mg
Simplo (0cm)	23.99	28.42	0.0198	7.5	20	5	4.43	14.25	2.63
Duplo (0cm)	27.29	31.35	0.0198	7.5	20	5	4.06	16.21	2.41
Triplo (0cm)	23.94	26.68	0.0198	7.5	20	5	2.74	14.22	1.63
Simplo (30cm)	22.3	25.42	0.0198	7.5	20	5	3.12	13.25	1.85
Duplo (30cm)	25.6	28.53	0.0198	7.5	20	5	2.93	15.21	1.74
Triplo (30 cm)	20.8	24.78	0.0198	7.5	20	5	3.98	12.36	2.36

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Kadar Ca: } & \frac{\text{mL penitar Ca} \times \text{N EDTA} \times \text{FP} \times \text{FK}}{\text{g sampel}} \\ & : \frac{23.99 \text{ mL} \times 0.0198 \text{ N EDTA} \times \frac{75}{10} \times 20}{5.00 \text{ gram}} \\ & : \frac{71.25}{5} \\ & : 14.25 \text{ cmol/kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Mg: } & \frac{\text{mL penitar Mg (b-a)} \times \text{N EDTA} \times \text{FP} \times \text{FK}}{\text{g sampel}} \\ & : \frac{(28.42 \text{ mL} - 23.99 \text{ mL}) \times 0.0198 \text{ N EDTA} \times \frac{75}{10} \times 20}{5.00 \text{ gram}} \\ & : \frac{13.1571}{5} \\ & : 2.63 \text{ cmol/kg} \end{aligned}$$

8. Penentuan P₂O₅


Diketahui:

Standar	ppm standar	abs (y)	x ²	y ²	x.y
0	0	0	0	0	0
1.00	0.01	0.024	0.0001	0.000576	0.00024
2.00	0.03	0.027	0.0009	0.000729	0.00081
3.00	0.05	0.037	0.0025	0.001369	0.00185
4.00	0.07	0.039	0.0049	0.001521	0.00273
5.00	0.09	0.052	0.0081	0.002704	0.00468
6.00	0.11	0.056	0.0121	0.003136	0.00616
7.00	0.13	0.059	0.0169	0.003481	0.00767
8.00	0.49	0.294	0.0455	0.013516	0.02414

2).Sampel

No.	Sampel	Absorbansi (y)
1	Simplo (0cm)	0.0582
2	Duplo (0cm)	0.0589
3	Triplo (0cm)	0.0520
4	Simplo (30 cm)	0.0546
5	Duplo (30cm)	0.0442
6	Triplo (30 cm)	0.0490

3). Grafik



4). Persamaan garis linear

- Nilai b

$$y = a + bx$$

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{(7 \times 0.02414) - (0.49 \times 0.294)}{(7 \times 0.0455) - (0.49)^2} \\
 &= \frac{0.16898 - 0.14406}{0.3185 - 0.2401} \\
 &= \frac{0.02492}{420.0784} 0.16898 - 0.14406
 \end{aligned}$$

$$b = 0.3178$$

-Nilai a

$$a = y_{rata-rata} - bx_{rata-rata}$$

$$a = 0.042 - 0.3178 \times 0.07$$

$$a = 0.0197$$

-Nilai R

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) ((n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2))} \\
 &= \frac{(7 \times 0.02414) - (0.49 \times 0.294)}{\sqrt{((7 \times 0.0455) - (0.2401)) ((7 \times 0.013516) - (0.086436))} \\
 &= \frac{0.16898 - 0.14406}{\sqrt{(0.3185 - 0.2401)(0.094612 - 0.086436)}} \\
 &= \frac{0.02492}{\sqrt{(0.0784)(0.008176)}} \\
 &= \frac{0.02492}{\sqrt{0.0006409984}} \\
 &= \frac{0.02492}{0.02531} \\
 R &= 0,9845
 \end{aligned}$$

-Konsentrasi kurva

Simplo tanah kota 0 cm

$$y = 0,02 + 03178x$$

$$0,0582 = 0,0197 + 0,3178x$$

$$0,3178x = 0,0582 - 0,0197$$

$$x = 0.12 \text{ ml/l}$$

Kadar P₂O₅ tersedia (ppm)

Kode contoh	ppm kurva	Fp	FK	P ₂ O ₅ (ppm)
Simplo (0cm)	0.12	1.00	1.11	10.26
Duplo (0cm)	0.13	1.00	1.11	10.45
Triplo (0cm)	0.10	1.00	1.11	8.63
Simplo (30 cm)	0.11	1.00	1.11	9.32
Duplo (30cm)	0.08	1.00	1.11	6.58
Triplo (30 cm)	0.09	1.00	1.11	7.85

Perhitungan:

P₂O₅ :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Ppm kurva} \times \frac{\text{mL ekstrak}}{1000\text{mL}} \times \frac{1000 \text{ g}}{(\text{g contoh})} \times \text{fp} \times \frac{\text{Mr P2O5}}{\text{Mr 2 PO4}} \times \text{fk} \times 5 \\
 &= 0.12 \text{ ppm} \times \frac{20\text{mL}}{1000\text{mL}} \times \frac{1000\text{g}}{1\text{g}} \times 1 \times \frac{142}{190} \times 1.11 \times 5 \\
 &= 0.12 \text{ ppm} \times 20 \times 1 \times 0.7473 \times 1.11 \times 5 \\
 &= 10,26 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

Perhitungan yang sama dilakukan untuk tanah kebun kedalaman 30 cm


1. Perhitungan koloni bakteri (cfu/mL)

Kode sampel	Jumlah bakteri (cfu/mL)		
	Perlakuan 1	Perlakuan 2	Perlakuan 3
Tanah 0 cm	50	10	-
Tanah 30 cm	70	-	-

Untuk tanah 0 cm pada perlakuan 3

Perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah koloni (cfu/mL)} &= \text{jumlah koloni} \times \text{faktor pengenceran} \\ &= 5 \times \frac{1}{10^{-1}} \\ &= 50 \text{ cfu/mL}\end{aligned}$$



LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi




Gambar Tanah

Hasil Uji Swab tanah permukaan (0 cm)



Hasil Uji Swab kedalaman tanah 30 cm



Proses penjilatan anjing



Proses Pembilasan

RIWAYAT HIDUP



Elmika Nesti lahir pada tanggal 18 Desember 1997 di Kabupaten Bantaeng. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ayahanda M. Amiruddin, S.Pd.I dan Ibunda Hariani. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri No. 28 Bangkalaloe pada tahun 2004 dan menamatkan pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPs DDI Mattoanging Bantaeng dan menamatkan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI Mattoanging Bantaeng. dan menamatkan pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur UMM dengan mengambil Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi dan mencapai gelar Sarjana Sains (S.Si) predikat memuaskan pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R