

**GAMBARAN HISTOLOGI USUS HALUS BROILER DENGAN
PENAMBAHAN PROBIOTIK *Lactobacillus plantarum* DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Pada Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SITI SORAYA ASTI

60300114023

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Soraya Asti
NIM : 60300114023
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai/ 10 Maret 1996
Jurusan/prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Perumahan Zarindah Permai blok G9 Samata, Gowa.
Judul : Gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Maret 2019 M
18 Rajab 1440 H

Penyusun,



Siti Soraya Asti

NIM: 60300114023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan”, yang disusun oleh Siti Soraya Asti, NIM: 60300114023, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Maret 2019 M, bertepatan dengan 18 Rajab 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 25 Maret 2019 M
18 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si (.....)

Munaqisy I : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. (.....)

Munaqisy II : Dr. Shuhufi Abdullah, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd. (.....)

Pembimbing II: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

NIP. 196912051993031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Setelah melalui proses pengerjaan yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini dapat juga terselesaikan. Untuk itu, penulis memanjatkan segala pujian dan rasa syukur tertinggi atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dialah Allah, Tuhan semesta alam yang mengajarkan kepada manusia semua ilmu di muka bumi ini.

Dia pulalah yang memberikan potensi kesuksesan kepada manusia. Memberikan akal, penglihatan, pendengaran dan hati kepada manusia untuk dapat meraih sesuatu yang diinginkan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada para Nabi, para Rasul dan pengikut mereka hingga akhir zaman. Salawat dan salam paling sempurna semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang tak kenal lelah menyampaikan risalah, amanat dan nasehat kepada seluruh manusia. Semoga Allah memberinya kebaikan, wasilah, keutamaan, kemuliaan dan kedudukan yang terpuji.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Tidak mungkin menyebutkan mereka satu persatu di sini. Meskipun begitu, pihak yang secara langsung terkait dan berjasa dalam pengerjaan tulisan ini harus disebutkan. Namun, penulis memohon pengertian mereka yang seharusnya disebutkan namun tak disebutkan karena keterbatasan ruang.

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam dan tulus kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Syarifuddin dan ibunda Nuriati yang senantiasa merawat dan mendidik penulis dari kecil hingga sekarang. Terutama bagi ibu penulis semoga Allah senantiasa memberikan tempat terbaik. Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih penulis tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya. Untuk ayahanda tercinta, pengertian, motivasi dan doa yang selalu engkau panjatkan senantiasa penulis ingat, kagumi dan hormati.

Selanjutnya, penulis sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku ketua jurusan Biologi serta sekretaris Jurusan Biologi atas segala ilmu, petunjuk serta arahnya selama berkuliah di UIN Alauddin.
4. Ibunda Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd selaku pembimbing I dan Ibunda St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik (PA) dalam penulisan skripsi yang senantiasa menyisihkan sedikit waktu-waktunya

yang berharga untuk membimbing penulis. Saran-saran serta kritik-kritik mereka sangat bermanfaat dalam merampungkan skripsi ini.

5. Ibunda Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. selaku pembahas I, yang telah memberikan saran, kritik dan bantuan baik dari segi moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Dr. Shuhufi Abdullah M.Ag selaku pembahas II.
6. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
7. Kepala Laboratorium dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan saya wadah dalam melakukan praktikum serta banyak pengenalan dan pengalaman dalam laboratorium.
8. Dokter Wahyuni dan staf di BB-VET Maros, maupun di Maros Pet Care Center & Petshop yang senantiasa membimbing selama penelitian berlangsung.
9. Kepada Kak Ati Staf di Jurusan Biologi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis. Senantiasa meluangkan waktunya dalam hal mengurus persuratan dan sebagainya.
10. Kepada Staf Akademik yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis. Senantiasa meluangkan waktunya dalam hal mengurus persuratan dan sebagainya.
11. Kepada adik saya Muhammad Aidil Putra dan 3 saudara lainnya yang selalu mengingatkan saya untuk rajin kerja skripsi.

12. Kepada saudara dan saudari dari ibu dan ayah saya Tante, Paman, sepupu yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. Kepada Ibunda mursalim yang senantiasa membantu menjaga ayam-ayam penulis baik dari segi memberi makan, dan lain sebagainya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
14. Saudara-Saudari seperjuanganku Tim Bal Ayam Wahyuni Mentari, Mursalim dan Rahmat Fajrin Alir yang senantiasa berjuang sama-sama, saling memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
15. Kepada teman se-Angkatan (LACTEAL) yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
16. Kakak-kakak Alumni dari angkatan Pioner sampai dengan Brachialis serta Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi Impuls, Imunoglobulin dan Inter Neuron atas bantuan, dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
17. Teman-teman KKN-57 di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bisappu, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
18. Kakak-Kakak, Teman-teman dan Adik-adik di HMI kom. Saintek cabang gowa raya Uinam yang telah memotivasi dan memaklumi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

19. Sahabat-sahabat saya Arifah Rahmania, Fitriany Aming, Nurcahaya, Atimah Nurdin, dan yang selalu ada saat suka maupun dukanya penulis.
20. Kepada Kak Silvana manan, Niyani Asmi Wahyuni dan Afdalia yang selalu saling memberi semangat satu sama lain selama pengurusan berkas sampai ujian tutup.
21. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya sehubungan dengan pengumpulan bahan-bahan untuk membuat skripsi ini.

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran, kritikan atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam skripsi ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, skripsi ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Gowa, 25 Maret 2019 M
18 Rajab 1440 H




SITI SORAYA ASTI
60300114023

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-7 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 8-25 |
| A. Ayat yang Relevan..... | 8 |
| B. Tinjauan Umum Broiler..... | 10 |
| C. Tinjauan Umum Probiotik | 13 |
| D. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat | 16 |
| E. Tinjauan Umum <i>Lactobacillus plantarum</i> | 18 |
| F. Tinjauan Umum Usus Halus..... | 20 |
| G. Tinjauan Umum Histologi Usus Halus | 22 |
| H. Kerangka Berfikir..... | 25 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 26-32 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 26 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 26 |
| C. Variabel Penelitian..... | 26 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 27 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 27 |

| | | |
|--------|---|-------|
| | F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)..... | 27 |
| | G. Prosedur Kerja..... | 28 |
| | H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 33-47 |
| | A. Hasil Penelitian | 33 |
| | B. Pembahasan..... | 39 |
| BAB V | PENUTUP..... | 48 |
| | A. Kesimpulan | 48 |
| | B. Saran | 48 |
| | KEPUSTAKAAN | 49 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | 54 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 67 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1. Hasil uji statistik luas villi ileum UNIANOVA..... | 34 |
| Tabel 4.2. Hasil uji statistik luas villi jejunum UNIANOVA..... | 36 |
| Tabe 4.3. Hasil uji statistik rerata bobot badan broiler UNIANOVA..... | 39 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar. 2.1. Broiler | 10 |
| Gambar. 2.2. <i>Lactobacillus plantarum</i> | 19 |
| Gambar. 2.3. Sistem pencernaan pada ayam broiler..... | 21 |
| Gambar. 4.1. Luas vili ileum (μm)..... | 33 |
| Gambar. 4.2. Luas permukaan vili ileum (μm) | 35 |
| Gambar. 4.3. Luas vili jejunum (μm)..... | 36 |
| Gambar. 4.4. Luas permukaan vili jejunum (μm) | 37 |
| Gambar. 4.5. rerata pertambahan bobot badan broiler..... | 38 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|-------------|--|----|
| Lampiran 1. | Rerata luas permukaan villi pada ileum (μm) Broiler | 55 |
| Lampiran 2. | Rerata luas permukaan villi pada jejunum (μm) Broiler | 55 |
| Lampiran 3. | Bobot dan pertumbuhan berat badan broiler (g/ekor)..... | 55 |
| Lampiran 4. | Hasil Uji Statistik <i>One Way Anova</i> vili ileum | 56 |
| Lampiran 5. | Hasil Uji Analisis <i>One Way Anova</i> vili jejunum | 57 |
| Lampiran 6. | Dokumentasi Penelitian | 59 |
| Lampiran 7. | Alat dan Bahan Penelitian..... | 62 |



ABSTRAK

Nama : Siti Soraya Asti

NIM : 60300114023

Judul Skripsi : **Gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Sebagai perlakuan adalah pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* secara oral masing-masing sebanyak 2 ml yang terdiri dari P₀ (Pemberian hanya dengan Aquadest), P₁ (Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dengan konsentrasi 10⁶), P₂ (Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dengan konsentrasi 10⁸), dan P₃ (Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dengan konsentrasi 10¹⁰). Pemeliharaan broiler dilakukan selama 35 hari untuk mengetahui luas vili usus halus (ileum dan jejunum) dan pertambahan bobot badan broiler. Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan software SPSS menggunakan uji ANOVA dan diuji lanjut apabila terdapat perbedaan diantara perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan tidak berbeda secara signifikan (P > 0,05) terhadap luas vili ileum dan jejunum, tetapi signifikan (P < 0,05) terhadap pertambahan bobot badan broiler. Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* hasil isolasi dari dangke tidak berpengaruh terhadap gambaran histologi usus halus (ileum dan jejunum), tetapi berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan broiler.

Katakunci: *Lactobacillus plantarum*, Histologi, Usus halus, Broiler.

ABSTRACT

Name : Siti Soraya Asti
SSN : 60300114023
Essay title : **Histology of broiler small intestine with the addition of probiotic lactobacillus plantarum and its effect on growth**

This research aimed to determine the histology of broiler small intestine with the addition of probiotics and its effect on growth. Broiler hematology status can be known by looking at blood levels. This research used completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 replications. As the treatment is giving *Lactobacillus plantarum* orally 2 milliliters each of them with consisting of P₀ (giving only with Aquadest), P₁ (giving of probiotics *L. plantarum* with concentration 10⁶ cfu/ml), P₂ (giving of probiotics *L. plantarum* with concentration 10⁸ cfu/ml), and P₃ (giving of probiotics *L. plantarum* with concentration 10¹⁰ cfu/ml). Broiler maintenance is carried out for 35 days determine the extent of small intestinal villi (ileum and jejunum) and the increase in broiler body weight. The data obtained were analyzed statistically using SPSS software and ANOVA test and tested further if there were differences in treatment. The result of research showed that in general the treatment did not differ significantly (P>0,05) on the extent of ileum and jejunal villi, but it was significant (P <0.05) in broiler body weight gain. Giving probiotics *L. plantarum* as a result of isolation from dangke didn't effect the histology of the small intestine (ileum and jejunum), but it affected the weight gain of the broiler body.

Keyword: *Lactobacillus plantarum*, Histology, Small intestine, Broiler.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Allah swt yang memiliki habitat, cara hidup dan perilaku, ukuran warna dan bentuk yang beragam. Dalam perspektif Al-qur'an hewan merupakan salah satu bagian dari ayat-ayat Allah swt yang harus dikaji dan direnungkan, karena dapat mengungkapkan tanda-tanda eksistensi dan kekuasaan Allah swt serta dapat memperkokoh keimanan bagi orang yang meyakinkannya. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. An-Nur/24: 45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۝٤٥

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air maka sebagian ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2016).

Allah swt menyebutkan tentang kekuasaan-Nya Yang Maha Sempurna dan pengaruh-Nya Yang Maha Agung dalam menciptakan makhluk-Nya yang beranekaragam bentuk, warna dan sepak terjangnya yang semuanya itu Dia ciptakan

dari satu air. “Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan diatas perutnya”, seperti ular dan hewan-hewan lainnya yang berbentuknya serupa. “Dan sebagian berjalan dengan dua kaki”, seperti manusia dan burung, ”Sedangkan sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki”, seperti hewan ternak dan hewan-hewan lainnya. Karena itu disebut dalam firman selanjutnya “Allah menciptakan apa yang dikehendakinya”, dengan kekuasaan-Nya, karena sesungguhnya apa yang dikehendaki-Nya pasti ada dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tiada. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan ”Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (Katsir, 2012).

Salah satu kutipan ayat diatas mengatakan bahwa “Dan sebagian berjalan dengan dua kaki”, seperti manusia dan burung. Salah satu hewan yang dimaksud adalah ayam broiler memiliki kelebihan dan kelemahan, kelebihan adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan penambahan bobot badan sangat cepat sedangkan kelemahannya memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi.

Ayam ras pedaging (broiler) merupakan jenis ternak unggas yang tujuan utama pemeliharaannya sebagai penghasil daging. Ternak ini terus mengalami kemajuan dalam seleksi genetic terutama pada aspek pertumbuhan. Hal tersebut menyebabkan broiler memiliki peran yang strategis dalam penyediaan sumber protein

hewani bagi masyarakat. Berdasarkan data BPS, daging broiler memberikan kontribusi sebesar 46,3% setiap tahun dari total produksi daging nasional.

Protein genetik broiler yang memiliki pertumbuhan yang cepat tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang maksimal. Dukungan eksternal yang dimaksud diantaranya kondisi lingkungan peternakan, kualitas pakan, bahan aditif atau suplemen, manajemen dan sumber daya manusia (peternak). Sedangkan kondisi internal, yaitu kondisi fisiologi dari ternak itu sendiri, seperti kondisi kesehatan dan perkembangan system pencernaan.

Saluran pencernaan merupakan tempat berlabuh berbagai macam microbial, seperti bakteri, fungi, protozoa, dan virus. Mikrobial tersebut memiliki peran dalam kesehatan dan pemanfaatan nutrisi bagi ternak diantaranya dalam proses pencernaan dan fermentasi bahan pakan, terutama pada ternak herbivora. Kondisi saluran pencernaan yang sehat dan baik menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan efisiensi absorpsi zat-zat makanan, sebagian besar proses absorpsi zat-zat makanan berlangsung pada usus halus. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk memperbaiki kondisi usus halus agar proses absorpsi zat-zat makanan menjadi maksimal. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi jumlah absorpsi zat-zat makanan pada bagian usus halus, diantaranya keberadaan mikroba. Keberadaan mikroba patogen pada usus halus secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas ternak. Mikroba-mikroba tersebut dalam jumlah yang dominan dapat mengganggu produktivitas ternak melalui toksin yang dihasilkan, memanfaatkan zat-zat makanan yang esensial untuk pertumbuhan unggas, dan menekan pertumbuhan

mikroba yang dapat mensintesa vitamin tertentu. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, maka penggunaan probiotik menjadi salah satu pilihan bagi produsen selama ini.

Penggunaan probiotik terbukti dapat memperbaiki produktivitas ternak dan meningkatkan pendapat produsen (peternak). Menurut Budiansyah (2004) pemberian probiotik pada ternak unggas dapat digunakan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kontaminasi mikroba penyebab penyakit (mikroba patogenik) terhadap produk-produk hasil unggas, sehingga unggas yang dihasilkan tetap higienis. Pemberian probiotik pada ayam pedaging (broiler) juga dapat memperbaiki pertumbuhan, angka konversi serta meningkatkan ketersediaan vitamin dan zat makanan lain. Dengan demikian pemberian probiotik pada ternak unggas diharapkan akan mampu memperbaiki penampilan produksinya baik kuantitas yaitu jumlah ternak, daging atau telur yang dihasilkan lebih banyak, maupun kualitasnya berupa produk yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah bakteri *Lactobacillus plantarum* sebagai probiotik.

Komposisi kimia daging adalah salah satu faktor penting dalam nutrisi manusia dan perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan makanan. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air adalah nutrisi penting yang jika digabungkan dalam proporsi yang benar menyebabkan hidup sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Pada penelitian ini probiotik *Lactobacillus plantarum* diperoleh dari hasil isolasi bakteri asam laktat yang terdapat pada limbah dangke.
2. Gambaran histologi (jejunum, ileum) usus halus broiler yang diuji dengan penambahan atau suplementasi bakteri asam laktat hasil isolasi dari pembuatan limbah dangke.
3. Pemeliharaan broiler dilakukan di Pannunjuang Desa Kalemandalle Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan penentuan gambaran histologi usus halus (jejunum dan ileum) broiler dilakukan di Balai Veteriner Maros.

D. Kajian Pustaka

1. Muh. Nur Hidayat (2008), tentang kajian Efektifitas *Bacillus* spp. Terhadap Performans Ayam Ras Pedaging. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendapatkan kemungkinan penggunaan *Bacillus* spp. sebagai probiotik dalam memperbaiki performans ternak ayam ras pedaging, (2) mengkaji

berapa dosis *Bacillus* spp. yang efektif dan efisien dalam memperbaiki performans ayam ras pedaging.

2. Sri Harimurti, Endang Sutriswati Rahayu (2009), tentang Morfologi Usus Ayam Broiler yang disuplementasi dengan probiotik strain tunggal dan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfologi usus ayam broiler yang disuplementasi probiotik strain tunggal dan probiotik campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplemen probiotik dengan strain tunggal maupun campuran meningkatkan tinggi vili pada duodenum, jejunum, dan ileum. Lebar vili pada deodenum, jejunum, dan ileum memiliki pola yang sama, dipengaruhi oleh suplementasi probiotik strain tunggal dan campuran, tetapi kedalaman *crypta* jejunum secara statis tidak berbeda nyata meskipun pada deodenum dan ileum berbeda secara signifikan.
3. Amirullah (2017), tentang Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Organ Dalam Pada Broiler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap organ dalam pada broiler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik cair tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap persentase hati, persentase usus halus, persentase ventrikulus dan persentase limfah tetapi berpengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap persentase proventrikulus, persentase jantung, persentase seka, persentase tembolok dan persentase usus besar.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi tentang gambaran histologi usus halus broiler dengan penambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
3. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian lain yang sejenis dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan Hadits yang Relevan

Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting dialam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan domba) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu, atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nectar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peran dalam bidang biologi maupun peran usaha dalam bidang peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum muslim, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al Hadits (Anonim, 2009).

Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang itu, dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunianya. Kami memberi kamu minum dari sebagian, yakni susu murni yang penuh gizi, yang ada dalam perutnya, dan juga selain sususnya, padanya yakni pada binatang-binatang ternak itu, secara khusus terdapat juga faedah yang banyak buat kamu, seperti daging, kulit dan bulunya. Semua itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan dan sebagian darinya atas berkah Allah, kamu makan dengan mudah lagi lezat dan bergizi. Diatasnya yakni terdiri atas punggung binatang-binatang itu, yakni unta dan juga diatas perahu-perahu

kamu dan barang-barang kamu diangkat atas izin Allah menuju tempat-tempat yang jauh (Shihab, 2002).

Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Mu'minin/23: 21 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahannya:

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Kementerian Agama RI, 2016).

Dalam surah Al-Mu'minin ayat 21 menjelaskan bahwa ternak memiliki banyak manfaat, seperti daging bahan konsumsi dalam pemenuhan gizi, susunya yang bisa diminum dan bernilai gizi tinggi, hasil ikutan lainnya seperti pupuk kompos, biogas, kulit, tulang dan lain sebagainya. Mahasuci Allah yang sangat bermanfaat bagi manfaat. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surah Al-Mu'minin ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur, dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Selain, itu ternak

merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan (Anonim, 2009).

B. Tinjauan Umum Ayam Broiler

Ayam broiler merupakan jenis ayam unggul dari hasil persilangan antara bangsa-bangsa ayam yang dikenal memiliki daya produktivitas yang tinggi terhadap produksi daging dan telur. Secara umum ayam broiler memiliki faktor keturunan atau genetik yang baik, memiliki pertumbuhan yang cepat, umumnya bertubuh besar, produksi daging dan telur tinggi, serta memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk protein (daging dan telur) tinggi. Ayam *broiler* atau ayam ras pedaging merupakan jenis ras unggul hasil persilangan, perkawinan antara ayam jantan ras *White Cornish* dari Inggris dengan ayam betina ras *Plymouth rock 12* dari Amerika (Samadi, 2010).



Gambar 2.1 Ayam broiler

Ayam broiler adalah strain hibrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang dikembangkan oleh perusahaan pembibitan khusus. Kata broiler berasal dari kata kerja “*to broil*” (sate) yang sering disama artikan dengan makna bahasa Inggris Amerika yaitu “*to grill*” (memanggang) (Gordon dan Charles, 2002). Broiler adalah ayam muda yang berumur 5-9 minggu dengan jenis kelamin yang berbaur dalam pemeliharaannya (Ensminger et al, 1992).

Ayam broiler adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu rapat ketubuh, kulit putih dan produksi telur rendah (Suprijatna, 2005).

Ayam broiler merupakan jenis ternak unggas yang tujuan utama pemeliharaannya sebagai penghasil daging. Ternak ini terus mengalami kemajuan dalam seleksi genetik terutama pada aspek pertumbuhan. Hal tersebut menyebabkan broiler memiliki perang yang strategis dalam penyediaan sumber protein hewan bagi masyarakat. Berdasarkan data BPS, daging broiler memberikan kontribusi sebesar 46,3% setiap tahun dari total produksi daging nasional (Hidayat, 2015).

Untuk mendapatkan bobot badan yang sesuai dengan yang dikehendaki pada waktu yang tepat, maka perlu diperhatikan pakan yang tepat. Kandungan energy pakan yang tepat dengan kebutuhan ayam dapat mempengaruhi konsumsi pakannya, dan ayam jantan memerlukan energi yang lebih banyak daripada betina, sehingga ayam jantan mengkonsumsi pakan lebih banyak (Anggorodi, 2000).

Potensi genetik broiler yang memiliki pertumbuhan yang cepat tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang

maksimal. Dukungan eksternal yang dimaksud diantaranya kondisi lingkungan peternakan, kualitas pakan, bahan aditif atau suplemen, manajemen dan sumberdaya daya manusia (peternak). Sedangkan kondisi internal, yaitu kondisi fisiologi dari ternak itu sendiri, seperti kondisi kesehatan dan perkembangan sistem pencernaan. Untuk mengetahui status kesehatan ternak dapat dilakukan dengan pemeriksaan gambaran darah, seperti jumlah eritrosit, leukosit, kadar hemoglobin dan hematokrit (Packed cell volume/PCV) (Hidayat, 2015).

Ciri khas ayam broiler adalah rasanya enak dan pengelolahannya mudah tetapi mudah hancur dalam proses perebusan yang lama. Daging ayam adalah sumber protein yang berkualitas bila dilihat dari kandungan gizi. Daging ayam dengan berat 100 gram mengandung didalamnya 18,20 gram protein dan 404,00 kalori yang berguna untuk menambah energi (Rasyaf, 2006).

Klasifikasi dari ayam pedaging atau broiler adalah

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Aves
 Ordo : Galliformis
 Famili : Phasianidae
 Genus : Gallus
 Spesies : *Gallus domesticus* (Sarwono, 2013).

C. Tinjauan Umum Probiotik

Istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani, *pros* dan *bios* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai untuk hidup. Probiotik didefinisikan sebagai kultur tunggal atau campuran dari bakteri hidup yang dapat diaplikasikan kepada hewan maupun manusia dan dapat memberikan keuntungan bagi inangnya dalam meningkatkan kinerja mikroflora alami tubuh. Mikroba yang digunakan sebagai probiotik adalah bakteri, khamir atau ragi dan mungkin pada suatu saat termasuk protozoa dan bahkan metazoa (Irianto, 2007).

Istilah antibiotik diberikan pada produk metabolik yang dihasilkan suatu organisme tertentu, yang dalam jumlah sangat kecil bersifat merusak atau menghambat mikroorganisme lain dengan kata lain antibiotik merupakan suatu zat kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang menghambat mikroorganisme lain. Setiap antibiotik sangat beragam efektivitasnya dalam melawan berbagai jenis bakteri, yaitu terdapat antibiotik yang mempunyai sasaran bakteri Gram negatif dan atau Gram positif. Keefektifan suatu antibiotik sangat tergantung pada lokasi infeksi dan kemampuan antibiotik mencapai lokasi tersebut (Pelczar dan Chan, 2008).

Probiotik merupakan mikroorganisme yang hidup dengan spesies yang spesies untuk mengubah mikroflora melalui kolonisasi sehingga dapat memberikan efek yang menguntungkan. Menurut FAO (*Food and Agricultural Organization of The United Nations*) probiotik adalah suatu mikroorganisme yang hidup apabila dalam jumlah tertentu yang kuat memberikan keuntungan bagi kesehatan (Setyani, 2009).

Probiotik yang efektif ialah bakteri yang mempunyai karakteristik. Bakteri tersebut harus dapat dipreparasi dan dibuat dalam skala industri. Harus tetap stabil dalam jangka panjang baik dalam penyimpanan maupun di lapangan. Harus bertahan dalam saluran pencernaan khususnya dalam usus dan tidak diharuskan tumbuh dalam usus halus. Harus bermanfaat bagi inang (Fuller, 1992).

Probiotik didefinisikan sebagai organisme yang memberikan kontribusi terhadap keseimbangan mikroba dalam usus (Hammes and Hertel, 2002).

Probiotik bekerja secara aktif meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan mikroflora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dengan jumlah yang memadai. Probiotik secara langsung mampu membantu mikroflora yang berada disaluran pencernaan guna menghambat bakteri patogen yang dapat mengganggu saluran pencernaan.

Secara umum fungsi probiotik sama dengan antibiotik yaitu meningkatkan kesehatan. Akan tetapi mekanisme kerja antibiotik langsung membunuh mikroorganisme target dan meninggalkan residu dalam jaringan tubuh. Sedangkan probiotik menekan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dan merangsang kerja mikroorganisme sejenis serta tidak meninggalkan residu dalam jaringan.

Antibiotik adalah suatu obat, bukan zat makanan. Jadi pengaruhnya terhadap ransum ternak adalah sekunder. Antibiotik digunakan secara luas dalam ransum unggas dan babi untuk mempertinggi laju dan efisiensi pertumbuhan berat badan hewan ternak tersebut (Anggorodi,1998). Umumnya penggunaan antibiotic (*feed*

additives) pada ternak unggas yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan adalah 5-50 ppm (Jeffrey, 1999).

Antibiotik yang digunakan pada ternak berfungsi untuk pengobatan, pencegahan penyakit dan sebagai perangsang pertumbuhan (*growth promoter*) untuk memperbaiki performan unggas. Diawal tahun 1900 antibiotik menjadi perintis (*pioneers*) pertama yang dilaporkan sebagai substansi kimia yang dapat mengobati penyakit sipilis pada manusia, infeksi *Streptococci* dan *Staphylococci* pada tikus dan kelinci (Jones dan Ricket, 2003).

Probiotik dapat memelihara lingkungan mikroba yang ada di dalam saluran pencernaan unggas menjadi lebih baik dengan cara mengurangi jumlah mikroba patogen yang ada pada saluran pencernaan. Kondisi lingkungan pencernaan yang baik ini menyebabkan terjadinya peningkatan daya cerna, absorpsi dan efisiensi pemanfaatan pakan (Khaksefidi dan Ghoorchi, 2006). Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan efektifitas probiotik pada unggas dalam berkompetisi dengan patogen, yaitu penggunaan antibiotik, stres, penyakit, molting, pemuasaan dan dosis (Karaoglu dan Durdag, 2005).

Kriteria probiotik yang efektif antara lain, yaitu memberikan efek menguntungkan bagi induk semang, tidak menyebabkan penyakit dan tidak beracun, mengandung sel hidup lebih dari 10⁶ (1 juta sel), mampu bertahan dan melakukan aktivitas metabolisme dalam saluran pencernaan, tetap hidup dalam selama penyimpanan dan tidak terjadi kekebalan terhadap keberadaan probiotik baru (Sumarsih dkk, 2012).

Pemberian probiotik dalam kondisi manajemen dan lingkungan yang baik menunjukkan pengaruh yang kurang signifikan pada performans dan karkas ternak. Hal ini menunjukkan kemungkinan suplemen probiotik pada ternak (broiler) akan lebih efektif jika dilakukan dalam waktu singkat atau waktu terjadi stress sebagai pengaruh dari lingkungan yang buruk (Karaoglu dan Durdag, 2005).

D. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan sekelompok bakteri gram positif. Berdasarkan jenis asam yang dihasilkan, Bakteri Asam Laktat (BAL) dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Asam laktat merupakan satu-satunya produk hasil fermentasi pada kelompok BAL homofermentatif, sedangkan pada kelompok heterofermentatif selain memproduksi asam asetat sebagai produk sampingan (Fardiaz, 1992).

Bakteri Asam Laktat (BAL) termasuk golongan bakteri mikroaerofilik, yang memfermentasi heksosa menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat (BAL) yang banyak digunakan dalam dunia industri adalah spesies *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, dan *Lactobacillus*. Spesies BAL dalam memetabolisme hexosa dapat melalui dua proses fermentasi, yaitu homofermentatif, dimana BAL hanya menghasilkan asam laktat, dan heterofermentatif, dimana selain menghasilkan asam laktat BAL juga menghasilkan CO₂, asam asetat, dan etanol (Holzapfel dan Schillinger, 2002).

Bakteri Asam Laktat telah dipakai dalam industry makanan selama bertahun-tahun, karena mampu mengubah gula (termasuk laktosa) dan karbohidrat lain menjadi asam laktat. Proses pengubahan menjadi asam inilah yang memunculkan rasa asam yang unik dari makanan olahan susu yang difermentasi. Selain itu, asam laktat ini juga bermanfaat sebagai pembasmi kuman dan virus penyakit, karena turut mengurangi kadar asam pH (Sunarlim, 2006).

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki BAL yaitu: 1) BAL mampu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat memberikan rasa dan aroma spesifik pada makanan fermentasi (Rahayu, 2001). 2) BAL mampu meningkatkan nilai cerna pada makanan fermentasi karena dapat melakukan pemotongan pada bahan makanan yang sulit dicerna sehingga dapat langsung diserap oleh tubuh, misalnya protein diubah menjadi asam-asam amino (Guerra *et al.*, 2006), 3) BAL menghasilkan senyawa antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk pada bahan makanan sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk tersebut. Senyawa-senyawa antimikroba yang dihasilkan BAL antara lain: asam laktat, hidrogen peroksida, CO₂, dan bakteriosin (Holzapfel *et al.*, 2001).

E. Tinjauan Umum *Lactobacillus plantarum*

Lactobacillus merupakan salah satu kelompok bakteri asam laktat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, melalui senyawa antimikroba yang dihasilkan, seperti asam organik, hydrogen peroksida, diasetil dan bakteriosin (Abdelbasset dan Djamila, 2008).

Lactobacillus merupakan salah satu mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam bahan pangan karena sifatnya tidak toksik dan tidak menghasilkan toksin. Bahkan, *Lactobacillus* bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan keamanan bahan pangan melalui penghambatan secara alami terhadap pertumbuhan mikroorganisme berbahaya yang menyebabkan pembusukan pada makanan maupun menyebabkan penyakit. *Lactobacillus* berfungsi sebagai pengawet makanan karena mampu memproduksi senyawa antibakteri seperti asam organik, hidrogen peroksida (H_2O_2), karbon dioksida (CO_2), diacetyl dan bakteriosin (Sumarsih dkk, 2012).

Selain itu, spesies *Lactobacillus* ditemukan dalam usus manusia dan hewan lainnya, sementara jumlah mereka dapat bervariasi dengan spesies hewan dan lokasi dalam usus. Namun, hanya beberapa spesies *Lactobacillus* beres perwakilan yang baik terlibat dalam tradisional dan fermentasi industri makanan dan berada di usus manusia maupun hewan. Mereka termasuk *L. crispatus*, *L. plantarum* (Ngatirah, 2000).

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri gram positif berbentuk basil (0,5-1,5 s/d 1,0-10 μm) serta tidak bergerak (non-motil) yang terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Bakteri ini memiliki sifat katalase negatif, aerob atau fakultatif anaerob, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak mereduksi nitrat, dan toleran terhadap asam. Koloni berukuran 2-3 mm, cembung, berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Bakteri ini mampu merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan hasil akhir yaitu asam laktat. *Lactobacillus plantarum* termasuk dalam golongan gram positif dengan basil

nonmotil, ukuran sel 0,5-0,9 μm , anaerob fakultatif, jarang dijumpai yang patogenik, serta dapat memfermentasi gula menjadi asam laktat, tahan pada kadar asam tinggi (pH 4-5,5), tidak tumbuh pada pH diatas 6 (Khalik, 2015)

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam laktat serbaguna, yaitu ditemui dalam berbagai ceruk lingkungan termasuk susu, daging dan banyak fermentasi sayuran. *Lactobacillus plantarum* dapat terlibat dalam pembusukan makanan, seperti daging (Borcha dkk, 1997), anggur (Beneduce dkk, 2004), jus jeruk (Alwazeer dkk, 2002).



Gambar 2.2 *Lactobacillus plantarum* (Anonim, 2012 dalam Syarchroni 2004)


Bakteri *Lactobacillus plantarum* bersifat gram positif, non motil, dan berukuran 0,6-0,8 μm . Bakteri ini memiliki sifat antagonis terhadap mikroorganisme penyebab kerusakan makanan. Bakteri ini bersifat toleran terhadap garam, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki pH ultimat 5,3-5,6 (Buckle, 1987).

Klasifikasi dari *Lactobacillus plantarum* adalah:

Kingdom : Animalia
Filum : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Ordo : Lactobacillales
Famili : Lactobacillaceae
Genus : Lactobacillus
Spesies : *Lactobacillus plantarum* (Abdelbasset, 2008).

F. Tinjauan Umum Usus Halus

Pencernaan makanan adalah suatu aktivitas dalam saluran pencernaan (*Tractus digestivus*) dan kelenjarnya dalam proses mempersiapkan makanan untuk diserap oleh usus. Proses awal yang terjadi sebelum makanan yang dikonsumsi dapat diserap usus adalah terjadinya beragam proses sekresi cairan usus yang akan berfungsi untuk melakukan pencernaan. Penyerapan makanan yang telah mengalami pencernaan meliputi suatu proses transfer larutan dan solute (zat-zat yang larut dalam larutan terkait) melewati membrane semipermeabel sel-sel saluran pencernaan makanan (Piliang dan Al haj, 1991).



Gambar 2.3 Sistem Pencernaan pada Ayam Broiler (Siregar, 1994)

Bagian saluran pencernaan yang paling banyak dihuni bakteri, yaitu saluran usus (Kurniawan, 2011). Oleh karena itu kesehatan sistem saluran pencernaan merupakan hal penting yang senantiasa harus dipertahankan. Hal ini disebabkan saluran pencernaan merupakan tempat lewat dan masuknya berbagai nutrisi yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan tubuh. Selain untuk meningkatkan daya serap terhadap makanan, permukaan saluran pencernaan yang luas juga sering terpapar karena berbagai macam zat atau benda asing, termasuk agen patogen. Keberadaan patogen di dalam saluran pencernaan dapat mengakibatkan berbagai penyakit, salah satunya diare (Schiller, 2010).

Usus halus merupakan organ utama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorbs produk pencernaan. Berbagai enzim yang masuk kedalam saluran ini berfungsi mempercepat dan mengefisiensikan pemecahan karbohidrat, protein dan lemak untuk mempermudah proses absorbs. Pada ayam dewasa, panjang usus halus sekitar 62 inci atau 1,5 meter (Suprijatna, 2008).

Sebagian besar pencernaan terjadi didalam usus halus, disini terjadi pemecahan zat-zat pakan menjadi bentuk yang sederhana dan hasil pemecahannya disalurkan kedalam aliran darah melalui gerakan peristaltik didalam usus halus. Didalam saluran pencernaan, khususnya usus halus, patogen yang sering menyebabkan gangguan adalah *Escherichia coli*. Banyak dilaporkan bahwa mikroorganisme patogen, seperti *Escherichia coli* *Escherichia coli* yang terdapat dalam saluran pencernaan, dapat merusak mukosa saluran pencernaan secara potensial.

G. Tinjauan Umum Histologi Usus Halus

Kemampuan pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan dapat dipengaruhi oleh luas permukaan epitel usus, jumlah lipatan-lipatannya dan banyaknya vili dan mikrovili yang memperluas bidang penyerapan dan dipengaruhi juga oleh tinggi dan luas permukaan vili, duodenum, jejunum dan ileum (Ibrahim dkk, 2008).

Luas permukaan usus halus seperti tinggi vili menggambarkan area untuk penyerapan zat-zat nutrisi. Vili merupakan tonjolan kecil mirip jari atau daun yang terdapat pada membran mukosa, panjangnya 0,5-1,5 mm dan hanya terdapat pada usus halus. Vili pada ileum bentuknya mirip jari dan lebih pendek dibandingkan dengan vili yang terdapat pada duodenum dan jejunum. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan adalah struktur morfologi usus (Wang, 2008).

Vili berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan (Alfiansyah, 2011). Perkembangan vili-vili usus pada ayam broiler berkaitan dengan fungsi dari usus dan pertumbuhan dari ayam tersebut (Sun, 2004).

Semakin lebar vili semakin banyak zat-zat makanan yang akan diserap pada akhirnya dapat berdampak pada pertumbuhan organ-organ tubuh dan karkas yang meningkat. Peningkatan tinggi vili pada usus halus ayam broiler atau pedaging berkaitan erat dengan peningkatan fungsi pencernaan dan fungsi penyerapan karena meluasnya area absorpsi serta merupakan suatu ekspresi sistem transportasi keseluruhan tubuh (Awad, 2008).

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan adalah struktur morfologi usus (Ningtias, 2013). Tinggi vili pada setiap bagian usus halus secara umum meningkat seiring dengan bertambahnya umur ayam (Wang, 2008).


Setiap bagian dari usus halus memiliki karakteristik sendiri terhadap jenis mikronutrien yang diabsorpsi (Andra, 2007). Proses pencernaan utama berlangsung pada bagian duodenum. Hati menyalurkan empedu masuk ke dalam duodenum, sedangkan pankreas menyalurkan enzim yang digunakan bersama-sama dengan enzim yang dihasilkan usus halus untuk proses pencernaan (Denbow, 2000). Duodenum merupakan tempat terjadinya pencampuran makanan dengan garam empedu dan enzim pankreas serta absorpsi besi dan folat (Andra, 2007). Jumlah vili pada daerah duodenum lebih banyak dan memiliki lipatan mukosa yang melingkar

(Banks, 1993). Duodenum memiliki panjang 25 cm yang merupakan bagian dari usus halus yang berfungsi sebagai penyerapan air, natrium, dan mineral-mineral lain (Ganong, 1995).

Bagian jejunum dan ileum memiliki peran yang penting dalam proses absorpsi zat makanan, seperti asam amino, vitamin dan monosakarida kedalam sirkulasi darah (Denbow, 2000). Bagian jejunum dengan panjang 1,5-1,75 cm merupakan tempat penyerapan obat (Andra, 2007). Jejunum memiliki ukuran villi langsing, lebih kecil dan lebih sedikit jumlahnya disbanding duodenum (Banks, 1993).

Daerah ileum usus halus mirip dengan jejunum dengan panjang 0,75-3,5 cm. Vili pada ileum membentuk kelompok. Daerah ileum tidak memiliki lipatan-lipatan mukosa (Banks, 1993). Motalitas makanan yang melewati ileum lebih lambat daripada jejunum. Hal itu memungkinkan kesempatan makanan untuk kontak lebih lama dengan mukosa sehingga absorbs nutrisi lebih banyak (Andra, 2007).

H. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksperimental dengan menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai November 2018. Pembuatan Suspensi BAL bertempat di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Pemeliharaan broiler bertempat di Pannujuang Desa Kalamandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan penentuan gambaran histologi usus halus broiler dilakukan di Balai Veteriner Maros.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua macam variabel bebas dan variabel terikat. Konsentrasi *Lactobacillus plantarum* sebagai variabel bebas dan gambaran histologi sebagai variabel terikat.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Gambaran histologi usus halus (jejunum dan ileum) broiler adalah gambaran untuk menentukan luas vili pada usus halus (jejunum dan ileum) setelah pemberian BAL *Lactobacillus plantarum*.
2. Konsentrasi BAL *Lactobacillus plantarum* yang disuplementasi pada broiler sebanyak 10^6 cfu/ml, 10^8 cfu/ml, 10^{10} cfu/ml.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui percobaan laboratorium dengan pengamatan gambaran histologi usus halus ayam broiler.

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang sistem panggung sebanyak 4 petak, tempat makan dan minum, 4 lampu pijar 60 watt, inkubator, autoklaf, Erlenmeyer, *hot plate and stirrer*, lampu spritus, ose bulat, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, vortex, oven, aluminium foil, spoit, thermometer, *waterbath*, spektrofotometer, neraca analitik, *laminar air flow*, *mortal and pestle*, mikropipet, timbangan digital, botol you C, karet pentil, pisau dan tip, 1 set alat bedah, mikrotom, mikroskop, mikrometer, *tissue prosessor*, *Autostainer*, *Scalpel*, objek *glass*, *tissue cassette*.

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah broiler strain SR 707 umur 1 hari atau *Day Old Chick* (DOC), ransum BP 11 dan PB II, air, sekam padi, karung, kardus, biakan murni *Lactobacillus plantarum*, usus ayam broiler (jejunum dan ileum), aquades, vaksin ND B1, kapas, vita stress, perkakas, vitachick, *Man Rogosa Sharpe Broth* (MRSB), larutan hematoksin, dan larutan eosin.

G. Prosedur Kerja

1. Persiapan Kandang

Kandang yang digunakan berupa kandang dengan sistem panggung dengan jarak 40 cm dari tanah yang beralaskan sekam padi dengan ukuran 1 m x 1m x 60 cm (panjang x lebar x tinggi). Setiap petak kandang dilengkapi tempat pakan dengan kapasitas 3 kg dan tempat minum kapasitas 3 liter, serta lampu pijar 60 watt, pada bagian sisi kandang dilapisi kardus.

Setiap unit kandang dan peralatan dibersihkan terlebih dahulu. Sekam ditaburkan dengan ketebalan 5 – 8 cm di lantai yang telah dipasang karung terlebih dahulu. Untuk suhu kandang diatur 31 – 32⁰C dan dipertahankan untuk minggu pertama dengan menyalakan lampu selama 24 jam dan selanjutnya lampu hanya dinyalakan pada malam hari hingga akhir penelitian.

2. Preparasi Suspensi Bakteri Asam Laktat

Pembuatan suspensi BAL *Lactobacillus plantarum* dilakukan dengan cara meremajakan di media MRSA menggunakan ose kemudian diinkubasi selama 2 x 24 jam. Kemudian bakteri yang telah tumbuh diuji dengan media BCP dan CaOH.

Bakteri yang telah tumbuh kemudian dipindahkan ke media MRSB lalu dihomogenkan dan diinkubasi lagi selama 2 x 24 jam.

Pembuatan suspensi BAL menggunakan standar Mac Farland 8 dengan pengenceran 10^{10} , 10^9 , 10^8 , 10^7 , 10^6 . Aquades steril sebanyak 27 mL diisi kedalam botol you C. Isolat BAL *Lactobacillus plantarum* dimedia MRSB dipipet kedalam botol you C 10^{10} , kemudian menghitung jumlah suspense BAL sampai mencapai nilai 0,94 – 0,98 cfu/ml dispektrofotometer dengan absorbansi 625 nm, kemudian dilakukan seri pengenceran dari 10^{10} , 10^9 , 10^8 , 10^7 , 10^6 . Kemudian konsentrasi 10^{10} , 10^8 , 10^6 dipipet masing-masing kedalam botol vial sebanyak 2 ml (Tjay dan Rahardja, 2010).

3. Pemeliharaan dan Adaptasi Broiler

Pemeliharaan broiler dilakukan selama 5 minggu, sebanyak 24 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ekor. Sebelum pemberian perlakuan terhadap hewan uji, perlu dilakukan adaptasi selama 1 minggu terlebih dahulu dengan tujuan agar hewan uji yang digunakan mampu saling beradaptasi dan tidak saling menyerang satu sama lain. Sehingga ketika percobaan berlangsung broiler tidak saling mengganggu dan tetap tenang karena telah terbiasa dalam keadaan satu kandang bersama. Vaksin ND B1 (*New Castle Disease*) diberikan pada ayam saat merumur 4 hari melalui tetesan pada mata. Pada minggu pertama dan kedua, tempat pakan dan air minum diletakkan diatas sekam, sedangkan untuk minggu ketiga sampai pemanenan tempat pakan dan air minum digantung sejajar dengan kandang ayam. Pakan dan air minum diberikan secara *ad libitum*.

4. Perlakuan Terhadap Hewan Percobaan

Ayam broiler dibagi kedalam 4 kelompok perlakuan. selama percobaan semua kelompok broiler diberi Aquades. Q0 dengan perlakuan broiler tanpa tambahan probiotik (hanya diberi Aquades) sebanyak 2 ml, Q1 dengan perlakuan broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^6 cfu/mL, Q2 dengan perlakuan broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^8 cfu/mL, Q3 dengan perlakuan broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^{10} cfu/mL.

Sampel probiotik diberikan pada broiler sesuai dengan perlakuan. Pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* pertama kali diberikan setelah broiler beradaptasi di kandang selama 1 minggu. Pemberian BAL dilakukan setiap pagi sebelum pemberian pakan dan diberikan secara oral dengan menggunakan metode sonde. Untuk mengetahui penambahan bobot broiler maka dilakukan penimbangan setiap hari. Pemberian BAL untuk yang terakhir dipuaskan selama 2 jam. Preparasi sampel dilakukan pada hari ke 35 penelitian (Astuti, 2009).

5. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel usus halus (jejunum dan ileum) untuk melihat perkembangan vili dilakukan pada umur 35 hari. Jejunum didefinisikan segmen usus halus bagian tengah antara bagian akhir duodenum dan Meckel's diverticulum. Ileum didefinisikan segmen usus halus yang rentangannya adalah dari Meckel's diverticulum sampai dengan awal percabangan sekum. Luas vili : dilakukan dengan diwarnai hematoksilin dan eosin, Luas per vili dihitung dengan mikroskop pada pembesaran objektif empat kali dan video mikrometer.

6. Preparasi sampel

Sampel usus yang sudah diperoleh, dibuat potongan sepanjang 2 cm untuk masing-masing segmen usus halus yakni jejunum dan ileum kemudian difiksasi dalam 10 % buferformalin, dibiarkan terendam 24-48 jam, dan untuk selanjutnya dibuat preparat histologi. Cara penyimpanan preparat Haematoxylin-eosin (HE), setiap potongan sampel jaringan dihidrasi melalui satu seri alkohol yang konsentrasinya bertingkat semakin meninggi. Sampel ditransfer satu demi satu kedalam setiap konsentrasi alkohol dan dibiarkan untuk terendam dalam setiap konsentrasi alkohol tersebut kira-kira 10 detik. Untuk selanjutnya sampel tersebut dimasukkan dalam xytol dan akhirnya dicelupkan dalam parafin. Dengan menggunakan mikrotom, sampel disayat tipis untuk seterusnya dilakukan pengecatan Haematoxylin-eosin. Preparasi histologi yang sudah siap dalam objek glass diamati dan diukur menggunakan mikroskop dengan bantuan computer (Sri Harimurti,2009).

7. Perhitungan Luas Vili

Langkah untuk pengukuran luas permukaan vili, terlebih dahulu ditentukan menggunakan mikroskop Olympus diatur dengan perbesaran 4 kali. Gambaran histologi muncul pada layar monitor JVCTMH 1750 C. setelah ditemukan gambaran yang diinginkan maka dilakukan pemotretan seluruh preparat preparat yang akan diukur. Pengukuran minimum dilakukan tiga kali per slide yang dibuat untuk setiap parameter, selanjutnya cara pengukuran luas vili dilakukan menggunakan computer layar datar dengan program Mikrosoft Office Picture Manager pada perbesaran 20%. Mula-mula standar ukuran μm ditentukan lebih dahulu dengan bantuan computer

yaitu berapa nilai perbesaran yang dipakai atau diinginkan dikonversikan kedalam satuan panjang (μm). Angka satuan μm yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai standar dalam mengukur panjang atau lebar vili yang terpampang pada layar monitor (Sri Harimurti, 2009).

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan program SPSS dengan model matematika sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \sum ij$$

Y_{ij} = pengaruh perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

μ = nilai tengah perlakuan

α_i = pengaruh perlakuan ke-i

β_j = pengaruh perlakuan ke-j

$\sum ij$ = galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA. Jika terdapat perbedaan nyata akan diuji dengan uji Duncan Multiple Comparison (Astuti, 2009).


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. a. Luas Vili pada Ileum Broiler

Hasil penelitian terhadap luas vili ileum pada broiler dengan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dapat dilihat pada gambar 4.1




Gambar 4.1. Luas vili ileum (μm) usus broiler yang diberi probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀: control dengan aquadest, P₁: *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P₂: *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), P₃: *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).

Tabel 4.1. Hasil uji statistik luas vili ileum UNIANOVA uji antara pengaruh subjek dengan variabel terikat probiotik *Lactobacillus plantarum*.

| | Jumlah Kuadrat | db | Rata-rata persegi | F | Sig. |
|------------------------|----------------|----|-------------------|-------|-------|
| Perlakuan | 346,616 | 3 | 115,539 | 2,512 | 0,155 |
| Ulangan | 106,856 | 2 | 53,428 | 1,161 | 0,375 |
| Perlakuan * ulangan | 275,995 | 6 | 45,999 | . | . |


Data berdasarkan gambar 4.1. selanjutnya di uji secara statistic (SPSS) dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan yang ada sehingga nilai signifikan yang didapatkan (lihat Tabel 4.1) yaitu ($P > 0,05$), yang berarti tidak ada perbedaan pengaruh antara perlakuan pemberian *Lactobacillus plantarum*.



Gambar 4.2 Luas vili ileum (μm) usus broiler yang diberi probiotik *Lactobacillus plantarum*. (a). P₀: control dengan aquadest, (b). P₁: *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), (c). P₂: *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), (d). P₃: *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).

b. Luas Vili pada Jejunum Broiler

Hasil penelitian terhadap luas vili jejunum pada broiler dengan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dapat dilihat pada gambar 4.3




Gambar 4.3. Luas vili jejunum (μm) usus broiler yang diberi probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀: control dengan aquadest, P₁: *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P₂: *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), P₃: *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).

Tabel 4.2. Hasil uji statistik luas vili jejunum UNIANOVA uji antara pengaruh subjek dengan variabel terikat probiotik *Lactobacillus plantarum*.

| | Jumlah kuadrat | db | Rata-rata persegi | F | Sig. |
|------------------------|----------------|----|-------------------|-------|-------|
| Perlakuan | 7044,066 | 3 | 2348,022 | 0,381 | 0,770 |
| Ulangan | 8451,562 | 2 | 4225,781 | 0,686 | 0,539 |
| Perlakuan * ulangan | 36949,240 | 6 | 6158,207 | . | . |


Data berdasarkan gambar 4.3. selanjutnya di uji secara statistic (SPSS) dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan yang ada sehingga nilai signifikan yang didapatkan (lihat Tabel 4.2) yaitu ($P > 0,05$), yang berarti tidak ada perbedaan pengaruh antara perlakuan pemberian *Lactobacillus plantarum*.



Gambar 4.4 Luas vili jejunum (μm) usus broiler yang diberi probiotik *Lactobacillus plantarum*. (a). P₀: control dengan aquadest, (b). P₁: *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), (c). P₂: *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), (d). P₃: *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).

2. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus Plantarum* terhadap Pertambahan Bobot Badan Broiler

Hasil penelitian terhadap pertambahan bobot badan pada broiler dengan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dapat dilihat pada Gambar 4.5



Gambar 4.5. Rerata Pertambahan bobot badan broiler yang diberi Probiotik *Lactobacillus plantarum*. P₀ : kontrol dengan aquadest, P₁ : *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P₂ : *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), P₃ : *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml).

Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik Rerata Pertumbuhan Bobot Badan Broiler UNIANOVA Uji Antara Pengaruh Subjek dengan Variabel Terikat Probiotik *L. plantarum*

| | Tipe III Jumlah Kuadrat | df | Rata-rata persegi | F | Sig. |
|-----------|--------------------------|----|-------------------|---------|------|
| Model | 2115647,500 ^a | 5 | 423129,500 | 247,671 | .000 |
| Perlakuan | 2115647,500 | 5 | 423129,500 | 247,671 | .000 |
| Error | 25626,500 | 15 | 1708,433 | | |
| Total | 2141274,000 | 20 | | | |

Berdasarkan uji secara statistik (SPSS) UNIANOVA penambahan bobot badan broiler dengan melihat beberapa faktor dan perlakuan didapatkan pengaruh subjek dengan variabel terikat Probiotik *Lactobacillus plantarum* dipengaruhi secara nyata sehingga nilai signifikan yang didapatkan (lihat Tabel 4.3) yaitu ($P < 0.05$).

B. Pembahasan

Peternakan broiler merupakan salah satu usaha produktif yang prospektif seiring dengan terjadinya peningkatan gizi dan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan hewani. Hal tersebut mendorong para peternak untuk memenuhi kecukupan daging sebagai sumber protein yang berkualitas bagi masyarakat, sehingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan produktifitas ternaknya. Salah satu aspek penting dan utama dalam usaha peternakan broiler adalah pakan. Kualitas pakan sangat ditentukan oleh kandungan dan ketersediaan nutrisinya untuk memenuhi kebutuhan broiler selama masa pemeliharaan. Berbagai formulasi pakan telah disusun sedemikian rupa demi mencapai produktivitas broiler yang maksimal (Hafsan, 2006).

Broiler adalah istilah untuk menyebut *strain* ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis, dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relative muda, serta menghasilkan daging berkualitas serat lunak (Murtidjo, 2002).

Ayam broiler memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, baik bagi para peternakan maupun para konsumen. Adapun sifat-sifat baik yang dimiliki ayam broiler adalah dagingnya empuk, kulit licin dan lunak, tulang rawan dada belum membentuk tulang yang keras, ukuran badan besar, dengan bentuk dada yang lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi dan sebagian besar dari makanan diubah menjadi daging, pertumbuhan atau penambahan berat badan sangat cepat pada umur 5 – 6 minggu ayam bisa mencapai berat ± 2 kg. Tetapi pengembangan usaha broiler sering mengalami berbagai kendala diantaranya karena rendahnya produktivitas akibat lambatnya pertumbuhan, sehingga diperlukan manipulasi nutrisi. Alternatif yang semakin populer dalam industri ternak, yaitu penggunaan bahan-bahan alami seperti mikroba yang bersifat probiotik (Rasyaf, 2004).

Probiotik merupakan suatu produk yang mengandung mikroba hidup non pathogen yang diberikan kepada ternak untuk menjaga keseimbangan ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan dan menyediakan enzim yang mampu mencerna serat kasar, lemak, protein, dan mendetoksikasi zat racun atau metabolit guna dapat memperbaiki laju pertumbuhan, kesehatan ternak, efisiensi konsumsi ransum.

Salah satu sumber isolat lokal yang telah diuji kemampuannya secara *in vitro* sebagai kandidat probiotik yaitu *Lactobacillus plantarum*. Bakteri ini termasuk kelompok BAL yang diisolasi dari dangke, yaitu makanan khas dari Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. *Lactobacillus plantarum* adalah bakteri asam laktat yang hidup normal dalam saluran pencernaan, perannya sangat penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan (Ali, 2013).

Usus halus terdiri dari tiga segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum sebagai organ pencernaan dan penyerapan yang primer yang bervariasi kemampuannya (Ensminger, 1980). Kemampuan pencernaan zat-zat makanan dapat dipengaruhi oleh luas permukaan ephitel usus, banyaknya vili dan microvili yang memperluas bidang penyerapan (Austic dkk, 1990) dan dipengaruhi juga oleh tinggi dan luas permukaan vili duodenum, jejunum, dan ileum (Sugito, 2007). Selanjutnya, luas penampang usus halus dapat juga berpengaruh terhadap kemampuan pencernaan dan penyerapan zat makanan. Luas penampang usus halus dipengaruhi oleh panjang dan lebarnya (Yao, 2006). Usus halus broiler yang bertubuh berat adalah lebih panjang dan lebih luas bidang absorpsinya dibanding dengan usus halus yang bertubuh lebih ringan (Yamauchi, 1991).

Dalam Penelitian ini pemberian probiotik BAL *Lactobacillus plantarum* yang telah diisolasi dari pembuatan dangke yang kemudian disuspensi menggunakan Mac Farland 8 dengan absorbansi 625 nm dengan metode pengenceran (10^1 sampai 10^6) diharapkan mampu berpengaruh gambaran histologi usus halus broiler. Dan salah satu parameter dari gambaran histologi usus halus broiler adalah luas vili pada

ileum dan jejunum. Jejunum (usus kosong) memiliki vili yang lebih pendek, sempit, dan lebih sedikit, sedangkan sel goblet pada epitel jumlahnya lebih banyak. Ileum (usus penyerapan) yang mengandung sedikit vili yang sempit dan pendek, selain itu epitel pada ileum mengandung lebih banyak sel goblet dibandingkan dengan duodenum dan jejunum (Victori, 2017).

Penelitian ini menggunakan 2 parameter dalam menentukan gambaran histologi usus halus broiler yaitu dengan menentukan luas vili pada jejunum dan ileum yang diberi tambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* yang dapat dilihat pada gambar 4.1, dan gambar 4.2. dan pengaruhnya terhadap pertambahan bobot broiler setelah diberi tambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* yang dapat dilihat pada gambar 4.5.

1. a. Luas Vili pada Ileum Broiler

Pengaruh pemberian probiotik BAL *Lactobacillus plantarum* pada broiler setelah penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2. Hasil analisis variansi menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap luas vili pada ileum. Rerata dari hasil penelitian ini yaitu P_0 (Aquadex) yang berperan sebagai control dengan nilai $14,67 \mu\text{m}$, P_1 (Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* 10^6) dengan nilai $10,98 \mu\text{m}$, P_2 (Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* 10^8) dengan nilai $25,15$ dan P_3 (Pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* 10^{10}) dengan nilai $20,09 \mu\text{m}$.

Saluran pencernaan merupakan organ yang memiliki fungsi sebagai pencerna pakan serta fungsi imunologis (sebagian besar sel-sel imun diproduksi di usus). Terkait dengan fungsi pencernaan pakan. Penyerapan nutrisi pakan dapat

berlangsung optimal apabila kondisi usus dalam keadaan sehat dan baik. Kesehatan usus salah satunya dipengaruhi oleh populasi mikroba yang ada didalamnya diantaranya yaitu bakteri. Bakteri menguntungkan yang ada di usus halus misalnya Bakteri Asam Laktat (BAL) (Yudiarti, 2017).

Berdasarkan hasil data yang diperoleh P₂ dengan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* 10⁸ lebih luas atau lebih panjang permukaan villi ileumnya, sedangkan yang terendah adalah P₁ dengan perlakuan pemberian *Lactobacillus plantarum* 10⁶. Sehubungan dengan hal ini, luas permukaan vili pada ileum broiler berhubungan erat dengan potensi usus halus dalam menyerap sari-sari makanan. Semakin luas vili usus halus, semakin besar efektifitas penyerapan sari-sari makanan melalui epitel usus halus (Lenhard dan Mozes, 2003). Demikian juga, dengan meningkatnya panjang dan berat usus halus, semakin meningkat pula permukaan bagian dalam dan luas permukaan usus halus, sehingga dalam taraf tertentu terjadi peningkatan daya cerna dan daya serap sari-sari makanan oleh usus halus (Yao, et al., 2006). P₁ dengan perlakuan pemberian *Lactobacillus plantarum* 10⁶ adalah yang terendah. Semakin panjang dan luas vili usus halus semakin besar efektifitas penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan (Lenhardt dan Mozes, 2003). Berbeda halnya yang terjadi pada P₁ yang diberi tambahan probiotik *Lactobacillus plantarum* dengan konsentrasi 10⁶ justru yang paling terendah. Hal ini menunjukkan kemungkinan suplemen probiotik pada ternak (broiler) akan lebih efektif jika dilakukan dalam waktu singkat atau waktu terjadi stress sebagai pengaruh dari lingkungan yang buruk (Karaoglu dan Durdag, 2005). Salah satu faktor yang

mempengaruhinya yaitu lama penyimpanan sampel dari semestinya, sehingga dapat mempengaruhi struktur jaringan, dapat menghambat peningkatan vili dari usus halus (ileum) itu sendiri, sehingga tidak dapat melindungi usus dari kerusakan dan dapat terinfeksi pathogen.

Pemberian Peranan probiotik terhadap usus halus broiler tidak memberikan pengaruh nyata di karenakan pemaksimalan penyerapan zat makanan dalam usus tidak terserap dengan sempurna. Panjang relatif usus halus dipengaruhi oleh kadar serat kasar yang terkandung dalam pakan. Unggas yang diberi pakan dengan serat kasar tinggi cenderung memiliki saluran pencernaan yang lebih besar dan panjang (Sturkie, 1976).

Penelitian dari Elisa, Widiastuti, Teysar (2017) dengan judul Bobot relatif organ limfoid dan usus halus ayam broiler yang disuplementasi probiotik *bacillus plus*. Suplementasi probiotik Bacillus plus nyata ($P < 0,05$) meningkatkan bobot relatif organ usus halus duodenum dan ileum namun tidak berbeda nyata ($P > 0,05$) terhadap bobot relatif jejunum

b. Luas Vili pada Jejunum Broiler

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, luas vili jejunum yang telah diberi bakteri asam laktat *Lactobacillus plantarum* dan aquades sebagai kontrol dapat dilihat pada gambar 4.2. Pada gambar tersebut nampak bahwa P₃ mempunyai luas permukaan vili sebesar 184,63 μm nyata lebih luas dibandingkan pada P₂, P₁ dan P₀ yang masing-masing 140,50 μm , 120,52 μm , dan 164,78 μm .

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* dengan tingkat konsentrasi yang berbeda (10^6 , 10^8 , dan 10^{10}) tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap luas vili jejunum. Hal ini dapat dilihat dari penambahan BAL *Lactobacillus plantarum* dengan konsentrasi 10^{10} (P_3) senilai 184,63 μm lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi 10^8 (P_2): 140,50 μm , 10^6 (P_1): 120,52 μm , dan P_0 dengan nilai 164,78 μm sebagai kontrol.

Sesuai dengan pernyataan Awad dkk. (2008) lebih rinci menyatakan bahwa penambahan luas villi pada jejunum broiler adalah paralel dengan peningkatan fungsi pencernaan dan fungsi absorpsi karena meluasnya area absorpsi serta merupakan suatu ekspresi lancarnya sistem transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Prospek penggunaan probiotik pada unggas telah banyak diulas (Goldin dan Gorbach, 1992). Dalam upaya mengembangkan probiotik untuk unggas, bila dominasi mikroba yang menguntungkan dapat dicapai, diharapkan kinerja ayam akan lebih baik. Penambahan kultur *Lactobacillus* (Yeo dan Kim 1997; Jin et al. 1998) pada ransum mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan, produksi telur, dan efisiensi penggunaan pakan.

Penelitian dari (Purnata, Berata, dan Kardena, 2018) dengan fokus studi perkembangan histologi jejunum ayam broiler yang diberikan suplemen Asam butirat. Dengan hasil dari pengukuran panjang vili menunjukkan bahwa pemberian suplemen asam butirat yang dicampurkan pada pakan, memberikan pengaruh yang nyata terhadap panjang villi jejunum ayam broiler. Hasil ini sesuai dengan laporan

dari Mansoub *et al* (2011) bahwa pemberian asam butiric pada ayam dapat merangsang perkembangan villi usus.

2. Pengaruh Pemberian Probiotik *Lactobacillus plantarum* Terhadap Pertambahan Bobot Badan Broiler

Rerata nilai pertambahan bobot badan broiler dapat dilihat pada Gambar 4.4. Pada gambar tersebut nampak bahwa pertambahan bobot badan broiler umur 35 hari pada P₂ adalah 1524 gram nyata lebih tinggi dibandingkan pada P₀, P₁ dan P₃ masing-masing 1484, 1353, dan 1501 gram. Hasil analisis variansi menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap pertambahan bobot badan broiler. Hal ini dapat terlihat pada pertambahan bobot badan broiler tiap perlakuan antara P₀ (kontrol dengan aquades), P₁ (*L. plantarum* 10⁶ cfu/ml), P₂ (*L. plantarum* 10⁸ cfu/ml), dan P₃ (*L. plantarum* 10¹⁰ cfu/ml).

Menurut Rasyaf (2007) dalam Hidayat (2010) mengatakan bahwa pertambahan bobot badan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain umur, bangsa, jenis kelamin, kecepatan pertumbuhan, kesehatan ternak serta kualitas dan kuantitas pakan.

Berdasarkan penelitian pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan ($P < 0,05$) hal ini disebabkan oleh kandungan energi dan kandungan protein yang terkandung dalam pakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma; dkk (2015) yang menyatakan bahwa

keseimbangan zat-zat nutrisi terutama imbangan energi dan protein penting karena nyata mempengaruhi pertumbuhan. Pertambahan berat badan menunjukkan bahwa pakan yang dikonsumsi oleh broiler cukup efisien dan banyak digunakan untuk pertumbuhan. Jika broiler mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang banyak namun pertambahan berat badan tidak tinggi maka penyerapan makanan dalam saluran pencernaan broiler tersebut berlangsung tidak sempurna. Selain itu bisa juga disebabkan karena broiler sedang berada dalam kondisi sakit, faktor lainnya adalah jenis kelamin, suhu dan kualitas makanan.

Dan dijelaskan oleh Yeo dan Kim (1997) dalam Ali; dkk (2013) menyatakan bahwa pemberian probiotik pada ayam mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan, dan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik meningkatkan aktivitas enzim pencernaan sehingga penguraian dan penyerapan makanan menjadi lebih sempurna sehingga makanan yang diserap dengan baik tersebut dapat dimanfaatkan oleh ayam untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan.

Kecepatan pertumbuhan mempunyai variasi yang cukup besar, keadaan ini bergantung pada tipe ayam, jenis kelamin, galur, tata laksana, temperatur lingkungan, tempat ayam tersebut dipelihara, kualitas dan kuantitas ransum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* pada broiler hasil analisis variansi (ANOVA) tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap luas villi ileum dan jejunum. Sedangkan pemberian probiotik *Lactobacillus plantarum* berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap penambahan bobot badan broiler.

B. Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai luas permukaan villi duodenum sebagai salah satu parameter gambaran histologi usus halus dan diperlukan kajian lebih lanjut mengenai gambaran histologi broiler yang diberi probiotik BAL *Lactobacillus plantarum* pada broiler yang berumur 7, 14, 21 dan 28 hari sebagai pembanding. Sebaiknya dalam proses pembuatan slide, peneliti perlu memperhatikan lama penyimpanan sampel, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap struktur jaringan dari sampel usus halus broiler itu sendiri.

KEPUSTAKAAN

- Abdelbasset, M. and K. Djamila., *Antimicrobial activity of autochthonous lactic acid bacteria isolated from Algerian traditional fermented milk Raïb. Afr. J. Biotechnol.*, 7: 2908-2914, 2008.
- Ali, S.A., Ismoyowati dan I. Diana. *Jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan hematokrit pada berbagai jenis itik lokal terhadap penambahan probiotik dalam ransum. Jurnal Ilmiah peternakan.* 1(3): 1001-1013, 2013.
- Andra. “*Usus memendek malnutrisi didapat*”. *Farmacia*”. 6 (8) <http://www.majalah-farmacia.com>.(Diakses 25 Maret 2018)
- Anggorodi, H.R. *Ilmu Makanan dan Ternak Umum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 1998.
- Anonim. *Pemeliharaan Ayam Broiler.* http://pertanian-peternakanmanegara.blogspot.com/2009/10/pemeliharaan-ayam-broiler_9717.html (Diakses 3 September 2018).
- Astuti, Bachruddin, Z., Supadmo, Harmayani, E.” *Pengaruh Pemberian Bakteri Asam Laktat Streptococcus thermophilus Terhadap Kadar Kolesterol Darah Ayam Broiler Strain Lohman*”. Yogyakarta: Fakultas MIPA UGM, 2009.
- Austic, R.E. and Nesheim. *Poultry Production*, 13th ed. Lea and Febiger. Philadelph. London. p.29-30, 1990.
- Awad, W. A., K. Ghareeb, S. Nitch, S. Pasteiner, S. A. Raheem, and J. Bohm. *Efect of dietary inclusion of probiotic, prebiotic and symbiotic on intestinal glucose absorbtion of broiler chickens.* *Int. J. Poult. Sci.*, 7: 688-691, 2008.
- Banks, W. J. *Applied Veterinary Histology*.3rd Edition. Marcell Dekker Inc., Newyork, 1993.
- Buckle, K.A., Edwards, R.A., Fleet, G.H., dan Wootton, M. *Ilmu Pangan*. Jakarta: UI-Press. 1987.
- Denbow DM.. *Gastrointestinal anatomy and physiology*. Di dalam: Whittow JC, editor. *Sturkie’s Avian Physiology*. Ed ke-5. London: Academic Pr. hlm 299-325, 2000.

- Elisa, W. Widiastuti, E. Teysar, A.S. *bobot relatif organ limfoid dan usus halus ayam broiler yang disuplementasi probiotik bacillus plus*. Departemen Peternakan. Semarang, 2017.
- Ensminger, M.E. Poultry Science. 2nd ed. *The Interstate Printers and Publishers*, Inc. Danville, Illinois. p. 32.33, 1980.
- Ensminger. M. E., J. E. Oldfield and W. W. Heinemann. *Feeds and Nutrition*. 2nd Edition. Ensminger Publishing Company. USA, 1992.
- Fardiaz, S. *Mikrobiologi pangan I*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Fuller, M.F. *Probiotics: The Scientific Basis*. Chapman and Hall. London, 1992.
- Ganong WF.. *Review of Medical Physiology*. Ed ke-10. California: Lange Medical, 1983.
- Hafsan, Bayu, G. Hidayat, Ar. S. Agustina, L. Natsir, A. Ahmad, A. *Bobot karkas dan Persentase Organ Dalam Broiler Dengan Suplementasi Fitase Dari Bukholderia sp. Strain HF.7*. Journal Seminar Nasional Biologi, 2018.
- Hammes, W. P., and C. Hertel. Research approach for pre- and probiotics: challenges and outlook. *Food Research International*, 35: 165-170, 2002.
- Harimurti, S dan E.S.Rahayu. *Morfologi usus ayam broiler yang disuplementasi dengan probiotik strain tunggal dan campuran*. *Agritech*, Vol. 29, No. 3, 2009.
- Hidayat, Masdiana N. Padaga D. dan Sukartini S. *Mikrobiologi industri*. Yogyakarta:CV andi affset, 2015.
- Holzapfel, W.H., P. Harberer, R. Geisen, J. Bjokroth, and U. Schilinger.. Taxonomy and important features of probiotic microorganism in food and nutrition. *American Journal of Clinical Nutrition*, 73: 365-373, 2001.
- Iji PA, Hughes RJ, Choct M, Tivey DR.. *Intestinal structure and function of broiler chickens on wheat-based diets supplemented with a microbial enzyme*. *Asian – Aust J Anim Sci* 14(1):54-60, 2001.
- Irianto, Koes. *Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 1*. Bandung: Yrama Widya, 2007.

- Jeffrey, J.S. *Use of Competitive Exclusion Products for Poultry*. Cooperative Extension, University Of California. Poult. Fact Sheet No. 30, 1999.
- Jin, L.Z., Ho., Abdullah. and Jalaludin. Probiotic in Poultry: Modes of Action. *World's Poultry Science*. 53: 351-368, 1998.
- Jones, F. T., and S.C. Ricket. *Observation on the history of the development of antimicrobials and floor-pen experiment with chickens*. *Exp.Parasitol*. 28:30-36, 2003.
- Katsir, Ibnu.. *Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Khaksefidi, A., and T. Ghoorchi. *Effect of probiotic on performance and immunocompetence in broiler chicks*. *Poult. Sci*. 43: 296-300, 2006.
- Khalik, F. N .Hafsan dan W. Andi. "Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat Berpotensi Probiotik pada Dangke, Makanan Tradisional dari Susu Kerbau di Curio Kabupaten Enrekang". *BIOGENESIS. J. Ilmiah Biologi*. 3 No. 1 Juni (2015): h. 60-65.
- Karaoglu, M., and H. Durdag. *The influence of dietary probiotic (Saccharomyces cerevisia) supplementation and different slaughter age on the performance, slaughter and carcass properties of broiler*. *Int. Poult. Sci*. 4(5):309-316, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2016.
- Kurniawan, W.. *Peran obat hewan dalam keamanan produk ternak*. (Online) <http://www.majalahinforet.com/2007/10/peran-obat-hewan-dalam-keamanan-produk.html>. 2011 (Diakses 10 April 2018).
- Murtidjo, B. A. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 2002.
- Ngatirah, A. *Seleksi Bakteri Asam Laktat sebagai Agensia Probiotik yang Berpotensi Menurunkan Kolesterol*. Tesis. Program Pasca Sarjana, UGM, 2000.
- Lenhardt, L. and Mozes, S. *Morphological and functional changes of the small intestine in growth-stunted broilers*. *Acta Vet. Brno*. 72:353-358, 2003.

- Pelczar, M.J & Chan, E.C.S.. *Dasar-Dasar Mikrobiologi II*. Terjemahan: R.A. Hadioetomo, T.Imas, S.S.Tjitrosomo, S.L.Angka. Universitas Indonesia press, Jakarta, 2008.
- Piliang, W.G., dan S.D Al Haj.. *Fisiologi Nutrisi Volume I*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu hayat Institut Pertanian Bogor, 1991.
- Purnama, I.D.N.A, Berata, I.K, Kardena, I.M. *Studi perkembangan histologi jejunum ayam broiler yang diberikan suplemen asam butirat*. Fakultas kedokteran hewan Universitas Udayana, Bali. 7(5): 531-539, 2018.
- Rahayu, K dan S. Sudarmadji. *Mikrobiologi Pangan*. Jogjakarta: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. UGM, 1989.
- Rasyaf, M. *Beternak Ayam Pedaging*. Jakarta. Penebar Swadaya, 2006.
- Rasyaf, M. *Pengolahan Usaha Peternakan Ayam Pedaging*. Cetakan ke-2 Penebar Swadaya, Jakarta. 2004.
- Samadi B. *Sukses beternak ayam ras petelur dan pedaging*. Pustaka Mina. Jakarta. 2010.
- Schiller LR, J.H. Sellin Diarrhea. Dalam: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, penyunting. Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease: pathophysiology, diagnosis and management. Philadelphia: Saunders Elsevier; hlm. 159–86, 2010.
- Setyani S, Medikasari., Astuti W.I. “*Fortifikasi Jagung Manis dan Kacang Hijau Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik Susu Jagung Manis Kacang Hijau*”. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian*, vol. 14. no.2.; h. 107-119, 2009.
- Shihab, M. Q. Tafsir Al- Misshbah. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Shihab, MQ. Tafsir Al-Mishbah (*Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Siregar, F. *Pengaruh Ransum Komersial terhadap Performa Teknis dan Ekonomis Beberapa Galur Ayam Broiler Umur Lima, Enam dan Tujuh Minggu*. Tesis. Fakultas Pasca Sarjana, IPB. Bogor, 1994.
- Sumarsih, S. B., C.I. Sulistiyanto, Sutrisno dan E.S. Rahayu. *Peran probiotik bakteri asam laktat terhadap produktivitas unggas (The role of lactic acid bacteria*

- probiotic on the poultry's productivity*). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol.10. No.1 –5, 2012.
- Sun, X. *Broiler performance and intestinal alteration when feed drug-free diets*. Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia, 2004.
- Sunarlim, R. “*Potensi Lactobacillus sp. Asal dari dadih sebagai starter pada pembuatan susu fermentasi khas indonesia*”. *Buletin teknologi pascapanen pertanian* 5.h. 69-79, 2006.
- Suprijatna, E. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta, 2008.
- Suprijatna, E., Atmomarsono. Kartasudjana.. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta, 2005.
- Victori, J.T. Wangko, S. Kalangi, S.J.R. *Gambaran histologic usus halus pada hewan uji coba selama 24 jam postmortem*. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017.
- Wang J, Zhang H, Chen X, Chen Y, Menghebilige, Bao Q.. Selection of Potential Probiotic Lactobacilli for Cholesterol-Lowering Properties and Their Effect on Cholesterol Metabolism in Rats Fed A High-Lipid Diet. *J Dairy Sci.* vol 95(4):1645-54, 2012.
- Yao, Y., Xiaoyan, T., Haibo, X., Jincheng, K., Ming, X. and Xiaobing, W. *Effect of choice feeding on performance gastrointestinal development and feed utilization of broilers*. *Asian-Aust. J. Anim. Sci.* 19:91-96, 2006.
- Yudiarti. T, Sugiharto, Halimatunnisroh. R. *Jumlah coliform, BAL dan total bakteri usus halus ayam broiler yang diberi kunyit (Curcuma domestica)*. *Jurnal Peternakan Indonesia* Vol 19 (2): 79-84, 2017.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Rerata luas permukaan villi pada ileum (μm) Broiler

| NO. | PERLAKUAN (P) | ULANGAN (T) | | | Rerata |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | T ₁ | T ₂ | T ₃ | |
| 1. | P ₀ | 19,95 | 7,41 | 16,64 | 14,67 |
| 2. | P ₁ | 13,73 | 9,38 | 9,83 | 10,98 |
| 3. | P ₂ | 38,02 | 19,82 | 17,60 | 25,15 |
| 4. | P ₃ | 23,50 | 21,43 | 15,35 | 20,35 |

Lampiran 2. Rerata luas permukaan villi pada jejunum (μm) Broiler

| NO. | PERLAKUAN (P) | ULANGAN (T) | | | Rerata |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | T ₁ | T ₂ | T ₃ | |
| 1. | P ₀ | 145,02 | 127,14 | 222,18 | 164,78 |
| 2. | P ₁ | 119,92 | 129,06 | 112,57 | 120,52 |
| 3. | P ₂ | 103,19 | 159,92 | 158,40 | 140,50 |
| 4. | P ₃ | 214,17 | 305,39 | 34,24 | 184,24 |

Lampiran 3. Bobot dan pertumbuhan berat badan broiler (g/ekor)

| Umur Ayam (Hari) | Bobot Badan (g/ekor) | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| | P0 | P1 | P2 | P3 |
| 2 | 54 | 55 | 55 | 50 |
| 7 | 149 | 142 | 149 | 155 |
| 14 | 328 | 324 | 355 | 345 |
| 21 | 668 | 610 | 687 | 730 |
| 28 | 1019 | 928 | 1114 | 1186 |
| 35 | 1538 | 1408 | 1579 | 1632 |
| Umur Ayam (Hari) | Pertumbuhan Bobot Badan (g/ekor/hari) | | | |
| | P0 | P1 | P2 | P3 |
| 7 | 95 | 87 | 94 | 105 |
| 14 | 179 | 182 | 206 | 109 |
| 21 | 340 | 286 | 332 | 385 |
| 28 | 351 | 318 | 427 | 456 |
| 35 | 519 | 480 | 465 | 446 |

Lampiran 4. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada luas permukaan villi ileum

ANOVA

| | | Jumlah kuadrat | df | Rerata persegi | F | Sig. |
|----------------------|----------------|----------------|----|----------------|-------|-------|
| Ulangan | Antar kelompok | .000 | 3 | .000 | .000 | 1.000 |
| | Dalam kelompok | 8.000 | 8 | 1.000 | | |
| | Total | 8.000 | 11 | | | |
| Luas permukaan ileum | Antar kelompok | 346.616 | 3 | 115.539 | 2.414 | .142 |
| | Dalam kelompok | 382.851 | 8 | 47.856 | | |
| | Total | 729.467 | 11 | | | |

| (I) konsentrasi | (J) konsentrasi | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| aquades | BAL 6 | 3.68667 | 5.64839 | .912 | -14.4015 | 21.7748 |
| | BAL 8 | -10.48000 | 5.64839 | .317 | -28.5681 | 7.6081 |
| | BAL 10 | -5.42667 | 5.64839 | .774 | -23.5148 | 12.6615 |
| BAL 6 | aquades | -3.68667 | 5.64839 | .912 | -21.7748 | 14.4015 |
| | BAL 8 | -14.16667 | 5.64839 | .133 | -32.2548 | 3.9215 |
| | BAL 10 | -9.11333 | 5.64839 | .423 | -27.2015 | 8.9748 |
| BAL 8 | aquades | 10.48000 | 5.64839 | .317 | -7.6081 | 28.5681 |
| | BAL 6 | 14.16667 | 5.64839 | .133 | -3.9215 | 32.2548 |
| | BAL 10 | 5.05333 | 5.64839 | .808 | -13.0348 | 23.1415 |
| BAL 10 | aquades | 5.42667 | 5.64839 | .774 | -12.6615 | 23.5148 |
| | BAL 6 | 9.11333 | 5.64839 | .423 | -8.9748 | 27.2015 |
| | BAL 8 | -5.05333 | 5.64839 | .808 | -23.1415 | 13.0348 |
| aquades | BAL 6 | 3.68667 | 5.64839 | .532 | -9.3385 | 16.7119 |
| | BAL 8 | -10.48000 | 5.64839 | .101 | -23.5052 | 2.5452 |

| | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----------|---------|
| | BAL 10 | -5.42667 | 5.64839 | .365 | -18.4519 | 7.5985 |
| BAL 6 | aquades | -3.68667 | 5.64839 | .532 | -16.7119 | 9.3385 |
| | BAL 8 | -14.16667* | 5.64839 | .036 | -27.1919 | -1.1415 |
| | BAL 10 | -9.11333 | 5.64839 | .145 | -22.1385 | 3.9119 |
| BAL 8 | aquades | 10.48000 | 5.64839 | .101 | -2.5452 | 23.5052 |
| | BAL 6 | 14.16667* | 5.64839 | .036 | 1.1415 | 27.1919 |
| | BAL 10 | 5.05333 | 5.64839 | .397 | -7.9719 | 18.0785 |
| BAL 10 | aquades | 5.42667 | 5.64839 | .365 | -7.5985 | 18.4519 |
| | BAL 6 | 9.11333 | 5.64839 | .145 | -3.9119 | 22.1385 |
| | BAL 8 | -5.05333 | 5.64839 | .397 | -18.0785 | 7.9719 |

Lampiran 5. Data Hasil Uji Statistik Analysis of Variance (ANOVA) Pada luas permukaan villi jejunum

ANOVA

| | | Jumlah kuadrat | df | Rerata persegi | F | Sig. |
|------------------------|----------------|----------------|----|----------------|------|-------|
| ulangan | Antar kelompok | .000 | 3 | .000 | .000 | 1.000 |
| | Dalam kelompok | 8.000 | 8 | 1.000 | | |
| | Total | 8.000 | 11 | | | |
| luas permukaan jejunum | Antar kelompok | 7044.066 | 3 | 2348.022 | .414 | .748 |
| | Dalam kelompok | 45400.802 | 8 | 5675.100 | | |
| | Total | 52444.868 | 11 | | | |

| (I) konsentra si | (J) konsentra si | Mean Difference (I- J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------|-------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| aquades | BAL 6 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 8 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 10 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| BAL 6 | aquades | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 8 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 10 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| BAL 8 | aquades | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 6 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 10 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| BAL 10 | aquades | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 6 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| | BAL 8 | .00000 | .81650 | 1.000 | -2.6147 | 2.6147 |
| aquades | BAL 6 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 8 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 10 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| BAL 6 | aquades | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 8 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 10 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| BAL 8 | aquades | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 6 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 10 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| BAL 10 | aquades | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 6 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |
| | BAL 8 | .00000 | .81650 | 1.000 | -1.8828 | 1.8828 |

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian




(Kondisi Kandang Tampak Dari Depan)



(Kondisi Kandang Tampak Dari Dalam)



(Kondisi Kandang Tampak Dari Dekat)



(Vaksinasi Broiler umur 4 hari dengan ND B1)




(Proses Suspensi)




(Proses Pengenceran)



(Penggunaan Spektrofotometer)



(Tata Letak Cuvet)



(Hasil Uji Absorbansi)



(Pemberian BAL Secara Oral)



(Pengambilan Usus Halus)

Lampiran 9. Alat dan Bahan Penelitian



(oven)



(Autoklaf)



(Vortex)



(Spektrofotometer)



(Hot Plate)



(Neraca Analitik)



(Cuvet)



(Botol Vial)



(Timbangan Digital)



(Spoit Sonde)



(Tempat Minum 3 liter)




(Lampu 60 watt)



(Karung)



(Tempat Pakan 3 kg)



(Mikroskop)



(HCL)



(Vita chicks)

*Tissue processor*



Autostainer



Mikroskop Olympus



Mikrotom



Scalpel




Objek glass




tissue cassette

Prosedur Kerja Pembuatan Preparat Histologi



Pembuatan Preparat Histologi



RIWAYAT HIDUP



SITI SORAYA ASTI, lahir di Sinjai, 10 Maret 1996. Anak Pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Syarifuddin dan Nuriati. Penulis memulai Pendidikan Sekolah dasarnya pada Tahun 2003-2004 di SD 32 Buakang kemudian pindah pada tahun 2004-2008 di SD 29 Maroanging dan menyelesaikan Pendidikan sekolah dasarnya disana. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang Pendidikan menengah pertamanya di SMPN 2 Sinjai Timur (2008-2011), lalu pada jenjang Pendidikan Menengah Atas penulis melanjutkannya di SMA 1 Sinjai Utara (2011-2014). Setelah itu penulis mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri UIN Alauddin Makassar dan dinyatakan lulus pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2014.

Selama tercatat sebagai mahasiswi Biologi, penulis juga aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus diantaranya di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi, sebagai anggota bidang Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi (POK) periode (2015-2016), Anggota DEMA Fakultas Sains dan teknologi di Bidang Akhlak dan Moral periode (2017-2018), Wakil Bendahara DEMA Fakultas Sains dan teknologi periode (2018-2019). Untuk Organisasi eksternal penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Departemen Hubungan Antar Lembaga di Korps HMI-WATI (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi

Cabang Gowaraya periode (2015-2016) dan Sekertaris Umum di Korps HMI-WATI (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowaraya periode (2018 sampai sekarang).

