

**PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG APU-APU (*Pistia stratiotes*)
TERHADAP KECERNAAN PROTEIN KASAR PADA
AYAM KAMPUNG SUPER**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:

**SUPARMAN M
60700114031**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG APU-APU (*Pistia stratiotes*)
TERHADAP KECERNAAN PROTEIN KASAR PADA
AYAM KAMPUNG SUPER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:

SUPARMAN M
60700114031

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparman M
Nim : 60700114031
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 11 November 1996
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Alamat : Perumahan Bukit Baruga Antang
Judul : Pengaruh Pemberian Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Kecernaan Protein Kasar pada Ayam Kampung Super

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Karya Skripsi yang saya tulis adalah asli. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

Gowa, Februari 2019



Suparman M
60700114031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **Pengaruh Pemberian Tepung Apu-Apu (*Pistia stratiotes*) Terhadap Kecernaan Protein Kasar pada Ayam Kampung Super** yang disusun oleh **SUPARMAN M.** NIM: 60700114031, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan dalam Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, Februari 2019

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. Wasilah, S.T., M.T.**


Sekretaris : **Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.**

Munaqisyi I : **Dr. Muh. Nur Hidayat S.Pt., M.P.**

Munaqisyi II : **Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi**

Pembimbing I : **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.**

Pembimbing II : **Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.**



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691705199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Segala puja dan puji bagi Allah swt atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada penulis sehingga dapat merampungkan penulisan Skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Pemberian Tepung Apu-Apu (*Pistia stratiotes*) Terhadap Kecernaan Protein Kasar pada Ayam Kampung Super**. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan serta telah membawa ummat dari lembah kehancuran menuju alam yang terang benderang.

Melengkapi rasa syukur sekaligus ucapan banyak terima kasih atas segala himbuan dan pengarahan, maka perkenankanlah menghaturkan banyak terimah kasih yang istimewa kepada Ayahanda tercinta **H. MARSUKI** dan Ibunda **HJ. SUKAENI** yang telah melahirkan, mendo'akan, mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudari yang senantiasa memberikan support kepada penulis.

Terima kasih tak terhingga kepada Ibu **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** selaku Pembimbing I dan kepada Ibu **HJ. Irmawaty., S.Pt., M.P** selaku Pembimbing II atas didikan, bimbingan serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk dan menyumbangkan pikirannya dalam membimbing penulis mulai dari perencanaan penelitian sampai selesainya skripsi ini.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku Rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan dan **Ibu Astaty S.Pt., M.Si** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
5. **Bapak Dr. Muh. Nur Hidayat., M.P** dan **Bapak Dr. Thahir Maloko., M.Hi** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih pula kepada rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar **ELANG** Angkatan 2014 karena sudah memberikan motivasi yang sangat bermanfaat sehingga penulis tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan selama penelitian, tim *Pistia stratiotes* **Khaerullah, Muhammad Rusli, Muhammad Basri, Makmur, Awal, dan Muh Mudzakkir.**

8. Teman-teman **KKN Angkatan 58 Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.**
9. Terima Kasih banyak kepada kakak **Andi Afriana, SE** selaku pegawai Jurusan yang membantu dalam pengurusan berkas, Kakanda **Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.P** dan **Hikmawati S. Pt**, selaku laboran Jurusan Ilmu Peternakan dan Kakanda **Dzul yadaini, S.Pt.**
10. Terima Kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam proses penelitian **Rahmawati, S.Pt, Isra Nurfadilah Haris, S.Pt, Usman, Redho Al-Fazrin** dan **Ria Rizki Amelia.**
11. Terima Kasih kepada teman-teman **Restorasi**, teman-teman seperjuangan di Lembaga Kemahasiswaan baik itu **HMJ Ilmu Peternakan** maupun **DEMA-Fakultas.**

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan Skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, Februari 2019

SUPARMAN M
60700114031

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Ruang Lingkup Penelitian	7
G. Hipotesis	7
H. Kajian Terdahulu	7


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Hewan Ternak dalam Tinjauan Al-Qur'an	9
B. Pemanfaatan Tanaman Apu-apu (<i>Pistia stratiotes</i>) dalam Al-Qur'an ...	13
C. Hadist tentang Larangan Makan Secara Berlebihan	15
D. Ayam Buras (Bukan Ras)	16
E. Klasifikasi Ayam Kampung	18
F. Ayam Kampung Super	20
G. Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung	27
H. Bahan dan Kandungan Pakan	34
I. Konsumsi Pakan	38
J. Konversi Pakan	40
K. Kecernaan Protein	42
L. Protein	43
M. Apu-Apu (<i>Pistia stratiotes</i>)	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	51
B. Alat dan Bahan Penelitian	51
C. Jenis penelitian	54

D. Metode penelitian	54
E. Parameter yang Diukur	56
F. Analisis Data	57
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv



DAFTAR TABEL

No	Teks	Hal.
1.	KebutuhanNutrisi Ayam Kampung Berdasarkan Umur	30
2.	Kebutuhan Zat Nutrisi	31
3.	Kebutuhan Gizi Ayam Kampung	33
4.	Konsumsi Pakan Ayam Kampung Pada Berbagai Umur.....	39
5.	Kebutuhan Ransum/Ekor/Hari Sesuai dengan Umur.....	39
6.	Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dan Energi Metabolisme Ransum Penelitian.....	53
7.	Susunan Ransum Penelitian	53
8.	Kandungan Zat-Zat Makanan, Energi Metabolisme dan Asam Amino Ransum Penelitian.....	54
9.	Rataan Nilai Kecernaan Protein Kasar Ayam Kampung Super.....	59

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Hasil Rataan Nilai Kecernaan Protein Kasar pada Ayam Kampung Super Terhadap Pemberian Tepung Apu-apu	59



ABSTRACT

Name : Suparman M
Nim : 60700114031
Department : Animal Husbandry
Title : Effect of Apu-Apu Flour (*Pistia stratiotes*) Against Rough Protein Digestion in Super-Chicken Village

This study aims to determine the effect of the use of Apu-apu flour (*Pistia stratiotes*) in the diet of super chicken chicken on the digestibility of crude protein. The research was conducted on 13 October to 13 November 2018. Located in the village of Bonto Tallasa Kec Hemat Ulu Ere, Bantaeng Regency, South Sulawesi and continued at the Laboratory of Animal Food Chemistry, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi. The method used in this study is Complete Random Design (CRD) with 5 treatments, 3 replications and methods for measuring protein digestibility, namely the collection method of the ileum digesta. The use of apu-apu content in each treatment was different, namely P0 0%, P1 5%, P2 10%, P3 15% and P4 20%. In this study using 15 super village chickens, one unit each containing 1 tail with 5 treatments and 3 replications. The average yield of crude protein digestibility shows the data percentage as follows: P0 (92.08%), P1 (92.42), P2 (94.15), P3 (90.96), P4 (91.79). Based on the results of variance showed that the treatment had no significant effect ($P > 0.05$) on the digestibility of crude protein in super chicken, but could be used as feed ingredients that could substitute other feed ingredients such as soybean meal and fish meal. Therefore the use of apu-apu flour in the ration formulation in this study to the standard limit of adding 10% apu-apu.

Keywords: *Super chicken, Apu-apu Flour, Rough Protein Digestion.*

ABSTRAK

Nama : Suparman M
Nim : 60700114031
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pengaruh Pemberian Tepung Apu-Apu (*Pistia stratiotes*) Terhadap Kecernaan Protein Kasar Pada Ayam Kampung Super

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) dalam ransum pakan ayam kampung super terhadap pencernaan protein kasar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober sampai 13 November 2018. Bertempat di di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan dilanjutkan di Laboratorium Kimia Makanan Ternak Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 3 ulangan serta metode dalam pengukuran daya cerna protein yaitu metode koleksi digesta ileum. Penggunaan kadar tepung apu-apu pada setiap perlakuan berdeda yaitu P0 0%, P1 5%, P2 10%, P3 15% dan P4 20%. Dalam penelitian ini menggunakan 15 ekor ayam kampung super, masing-masing satu unit berisi 1 ekor dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Hasil rata-rata nilai pencernaan protein kasar menunjukkan presentase data sebagai berikut: P0 (92,08%), P1 (92,42), P2 (94,15), P3 (90,96), P4 (91,79). Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap pencernaan protein kasar pada ayam kampung super, tetapi bias dimanfaatkan sebagai bahan pakan yang dapat mensubstitusi bahan pakan lain seperti bungkil kedelai dan tepung ikan. Oleh karena itu penggunaan tepung apu-apu dalam formulasi ransum pada penelitian ini sampai batas standar penambahan 10% tepung apu-apu.

Kata Kunci: Ayam Kampung Super, Tepung Apu-apu, Kecernaan Protein Kasar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri peternakan maupun usaha yang bergelut dibidang peternakan terkhusus disektor perunggasan, itu kemudian menjadi salah satu bidang usaha yang sedikit banyaknya dilirik oleh masyarakat indonesia. Hal ini dikarenakan usaha disektor perunggasan ini cukup menjanjikan, melihat kebutuhan protein hewani semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya itu kemudian akan menambah jumlah permintaan dan kebutuhan protein hewani, sedangkan stok yang tersedia masih kurang. Karena alasan dan problem inilah usaha dibidang perunggasan kemudian cukup menjanjikan untuk dikembangkan kedepannya.

Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum Muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Mukminum/23:21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada didalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat manfaat yang

banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan (Kementerian Agama, RI. 2013).

Jenis ternak yang sampai saat ini menjadi andalan sebagai sumber daging/protein hewani umumnya berasal dari ternak unggas dan sapi potong. Dengan demikian salah satu sumber protein hewani sektor perunggasan ini menjadi salah satu solusi dalam permasalahan ketersediaan daging.

Daging unggas menjadi salah satu komoditas karena mengandung zat gizi yang begitu banyak. Semua unggas jantan dan betina dapat menghasilkan daging. Unggas penghasil daging umumnya mempunyai ciri-ciri kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan yang cepat, dan hemat pakan. Dengan ciri-ciri tersebut ada beberapa unggas yang cocok dijadikan unggas pedaging, salah satunya ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

Melihat histori perunggasan di Indonesia, sebelum ada ayam ras, ayam kampung merupakan sumber utama untuk daging unggas. Pada saat ini, ayam kampung juga masih menjadi sumber daging unggas, meskipun menempati urutan kedua setelah ayam ras. Seiring perkembangan teknologi dibidang peternakan, maka ayam kampung kemudian dihasilkan hasil persilangan dari ayam kampung dan ayam ras petelur menjadi ayam kampung super.

Salah satu ayam kampung yang sudah dikembangkan yaitu ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) merupakan hasil penelitian dari Badan Litbang Pertanian. Sarana peningkatan populasi untuk pemenuhan protein hewani dari data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) memiliki keunggulan kemampuan produksitelur 160-180 butir/tahun dan bobot panen 800-900 g dalam waktu pemeliharaan selama 10

minggu. Potensi lain ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) dapat digunakan sebagai sumber bibit *parent stock* untuk penyediaan DOC ayam kampung potong yang dibutuhkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan daging ayam kampung (Sartika dkk. 2014).

Ayam kampung super merupakan hasil dari persilangan ayam kampung dan ayam ras betina/petelur. Persilangan ini bertujuan untuk mendapatkan daging ayam rasa kampung tetapi pertumbuhannya cepat dan hasil dagingnya banyak, serta produksi telurnya pun lebih banyak dari ayam kampung biasanya.

Menurut (Yaman, 2010), perbedaan yang paling signifikan antara ayam kampung umumnya dengan ayam kampung super terlihat pada kemampuan menghasilkan daging, terutama pada organ tubuh bagian dada dan bagian paha, seperti ayam pedaging unggul lainnya, perkembangan kedua jenis tipe otot tersebut menunjukkan bahwa ayam kampung super memiliki sifat dengan jenis ayam pedaging lainnya. Ciri-cirinya adalah otot bagian dada dan paha tumbuh lebih cepat dan dominan daripada bagian tubuh lainnya.

Pertumbuhan ayam kampung super ini lebih cepat dibandingkan ayam kampung (buras) karena sudah mengalami perbaikan genetik dimana masa pemeliharaan panen membutuhkan waktu 50-60 hari dengan bobot badan sekitar 0,8 – 1,0 kg/ekor serta efisien dalam penggunaan ransum.

Kebutuhan protein ayam kampung super berdasarkan umur pertumbuhan, umur 1-1,5 bulan kadar protein 18-22%, umur 1,5- 3 bulan kadar protein 16-18% sedangkan umur 3 bulan keatas 15-16%. Kebutuhan protein ayam kampung super

lebih rendah bila dibandingkan dengan ayam broiler maupun ras petelur (Agustina, 2013).

Ayam kampung super dalam pemeliharaannya membutuhkan pakan yang berkualitas untuk pemenuhan gizinya, sebab pakan yang sempurna dengan kandungan zat nutrisi yang seimbang akan memberikan hasil yang optimal. Kenyataan sekarang ini harga pakan komersial dipasaran harganya dirasakan oleh peternak sangat mahal sehingga pakan merupakan komponen terbesar dalam usaha peternakan unggas. Biaya pakan ini dapat mencapai 60-70% dari total biaya produksi (Tilman dkk. 1991), sehingga sangatlah penting untuk dicari alternatif lain dalam ketersediaan bahan pakan ransum. Upaya untuk mengatasi masalah pakan dengan jalan memanfaatkan potensi bahan pakan lokal yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan limbah tanaman ataupun gulma pada tanaman.

Penggunaan gulma air (*water plant*), seperti Tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes* L) ataupun *duckweed* merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Disamping itu, Apu-apu mampu meningkatkan serat dan menurunkan energi metabolis ransum. Disadari bahwa Apu-apu merupakan bahan baku pakan lokal dengan serat, nilai nutrien, dan produksi biomassa bahan kering yang cukup tinggi, 16,1ton BK/ha/ tahun (Reddy dan Debusk, 1985); tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, disukai oleh unggas, ikan, dan babi.

Tanaman apu-apu (*Pistia stratiotes*) merupakan tumbuhan air yang biasa dijumpai diperairan tenang, kolam ikan atau di sawah sebagai hama/gulma yang mengganggu pertumbuhan padi serta meresahkan para petani jika ingin membunuhnya. Selain memiliki kandungan protein, lemak kasar, nilai pencernaan

yang tinggi mengandung juga flavonoid, tanin, dan polifenol. Sedangkan cara mengembangbiakkannya sangat mudah, cukup dengan memisahkan anaknya yang tumbuh dari batang jalurnya lalu kita pindahkan ke tempayan yang lain. Jika ditinjau dari kandungan nutrisinya, tanaman apu-apu dapat dijadikan sebagai bahan penyusun pakan ternak karena berdasarkan berat kering mengandung BETN 37,0%, protein kasar 19,5%, kadar abu 25,6%, lemak kasar 1,3% dan serat kasar 11,7% (Haridjaja dkk. 2009).

Melihat kandungan nutrisi tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*) ini dapat dijadikan sebagai bahan penyusun pakan ternak yang kaya akan proteinnya. Karena kandungan protein kasar pada Apu-apu ini 19,5%. Berdasarkan kandungan protein daging pada ayam kampung super ini, dalam setiap 100 gram daging, kandungan protein ayam kampung 18,1%. Hal ini menjadikan landasan bahwasanya tanaman Apu-apu dapat dijadikan sebagai bahan penyusun pakan ternak.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis mencoba memanfaatkan tanaman gulma/hama yakni tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*) pada Ayam kampung super agar dapat mengetahui tingkat pencernaan protein kasar pada ternak, serta melihat potensi formulasi bahan pakan dengan menambahkan tepung apu-apu mampu bersaing dengan pakan komersil/pakan pabrikan sehingga dapat mengefisienkan penggunaan pakan dalam usaha peternakan ayam kampung super.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana melihat pengaruh penggunaan tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) dalam ransum pakan ayam kampung super terhadap pencernaan protein kasar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) dalam ransum pakan ayam kampung super terhadap pencernaan protein kasar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi pembaca terkait dengan pengaruh tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap pencernaan protein kasar pada ayam kampung super
2. Sebagai informasi terbaru bagi peternak serta dapat mengaplikasikan hasil dari penelitian ini untuk meningkatkan penghasilan produk yang lebih unggul dan berkualitas.
3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
4. Serta sebagai inovasi pembuatan pakan formulasi yang mampu bersaing dengan pakan komersil/pakan pabrikan.

E. Defenisi Operasional

1. Ayam kampung super merupakan ayam hasil persilangan antara pebantankampung dengan betina ras petelur menghasilkan ayam dengan

pertumbuhan lebih cepat dibandingkan ayam kampung (umur panen 60 hari atau 2 bulan (Gunawan dan Sihombing, 2004).

2. Tanaman apu-apu (*Pistia stratiotes*) merupakan tumbuhan air yang biasa dijumpai diperairan tenang atau kolam ikan.

3. Kecernaan protein kasar/Daya cerna protein adalah jumlah fraksi nitrogen dari bahan makanan yang dapat diserap oleh tubuh (Winarno, 1991).

4. Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya sejumlah unsur nutrisi yang ada didalam ransum yang telah tersusun dari berbagai bahan makanan untuk memenuhi nutrisi ayam (Rasyaf, 1994).

5. Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang di konsumsi dengan produksi daging yang dihasilkan, semakin rendah nilai FCR suatu pakan maka semakin bagus kualitas dari pakan tersebut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu menganalisis pengaruh penggunaan tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap pencernaan protein kasar pada ayam kampung super serta membuat inovasi pembuatan pakan formulasi yang mampu bersaing dengan pakan komersil/pakan pabrikan.

G. Hipotesis

Diduga bahwa tingkat pencernaan protein kasar tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) lebih tinggi dibanding pakan tanpa pemberian tepung apu-apu.

H. *Kajian Terdahulu*

Berdasarkan hasil penelitian Yudhistira (2013), menunjukkan bahwa daun apu-apu fermentasi *Aspergillus niger* memiliki kandungan nutrient yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pakan alternatif sumber protein nabati karena memiliki kadar protein sebesar 24,43%, kadar lemak kasar sebesar 2,15%, kadar air sebesar 8,74%, serat kasar sebesar 12,08% dan nilai pencernaan protein 61,26%.

Berdasarkan hasil penelitian I. N. Sutarpa Utama dengan judul penelitian Pengaruh Suplementasi Kapu - Kapu (*Pistia Stratiotes* L) Dalam Ransum Terhadap Kolesterol Pada Serum Dan Daging Ayam Kampung dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kapu – kapu sampai 30% dalam ransum mampu menurunkan LDL serum dan total kolesterol daging, di samping dapat meningkatkan HDL serum, tanpa mempengaruhi total kolesterol, trigliserida, dan VLDL serum.

Berdasarkan hasil penelitian Fery Dwi Riptianingsih, Nur Hidayah dan Dinda Mulia Utami. Telur itik merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung protein dan kolesterol tinggi. Kandungan kolesterol yang tinggi pada telur itik dapat membahayakan kesehatan. Penggunaan (*Pistia stratiotes*) sebagai campuran pada ransum itik merupakan salah satu inovasi yang solutif dan tepat guna untuk menghasilkan produk telur itik tinggi protein dan rendah kolesterol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Tinjauan Al-Qur'an tentang Hewan Ternak

Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Allah swt. yang memiliki habitat, cara hidup dan perilaku, ukuran, warna, bentuk yang beragam-penuh dengan keajaiban. Dalam perspektif al-Qur'an hewan merupakan salah satu bagian dari ayat-ayat Allah swt. yang harus di kaji dan direnungkan. Jika fenomena tersebut di renungkan dapat mengungkap tanda-tanda eksistensi dan kekuasaan Allah swt. serta dapat memeperkokoh keimanan bagi orang-orang yang meyakinya. Pemahaman yang benar dan mendalam dapat mendekati diri kepada Allah swt.

Ketika melihat keindahan binatang-binatang, hewan ternak maka ketahuilah bahwa Allah, Sang Pencipta semua makhluk ini, hanya ingin agar kita berpikir tentang keahlian dan kekuasaan-Nya yang tak terbatas, mengakui bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dialah pemilik segala sesuatu. Allah juga menginginkan kita melihat keindahan dalam makhluk hidup ini, untuk mendapatkan kesenangan dari-Nya dan oleh karena-Nya kita mencintai Allah dan berterima kasih kepada-Nya karena Allah telah menciptakan makhluk-makhluk mempesona, dan bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya.

Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia dan unggas (sapi, kambing,

domba dan kerbau) dan (ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur dan jenis ayam lainnya) yang mampu mengubah rumput (hijauan) dan bahan pakan lainnya menjadi daging, susu dan telur . Atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia (QS al-Nahl/16: 68-69). Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum Muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Mukminum/23:21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نَسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada didalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan (Kementerian Agama, RI. 2013).

“Tafsir Jalalayn” kandungan dari QS al-Mukminum/23:21 menjelaskan bahwa (Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak bagi kalian) yakni unta, sapi dan kambing (benar-benar terdapat pelajaran yang penting) bahan pelajaran yang kalian dapat mengambil manfaat besar dari padanya (Kami memberi minum kalian) dapat dibaca Nasqiikum dan Nusqiikum (dari apa yang ada didalam perutnya) yakni air susu (dan juga pada hewan ternak itu terdapat faedah yang banyak bagi kalian) dari bulu domba, unta dan kambing serta manfaat-manfaat yang lainnya (dan sebagian dari padanya kalian makan).

“Tafsir Quraish Shihab” kandungan QS al-Mukminun/23:21 menjelaskan bahwa sungguh, pada hewan-hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, benar-benar terdapat bukti kekuasaan dan pertanda kemurahan Kami dalam menganugerahkan karunia untuk kalian. Kalian Kami beri minum susu murni, lezat dan mudah diminum, yang keluar dari dalam perut hewan-hewan itu. Selain susu, hewan-hewan itu mengandung daging, kulit, dan bulu yang sangat berguna. Dari hewan-hewan itu kalian dapat hidup memperoleh rezeki.

Mahasuci Allah yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surat al-Mukminun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan.

Berdasarkan pendapat Profesor I.K. Han, Guru Besar Ilmu Produksi Ternak Universitas Nasional Seoul (1999) menyebutkan pentingnya peran ternak dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak) dan sebagai dam pada saat melakukan ibadah haji.

Ayat lainnya yang menjelaskan tentang hewan ternak yakni sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-An'aam/6:38 yang berbunyi,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Kementerian Agama, RI. 2013).

Asy-Sya'rawi menguraikan hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya bahwa sesungguhnya Allah swt. telah menjelaskan kepada kita bahwa Dia yang Maha Kuasa telah menurunkan ayat-ayat yang Dia ketahui bahwa fitrah manusia yang sehat akan menerima dan mempercayainya sebagai ayat/bukti. Allah swt. telah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an bagi seluruh manusia agar mereka percaya kepada Rasul yang membawanya dan al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi kebahagiaan umat manusia. Allah swt. menjadikan manusia sebagian penguasa alam, semua wujud melayani mereka. Sungguh sangat wajar manusia memperhatikan dan menyadari bagaimana binatang-binatang ditundukkan Allah untuk kemaslahatan manusia, demikian juga bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan binatang dan manusia. Maka jika Allah swt. telah menundukkan semua itu untuk manusia demi kemaslahatan mereka sambil memberi kepada masing-masing binatang dan tumbuhan itu sistem serta naluri yang sesuai baginya sekaligus mendukung fungsinya dan dalam bentuk yang menyenangkan manusia. Maka bagaimana mungkin Allah swt. membiarkan manusia tanpa petunjuk dan ketentuan-ketentuan demi kebahagiaan hidup makhluk yang Dia jadikan khalifah di muka bumi ini?

“Tafsir Quraish Shihab” Kandungan QS al-Ana’am/6:38 menjelaskan bahwa Bukti paling kuat atas kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah adalah bahwa Dia mencipta segala sesuatu. Tiada binatang yang melata di bumi atau burung yang terbang di awan-awan kecuali diciptakan oleh Allah dengan berkelompok-kelompok seperti kalian, lalu Dia beri ciri khusus dan cara hidup tersendiri. Tidak ada sesuatu apa pun yang luput dari catatan Kami dalam kitab yang terjaga di sisi Kami (al-lawh al-mahfûzh), walau mereka tidak mempercayainya. Pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama bangsa-bangsa lain untuk diadili. Makhluk hidup dikelompokkan menurut keluarga-keluarga yang mempunyai ciri-ciri genetik, tugas, dan tabiat tersendiri. Dalam ayat ini terdapat isyarat tentang perbedaan bentuk dan cara hidup antara makhluk-makhluk hidup itu, suatu ketentuan yang berlaku pada manusia dan makhluk hidup yang lain.

B. Pemanfaatan Tanaman Apu-Apu (*Pistia stratiotes*) dalam Al-Qur’an

Alam semesta dengan segala isinya diciptakan Allah hanya untuk kepentingan makhluk hidup, segala sesuatu yang diciptakan pasti mengandung manfaat. Limbah merupakan hasil sisa industri yang umumnya dibuang, tetapi tidak semua limbah itu adalah sampah begitupun dengan gulma (tanaman pengganggu) tidak semua gulma itu adalah hama/pengganggu bagi tanaman lainnya. Salah satu contoh limbah/gulma/hama yang memberikan manfaat untuk makhluk hidup lainnya adalah gulma pada pertanian. Gulma yang dimaksud ini adalah tanaman Apu-Apu (*Pistia stratiotes*) merupakan gulma pada padi yang

mampu dijadikan pakan ternak serta obat-obatan. Pemanfaatan Limbah/Gulma ini sejalan dengan apa yang tertera dalam QS Thaahaa/20:53-54..

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS Thaahaa/20:53-54 Ali ‘Imran/3:191

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَنْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۗ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“53. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. 54. Makanlah dan gembalkanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal” (Kementrian Agama RI. 2013).

Ayat tersebut menjelaskan tentang Dialah Tuhan yang menganugerahkan nikmat kehidupan dan pemeliharaan kepada hamba-hamba-Nya. Dengan kekuasaan-Nya, Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu, membuka jalan-jalan untuk kamu lalui dan menurunkan hujan di atas bumi sehingga terciptalah sungai-sungai. Dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda warna, rasa dan manfaatnya. Ada yang berwarna putih dan hitam, ada pula yang rasanya manis dan pahit. Allah memberi petunjuk kepada para hamba-Nya cara memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang telah ditumbuhkan-Nya. Yaitu dengan memakan, menggembalakan binatang. Allah menjelaskan bahwa di dalam penciptaan makhluk, pengaturan dan cara memanfaatkannya terdapat bukti-bukti nyata yang dapat dijadikan petunjuk bagi

orang-orang yang berakal untuk beriman kepada Allah dan risalah- risalah-Nya (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan betapa besarnya karunia/nikmat yg Allah berikan pada kita diantaranya menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia yg dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana seperti jalan menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi yang kering dan tandus menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi ternak dan dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga tanaman/tumbuh-tumbuhan ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan pakan untuk ternaknya, salah satunya tanaman gulma yakni tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*) ini sebagai pakan ternak ayam kampung super.

C. Hadis tentang Larangan Makan Secara Berlebihan

Adapun hadis yang disandarkan kepada Rasulullah *saw.* mengenai ada seorang muslim dalam makan, yaitu jangan berlebihan makan sampai kenyang yang membuat malas dan merusak kesehatan.

Hadis Rasulullah *saw.* dalam HR at-Tirmidzi, Ibnu Hibban.

عن المقدم بن معدي كرب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَةٌ يُقْمَنَ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَأَمْحَالَةَ فَأَعْيَالًا فَتُلْتُ لَطْعَامِهِ وَتُلْتُ لَشَرًّا بِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ (رواه الترمذی وابن حبان)

Artinya:

Dari miqdam bin ma'dikariba sesungguhnya Rasulullah *saw* bersabda: "Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih,

maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya (HR Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis tersebut bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk makan yang cukup dan tidak memenuhi seluruh perut kita dengan makanan. Tetapi dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara.

Ditinjau dari hadis tersebut pemberian pakan pada ternak hendaknya tidak berlebihan karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Pemberian pakan yang tepat sesuai kebutuhan nutrisi pada Ayam kampung super ini akan meningkatkan pertumbuhan pada ternak itu sendiri serta asupan nutrisinya tercukupi.

D. Ayam Buras (*Bukan Ras*)

Dalam usaha peternakan terdapat pengelompokkan ayam kampung berdasarkan profilnya. Hasil pengelompokkan ini belum dinyatakan sebagai ras ayam kampung tetapi disebut ayam buras spesifik. Hal itu dikarenakan buras sebenarnya adalah ayam kampung yang rasanya bercampur baur dan tidak terdeteksi lagi akibat perkawinan secara liar (Mulyono, 2004).

Ayam buras (bukan ras) merupakan suatu istilah yang diberikan pada jenis jenis ayam lokal asli Indonesia. Istilah tersebut baru muncul sekitar tahun delapan puluhan. Pemakaian istilah tersebut digunakan untuk membedakan antara jenis ayam lokal dengan jenis ayam unggul impor yang biasa disebut ayam ras (Suprijatna, 2005).

Ayam buras spesifik atau ayam asli Indonesia diduga berasal dari empat spesies. Keempatnya ialah *Gallus varius*, *Gallus gallus*, *Gallus sonnerati*, dan *Gallus lavayeti*. Jika dilihat dari sifat ayam dan warna bulunya cenderung hijau dan merah, ayam-ayam tersebut lebih cenderung berasal dari *Gallus gallus* dan *Gallus varius*. Dalam pengembangan lebih lanjut, keturunan ayam-ayam tersebut menghasilkan ayam khas atau spesifik diantaranya ayam kedu, ayam bekisar, ayam nunukan, ayam pelung, dan ayam sentul (Mulyono, 2004).

Pada awal pembangunan peternakan di Indonesia, terutama sebelum tahun tujuh puluhan, kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani asal ayam hampir seluruhnya dipenuhi oleh ayam buras. Ayam buras tersebut berasal dari peternakan rakyat yang pemeliharaannya dilakukan secara ekstensif tradisional. Setelah tahun tujuh puluhan, sejalan dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya gizi yang baik, dan meningkatnya daya beli masyarakat maka permintaan protein hewani asal ayam buras meningkat dengan pesat. Ketersediaan ayam pun tak lagi bisa dipenuhi oleh peternakan ayam buras. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan peternakan ayam ras guna mengantisipasi permintaan produk ayam (Suprijatna, 2005).

Salah satu daya tarik masyarakat untuk beternak ayam buras adalah harganya yang selalu mengalami peningkatan dan fluktuasi harganya relatif tetap. Selain itu, sistem penjualan produk ayam buras tidak didasarkan pada satuan berat (kilogram), tetapi didasarkan pada satuan ekor (untuk daging) dan butir (untuk telur). Bagi peternak, sistem tersebut cukup menguntungkan. Ayam buras juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan ayam ras. Ayam

buras juga relatif jarang mengalami stres (cekaman) akibat perubahan musim atau karena kondisi yang buruk. Ayam buras memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang buruk. Hal ini menjadikan pemeliharaan ayam buras dapat dilakukan meskipun dengan teknologi pemeliharaannya dan pemberian pakan yang sederhana (Suprijatna, 2005).

Ayam buras mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat terutama di pedesaan. Ayam buras selain dijadikan sebagai sumber protein hewani, baik daging maupun telur guna memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Peranan ayam buras sebagai penghasil daging cukup menonjol dan sebagai penghasil telur juga mempunyai andil cukup besar. Perlu dicatat bahwa produk ayam buras seperti telur dan dagingnya mempunyai keistimewaan sehingga sukar digantikan oleh komoditas lainnya. Hal ini terbukti dari permintaan daging ayam sayur (buras) yang belum seluruhnya dapat terpenuhi (Kartasudjana, 2006).

Sistem pemeliharaan yang tradisional, makanan yang kurang baik, pengawasan/pencegahan penyakit yang kurang, serta mutu genetik yang rendah, menjadi penyebab rendahnya produktivitas, terhambatnya pertumbuhan dan penurunan populasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi ayam buras ini, yaitu dengan memberi bantuan vaksinasi terutama penyakit ND (tetelo). Penyakit ini merupakan penyakit yang sering melanda ayam buras dengan resiko kematian yang tinggi. Kegiatan ini disebut dengan Intensifikasi Vaksinasi (INVAK) melalui anggaran proyek-proyek pembangunan yang didukung dengan dana APBN dan APBD dan ternyata angka kematian dapat ditekan dari 62%

menjadi 38%. Sejak tahun anggaran 1985/1986 ayam buras dimasukkan sebagai komoditas nasional dalam koordinasi Badan Pengendali Bimas yang dikembangkan melalui program Intensifikasi Ayam Buras (INTAB). Melalui INTAB diterapkan teknologi Sapta Usaha Intab, dengan vaksinasi ND pada ayam buras menjadi utama (Kartasudjana, 2006).

E. Klasifikasi Ayam Kampung

Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokkan jenis-jenis ternak berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik. Suprijatno, dkk (2005) mengemukakan taksonomi ayam kampung didalam dunia hewan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Subphylum : Vertebrata
Class : Aves
Subclass : Neornithes
Ordo : Galliformes
Famili : Phasianidae
Genus : Gallus
Spesies : *Gallus domesticus*
Subspesies : *Gallus gallus domesticus*

Menurut Hardjosubroto (1994), yang menyatakan bahwa ayam yang ditenak masyarakat dewasa ini berasal dari 4 spesies Gallus, yaitu:

1. *Gallus-gallus*

Spesies ini sering disebut juga sebagai *Gallus bankiva*, terdapat disekitar India sampai ke Thailand, termasuk Filipina dan Sumatera. Karakteristik dair spesies ayam ini adalah jengger berbentuk tunggal dan bergerigi. Bulu yang betina berwarna coklat bergaris hitam, sedangkan jantan mempunyai leher, sayap, dan punggung berwarna merah sedangkan dada dan badan bagian bawah berwarna hitam. Ayam yang jantan berwarna merah dan sering disebut Ayam Hutan Merah.

2. *Gallus lavayeti*

Spesies ini banyak terdapat di sekitar Ceylon, sebab itu juga sebagai Ayam Hutan Ceylon. Ayam ini mempunyai tanda-tanda mirip seperti *Gallus gallus*, hanya saja yang jantan berwarna merah muda atau orange.

3. *Gallus soneratti*

Spesies ini terdapat disekitar India Barat Daya. Tanda-tanda ayam ini mirip seperti *Gallus gallus*, hanya saja warna yang menyolok pada yang jantan adalah warna kelabu.

4. *Gallus varius*

Spesies ini terdapat di sekitar Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Yang jantan mempunyai jengger tunggal tidak bergerigi, mempunyai bulu penutup bagian atas berwarna hijau mengkilau dengan sayap berwarna merah. Karena adanya warna kehijauan ini maka ayam ini disebut Ayam Hutan Hijau.

Ayam Hutan Hijau (*Gallus varius*) inilah yang merupakan nenek moyang ayam kampung yang umum dipelihara. Ayam kampung yang ada kini masih menurunkan sifat-sifat asal nenek moyangnya, oleh karena itu varietas asal unggas hutan setengah liar ini dikenal dengan Ayam kampung (Kingston, 1979 dalam Rasyaf, 2006).

F. Ayam Kampung Super

Ayam lokal adalah jenis ayam asli Indonesia, masih alami, dan belum banyak mengalami perbaikan mutu genetik. Ayam lokal disebut pula ayam bukan ras (buras), untuk membedakannya dengan ayam ras. Di beberapa daerah, ayam lokal dikembangkan masyarakat sehingga memiliki karakteristik yang relatif homogen, baik bentuk tubuh maupun warna bulu. Kemudian, ayam itu diberi nama berdasarkan nama daerah atau nama tertentu. Contohnya, ayam kedu, ayam sentul, ayam nunukan. Sementara karakteristik ayam lokal yang dipelihara oleh sebagian besar masyarakat di pedesaan masih alami. Bentuk tubuh maupun warna bulu sangat beragam, biasanya disebut sebagai Ayam kampung (Suprijatna, dkk. 2005).

Ayam kampung merupakan salah satu unggas lokal yang memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan sebagai komoditi peternakan, karena produk yang dihasilkan berupa daging dan telur harganya relatif murah jika dibandingkan dengan daging asal ternak lain. Karena itu, permintaan konsumen terhadap ayam kampung dari tahun ke tahun semakin meningkat (Agromedia, 2005).

Sebelum ada ayam ras, ayam kampung merupakan sumber utama untuk daging unggas. Pada saat ini, ayam kampung juga masih menjadi sumber daging unggas, tetapi menempati urutan kedua setelah ayam ras. Sebagai unggas penghasil daging, ayam kampung mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sama halnya dengan itik lokal, kelebihanya adalah lebih tahan terhadap cekaman (stres) dibandingkan dengan ayam ras. Daging ayam kampung masih sangat disukai terutama untuk jenis olahan tertentu. Adapun kekurangannya adalah perkembangbiakannya lambat karena produksi telurnya sedikit dan sifat mengeramnya masih tinggi. Tetapi untuk mendapatkan daging ayam kampung, pertumbuhannya cepat dan hasil dagingnya banyak, dapat ditempuh melalui persilangan ayam kampung jantan dengan ayam ras betina (Hardjosworo, 2000).

Pemeliharaan ayam kampung pada umumnya masih dilakukan secara ekstensif tradisional atau secara diumbar di halaman dan di kebun sekitar rumah, sehingga produktivitasnya rendah (Sartika dkk., 2014). Menurut (2015), produktivitas ayam kampung dari rata-rata bobot akhir ayam kampung umur 10 minggu sebesar 501,17 g. Problema produksi daging ayam kampung dilakukan upaya respon kebutuhan teknologi pembibitan ayam kampung unggul, Balai Penelitian Ternak (Balitnak) telah melakukan berbagai kegiatan penelitian pada ayam kampung. Hasil penelitian menunjukkan, melalui teknologi seleksi disertai sistem pemeliharaan yang intensif, produktivitasnya dapat ditingkatkan. Hasil seleksi ini dihasilkan ayam kampung unggul yang disebut dengan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) (Sartika dkk., 2014).

Selama periode pemeliharaan diberikan pakan standar yang sesuai dengan kebutuhan gizi ayam kampung. Seleksi yang dilakukan terhadap induk-induk ayam kampung meliputi produksi telur dan sifat mengeram. Induk ayam yang mempunyai sifat mengeram lama dan sering, dilakukan pengafkiran (*culling*). Seleksi juga dilakukan pada ayam pejantan dengan memeriksa kualitas spermnya. Seleksi, dari generasi ke-1 sampai generasi ke-6 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

1. Produksi telur ayam pada setiap generasi diamati selama enam bulan, kemudian dilakukan seleksi individu pada ayam yang mempunyai rata-rata produksi telur 50% terbaik dan memiliki sifat tidak mengeram,
2. Hasil seleksi tersebut disebut G1 (generasi 1) yang kemudian diperbanyak untuk menghasilkan F1,
3. Evaluasi produksi telur pada F1 juga dilakukan selama 6 bulan dan diseleksi dengan kriteria seleksi yang sama untuk menghasilkan G2 dan seterusnya sampai G6 (generasi 6). Seleksi dalam pembentukan ayam kampung unggul yang kini disebut sebagai ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) telah dilakukan selama enam generasi, dimana satu generasi memerlukan waktu selama 12-18 bulan (Sartika dkk., 2014).

Hasil penelitian para pakar peternakan menunjukkan bahwa teknologi seleksi disertai dengan sistem pemeliharaan yang intensif dapat meningkatkan produktivitas ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB). Karakteristik dan keunggulan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) secara umum adalah:

1. Warna bulu beragam, seperti ayam kampung pada umumnya,
2. Bobot badan umur 20 minggu antara 1.200-1.800 g,
3. Bobot telur antara 35-45 g,
4. Produktivitas telur lebih tinggi (130-160 butir/ekor/tahun),
5. Produksi telur (*hen-day*) 50%,
6. Puncak produksi telur 65-70%,
7. Lebih tahan terhadap penyakit (Sartika dkk., 2014).

Karakteristik dan keunggulan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) antara lain secara fisik hampir sama seperti ayam kampung biasa, terutama varian warnanya. Meskipun awalnya diarahkan sebagai ayam kampung petelur unggul, ternyata ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) juga memiliki keunggulan sebagai ayam kampung pedaging karena dapat mencapai bobot badan rata-rata 830,55 g pada umur pemeliharaan 10 minggu dengan kadar protein sekitar 17,50% (Sartika, 2016). Menurut penelitian Mazi (2013), nilai bobot badan tertinggi ayam kampung yang dipelihara sampai umur 9 minggu yaitu sebesar 539,64 g pada perlakuan yang diberi pakan protein kasar 16.00% dan suplementasi enzim papain 0,075%.

Pemeliharaan ayam kampung dibagi menjadi 4 periode, yaitu *starter* (0-4 minggu), periode *grower 1* (4-6 minggu), perioder *grower 2* (6-8 minggu), dan periode *finisher* (8-10 minggu) (Iswanto, 2002), sedangkan berdasarkan tingkat pemberian makan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) dibagi menjadi 2 periode yaitu periode *starter* dan *finisher* (Sartika, 2016).

Ayam kampung super adalah hasil persilangan ayam ras betina dengan ayam lokal jantan, pada umur 8 minggu pertumbuhannya hampir sama dengan umur 5-6 bulan ayam kampung pada umumnya. Ayam kampung super bila dipelihara secara semi intensif dan secara intensif akan menghasilkan produk yang lebih baik (Abun, 2007).

Ayam kampung super merupakan ayam hasil persilangan antara pejantankampung dengan betina ras petelur menghasilkan ayam dengan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan ayam kampung (umur 60 hari atau 2 bulan bobotnya 0,85 kg sedangkan ayam kampung hanya 0,50 kg), tubuh dan karkasnya mirip ayam kampung, tekstur dagingnya sama dengan ayam kampung. Ayam kampung super merupakan hasil dari proses pemuliaan yang bertujuan untuk peningkatan produksi daging. Dalam jangka pendek metode persilangan dapat meningkatkan rata-rata bobot potong ayam (Gunawan dan Sihombing, 2004).

Ayam hasil persilangan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung pada pemeliharaan semi intensif. Ayam kampung super memiliki keunggulan antara lain pertumbuhannya yang cepat, angka kematian yang rendah (sekitar 5%), mudah beradaptasi dengan lingkungan serta pada uji karkas dan uji rasa menunjukkan bahwa tampilan karkasnya mirip dengan ayam kampung, pada umur 8 – 10 minggu sudah mencapai bobot potong yang banyak diminati konsumen (Abun *et al.*, 2007).

Ayam kampung super mempunyai pertumbuhan lebih cepat daripada ayam kampung lokal. Yaman (2010), menyebutkan bahwa ayam kampung super dari 100 ekor DOC (37 g/ekor) sampai masa panen (60 hari) dengan berat 0,9

kg/ekor, memerlukan pakan BR-I dengan protein minimum 21% sebanyak 200 kg. Jadi, konsumsinya 2 kg/ekor, pertambahan berat badannya 873 g/ekor, konversi pakannya diperhitungkan 2,27. Salim (2013) menyebutkan bahwa ayam kampung super mulai bertelur pada umur 150 hari dengan puncak produksi (80%) pada umur 2 tahun, produksi 60% pada umur tahun, dan diafkir pada umur 2 tahun.

Menurut Yaman (2010), perbedaan yang paling signifikan antara ayam kampung umumnya dengan ayam kampung super terlihat pada kemampuan menghasilkan daging, terutama pada organ tubuh bagian dada dan bagian paha, seperti ayam pedaging unggullainnya, perkembangan kedua jenis tipe otot tersebut menunjukkan bahwa ayam kampungsuper memiliki sifat dengan jenis ayam pedaging lainnya. Ciri-cirinya adalah otot bagian dadadan paha tumbuh lebih cepat dan dominan daripada bagian tubuh lainnya.

Menurut Sofjan (2012), laju pertumbuhan ayam kampung super memang bisa di bilang bagus yaitu bisa mencapai berat 0,6–0,8 kg pada umur pemeliharaan 45 hari, akan tetapi tingkat konsumsi pakan masih tergolong tinggi. Karkas ayam kampung super sepintasmemang agak sulit dibedakan dengan ayam kampung asli. Ayam kampung super (kamper)kini ramai diperbincangkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari calon pembibit, peternakpembesaran DOC ayam kampung super, pengelola restoran/rumah yang menjadi konsumenpaling potensial, sehingga kita sebagai konsumen biasa. Berbeda dari ayam kampung biasa, ayam kampung super memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga bisa dipanenpada umur 50 - 60 hari dengan bobot badan sekitar 0,8 - 1,0 kg/ekor.

Pemeliharaan ayam kampung super bagi sebagian besar masyarakat dilakukan secara ekstensif sehingga hasil yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan konsumen, baik dalam hal kualitas dan kuantitas produksinya dan untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi ayam kampung diperlukan pemeliharaan intensif dengan perbaikan potensi dan juga didukung dengan perbaikan lingkungan, terutama perkandangan dan pakan yang bergizi (Suprijatna *et al.*, 2005).

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ternak ayam pada umumnya adalah pakan (feed), pembibitan (breeding), dan tata laksana (management). Pakan merupakan unsur terpenting untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan dan suplai energi sehingga proses metabolisme dapat berjalan dengan baik serta tumbuh dan berkembang dengan baik (Suprijatna *et al.*, 2005).

G. Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung

Usaha peternakan, pakan berperan sangat strategis. Dalam hal ini Kebutuhan nutrisi ayam sangat menunjang keberhasilan dalam usaha peternakan ayam kampung. Dari aspek ekonomi, kebutuhan biaya untuk pakan sangat tinggi, yaitu dapat mencapai 70% dari total biaya produksi. Ditinjau dari aspek biologis, pertumbuhan dan produksi maksimal akan tercapai jika pakan cukup memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Oleh karena itu, untuk tercapainya produksi yang efisien maka harus tersedia pakan yang murah dan kebutuhan zat-zat makanan tercukupi (Suprijatna, 2005).

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting pemeliharaan ternak, termasuk ternak ayam kampung. Hal ini disebabkan pakan merupakan

sumber gizi dan energi sehingga ternak dapat hidup, tumbuh dan bereproduksi dengan baik (Rukmana, 2003).

Pakan adalah campuran bahan-bahan pakan yang merupakan perpaduan antara sumber nabati dan hewani, karena tidak ada satupun jenis bahan pakan yang sempurna kandungan gizinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gizi ayam dibutuhkan campuran bahan nabati dan hewani (Rasyaf, 1992).

Pakan adalah campuran berbagai macam bahan, baik organik maupun anorganik yang diberikan kepada ternak guna memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi. Untuk keperluan tercapainya pertumbuhan dan produksi yang maksimal maka perlu tersedia pakan yang memadai, baik jumlah maupun kandungan zat-zat makanan yang diperlukan ternak (Suprijatna, 2005).

Pakan yang dikonsumsi sebagian dicerna dan selanjutnya diserap untuk digunakan oleh tubuh, sebagian lainnya yang tidak dicerna dieksresikan. Zat-zat makanan (*nutrien*) dari pakan yang dicerna digunakan untuk sejumlah proses di dalam tubuh ternak (Suprijatna, 2005).

Berdasarkan jumlah kebutuhan zat-zat makanan harian untuk kebutuhan berbagai tujuan, dikelompokkan dalam kategori tinggi, rendah, variabel, atau intermediet. Kebutuhan untuk produksi telur disebut sebagai kebutuhan penggunaan tinggi (*hight demand uses*), kebutuhan untuk *moulting* sebagai kebutuhan penggunaan rendah (*low demand uses*), sedangkan pertumbuhan dan penggemukan dikelompokkan sebagai kebutuhan penggunaan intermediet (Suprijatna, 2005).

Prinsip zat gizi yang dibutuhkan oleh ayam kampung terdiri atas sumber energi. Zat-zat gizi yang dibutuhkan diantaranya karbohidrat sebagai sumber utama, dan lemak sebagai cadangan utama, protein (Asam-asam amino), vitamin dan mineral. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kebutuhan energi dan protein yang diperlukan ayam kampung. Akan tetapi, penelitian mengenai kebutuhan vitamin dan mineral untuk ayam kampung belum diketahui. Informasi mengenai kebutuhan energi dan protein ini sangat diperlukan dalam menyusun ransum, baik dari segi kualitas kandungan gizi maupun harga yang diinginkan (Mulyono, 2004).

Selain zat-zat nutrisi diatas unggas juga memerlukan air. Air sangat penting untuk kehidupan, karena didalam sel, jaringan dan organ ternak sebagian besar adalah air. Tubuh unggas mengandung 60-70% air yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan kesehatan ternak (Djulardi, 2006).

Kebutuhan nutrisi setiap fase pertumbuhan atau setiap umur ayam kampung berbeda-beda. Menurut Mulyono (2004), yang menyatakan bahwa kebutuhan nutrisi untuk ayam kampung setiap fase adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan nutrisi fase starter

Pada periode starter nutrisi yang penting adalah untuk pertumbuhan. Kebutuhan protein pada ayam kampung yang sedang tumbuh 17% dan memerlukan energi sebanyak 2.600 kkal (kilo kalori, Pakan yang diberikan seharusnya berbentuk butiran kecil (*crumble*)).

2. Kebutuhan nutrisi fase *grower*

Pada fase *grower* ayam tidak terlalu menuntut kualitas pakan yang sebagaimana fase starter. Hal ini disebabkan nutrisi dari pakan tidak terlalu digunakan untuk tumbuh dan ayam pun belum bereproduksi. Pada fase ini pakannya perlu karbohidrat tinggi yaitu 2.600 kkal/kg dengan kadar protein yang dibutuhkan yaitu 14%. Kandungan asam amino terpenting pada fase ini adalah *lisin* yaitu 3,5 g/mkal (mega kalori).

3. Kebutuhan nutrisi fase *layer*

Pakan diperlukan lebih banyak karena disamping untuk memenuhi kebutuhan dasarnya juga untuk memenuhi kebutuhan produksi telur. Kadar energi dalam pakan sebesar 2.400-2.700 kkal/g. Kadar protein dalam ransum sebanyak 14% sudah dapat menunjang produksi telur. Asam amino yang penting untuk produksi telur adalah *methionin* (kira-kira 0,22%) dan *lisin* (kira-kira 0,68%).

Menurut Nawawi dan Nurrohmah (2011), yang menyatakan bahwa Pakar nutrisi dari Fakultas Peternakan UGM, Dr. In Jafendi H. Purba Sidadolog, membagi kebutuhan pakan ayam kampung sebagai berikut.

1. Ayam kampung berumur 0-4 minggu atau fase *starter* membutuhkan protein sekitar 19-20%, energi 2.850 kkal/kg, Ca 1% dan P 0,45%.
2. Ayam kampung berumur 4-8 minggu atau fase *grower* I membutuhkan protein sekitar 18-19%, energi 2.900 kkal/kg, Ca 1% dan P 0,45%.
3. Ayam kampung berumur 8-12 minggu atau fase *grower* II membutuhkan protein sekitar 16-18%, energi 3.000 kkal/kg, Ca 0,6%

dan P 0,4%. Sementara itu, ayam kampung dewasa (berumur 18-24 minggu) membutuhkan protein sekitar 16-17%, energi 2.850 kkal/kg, Ca 3,5% dan P 0,55%.

Pakai lain menyebutkan bahwa kebutuhan pakan untuk ayam kampung bisa dipilih menjadi lebih sederhana lagi, yaitu seperti pada tabel berikut menurut pernyataan Subangkit Mulyono.

Tabel 2.1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung Berdasarkan Umur

Uraian	Umur (Minggu)		
	1-8	9-20	>20
Energi metabolis (kkal/kg)	2.600	2.400	2.400-2.600
Protein kasar (%)	15-17	14,00	14,00
Kalsium/Ca (%)	0,90	1,00	3,40
Fosfor tersedia (%)	0,45	0,45	0,34
Metionin (%)	0,37	0,21	0,22-0,3
Lisin (%)	0,87	0,45	0,68

Sumber: Mulyono, (2004).

Menurut Hardjosworo dan Rukmiasih (2000), yang menyatakan bahwa pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibedakan berdasarkan tingkat umur. Kebutuhan zat nutrisi pada beberapa fase disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kebutuhan Zat Nutrisi (Gizi)

Uraian	Umur (Minggu)			
	0-4	4-6	6-8	8-10
Energi metabolis (kkal/kg)	2.800	2.800	2800	2800
Protein kasar (%)	20,00	18,00	18,00	16,00
Kalsium/Ca (%)	0,80	0,80	0,80	0,70

Fosfor tersedia (%)	0,40	0,40	0,40	0,35
Metionin (%)	0,30	0,30	0,25	0,25
Lisin (%)	0,85	0,85	0,60	0,60

Sumber: Hardjosworo dan Rukmiasih, (2000).

Menurut Sidadolog dan Yuwanta (2011), fase hidup ayam kampung pedaging dibagi menjadi 3 fase, yaitu

1. Fase *starter*, yaitu ayam kampung berumur 0--4 minggu membutuhkan protein kasar sekitar 9--20%, energi 2.850 kkal/kg, Ca 1%, dan P 0,45%.
2. Fase *grower*, yaitu ayam kampung berumur 4--8 minggu membutuhkan protein kasar 18--19%, energi 2.900 kkal/kg, Ca 1%, dan P 0,45%.
3. Fase *finisher*, yaitu ayam kampung berumur 8--12 minggu membutuhkan protein kasar 16--18%, energi 3.000 kkal/kg, Ca 0,6%, dan P 0,4%.

Menurut NRC (1994), untuk ayam pedaging dibutuhkan 23% protein pada umur 0-3 minggu, 20% protein pada umur 3-6 minggu, 18% protein pada umur 6-8 minggu dengan 3.200 kkal/kg energi metabolis. Menurut Iskandar *et al.* (1991), melaporkan bahwa kebutuhan protein ayam kampung pedaging adalah 15% pada umur 0-6 minggu dan 19% pada umur 6-12 minggu dengan energi metabolis 2.900 kkal/kg.

Ayam kampung periode *starter* (0-4 minggu) membutuhkan protein sekitar 19-20% dengan energi metabolis sebesar 2.850 kkal/kg, periode *grower* I memerlukan protein sekitar 18--19%, energi 2.900 kkal/kg, dan pada periode *grower* II energi metabolis sekitar 3.000 kkal/kg dengan protein sebesar 16--18% (Nawawi dan Nurrohmah, 2011).

Pemberian ransum komersial ayam ras untuk ayam kampung merupakan pemborosan, ditinjau baik dari segi teknis maupun ekonomis. Menurut Nawawi (2015), kandungan gizi yang dibutuhkan ayam kampung pada umur 0-12 minggu dibutuhkan protein kasar 15-17 % dan kebutuhan energi metabolik 2.600 kkal/kg. Sedangkan menurut Sinurat (1991), kebutuhan protein periode *grower* 12-22 minggu sebesar 14% dan kandungan energi metabolis 2.400 kkal/kg.

Hal tersebut dijadikan dasar agar diperolehnya informasi tentang kebutuhan protein kasar yang optimal untuk ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) dan belum cukupnya informasi mengenai kebutuhan nutrisi untuk ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB). Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini agar kadar protein dalam ransum bisa dimanfaatkan pada proses pertumbuhan ayam kampung dengan optimal khususnya pada periode *finisher* (9-12 minggu).

Kebutuhan gizi ayam kampung dikelompokkan ke dalam tiga kelompok umur yaitu: 0-12 minggu (*starter*), 12-22 minggu (*grower*), dan > 22 minggu (*layer*). Jenis kebutuhan gizi ayam kampung hanya dibatasi yang paling penting saja yaitu: protein, energi, asam amino lisin, asam amino metionin, kalsium (Ca), dan fosfor (P) total (Sinurat, 1991). Kebutuhan gizi ayam kampung dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kebutuhan Gizi Ayam Kampung

Gizi	Umur (minggu)		
	<i>Starter</i> 0-12	<i>Grower</i> 12-22	<i>Layer</i> 22
Protein (%)	15,00 - 17,00	14	14
Energi (kkal /kg)	2.600	2.400	2.400 - 2.600
Lisin (%)	0,87	0,45	0,68

Metionin (%)	0,37	0,21	0,22 - 0,30
Ca (%)	0,9	1	3,4
P tersedia (%)	0,45	0,4	0,34

Sumber: Sinurat, (1991).

Kebutuhan protein pada umur 0-12 minggu sebanyak 15-17%, turun menjadi 14% pada umur 12-22 minggu sampai umur >22 minggu. Pola penurunan ini diikuti oleh kebutuhan fosfor (P) untuk ayam kampung. Sebaliknya, kebutuhan energi, lisin, metionin, dan kalsium (Ca) tinggi pada umur 0-12 minggu, turun pada umur 12-22 minggu dan naik lagi pada umur >22 minggu setelah ayam kampung mulai bertelur. Kenaikan kebutuhan Ca pada ayam kampung pada umur > 22 minggu tersebut (juga ternak unggas petelur lainnya), karena dibutuhkan lebih banyak Ca untuk pembentukan kerabang telur (Sinurat, 1991).

H. Bahan dan Kandungan Pakan

Bahan pakan adalah setiap bahan pakan yang dapat dimakan, disukai, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi ternak (Nawawi dan Nurrohmah, 1997). Bahan pakan merupakan sumber utama kebutuhan nutrisi ayam untuk keperluan hidup pokok dan produksinya.

Zat-zat makanan (*nutrien*) adalah substansi dari bahan pakan yang dapat digunakan ternak jika tersedia dalam bentuk yang telah siap difungsikan oleh sel, organ, dan jaringan. Zat-zat makanan tersebut dapat dibagi menjadi enam kelas, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Energi kadang dimasukkan sebagai zat-zat makanan karena dihasilkan melalui proses metabolisme dalam tubuh dari bahan karbohidrat, lemak, dan protein (Suprijatna, 2005).

Bahan-bahan untuk pakan ayam kampung harus terus terjamin ketersediaan dan mutunya. Namun, bahan yang seimbang kandungan zat gizinya akan menjadi rendah mutunya jika tersimpan terlalu lama. Bahan-bahan untuk pakan harus mengandung zat-zat yang memelihara dan membangun tubuh, serta menghasilkan produksi (telur, daging). Zat-zat gizi yang harus terkandung dalam pakan antara lain hidrat arang (bahan sumber energi), protein, mineral, vitamin, dan makanan tambahan (bila diperlukan) (Nawawi, 2011).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu nutrisi ternak juga mengalami perkembangan. Sampai saat ini ilmu nutrisi telah menemukan berbagai macam zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan produksi ternak (Hidayat, 2012). Golongan zat nutrisi tersebut terdiri dari:

1. Karbohidrat 25 macam
2. Asam lemak 15 macam
3. Asam amino 20 macam
4. Unsur hara (mineral) 18 macam
5. Vitamin 16 macam

Menurut Hidayat (2012), yang menyatakan bahwa sekitar 100 tahun setelah penelitian Lavoiser (abad ke-19), ilmu makanan klasik mengemukakan bahwa semua bahan makanan dapat dibagi dalam 4 komponen, yaitu:

1. Karbohidrat
2. Lemak
3. Protein

4. Mineral

Zat nutrisi merupakan kandungan atau komponen yang terdapat dalam suatu bahan pakan. Tidak semua zat nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan dapat dicerna oleh ternak dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor pembatas, seperti selulosa. Secara umum sumber pakan ternak dapat berasal dari nabati dan hewani. Pakan ternak yang berasal dari tanaman atau hijauan serta hasil ikutannya (*by product*) memiliki keterbatasan untuk dimanfaatkan, khususnya pada ternak unggas, karena memiliki kandungan serat kasaryang cukup tinggi (Hidayat, 2012).

Menurut Hardjosworo dan Rukmiasih (2000), yang menyatakan bahwa Pengefisien dalam penggunaan pakan dapat terlaksana bila telah mengetahui bahan pakan berdasarkan zat nutrisinya atau kandungan nutrisi dalam bahan pakan tersebut. Berdasarkan sumber zat nutrisinya, bahan pakan digolongkan sebagai berikut:

1. Sumber energi: jagung, dedak, polar, minyak.
2. Sumber protein: tepung ikan, tepung daging dan tulang, bungkil kedelai.
3. Sumber vitamin: jagung, dedak, polar, minyak, tepung ikan, tepung daging dan tulang, bungki kedelai, campuran vitamin buatan pabrik (vitamix atau premix).
4. Sumber mineral: kalsium karbonat, tepung tulang, tepung kerang, tepung ikan, tepung daging dan tulang, campuran mineral buatan pabrik (mineral mix atau premix).

Berbagai jenis bahan pakan dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu:

1. Bahan pakan nabati

Bahan pakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut dengan bahan pakan nabati, termasuk disini adalah biji-bijian dan hasil olahan atau limbahnya. Bahan pakan nabati yang biasa digunakan untuk memberi makan ayam adalah jagung, kacang-kacangan, limbah gabah, limbah pembuatan minyak, sorgum dan lain-lain (Rasyaf, 1992).

Bahan pakan nabati umumnya mempunyai serat kasar yang tinggi, misalnya dedak dan daun-daunan yang suka dimakan oleh ayam buras. Disamping itu bahan pakan nabati banyak pula yang mempunyai kandungan protein tinggi seperti bungkil kelapa, bungkil kedele, dan bahan pakan asal kacang-kacangan. Dan tentu saja kaya akan energi seperti jagung (Santoso, 1996).

2. Bahan pakan Hewani

Bahan pakan hewani adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan, termasuk ikan dan olahannya. Bahan pakan asal hewan ini umumnya merupakan limbah industri, sehingga sifatnya memanfaatkan limbah. Bahan pakan hewani yang biasa digunakan adalah tepung ikan, tepung tulang, tepung udang, tepung kerang, cacing, bekicot, serangga dan lain-lain (Murtidjo, 2006).

Secara umum, bahan makanan asal nabati dan olahannya menacpai 60-80% dari total makanan yang diberikan kepada ayam, selebihnya adalah bahan makanan asal hewani (Rasyaf, 1992).

Menurut Rasyaf (2006), yang menyatakan bahwa suatu bahan makanan layak dikonsumsi ayam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Langgeng keberadaannya, jangan sampai terjadi bahan makanan itu sekarang ada, tetapi dua bulan lagi menghilang atau ketersediaannya berkurang.
2. Tidak mempunyai daya saing yang kuat dengan kebutuhan manusia
3. Tidak mempunyai daya saing nutrisi yang kuat dengan bahan makanan ayam sejenisnya
4. Mengandung serat kasar yang rendah

I. *Konsumsi Pakan*

Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya sejumlah unsur nutrisi yang ada didalam ransum/pakan yang telah tersusun dari berbagai bahan makanan ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ayam (Rasyaf, 1994). Menurut Wahyu (1992), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan merupakan jumlah dari bahan pakan yang diberikan dikurangi dengan jumlah pakan yang tersisa dan tercecer.

Menurut Murtidjo (1996), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan merupakan faktor penunjang terpenting untuk mengetahui penampilan produksinya. Rasyaf (2006) menambahkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan diantaranya adalah usia ayam, kondisi kesehatan ayam, dan kegiatan fisiologi ayam.

Menurut Wahyu (1992), yang menyatakan bahwa temperatur lingkungan juga mempengaruhi konsumsi makanan. Temperatur lingkungan yang tinggi mengakibatkan konsumsi pakan menurun, sehingga untuk ayam-ayam yang

dipelihara ditempat-tempat yang temperaturnya tinggi harus diberi ransum dengan kadar protein dan energi tinggi disertai dengan meningkatkan kadar zat-zat makanan lainnya, vitamin dan mineral.

Setiap jenis unggas konsumsi pakannya berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini harus disusun ransum yang tepat berdasarkan kebutuhan tiap jenis unggas dan setiap kelebihan untuk pertumbuhan harus dihindarkan karena kelebihan ini akan dapat menimbulkan kondisi yang terlampau gemuk dan produksi telur akan menurun (Rasyaf, 1994).

Menurut Hardjosworo dan Rukmiasih (2000), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan ayam kampung pada berbagai umur disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Konsumsi Pakan Ayam Kampung Pada Berbagai Umur

Umur (Minggu)	Konsumsi Pakan (gram/ekor/minggu)
	Ayam Kampung
0-1	30
1-2	80
2-3	150
3-4	170
4-5	210
5-6	270
6-7	320
7-8	350
8-9	400
9-10	450
10-11	500
11-12	550

Sumber: Hardjosworo dan Rukmiasih (2000).

Menurut Rukmana (2003), yang menyatakan bahwa jumlah ransum yang diberikan kepada setiap ekor ayam per hari disesuaikan dengan umur ayam seperti dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kebutuhan Ransum/Ekor/Hari Sesuai Dengan Umur

Umur ayam (Minggu)	Jumlah Ransum	
	Hari (g)	Minggu (g)
9	50	350
10	52	360
11	53	370
12	55	390

Sumber: Rukmana (2003).

Menurut NRC (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum adalah besarnya tubuh ternak, aktivitas ternak, suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas ransum. Amrullah (2004) menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap konsumsi harian ransum yaitu kandungan kalori ransum dan suhu lingkungan.

Konsumsi ransum ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) berkisar antara 80-85 g/ekor/hari jika dijadikan dalam satu minggu berkisar antara 560-595 g/ekor (Sartika, 2016). Menurut Priono (2003), konsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besar dan bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, dan energi ransum.

Konsumsi mempengaruhi pertumbuhan ternak, menurut Dagher (1998), diperkirakan 63% dari penurunan pertumbuhan disebabkan menurunnya konsumsi ransum dari ayam. Pertumbuhan juga menurun karena konsumsi ransumnya menurun, hal ini karena temperatur tinggi dan ayam dalam keadaan stres (Leeson dan Summer, 2001). Namun palatabilitas dapat dipengaruhi oleh bentuk, bau, rasa, tekstur, dan suhu pakan yang diberikan. Selera atau palatabilitas merupakan faktor internal yang merangsang lapar pada ternak (Anggorodi, 1990).

Rata – rata konsumsi ransum ayam kampung super umur 3 – 7 minggu yang diberikan ransum *ad libitum* sebesar 400,98 g/ekor/minggu (Wicaksono, 2015). Kandungan energi dan protein dalam ransum dapat mempengaruhi jumlah dari konsumsi ransum ayam, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pertambahan bobot badan (Sidadolog dan Yuwanta, 2009). Ayam dapat menentukan pasokan kebutuhan energi dan protein (Sinurat, 1991).

J. Konversi Pakan

Konversi pakan adalah perbandingan konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan atau produksi telur. Dengan demikian konversi pakan terbaik adalah jika nilai terendah (Djulardi, 2006). Lebih lanjut Mulyono (2006) menambahkan konversi pakan adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak pakan yang dikonsumsi (kg) untuk menghasilkan berat ayam 1 kg.

Menurut Siregar, dkk (1981) dalam Kustiningrum (2004) yang menyatakan bahwa angka konversi pakan yang tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang kurang efisien, sebaliknya angka yang mendekati satu berarti makin efisien dengan kata lain semakin kecil angka konversi pakan berarti semakin efisien.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik pakan, bobot badan, kandungan nutrisi dalam pakan, suhu lingkungan, dan jenis kelamin. Selain itu, konversi pakan juga dipengaruhi oleh mutu ransum yang diberikan dan juga tata cara pemberian makannya (Davies, 1982).

Ayam kampung super (umur 3 – 10 minggu) dengan pemberian ransum *adlibitum* memiliki nilai konversi ransum 5,0 – 5,5 (Wicaksono, 2015). Konversi

ransum ayam buras yang dipelihara dengan sistem pemeliharaan intensif berkisar antara 4,9 – 6,4. Pemeliharaan ayam dengan sistem pemeliharaan secara tradisional, semi intensif dan intensif dihasilkan konversi ransum berbeda. Konversi ransum pada sistem pemeliharaan tradisional sekitar >10, pada sistem pemeliharaan secara semi intensif didapatkan hasil berkisar 8 – 10 dan sistem pemeliharaan secara intensif didapatkan hasil konversi ransum berkisar antara 4,9 – 6,4 (Suryana dan Hasbianto, 2008). Semakin kecil angka konversi ransum menandakan ayam lebih baik dalam mengubah pakan menjadi daging dan ransum dapat dikatakan baik (Wahju, 2004). Pemberian pakan pada suhu lingkungan yang sejuk (kurang 2 – 3 °C dari normal) secara nyata akan meningkatkan bobot badan, memperbaiki konversi ransum, mengurangi mortalitas 1.41% dibanding yang bersuhu normal (Skomorucha dan Herbut, 2006).

K. *Kecernaan Protein*

Daya cerna protein adalah jumlah fraksi nitrogen dari bahan makanan yang dapat diserap oleh tubuh (Winarno, 1991). Lebih lanjut Muchtadi (1989) menyebutkan bahwa terdapat beberapa macam enzim pencernaan yang dapat digunakan dalam menentukan kecernaan protein yaitu pepsin-pankreatin, tripsin, kimotripsin, peptidase, atau campuran dari beberapa macam enzim tersebut (multi enzim). Soedarmo (1989) menyebutkan bahwa pepsin dihasilkan oleh sel-sel dinding mukosa lambung. Pepsin atau kimotripsin akan menguraikan pada tempat residu fenilalanin, tirosin dan triptofan, yang artinya pada asam-asam amino aromatik. Wijaya *et al.* (1992) melaporkan bahwa daya cerna protein daging ayam adalah 59,62% – 81,16%.

Kecernaan adalah hasil proses degradasi molekul makro yang terdapat didalam bahan pakan menjadi senyawa sederhana yang dapat diserap oleh organ pencernaan. Kecernaan yang tinggi menunjukkan zat-zat pakan yang diserap tubuh semakin tinggi pula. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, kecernaan pakan, penambahan bobot badan, dewasa kelamin, produksi telur dan kualitas telur yang dihasilkan (Irawan dkk., 2012).

Prinsip penentuan kecernaan nutrien adalah menghitung banyaknya nutrien yang dikonsumsi dikurangi dengan banyaknya nutrien yang dikeluarkan melalui feses. Metode yang digunakan untuk menilai kecernaan yaitu metode konvensional atau *total collecting methods*, yang terdiri dari periode pendahuluan selama 4 - 10 hari dengan tujuan membiasakan ternak pada pakan dan keadaan lingkungan sekitar dan menghilangkan sisa pakan sebelum perlakuan. Selanjutnya, periode koleksi ekskreta dilakukan selama 5 - 15 hari, dengan waktu koleksi 24 jam (Ranjhan, 1980).

Pengukuran kecernaan dapat dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo*. Pengukuran kecernaan secara *in vitro* dilakukan dengan membuat suasana seperti yang terjadi dalam saluran pencernaan ternak di laboratorium (Williamson dan Payne, 1993). Pengukuran secara *in vivo* terdiri dari 2 periode yaitu periode pendahuluan dan periode total koleksi. Periode pendahuluan digunakan untuk membiasakan ternak dengan ransum perlakuan dan kondisi lingkungan yang baru serta menghilangkan sisa ransum waktu sebelumnya. Periode total koleksi adalah periode pengumpulan ekskreta sampai akhir percobaan yang kemudian dikeringkan dan dianalisis (Tillman *et al.*, 1998). Jalur pengeluaran feses dan urin

pada unggas menjadi satu sehingga koleksi feses dan urin dilakukan secara bersamaan sebagai koleksi ekskreta. Pengukuran pencernaan pada unggas dapat ditambahkan suatu indikator ke dalam ransum. Metode indikator merupakan pengukuran pencernaan dengan menggunakan senyawa yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan unggas seperti krom oksida, *methyline blue*, *karmine* dan barium sulfat yang ditambah ke dalam ransum (Wahju, 2004).

L. Protein

Protein merupakan zat organik yang tersusun dari unsur karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen. Fungsi protein untuk hidup pokok, pertumbuhan jaringan baru, memperbaiki jaringan rusak, metabolisme untuk energi dan produksi (Anggorodi, 1994). Molekul protein adalah sebuah polimer dari asam-asam amino yang digabung dalam ikatan peptida (Tillman *et al.*, 1998). Pencernaan protein kasar tergantung pada kandungan protein di dalam ransum. Ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya mempunyai pencernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Tinggi rendahnya pencernaan protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman *et al.*, 1991).

Protein merupakan struktur yang amat penting untuk jaringan-jaringan lunak didalam tubuh hewan seperti urat daging, kolagen kulit, rambut, kuku, bulu dan paruh. Meskipun semua protein itu sama-sama asam amino, namun rangkaian asam-asam amino didalam protein yang terdapat di alam berbeda nyata satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh yang khas terhadap sifat dari tiap protein (Wahju, 1992).

Menurut Widodo (2002) fungsi protein meliputi banyak aspek, yaitu: (1) sebagai struktur penting untuk jaringan urat daging, kolagen, rambut, bulu, kuku, dan bagian tanduk serta paruh; (2) sebagai komponen protein darah, albumin, dan globulin yang dapat membantu mempertahankan sifat homeostatis dan mengatur tekanan osmosis; (3) sebagai komponen fibrinogen dan tromboplastin dalam proses pembekuan darah (4) sebagai karier oksigen ke sel dalam bentuk sebagai hemoglobin; (5) sebagai komponen lipoprotein yang berfungsi mengangkut vitamin yang larut dalam lemak dan metabolit lemak yang lain; (6) sebagai komponen enzim yang bertugas mempercepat reaksi kimia dalam sistem metabolisme; (7) sebagai nukleoprotein, glikoprotein dan vitellin.

Protein diperlukan sebagai material pembentukan jaringan dan produk (telur/daging). Selain itu, protein juga merupakan sumber energi meskipun bukan yang utama karena memerlukan proses kompleks. Protein merupakan bahan pakan yang mahal sehingga tidak efisien bila dijadikan sebagai sumber energi (Atmomarsono, 2005).

Jaringan tubuh dan telur tersusun atas protein. Protein tersebut berasal dari protein dalam pakan yang dikonsumsi. Selama proses pencernaan, protein pakan yang dikonsumsi dipecah menjadi asam amino dan diserap tubuh. Kemudian, disusun kembali menjadi protein jaringan atau telur dengan proporsi kandungan asam amino yang berbeda dengan kandungan protein pakan yang dikonsumsi (Suprijatna, dkk. 2005).

Klasifikasi protein dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Protein globular (berbentuk bola) 2. Protein fibrosa (berbentuk batang) 3. Protein konjugasi (protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino/gugusprostetik) (Hidayat, 2012).

Bahan pakan sumber protein adalah bahan yang memiliki kandungan protein tinggi, yaitu sekitar 45%. Bahan tersebut dapat berupa sumber protein hewani dan nabati. Beberapa hasil ikutan pabrik juga dapat dijadikan sumber protein, tetapi tidak utama dan hanya sebagai tambahan. Sumber protein hewani yang dapat dijadikan sebagai bahan pakan antara lain tepung ikan, hasil olahan ikan, tepung bulu ayam, dan manure (kotoran ayam) (Suprijatna, 2005).

Bahan pakan sumber protein nabati umumnya mengandung protein sekitar 45%. Walaupun kandungan proteinnya cukup tinggi, tetapi kandungan asam amino esensialnya rendah sehingga dalam penggunaannya harus diimbangi dengan sumber protein hewani atau bahan sumber asam amino esensial lainnya. Beberapa sumber protein nabati antara lain tepung bungkil kedelai, tepung bungkil kelapa dan bungkil kacang tanah (Suprijatna, 2005).

Protein kasar digunakan untuk menggolongkan semua ikatan nitrogen dalam bahan pakan. Pengukuran protein kasar dapat menjadi acuan untuk digolongkan sebagai sumber protein atau tidak. Metode kjeldahl digunakan untuk mengukur Nitrogen dalam bahan pakan, sebagian besar nitrogen dalam bahan pakan dalam bentuk protein, nitrogen dapat pula membentuk senyawa lain yang bukan protein, seperti amide, asam amino, glikosida, alkaloid, garam ammonium dan senyawa lipid (Hidayat, 2012).

Kualitas protein dalam pakan/ransum tergantung keseimbangan asam-asam amino yang dikandungnya. Protein asal hewan (daging, susu dan telur) lebih tinggi dibandingkan protein asal tumbuh-tumbuhan (biji kapok dan wijen), kecuali kacang kedele (Hidayat, 2012).

Kebutuhan protein pada saat periode pertumbuhan tergantung laju pertumbuhan. Pertumbuhan yang cepat menuntut tersedianya protein lebih tinggi. Kebutuhan protein per ekor per hari pada ayam ras lebih tinggi dibandingkan ayam buras. Pada ayam krosing, kebutuhan protein lebih tinggi dibandingkan ayam buras, tetapi sedikit lebih rendah dari ayam ras.

Faktor penunjang terpenting terhadap produksi pada ayam kampung super adalah pencernaan bahan pakan didalam saluran pencernaan, seperti pencernaan protein kasar dan retensi nitrogen. Pencernaan merupakan banyaknya nutrisi dari pakan yang tidak dikeluarkan melalui feses atau bagian pakan yang hilang dari makanan setelah proses pencernaan dan penyerapan. Pencernaan pakan dipengaruhi oleh spesies hewan, bentuk fisik pakan, komposisi pakan, tingkat pemberian pakan, temperatur lingkungan dan umur ternak (Ranhjan, 1980). Pencernaan protein pada unggas terjadi di proventrikulus oleh pepsin dan di usus halus oleh sekresi enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Sekresi enzim pankreas distimulasi oleh hormon kolesistokinin. Kolesistokinin merupakan hormon yang disekresikan oleh mukosa usus halus yang berfungsi menstimulasi sekresi kantung empedu (Hidayat *et al.*, 2010).

M. Apu-Apu (*Pistia stratiotes*)

Apu-apu (*Pistia Stratiotes*)Tumbuhan ini dikenal dengan water lettuce dalam bahasa Inggris yang berarti kubis air atau selada air. merupakan tumbuhan yang berasal dari Afrika atau Amerika selatan, yang tumbuh secara alami atau bisa juga dibawa oleh manusia. Penyebaran hidrophyta secara luas pada iklim tropis. Di Amerika selatan, terdapat pada semenanjung Florida dan menuju ke barat hingga Texas. Di Florida, didokumentasikan di sepanjang danau danau, aliran sungai, pantai, rawa, rawa yang dalam, rawa yang dangkal dan komunitas yang kasar. Spesimen herbarium dikumpulkan dari 39 wilayah seperti kabupaten Bay di Panhandle melalui Peninsula selatan ke Collier dan kabupaten Miami-dade. Namun sekarang telah menyebar hingga wilayah beriklim tropis dan subtropis, termasuk Asia (Langeland.*et al*, 2008). Tumbuhan ini merupakan tumbuhan mengapung di permukaan air, tumbuhan herba dengan stoloniferus dan biasa di temukan di genangan air seperti kolam dan sungai hingga ketinggian 1000 meter. Bagian daunnya sering digunakan untuk pengobatan. Di Gambia, tumbuhan ini digunakan sebagai Anodine untuk cuci mata (Kumar, 2010).

Kayu apu merupakan jenis tanaman air yang banyak tumbuh di daerah tropis. Tumbuh terapung pada genangan air yang tenang atau mengalir dengan lambat. Kayu apu mempunyai banyak akar tambahan yang penuh dengan bulu-bulu yang halus, panjang, dan lebat. Bentuk dan ukuran daunnya sangat bervariasi, dapat menyerupai sendok, lidah atau romping, dengan ujung yang melebar. Warna daunnya hijau muda, makin ke pangkal makin putih. Susunan daun terpusat/terbentuk roset. Batangnya sangat pendek, bahkan terkadang tidak

tampak sama sekali. Buah buninya bila telah masak pecah sendiri serta berbiji banyak. Selain dengan biji, kayu apu berkembang biak dengan selantar/stolonnya (Sastrapradja dan Bimantoro, 1981)

Menurut Kasselmann (1995) mengemukakan bahwa Nama lokal dari tanaman ini adalah kapu-kapu atau kayu apu. Bentuknya mirip dengan sayuran kol atau kubis yang berukuran kecil. Klasifikasi tanaman kapu-kapu adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionata
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledoneae
Bangsa : Arales
Suku : Araceae
Marga : *Pistia*
Jenis : *Pistia stratiotes* L.
Nama umum/dagang: Kayu apu/Apu apu

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan herba yang hidup mengapung di permukaan air yang tenang atau air yang mengalir tetapi dengan aliran yang pelan. Sesuai dengan nama dari tumbuhan ini yaitu selada air (dalam bahasa indonesia), maka secara keseluruhan tumbuhan ini mirip dengan selada namun kecil, mengapung dan terbuka ke atas (Landprotection, 2006).

Menurut Kasselman (1995), kandungan hara *Pistia stratiotes* (dalam %) adalah Corganik sebesar 35,20 %, kandungan N sebesar 2,67 %, P sebesar 0,30 %, K sebesar 1,12 % dan rasio C/N adalah 13,18 %. Dari nilai N sebesar 26,7 % tersebut, dapat diketahui kandungan proteinnya dengan cara mengalikan dengan faktor koversi protein 6,25. Sehingga didapatkan nilai dugaan kandungan protein dalam *Pistia stratiotes* sebesar 16,7 %. Kandungan protein ini lebih besar daripada protein kasar *Salvinia molesta*, sejenis tanaman yang juga dikembangkan sebagai pakan itik sebesar 15,9 %.

Secara fisiologis, tumbuhan apu-apu (*P.stratiotes*) memiliki kemampuan untuk menyerap bahan radioaktif sehingga dapat digunakan untuk mengurangi limbah akibat pencemaran bahan radioaktif di lingkungan. Karena kemampuan tersebut, maka tumbuhan ini dapat dikatakan sebagai fitoremediasi. Hal ini didasari oleh kemampuan sejumlah tanaman termasuk apu apu (*P.stratiotes*) untuk mengakumulasi bahan radioaktif tertentu sehingga konsentrasi pada biota jauh diatas konsentrasi media tanamnya yang merupakan jalur masuknya bahan radioaktif tersebut. Bahan radioaktif yang ada pada lingkungan tersebut diserap oleh akar, kemudian mengalami translokasi di dalam tumbuhan, dan dilokalisasi pada jaringan. Salah satu contoh bahan radioaktif yang ada yaitu Cesium (Cs). Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa tanaman apu-apu mampu menyisihkan ¹³⁴Cesium pada sistem perairan. Dengan metode rhizofiltrasi, akumulasi aktivitas ¹³⁴Cesium terbesar ada pada organ akar adalah 29044,05 Bq lalu pada daun tua aktivitas terbesar adalah 3607,62 Bq keduanya terjadi pada hari ke-45, sedangkan aktivitas terbesar yang terserap pada organ daun muda adalah

4341,67 Bq yang terjadi pada hari ke-30. Dan yang terakhir adalah persentase penyisihan maksimum $^{134}\text{Cesium}$ oleh kiapu adalah sebesar 48%. (Abadi, 2010).

Melihat kemampuan dari Tumbuhan apu-apu, maka dapat dilihat bahwa proses tersebut merupakan bentuk adaptasi fisiologis yang dilakukan tumbuhan ini untuk tetap bertahan pada suatu wilayah perairan dengan kondisi adanya bahan radioaktif. Proses adaptasi fisiologis tersebut ditunjukkan dengan kemampuan akar untuk melakukan filtrasi dan kemudian mengalami perubahan susunan pada jaringan penyusun tubuh tumbuhan ini. Selain hal tersebut, berdasarkan pengamatan terhadap phytochemical screening maka menunjukkan bahwa tumbuhan apu-apu (*Pistia stratiotes*) mengandung alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, minyak, lemak dan glikosid (Kumar, *et. al*, 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober sampai 13 November 2018. Bertempat di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan dilanjutkan di Laboratorium Kimia Makanan Ternak Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Kandang yang digunakan adalah sistem “cage” yang kerangkanya terbuat dari kayu dan bambu dengan ukuran 60 x 60 cm disetiap Ulangan, Masing – Masing dilengkapi dengan tempat makan dan minum. Lampu 4 buah (15 watt) digunakan sebagai penerang kandang. Timbangan yang digunakan timbangan analitik dan timbangan manual, timbangan analitik digunakan untuk mengukur rasio berat sampel feses segar dalam usus pada ayam kampung super. Sedangkan timbangan manual berkapasitas 5 kg dengan tingkat ketelitian 0,1 g, Untuk menimbang DOC, penimbangan bobot ayam, penimbangan ransum dan sisa ransum, tempat makan dan minum, peralatan kebersihan atau sanitasi kandang, dan tirai penutup area kandang.

2. Bahan

a. Ayam Percobaan

Ayam yang digunakan diperoleh dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Bantaeng Provinsi Sulawesi-Selatan, jenis ayam yang digunakan adalah ayam kampung super berjumlah 15 ekor umur fase grower II (12 minggu) dengan jenis kelamin campuran. Setiap perlakuan ransum dengan 5 (Lima) perlakuan, 3 (Tiga) Ulangan setiap ulangan terdiri dari 1 (Satu) ekor ayam.

b. Ransum Percobaan

Bahan penyusun ransum diperoleh dari UPTD bantaeng yang terdiri dari Jagung, Dedak, Tepung kedelai, Tepung ikan, Sedangkan Tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) diambil langsung dari alam yakni sawah yang menjadi tumbuhan hama/gulma bagi petani, itu kemudian diolah sampai menjadi tepung. Ransum penelitian terdiri dari lima macam yaitu: ransum dengan kandungan protein 16,02% (R0: Kontrol), 16,11% (R1: 5% Apu-apu), 16,12% (R2: 10% Apu-apu), 16,30% (R3: 15% Apu-apu), dan ransum dengan kandungan protein 16,31% (R4: 20% Apu-apu).

c. Bahan tambahan lainnya yaitu gula merah, tali rapih, kantong plastik, plastik sampel.

Tabel 3.1. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dan Energi Metabolisme Ransum Penelitian

No	Bahan Pakan	Protein Kasar (%)	Lemak (%)	Serat Kasar (%)	Energi Metabolisme (Kkal/kg)
1	Jagung	9	4	2	3430
2	Dedak	10	13	12	1650
3	Tp Ikan	35	4	1	2219
4	B Kedelai	43	1	6	2240
5	Apu-Apu*	35	8	16	2100

Sumber: Scoot, dkk (1982)

*Analisis Laboratorium Kimia Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin 2018.

Tabel 3.2. Susunan Ransum Penelitian

No	Bahan Pakan	Ransum Perlakuan				
		R0	R1	R2	R3	R4
1	Jagung	59	59	59	59	59
2	Dedak	20	19	18	16	15
3	Tp Ikan	4	2	1	2	1
4	B Kedelai	17	15	12	8	5
5	Apu-Apu		5	10	15	20
Total		100	100	100	100	100

Sumber: Data Primer, (2018)

Tabel 3.3. Kandungan Zat-Zat Makanan, Energi Metabolisme dan Asam Amino Ransum Penelitian

No	Zat Makanan	Ransum Perlakuan				
		R1	R2	R3	R4	R5
1	Protein Kasar (%)	16.02	16.11	16.12	16.30	16.31
2	Lemak Kasar (%)	5.29	5.46	5.66	5.8	6
3	Serat Kasar (%)	4.64	5.18	5.67	6	6.49
4	EM (kkal/kg)	2823.26	2822.58	2821.69	2826.28	2825.39

Sumber : Data Primer, (2018)

C. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. *Metode Penelitian*

1. *Rancangan Penelitian*

Rancangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Dimana setiap ulangan terdiri dari 1 ekor ayam kampung super sehingga jumlah keseluruhan ayam yang digunakan adalah 15 ekor dengan perlakuan (P) yaitu:

- P0 : Pemberian pakan standar tanpa menggunakan tepung apu-apu.
- P1 : Pemberian pakan standar dengan tambahan 5% tepung apu-apu.
- P2 : Pemberian pakan standar dengan tambahan 10% tepung apu-apu.
- P3 : Pemberian pakan standar dengan tambahan 15% tepung apu-apu.

P4 : Pemberian pakan standar dengan tambahan 20% tepung apu-apu.

2. Prosedur Penelitian

a. Tahap Persiapan

Sebelum Ayam Kampung Super umur fase *grower* II dimasukkan ke dalam kandang, terlebih dahulu dilakukan sanitasi. Sanitasi kandang dilakukan setelah kandang dicuci dengan air dan detergen lalu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, tempat pakan dan minum. Luas unit kandang yang digunakan yakni 60 x 60 cm. Persiapan ayam kampung super dengan umur Fase *grower* II sebanyak 15 ekor ayam perlakuan itu kemudian dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing dalam satu sekat berisi 1 ekor dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan.

b. Tahap Pelaksanaan

Ayam kampung super yang sudah dipilih tadi dipisahkan sesuai dengan pengacakan perlakuan dan ulangan yang telah diberi nomor dengan cara menggunakan kertas disetiap perlakuan yang dilakukan secara acak. Penempatan ayam kedalam unit kandang dilakukan secara acak pula.

Ransum percobaan dengan pemberian tepung Apu-Apu (*Pistia Stratiotes*) 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Diberikan kepada ayam percobaan setiap perlakuan yang telah diacak. Setiap kali memberikan pakan diusahakan ransum tidak ada yang tercecer. Disamping itu disediakan pula tempat air minum dan tempat pakan.

Daya cerna protein, yang dilakukan setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengujian daya cerna protein pada tiap objek penelitian (Ayam Kampung Super). Pengamatan terhadap daya cerna protein dengan cara mengetahui data konsumsi pakan yang telah diformulasikan dengan formulasi kontrol dan penambahan tepung apu-apu. Daya cerna protein adalah banyaknya protein yang dapat dicerna tubuh atau banyaknya protein yang dapat dipotong ikatannya oleh enzim protease sehingga dapat diperoleh asam-asam amino yang dapat langsung diserap tubuh.

E. Parameter yang diamati

Daya cerna dapat diukur dengan menggunakan Metode koleksi digesta ileum dengan cara pemuasaan ayam selama semalam, pemberian pakan uji selama 5 hari, setelah itu ayam disembelih. Digesta diambil dari usus halus bagian ileum, yaitu setelah 1 cm dari Meckel's diverticulum hingga batas 1 cm sebelum ileocecal junction. Digesta ileum dikumpulkan, dibekukan, dan disimpan pada suhu -20 °C sampai siap dianalisis. Sampel ekskreta beku yang telah kering dihancurkan dengan menggunakan mortar dan alu dan kemudian dianalisis (Adedokun *et al.*, 2008).

Rumus daya cerna protein sebagai berikut :

$$\text{Daya Cerna Protein} = \frac{(\sum A (\text{gr}) \times \% B) - (\sum C (\text{gr}) \times \% D)}{(\sum A (\text{gr}) \times \% B)} \times 100$$

Keterangan:

A = Konsumsi ransum (gram)

B = % Zat makanan dalam ransum (Protein)

C = Jumlah feses (gram)

D = % Zat makanan dalam feses (Protein) (Menurut Anggorodi, 1990).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Apabila perlakuan berpengaruh nyata akan dilanjutkan dengan uji BNT. Menurut Steel dan Torrie (1991), Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari ulangan ke-j.

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P0, P1, P2, P3, P4 (perlakuan)

j = 1,2,3 (ulangan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode koleksi digesta ileum yakni melakukan pemuasaaan ayam selama semalam (14 jam), setelah dipuasakan diberikan pakan uji dengan persentase 0%, 5% Apu-apu, 10% Apu-apu, 15% Apu-apu, 20% Apu-apu sebanyak 75 gram/ekor selama pemberian 7-10 jam sebelum pemotongan. Kemudian ayam tersebut disembelih setelah pemberian pakan uji selama 7-10 jam. Setelah itu dilakukan pembedahan kemudian Digesta diambil dari usus halus bagian ileum, yaitu setelah 1 cm dari Meckel's diverticulum hingga batas 1 cm sebelum ileo-cecal junction. Setelah itu feses/sampelnya dikeluarkan kemudian ditimbang berat awalnya dalam bentuk segar dari setiap perlakuan. Setelah itu feses dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara *In vitro* di Laboratorium.

Berikut hasil rata-rata nilai pencernaan protein kasar pada ayam kampung super terhadap pengaruh pemberian tepung apu-apu dalam pakan formulasi ayam dapat disajikan pada Tabel 4.1 :


Tabel 4.1 Rataan Nilai Kecernaan Protein Kasar Ayam Kampung Super

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata %
	1	2	3	
P0 (Kontrol)	92,29	90,92	93,03	92,08
P1 (5% Apu-apu)	87,08	95,91	94,26	92,42
P2 (10% Apu-apu)	92,62	93,67	96,17	94,15
P3 (15% Apu-apu)	84,47	94,51	93,9	90,96
P4 (20% Apu-apu)	89,97	94,66	90,73	91,79

Sumber: Data Primer, 2018.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambar sebagai berikut:



Gambar. Hasil rata-rata nilai Kecernaan Protein Kasar

Hasil rata-rata nilai kecernaan protein kasar pada ayam kampung super terhadap pengaruh pemberian tepung apu-apu dengan berbagai level terlihat pada gambar menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari perlakuan P2 (Apu-apu 10%) memiliki nilai kecernaan protein kasar yang paling tinggi diantara perlakuan lainnya. Sedangkan nilai kecernaan protein kasar yang terendah adalah P3 (Apu-apu 15%). Oleh karena itu dari data perlakuan pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa interval nilai kecernaan antara Perlakuan (P0) dengan perlakuan pemberian Apu-apu 5% (P1) adanya peningkatan nilai kecernaan, namun tidak begitu

signifikan, berbeda dengan perlakuan pemberian Apu-apu 5% (P1) terhadap perlakuan pemberian Apu-apu 10% (P2) menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan, terlihat pada tabel 4.1 dan gambar/grafik. Sedangkan interval nilai pencernaan antara perlakuan pemberian Apu-apu 10% (P2) dengan perlakuan pemberian Apu-apu 15% (P3) itu terjadi penurunan nilai pencernaan yang signifikan. Namun pada perlakuan pemberian Apu-apu 15% (P3) dengan perlakuan pemberian Apu-apu 20% (P4) itu terjadi peningkatan namun tidak begitu signifikan dan tidak melampaui nilai pencernaan P0, P1, dan P2. Dari hasil nilai pencernaan berikut maka dapat direkomendasikan penggunaan tepung apu-apu pada formulasi ransum ayam kampung super sampai batas penggunaan 10%.

Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian tepung apu-apu terhadap daya cerna protein kasar. Berdasarkan hasil sidik ragam (lampiran 1) memperlihatkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap pencernaan protein kasar pada ayam kampung super. Namun secara presentase terlihat (tabel 4.1.) menunjukkan pengaruh yang baik terhadap nilai pencernaan protein kasar ayam kampung terhadap pemberian tepung apu-apu karena dari presentase pencernaan cenderung sama dan rata-rata dengan nilai pencernaan 90%. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahju (2004), yang menyatakan bahwa daya cerna protein/kecernaan protein unggas berkisar antara 70-85%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencernaan protein kasar adalah kandungan protein dalam ransum yang dikonsumsi ternak. Ransum dengan kandungan protein rendah, umumnya mempunyai pencernaan yang rendah pula begitupun sebaliknya. Tinggi rendahnya pencernaan protein dipengaruhi oleh

kandungan bahan pakan ransum dan banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman dkk. 1986). Kecernaan protein menggambarkan seberapa besar protein yang digunakan oleh tubuh dalam proses pencernaan, baik untuk memenuhi kebutuhan.

Faktor yang mempengaruhi perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) adalah disebabkan oleh kondisi fisiologis ternak, suhu, lingkungan, penyediaan ransum, bentuk pakan, kandungan protein dalam pakan yang diberikan pada ayam kampung pada fase grower II serta dosis pemberian tepung apu-apu setiap perlakuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Donal (2002), menyatakan bahwa tinggi rendahnya kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, bentuk pakan, macam bahan pakan dalam ransum, kandungan protein kasar dan cara penyediaan ransum. Namun hal ini demikian menunjukkan salah satu faktor yang membuat tidak signifikan dalam konsumsi ransumnya adalah dipengaruhi oleh bentuk pakan yang tidak dalam bentuk pellet, kandungan nutrisi dalam ransum, suhu lingkungan yang tidak teratur, serta pola konsumsi ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi daya cerna untuk memberikan pertumbuhan, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang optimal. Sedangkan suhu lingkungan yang tidak stabil/ tidak teratur menyebabkan kondisi fisiologis ternak terganggu sehingga daya konsumsi ternak menurun. Suhu lingkungan yang nyaman bagi ternak yaitu sekitar 18-21⁰C (Suprijatna *et al.*, 2005).

Penyusunan ransum dan bentuk pakan dalam penyediaan ransum ayam kampung super juga salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kecernaan protein pada ayam. Pada penelitian ini bentuk pakan yang digunakan adalah mesh atau bentuk ukuran kecil dengan melalui pencampuran secara manual sampai homogen bahan pakan yang satu dengan bahan lainnya. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa bentuk pakan yang baik buat ayam kampung super yang sudah berada pada fase grower I, II sampai finisher yaitu bentuk pellet dan crambel karena melihat dari fisiologis ayam dalam mengkomsumsi pakannya. Bentuk pellet dan crambel mampu memacu tingkat palatabilitas pada suatu makanan tinggi dan mampu meningkatkan kecernaannya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ayam kampung super itu sendiri dari bentuk pakannya. Ketika pakan dalam bentuk mesh itu kemudian diberikan ke ternak, pakan mudah dikais oleh ayam dan pencampuran tidak merata sehingga ada pemisahan bahan yang menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi yang akan dikonsumsi oleh ayam. Sementara itu ayam tersebut memilah milih pakan yang diberikan.

Kandungan protein dalam pakan yang digunakan pada setiap perlakuan yaitu rata-rata 16%. Hal ini sesuai dengan pendapat Sinurat (1991), yang menyatakan bahwa kebutuhan protein periode *grower* 12-22 minggu sebesar 14% dan kandungan energi metabolis 2.400 kkal/kg. Dilanjut pendapat Sidadolog dan Yuwanta (2011) yang menyatakan bahwa pada Fase *finisher*, yaitu ayam kampung berumur 8-12 minggu membutuhkan protein kasar 16-18%, energi 3.000 kkal/kg, Ca 0,6%, dan P 0,4%. Ditambahkan juga oleh Iskandar *et al.*

(1991), melaporkan bahwa kebutuhan protein ayam kampung pedaging adalah 15% pada umur 0-6 minggu dan 19% pada umur 6-12 minggu dengan energi metabolis 2.900 kkal/kg. Menurut Nawawi (2015), kandungan gizi yang dibutuhkan ayam kampung pada umur 0-12 minggu dibutuhkan protein kasar 15-17 % dan kebutuhan energi metabolik 2.600 kkal/kg. Oleh karena itu menurut pendapat Tillman (2001), yang menyatakan bahwa ransum yang kandungan proteinnya rendah umumnya mempunyai tingkat pencernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Tinggi rendahnya pencernaan protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan, banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan dan pengaruh penggunaan dosis antibiotik dan probiotik yang diberikan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pemberian tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) dengan konsentrasi berbeda itu tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap pencernaan protein kasar Ayam kampung super. Namun secara presentase terlihat bahwa pemberian tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) ini menunjukkan pengaruh yang baik terhadap nilai pencernaan protein kasar ayam kampung karena dari presentase pencernaan cenderung sama dan rata-rata dengan nilai pencernaan 90%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pembahasan maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan tepung apu-apu standar 10% dengan formulasi ransum dalam bentuk mesh dan sebagai pakan pengganti/substitusi dari pakan komersil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi,A.L. 2010. *Ilmu Tumbuhan*. Bayu Media Publishing. Malang
- Abun. 2007. *Pengukuran Nilai Kecernaan Ransum Yang Mengandung Limbah Udang Windu Produk Fermentasi Pada Ayam Petelur*. Makalah Ilmiah. Universitas Padjadjaran. Jatinangor.
- Adodekun. 2008. *Analisis Kecernaan Unggas*. Tesis. FPS UGM. Yogyakarta.
- Agustina, L. 2013. *Potensi Ayam Buras Di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Amrullah, I. K. 2004. *Nutrisi Ayam Broiler*. Lembaga Satu Gunung Budi. Bogor.
- Anggorodi, 1979. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. PT. Gramedia. Jakarta.
- _____, 1990. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Gramedia. Jakarta.
- Atmomarsono, U. dan S. Ronodihardjo. 1990. *Pakan Untuk Ayam Buras Suatu Tinjauan Hasil-hasil Penelitian*. Laporan Pelaksanaan Pertemuan Aplikasi Paket Teknologi Pertanian Tingkat I Jawa Tengah, Balai Informasih Pertanian. Ungaran.
- Davies. 1982. *Growth and Energy In Nutrition and Growth Manual*. The Australian University Internasional Development Programs. Australia.
- Djulardi, A. Muis, H. Latif, S.A. 2006. *Nutrisi Aneka Ternak Dan Satwa Harapan*. Andalas University Press. Padang.
- Donald. 2002. *Sistem Pencernaan Unggas*. Universitas Airlangga Press. Surabaya
- Gunawan dan D. T. H. Sihombing. 2004. *Pengaruh Suhu Lingkungan Tinggi Terhadap Kondisi Fisiologis dan Produktivitas Ayam Buras*. Wartazoa. Vol 4. hlm. 31- 38.
- Hardjosworo, S. dan Rukmiasih. 2000. *Meningkatkan Produksi Daging Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Hardjosubroto, W. 1994. *Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan*. Grasindo. Jakarta.
- Haridjaja O, Purwakusuma W, Safitri R. 2009. *Pemanfaatan Kayu Apu (Pistia stratiotes L.) dan Kiambang (Salvinia molesta D.mitch) Untuk Meningkatkan Kualitas Air Greywater Hidroponik Tanaman Selada*

(*Lactuca sativa L.*). Jurnal Sains LSingkungan. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Iskandar, S., E. Juarini, D. Zainuddin, H. Resnawati, B. Wibowo Dan Sumanto. 1991. *Teknologi Tepat Guna Ayam Buras*. Prosiding. Balai Penelitian Ternak. Bogor

Kumar. R. 2008. *Review Of Plants*. John Press. Toronto

Kasselmann C. 1995. *Aquarienpflanzen. Aquarienpflanzen*. Egen Ulmer GMBH & Co., Stuttgart. Egen Ulmer GMBH & Co, Stuttgart. 472 pp. 472 pp. (In German) (Di Jerman)

Kementerian Agama, RI., 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta timur: CV. Darus Sunnah.

Kartasudjana, R., dan Edjeng S., 2006. *Manajemen Ternak Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Kim. 2010. *Metode untuk Pengukuran Kecernaan Protein pada Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Leeson, S., & J.D. Summers. 2001. *Nutrition of the Chicken*. 4th Edition. Guelph, Ontario.Canada.

Langeland, G. 2008. *Code For Practice For Powdered Formula For Plants*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Landprotection,2006. *In Asive Plants*. Century Crafts. New York

M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati. Jakarta

Mulyono, S. 2004. *Memelihara Ayam Buras Berorientasi Agribisnis cet. VII (Edisi revisi)*. Penebar Swadaya. Jakarta

Murtidjo, A. B. 2006. *Mengelola Ayam Buras*. Kanisius.Yogyakarta.

Nawawi, N. T dan S. Nurrohmah. 1997. *Ransum Ayam Kampung*. Trubus Agrisarana, Surabaya.

Nawawi, N. T dan S. Nurrohmah. 2011. *Ilmu Nutrien Unggas*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

NRC (National Research Council). 1994. *Nutrient Requirement for Poultry*. NRC. National Academic Press. Washington DC.

- Rasyaf M. 1992. *Memelihara Ayam Buras*. Kanisius. Yogyakarta
- _____. 2005. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya. Jakarta
- _____. 2006. *Beternak Ayam Pedaging II*. PT Penebar Swadaya. Jakarta.
- Redaksi Agromedia. 2005. *Beternak Ayam Kampung Petelur*. Agromedia Pustaka. Jakarta
- Ranjhan, S.K. 1980. *Animal Nutrition In The Tropics*. Vikas Publishing House P and T Ltd. New Delhi.
- Reddy, K.R. and W. F. Debusk. 1985. *Growth Characteristic of Aquatic Macrophytes Cultured in Nutrient Enriched Water. II: Azola, Duckweed and Salvinia*. *Economie Botany*, 38: 200 – 208.
- Salim, E. 2013. *Empat Puluh Lima Hari Siap Panen Ayam Kampung Super*. Lily Publisher. Yogyakarta.
- Sastrapradja, S dan R. Bimantoro. 1981. *Tumbuhan Air*. Lembaga Biologi Nasional-LIPI: Bogor.
- Sartika, T., Desmayati., H. Resnawati., S. Iskandar., M. Purba., D. Zainuddin, dan A. Unadi. 2014. *Teknik Formulasi Ransum Ayam KUB Berbasis Bahan Pakan Lokal*. Prosiding. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Bogor.
- Sartika, T. 2016. *Panen Ayam Kampung 70 Hari*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sarwono, B. 1994. *Beternak Ayam Buras*, Hal. 77, 81-82, Cet. Ke-9. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Santoso, U. 1996. *Limbah Bahan Ransum Unggas Yang Rasional*. PT. Bhartara Karya Aksara. Jakarta.
- Sidadolog, J.H.P. dan T. Yuwanta. 2009. *Pengaruh Konsentrasi Protein-Energi Pakan terhadap Pertambahan Berat Badan, Efisiensi Energi dan Efisiensi Protein pada Masa Pertumbuhan Ayam Merawang*. *J. Anim. Prod.* 11(1): 15--22.
- Sinurat, A.P. 1991. *Penyusunan Ransum Ayam Buras*. *Wartazoa* 2 : 1--4.
- Sofjan I. 2012. *Ayam kampung unggul balitnak*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta

- Suprijatna, E. 2005. *Ayam Buras Krosing Petelur*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- _____. 2010. *Strategi Pengembangan Ayam Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berwawasan Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Unggas Lokal ke IV. Hal : 55 – 79.
- Suprijatna, E. Atmomarsono, U dan Kartosudjono, R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Steel. 1991. *Model Matematika dari Rancangan Acak Lengkap*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tilman, A.D. Hartadi, H. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, S. Lebdosoekojo, S. 1986. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Cetakan ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Cetakan keempat. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Wahju, J. 1992. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 1997. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan Keempat. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Kecernaan Protein*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Yaman MA. 2010. *Ayam Kampung Unggul 6 Minggu Panen*. Penebar Swadaya. Jakarta.


Lampiran 1. Hasil Analisis Statistik Pengaruh Pemberian Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Kecernaan Protein Kasar pada Ayam Kampung Super.

ANOVA					
Kecernaan Protein					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16.661	4	4.165	.323	.856
Within Groups	129.064	10	12.906		
Total	145.726	14			

Test of Homogeneity of Variances			
Kecernaan Protein			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
4.061	4	10	.033

Descriptives									
Kecernaan Protein									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
	Apu-apu 0%	3	92.0800	1.07056	.61809	89.4206	94.7394	90.92	93.03
	Apu-apu 5%	3	92.4167	4.69475	2.71051	80.7543	104.0791	87.08	95.91
	Apu-apu 10%	3	94.1533	1.82369	1.05291	89.6230	98.6836	92.62	96.17
	Apu-apu 15%	3	90.9600	5.62877	3.24977	76.9773	104.9427	84.47	94.51
	Apu-apu 20%	3	91.7867	2.51723	1.45332	85.5335	98.0398	89.97	94.66
	Total	15	92.2793	3.22629	.83303	90.4927	94.0660	84.47	96.17
Model	Fixed Effects			3.59255	.92759	90.2125	94.3461		
	Random Effects				.92759 ^a	89.7039 ^a	94.8547 ^a		
a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.									

Lampiran 2. Kurva Nilai Rataan Kecernaan Protein



Gambar 2. Diagram Garis Daya Cerna Protein Kasar

Lampiran 3. Proses Pelaksanaan Penelitian

1. Tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*)



Gambar 3. Panen Tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*)

2. Proses Pengeringan Bahan yang akan digunakan dalam Penelitian



Gambar 4. Proses pengeringan tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*) 2-3 hari



Gambar 5. Proses Pengeringan Ikan Sebelum dijadikan Tepung

3. Pembuatan Kandang



Gambar 6. Proses pembuatan unit kandang



Gambar 7. Proses sanitasi kandang



Gambar 8. Pemasukan Ayam Kampung di Unit Kandang Penelitian

4. Ransum Penelitian



Gambar 9. Proses penimbangan bahan pakan



Gambar 10. Penyusunan bahan pakan formulasi ransum penelitian terdiri dari Tepung apu-apu, bungkil kedelai, tepung ikan, dedak dan jagung



Gambar 11. Proses pencampuran Bahan Pakan

5. Pengambilan Sampel



Gambar 12. Proses pemotongan ayam



Gambar 13. Proses pengambilan sampel



Gambar 14. Sampel Feses segar melalui koleksi digesta ileum



Gambar 15. Proses Uji analisis Kecernaan Protein Kasar di Laboratorium

RIWAYAT HIDUP



Suparman M biasa di sapa Parman lahir di Watampone, 11 November 1996. Lahir dari keluarga yang sederhana, anak ke-5 dari 6 bersaudara yakni dari pasangan suami istri H. Marsuki dan Hj. Sukaeni. Sekarang tinggal di Jln. Kayu Agung 4 No. 7 Kawasan Andalas, Perumahan Bukit Baruga Antang. Penulis pernah belajar di SDN 10 Manurunge Kab. Bone selama 6 Tahun. Setelah lulus dari sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 4 Watampone, Kab. Bone. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Watampone, Kab. Bone dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014.

Penulis bersyukur atas karunia Allah swt. sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan dan juga berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan kedua orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG APU-APU (*Pistia stratiotes*) TERHADAP KECERNAAN PROTEIN KASAR PADA AYAM KAMPUNG SUPER

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	2%
2	perbaiki-ummat.com Internet Source	2%
3	armandruru.blogspot.com Internet Source	2%
4	www.pertanianku.com Internet Source	1%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
6	bse.mahoni.com Internet Source	1%
7	repository.ipb.ac.id Internet Source	1%
8	tanzil.net Internet Source	1%

9	fr.scribd.com Internet Source	1%
10	media.neliti.com Internet Source	1%
11	www.pps.unud.ac.id Internet Source	1%
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
13	lintangrinastiti.blogspot.com Internet Source	1%
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
15	id.123dok.com Internet Source	1%
16	www.docstoc.com Internet Source	1%
17	elradhie.files.wordpress.com Internet Source	1%
18	myartikelblogbelajar.blogspot.com Internet Source	1%
19	journal.unpad.ac.id Internet Source	1%
20	rifalgalaxy.blogspot.com Internet Source	

		1%
21	belajarunggas.blogspot.com Internet Source	1%
22	seminar.fpp.undip.ac.id Internet Source	1%
23	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
24	repository.unib.ac.id Internet Source	1%
25	ibnothman.com Internet Source	1%
26	hancpoultryfarm.blogspot.com Internet Source	1%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography Off