

**IMPLEMENTASI ALGORITMA SEQUENTIAL COLORING
DALAM PEWARNAAN GRAPH PEMETAAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Matematika Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh

SUKRIADI

NIM. 60600113055

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk yang disebut bodynote atau daftar pustaka. Jika dikemudian hari apabila ada hasil jiplakan orang lain dalam skripsi ini maka penulis siap mempertanggung jawabkannya.

Gowa, 14 Agustus 2019



Sukriadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 60600113055

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Implementasi Pewarnaan Graph dalam Pemetaan Daerah Kabupaten Jeneponto”, yang disusun oleh Saudara **Sukriadi**, Nim: **60600113055** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **23 Agustus 2019 M**, bertepatan dengan **22 Dzulhijjah 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 23 Agustus 2019 M
22 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahmi Damis, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
Nip. 19710412 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karyaku ini teruntuk

- *Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang sangat tulus selama ini...*
- *Adik-adikku da semua keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan do'a nya selama ini...*
- *Kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan bantuannya selama ini...*
- *Almamater kebanggaanku terkhusus Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*

MOTTO

Hidup ini adalah sebuah pilihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt atas inayah, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan draf proposal ini dengan judul “IMPLEMENTASI ALGORITMA SEQUENTIAL DALAM PEWARNAAN GRAPH PEMETAAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO”. Banyak kendala dan hambatan yang dilalui dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi dengan usaha yang penulis lakukan sehingga semuanya dapat teratasi.

Serta salam dan salawat tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, dimana beliau adalah suri tauladan bagi umat manusia. Penulisan draf ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana yang wajib ditempuh di UIN Alauddin Makassar. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis sampaikan banyak terima kasih.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini sendiri, melainkan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

Allah swt yang telah limpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, Ayahanda yang tercinta **Kamiruddin**, Ibuku **Sungguh** serta kedua saudaraku tercinta **Sulfikar** dan **Saldi** yang telah memberikan do'a dan selalu menjadi penyemangat penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sangat besar penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar serta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dan selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingannya, saran dan motivasi yang diberikan selama ini.
5. Bapak Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Risnawati Iknas, S.Si., M.Si., selaku Dosen Penguji I atas bimbingan dan sarannya selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rahmi Damis, M.Ag., selaku Dosen Penguji II (Pengetahuan Agama) atas bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya selama penulis belajar di kampus ini.
9. Dinas Tata Ruang Kab. Jeneponto atas data yang diberikan kepada penulis untuk meminimumkan warna peta yang ada di Kabupaten Jeneponto.
10. Segenap keluarga yang tidak pernah memberikan doa dan motivasi secara moril maupun spiritual kepada penulis semasa kuliah hingga sekarang.
11. Semua sahabat-sahabat peneliti, semua teman-teman Sigma 013 atas segala motivasi dan dukungannya selama ini kepada penulis.
12. Terkhusus semua sahabat dari kelas C yang telah memberikan semangat dan motivasinya mulai dari Nol kami berjuang bersama-sama.
13. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan

skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Allah swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama pengembang ilmu pengetahuan.

Samata, 16 Agustus 2019
Penulis,

Sukriadi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR SIMBOL	x
DAFTAR GAMBAR	xi-xii
ABSTRAK	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Batasan Masalah	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6-24
A. Sejarah Teori <i>Graph</i>	6
B. Terminologi dan Konsep Dasar <i>Graph</i>	9
C. Jenis-jenis <i>Graph</i>	13
D. <i>Graph</i> Planar dan <i>Graph</i> Bidang	15
E. Pewarnaan <i>Graph</i>	16
F. Warna dan Pemetaan	20
III. METODOLOGI PENELITIAN	25-26
A. Jenis Penelitian	25
B. Waktu Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	25

E. Prosedur Penelitian	25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27-84
A. Interpretasi Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto Menjadi <i>Graph</i>	27
B. Pewarnaan <i>Graph</i> Wilayah Kabupaten Jeneponto	33
C. Pewarnaan <i>Graph</i> Wilayah Desa di Kabupaten Jeneponto	45
D. Menentukan Jumlah Warna Minimum Peta Kabupaten Jeneponto	80
V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFRAT PUSTAKA	86
LAMPIRAN	87-95

DAFTAR SIMBOL

V = Titik

E = Sisi

\mathcal{E} = Elemeng

x_i = Simpul

C_i = Warna yang digunakan

L_i = Jumlah titik

= Sama dengan

- Pengurangan

< Kurang dari

> Lebih dari



DAFTAR GAMBAR

2.1. Jembatan Konigsberg	6
2.2. Graph yang Mempresentasikan Jembatan Konigsberg	7
2.3. Graph G Sederhana	9
2.4. Graf G Sederhana	10
2.5. Graph Bertetangga	11
2.6. Simpul Terpencil	12
2.7. Graph dengan Derajat Simpul	12
2.8. Graph Terhubung dan Graph tidak Terhubung	13
2.9. Graph Sederhana	14
2.10. Graph tak Sederhana	14
2.11. Graph Berarah	15
2.12. Graph tak Berarah	15
2.13. Graph Planar dan Graph bidang	16
2.14. Pewarnaan simpul	17
2.15. Pewarnaan Sisi	18
2.16. Pewarnaan wilayah	18
2.17. Pemetaan M	22
2.18. Pemetaan P	23
2.19. Graph Menggunakan Algoritma <i>Sequential Coloring</i>	24
4.1. Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto	27
4.2. Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto dengan Kode	28
4.3. Graph Jeneponto	29
4.4. Peta Wilayah Desa dengan Kode	32
4.5. Graph Desa Kabupaten Jeneponto	33

4.6. Graph yang Telah Diberi Warna	44
4.7. Grap Desa yang Telah Diberi Warna	80
4.8. Peta wilayah Kabupaten Jenepono dengan Warna Minimum	81
4.9. Peta Desa Kabupaten Jenepono dengan Warna Minimum	84



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi pewarnaan *graph* dalam pemetaan daerah Kabupaten Jeneponto menggunakan Algoritma *Sequential Coloring*. Pewarnaan wilayah adalah pemberian warna dalam setiap wilayah pada *graph* sehingga tidak ada wilayah bersebelahan yang mempunyai warna yang sama. Skripsi ini bertujuan untuk mencari warna minimum pada daerah Kabupaten Jeneponto yang mempunyai 11 kecamatan dan 113 desa dengan menggunakan metode bilangan kromatik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarnaan *graph* peta pada daerah Kabupaten Jeneponto memiliki bilangan kromatik yaitu $(X(G) = 4)$ untuk kecamatan dan bilangan kromatik yaitu $(X(G) = 5)$ untuk desa.

Kata Kunci : *Bilangan Kromatik $(X(G))$, Graph dan Algoritma Sequential Coloring.*



ABSTRACT

This study discusses the implementation of graph coloring in the mapping of the Jeneponto Regency area using Sequential Coloring Algorithm. Regional coloring is a color rendering in each region of the graph so that there are no contiguous regions that have the same color. This thesis aims to find the minimum color in the Jeneponto Regency which has 11 districts and 113 villages using the chromatic number method. Based on the results of the study showed that the map graph coloring in the Jeneponto district had chromatic numbers ($X(G) = 4$) for sub-districts and chromatic numbers ($X(G) = 5$) for villages.

Keywords: *Chromatic Numbers ($X(G)$), Graphs and Sequential Coloring Algorithms.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang memerlukan sebuah penyelesaian seperti halnya dengan pewarnaan peta pada daerah yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dengan metode yang ada pada matematika permasalahan tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada peta Kabupaten Jeneponto yaitu dengan menggunakan teori pewarnaan *graph*.

Kerana melihat kondisi yang ada pada daerah Kabupaten Jeneponto yang menjadi sumber permasalahan pada masyarakat saat ini adalah perbatasan dan bidang pada setiap kecamatan dan desa yang berdekatan biasanya menggunakan warna yang sama atau terlalu banyak warna yang digunakan, sehingga masyarakat Kabupaten Jeneponto sulit untuk membedakan warna kecamatan dan desanya sendiri. Dengan demikian untuk meminimumkan warna pada peta daerah Kabupaten Jeneponto seminimum mungkin maka harus menggunakan teori pewarnaan wilayah untuk menentukan bilangan kromatik atau warna minimumnya.

Bila di perhatikan ayat-ayat dalam al-Qur'an maka di temukan persoalan warna di dalamnya, walaupun tak semua persis yang di maksud dalam teori yang digunakan dalam skripsi ini, akan tetapi ada beraneka ragam warna di temukan dalam QS Faathir 35 : 27.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

Terjemahnya :

Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.¹

Menurut dari M. Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan bahwa bahwa Allah menurunkan dari langit air hujan lalu kami dengan kuasa mengeluarkan yakni menghasilkan memunculkan dengannya yakni dengan hujan itu berbagai jenis buah-buahan yang beraneka macam warna, bentuk, rasa dan aromanya. Engkau dapat melihat diantara gunung-gunung ada yang memiliki jalur dan garis-garis yang terlihat warna putih dan ada juga yang warna merah yang kejelasan warna dan keburamannya beraneka macam warnanya dan ada pula disamping yang merah dan putih yang pekat.²

Warna yang beraneka ragam inilah yang dimanfaatkan oleh para peneliti yang memikirkan ciptaan Allah swt tersebut. Sehingga warna dijadikan salah satu objek untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Teori pewarnaan *graph* dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan yang rumit.

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Vivi Septianita yaitu Algoritma yang digunakan dalam menentukan warna pada peta Kabupaten Serdang

¹ Departemen Agama RI. 2011. "Al-Qur'an dan Terjemahnya". Jakarta. Erlangga

² M. Quraish Shihab. 2002. "Tafsir Al-Mishbah". Jakarta. Lentera Hati

Bedagai ini, yaitu algoritma *Sequential Coloring* meskipun algoritma ini masih bergantung pada urutan penomoran dari titik pada *graph*, namun keuntungan dari algoritma *Sequential Coloring* adalah efesiensinya.

Algoritma Welch Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya atau disebut *largest degree ordering* (LDO). Algoritma *Sequential Coloring* adalah sebuah algoritma untuk mewarnai sebuah *graph* dengan k -warna, k adalah bilangan integer positif. Metode yang digunakan algoritma ini adalah dengan pewarnaan langsung pada sebuah *graph* dengan warna yang sesedikit mungkin. Namun algoritma *Sequential Coloring* ini masih bergantung pada urutan penomoran dari titik-titik pada *graph*. Bilangan kromatik adalah minimum dari banyaknya warna yang digunakan pada pewarnaan *graph* G . Jika untuk setiap dua titik yang berbeda u, v maka c disebut pewarnaan kromatik.

Pada penelitian kali ini peneliti akan menentukan setiap warna-warna yang ada pada kecamatan dan desa yang dianggap sama sehingga bisa memberikan solusi supaya tidak ada lagi warna pada setiap bidang *graph* di kecamatan dan desa itu yang sama. Karena banyak permasalahan yang terjadi didaerah tentang warna yang sama didaerah tersebut yang berbeda jadi peneliti ingin membuat warna yang sama itu menjadi berbeda supaya tidak ada lagi warna yang sama didaerah itu dengan cara mengimplementasikan algoritma *sequential coloring* dalam pewarnaan *graph* pada daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul penelitian “**Implementasi Algoritma *Sequential Coloring* Dalam Pewarnaan Graph Pemetaan Daerah KABUPATEN JENEPONTO**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi algoritma *sequential coloring* pada pewarnaan *graph* dalam pemetaan daerah Kab. Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pemetaan daerah dari hasil implementasi algoritma *sequential coloring* pada Kab. Jeneponto berdasarkan kecamatan.
2. Untuk mendapatkan pemetaan daerah dari hasil implementasi algoritma *sequential coloring* Kab. Jeneponto berdasarkan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti: ingin menerapkan pewarnaan *graph* bidang khususnya dalam pemetaan daerah Kabupaten Jeneponto.
2. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan: sebagai bahan bacaan sekaligus bahan referensi bagi perkembangan keilmuan khususnya di jurusan matematika dalam bidang pewarnaan *graph*.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai sejarah teori *graph*, teori *graph*, terminologi dan konsep dasar *graph*, jenis-jenis *graph*, *graph* planar dan *graph* bidang, pewarnaan *graph*, dan pemetaan daerah Kab. Jeneponto.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang Interpretasi Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto Menjadi *Graph*, Pewarnaan *Graph* Wilayah Kabupaten Jeneponto, Pewarnaan *Graph* Wilayah Desa di Kabupaten Jeneponto dan Menentukan Jumlah Warna Minimum Peta Kabupaten Jeneponto.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.


Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 . Sejarah Teori *Graph*

Teori *graph* diperkenalkan pada abad ke-18 oleh seorang matematikawan dari swiss bernama Leonhard Euler. Euler mencoba memecahkan teka-teki yang dikenal dengan nama Masalah Jembatan Königsberg. Königsberg adalah sebuah kota di sebelah timur prussia (Jerman sekarang) dimana terdapat sungai Pregel (Pregolya sekarang) dan merupakan tempat tinggal duke of prussia tahun 1736. Kota tersebut saat ini bernama Kaliningrad dan merupakan pusat ekonomi industri utama di Rusia Barat.³ Sungai pregel membagi kota menjadi empat daratan dengan mengalir mengitari pulau Kneiphof lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai, seperti pada gambar berikut ini :




Gambar 2.1. Jembatan Königsberg.⁴

Pada abad ke-18 dibangunlah tujuh jembatan yang menghubungkan keempat daratan tersebut. Pada hari minggu masyarakat Königsberg biasanya

³ Risky Aswi Ramadhani. 2016. *Implementasi Graph Coloring dalam Pemetaan Kecamatan Di Kabupaten Kediri*. Kediri. Program Studi Teknik Informatika

⁴ Vivi Septianita Hutabarat. 2009. *Implementasi Graph Coloring dalam Pemetaan Daerah Kabupaten Bedagai*. Medan. Ilmu Komputer

berjala-jalan dari daratan ke suatu daratan lainnya melalui jembatan tersebut. Meraka berfikir apakah mungkin untuk berjalan menyebrangi ketujuh jembatan tanpa melalui jembatan yang sama dari suatu daratan dan kembali ke tempat semula. Masalah ini pertama kali di pecahkan oleh Leonard Euler. Ahli matematika dari Swiss yang menemukan salah satu cabang dari matematika yang saat ini dikenal sebagai “Teori *Graph*”. Solusi Euler merepresentasikan masalah ini ke dalam sebuah *graph* dengan ke empat daratan sebagai empat titik (*verteks*) dan ke tujuh jembatan sebagai empat sisi (*edge*). *Graph* yang dibuat Euler diperlihatkan pada gambar di bawah :⁵



Gambar 2.2. *Graph* yang merepresentasikan jembatan konigsberg.

2.1.1. Teori *Graph*

Graph adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, *graph* digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti.

Teori *graph* merupakan cabang ilmu matematika diskrit yang banyak penerapannya dalam berbagai bidang ilmu seperti *engineering*, fisika, biologi, kimia, arsitektur, transportasi, teknologi komputer, ekonomi, sosial dan bidang

⁵ Dian Wirdasari. 2011. *Teori Graph dan Implementasinya Dalam Ilmu Komputer*. Medan. Program Studi Ilmu Komputer

lainnya. Teori *graph* juga dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti *Travelling Salesperson Problem*, *Chinese Postman Problem*, *Shortest Path*, *Electrical Network Problems*, *Seating Problem* dan *Graph coloring*.

Suatu linear graph atau sederhana $G = (V, E)$ terdiri atas himpunan benda $V = \{v_1, v_2, \dots\}$ disebut titik, dan himpunan $E = \{e_1, e_2, \dots\}$, yang elemennya disebut sisi sehingga setiap sisi e_k diidentifikasi dengan pasangan tak berurut titik (v_i, v_j) . Dalam teori *graph*, *graph* adalah kumpulan titik yang mungkin terhubung maupun tidak terhubung dengan titik lainnya dengan garis. Tidak penting seberapa besar titik itu, atau seberapa panjang garisnya, atau apakah garis itu lurus atau melengkung dan titik itu pun tidak harus bulat. Intinya adalah bahwa titik-titik itu terhubung oleh garis.⁶

Definisi 1. *Graph* G adalah pasangan $(V(G), E(G))$ dengan $V(G)$ adalah himpunan titik kosong dan berhingga dari objek-objek yang disebut **titik**, dan $E(G)$ adalah himpunan (mungkin kosong) pasangan tak berurutan dari titik-titik berbeda di $V(G)$ yang disebut **sisi**. Banyaknya unsur di $V(G)$ disebut **order** dari G dan dilambangkan dengan $p(G)$, dan banyaknya unsur di $E(G)$ disebut **ukuran** dari G dan dilambangkan dengan $q(G)$. Jika *graph* yang dibicarakan hanya *graph* G , maka order dari G masing-masing cukup ditulis p dan q . *Graph* dengan order p dan ukuran q dapat disebut graf- (p, q) .⁷

⁶ Vivi Septianita Hutabarat. 2009. *Implementasi Graph Coloring dalam Pemetaan Daerah Kabupaten Bedagai*. Medan. Ilmu Komputer

⁷ Abdussakir, Nilna dan Fifi. 2009. "*Teori Graf*". Malang. UIN-Malang Press


2.1.2. Terminologi dan Konsep Dasar *Graph*

Nama “*graph*” diberikan karena *graph* dapat disajikan dalam secara grafik atau gambar, dan justru dengan bentuk gambar inilah sifat-sifat *graph* dapat dikenali secara detail. Titik disajikan dalam bentuk noktah atau lingkaran kecil dan sisi disajikan dalam bentuk garis atau kurva yang memasangkan dua titik. Penyajian *graph* secara gambar tidak harus tunggal. Penempatan posisi titik dan sisi tidak menjadi perhatian serius. Perhatikan gambar G yang memuat himpunan titik $V(G)$ dan himpunan sisi $E(G)$ seperti berikut ini.

$$V(G) = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E(G) = \{(a, b), (a, c), (a, d), (b, d), (b, c), (d, e)\}.$$

Graph G tersebut secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2.3. *Graph G* Sederhana.

Graph G mempunyai 5 titik sehingga order G adalah $p = 5$. *Graph G* mempunyai 6 sisi sehingga ukuran *graph G* adalah $q = 6$.

Sisi $e = (u, v)$ dikatakan menghubungkan titik u dan v . Jika $e = (u, v)$ adalah sisi di *graph G*, maka u dan v disebut terhubung langsung, v dan e serta u dan e disebut terkait langsung, dan titik u dan v disebut ujung dari e . Dua sisi berbeda e_1 dan e_2 terhubung langsung, jika terkait langsung pada satu titik

yang sama. Untuk selanjutnya, sisi $e = (u, v)$ akan ditulis $e = uv$. Perhatikan kembali *graph G* berikut:



Gambar 2.4. Graph G Sederhana.

Berdasarkan gambar *graph G* tersebut, maka titik a dan b terhubung langsung, demikian juga a dan c , a dan d , serta d dan e . Titik a dan e tidak terhubung langsung, demikian juga dengan b dan e serta c dan e . Sisi e_1 terkait langsung dengan titik a dan b . Sisi e_2 terkait langsung dengan titik a dan c . Sisi e_1 tidak terkait langsung titik c dan d . Perlu diperhatikan bahwa satu sisi hanya dapat terkait langsung dengan dua titik berbeda. Hal ini terjadi karena satu sisi hanya menghubungkan dua titik berbeda. Sisi e_1 dan e_2 terhubung langsung karena terkait langsung pada satu titik yang sama, yaitu titik a . Sisi e_1 dan e_6 tidak terhubung langsung karena tidak terkait langsung pada titik yang sama.⁸


Graph G = (V, E) terdiri dari sebuah himpunan tidak kosong terbatas dari berbagai titik dan sisi yang memuat sebarang himpunan bagian dari berbagai pasangan $\{(v, w) : v, w \in V, v \neq w\}$. Sisi $\{v, w\}$ dapat diekspresikan sebagai vw

⁸ Abdussakir, Nilna dan Fifi. 2009. "Teori Graf". Malang. UIN-Malang Press

atau wv dan dinyatakan sebagai relasi titik v ke titik w , dimana v, w disebut titik-titik ujung dari sisi vw .⁹

1. Bertetangga dan bersisian

Dua buah titik v dan w dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi $e = (v,w)$, dan sisi $e = (v,w)$ dikatakan bersisian atau terkait langsung dengan titik v dan w .




Gambar 2.5. Graph Bertetangga.

Berdasarkan *graph G* pada gambar diatas, titik a bertetangga dengan titik b dan c , tetapi titik a tidak bertetangga dengan titik d . Sisi (b,c) atau e_5 bersisian dengan titik b dan titik c , sisi (b,d) atau e_2 bersisian dengan titik b dan titik d , tetapi sisi (a,b) atau e_1 tidak bersisian dengan titik d .

2. Simpul Terpencil

Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang satupun tidak bertetangga dengan simpul-simpul lainnya.

⁹ Fadhilsyah, Bustami. 2009. "Matematika Diskrit". Yogyakarta. Graha Ilmu



Gambar 2.6. Simpul Terpencil.

Berdasarkan gambar diatas, titik e adalah titik terpencil karena tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya atau tidak ada satupun titik yang bertetangga dengan titik e .

3. Derajat

Misalkan v adalah titik dalam suatu *graph* G . Derajat titik v (simbol $d(v)$) adalah jumlah garis (sisi) yang berhubungan dengan titik v dan gelang (loop) dihitung dua kali. Derajat total G adalah jumlah semua titik dalam G .



Gambar 2.7. Graph dengan Derajat Simpul.


Berdasarkan gambar diatas, diperoleh bahwa derajat untuk masing-masing titik adalah sebagai berikut:

$d(v_1) = 4$, karena garis yang berhubungan dengan v_1 adalah e_1 , e_3 dan *loop* e_1 yang dihitung dua kali.

$d(v_2) = 2$, karena garis yang berhubungan dengan v_2 adalah e_2 dan e_3 .

4. Graph Terhubung

Misalkan G adalah suatu *graph*, maka setiap dua titik v dan w dalam G dikatakan terhubung jika dan hanya jika ada lintasan dari titik v ke w atau w ke v . *Graph* G dikatakan tidak terhubung jika dan hanya jika ada dua titik dalam G yang tidak terhubung.



Gambar 2.8. *Graph* Terhubung dan *Graph* Tidak terhubung.

Berdasarkan gambar diatas, Gambar (a) adalah *graph* terhubung karena setiap dua titik di *graph* tersebut mempunyai lintasan. Sedangkan Gambar (b) adalah *graph* tidak terhubung karena tidak ada lintasan dari v_2 ke v_4 .¹⁰

2.1.3 Jenis-Jenis *Graph*

Jenis-jenis *graph* dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor-faktor berikut ini:


a. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu *graph*, maka *graph* digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

i. *Graph* sederhana

Graph sederhana yaitu *graph* yang tidak mengandung sisi ganda.

Gambar di bawah ini adalah contoh *graph* sederhana.

¹⁰ Alhamis. 2012. “Aplikasi Algoritma Sequential Color Untuk Pewarnaan Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”. Riau. Prodi Matematika




Gambar 2.9. Graph Sederhana.

ii. *Graph* tak sederhana

Graph tak sederhana yaitu *graph* yang mengandung sisi ganda atau sisi,

Gambar dibawah ini adalah contoh *graph* tidak sederhana.



Gambar 2.10. Graph tak sederhana.

b. Berdasarkan jumlah titik pada suatu *graph*, maka secara umum *graph* dapat digolongkan menjadi dua jenis:

i. *Graph* berhingga

Graph berhingga adalah *graph* yang jumlah titiknya n berhingga


ii. *Graph* tak berhingga

Graph tak berhingga adalah *graph* yang jumlah titiknya n tidak berhingga banyaknya.

c. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum *graph* dibedakan atas dua jenis:

i. *Graph* berarah


Graph berarah adalah *graph* yang setiap sisinya diberikan orientasi arah.



Gamabar 2.11. *Graph* berarah.

ii. *Graph* tak berarah

Graph tak berarah adalah *graph* yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah.¹¹




Gamabar 2.12. *Graph* tak berarah.

2.1.4 *Graph* Planar dan *Graph* Bidang

Suatu *graph* disebut *graph* planar jika *graph* tersebut dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga sisi-sisinya hanya beririsan (berpotongan) titik-titik akhirnya. *Graph* bidang adalah *graph* planar G yang digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisi yang

¹¹Risky Aswi Ramadhani. 2016. *Implementasi Graph Coloring dalam Pemetaan Kecamatan Di Kabupaten Kediri*. Kediri. Program Studi Teknik Informatika

saling beririsan (berpotongan) kecuali pada titik-titik akhir dari sisi-sisi tersebut.



Gambar 2.13. Graph Planar dan Graph Bidang.

2.1.5 Pewarnaan *Graph*

Pewarnaan titik suatu *graph* adalah pemberian warna terhadap titik sedemikian sehingga dua titik yang berdampingan mempunyai warna yang berlainan. Sebuah titik dapat diberikan sembarang warna asalkan warna yang diberikan berbeda dengan titik yang berdekatan dengannya. Dikatakan G berwarna n , bila terdapat pewarnaan dengan menggunakan n warna. Jumlah minimum yang dibutuhkan disebut bilangan kromatis dari G , ditulis $K(G)$.


Masalah pewarnaan *graph* diyakini pertama kali muncul sebagai masalah pewarnaan peta, dimana warna setiap daerah pada peta yang berbatasan dibuat berlainan sehingga mudah untuk dibedakan. Pewarnaan *graph* adalah kasus khusus dari pelabelan *graph*. Pelabelan disini maksudnya, memberikan warna pada titik pada batas tertentu.¹²

¹² Sumardi Saldi. 2017. "Implementasi Algoritma Tabu Search Dalam Pewarnaan Simpul Graf". Makassar. Prodi Matematika

Persoalan pewarnaan graph dibagi ke dalam tiga macam yaitu:

1. Pewarnaan titik

Pewarnaan titik pada *graph* adalah memberi warna pada titik-titik suatu *graph* sedemikian sehingga tidak ada dua titik bertetangga yang memiliki warna yang sama. Suatu pewarnaan yang menggunakan beberapa n -buah warna biasanya disebut dengan *n-coloring*. Ukuran terkecil banyaknya warna yang dapat diberikan kepada sebuah *graph* G dinamakan dengan bilangan kromatik yang dilambangkan dengan $X(G)$.




Gambar 2.14. Pewarnaan simpul.

Berdasarkan Gambar 2.11 di atas, *graph* tersebut mempunyai bilangan kromatik 4 ($X(G) = 4$), karena ukuran terkecil banyaknya warna yang dapat diberikan pada *graph* tersebut adalah 4 warna, yaitu: merah, kuning, biru dan hitam.

2. Pewarnaan sisi

Pewarnaan sisi pada *graph* adalah memberikan warna pada garis sedemikian rupa sehingga setiap garis yang bertumpuan pada titik yang sama diberi warna yang berbeda. Pewarnaan sisi dengan warna-warna (sebut saja variabel k) dinamakan sebagai pewarnaan sisi k dan ekuivalen dengan persoalan membagi sisi dengan warna-warna tertentu pada

himpunan sisi dengan warna tertentu. Angka terkecil dari warna-warna yang dibutuhkan untuk pewarnaan sisi *graph* G disebut sebagai indeks kromatik atau angka kromatik sisi yang dilambangkan dengan $X'(G)$.




Gambar 2.15. Pewarnaan Sisi.

Berdasarkan Gambar 2.12 diatas, *Graph* tersebut mempunyai bilangan kromatik 4, karena ukuran terkecil banyaknya warna yang dapat diberikan pada sisi *graph* tersebut adalah 4 warna yaitu merah, kuning, biru dan hitam.

3. Pewarnaan wilayah

Pewarnaan wilayah adalah pemberian warna pada setiap wilayah pada *graph* sehingga tidak ada wilayah bersebelahan yang memiliki warna yang sama. Misalnya adalah masalah pewarnaan peta. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul *graph*. Sedangkan sisi menyatakan bahwa terdapat dua wilayah yang berbatasan langsung (disebut juga bertetangga).

Oleh karena itu, *graph* yang terbentuk merupakan *graph* planar.¹³



Gambar 2.16. Pewarnaan Wilayah.

¹³ Alhamis. 2012. *Aplikasi Algoritma Sequential Color Untuk Pewarnaan Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*. Riau. Prodi Matematika

Definisikan sebuah warna titik, atau secara mudah sebuah warna dari sebuah *graph* dan jumlah kromatik dari G , yang dinyatakan dengan $X(G)$, (X adalah huruf Yunani chi). Sebuah pewarnaan dari *graph* G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke titik-titik dari G sedemikian hingga *vertices adjacency* (titik relasinya) mempunyai warna-warna yang berbeda. Kita mengatakan bahwa G adalah berwarna n jika terdapat sebuah pewarnaan dari G yang menggunakan n warna. Jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai G disebut jumlah kromatik dari G .

Algoritma Welch-Powell adalah sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah *graph* G . Kita menegaskan bahwa algoritma hanya memberikan batas atas untuk $X(G)$ yaitu, bahwa algoritma tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai G . Pertama urutkan titik-titik dari G dalam derajat yang menurun. Sebuah urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa titik mungkin mempunyai derajat yang sama. Kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai titik pertama dan untuk mewarnai, dalam urutan yang berurutan, setiap titik dalam daftar yang tidak berelasi dengan titik sebelumnya diwarnai dengan warna ini. Mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses pewarnaan titik yang tidak berwarna sebelumnya dengan menggunakan warna kedua. Terus ulangi dengan penambahan warna-warna sampai semua titik telah terwarnai. Algoritma adalah pola berfikir yang terstruktur yang berisi tahap-tahap penyelesaian suatu masalah yang nantinya akan diimplementasikan kedalam suatu bahasa pemrograman.

Misalkan G *graph* tanpa loop. Suatu pewarnaan- k (pewarnaan simpul) untuk *graph* G adalah penggunaan sebagian atau semua k warna berbeda untuk mewarnai semua titik di G sehingga setiap dual titik yang terhubung langsung diberi warna yang berbeda. Jika G mempunyai pewarnaan k maka G dikatakan dapat diwarnai dengan k warna.¹⁴

Misalkan G sebuah *graph*, sebuah pewarnaan- k dari G adalah pewarnaan semua titik G dengan menggunakan k warna warna semikian hingga dua titik G yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Jika G memiliki sebuah pewarnaan- k maka G dikatakan dapat diwarnai dengan k warna. Sebuah pewarnaan- k dari *graph* G biasanya ditunjukkan dengan melabel titik-titik G dengan warna 1, 2, 3, ..., k . Jika dua titik berbeda di *graph* G dihubungkan oleh satu sisi atau lebih dari satu sisi, maka kedua titik tersebut tetap harus mendapatkan warna yang berbeda. Sehingga, berkaitan dengan pewarnaan titik pada *graph*, cukup dibatasi dengan *graph-graph* sederhana saja.¹⁵

2.1.6 Warna dan pemetaan

Pemetaan adalah paparan visual relasi dengan menghubungkan anggota satu himpunan dengan himpunan yang lain. Dalam sebuah relasi, satu anggota pada himpunan pertama dapat dipetakan ke lebih dari satu anggota himpunan kedua. Relasi binary adalah relasi dimana tidak ada anggota pada himpunan

¹⁴ Noor Saif. 2015. "Penerapan Greedy coloring Algoritma pada Peta Kotamadya Yogyakarta Berbasis Four-Colour Theorem". Yogyakarta. Prodi Matematika

¹⁵ Wahyuni Abidin, S.Pd.,M.Pd. 2013. "Matematika Diskrit". Makassar. UIN Alauddin

pertama yang dihubungkan dengan lebih dari satu anggota pada himpunan kedua.


Sebuah *graph* dikatakan *graph* bidang bila rusuk-rusuknya terletak pada bidang datar serta tidak saling dititiknya. *Graph* bidang disebut peta (map), rusuk-rusuk *graph* bidang memisahkan *graph* bidang atas wilayah-wilayah, daerah-daerah dan region, karena wilayah dibatasi oleh rusuk-rusuk maka wilayah dalam *graph* bidang dapat dibedakan menurut jumlah rusuk yang membatasi wilayah tersebut (derajat wilayah).

Ada beberapa prinsip dalam mewarnai peta, yaitu

1. Banyak warna yang harus digunakan seminimum mungkin, banyak warna minimum disebut bilangan kromatik ($X(G)$).
2. Dua buah titik yang terhubung oleh satu atau lebih rusuk tidak boleh diberi warna yang sama (pewarnaan titik).
3. Dua buah sisi atau lebih yang bertemu pada sebuah titik tidak boleh diberi warna yang sama (pewarnaan sisi).
4. Dalam mewarnai peta pakailah sebuah warna secara optimun, artinya warna baru digunakan setelah warna pertama tidak dapat digunakan lagi.

Dua buah wilayah dari sebuah *multigraph* planar dikatakan berelasi jika mereka mempunyai sebuah sisi bersama. Perhatikan, sebagai contoh pemetaan yang ditunjukkan pada gambar di bawah in. wilayah r_2 dan r_3 berelasi tetapi wilayah r_2 dan r_4 tidak.¹⁶

¹⁶ Samuel Wibisono. 2004. "*Matematika Diskrit*". Yogyakarta. Graha Ilmu



Gambar 2.17. Pemetaan M.

Jumlah wilayah yang berelasi dengan sebuah wilayah yang di berikan didapat dengan menghitung jumlah wilayah yang membagi paling sedikit satu sisi dengan wilayah tersebut. Sehingga empat wilayah r_1 , r_2 , r_3 dan r_4 dari R mempunyai berturut-turut 2, 1, 3 dan 2 wilayah relasi.


Dengan pewarnaan pada suatu pemetaan M kita mengartikan suatu pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah dari M sedemikian sehingga wilayah-wilayah relasinya mempunyai warna yang berbeda. Sebuah pemetaan adalah berwarna n jika terdapat sebuah pewarnaan dari M yang menggunakan n warna. Pemetaan pada gambar diatas adalah berwarna 3 karena wilayah-wilayahnya bisa diwarnai sebagai berikut:

r_1 biru, r_2 putih, r_3 biru, r_4 putih, r_5 biru, r_6 putih

Sebuah pemetaan P berwarna 4 memetakan empat warna ke wilayah-wilayah dari P sedemikian sehingga wilayah relasinya dipetakan dengan warna-warna yang berbeda. Satu yang mungkin berwarna adalah sebagai berikut:

Merah: r_1 dan r_3 , Biru: r_2 dan r_6 , Hijau: r_4 dan r_5 Kuning: r_7

Tidak, kita bisa mewarnai P dengan 3 warna. Ingat bahwa wilayah-wilayah r_1, r_2, r_5 dan r_7 semua berelasi satu sama lain dan oleh sebab itu harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Sehingga, paling sedikit empat warna diperlukan untuk mewarnai.



Gambar 2.18. Pemetaan P.


Batas setiap wilayah r dari sebuah pemetaan M terdiri dari sebuah barisan sisi yang membentuk sebuah path tertutup. Derajat dari wilayah r , dinyatakan dengan $\deg(r)$, adalah panjang dari path tertutup yang membatasi r . Kadang-kadang path tertutup adalah sebuah *cycle* (putaran). Jika tidak, maka beberapa sisi muncul dua kali dalam path.¹⁷

Algoritma *Sequential Color* adalah sebuah algoritma untuk mewarnai sebuah *graph* dengan k -warna, di mana k adalah bilangan *integer* positif. Metode yang digunakan algoritma ini adalah dengan pewarnaan langsung sebuah *graph* dengan warna yang sesedikit mungkin. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari algoritma *Sequential Color*:

¹⁷ Seymour Lipschutz, marc Lars Lipson. 2002. “*Matematika Diskrit*”. Jakarta. Salemba Teknik

1. $G = (V, E)$ adalah *graph* dengan jumlah titik v buah. Beri nama titik *graph* tersebut dengan $x_1, x_2, x_3, \dots, x_v$. Misalkan warna-warna yang mungkin mewarnai titik *graph* adalah $1, 2, 3, \dots, v$.
2. Buat $L_i = \langle 1, 2, 3, \dots, v \rangle$, dengan L_i adalah kumpulan warna yang mungkin menjadi warna dari titik x_i , dimulai dari $i = 1$ hingga v .
3. Lakukan pewarnaan secara berurutan berdasarkan urutan dari titik x_i , dimulai dari $i = 1$ hingga v , dengan cara sebagai berikut:
 - 3.1. Warnai titik x_i dengan C_i (C_i adalah warna pertama pada list L_i).
 - 3.2. Untuk $j = i$ hingga v , lakukan:
 - Jika $(x_i, x_j) \in E(G)$ maka $l_j = l_j - C_i$, artinya adalah jika C_i anggota l_j , buang C_i dari l_j , sebab x_j tidak boleh diwarnai dengan warna C_i , karena C_i telah menjadi warna x_i yang bertetangga dengan x_j . l_j adalah kumpulan warna yang mungkin bisa menjadi warna dari x_j .
4. Tiap titik telah diberi warna dan jumlah warna yang digunakan dihitung.

Berikut ini adalah salah satu contoh dari cara penyelesaian masalah pewarnaan simpul *graph* dengan menggunakan algoritma *Sequential Color*.¹⁸



Gambar 2.19. Graph menggunakan algoritma *Sequential Coloring*.

¹⁸ Alhamis. 2012. "Aplikasi Algoritma *Sequential Color* Untuk Pewarnaan Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singgingi Provinsi Riau". Riau. Prodi Matematika

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Terapan.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhitung pada Bulan April 2018 sampai dengan Agustus.

C. Lokasi Pengambilan Data

Adapun Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Jeneponto.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data Sekunder. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu bersumber dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Jeneponto.

E. Prosedur Penelitian

Adapun Prosedur pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengambil peta Kab. Jeneponto dari dinas tata ruang.
2. Membentuk denah peta lokasi Kab. Jeneponto berdasarkan kecamatan.
3. Menentukan *graph coloring* tiap daerah berdasarkan kecamatan.
4. Melakukan pemetaan daerah Kab. Jeneponto berdasarkan kecamatan.
5. Membentuk denah peta lokasi Kab. Jeneponto berdasarkan desa.

6. Menentukan *graph coloring* tiap daerah berdasarkan desa.
7. Melakukan pemetaan daerah Kab. Jeneponto berdasarkan desa.
8. Memperoleh Hasil Pewarnaan daerah Kab. Jeneponto.
9. Memperoleh Hasil Pemetaan daerah Kab. Jeneponto.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Interpretasi Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto Menjadi *Graph*

Penelitian ini mengaplikasikan algoritma *Sequential Coloring* dalam mewarnai peta wilayah kabupaten Jeneponto dan menentukan jumlah warna minimum yang harus digunakan pada pewarnaan wilayah kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto mempunyai 11 wilayah kecamatan yang akan diberi warna, pewarnaan peta kabupaten Jeneponto dilakukan dengan pewarnaan wilayah (*Region Coloring*), dimana pada wilayah yang bertetangga akan diberikan warna yang berbeda.

Adapun peta administrasi kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :




Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto.

1. Batas wilayah kecamatan di kabupaten Jeneponto.


Daerah kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 kecamatan dapat kita representasikan menjadi sebuah *graph* dimana x_1, x_2, \dots, x_{11} direpresentasikan sebagai titik. Masing-masing wilayah kecamatan diberi kode x_1 untuk kecamatan bangkala barat, x_2 untuk kecamatan bangkala, x_3 untuk kecamatan bontoramba, x_4 untuk kecamatan tamalatea, x_5 untuk kecamatan turatea, x_6 untuk kecamatan binamu, x_7 untuk kecamatan batang, x_8 untuk kecamatan arungkeke, x_9 untuk kecamatan tarowang, x_{10} untuk kecamatan kelara, x_{11} untuk kecamatan rumbia.

Berikut ini adalah gambar yang merepresentasikan peta wilayah kabupaten Jeneponto yang telah diberi kode yang bersesuaian dengan nama kecamatan :



Gambar 4.2 : Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto dengan Kode.

Wilayah kecamatan pada peta kabupaten jenepono direpresentasikan sebagai titik, pada *graph* wilayah kecamatan yang berbatasan langsung direpresentasikan sebagai sisi pada *graph*. *Graph* yang diperoleh disebut sebagai *graph* jenepono seperti yang diperlihatkan gambar 4.3 sebagai berikut.



Gambar 4.3 : *Graph* Wilayah Jeneponto Berdasarkan Kecamatan.


2. Batas wilayah desa

Daerah kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 kecamatan dapat kita representasikan menjadi sebuah *graph* dimana x_1, x_2, \dots, x_{11} direpresentasikan sebagai titik. Masing-masing wilayah kecamatan diberi kode x_1 untuk desa barana, x_2 untuk desa bulujaya, x_3 untuk desa beroanging, x_4 untuk desa pappaluang, x_5 untuk desa tuju, x_6 untuk desa banrimanurung, x_7 untuk desa pattiro, x_8 untuk desa garassikang, x_9 untuk desa pallantikang, x_{10} untuk desa gunung silanu, x_{11} untuk desa kapita, x_{12} untuk desa marayoka, x_{13} untuk desa bulusibatang, x_{14} untuk desa kareloe,

x_{15} untuk desa batujala, x_{16} untuk desa bulusuka, x_{17} untuk desa bontomanai, x_{18} untuk desa kalimporo, x_{19} untuk desa benteng, x_{20} untuk desa pantai bahari, x_{21} untuk desa pallengu, x_{22} untuk desa punagaya, x_{23} untuk desa bontorannu, x_{24} untuk desa tombo-tombolo, x_{25} untuk desa jenetallasa, x_{26} untuk desa mallasoro, x_{27} untuk desa tonrokassi barat, x_{28} untuk desa tonrokassi, x_{29} untuk desa tonrokassi timur, x_{30} untuk desa maero, x_{31} untuk desa bontoramba, x_{32} untuk desa baraya, x_{33} untuk desa tanammawang, x_{34} untuk desa datara, x_{35} untuk desa bangkalaloe, x_{36} untuk desa balunbungang, x_{37} untuk desa lentu, x_{38} untuk desa taman roya, x_{39} untuk desa bontotangga, x_{40} untuk desa turatea, x_{41} untuk desa bontojai, x_{42} untuk desa bontosunggu, x_{43} untuk desa borongtala, x_{44} untuk desa turatea timur, x_{45} untuk desa manjangloe, x_{46} untuk desa karelayu, x_{47} untuk desa jombe, x_{48} untuk desa tanjonga, x_{49} untuk desa bululoe, x_{50} untuk desa mangepong, x_{51} untuk desa paitana, x_{52} untuk desa langkura, x_{53} untuk desa bontomatene, x_{54} untuk desa parasangan baru, x_{55} untuk desa kayuloe barat, x_{56} untuk desa sapanang, x_{57} untuk desa bontoa, x_{58} untuk desa balang baru, x_{59} untuk desa panaikang, x_{60} untuk desa biringkassi, x_{61} untuk desa pabiringan, x_{62} untuk desa balang, x_{63} untuk desa balang toa, x_{64} untuk desa monro-monro, x_{65} untuk desa sidenre, x_{66} untuk desa empoang, x_{67} untuk desa empoang utara, x_{68} untuk desa kayuloe timur, x_{69} untuk desa bungungloe, x_{70} untuk desa kaluku, x_{71} untuk desa maccinibaji, x_{72} untuk desa kalumpang loe, x_{73} untuk desa empoang selatan, x_{74} untuk desa kampala, x_{75} untuk desa bulo-bulo, x_{76}


untuk desa palajau, x_{77} untuk desa arungkeke, x_{78} untuk desa borong lamu, x_{79} untuk desa camba-camba, x_{80} untuk desa togo-togo, x_{81} untuk desa bontoraya, x_{82} untuk desa tolo selatan, x_{83} untuk desa tolo barat, x_{84} untuk desa tolo, x_{85} untuk desa tolo timur, x_{86} untuk desa bontolebang, x_{87} untuk desa samataring, x_{88} untuk desa allu tarowang, x_{89} untuk desa bontorappo, x_{90} untuk desa pao, x_{91} untuk desa bungeng, x_{92} untuk desa arungkeke pallantikang, x_{93} untuk desa tarowang, x_{94} untuk desa balang baru, x_{95} untuk desa balang loe tarowang, x_{96} untuk desa bonto ujung, x_{97} untuk desa tino, x_{98} untuk desa gantarang, x_{99} untuk desa tombo-tombolo, x_{100} untuk desa bonto nompo, x_{101} untuk desa tolo utara, x_{102} untuk desa pallantikang, x_{103} untuk desa bontomanai, x_{104} untuk desa rumbia, x_{105} untuk desa lebang manai, x_{106} untuk desa lebang manai utara, x_{107} untuk desa bonto kini, x_{108} untuk desa bontotiro, x_{109} untuk desa kassi, x_{110} untuk desa loka, x_{111} untuk desa tompobulu, x_{112} untuk desa ujung bulu, x_{113} untuk desa jenetallasa.

Berikut ini adalah gambar yang merepresentasikan peta wilayah desa yang telah diberi kode yang bersesuaian dengan nama desa.



Gambar 4.4 : Kode Peta Kab. Jeneponto Berdasarkan Wilayah desa.

wilayah desa pada peta kabupaten jeneponto direpresentasikan sebagai titik, pada *graph* wilayah desa yang berbatasan langsung direpresentasikan sebagai sisi pada *graph*. *Graph* yang diperoleh disebut sebagai *graph* desa seperti yang diperhatikan gambar 4.5 sebagai berikut.



Gambar 4.5 : Graph Kab. Jeneponto Berdasarkan Wilayah Desa.

B. Pewarnaan Graph Wilayah Kabupaten Jeneponto

Pewarnaan peta wilayah kabupaten Jeneponto dapat dilakukan dengan menggunakan teori *graph*. Pewarnaan pada teori *graph* yang akan digunakan adalah pewarnaan titik, dimana wilayah kecamatan pada kabupaten jeneponto direpresentasikan sebagai titik pada *graph*. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.3 di atas.

Dengan melakukan pewarnaan titik pada *graph* jeneponto, akan diperoleh atau digunakan jumlah warna yang minimum.

Pemberian kode untuk pewarnaan daerah dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* agar memperoleh warna yang minimum :

{input : titik (V) : $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$ }.

{proses : pewarnaan *graph*}.

{output : warna-warna yang ditampilkan dan jumlah warna yang digunakan}.

Langkah-langkah algoritma *Sequential Coloring* di atas dapat digunakan untuk daerah kabupaten jeneponto, yaitu sebagai berikut :

Langkah 1 : masukkan titik (V) dan sisi (E)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}\}$$

$$E = \{(x_1x_2), (x_2x_3), (x_2x_4), (x_3x_4), (x_3x_5), (x_3x_6), (x_4x_6), (x_5x_6), (x_5x_7), (x_5x_{10}), (x_6x_8), (x_7x_8), (x_7x_9), (x_7x_{10}), (x_9x_{10}), (x_{10}x_{11})\}$$

Langkah 2 : Menentukan L_i yaitu kumpulan warna yang mungkin menjadi warna dari simpul x_i . Semua simpul pada *graph* terlebih dahulu diberikan warna yang berbeda, sehingga L_i untuk simpul *graph* pada gambar 1.3 di atas adalah:

L_1 untuk x_1 adalah $\langle 1 \rangle$

L_2 untuk x_2 adalah $\langle 1, 2 \rangle$

L_3 untuk x_3 adalah $\langle 1, 2, 3 \rangle$

L_4 untuk x_4 adalah $\langle 1, 2, 3, 4 \rangle$

L_5 untuk x_5 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$

L_6 untuk x_6 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$

L_7 untuk x_7 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$

L_8 untuk x_8 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$

L_9 untuk x_9 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$

L_{10} untuk x_{10} adalah $\langle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 \rangle$

L_{11} untuk x_{11} adalah $\langle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 \rangle$

Langkah 3 : Melakukan pewarnaan dengan berurutan berdasarkan dari urutan simpul x_1 , dimulai dari $i = 1$ hingga v , sebagai berikut:

- Langkah 3.1 : warnai simpul x_i dengan C_i (C_i adalah warna pertama pada L_i).
- Langkah 3.2 : untuk $j = i$ hingga v , dapat dilakukan:

Jika $(x_i, x_j) \in E(G)$ maka $L_j = L_j - C_i$, artinya adalah jika C_i anggota L_j , buang C_i dari L_j , sebab x_j tidak boleh diwarnai dengan warna C_i , karena C_i telah menjadi warna x_i yang bertetangga dengan x_j . L_j adalah kumpulan warna yang mungkin bisa menjadi warna dari x_j .

Berdasarkan langkah 3, maka proses dari pewarnaan *graph* dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* sebagai berikut:

a. Simpul x_1

Untuk warna simpul x_1 , ambil warna pertama pada L_1 yaitu 1, berarti C_1 untuk simpul x_1 adalah 1. kemudian diperhatikan simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_1 , simpul yang bertetangga dengan x_1 adalah simpul x_2 , berarti $j = 2$. Kemudian L_2 atau warna yang mungkin dapat menjadi warna dari simpul x_2 adalah sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_2 = L_2 - C_1$$

$= \langle 1, 2 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_1 = 1$ maka anggota $L_2 = \langle 1, 2 \rangle$ buang $C_1 = 1$ dari $L_2 = \langle 1, 2 \rangle$, sebab x_2 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_1 = 1$, karena $C_1 = 1$ telah menjadi warna dari x_1 yang bertetangga dengan x_2 sehingga dapat diperoleh $L_2 = \langle 2 \rangle$.

b. Simpul x_2

Untuk warna simpul x_2 , lihat $L_2 = \langle 1, 2 \rangle$ karena warna pertama pada L_2 telah digunakan oleh simpul x_1 dan simpul x_1 merupakan simpul yang bertetangga dengan x_2 sebelumnya, maka ambil warna 2, berarti C_2 untuk simpul x_2 yaitu 2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_2 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_2 adalah simpul x_3 dan x_4 , berarti $j = 3$ dan 4. Kemudian untuk L_3 dan L_4 atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_3 dan x_4 sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_3 = L_3 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, buang $C_2 = 2$ dari $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, sebab x_3 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna x_2 yang bertetangga dengan x_3 , sehingga dapat diperoleh $L_3 = \langle 1, 3 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_4 = L_4 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3, 4 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$, buang $C_2 = 2$ dari $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$, sebab x_4 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna x_2 yang bertetangga dengan x_4 sehingga dapat diperoleh $L_4 = \langle 1, 3, 4 \rangle$.

c. Simpul x_3

Untuk warna simpul x_3 , lihat $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$ karena warna pertama pada L_3 yaitu warna 1 maka diambil warna 1, berarti C_3 untuk simpul x_3 yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_3 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_3 adalah simpul x_4 , x_5 dan x_6 berarti $j = 4, 5$ dan 6 , kemudian untuk L_4 , L_5 dan L_6 atau warna yang memungkinkan bisa menjadi warna dari simpul x_4 , x_5 dan x_6 adalah sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_4 = L_4 - C_3$$

$= \langle 1, 2, 3, 4 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 1$ maka anggota $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$, buang $C_3 = 1$ dari $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$, sebab x_4 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 1$ karena $C_3 = 1$ telah menjadi warna x_3 yang bertetangga dengan x_4 sehingga dapat diperoleh $L_4 = \langle 2, 3, 4 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_5 = L_5 - C_3$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 1$ maka anggota $L_5 = \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$, buang $C_3 = 1$ dari $L_5 = \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$, sebab x_5 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 1$ karena $C_3 = 1$ telah menjadi warna x_3 yang bertetangga dengan x_5 sehingga dapat diperoleh $L_5 = \langle 2, 3, 4, 5 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_6 = L_6 - C_3$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 1$ maka anggota $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, buang $C_3 = 1$ dari $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, sebab x_6 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 1$ karena $C_3 = 1$ telah menjadi warna x_3 yang bertetangga dengan x_6 sehingga dapat diperoleh $L_6 = \langle 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$.

d. Simpul x_4

Untuk warna simpul x_4 , lihat $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$ karena warna pertama pada L_4 yaitu warna 1 dan warna 2 telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_4 yaitu simpul x_2 dan x_3 sebelumnya, maka warna pertama pada $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$ yaitu warna 3, berarti C_4 untuk simpul x_4 adalah 3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_4 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_4 adalah simpul x_6 berarti $j = 6$, kemudian untuk L_6 atau warna yang bisa memungkinkan menjadi warna dari simpul x_6 sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_6 = L_6 - C_4$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_4 = 3$ maka anggota L_6
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, buang $C_4 = 3$ dari $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, sebab
 x_6 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_4 = 3$ karena $C_4 = 3$ telah
 menjadi warna x_4 yang bertetangga dengan x_6 sehingga dapat
 diperoleh $L_6 = \langle 1, 2, 4, 5, 6 \rangle$

e. Simpul x_5

Untuk warna simpul x_5 ambil warna 2 karena warna pertama pada L_5
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$ adalah warna 2, berarti C_5 untuk simpul x_5 adalah 2.
 Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_5 , simpul
 yang bertetangga dengan simpul x_5 adalah simpul x_7 dan x_{10} berarti $j = 7$
 dan 10, kemudian untuk L_7 dan L_{10} atau warna yang memungkinkan bisa
 menjadi warna dari simpul x_7 dan x_{10} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_7 = L_7 - C_5$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_5 = 2$ maka anggota
 $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$, buang $C_5 = 2$ dari $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$,
 sebab x_7 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_5 = 2$ karena $C_5 = 2$
 telah menjadi warna x_5 yang bertetangga dengan x_7 sehingga dapat
 diperoleh $L_7 = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{10} = L_{10} - C_5$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_5 = 2$ maka
 anggotan $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, buang $C_5 = 2$ dari $L_{10} =$

$\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, sebab x_{10} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_5 = 2$ karena $C_5 = 2$ telah menjadi warna x_5 yang bertetangga dengan x_{10} sehingga dapat diperoleh $L_{10} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$.

f. Simpul x_6

Untuk warna simpul x_6 , lihat $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$ ambil warna 4 karena warna 1, 2 dan 3 telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_6 sebelumnya, berarti C_6 untuk simpul x_6 yaitu 4. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_6 . Simpul yang bertetangga dengan simpul x_6 adalah simpul x_8 , berarti $j = 8$, kemudian untuk L_8 atau warna yang memungkinkan bisa menjadi warna dari simpul x_8 sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_8 = L_8 - C_6$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle - \langle 4 \rangle$, artinya adalah jika $C_6 = 4$ maka anggota $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, buang $C_6 = 4$ dari $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, sebab x_8 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_6 = 4$ karena $C_6 = 4$ telah menjadi warna x_6 yang bertetangga dengan x_8 sehingga dapat diperoleh $L_8 = \langle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 \rangle$.

g. Simpul x_7

Untuk warna simpul x_7 , lihat $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$ karena warna pertama pada L_7 yaitu 1 maka yang diambil warna 1, berarti C_7 untuk simpul x_7 yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan

simpul x_7 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_7 adalah simpul x_8, x_9 dan x_{10} berarti $j = 8, 9$ dan 10 , kemudian untuk L_8, L_9 dan L_{10} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_8, x_9 dan x_{10} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_8 = L_8 - C_7$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_7 = 1$ maka anggota $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, buang $C_7 = 1$ dari $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, sebab x_8 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_7 = 1$ karena $C_7 = 1$ telah menjadi warna x_7 yang bertetangga dengan x_8 sehingga dapat diperoleh $L_8 = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_9 = L_9 - C_7$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_7 = 1$ maka anggota $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, buang $C_7 = 1$ dari $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, sebab x_9 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_7 = 1$ karena $C_7 = 1$ telah menjadi warna x_7 yang bertetangga dengan x_9 sehingga dapat diperoleh $L_9 = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{10} = L_{10} - C_7$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_7 = 1$ maka anggota $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, buang $C_7 = 1$ dari $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, sebab x_{10} tidak boleh diwarnai dengan

warna $C_7 = 1$ karena $C_7 = 1$ telah menjadi warna x_7 yang bertetangga dengan x_{10} sehingga dapat diperoleh $L_{10} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$.

h. Simpul x_8

Untuk warna simpul x_8 , perhatikan $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$ ambil warna 2 karena warna pertama L_8 telah digunakan oleh simpul x_8 sebelumnya, yaitu simpul x_7 , berarti C_8 untuk simpul x_8 yaitu 2. kemudian perhatikan simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_8 . Simpul yang bertetangga dengan simpul x_8 tidak ada.

i. Simpul x_9

Untuk warna simpul x_9 , lihat $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, ambil warna 2 karena warna pertama pada L_9 telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_9 sebelumnya, yaitu simpul x_7 , berarti C_9 untuk simpul x_9 adalah 2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_9 . Simpul yang bertetangga dengan simpul x_9 adalah simpul x_{10} , berarti $j = 10$, kemudian untuk L_{10} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{10} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{10} = L_{10} - C_9$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_9 = 2$ maka anggota $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, buang $C_9 = 2$ dari $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, sebab x_{10} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_9 = 2$ karena $C_9 = 2$ telah menjadi warna x_9 yang bertetangga

dengan x_{10} sehingga dapat diperoleh $L_{10} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$.

j. Simpul x_{10}

Untuk warna simpul x_{10} , lihat $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$ karena warna pertama pada L_{10} yaitu warna 1 dan 2 telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_{10} yaitu simpul x_7 dan x_9 , maka ambil warna 3, berarti C_{10} untuk simpul x_{10} adalah 3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{10} . Simpul yang bertetangga dengan simpul x_{10} yaitu simpul x_{11} , berarti $j = 11$, kemudian untuk L_{11} atau warna yang memungkinkan bisa menjadi warna dari simpul x_{11} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{11} = L_{11} - C_{10}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{10} = 3$ anggota $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$, buang $C_{10} = 3$ dari

$L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$, sebab x_{11} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{10} = 3$ karena $C_{10} = 3$ telah menjadi warna x_{10} yang bertetangga dengan x_{11} sehingga dapat diperoleh $L_{11} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$.

k. Simpul x_{11}

Untuk warna simpul x_{11} , lihat $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$ karena warna pertama pada L_{11} yaitu 1 maka yang diambil warna 1, berarti C_{11} untuk simpul x_{11} yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang


bertetangga dengan simpul x_{11} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{11} tidak ada.

langkah 2 dan 3 dapat dilihat pada tabel pewarnaan *graph* G dibawah ini:

Langkah 4 :

x_1 memperoleh warna 1, x_2 memperoleh warna 2, x_3 memperoleh warna 1, x_4 memperoleh warna 3, x_5 memperoleh warna 2, x_6 memperoleh warna 4, x_7 memperoleh warna 1, x_8 memperoleh warna 2, x_9 memperoleh warna 2, x_{10} memperoleh warna 3, x_{11} memperoleh warna 1. Jadi jumlah warna yang digunakan adalah 4.

Dari langkah-langkah yang dijabarkan dalam bentuk tabel di atas, maka dapat kita gambarkan *graph* G setelah di beri warna.



Gambar 4.6 : Graph yang Telah Diberi Warna (titik).

Berdasarkan gambar 4.6 merupakan hasil dari proses pewarnaan dengan menggunakan algoritma *Sequetial Coloring* sesuai dengan pewarnaan

graph yaitu simpul yang bertetangga tidak boleh diwarnai dengan warna yang sama dan tujuan pewarnaan dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* tercapai yaitu menginginkan warna sesedikit mungkin untuk digunakan dalam proses pewarnaannya.

C. Pewarnaan *Graph* Wilayah Desa di Kabupaten Jeneponto

Pewarnaan peta wilayah desa kabupaten jeneponto dapat di lakukan dengan menggunakan teori *graph*. Pewarnaan pada teori *graph* yang akan digunakan adalah pewarnaan titik, dimana wilayah desa pada kabupaten jeneponto direpresentasikan sebagai titik pada *graph*. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.5 di atas.

Dengan melakukan pewarnaan titik pada *graph* desa, akan diperoleh atau digunakan jumlah warna yang minimum.

Pemberian kode untuk pewarnaan daerah dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* agar memperoleh warna yang minimum :

{input : titik (V) : $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{35}, x_{36}, x_{37}, x_{38}, x_{39}, x_{40}, x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44}, x_{45}, x_{46}, x_{47}, x_{48}, x_{49}, x_{50}, x_{51}, x_{52}, x_{53}, x_{54}, x_{55}, x_{56}, x_{57}, x_{58}, x_{59}, x_{60}, x_{61}, x_{62}, x_{63}, x_{64}, x_{65}, x_{66}, x_{67}, x_{68}, x_{69}, x_{70}, x_{71}, x_{72}, x_{73}, x_{74}, x_{75}, x_{76}, x_{77}, x_{78}, x_{79}, x_{80}, x_{81}, x_{82}, x_{83}, x_{84}, x_{85}, x_{86}, x_{87}, x_{88}, x_{89}, x_{90}, x_{91}, x_{92}, x_{93}, x_{94}, x_{95}, x_{96}, x_{97}, x_{98}, x_{99}, x_{100}, x_{101}, x_{102}, x_{103}, x_{104}, x_{105}, x_{106}, x_{107}, x_{108}, x_{109}, x_{110}, x_{111}, x_{112}, x_{113}$ }.

{proses : pewarnaan *graph*}.

{ output : warna-warna yang ditampilkan dan jumlah warna yang digunakan }.

Langkah-langkah algoritma *Sequential Coloring* di atas dapat digunakan untuk wilayah desa kabupaten jeneponto sebagai berikut :

Langkah 1 : masukkan titik (V) dan sisi (E)

$$G = (V,E)$$

$$V = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{35}, x_{36}, x_{37}, x_{38}, x_{39}, x_{40}, x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44}, x_{45}, x_{46}, x_{47}, x_{48}, x_{49}, x_{50}, x_{51}, x_{52}, x_{53}, x_{54}, x_{55}, x_{56}, x_{57}, x_{58}, x_{59}, x_{60}, x_{61}, x_{62}, x_{63}, x_{64}, x_{65}, x_{66}, x_{67}, x_{68}, x_{69}, x_{70}, x_{71}, x_{72}, x_{73}, x_{74}, x_{75}, x_{76}, x_{77}, x_{78}, x_{79}, x_{80}, x_{81}, x_{82}, x_{83}, x_{84}, x_{85}, x_{86}, x_{87}, x_{88}, x_{89}, x_{90}, x_{91}, x_{92}, x_{93}, x_{94}, x_{95}, x_{96}, x_{97}, x_{98}, x_{99}, x_{100}, x_{101}, x_{102}, x_{103}, x_{104}, x_{105}, x_{106}, x_{107}, x_{108}, x_{109}, x_{110}, x_{111}, x_{112}, x_{113}\}.$$

$$E = \{(x_1x_2), (x_1x_3), (x_2x_3), (x_2x_5), (x_2x_6), (x_2x_7), (x_2x_9), (x_3x_4), (x_3x_9), (x_3x_{10}), (x_3x_{11}), (x_3x_{12}), (x_5x_6), (x_5x_8), (x_6x_7), (x_6x_8), (x_7x_9), (x_7x_{19}), (x_8x_{19}), (x_8x_{20}), (x_9x_{10}), (x_9x_{18}), (x_9x_{19}), (x_{10}x_{11}), (x_{10}x_{17}), (x_{10}x_{18}), (x_{11}x_{12}), (x_{11}x_{13}), (x_{11}x_{15}), (x_{11}x_{16}), (x_{11}x_{17}), (x_{12}x_{13}), (x_{13}x_{14}), (x_{13}x_{15}), (x_{13}x_{31}), (x_{13}x_{32}), (x_{14}x_{32}), (x_{14}x_{33}), (x_{15}x_{16}), (x_{15}x_{30}), (x_{15}x_{31}), (x_{16}x_{17}), (x_{16}x_{25}), (x_{16}x_{27}), (x_{16}x_{28}), (x_{16}x_{30}), (x_{17}x_{18}), (x_{17}x_{25}), (x_{18}x_{19}), (x_{18}x_{21}), (x_{18}x_{23}), (x_{18}x_{24}), (x_{18}x_{25}), (x_{19}x_{20}), (x_{19}x_{21}), (x_{20}x_{21}), (x_{20}x_{22}), (x_{21}x_{22}), (x_{21}x_{23}), (x_{22}x_{23}), (x_{22}x_{26}), (x_{23}x_{24}), (x_{23}x_{27}), (x_{24}x_{25}), (x_{24}x_{27}), (x_{25}x_{27}), (x_{27}x_{28}), (x_{28}x_{29}), (x_{29}x_{30}), (x_{29}x_{37}), (x_{29}x_{38}), (x_{30}x_{31}), (x_{30}x_{37}), (x_{31}x_{32}), (x_{31}x_{36}),$$

$(x_{31}x_{37}), (x_{32}x_{33}), (x_{32}x_{34}), (x_{32}x_{35}), (x_{32}x_{36}), (x_{34}x_{35}), (x_{34}x_{48}),$
 $(x_{34}x_{49}), (x_{35}x_{36}), (x_{35}x_{46}), (x_{35}x_{47}), (x_{35}x_{48}), (x_{36}x_{37}), (x_{36}x_{46}),$
 $(x_{37}x_{38}), (x_{37}x_{46}), (x_{38}x_{39}), (x_{39}x_{40}), (x_{39}x_{44}), (x_{39}x_{45}), (x_{39}x_{46}),$
 $(x_{40}x_{41}), (x_{40}x_{43}), (x_{40}x_{44}), (x_{41}x_{42}), (x_{41}x_{43}), (x_{43}x_{44}), (x_{43}x_{60}),$
 $(x_{44}x_{45}), (x_{44}x_{58}), (x_{44}x_{59}), (x_{45}x_{46}), (x_{45}x_{47}), (x_{45}x_{56}), (x_{45}x_{57}),$
 $(x_{45}x_{58}), (x_{46}x_{47}), (x_{47}x_{48}), (x_{47}x_{55}), (x_{47}x_{56}), (x_{48}x_{49}), (x_{48}x_{50}),$
 $(x_{48}x_{53}), (x_{49}x_{50}), (x_{50}x_{51}), (x_{50}x_{52}), (x_{50}x_{53}), (x_{51}x_{52}), (x_{51}x_{83}),$
 $(x_{51}x_{84}), (x_{52}x_{53}), (x_{52}x_{69}), (x_{52}x_{83}), (x_{53}x_{54}), (x_{53}x_{69}), (x_{54}x_{55}),$
 $(x_{54}x_{68}), (x_{55}x_{56}), (x_{55}x_{67}), (x_{55}x_{68}), (x_{56}x_{57}), (x_{56}x_{62}), (x_{56}x_{67}),$
 $(x_{57}x_{58}), (x_{57}x_{62}), (x_{58}x_{59}), (x_{58}x_{62}), (x_{59}x_{60}), (x_{59}x_{61}), (x_{59}x_{62}),$
 $(x_{59}x_{63}), (x_{60}x_{61}), (x_{61}x_{64}), (x_{62}x_{63}), (x_{62}x_{67}), (x_{63}x_{64}), (x_{63}x_{65}),$
 $(x_{63}x_{66}), (x_{63}x_{67}), (x_{64}x_{65}), (x_{64}x_{73}), (x_{65}x_{66}), (x_{65}x_{73}), (x_{66}x_{67}),$
 $(x_{66}x_{72}), (x_{66}x_{73}), (x_{67}x_{68}), (x_{67}x_{71}), (x_{68}x_{69}), (x_{69}x_{70}), (x_{69}x_{71}),$
 $(x_{70}x_{71}), (x_{70}x_{80}), (x_{70}x_{81}), (x_{70}x_{82}), (x_{71}x_{72}), (x_{71}x_{79}), (x_{72}x_{73}),$
 $(x_{72}x_{74}), (x_{73}x_{74}), (x_{74}x_{75}), (x_{75}x_{76}), (x_{76}x_{77}), (x_{76}x_{79}), (x_{77}x_{78}),$
 $(x_{78}x_{79}), (x_{78}x_{92}), (x_{79}x_{80}), (x_{80}x_{81}), (x_{80}x_{89}), (x_{80}x_{92}), (x_{81}x_{82}),$
 $(x_{81}x_{86}), (x_{81}x_{88}), (x_{81}x_{89}), (x_{82}x_{83}), (x_{82}x_{84}), (x_{82}x_{85}), (x_{82}x_{86}),$
 $(x_{83}x_{84}), (x_{84}x_{85}), (x_{84}x_{101}), (x_{85}x_{86}), (x_{85}x_{101}), (x_{86}x_{87}), (x_{86}x_{88}),$
 $(x_{87}x_{88}), (x_{87}x_{98}), (x_{87}x_{99}), (x_{88}x_{89}), (x_{88}x_{93}), (x_{89}x_{90}), (x_{89}x_{91}),$
 $(x_{89}x_{93}), (x_{90}x_{91}), (x_{90}x_{93}), (x_{91}x_{92}), (x_{93}x_{94}), (x_{94}x_{95}), (x_{94}x_{98}),$
 $(x_{95}x_{96}), (x_{96}x_{97}), (x_{97}x_{98}), (x_{98}x_{99}), (x_{98}x_{100}), (x_{99}x_{100}), (x_{100}x_{105}),$
 $(x_{101}x_{103}), (x_{102}x_{103}), (x_{102}x_{104}), (x_{102}x_{105}), (x_{102}x_{106}), (x_{102}x_{107}),$

$(x_{103}x_{104}), (x_{105}x_{106}), (x_{106}x_{107}), (x_{106}x_{109}), (x_{107}x_{108}), (x_{108}x_{109}),$
 $(x_{108}x_{110}), (x_{108}x_{111}), (x_{109}x_{110}), (x_{110}x_{111}), (x_{110}x_{113}), (x_{112}x_{113})\}$.

Langkah 2 : Menentukan L_i yaitu kumpulan warna yang mungkin menjadi warna dari simpul x_i . Semua simpul pada *graph* terlebih dahulu diberikan warna yang berbeda, sehingga L_i untuk simpul *graph* pada gambar 4.5 di atas adalah :

L_1 untuk x_1 adalah $\langle 1 \rangle$

L_2 untuk x_2 adalah $\langle 1, 2 \rangle$

L_3 untuk x_3 adalah $\langle 1, 2, 3 \rangle$

L_4 untuk x_4 adalah $\langle 1, 2, 3, 4 \rangle$

L_5 untuk x_5 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$

L_6 untuk x_6 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$

L_7 untuk x_7 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$

L_8 untuk x_8 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$

L_9 untuk x_9 adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$

L_{10} untuk x_{10} adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$

L_n untuk x_n adalah $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots, n \rangle$ untuk $1 \leq n \leq 113$

Langkah 3 : Melakukan pewarnaan dengan berurutan berdasarkan dari urutan simpul x_1 , dimulai dari $i = 1$ hingga v sebagai berikut :

- Langkah 3.1 : warnai simpul x_i dengan C_i (C_i adalah warna pertama pada L_i).
- Langkah 3.2 : untuk $j = i$ hingga v , dapat dilakukan :

Jika $(x_i x_j) \in E(G)$ maka $L_j = L_j - C_i$, artinya jika C_i anggota L_j , buang C_i dari L_j , sebab x_j tidak boleh diwarnai dengan warna C_i , karena C_i telah menjadi warna x_i yang bertetangga dengan x_j . L_j adalah kumpulan warna yang mungkin bisa menjadi warna dari x_j .

Berdasarkan langkah 3, maka proses dari pewarnaan *graph* dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* sebagai berikut :

1. Simpul x_1

Untuk warna simpul x_1 , ambil warna pertama pada L_1 yaitu 1, berarti C_1 untuk simpul x_1 adalah 1. Kemudian diperhatikan simpul yang bertetangga dengan simpul x_1 , simpul yang bertetangga dengan x_1 adalah x_2 dan x_3 , berarti $j = 2$ dan 3 . Kemudian L_2 dan L_3 atau warna yang mungkin dapat menjadi warna dari simpul x_2 dan x_3 adalah sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_2 = L_2 - C_1$$

= $\langle 1, 2 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_1 = 1$ maka anggota $L_2 = \langle 1, 2 \rangle$, buang $C_1 = 1$ dari $L_2 = \langle 1, 2 \rangle$, sebab x_2 tidak boleh diwarnai dengan $C_1 = 1$, karena $C_1 = 1$ telah menjadi warna dari x_1 yang bertetangga dengan x_2 sehingga dapat diperoleh $L_2 = \langle 2 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_3 = L_3 - C_1$$

$= \langle 1, 2, 3 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_1 = 1$ maka anggota $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, buang $C_1 = 1$ dari $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, sebab x_3 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_1 = 1$ karena $C_1 = 1$ telah menjadi warna x_1 yang bertetangga dengan x_3 sehingga dapat diperoleh $L_3 = \langle 2, 3 \rangle$.

2. Simpul x_2

Untuk warna simpul x_2 , lihat $L_2 = \langle 1, 2 \rangle$ karena warna pertama pada L_2 telah digunakan oleh simpul x_1 dan simpul x_1 merupakan simpul yang bertetangga dengan simpul x_2 sebelumnya, maka ambil warna 2, berarti C_2 untuk simpul x_2 yaitu 2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_2 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_2 adalah simpul x_3, x_5, x_6, x_7 dan x_9 , berarti $j = 3, 5, 6, 7$ dan 9 . Kemudian untuk L_3, L_5, L_6, L_7 dan L_9 atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_3, x_5, x_6, x_7 dan x_9 sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_3 = L_3 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, buang $C_2 = 2$ dari $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, sebab x_3 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna dari x_2 yang bertetangga dengan x_3 , sehinggadapat diperoleh $L_3 = \langle 1, 3 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_5 = L_5 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_5 = \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$, $C_2 = 2$ dari $L_5 = \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$, sebab x_5 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna dari x_2 yang bertetangga dengan x_5 , sehingga dapat diperoleh $L_5 = \langle 1, 3, 4, 5 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_6 = L_6 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, buang $C_2 = 2$ dari $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, sebab x_6 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna dari x_2 yang bertetangga dengan x_6 , sehingga dapat diperoleh $L_6 = \langle 1, 3, 4, 5, 6 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_7 = L_7 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$, buang $C_2 = 2$ dari $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$, sebab x_7 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna dari x_2 yang bertetangga dengan x_7 , sehingga dapat diperoleh $L_7 = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_9 = L_9 - C_2$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_2 = 2$ maka anggota $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, buang $C_2 = 2$ dari $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, sebab x_9 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_2 = 2$ karena $C_2 = 2$ telah menjadi warna dari x_2 yang bertetangga dengan x_9 , sehingga dapat diperoleh $L_9 = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$.

3. Simpul x_3

Untuk warna simpul x_3 , lihat $L_3 = \langle 1, 2, 3 \rangle$ karena warna pertama pada L_3 yaitu warna 1 dan warna 2 telah digunakan oleh tetangga dari x_3 yaitu simpul x_1 dan simpul x_2 sebelumnya, maka ambil warna 3, berarti C_3 untuk simpul x_3 yaitu 3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_3 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_3 adalah simpul x_4, x_9, x_{10}, x_{11} dan x_{12} , berarti $j = 4, 9, 10, 11$ dan 12 . Kemudian untuk L_4, L_9, L_{10}, L_{11} dan L_{12} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_4, x_9, x_{10}, x_{11} dan x_{12} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_4 = L_4 - C_3$
 $= \langle 1, 2, 3, 4 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 3$ maka anggota $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$, buang $C_3 = 3$ dari $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$, sebab x_4 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 3$ karena $C_3 = 3$ telah menjadi warna dari x_3 yang bertetangga dengan x_4 , sehingga dapat diperoleh $L_4 = \langle 1, 2, 4 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_9 = L_9 - C_3$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 3$ maka anggota $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, buang $C_3 = 3$ dari $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, sebab x_9 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 3$ karena $C_3 = 3$ telah menjadi warna dari x_3 yang betetangga dengan x_9 , sehingga dapat diperoleh $L_9 = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{10} = L_{10} - C_3$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 3$ maka anggota $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, buang $C_3 = 3$ dari $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, sebab x_{10} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 3$ karena $C_3 = 3$ telah menjadi warna dari x_3 yang betetangga dengan x_{10} , sehingga dapat diperoleh $L_{10} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{11} = L_{11} - C_3$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 3$ maka anggota $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$, buang $C_3 = 3$ dari $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$, sebab x_{11} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 3$ karena $C_3 = 3$ telah menjadi warna dari x_3 yang betetangga dengan x_{11} , sehingga dapat diperoleh $L_{11} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{12} = L_{12} - C_3$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_3 = 3$ maka anggota $L_{12} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$, buang $C_3 = 3$ dari $L_{12} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$, sebab x_{12} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_3 = 3$ karena $C_3 = 3$ telah menjadi warna dari x_3 yang bertetangga dengan x_{12} , sehingga dapat diperoleh $L_{12} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$.

4. Simpul x_4

Untuk warna simpul x_4 , lihat $L_4 = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$ karena warna pertama pada L_4 yaitu warna 1 maka diambil warna 1, berarti C_4 untuk simpul x_4 yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_4 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_4 tidak ada.

5. Simpul x_5

Untuk warna simpul x_5 , lihat $L_5 = \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$ karena warna pertama pada L_5 yaitu warna 3, berarti C_5 untuk simpul x_5 yaitu 3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_5 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_5 adalah simpul x_6 dan x_8 , berarti $j = 6$ dan 8 . Kemudian untuk L_6 dan L_8 atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_6 dan x_8 sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_6 = L_6 - C_5$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle - \langle \rangle$, artinya adalah jika $C_5 = 3$ maka anggota L_6

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, buang $C_5 = 3$ dari $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$, sebab

x_6 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_5 = 2$ karena $C_5 = 2$ telah

menjadi warna dari x_5 yang bertetangga dengan x_6 , sehingga dapat diperoleh $L_6 = \langle 1, 2, 4, 5, 6 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_8 = L_8 - C_5$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_5 = 3$ maka anggota $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, buang $C_5 = 3$ dari $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, sebab x_8 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_5 = 3$ karena $C_5 = 3$ telah menjadi warna dari x_5 yang bertetangga dengan x_8 , sehingga dapat diperoleh $L_8 = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$.

6. Simpul x_6

Untuk warna simpul x_6 , lihat $L_6 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$ karena warna pertama pada L_6 yaitu warna 1, berarti C_6 untuk simpul x_6 yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_6 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_6 adalah simpul x_7 , x_8 dan x_{19} berarti $j = 7, 8$ dan 19 . Kemudian untuk L_7 , L_8 dan L_{19} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_7 , x_8 dan x_{19} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_7 = L_7 - C_6$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_6 = 1$ maka anggota $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$, buang $C_6 = 1$ dari $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$, sebab x_7 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_6 = 1$ karena $C_6 = 1$

telah menjadi warna dari x_6 yang bertetangga dengan x_7 , sehingga dapat diperoleh $L_7 = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_8 = L_8 - C_6$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_6 = 1$ maka anggota $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, buang $C_6 = 1$ dari $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, sebab x_8 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_6 = 1$ karena $C_6 = 1$ telah menjadi warna dari x_6 yang bertetangga dengan x_8 , sehingga dapat diperoleh $L_8 = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$.
- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{19} = L_{19} - C_6$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_6 = 1$ maka anggota $L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$, buang $C_6 = 1$ dari $L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$, sebab x_{19} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_6 = 1$ karena $C_6 = 1$ telah menjadi warna dari x_6 yang bertetangga dengan x_{19} , sehingga dapat diperoleh $L_{19} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$.

7. Simpul x_7

Untuk warna simpul x_7 , lihat $L_7 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rangle$ karena warna pertama pada L_7 yaitu warna 3, berarti C_7 untuk simpul x_7 yaitu

3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_7 ,

simpul yang bertetangga dengan simpul x_7 adalah simpul x_9 dan x_{19} berarti $j = 9$ dan 19 . Kemudian untuk L_9 dan L_{19} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_9 dan x_{19} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_9 = L_9 - C_7$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_7 = 3$ maka anggota $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, buang $C_7 = 3$ dari $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$, sebab x_9 tidak boleh diwarnai dengan warna $C_7 = 3$ karena $C_7 = 3$ telah menjadi warna dari x_7 yang bertetangga dengan x_9 , sehingga dapat diperoleh $L_9 = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{19} = L_{19} - C_7$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_7 = 3$ maka anggota $L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$, buang $C_7 = 3$ dari $L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$, sebab x_{19} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_7 = 3$ karena $C_7 = 3$ telah menjadi warna dari x_7 yang bertetangga dengan x_{19} , sehingga dapat diperoleh $L_{19} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$.

8. Simpul x_8

Untuk warna simpul x_8 , lihat $L_8 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$ ambil warna 2 karena warna pertama pada L_8 telah digunakan oleh simpul

tetangga dari x_8 sebelumnya, berarti C_8 untuk simpul x_8 yaitu 2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_8 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_8 adalah simpul x_{19} dan x_{20} berarti $j = 19$ dan 20 . Kemudian untuk L_{19} dan L_{20} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{19} dan x_{20} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{19} = L_{19} - C_8$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle -$$

$$\langle 2 \rangle, \text{ artinya adalah jika } C_8 = 2 \text{ maka anggota } L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6,$$

$$7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle, \text{ buang } C_8 = 2 \text{ dari } L_{19}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle,$$

sebab x_{19} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_8 = 2$ karena $C_8 = 2$ telah menjadi warna dari x_8 yang bertetangga dengan x_{19} , sehingga

$$\text{dapat diperoleh } L_{19} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle.$$

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{20} = L_{20} - C_8$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 \rangle -$$

$$\langle 2 \rangle, \text{ artinya adalah jika } C_8 = 2 \text{ maka anggota } L_{20} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6,$$

$$7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 \rangle, \text{ buang } C_8 = 2 \text{ dari}$$

$$L_{20} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,$$

$$20 \rangle, \text{ sebab } x_{20} \text{ tidak boleh diwarnai dengan warna } C_8 = 2 \text{ karena } C_8$$

$$= 2 \text{ telah menjadi warna dari } x_8 \text{ yang bertetangga dengan } x_{20},$$

sehingga dapat diperoleh $L_{20} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 \rangle$.

9. Simpul x_9

Untuk warna simpul x_9 , lihat $L_9 = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \rangle$ karena warna pertama pada L_9 yaitu warna 1, berarti C_9 untuk simpul x_9 yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_9 , simpul yang bertetangga dengan simpul x_9 adalah simpul x_{10} , x_{18} dan x_{19} berarti $j = 10, 18$ dan 19 . Kemudian untuk L_{10} , L_{18} dan L_{19} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{10} , x_{18} dan x_{19} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{10} = L_{10} - C_9$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_9 = 1$ maka anggota $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, buang $C_9 = 1$ dari $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$, sebab x_{10} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_9 = 1$ karena $C_9 = 1$ telah menjadi warna dari x_9 yang bertetangga dengan x_{10} , sehingga dapat diperoleh $L_{10} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$.
- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{18} = L_{18} - C_9$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle - \langle 1 \rangle$,
 artinya adalah jika $C_9 = 1$ maka anggota $L_{18} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$, buang $C_9 = 1$ dari $L_{10} = \langle 1, 2,$

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18>, sebab x_{18} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_9 = 1$ karena $C_9 = 1$ telah menjadi warna dari x_9 yang bertetangga dengan x_{18} , sehingga dapat diperoleh $L_{18} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{19} = L_{19} - C_9$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle -$$

$\langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_9 = 1$ maka anggota $L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6,$

$7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$, buang $C_9 = 1$ dari L_{19}

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle,$$

sebab x_{19} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_9 = 1$ karena $C_9 = 1$ telah menjadi warna dari x_9 yang bertetangga dengan x_{19} , sehingga

dapat diperoleh $L_{19} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle$.

10. Simpul x_{10}

Untuk warna simpul x_{10} , lihat $L_{10} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$

ambil warna 2 karena warna pertama pada L_{10} telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_{10} sebelumnya, berarti C_{10} untuk simpul x_{10} yaitu

2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{10} ,

simpul yang bertetangga dengan simpul x_{10} adalah simpul x_{11} , x_{17} dan

x_{18} berarti $j = 11, 17$ dan 18 . Kemudian untuk L_{11} , L_{17} dan L_{18} atau

warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{11} , x_{17} dan

x_{18} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{11} = L_{11} - C_{10}$$

= $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_{10} = 2$

maka anggota $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$, buang $C_{10} = 2$

dari $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$, sebab x_{11} tidak boleh

diwarnai dengan warna $C_{10} = 2$ karena $C_{10} = 2$ telah menjadi warna

dari x_{10} yang betetangga dengan x_{11} , sehingga dapat diperoleh $L_{11} =$

$\langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{17} = L_{17} - C_{10}$$

= $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle - \langle 2 \rangle$,

artinya adalah jika $C_{10} = 2$ maka anggota $L_{17} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$

$9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$, buang $C_{10} = 2$ dari $L_{17} = \langle 1, 2, 3,$

$4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$, sebab x_{17} tidak boleh

diwarnai dengan warna $C_{10} = 2$ karena $C_{10} = 2$ telah menjadi warna

dari x_{10} yang betetangga dengan x_{17} , sehingga dapat diperoleh $L_{17} =$

$\langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{18} = L_{18} - C_{10}$$

= $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle - \langle 2 \rangle$,

artinya adalah jika $C_{10} = 2$ maka anggota $L_{18} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$

$9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$, buang $C_{10} = 2$ dari $L_{18} = \langle 1, 2,$

$3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$, sebab x_{18} tidak

boleh diwarnai dengan warna $C_{10} = 2$ karena $C_{10} = 2$ telah menjadi warna dari x_{10} yang bertetangga dengan x_{18} , sehingga dapat diperoleh $L_{18} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$.

11. Simpul x_{11}

Untuk warna simpul x_{11} , lihat $L_{11} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$ karena warna pertama pada L_{11} yaitu warna 1, berarti C_{11} untuk simpul x_{11} yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{11} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{11} adalah simpul x_{12} , x_{13} , x_{15} , x_{16} dan x_{17} berarti $j = 12, 13, 15, 16$ dan 17 . Kemudian untuk L_{12} , L_{13} , L_{15} , L_{16} dan L_{17} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{12} , x_{13} , x_{15} , x_{16} dan x_{17} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{12} = L_{12} - C_{11}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_{11} =$

1 maka anggota $L_{12} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$, buang C_{11}

$= 1$ dari $L_{12} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$, sebab x_{12} tidak

boleh diwarnai dengan warna $C_{11} = 1$ karena $C_{11} = 1$ telah menjadi

warna dari x_{11} yang bertetangga dengan x_{12} , sehingga dapat

diperoleh $L_{12} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{13} = L_{13} - C_{11}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_{11} = 1$ maka anggota $L_{13} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$, buang $C_{11} = 1$ dari $L_{13} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$, sebab x_{13} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{11} = 1$ karena $C_{11} = 1$ telah menjadi warna dari x_{11} yang bertetangga dengan x_{13} , sehingga dapat diperoleh $L_{13} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{15} = L_{15} - C_{11}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_{11} = 1$ maka anggota $L_{15} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$, buang $C_{11} = 1$ dari $L_{15} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$, sebab x_{15} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{11} = 1$ karena $C_{11} = 1$ telah menjadi warna dari x_{11} yang bertetangga dengan x_{15} , sehingga dapat diperoleh $L_{15} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{16} = L_{16} - C_{11}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_{11} = 1$ maka anggota $L_{16} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$, buang $C_{11} = 1$ dari $L_{16} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$, sebab x_{16} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{11} = 1$ karena $C_{11} = 1$ telah menjadi warna dari x_{11}

yang bertetangga dengan x_{16} , sehingga dapat diperoleh $L_{16} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{17} = L_{17} - C_{11}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle - \langle 1 \rangle,$$

artinya adalah jika $C_{11} = 1$ maka anggota $L_{17} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$, buang $C_{11} = 1$ dari $L_{17} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$, sebab x_{17} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{11} = 1$ karena $C_{11} = 1$ telah menjadi warna dari x_{11} yang bertetangga dengan x_{17} , sehingga dapat diperoleh $L_{17} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$.

12. Simpul x_{12}

Untuk warna simpul x_{12} , lihat $L_{12} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \rangle$ ambil warna 2 karena warna pertama pada L_{12} telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_{12} sebelumnya, berarti C_{12} untuk simpul x_{12} yaitu 2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{12} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{12} adalah simpul x_{13} berarti $j = 13$. Kemudian untuk L_{13} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{13} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{13} = L_{13} - C_{12}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle - \langle 2 \rangle,$$

artinya adalah jika $C_{12} = 2$ maka anggota $L_{13} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$,

buang $C_{12} = 2$ dari $L_{13} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$, sebab x_{13} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{12} = 2$ karena $C_{12} = 2$ telah menjadi warna dari x_{12} yang bertetangga dengan x_{13} , sehingga dapat diperoleh $L_{13} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$.

13. Simpul x_{13}

Untuk warna simpul x_{13} , lihat $L_{13} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \rangle$ karena warna pertama pada L_{13} yaitu warna 1 dan warna 2 telah digunakan oleh tetangga dari x_{13} yaitu simpul x_{11} dan simpul x_{12} sebelumnya, maka ambil warna 3, berarti C_{13} untuk simpul x_{13} yaitu 3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{13} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{13} adalah simpul x_{14} , x_{15} , x_{31} dan x_{32} , berarti $j = 14, 15, 31$ dan 32 . Kemudian untuk L_{14} , L_{15} , L_{31} dan L_{32} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{14} , x_{15} , x_{31} dan x_{32} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{14} = L_{14} - C_{13}$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{13} = 3$ maka anggota $L_{14} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \rangle$, buang $C_{13} = 3$ dari $L_{14} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \rangle$, sebab x_{14} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{13} = 3$ karena $C_{13} = 3$ telah menjadi warna dari x_{13} yang bertetangga dengan x_{14} , sehingga dapat diperoleh $L_{14} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{15} = L_{15} - C_{13}$$

= $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{13} = 3$ maka anggota $L_{15} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$, buang $C_{13} = 3$ dari $L_{15} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$, sebab x_{15} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{13} = 3$ karena $C_{13} = 3$ telah menjadi warna dari x_{13} yang bertetangga dengan x_{15} , sehingga dapat diperoleh $L_{15} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{31} = L_{31} - C_{13}$$

= $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{13} = 3$ maka anggota $L_{31} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle$, buang $C_{13} = 3$ dari $L_{31} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle$, sebab x_{31} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{13} = 3$ karena $C_{13} = 3$ telah menjadi warna dari x_{13} yang bertetangga dengan x_{31} , sehingga dapat diperoleh $L_{31} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{32} = L_{32} - C_{13}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{13} = 3$ maka anggota $L_{32} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle$, buang $C_{13} = 3$ dari $L_{32} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle$, sebab x_{32} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{13} = 3$ karena $C_{13} = 3$ telah menjadi warna dari x_{13} yang bertetangga dengan x_{32} , sehingga dapat diperoleh $L_{32} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle$.

14. Simpul x_{14}

Untuk warna simpul x_{14} , lihat $L_{14} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \rangle$ karena warna pertama pada L_{14} yaitu warna 1, berarti C_{14} untuk simpul x_{14} yaitu 1. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{14} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{14} adalah simpul x_{32} dan x_{33} berarti $j = 32$ dan 33 . Kemudian untuk L_{32} dan L_{33} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{32} dan x_{33} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{32} = L_{32} - C_{14}$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle - \langle 1 \rangle, \text{ artinya adalah}
 \end{aligned}$$

jika $C_{14} = 1$ maka anggota $L_{32} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle$, buang $C_{14} = 1$ dari $L_{32} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle$, sebab x_{32} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{14} = 1$ karena $C_{14} = 1$ telah menjadi warna dari x_{14} yang bertetangga dengan x_{32} , sehingga dapat diperoleh $L_{32} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{33} = L_{33} - C_{14}$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 \rangle - \langle 1 \rangle$, artinya adalah jika $C_{14} = 1$ maka anggota $L_{33} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 \rangle$, buang $C_{14} = 1$ dari $L_{32} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 \rangle$, sebab x_{33} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{14} = 1$ karena $C_{14} = 1$ telah menjadi warna dari x_{14} yang bertetangga dengan x_{33} , sehingga dapat diperoleh $L_{32} = \langle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 \rangle$.

15. Simpul x_{15}

Untuk warna simpul x_{15} , lihat $L_{15} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \rangle$ ambil warna 2 karena warna pertama pada L_{15} telah digunakan oleh simpul tetangga dari x_{15} sebelumnya, berarti C_{15} untuk simpul x_{15} yaitu 2. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{15} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{15} adalah simpul x_{16} , x_{30} dan x_{31} berarti $j = 16, 30$ dan 31 . Kemudian untuk L_{16} , L_{30} dan L_{31} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{16} , x_{30} dan x_{31} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{16} = L_{16} - C_{15}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_{15} = 2$ maka anggota $L_{16} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$, buang $C_{15} = 2$ dari $L_{16} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$, sebab x_{16} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{15} = 2$ karena $C_{15} = 2$ telah menjadi warna dari x_{15} yang bertetangga dengan x_{16} , sehingga dapat diperoleh $L_{16} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{30} = L_{30} - C_{15}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_{15} = 2$ maka anggota $L_{30} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,$

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30>, buang $C_{15} = 2$ dari $L_{30} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle$, sebab x_{30} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{15} = 2$ karena $C_{15} = 2$ telah menjadi warna dari x_{15} yang betetangga dengan x_{30} , sehingga dapat diperoleh $L_{30} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{31} = L_{31} - C_{15}$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle - \langle 2 \rangle$, artinya adalah jika $C_{15} = 2$ maka anggota $L_{31} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle$, buang $C_{15} = 2$ dari $L_{31} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle$, sebab x_{31} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{15} = 2$ karena $C_{15} = 2$ telah menjadi warna dari x_{15} yang betetangga dengan x_{31} , sehingga dapat diperoleh $L_{31} = \langle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 \rangle$.

16. Simpul x_{16}

Untuk warna simpul x_{16} , lihat $L_{16} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \rangle$ karena warna pertama pada L_{16} yaitu warna 1 dan warna 2 telah digunakan oleh tetangga dari x_{16} yaitu simpul x_{11} dan

simpul x_{15} sebelumnya, maka ambil warna 3, berarti C_{16} untuk simpul x_{16} yaitu 3. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{16} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{16} adalah simpul x_{17} , x_{25} , x_{27} , x_{28} dan x_{30} , berarti $j = 17, 25, 27, 28$ dan 30 . Kemudian untuk L_{17} , L_{25} , L_{27} , L_{28} dan L_{30} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{17} , x_{25} , x_{27} , x_{28} dan x_{30} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{17} = L_{17} - C_{16}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle - \langle 3 \rangle,$$

artinya adalah jika $C_{16} = 3$ maka anggota $L_{17} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$

$9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$, buang $C_{16} = 3$ dari $L_{17} = \langle 1, 2, 3,$

$4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$, sebab x_{17} tidak boleh

diwarnai dengan warna $C_{16} = 3$ karena $C_{16} = 3$ telah menjadi warna

dari x_{16} yang bertetangga dengan x_{17} , sehingga dapat diperoleh $L_{17} =$

$$\langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle.$$

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{25} = L_{25} - C_{16}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,$$

$21, 22, 23, 24, 25 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{16} = 3$ maka anggota

$L_{25} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,$

$20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle$, buang $C_{16} = 3$ dari $L_{25} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,$

$8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle$,

sebab x_{25} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{16} = 3$ karena $C_{16} = 3$

telah menjadi warna dari x_{16} yang betetangga dengan x_{25} , sehingga dapat diperoleh $L_{25} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{27} = L_{27} - C_{16}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{16} = 3$ maka anggota $L_{27} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 \rangle$, buang $C_{16} = 3$ dari $L_{27} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 \rangle$, sebab x_{27} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{16} = 3$ karena $C_{16} = 3$ telah menjadi warna dari x_{16} yang betetangga dengan x_{27} , sehingga dapat diperoleh $L_{27} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{28} = L_{28} - C_{16}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{16} = 3$ maka anggota $L_{28} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 \rangle$, buang $C_{16} = 3$ dari $L_{28} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 \rangle$, sebab x_{28} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{16} = 3$ karena $C_{16} = 3$ telah menjadi warna dari x_{16}

yang bertetangga dengan x_{28} , sehingga dapat diperoleh $L_{28} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{30} = L_{30} - C_{16}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle - \langle 3 \rangle$, artinya adalah jika $C_{16} = 3$ maka anggota $L_{30} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle$, buang $C_{16} = 3$ dari $L_{30} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle$, sebab x_{30} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{16} = 3$ karena $C_{16} = 3$ telah menjadi warna dari x_{16} yang bertetangga dengan x_{30} , sehingga dapat diperoleh $L_{30} = \langle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 \rangle$.

17. Simpul x_{17}

Untuk warna simpul x_{17} , lihat $L_{17} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 \rangle$ karena warna pertama pada L_{17} yaitu warna 1, 2 dan 3 telah digunakan oleh tetangga dari x_{17} yaitu simpul x_{10} , x_{11} dan simpul x_{16} sebelumnya, maka ambil warna 4, berarti C_{17} untuk simpul x_{17} yaitu 4. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{17} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{17} adalah simpul x_{18} dan x_{25} , berarti $j = 18$ dan 25 . Kemudian untuk L_{18} dan L_{25} atau

warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul x_{18} dan x_{25} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{18} = L_{18} - C_{17}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle - \langle 4 \rangle,$$

artinya adalah jika $C_{17} = 4$ maka anggota $L_{18} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$, buang $C_{17} = 4$ dari $L_{18} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$, sebab x_{18} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{17} = 4$ karena $C_{17} = 4$ telah menjadi warna dari x_{17} yang bertetangga dengan x_{18} , sehingga dapat diperoleh $L_{18} = \langle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{25} = L_{25} - C_{17}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle - \langle 4 \rangle,$$

artinya adalah jika $C_{17} = 4$ maka anggota $L_{25} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle$, buang $C_{17} = 4$ dari $L_{25} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle$, sebab x_{25} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{17} = 4$ karena $C_{17} = 4$ telah menjadi warna dari x_{17} yang bertetangga dengan x_{25} , sehingga dapat diperoleh $L_{25} = \langle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 \rangle$.

18. Simpul x_{18}

Untuk warna simpul x_{18} , lihat $L_{18} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \rangle$ karena warna pertama pada L_{18} yaitu warna 1, 2, 3 dan 4 telah digunakan oleh tetangga dari x_{18} yaitu simpul x_9, x_{10}, x_{11} dan simpul x_{17} sebelumnya, maka ambil warna 5, berarti C_{18} untuk simpul x_{18} yaitu 5. Kemudian lihat simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul x_{18} , simpul yang bertetangga dengan simpul x_{18} adalah simpul $x_{19}, x_{21}, x_{23}, x_{24}$ dan x_{25} , berarti $j = 19, 21, 23, 24$ dan 25. Kemudian untuk $L_{19}, L_{21}, L_{23}, L_{24}$ dan L_{25} atau warna yang mungkin bisa menjadi warna dari simpul $x_{19}, x_{21}, x_{23}, x_{24}$ dan x_{25} sebagai berikut:

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{19} = L_{19} - C_{18}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle -$$

$$\langle 5 \rangle, \text{ artinya adalah jika } C_{18} = 5 \text{ maka anggota } L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6,$$

$$7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle, \text{ buang } C_{18} = 5 \text{ dari } L_{19}$$

$$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 \rangle,$$

$$\text{sebab } x_{19} \text{ tidak boleh diwarnai dengan warna } C_{18} = 5 \text{ karena } C_{18} = 5$$

$$\text{telah menjadi warna dari } x_{18} \text{ yang bertetangga dengan } x_{19}, \text{ sehingga}$$

$$\text{dapat diperoleh } L_{19} = \langle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,$$

$$17, 18, 19 \rangle.$$

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{21} = L_{21} - C_{18}$$

$= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 \rangle - \langle 5 \rangle$, artinya adalah jika $C_{18} = 5$ maka anggota $L_{21} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 \rangle$, buang $C_{18} = 5$ dari $L_{21} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 \rangle$, sebab x_{21} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{18} = 5$ karena $C_{18} = 5$ telah menjadi warna dari x_{18} yang betetangga dengan x_{21} , sehingga dapat diperoleh $L_{21} = \langle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{23} = L_{23} - C_{18}$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 \rangle - \langle 5 \rangle$, artinya adalah jika $C_{18} = 5$ maka anggota $L_{23} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 \rangle$, buang $C_{18} = 5$ dari $L_{23} = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 \rangle$, sebab x_{23} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{18} = 5$ karena $C_{18} = 5$ telah menjadi warna dari x_{18} yang betetangga dengan x_{23} , sehingga dapat diperoleh $L_{23} = \langle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 \rangle$.

- $L_j = L_j - C_i$
 $L_{24} = L_{24} - C_{18}$
 $= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 \rangle - \langle 5 \rangle$, artinya adalah jika $C_{18} = 5$ maka anggota L_{24}

= <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24>, buang $C_{18} = 5$ dari $L_{24} = <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24>$, sebab x_{24} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{18} = 5$ karena $C_{18} = 5$ telah menjadi warna dari x_{18} yang bertetangga dengan x_{24} , sehingga dapat diperoleh $L_{24} = <1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24>$.

- $L_j = L_j - C_i$

$$L_{25} = L_{25} - C_{18}$$

= <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25> - <5>, artinya adalah jika $C_{18} = 5$ maka anggota $L_{25} = <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25>$, buang $C_{18} = 5$ dari $L_{25} = <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25>$,

sebab x_{25} tidak boleh diwarnai dengan warna $C_{18} = 5$ karena $C_{18} = 5$ telah menjadi warna dari x_{18} yang bertetangga dengan x_{25} , sehingga dapat diperoleh $L_{25} = <1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25>$.


Dengan menggunakan cara yang sama kita bisa mendapatkan warna 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan memperhatikan simpul yang bertetangga tidak boleh diberi warna yang sama.

Langkah 4 :

x_1 memperoleh warna 1, x_2 memperoleh warna 2, x_3 memperoleh warna 3, x_4 memperoleh warna 1, x_5 memperoleh warna 3, x_6 memperoleh warna 1, x_7 memperoleh warna 3, x_8 memperoleh warna 2, x_9 memperoleh warna 1, x_{10} memperoleh warna 2, x_{11} memperoleh warna 1, x_{12} memperoleh warna 2, x_{13} memperoleh warna 3, x_{14} memperoleh warna 1, x_{15} memperoleh warna 2, x_{16} memperoleh warna 3, x_{17} memperoleh warna 4, x_{18} memperoleh warna 5, x_{19} memperoleh warna 4, x_{20} memperoleh warna 3, x_{21} memperoleh warna 1, x_{22} memperoleh warna 2, x_{23} memperoleh warna 4, x_{24} memperoleh warna 2, x_{25} memperoleh warna 1, x_{26} memperoleh warna 1, x_{27} memperoleh warna 5, x_{28} memperoleh warna 4, x_{29} memperoleh warna 2, x_{30} memperoleh warna 1, x_{31} memperoleh warna 4, x_{32} memperoleh warna 2, x_{33} memperoleh warna 3, x_{34} memperoleh warna 1, x_{35} memperoleh warna 3, x_{36} memperoleh warna 1, x_{37} memperoleh warna 3, x_{38} memperoleh warna 1, x_{39} memperoleh warna 2, x_{40} memperoleh warna 1, x_{41} memperoleh warna 3, x_{42} memperoleh warna 1, x_{43} memperoleh warna 2, x_{44} memperoleh warna 4, x_{45} memperoleh warna 3, x_{46} memperoleh warna 4, x_{47} memperoleh warna 1, x_{48} memperoleh warna 4, x_{49} memperoleh warna 3, x_{50} memperoleh warna 1, x_{51} memperoleh warna 2, x_{52} memperoleh warna 3, x_{53} memperoleh warna 5, x_{54} memperoleh warna 4, x_{55} memperoleh warna 2, x_{56} memperoleh warna 5, x_{57} memperoleh warna 4, x_{58} memperoleh warna 2, x_{59} memperoleh warna 3, x_{60} memperoleh warna 1, x_{61} memperoleh warna 2, x_{62} memperoleh warna 1, x_{63} memperoleh warna 2, x_{64} memperoleh warna 1, x_{65} memperoleh warna 3, x_{66} memperoleh warna 1, x_{67}

memperoleh warna 3, x_{68} memperoleh warna 1, x_{69} memperoleh warna 2, x_{70}
 memperoleh warna 4, x_{71} memperoleh warna 1, x_{72} memperoleh warna 2, x_{73}
 memperoleh warna 4, x_{74} memperoleh warna 1, x_{75} memperoleh warna 2, x_{76}
 memperoleh warna 3, x_{77} memperoleh warna 1, x_{78} memperoleh warna 2, x_{79}
 memperoleh warna 5, x_{80} memperoleh warna 2, x_{81} memperoleh warna 1, x_{82}
 memperoleh warna 2, x_{83} memperoleh warna 1, x_{84} memperoleh warna 3, x_{85}
 memperoleh warna 1, x_{86} memperoleh warna 3, x_{87} memperoleh warna 2, x_{88}
 memperoleh warna 4, x_{89} memperoleh warna 3, x_{90} memperoleh warna 1, x_{91}
 memperoleh warna 4, x_{92} memperoleh warna 1, x_{93} memperoleh warna 2, x_{94}
 memperoleh warna 3, x_{95} memperoleh warna 1, x_{96} memperoleh warna 2, x_{97}
 memperoleh warna 1, x_{98} memperoleh warna 5, x_{99} memperoleh warna 3, x_{100}
 memperoleh warna 2, x_{101} memperoleh warna 2, x_{102} memperoleh warna 1, x_{103}
 memperoleh warna 4, x_{104} memperoleh warna 3, x_{105} memperoleh warna 1, x_{106}
 memperoleh warna 2, x_{107} memperoleh warna 3, x_{108} memperoleh warna 1, x_{109}
 memperoleh warna 4, x_{110} memperoleh warna 2, x_{111} memperoleh warna 3, x_{112}
 memperoleh warna 4, x_{103} memperoleh warna 1. Jadi jumlah warna yang
 digunakan adalah 5.

Dari langkah-langkah yang dijabarkan dalam bentuk tabel di atas, maka
 dapat kita gambarkan *graph* G setelah diberi warna.



Gambar 4.7 : Graph Desa yang Telah Diberi Warna

Berdasarkan gambar 4.7 merupakan hasil dari proses pewarnaan dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* sesuai dengan pewarnaan *graph* yaitu simpul yang bertetangga tidak boleh diwarnai dengan warna yang sama dan tujuan pewarnaan dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* tercapai yaitu 5 warna berarti bilangan kromatiknya ($X(G) = 5$).

D. Menentukan Jumlah Warna Minimum Peta Kabupaten Jeneponto.

Jumlah warna minimum disebut juga dengan bilangan kromatik $X(G)$ yang diperoleh dari hasil pewarnaan wilayah kecamatan peta kabupaten Jeneponto dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* bisa dilihat dari beberapa banyak warna yang dibutuhkan dalam pewarnaan *graph* tersebut.

Sesuai dengan konsep pewarnaan wilayah, simpul-simpul pada *graph* yang merepresentasikan peta kabupaten Jeneponto mewakili wilayah kecamatan yang ada, sehingga warna yang digunakan untuk setiap simpul berarti warna yang digunakan untuk pewarnaan wilayah yang diwakilinya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pewarnaan wilayah dari *graph* peta kabupaten Jeneponto dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring*, warna minimum yang didapatkan adalah 4 warna, sehingga warna yang dibutuhkan untuk mewarnai 11 wilayah kecamatan peta kabupaten Jeneponto yang hanya membutuhkan 4 warna ($X(G) = 4$) dalam proses pewarnaannya.

Apabila dimisalkan warna 1 itu adalah kuning, warna 2 adalah biru, warna 3 adalah coklat, warna 4 adalah pink.



Gambar 4.8 : Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto dengan Warna Minimum.

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil pewarnaan dengan warna sesedikit mungkin, setiap kecamatan dapat di kelompokkan dalam bentuk sebagai berikut :


1. X1 untuk kecamatan bangkala barat berbatasan dengan X2 untuk kecamatan bangkala.
2. X2 untuk kecamatan bangkala berbatasan dengan X1 untuk kecamatan bangkala barat, X3 untuk kecamatan bontoramba dan X4 untuk kecamatan tamalatea.
3. X3 untuk kecamatan bontoramba berbatasan dengan X2 untuk kecamatan bangkala, X4 untuk kecamatan tamalatea, X5 untuk kecamatan turatea dan X6 untuk kecamatan binamu.
4. R4 untuk kecamatan tamalatea berbatasan dengan R3 untuk kecamatan bangkala, R3 untuk kecamatan bontoramba dan R6 untuk kecamatan binamu.
5. X5 untuk kecamatan turatea berbatasan dengan X3 untuk kecamatan bontoramba, X6 untuk kecamatan binamu, X7 untuk kecamatan batang dan X10 untuk kecamatan kelara.
6. X6 untuk kecamatan binamu berbatasan dengan X3 untuk kecamatan bontoramba, X4 untuk kecamatan tamalatea, X5 untuk kecamatan turatea, X7 untuk kecamatan batang dan X8 untuk kecamatan arungkeke.
7. X7 untuk kecamatan batang berbatasan X5 untuk kecamatan turatea, X6 untuk kecamatan binamu, X8 untuk kecamatan arungkeke, X9 untuk kecamatan tarowang dan X10 untuk kecamatan kelara.

8. X8 untuk kecamatan arungkeke berbatasan dengan X6 untuk kecamatan binamu dan X7 untuk kecamatan batang.
9. X9 untuk kecamatan tarowang berbatasan dengan X7 untuk kecamatan batang dan X10 untuk kecamatan kelara.
10. X10 untuk kecamatan kelara berbatasan dengan X5 untuk kecamatan turatea, X7 untuk kecamatan batang, X9 untuk kecamatan tarowang dan X11 untuk kecamatan rumbia.
11. X11 untuk kecamatan rumbia berbatasan dengan X10 untuk kecamatan kelara.

Setiap kelompok di atas harus diberi warna yang berbeda dan setiap anggota yang tergabung dalam satu kelompok harus diberi warna yang sama dengan warna kelompoknya. Pewarnaan kabupaten Jeneponto didapatkan bilangan kromatiknya adalah 4 ($X(G) = 4$) karena hanya memerlukan 4 warna dalam proses pewarnaannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pewarnaan perdesa pada *graph* peta Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan algoritma *Sequential Coloring* warna minimum yang didapatkan adalah 5 warna, sehingga warna yang dibutuhkan untuk mewarnai 113 desa pada peta Kabupaten Jeneponto yang hanya membutuhkan 5 warna ($X(G) = 5$) dalam proses pewarnaannya.

Apabila dimisalkan warna 1 adalah merah, warna 2 adalah biru, warna 3 adalah hijau, warna 4 adalah pink dan warna 5 adalah kuning.



Gambar 4.9 : Peta Desa Kabupaten Jeneponto dengan Warna Minimum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *algoritma coloring* pada pewarnaan *Graph* Kab. Jeneponto berdasarkan kecamatan yang memiliki 11 kecamatan didapatkan bilangan kromatiknya ($X(G) = 4$) dalam proses pewarnaannya.
2. Implementasi *algoritma coloring* pewarnaan *Graph* Kab. Jeneponto berdasarkan desa yang memiliki 113 desa didapatkan bilangan kromatiknya ($X(G) = 5$) dalam proses pewarnaannya.

B. Saran

Skripsi ini membahas salah satu aplikasi pada bidang teori *graph* tentang pewarnaan wilayah peta menggunakan algoritma *Sequential Coloring*. Penelitian lain dapat dikembangkan dari tugas akhir ini adalah pewarnaan *graph* yang juga digunakan pada kasus pengaturan lampu lalu lintas menggunakan algoritma lain serta pewarnaan bisa dilakukan juga dengan menggunakan program komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakir, Nilna, Fifi. 2009. "*Teori Graf*". Malang: UIN-Malang Press.
- Abidin, Wahyuni. 2013. "*Matematika Diskrit*". Makassar: UIN Alauddin.
- Alhamis. 2012. "*Aplikasi Algoritma Sequential Color untuk Pewarnaan Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*". Riau: Prodi Matematika.
- Departemen Agama RI. 2011. "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*". Jakarta: Erlangga.
- Fadhilsyah, Bustami. 2009. "*Matematika Diskrit*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hutabarat, Vivi Septianita. 2009. "*Implementasi Graph Coloring dalam Pemetaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai*". Medan: Ilmu Komputer.
- Ramadhani, Risky Aswi. 2016. "*Implementasi Graph Coloring dalam Pemetaan Kecamatan Di Kabupaten Kediri*". Kediri: Program Studi Teknik Informatika.
- Saif, Noor. 2015. "*Penerapan Greedy coloring Algoritma pada Peta Kotamadya Yogyakarta Berbasis Four-Colour Theorem*". Yogyakarta: Prodi Matematika.
- Saldi, Sumardi. 2017. "*Implementasi Algoritma Tabu Search Dalam Pewarnaan Simpul Graf*". Makassar: Prodi Matematika.
- Seymour Lipschutz, marc Lars Lipson. 2002. "*Matematika Diskrit*". Jakarta: Salemba Teknika.
- Shihab, M. Quraish. 2002. "*Tafsir Al-Mishbah*". Jakarta: Lentera Hati.
- Wibisono, Samuel. 2004. "*Matematika Diskrit*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirdasari, Dian. 2011. "*Teori Graph dan Implementasinya Dalam Ilmu Komputer*". Medan: Program Studi Ilmu Komputer.

L

A

M

P

I

R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

- **Sintaks Program Matriks Bertetangga Kabupaten Jeneponto**

```

#include <iostream>

using namespace std;

bool **W;

int n, m = 0;

int v, e = 0;

int x, y = 0;

int *vcolor;

bool promising (int i){
    int j = 0;
    while (++j < i){
        if ( W[i][j] && vcolor[i] == vcolor[j] )
            return false; }
    return true;}

void m_coloring (int i){
    if (promising(i)) {
        if (i+1==n) {
            for (i=1; i<n; i++)
                cout<<vcolor[i]<<" ";
            cout<<endl; }
        else{
            for (int color = 1; color <= m; color++){
                vcolor [i + 1] = color;
                m_coloring(i + 1); }
    }
}

```

```
    } } }
```

```
void initArrays(){
```

```
    for( int i = 0; i < n; i++){
```

```
        W[ i ] = new bool[ n];
```

```
        vcolor[ i ] = 0;
```

```
    } }
```

```
void fillW(){
```

```
    for( int i = 0; i < n; i++){
```

```
        for( int j = 0; j < n; j++){
```

```
            W[i][j] = false; } } }
```

```
void askForEdges(){
```

```
    cout << "berapa banyak sisi? ";
```

```
    cin >> e;
```

```
    cout << endl << "Masukkan sisi: (titik_x (spasi) titik_y)" << endl;
```

```
    for( int i = 0; i < e; i++ ) {
```

```
        cin >> x >> y;
```

```
        W[x][y] = true;
```

```
        W[y][x] = true; } }
```

```
void specialMatrixPrint(){
```

```
    cout << endl;
```

```
    for( int i = 0; i < n; i++){
```

```
for( int j = 0; j < n; j++){  
    cout << W[i][j] << " "; }  
cout << endl; } }
```

```
void showEdgesMatrix(){  
    int i;  
    cout << "\n "; for( i = 1; i < n; i++ ) {  
    cout << i << " "; }  
    cout << "\n "; for( i = 1; i < n; i++ ) {  
    cout << "# "; }  
    cout << endl;  
  
    for( i = 1; i < n; i++){  
        cout << i << " #";  
        for( int j = 1; j < n; j++ ) {  
            cout << (W[i][j]? "1 " : "0 "); }  
        cout << endl; } }
```

```
void checkFor( int i ){  
    m = i;  
    m_coloring( 4 ); }
```

```
int main(){  
    cout << "Berapa banyak titik? " ;  
    cin >> n;
```



```
n += 1;
```

```
W = new bool *[ n ];
```

```
vcolor = new int[ n ];
```

```
initArrays();
```

```
fillW();
```

```
askForEdges();
```

```
showEdgesMatrix();
```

```
checkFor( 4 ); //warna yang digunakan
```

```
cin >> y;
```

```
return 0; }
```

- **Sintaks Pewarnaan *Graph* Menggunakan MinGW**

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#define MAX_Titik 200
```

```
int n=0,color;
```

```
int V[MAX_Titik][MAX_Titik];
```

```
int Derajat[MAX_Titik];
```

```
int Warna[MAX_Titik];
```

```
int V_Sort[MAX_Titik];
```

```
void MasukanGraph()
```

```
{
```

```
int i=0,j=0,val=1;
```

```
printf ("Masukan Jumlah Titik : ");
```

```
scanf ("%d",&n);
```

```
printf ("Tekan 0 Jika Titik Sudah Tidak ada yang terhubung!\n");
```

```
for(i=0;i<n;i++){
```

```
printf ("Masukan T->%d : \n",i+1);
```

```

j=0;
while(1)
{
scanf("%d",&val);
if(val==0)
{
V[i][0]=j;
break;
}
V[i][++j] = val;
}
}
printf("\n=====DATA
Graph=====\\nTotal Titik= %d\\n",n);
printf("Titik Derjat \\tTitik Yang Terhubung\\n");
for(i=0;i<n;++i)
{
printf("%d\\t%d\\t",i+1,V[i][0]);
for(j=1;j<=V[i][0];j++) printf("%d ",V[i][j]);
printf("\\n");
}
}
int cek(int x,int y)
{
int j=0;
for(j=1;j<=V[x][0];j++)
{
if(y == (V[x][j]-1))
{
return 1;
}
}
return 0;
}
void Pewarnaan()
{
int i=0,j=0,k=0,temp=0,a=0;
int TempWarna[MAX_Titik];
for(i=0;i<n;i++)
{

```

```

Derajat[i] = V[i][0];
V_Sort[i]=i;
}
for (i=0;i<n-1;i++)
{
k = i;
for(j=i+1;j<n;j++)
{
if(Derajat[j]>Derajat[k])
{
k=j;
}
}
if(k!=i)
{
temp=Derajat[i];
Derajat[i] = Derajat[k];
Derajat[k] = temp;

temp=V_Sort[i];
V_Sort[i] = V_Sort[k];
V_Sort[k] = temp;
}
}
//algoritma Sequential
for(i=0;i<n;i++)
{
Warna[i]=0;
}
color=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
if(Warna[V_Sort[i]]==0)
{
color++;
Warna[V_Sort[i]] = color;
TempWarna[0]=1;
TempWarna[1]=V_Sort[i];

for(j=i+1;j<n;j++)

```

```


{
if((Warna[V_Sort[j]]==0)&&(!cek(V_Sort[i],V_Sort[j])))
{
for(k=2;k<=TempWarna[0];k++)
{
if(cek(TempWarna[k],V_Sort[j]))
{
goto next;
}
}
Warna[V_Sort[j]]=color;
TempWarna[0]+=1;
TempWarna[TempWarna[0]]=V_Sort[j];
}
next:
a=0;
}
}
}

void Hasil()
{

int i=0,j=0;
printf ("\nSorting : \n");
printf ("\nTitik\tDerajat\tTitik Yang Terhubung\n");
for (i=0;i<n;i++)
{
printf ("%d\t%d\t",V_Sort[i]+1,V[V_Sort[i]][0]);
for(j=1;j<=V[V_Sort[i]][0];j++)
{
printf ("%d ",V[V_Sort[i]][j]);
}
printf ("\n");
}
printf ("\nHasil : \n");
printf ("\nTitik\tWarna\n");
for(i=0;i<n;i++)
{

```

```
    printf ("%d\t%d\n",i+1,Warna[i]);  
    }  
    printf ("\nwarna yang di hasilakan : %d",color);  
    }  
int main()  
{  
    MasukanGraph();  
    Pewarnaan();  
    Hasil();  
    return 0;  
}
```





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1882 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan **Matematika** Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **SUKRIADI** NIM : **60600113055** tertanggal **22 September 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **"Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten Jeneponto"**
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Wahidah Alwi, S.Si., M.Si sebagai Pembimbing Pertama,
2. Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si, sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 September 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **6670/S.01/PTSP/2018**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN ALauddin Makassar Nomor : 4249/Un.6/FST/PP.00.9/9/2018 tanggal 18 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SUKRIADI**
Nomor Pokok : **60600113055**
Program Studi : **Matematika**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PEWARNAAN GRAPH DALAM PEMETAAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 September s/d 25 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN ALauddin Makassar di Makassar,
2. *Partnggal*.

SIMAP PTSP 21-09-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Lingkar Nomor 30 Bontosunggu, Tlp: 0419-2410044 Jeneponto

Nomor : 0232/IPT/DPMPSTP/JP/X/2018
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 01 Oktober 2018
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Tata Ruang Kab. Jeneponto
Di,
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No. Surat 6670/S.01/PTSP/2018, Tanggal 18 September 2018, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : SUKRIADI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : 60600113055
Program Studi : Matematika
Lembaga : Mahasiswa(S1)
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Parasangang Beru Kec. Turatea

Bermaksud melakukan Penelitian dan pengambilan data awal di daerah/kantor saudara sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

" IMPLEMENTASI PEWARNAAN GRAPH DALAM PEMETAAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO "

yang berlangsung tanggal 25 September 2018 s/d 25 November 2018

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

HJ. MERNAWATI, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina - IV/a

NIP : 197712312002122015

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
2. Dekan Fak.Sains Dan Teknologi UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Di Makassar
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip



Rp. 0,00



RIWAYAT HIDUP

AssalamuAlaikum WR...WB...

Nama lengkap saya adalah **SUKRIADI** dan biasa di panggil **SUKRI**, saya **Anak Pertama** dari **Tiga Bersaudara** dari pasangan **KAMIRUDDIN** dan **SUNGGUH**, saya terlahir dari keluarga yang sanga tsederhana pada **Hari Sabtu Tanggal 30 APRIL 1994**

di sebuah Desa yang jauh dari **Ibu Kota Kabupaten Jeneponto** yaitu **Desa Parasangan Beru**, saya mulai menempuh Pendidikan saya di **Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.90 Parasangan Beru** dan Alhamdulillah bisa lulus dengan nilai yg memuaskan dan perjalanan saya tidak sampai di situ saja karena saya melanjutkan lagi ke **Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Turatea** dan kemudian saya bertekat untuk melanjutkan lagi ke **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Jeneponto** dengan mengambil **Jurusan Administrasi Perkantoran** dan syukur Alhamdulillah saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan.

Perjalanan hidup saya tidak Cuma sampai di situ kerena kemudian saya bertekat untuk bias melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi dan doa saya terwujud karena saya bias melanjutkan sekolah saya kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)** dengan melalui perjuangan yang sangat berat karena harus bersaing dengan banyak orang dari berbagai daerah yang berbeda-beda, saya memulai perjuanganku di **UINAM** dengan mengambil Jurusan **Matematika Fakultas Sains dan Teknologi (FST)** dan tidak Cuma itu karena saya mendapatkan juga **teman-teman** yang sangat baik di **Kampus Peradaban** ini.

Itulah yang sempat saya bias tuliskan tentang kisah perjalanan hidupku selama saya menempuh pendidikan sampai sekarang ini, **sekian dan terimah kasih**

Wassalamualaikum WR...WB...