

**UJI AKTIVITAS INHIBITOR TIROSINASE EKSTRAK ETANOL DAUN  
KELOR (*Moringa oleifera* Lam)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**Achsanul Husna**

NIM. 70100115066

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achsanul Husna  
Nim : 70100115066  
Tempat/tgl lahir : Jayapura/ 19 September 1997  
Jur/prodi/konsentrasi : Farmasi  
Fakultas/program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Perumahan Graha Surandar 3  
Judul : Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2019

Penyusun

**ACHSANUL HUSNA**

**NIM. 70100115066**

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)" yang disusun oleh Achsanul Husna, NIM: 70100115066. Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin 11 November 2019 yang bertepatan dengan 14 Rabi'ul-Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 11 November 2019 M

14 Rabi'ul-Awal 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A  
Sekretaris : Indah, S.Si., M.Si., Apt.  
Pembimbing I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.  
Pembimbing II : Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt.  
Penguji I : Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.  
Penguji II : Dra. Asriyah, M.Pd



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.

NIP. 19800701 200604 002

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan utama dan paling utama ke hadirat Allah subhānahu wata'āla atas rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang telah menyingkap dan menggulung kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi, dan menjadi suri tauladan bagi jiwa jiwa yang suci.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak nikmat dari Sang Khalik melalui dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada ORANG TUA tercinta, terkasih, tersayang dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, doa yang tulus, dan pengorbanan lainnya yang jika diluapkan dalam tulisan ini tidak akan cukup untuk menggambarkan semuanya sehingga tidak dapat terbalaskan dengan seluruh pembendaharaan apa pun di dunia ini.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, MA., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menjadi pimpinan kampus dan bertanggung jawab atas status kemahasiswaan peneliti.

2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Dr. H. Kamaluddin abunawas, M.Ag, selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa kesehatan di FKIK.,
4. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.Km., MARS., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang begitu banyak mengayomi dan menuntun peneliti selama menjadi mahasiswa Farmasi.
6. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan ibu Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
7. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta

meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,

8. Ibu Dra. Asriyah, M.Pd selaku penguji agama yang telah memberikan arahan dan saran terkhusus dari segi tinjauan islam terhadap penelitian ini yang begitu membangun untuk peneliti.
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini
10. Ibu handayani selaku laboran di laboratorium biologi molekuler dan seluler yang selalu sabar mendampingi dan menunggu kami selesai mengerjakan penelitian di dalam lab yang beliau pegang.
11. Kak yusuf sebagai pendamping kami selama melakukan penelitian di lab BIOMOL dan SEL Rumah Sakit Pendidikan UNHAS yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan penelitian
12. Kepada keluargaku di perantauan PULV15 (Farmasi UINAM 2015) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, Kalian Luar Biasa

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah subhānahu wata'āla. Aamiin.

Wassalam.

Gowa, Oktober 2019

Penulis

Achsanul Husna

Nim. 70100115066

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Uraian Tanaman kelor.....	7
B. Kulit.....	8
C. Melanin.....	14
D. Enzim .....	17
E. Asam Kojat.....	28
F. Fenol.....	28
G. Microplate Reader .....	31

H. Ekstraksi .....	31
I. Tinjauan Islam.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Lokasi penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel .....	43
D. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
B. Pembahasan.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>76</b>




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian.....	62
Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel.....	63
Lampiran 3. Pembuatan Larutan Uji.....	64
Lampiran 4. Uji Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase.....	66
Lampiran 5. Identifikasi Golongan Senyawa .....	67
Lampiran 6. Hasil Perhitungan .....	68
Lampiran 7. Gambar Penelitian .....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun kelor .....	50
Tabel 2. Hasil Uji Kadar Air Simplisia .....	50
Tabel 3. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa .....	51
Tabel 4. Hasil Persen Inhibitor Ekstrak .....	51
Tabel 5. Hasil Nilai IC50 Ekstrak .....	52
Tabel 6. Sampel Ekstrak Daun Kelor.....	69
Tabel 7. Asam Kojat .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tanaman Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> Lam) .....	7
Gambar 2.	Struktur Kulit .....	10
Gambar 3.	Fungsi enzim tirosinase dan proses melanogenesis .....	16
Gambar 4.	Reaksi oksidasi dengan katalis enzim tirosinase .....	20
Gambar 5.	Rumus Struktur Asam Kojat .....	28
Gambar 6.	Gugus Fungsi Fenol .....	28
Gambar 7.	Kurva sampel .....	70
Gambar 8.	Kurva asam kojat .....	70
Gambar 9.	Pohon kelor .....	72
Gambar 10.	Sampel Daun Kelor .....	72
Gambar 11.	Ekstrak kental daun Kelor .....	72
Gambar 12.	Pengujian Kadar Air Simplisia Daun Kelor .....	73
Gambar 13.	Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Kelor .	74
Gambar 14.	Sampel pada microplate 96 well .....	75
Gambar 15.	Pengujian pada ELISA .....	75



## ABSTRAK

NAMA : ACHSANUL HUSNA  
NIM : 70100115066  
JURUSAN : FARMASI  
JUDUL : Uji Aktivitas Inhibitor Ekstrak Etanol Daun Kelor  
(*Moringa oleifera* Lam)

---

Daun kelor merupakan suatu bagian dari tumbuhan yang dilaporkan mengandung senyawa flavonoid dan fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan dan inhibitor enzim tirosinase. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji potensi ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebagai inhibitor enzim tirosinase yang dapat digunakan sebagai bahan aktif pencerah kulit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laboratorium eksperimental dengan melakukan uji aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) dengan cara menentukan nilai  $IC_{50}$  yang dapat diperoleh dari hasil deret konsentrasi sampel yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm serta asam kojat sebagai kontrol positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas inhibitor tirosinase pada ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dari hasil deret konsentrasi berturut-turut yaitu adalah 30,31%, 35,63%, 44,46%, 46,80%, dan 53,08%. Sehingga diperoleh nilai  $IC_{50}$  sampel yaitu 88,00  $\mu\text{g/mL}$  sedangkan nilai  $IC_{50}$  asam kojat sebagai kontrol positif yaitu 65,34  $\mu\text{g/mL}$ . Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) memiliki aktivitas yang kuat sebagai inhibitor tirosinase.

*kata kunci : Tirosinase, Daun Kelor,  $IC_{50}$*

## ABSTRACT

NAMA : ACHSANUL HUSNA  
NIM : 70100115066  
JURUSAN : FARMASI  
JUDUL : Test Tyrosinase Inhibitor Activity Of Ethanol Extract  
Moringa Leaves (*Moringa oleifera* Lam)

---

Moringa leaves are a part of the plant reported contain flavonoids compounds and phenolic substances that are potentially as antioxidants and tyrosinase enzyme inhibitors. The purpose of this research is to test the potential of moringa leaves ethanol extracts (*Moringa oleifera* Lam) as an inhibitor of a tyrosinase enzyme that can be used as the active ingredient of skin brightening. The method used in this research is an experimental laboratory with conducting activity test tyrosinase inhibitor of a moringa leaves ethanol extract (*Moringa oleifera* Lam) by specifying the Value of  $IC_{50}$  that can be Obtained from the sample concentration sequence of 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm and 100 ppm with the kojic acid as positive control. The results of this study showed that there is a tyrosinase inhibitor activity in the moringa leaves ethanol extract (*Moringa oleifera* Lam) can be seen from the value obtained from the result of consecutive concentration series is 30.31%, 35.63%, 44.46% , 46.80%, and 53.08%. Thus obtained the value of  $IC_{50}$  sample of 88.00  $\mu\text{g/ml}$  while the value of  $IC_{50}$  kojic acid as positive control is 65.34  $\mu\text{g/ml}$ . Based on the results of the research obtained can be said that the leaves moringa ethanol extract (*Moringa oleifera* Lam) has a strong activity as a tyrosinase inhibitor.

*Keywords: tyrosinase, leaves moringa,  $IC_{50}$*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Umumnya wanita-wanita pada benua asia lebih menyukai kulit yang berwarna putih dibandingkan dengan kulit berwarna coklat. hal ini mendasari terus berkembangnya produk pencerah kulit dalam pasar perawatan kulit (Sanjeewa et al. 2016).

Kosmetik saat ini sudah digunakan secara luas oleh masyarakat, khususnya kosmetik sebagai pencerah kulit yang biasanya mengandung obat pemutih. Penggelapan kulit terjadi karena adanya pembentukan pigmen melanin di kulit melalui oksidasi tirosin yang dibantu oleh enzim tirosinase membentuk L-DOPA yang kemudian pada tahapan akhirnya akan membentuk pigmen melanin (Chang. 2009). Pada umumnya jumlah melanin pada kulit inilah yang akan menentukan warna kulit kita (Su EG. 2003). Enzim tirosinase dapat digunakan untuk menghambat pembentukan melanin ini (Arbab. 2010).

Tirosinase atau yang juga dikenal dengan nama polifenol oksidase merupakan enzim yang tersebar luas pada hewan dan tumbuhan. Semua tirosinase memiliki persamaan yaitu mempunyai dua atom tembaga tipe III pada sisi aktifnya yang masing-masing diikat oleh 3 residu histidin (Lewis EA. 2004). Enzim tirosinase dapat mengkatalisis dua reaksi biosintesis melanin yaitu Ohidroksilasi dari asam amino L-tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (LDOPA), dan oksidasi subsekuen dari LDOPA menjadi dopakuinon. Senyawa dopakuinon mempunyai kereaktifan yang sangat tinggi sehingga dapat mengalami polimerisasi secara spontan membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin (Charissa. 2016).

Adapun kandungan senyawa pada tanaman yang dapat berpotensi sebagai inhibitor enzim tirosinase yaitu senyawa fenolik, flavonoid (Fatmawaty, 2010), asam askorbat, arbutin, kojic acid, merkuri dan hidrokuinon (Putri, 2010).

Adapun hasil penelitian yang menyatakan bahwa bahan alam yang kaya akan senyawa Flavonoid diantaranya adalah senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai inhibitor tirosinase (Kurniasari, 2018).

Indonesia sebagai Negara tropis mempunyai keragaman flora yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam dunia pengobatan, diantaranya adalah antioksidan. Salah satu jenis tumbuhan yang diduga sebagai antioksidan adalah kelor (*Moringa oleifera*, Lamk). Tanaman kelor telah dikenal selama berabad-abad sebagai tanaman multiguna padat nutrisi dan berkhasiat obat. Kelor dikenal sebagai The Miracle Tree atau pohon ajaib karena terbukti secara alamiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungannya di luar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya (Toripah, et al., 2014).

Dalam penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa daun kelor mengandung vitamin C tujuh kali lebih besar daripada jeruk, vitamin A sepuluh kali lebih besar daripada wortel, kalsium tujuh belas kali lebih besar dibanding susu, protein sembilan kali lebih besar daripada yoghurt, kalium lima belas kali lebih besar daripada pisang dan besi dua kali lebih besar daripada bayam. (Gopalakrishnan, 2016) Kandungan asam askorbat,  $\beta$ - karoten, asam tocopherol, flavonoid, fenolat, karotenoid, derivat asam hidroksinamit, dan flavonoid menyebabkan daun kelor dapat digunakan sebagai sumber bahan alami antioksidan (Krisnadi, 2013) sehingga tanaman kelor kemungkinan dapat memiliki efek sebagai inhibitor tirosinase.

Penelitian tentang berbagai khasiat kelor perlu dilakukan untuk menunjang penggunaan secara empiris dengan data-data ilmiah, sehingga penggunaannya dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) maka selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas penghambatan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) terhadap enzim tirosinase.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase ?
2. Berapa persen aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) ?
3. Berapakah nilai IC<sub>50</sub> inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) ?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan yang tidak terlarut.
- b. Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman obat.
- c. Melanin adalah pigmen yang diproduksi oleh sel yang dikenal sebagai melanosit pada kulit.
- d. Enzim tirosinase adalah enzim *multichopper monoxygenase* yang terdapat pada tanaman, jamur, serangga, dan mamalia termasuk manusia yang berperan penting dalam pigmentasi kulit.

- e. Inhibitor tirosinase adalah penghambatan enzim tirosinase yang berpengaruh pada pigmentasi kulit
- f.  $IC_{50}$  (*Inhibition Concentration 50*) merupakan angka yang menunjukkan konsentrasi suatu bahan yang mampu menghambat enzim tirosinase sebesar 50%.

## **2. Ruang Lingkup penelitian**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Fitokimia Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan laboratorium Biofarmaka Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin.

### **D. Kajian Pustaka**

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty et al tahun 2010 dengan judul “Efektivitas Beberapa Bahan Alam Sebagai Bahan Pemutih Kulit: Studi In Vitro Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase”, dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa tanaman obat yaitu rimpang lakka'-lakka (*Curculigo orchioides Gaerth*), daun singkong (*Manihot utilissima*) dan buah pare (*Momordica charantia*) sebagai inhibitor tirosinase. Ini adalah pemeriksaan awal untuk menemukan agen pemutih kulit dari produk alami. Sampel diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan metanol dan n-heksan sebagai pelarut, selain itu ekstrak metanol dipisahkan oleh partisi padat-cair menggunakan etil asetat. Semua ekstrak dievaluasi potensi penghambatan mereka terhadap aktivitas tirosinase dengan uji in vitro menggunakan L-tirosin sebagai substrat dan jamur tirosinase sebagai model enzim. Efek penghambatan diungkapkan oleh perubahan absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 490 nm. Data penelitian menunjukkan ekstrak metanol rimpang lakka'-lakka memiliki nilai  $IC_{50}$

paling rendah sebesar 10,78  $\mu\text{g/mL}$ , ekstrak metanol daun singkong sebesar  $\text{IC}_{50}$  28,05  $\mu\text{g/mL}$  dan ekstrak metanol buah pare sebesar  $\text{IC}_{50}$  16,45  $\mu\text{g/mL}$ . Dari data penelitian menunjukkan ekstrak metanol rimpang lakka'-lakka adalah yang paling efektif untuk menghambat aktivitas tirosinase dan berpotensi digunakan sebagai bahan pemutih kulit.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal Fatmawaty et al (2010) yaitu pada jenis sampel yang digunakan dimana peneliti menggunakan daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebagai sampel sedangkan peneliti dalam jurnal menggunakan beberapa bahan alam sebagai sampel. Perbedaan kedua yakni pada jurnal Fatmawaty et al (2010) menggunakan pelarut metanol dan n-heksan sebagai pelarut sedangkan pada penelitian ini menggunakan pelarut etanol 96%.

2. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aprilia Kurniasari dkk, dengan judul penelitian “potensi ekstrak biji coklat (*Theobroma cacao* Linn) sebagai inhibitor tirosinase untuk produk pencerah kulit” dimana pada penelitian tersebut dilakukan pengujian aktivitas penghambatan tirosinase pada ekstrak biji coklat. dimana pada pengujian penghambatan tirosinasenya menggunakan asam kojat sebagai control positifnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal Aprilia Kurniasari dkk (2018) yaitu pada jenis sampel yang digunakan dimana peneliti menggunakan ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebagai sampel sedangkan dalam jurnal menggunakan ekstrak etanol biji coklat (*Theobroma cacao* Linn).

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase.
- b. Untuk mengetahui persen aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam).
- c. Untuk mengetahui nilai  $IC_{50}$  inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam).

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi ilmiah, pengetahuan serta gambaran kepada penulis dan masyarakat luas terutama dalam penemuan senyawa metabolit sekunder dari bahan alam khususnya daun kelor (*Moringa oleifera* Lam).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tanaman kelor

##### 1. Klasifikasi tanaman kelor

Regnum	: Plantae
Subdivisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Famili	: Moringaceae
Genus	: Moringa
Spesies	: <i>Moringa oleifera</i> Lam (Ghasani, 2016)

##### 2. Deskripsi



Gambar 1. Tanaman Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Kelor memiliki batang berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar. Tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter dengan percabangan simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Daun kelor merupakan daun majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling, beranak daun gasal (imparipinnatus), helai daun saat muda berwarna hijau muda. Tanaman ini berbuah setelah berumur 12-18 bulan dengan bentuk buah panjang bersegi tiga, panjang 20-60 cm, buah muda berwarna hijau dan setelah tua menjadi berwarna coklat. Biji berbentuk bulat, berwarna coklat kehitaman. Akar tunggang, berwarna putih, membesar seperti lobak. (Kristina dan Syahid, 2014),

### **3. Nama Daerah**

Di Indonesia *Moringa oleifera* Lam dikenal dengan berbagai sebutan daerah, diantaranya kelor (Jawa, Sunda, Bali, Lampung), marunggai (Minangkabau), marongghi (Madura), murofng (Aceh), kewona (Nusa Tenggara), wori (Sulawesi), oewa herelo (Maluku), kelo (Bugis), kelo (Ternate), molting (Flores) (Depkes RI, 1980; Zuhud, 2013).

### **4. Kandungan Kimia Tanaman Kelor**

Kandungan kimia yang diperoleh dari daun kelor (*Moringa oleifera*, Lam) diantaranya adalah vitamin, karotenoid, polifenol, asam fenolat, flavonoid, alkaloid, glukosinolat, isotiosianat, tannin, saponin, dan oksalat (Leone et al, 2015). Sedangkan penapisan kimia yang dilakukan oleh Patel et al (2014) menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun kelor (*Moringa oleifera*, Lam) positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan tannin.

### **B. Kulit**

lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar disebut kulit. Kulit yaitu bagian tubuh yang

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperindah kecantikan, serta kulit dapat membantu menemukan penyakit yang diderita oleh pasien. Kulit disebut integument atau kutis yang tumbuh dari dua macam jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam), kulit mempunyai susunan saraf yang teranyam secara halus berguna untuk merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan merupakan indicator untuk memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan pada kulit. (Syaifuddin, 2009).

### **1. Fungsi Biologik Kulit**

Fungsi biologik kulit menurut Mitsui, T. (1997), ada 5 fungsi yaitu:

#### **a. Proteksi**

Serabut elastis yang terdapat pada dermis serta jaringan lemak subkutan berfungsi mencegah trauma mekanik langsung terhadap interior tubuh. Lapisan tanduk dan mantel lemak kulit menjaga kadar air tubuh dengan cara mencegah masuknya air dari luar tubuh dan mencegah penguapan air, selain itu juga berfungsi sebagai barrier terhadap racun dari luar. Mantel asam kulit dapat mencegah pertumbuhan bakteri di kulit.

#### **b. Termoregulasi**

Kulit mengatur temperatur tubuh melalui mekanisme dilatasi dan konstriksi pembuluh kapiler dan melalui perspirasi, yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Pusat pengatur temperatur tubuh di hipotalamus. Pada saat temperatur badan menurun terjadi vasokonstriksi, sedangkan pada saat temperatur badan meningkat terjadi vasodilatasi untuk meningkatkan pembuangan panas.

#### **c. Persepsi sensoris**

Kulit sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, suhu dan nyeri. Beberapa reseptor pada kulit untuk mendeteksi rangsangan dari

luar diantaranya adalah Benda Meissner, Diskus Merckell dan Korpuskulum Golgi sebagai reseptor raba, Korpuskulum Panici sebagai reseptor tekanan, Korpuskulum Ruffini dan Benda Krauss sebagai reseptor suhu dan Nervus End Plate sebagai reseptor nyeri.


#### d. Absorpsi

Beberapa bahan dapat diabsorpsi kulit masuk ke dalam tubuh melalui dua jalur yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjer sebacea dari folikel rambut. Bahan yang mudah larut dalam lemak lebih mudah diabsorpsi dibandingkan bahan yang larut air.

#### e. Fungsi Lain

Kulit dapat menggambarkan status emosional seseorang dengan memerah ataupun memucat. Kulit dapat juga mensintesa vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet.

## 2. Lapisan Kulit



Gambar 2. Struktur Kulit (Setiadi, 2007 : 24-25)

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni epidermis (non-viable dan viable epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga

lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat dan fungsinya (Isriany, 2013).

#### a. Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan bervariasi antara 50  $\mu\text{m}$  - 1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis terbentuk dari lima lapisan sel epitelial squamosa, diantaranya yang paling umum adalah keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan keratin, protein struktural dari kulit, rambut dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Isriani, 2013).

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. Lapisan epidermis tumbuh terus karena lapisan sel induk yang berada dilapisan bawah bermitosis terus-menerus, sedangkan lapisan paling luar epidermis akan mengelupas dan gugur. Epidermis dibina oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kalogen dan sedikit serat elastis (Harun, 2014).

Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan atau nutrisi tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Lapisan epidermis terdiri dari non-viable epidermis dan viable epidermis. Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya lebih dikenal dengan istilah 'strata'. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; non-viable epidermis yaitu stratum korneum dan viable epidermis yaitu stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal (germinativum). Kurang lebih setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel basal ke atas memulai semua lapisan-lapisan epidermis yang lain. Sambil bergerak

melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel mulai memipih, kehilangan inti, dan akhirnya kering (Isriani, 2013).

#### b. Dermis

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada dermis terdapat sel mast dan fibroblast. Sel mast memiliki situs reseptor untuk immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, kolagen, dan serat retikulum) (Isriani, 2013).

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang memberi sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, suatu protein amorf (Isriani, 2013).

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa (kelenjar) kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub kutis atau hipodermis) (Tranggono, 2007: 13)

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epideris lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebacea (Isriani, 2013).

### c. Endodermis (Hipodermis; Subkutan)

Hipodermis adalah lapisan bawah kulit (*fasia superficialis*) yang terdiri atas jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, elastic, dan sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adipose yang terdapat susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya, bila terdapat lobules lemak yang merata, hypodermis membentuk bantal lemak yang disebut *pannikulus adipose*. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skortum, lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hypodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit bawah dermis. Lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di bawahnya (syaifuddin, 2009).

### 3. Mekanisme Pigmentasi pada kulit

Sistem pigmentasi kulit melibatkan melanosit, melanosom, melanin, enzim tirosinase dan proses melanogenesis. Melanosom merupakan organel spesifik yang dibentuk oleh melanosit yang merupakan tempat pembentukan melanin sekaligus sebagai alat transport melanin dari melanosit menuju keratinosit. Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh melanosit dari polimerisasi dan oksidasi pada proses melanogenesis dan pembentukannya memerlukan adanya enzim tirosinase. Enzim tirosinase berfungsi dalam oksidasi pada proses melanogenesis, secara genetik enzim tirosinase berlokasi di dalam kromosom nomor 11 (Mamoto, 2009).

Pigmentasi kulit tergantung pada beberapa pengaruh termasuk faktor keturunan/genetik (warna kulit konstitutif), hormon dan lingkungan (warna kulit fakultatif). Faktor genetik mempengaruhi ukuran satuan melanin epidermis dan

melanosom serta produksi melanin. Faktor lingkungan seperti pajanan sinar matahari meningkatkan kegiatan enzim tirosinase sehingga meningkatkan produksi melanin dan penimbunannya di dalam keratinosit sehingga mencoklat (*tanning*). (Mamoto, 2009).

### C. *Melanin*

Melanin merupakan pigmen kulit manusia yang dibentuk oleh sel melanosit yang terletak di bagian epidermis. Melanosit merupakan perkembangan dari melanoblas yang berasal dari sel kristal neural. Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan basal (*stratum germinativum*). Melalui juluran lengan yang dinamakan dendrit, melanosit memberikan melanosom kepada sejumlah sel-sel keratinosit. Melanosom yang terdapat di dalam keratinosit berbentuk partikel-partikel padat atau gabungan dari 3-4 buah partikel lebih kecil yang mempunyai membran, dinamakan melanosom kompleks (Chang, 2009).

Terdapat dua tipe pigmen melanin utama, (Natalia F. E. Mamoto, 2009) :


#### 1) Eumelanin

Pigmen ini memberikan warna coklat atau coklat gelap dan hitam. Tidak larut dalam semua macam larutan, mempunyai berat molekul tinggi, mengandung nitrogen dan terjadi oleh karena proses oksidasi dan polimerisasi bentuk 5,6 dihidroksiindol dan 5,6 dihidroksiindol 2 asam karboksil.

#### 2) Feomelanin

Pigmen ini memberi warna cerah, yaitu kuning hingga coklat kemerahan. Larut terutama dalam alkali, mengandung nitrogen dan sulfur dan terjadi oleh karena proses polimerisasi sistenil dopa.

Melanin dibentuk melalui proses melanogenesis yang merupakan kombinasi reaksi katalitis enzimatis dan kimia. Dua jenis melanin yang disintesis di melanosom adalah eumelanin dan feomelanin. Eumelanin merupakan pigmen melanin hitam kecoklatan, dan feomelanin adalah pigmen melanin kuning kemerah-merahan. Menurut Ito dan Wakamtsu (2003) menyebutkan bahwa eumelanin merupakan pigmen melanin mayor yang menentukan warna kulit. Proses melanogenesis diawali dengan adanya katalisis L-tirosin menjadi DOPA oleh enzim tirosinase. Kemudian, terjadi proses oksidasi DOPA menjadi dopakuinon. Ketika terdapat sistein atau glution yang akan bereaksi dengan dopakuinon, akan terbentuk sisteinildopa dan turunan benzotiazin kemudian menjadi feomelanin. Selanjutnya, dalam proses pembentukan eumelanin, DOPA yang tidak bereaksi dengan sistein akan membentuk dopakrom, yang kemudian dopakrom mengalami tautomerisasi oleh enzim TYRP-2 (Tyrosinase related protein-2) menjadi asam 5,6-dihidroksiindol-2-karboksilat (DHICA), selanjutnya mengalami oksidasi dengan TYRP-1 menjadi asam indol-5-6-kuinon-karboksilat. Dopakrom mengalami pelepasan gugus asam karboksilat menjadi 5,6-dihidroksiindol (DHI). DHI dikatalisis oleh tirosinase membentuk indol-5,6-kuinon. Selanjutnya asam indol-5-6-kuinon-karboksilat dan indol-5,6-kuinon membentuk eumelanin (Ebanks et al., 2012). Agen pemutih kulit dengan mekanisme penghambatan tirosinase bekerja dengan cara menghambat terjadinya perubahan tirosin menjadi L- 3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA) menjadi dopakuinon, yang kemudian dikonversi melalui beberapa tahap transformasi menjadi melanin, sehingga melanin tidak akan terbentuk (Chang, 2009). Proses pembentukan melanin yang dihambat tersebut dapat menyebabkan kulit tampak menjadi lebih cerah.



Gambar 3. Fungsi enzim tirosinase dan proses melanogenesis (Likhitwitayawuid, 2008; 44).

a. Melanosit

Melanosit adalah sel khusus yang terdapat dalam stratum basal epidermis atau dalam dermis di bawahnya dan menjulurkan banyak cabang sel yang disebut dendrit di antara keratinosit sekitarnya. Melanosit merupakan sel yang dapat menyintesis enzim tirosinase, enzim tersebut jika bergabung dalam melanosom, dapat memulai sintesis dan deposit dari melanin. Oleh sebab itu melanosit adalah komponen penting dalam sistem pigmentasi kulit. Melanosit dapat memproduksi dan mendistribusikan melanin, karenanya berfungsi sebagai komponen penting terhadap sistem pigmentasi kulit. (Mamoto, 2009).

## b. Melanosom

Melanosom adalah organel spesifik yang dibentuk oleh melanosit yang merupakan tempat pembentukan melanin sekaligus sebagai alat transport melanin dari melanosit menuju keratinosit. Istilah melanosom digunakan untuk tahap akhir yang memberi DOPA positif.

Proses melanisasi dalam melanosom yaitu Tingkat I Merupakan pembentukan melanosom dari matriks protein. Pada tingkat ini melanosom berbentuk sferis atau lonjong. Berisi enzim tirosinase dan sedikit filamen, namun belum ada melanin. Tingkat II eumelanosom berbentuk lonjong dengan substruktur yang lamelar, feo-melanosom berbentuk bulat dengan substruktur yang tidak teratur. Melanosom berisi banyak filamen namun masih belum didapatkan melanin. Tingkat III, aktivitas enzim tirosinase meningkat, melanin telah terbentuk, dimana sebagian menutupi filamen sehingga gambarannya kabur. Tingkat IV melanosom berisi banyak melanin.

## D. *Enzim*

Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator, senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim katalisator berikatan dengan reaktan yang disebut substrat, mengubah reaktan menjadi produk dan melepaskan produk (Winarno, 1986).

Enzim sebagai suatu senyawa yang berstruktur protein baik murni maupun protein yang terikat pada gugus non protein, memiliki sifat yang sama dengan protein lain yaitu: (Poedjiadi, 1994).

- a. Dapat terdenaturasikan oleh panas,

- b. Terpresipitaskan atau terendapkan oleh senyawa-senyawa organik cair seperti etanol dan aseton juga oleh garam-garam organik berkonsentrasi tinggi seperti ammonium sulfat,
- c. Memiliki bobot molekul yang relatif besar sehingga tidak dapat melewati membran semi permeabel atau tidak dapat terdialisis.

Enzim adalah polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia. Enzim yang mengkatalisis perubahan satu atau lebih senyawa (substrat) menjadi satu atau lebih senyawa lain (produk) meningkatkan laju reaksinya setidaknya  $10^6$  kali dibandingkan jika tidak dikatalisis. Enzim tidak berubah secara permanen atau dikonsumsi sebagai konsekuensi dari keikutsertaannya dalam reaksi yang bersangkutan (Murray, Granner & Rodwell, 2006).

Fungsi suatu enzim ialah sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Suatu enzim dapat mempercepat reaksi  $10^8$  sampai  $10^{11}$  kali lebih cepat daripada apabila reaksi tersebut dilakukan tanpa katalis. Jadi enzim dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien, disamping itu mempunyai derajat kekhasan yang tinggi. Sama seperti katalis lainnya, enzim juga dapat menurunkan aktivitas suatu reaksi kimia. Reaksi kimia ada yang membutuhkan energi (reaksi endergonik) dan yang menghasilkan energi atau mengeluarkan energi (eksergonik) (Winarno, 1986).

Terdapat dua mekanisme yang dapat menjelaskan proses pengikatan substrak terhadap enzim, yaitu mekanisme Lock & key dan mekanisme Induced-fit. Mekanisme Lock & key dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1984 yang mana enzim dan substrat memiliki struktur geometric tertentu yang saling komplemen satu sama lainnya. model ini mampu menjelaskan sifat spesifik dari suatu enzim namun tidak dapat menjelaskan tingkat kestabilan yang mampu dicapai oleh kompleks teraktifkan enzim-sibstrat. Mekanisme induced-Fit

dikemukakan oleh Daniel Koshland pada tahun 1958 yang merupakan modifikasi dari mekanisme Lock & Key. dalam mekanisme ini ikut dipertimbangkan struktur enzim yang relative fleksibel dimana bagian sisi aktif enzim dapat terus mengalami perubahan ketika mulai terjadi interaksi. enzim akan menyesuaikan diri dengan geometri substrat sehingga pada akhirnya kedua geometri molekul yang terlibat saling komplemen (Hastri, 2012).

Mekanisme enzim dalam suatu reaksi ialah melalui pembentukan kompleks enzim-substrat (ES). Oleh karena itu hambatan atau inhibisi pada suatu reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis dapat terjadi apabila penggabungan substrat pada bagian aktif enzim mengalami hambatan. Molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi tersebut dinamakan inhibitor (Poedjiadi, 1994).

### 1. Reaksi Enzimatik


Reaksi umum dari enzim dan substrat dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam reaksi ini, jumlah S akan turun dan bersamaan dengan itu, jumlah P akan naik. Kecepatan perubahan ini dipengaruhi oleh jumlah E. Untuk mengukur laju reaksi ini, dapat dilakukan pengukuran konsentrasi S dalam dua waktu yang berbeda. Laju reaksi juga dapat diukur dengan mengukur kenaikan konsentrasi P, juga dalam dua waktu yang berbeda. Kecepatan perubahan konsentrasi substrat persatuan waktu adalah selisih konsentrasi substrat pada saat  $t = t_2$  dikurangi konsentrasi pada saat  $t = t_1$ , dibagi selisih waktu antara  $t_2$  dan  $t_1$  (McDonald, 1995).

Pada saat pertama reaksi, laju reaksi pembentuk ES dari E+S tepat sama dengan proses balik dari pembentukan ES dari E+P, oleh karena hanya ada satu konsentrasi ES. Begitu pula, laju reaksi penguraian kompleks ES ke arah kiri akan sama dengan ke arah kanan, oleh karena seluruh sistem berada dalam keadaan

seimbang. Akan tetapi, pada saat  $t$  yang sangat awal, nilai  $[P]$  sangat kecil dibandingkan dengan  $[S]$  dan dapat diabaikan. Ketika jumlah  $P$  sama dengan  $S$  maka reaksi berjalan pada titik stasioner yang tidak semakin cepat tapi kecepataannya konstan (McDonald, 1995).



Gambar 4. Reaksi oksidasi dengan katalis enzim tirosinase  
(Hashemi & Emami, 2015)

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Reaksi Enzimatik

Aktivitas atau kinerja enzim dipengaruhi oleh banyak faktor. Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu pH, temperatur, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan konsentrasi kofaktor (Bisswanger, 2002).

### a. pH

Enzim umumnya aktif pada rentang pH yang sempit. Karena enzim merupakan protein, perubahan pH dapat mempengaruhi gugus-gugus amino dan karboksilat dari protein enzim. Perubahan pH dapat mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk ionik dari sisi aktif enzim. Diluar pH optimumnya, enzim memperlihatkan aktivitas katalitik yang rendah atau kehilangan aktivitas katalitiknya (Bisswanger, 2002).

### b. Temperatur

Pada suatu reaksi enzimatik, temperatur mempengaruhi kestabilan enzim. Kenaikan temperatur sampai sedikit di atas temperatur optimumnya dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim, sedangkan pada temperatur jauh di atas

temperatur optimumnya enzim akan mengalami denaturasi hingga enzim kehilangan aktivitas katalitiknya. Enzim tirosinase stabil pada temperatur  $-20^{\circ}\text{C}$  (Bisswanger, 2002).

c. Konsentrasi Enzim

Pada konsentrasi substrat tetap, dalam batas tertentu, laju suatu reaksi enzimatik meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Hal ini berarti makin banyak enzim, sampai batas tertentu, makin banyak substrat yang terkonversi karena makin tinggi aktivitas enzim (Bisswanger, 2002).

d. Konsentrasi Substrat

Konsentrasi substrat dapat mempengaruhi laju produksi dan aktivitas katalitik enzim. Laju pembentukan produk meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat hingga dicapai laju reaksi maksimum untuk kemudian turun kembali mulai harga konsentrasi substrat tertentu (Bisswanger, 2002).

e. Konsentrasi Kofaktor

Jenis enzim yang memerlukan kofaktor berupa ion logam disebut metaloenzim. Di dalam beberapa metaloenzim, komponen logamnya itu sendiri ada yang telah memiliki aktivitas katalitik. Aktivitas enzim akan memperoleh peningkatan sangat besar setelah bergabung dengan kofaktor logamnya. Sebagai contoh, enzim amilase dan protease akan memiliki stabilitas dan kemampuan katalisis lebih tinggi apabila terdapat ion kalsium (Bisswanger, 2002).

### **1. Enzim tirosinase**

Enzim adalah polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia. Enzim yang mengkatalisis perubahan suatu senyawa (substrat) menjadi satu atau lebih senyawa lain (produk) meningkatkan laju reaksinya setidaknya  $10^6$  kali dibandingkan jika tidak dikatalisis. Enzim tidak berubah secara permanen atau

dikonsumsi sebagai konsekuensi dari keikutsertaannya dalam reaksi yang bersangkutan (Murray, Granner & Rodwell, 2006).

Tirosinase yang disebut juga polifenol oksidase merupakan enzim mono-oksigenase yang memiliki gugus ion logam ( $\text{Cu}^{2+}$ ). Tirosinase memiliki berat molekul sebesar 113.000 dalton (Warrington dan Saville, 1999). Enzim ini terdapat pada mikroorganisme, tanaman dan hewan. Pada jamur dan vertebrata, enzim tirosinase mengkatalisis laju pembentukan pigmen melanin yakni mengkatalisis tiga macam reaksi yaitu hidroksilasi L-tirosinase akan mengubah tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA) menjadi dopakuinon, yang kemudian dikonversi melalui tahap transformasi menjadi melanin (Chang, 2009).

Enzim dikelompokkan menjadi enam kelas, menurut International Union of Biochemists (IUB), yaitu :

1. Oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi yang terkait dalam transfer elektron.
2. Transferase, yaitu enzim yang mengkatalisis pemindahan atau transfer gugus fungsional yang bukan hidrogen antara suatu substrak dengan suatu senyawa penerima gugus.
3. Hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis, yaitu reaksi pemutusan ikatan kovalen dengan memecah satu molekul air dan memasukkan fragmen air ini kepada dua radikal pecahan substrak sehingga membentuk dua senyawa produk yang lebih kecil.
4. Liase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi yang mengeluarkan suatu gugus dari substrak dengan cara yang bukan hidrolisis dan menghasilkan ikatan rangkap.
5. Isomerase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pembentukan isomer, baik isomer optik, geometrik maupun isomer posisi.

6. Ligase, yaitu enzim yang kerjanya menghasilkan molekul yang lebih besar daripada molekul substrak awal. Enzim ini mengkatalisis reaksi sintesis yang pada reaksi terjadi pemecahan ATP atau senyawa sejenisnya.

Enzim tirosinase pada mamalia berperan dalam reaksi pigmentasi kulit atau perubahan warna kulit menjadi coklat, mata, dan rambut. Enzim tirosinase ini juga dapat menyebabkan reaksi pencoklatan pada produk pangan seperti pada buah-buahan dan sayuran yang mengakibatkan menurunnya harga jual dan nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut (Likhititwiyawuid, 2008). Reaksi pencoklatan pada produk pangan dipengaruhi oleh konsentrasi enzim tirosinase dan substrat, ketersediaan oksigen, pH dan suhu (Chang et al. 2007).

Mekanisme kerja enzim tirosinase untuk menghambat aktivitas enzim tirosinase adalah mereduksi bahan yang dapat menyebabkan oksidasi dopakuinon. Inhibitor tirosinase dapat bekerja secara kompetitif dan non-kompetitif dengan substrat tirosinase yaitu L-tirosin dan L-DOPA. Inhibitor tirosinase yang spesifik akan berikatan kovalen dengan enzim tirosinase sehingga menjadi tidak aktif selama reaksi katalik berlangsung (Chang, 2009).

Tirosinase yang disebut juga polifenol oksidase merupakan enzim mono-oksigenase yang memiliki gugus ion logam tembaga ( $\text{Cu}^{2+}$ ). Tirosinase memiliki berat molekul sebesar 113.000 dalton (Warrington dan Saville, 1999). Enzim ini terdapat pada mikroorganisme, tanaman dan hewan. Pada jamur dan vertebrata, enzim tirosinase mengkatalisis laju pembentukan pigmen melanin yakni mengkatalisis tiga macam reaksi yaitu hidrosilasi L-tirosinase akan mengubah tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA) menjadi dopakuinon, yang kemudian dikonversi melalui beberapa tahap transformasi menjadi melanin (Chang, 2009). Proses oksidasi oleh tirosinase juga terjadi pada tanaman yang

menyebabkan terjadinya pencoklatan ketika jaringan tanaman mengalami luka. Tirosinase yang diekstraksi dari jamur *Agaricus bisporus* adalah homolog dengan tirosinase mamalia. Saat ini tirosinase dari jamur tersebut sangat sesuai untuk uji melanogenesis (Chang, 2012).

## **2. Penghambat tirosinase**

Senyawa yang dapat menghambat proses pembentukan melanin disebut inhibitor tirosinase. Inhibitor tirosinase juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit hiperpigmentasi dan melanogenesis pada kulit (Batubara et al. 2010). Inhibitor tirosinase pada saat ini banyak digunakan dalam produk kosmetik dan farmasi sebagai penghambat produksi melanin berlebih pada lapisan epidermis dan membuat kulit tampak lebih putih (Arung et al. 2006).

Penghambatan tirosinase disebut juga penghambatan melanogenesis, yakni senyawa yang dapat mengganggu pembentukan melanin, baik secara langsung menghambat atau hanya berinteraksi dengan enzim (Chang, 2009). Chang (2012) menyebutkan bahwa penghambatan aktivitas tirosinase merupakan mekanisme depigmentasi yang paling sering digunakan. Karena penghambatan bersifat spesifik dengan target melanogenesis di sel tanpa menimbulkan efek samping. Menurut Chang (2009), agen penghambatan tirosinase dapat dikelompokkan menjadi lima golongan yaitu senyawa polifenol, turunan benzaldehid dan benzoat, steroid dan lipid rantai panjang, agen penghambatan alami atau sintetik, dan agen inaktivator ireversibel. Polifenol merupakan senyawa yang termasuk kelompok terbesar sebagai penghambatan tirosinase. Flavonoid termasuk senyawa polifenol yang paling banyak tersebar di daun, biji, kayu, dan bunga pada tanaman. Flavonoid dapat dibagi ke dalam tujuh kelompok yaitu flavon, flavonol, flavanon, flavanol, isoflavon, kalkon dan katekin (Harborne, 2000). Senyawa flavonoid, termasuk isoflavon di dalamnya, memiliki mekanisme dalam menghambat dan

mengkelat logam tembaga (Cu) enzim tirosinase akibat adanya gugus hidroksil pada cincin A dan B senyawa flavonoid (gugus OH pada C6 – C8 dan C2' – C4') (Chang, 2009). Posisi gugus hidroksil dan jumlah gugus memiliki peranan penting dalam menghambat aktivitas enzim tirosinase. Semakin banyak jumlah gugus OH pada cincin benzen, maka semakin berfungsi dalam menghambat aktivitas enzim tirosinase, sedangkan adanya konjugat gula pada cincin benzena dapat menurunkan aktivitas penghambatan (Kim et al., 2006).

Sebenarnya, inhibitor tirosinase spesifik harus dikatalisis oleh tirosinase dan membentuk ikatan kovalen dengan enzim, sehingga tidak dapat diubah lagi enzim selama reaksi katalitik. Juga, beberapa bahan kimia senyawa yang secara reversibel berikatan dengan tirosinase dan mengurangi katalitiknya kapasitas, dan mereka juga bisa diakui sebagai specific tyrosinase inhibitor. Secara umum, beberapa inhibitor tirosinase hanya menunjukkan efek lemah penghambatan karena sifat reaktif dan habis pakai mereka terhadap tirosinase atau produk kuinon. Inhibitor tirosinase dapat digolongkan menjadi empat jenis, termasuk inhibitor kompetitif, inhibitor tidak kompetitif, tipe campuran (kompetitif / tidak kompetitif) inhibitor, dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menggabungkan dengan tirosinase gratis yang mencegah pengikatan substrat. Sebuah inhibitor kompetitif mungkin merupakan chelator ion tembaga, tirosinase analog substrat, atau turunan dari L-tirosin atau L-DOPA (Chang, 2012).

Penelitian tentang senyawa bahan alam yang memiliki aktivitas penghambatan tirosinase telah banyak dilaporkan, di antaranya adalah ekstrak metanol *Instia palembanica* memiliki IC<sub>50</sub> penghambatan tirosinase sebesar 10,4 µg/ml (Batubara et al., 2010); senyawa Artoindosianin F yang berasal dari *Artocarpus heterophyllus* menunjukkan aktivitas penghambatan tirosinase dengan IC<sub>50</sub> 1,75 µg/ml (Rao et al., 2010); senyawa Glabren dan

Isoliquiritigenin yang diisolasi dari akar *Glycyrrhiza glabra* memiliki aktivitas penghambatan tirosinase dengan IC<sub>50</sub> sebesar 3,5 dan 8,1  $\mu\text{M}$  (Nerya et al., 2003). Fraksi n-heksana dari tanaman kayu bawang (*Protium javanicum*) mampu menghambat kerja reaksi difenolase pada enzim tirosinase dengan IC<sub>50</sub> sebesar 114,2  $\mu\text{g/ml}$  dan fraksi etil asetat asetat mampu menghambat reaksi monofenolase enzim tirosinase dengan IC<sub>50</sub> 834  $\mu\text{g/ml}$  (Irmanida et al., 2013). Chang et al. (2005) telah mengisolasi senyawa yang memiliki aktivitas penghambatan tirosinase dari kedelai koji yang difermentasi dengan *Aspergillus oryzae* BCRC 32288. Urutan aktivitas penghambatan tirosinase dari yang besar hingga rendah adalah senyawa 6,7,4'-trihidroksiisoflavon, daidzein, genistein dan glisitein. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya gugus hidroksil pada posisi C6 dan C7 di struktur isoflavon memberikan pengaruh besar pada aktivitas penghambatan tirosinase.


Bahan-bahan penghambat enzim tirosinase menurut Baumann dan Alleman (2009) antara lain:

- a. Hidrokuinon (HQ), merupakan Gold Standar untuk terapi hiperpigmentasi. Konsentrasi mulai dari 2% hingga 10% telah banyak digunakan untuk melasma dan PIH. Mekanisme kerja HQ selain menghambat kerja enzim tirosinase, merusak sel melanosit langsung, mempercepat degradasi melanosome juga menghambat sintesis enzim melanogenesis (Bruce, 2013). Efek yang dihasilkan agen ini dapat menurunkan lesi hiperpigmentasi hingga 90%. Hidrokuinon pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yaitu menimbulkan iritasi, rebound phenomenon dan okronosis (Baumann dan Alleman, 2009).
- b. Aloesin, senyawa kimia C-glycosylated chromone ini berasal dari tanaman aloe vera. Senyawa ini akan menghambat enzim tirosinase dengan dua cara,

yaitu menghambat hidroksilasi tirosin menjadi DOPA dan oksidasi DOPA menjadi DOPAquinon. Aloesin memiliki efek inhibisi lebih kuat dibanding arbutin dan asam kojik.

- c. Arbutin, senyawa kimia  $\beta$ -D-glucopyranoside merupakan sebuah molekul hidrokuinon yang berikatan dengan glukosa. Arbutin berasal dari berbagai tanaman seperti pohon pir, gandum dan bearberry. Mekanisme kerjanya lebih kepada penghambat reversible aktivitas enzim tirosinase didalam melanosit daripada penurun sintesis enzim tirosinase itu sendiri.
- d. Asam kojat, merupakan metabolit jamur seperti Aspergillus, Acetobacter dan Penicillium. Mekanisme kerjanya adalah dengan mengikat copper sehingga aktivitas enzim tirosinase terhambat. Keuntungan lain adalah asam kojat memiliki efek pengawet dan antibiotik sehingga bahan ini lebih stabil sebagai produk kosmetik.
- e. Flavonoid, merupakan turunan benzopyrane yang memiliki cincin fenol dan cincin pyrane, lebih dari 4000 flavonoid telah diidentifikasi dari berbagai tanaman. Pada lapisan epidermis, lipid peroksidasesinar UVB dapat menghasilkan ROS terutama dari proses membrane keratinosit dan melanosit. Flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas ini, sehingga proses melanogenesis yang dipicu oleh adanya ROS dapat dihambat dan dinetralisir.
- f. Hidrokumarin, merupakan senyawa kumarin yang bekerja langsung pada enzim tirosinase sehingga menghambat melanogenesis dan juga menghambat sintesis glutathion. Kombinasi antara senyawa ini dengan vitamin E dapat mencegah hiperpigmentasi dengan bekerja sebagai penetralisir radikal bebas.

### E. Asam Kojat




Gambar 5. Rumus Struktur Asam Kojat

Asam kojat (*Kojic acid*) adalah inhibitor tirosinase berasal dari berbagai spesies jamur tersebut dalam pengolahan makanan untuk mencegah browning dan untuk mempromosikan kemerahan strawberry mentah. *Kojic Acid* ini telah digunakan dalam industri makanan untuk mencegah pencoklatan makanan dan memerah tomat mentah (Sholikah, 2017: 28)

Bahan asam kojat telah dilaporkan memiliki potensi kepekaan yang tinggi dan dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan. Namun, hal ini berguna pada pasien yang tidak dapat mentoleransi *hydroquinone* dan studi menunjukkan dapat dikombinasikan dengan kortikosteroid topikal untuk mengurangi iritasi. Produk pencerah kulit yang mengandung asam kojat biasanya digunakan dua kali per hari selama 1 atau 2 bulan atau sampai efek yang diinginkan tercapai (Sholikah, 2017: 28).

### F. Fenol



Gambar 6. Gugus Fungsi Fenol

Pada umumnya semua tumbuhan memiliki senyawa fenol yang merupakan golongan metabolit sekunder. Istilah senyawa fenol digunakan untuk senyawa aromatik. Senyawa fenol yang memiliki gugus hidroksil lebih dari dua disebut dengan polifenol, sebagai contoh kelompok tanin, flavonoid, melanin, lignin. (Endang, 2014; 65).

#### 1. Senyawa fenol

Senyawa fenol murni dapat menimbulkan rasa panas seperti terbakar jika bersentuhan dengan kulit. Hidroksunion merupakan salah satu senyawa fenol yang penyebarannya dalam tumbuhan cukup luas. Fenol sederhana yang lain seperti orsinol, katekol, pirogalol, floriglusinol, keberadaannya lebih terbatas. Fenol bebas reaktif jarang terdapat dalam tumbuhan, umumnya senyawa fenol berikatan dengan gula membentuk glikosida yang lebih mudah larut dalam air. Senyawa fenol dengan protein membentuk glikosida yang lebih mudah larut dalam air.

Senyawa fenol dengan protein membentuk kompleks (melalui ikatan hidrogen) yang dapat mengakibatkan kerja enzim terhambat. Sering kali proses ekstraksi tidak berhasil dilakukan untuk memperoleh senyawa fenol karena kepekaannya terhadap enzim oksidase, seperti fenolase. Oleh pengaruh cahaya dan udara warna senyawa fenol secara perlahan menjadi gelap. Senyawa fenol yang sudah diketahui adalah sebagai pembangun dinding sel, pigmen bunga dan enzim. Contoh enzim yang termasuk dalam senyawa fenol antara lain asam indol-3-asetat oksidase, glukosa-6- fosfat dehidrogenase, dan beberapa enzim peroksidase. Beberapa senyawa fenol bersifat toksik terhadap beberapa serangga/hama, seperti yang terdapat dalam suku Anacardiaceae karena senyawa *o*-difenol dengan rantai samping panjang tidak jenuh. Sering kali senyawa fenol juga mengandung gugus karboksilat sehingga disebut asam fenolat. Beberapa contoh asam fenolat adalah asam salisilat, siringat, *p*-hidroksibenzoat, vanilat, pterokatekuat (Endang, 2014; 66).

## 2. Persebaran

Senyawa fenol tersebar luas pada dunia tumbuhan, terutama dalam tumbuhan yang memiliki senyawa aromatik. Strukturnya dimulai dari yang sederhana dengan satu cincin aromatik hingga kompleks merupakan polimer, sebagai contoh tanin dan lignin. Beberapa asam fenolat umumnya tersebar luas dalam tumbuhan angiospermae, sebagai contoh asam *p*-hidroksibenzoat, protokatekuat, vanilat dan siringat. Persebaran asam salisilat lebih terbatas yaitu pada suku Ericaceae. Sering kali senyawa fenol diperoleh sebagai hasil degradasi/penguraian, contohnya melanin (suatu polimer fenol alam) pada degradasi bisa menghasilkan katekol. Senyawa fenol sederhana juga dapat terjadi karena adanya degradasi flavonoid dan fenol kompleks. Beberapa senyawa fenol juga merupakan komponen minyak atsiri, contohnya timol dan kreskol dalam minyak atsiri *Thymus vulgaris*, katekol (*o*-dihidroksibenzena), dalam bentuk bebas terdapat dalam biji kola dan asam salisilat dalam daun *Gaultheria* spp (Endang, 2014; 66).

## 3. Biosintesis

Senyawa *L*-fenilalanin dan *L*-tirosin merupakan suatu prekursor untuk banyak senyawa yang terdapat dalam bahan alam. Dalam tumbuhan sering kali tahap pertama adalah terjadinya eliminasi amonia pada rantai samping sehingga terbentuk asam sinamat, sedangkan dari *L*-tirosin terbentuk asam *p*-kumarat. Asam sinamat terbentuk sebagai akibat aktivitas enzim *phenylalanine ammonia lyase* (Pal). Pembentukan asam kumarat dengan proses transformasi dari *L*-tirosin merupakan proses yang terbatas, terutama pada suku Graminae. Adanya enzim *tyrosine ammonia lyase* (TAL) dalam suku Gramine masih menjadi perdebatan.

Ada pendapat bahwa asam kumarat terbentuk dari hidrosilasi asam sinamat dalam reaksi sitokrom P-450, dan sebageian *L*-tirosin membentuk senyawa alkaloid. Selanjutnya dari asam kumarat terjadi asam kafaet, ferulat, dan sinapat. Asam-asam tersebut terdapat dalam bentuk bebas atau teresterifikasi dengan asam kuintat sebagai asam klorogenat,

dengan glukosa sebagai sinamoil-glukosa, dan dengan kolin membentuk sinapin (Endang, 2014; 67).

### **G. Microplate Reader**

Microplate reader atau plate reader merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi sampel kimia, fisika, atau biologis dalam ukuran mikro. Alat ini umumnya digunakan dalam penelitian obat, validasi, dan banyak lagi yang umumnya digunakan dalam bidang farmasi, bioteknologi, dan akademik. Format microplate yang umum digunakan yaitu dengan 96 sumur yang terdiri dari 12 kolom dan 8 baris (Ganske, 2010).

Pengukuran absorbansi dapat dilakukan dengan microplate reader. Pembacaan absorbansi suatu sampel dimanfaatkan untuk uji ELISA, kauntifikasi protein dan asam nukleat, serta uji terhadap aktivitas enzim. Prinsip kerja microplate reader tidak berbeda jauh dengan spektrofotometri. Sumber cahaya menyinari sampel yang akan diukur dengan panjang gelombang tertentu (diatur dengan filter cahaya atau sebuah monokromtor) dan kemudian detektor menghitung banyaknya cahaya awal yang ditransmisikan oleh sampel. Banyaknya cahaya yang ditransmisikan berhubungan dengan konsentrasi molekul yang akan dicari (Ganske, 2010).

### **H. Ekstraksi**

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 2000).

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang

telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (POM, 1979).

Ekstraksi (penyarian) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disari, mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain (Harborne, J.B., 1987: 7).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Ditjen POM, 1979:9).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Ditjen POM, 2000).

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan

terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker SD, dkk., 2006):

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi:

a. Cara Dingin

1) Maserasi

Maserasi berasal dari kata “*macerare*” artinya melunakkan. Maserasi merupakan proses penyarian yang sederhana dan banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel sehingga zat-zatnya akan terlarut, serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan pada wadah bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian diaduk berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia (Ansel, 1989). Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi (Syamsuni, 2006). Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 2000). Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Keuntungan dari metode maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana (Agoes, 2007).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna (*Exhaustiva extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses terdiri dari

tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Ditjen POM, 2000).

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Agoes, 2007).

#### b. Cara Panas

##### 1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000).

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

##### 2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Ditjen POM,

2000). Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun, 2014).

Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Seidel, 2006).

### 3) Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

### 4) Dekoksi

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infusdasi, hanya saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama ( $\geq 30$  menit) dan suhu pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan rasio 1:10, panaskan dalam panci enamel atau panci stainless steel selama 30 menit. Bahan sesekali diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume yang diinginkan (Atun, 2014).

### 5) Infusdasi

Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Atun, 2014).

### I. *Tinjauan Islam*

Flora atau segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau di suatu masa, yang mana merupakan sebutan untuk seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Sebagai padanan dari kata flora, dalam al-Qur'an digunakan kata "*nabaats*" dan "*haarts*" yang berarti tumbuhan dan tanaman. Saat ini berbagai macam nama tumbuhan yang kita ketahui, nama tumbuh-tumbuhan tersebut sebenarnya telah Allah subhānahu wata'āla. ajarkan kepada manusia, dan manusia pertama yang diajarkan oleh Allah subhānahu wata'āla, tentang nama-nama tumbuhan adalah Nabiullah Adam as.

Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional.

Dengan demikian pula Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am/ 6: 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ  
 وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي  
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Depertemen Agama RI, 2010: 140).

Ayat ini merupakan bukti kemahakusaan Allah subhānahu wata'āla Ayat ini mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah subhānahu wata'āla. Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan.

Pada ayat ini mengurai kumpulan hal-hal yang disebut sebelumnya, bermula dengan menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah subhānahu wata'āla, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuh-

*tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih. (Shihab, 2002: 573-574).*

Komentar beliau tentang ayat ini, kitab al-Muntakhab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan, pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah (Shihab, 2002, 3: 574).

Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya (Shihab, 2002, 3: 574-575).

Bagian akhir ayat ini disebutkan: perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botani) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2002, 3: 575).

Kitab Tafsir Ibnu Katsir di dalamnya, dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tuntunan Allah subhānahu wata'āla untuk mencapai kesadaran tauhid

dan iman. Allah subhānahu wata'āla menyatakan: Dialah (Allah subhānahu wata'āla) yang menurunkan hujan, dan Dia pula yang mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dia pula yang mewarnainya hijau dan lain-lainnya, lalu Dia pula yang menyusun butir-butir buahnya yang tersusun rapi. Juga Dia pula yang mengeluarkan mayang pohon kurma sehingga tersusun buahnya yang mudah dipetik, Dia pula yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan dalam kebun anggur, zaitun dan delima dan lain-lainnya baik yang serupa bentuk, warna atau cita rasanya atau yang jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, warnanya, bentuknya atau rasanya. Kemudian Allah subhānahu wata'āla menyuruh untuk mengamati buah sejak ia mulai berbuah hingga saat masak dan diketamnya untuk dirasakan nikmat, rahmat dan hikmat Tuhan yang menjadikan semua itu untuk kepentingan manusia (Katsir, 2004, 3: 305).

Tafsiran-tafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata'āla. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah subhānahu wata'āla tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan meneliti manfaat tumbuh-tumbuhan dalam meningkatkan kesehatan manusia, sehingga hal itu menimbulkan rasa syukur dan semakin yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata'āla.

Selain itu, Allah subhānahu wata'āla juga berfirman dalam QS Asy-Syu'arā'/26: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”.

Berdasarkan kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih (Shihab, 2002, 9: 256).

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Hal ini banyak dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wasallam* yang memerintahkan untuk berobat (Shihab, 2002, 9: 259).

Berdasarkan kitab Tafsir Ibnu Katsir, menceritakan dialog antara Ibrahim dan ayahnya. Ibrahim berkata: “Aku menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan yang menunjukkan jalan bagiku, yang memberi makan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan penyakitku dan juga mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali di hari kiamat dan Tuhan yang aku harapkan dengan sangat mengampuni kesalahan-kesalahanmu kelak di hari kiamat (Katsir, 2006, 6: 59).

Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah subhānahu wata'āla. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika kita diserang oleh suatu penyakit, maka dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Allah subhānahu wata'āla. menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia karena banyak tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman termasuk daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan Islam.

Berobat merupakan perkara yang disyariatkan selama tidak menggunakan sesuatu yang haram. Allah swt tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (Al Abi Alabas, 2007).

Terkait dengan hadist diatas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut:

Dari Jabir bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.* bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

"Setiap penyakit ada obatnya, Apabila didapat obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wa jalla" (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah subhānahu wata'āla ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan

seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah subhānahu wata'āla yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah subhānahu wata'āla menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Bersumber dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Allah subhānahu wata'āla telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah subhānahu wata'āla yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi secara mendetail, sehingga dengan ayat dan hadist ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatu apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen laboratorium berdasarkan pada model penelitian true eksperimental.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Biomolekuler dan Seluler Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif berupa analisis data berupa angka atau bilangan.

#### **C. *Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah Tanaman kelor (*Moringa oleifera* Lam) yang diperoleh dari daerah Sudiang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **2. Sampel**

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu daun kelor (*Moringa oleifera* Lam).

#### **D. *Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data***

##### **1. Alat-alat yang digunakan**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alat-Alat Gelas, Bejana maserasi, Cawan porselin, Deksikator, Oven, Ph Meter, Rotary evaporator, Tabung ependorf, Timbangan Analitik, Mikro Plate Reader 96 Well, Mikro Pipet.

## 2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah air suling (sentana), aluminium foil, asam kojat (sentana), asam asetat anhidrat ( $AC_2O$ ), asam klorida (HCL) 2 N, asam sulfat pekat ( $H_2SO_4$ ), besi (III) klorida ( $FeCl_3$ ), dimetilsulfoksida (DMSO) (sentana), ekstrak etanol daun kelor, eter, enzim tirosinase 25 KU mushroom (sigma®), etanol 96% (CV.Intraco), heksan (CV.Intraco), kalium hidroksida (KOH) (CV.Intraco), kalium dihidrogen pospat ( $KH_2PO_4$ ) (CV.Intraco), kertas perkamen, kertas saring (CV.Intraco), L-tirosin (sigma®), natrium klorida (NaCl), magnesium (CV.Intraco), pereaksi dragendorf, mayer, wagner, tisu, dan simplisia daun kelor.

### E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### 1. Penyiapan Sampel (Ekstrak Daun kelor)

##### a. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun kelor (*Moringa oleifera* Lam). Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Daun yang digunakan adalah daun yang bagus, tidak rusak dan tidak berjamur.

##### b. Pengolahan Sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada daun kemudian dikeringkan dengan menggunakan lemari pengering. Setelah itu dilakukan perajangan hingga diperoleh simplisia daun tomat.

##### c. Ekstraksi Sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Metode ini digunakan untuk menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (tidak tahan terhadap pemanasan). Pada penelitian ini menggunakan

sampel daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) mengandung senyawa flavonoid dimana senyawa ini memiliki sifat termolabil (tidak tahan pemasakan). Maka dari itu dalam penelitian ini digunakan metode ekstraksi dengan cara maserasi. Sampel daun kelor yang telah kering ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan pelarut etanol hingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotary evaporator* sampai diperoleh ekstrak etanol kental.

## 2. Uji Kadar Air Simplisia

Cawan penguap dikeringkan pada suhu 105° selama 30 menit kemudian capor didinginkan dalam eksikator ± 15 menit lalu ditimbang. Sebanyak 3 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan penguap didinginkan di eksikator lalu ditimbang. Prosedur ini dilakukan berulang hingga diperoleh bobot tetap. Kadar air sampel ditentukan dengan persamaan.

$$\% \text{ Kadar Air} = \frac{x_1 - y}{X} \times 100\%$$

Dengan : X = Bobot sampel awal (g)

$x_1$  = Bobot cawan + sampel (sebelum pemanasan) (g)

y = Bobot cawan + sampel (setelah pemanasan) (g)

## 3. Identifikasi Komponen Kimia

### a. Alkaloid

Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) 0,5g dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 ml HCl 2N kemudian dipanaskan selama 2-3 menit, didinginkan dan ditambahkan NaCl untuk mendapatkan protein-proteinnnya kemudian disaring. Ditambahkan 2 ml HCl 2N ke dalam filtrat. Dibagi

menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi (I) ditambahkan dragendorff menghasilkan endapan merah jingga, tabung reaksi (II) ditambahkan mayer menghasilkan endapan putih kekuningan, dan tabung reaksi (III) ditambahkan wagner menghasilkan endapan coklat.

b. Flavonoid

Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) 0,5g ditambahkan aquades dan ditambahkan heksan dan dikocok. Kemudian akan terpisah menjadi 2 lapisan dimana ekstrak etanol dalam air akan berada dibawah dan lapisan heksan akan berada di atas. Lapisan heksan dipisahkan sementara lapisan air ditambahkan etanol kemudian dipisahkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama ditambahkan 0,5 ml HCl pekat, kemudian dipanaskan di atas penangas selama 15 menit. Positif bila berwarna merah terang atau violet. Bagian kedua ditambahkan 0,5 ml HCl pekat kemudian ditambahkan 3 - 4 potong magnesium, amati perubahan warna yang terjadi pada tiap lapisan. Jika warna merah berarti positif mengandung flavonoid. Merah pucat-merah tua mengandung flavon.

c. Glikosida

Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) 0,2 g diuapkan di atas penangas air, lalu ditambahkan 3 ml asam asetat dengan sedemikian pemanasan, kemudian didinginkan. Selanjutnya, larutan ini ditambah larutan besi (III) klorida 0,3M, lalu dengan hati-hati ditambahkan campuran 3 ml asam sulfat dan 1 tetes besi (III) klorida 0,3M sehingga akan terbentuk cincin warna merah coklat pada batas cairan. Setelah beberapa menit di atas cincin akan berwarna biru hijau, ini menunjukkan adanya glikosida dan glikon gula 2-deoksi (Hanani, 2015).

d. Saponin

Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebanyak 0,5 g ditambahkan 10 ml air panas kemudian didinginkan, selama 10 detik larutan

dikocok dengan kuat kemudian dидiamkan selama 10 detik. Terbentuk buih setinggi 1-10 cm dan buih tidak hilang bahkan setelah penambahan 1 tetes HCl 2N jika ekstrak positif mengandung saponin (Ditjen POM, 1995).

e. Terpenoid

Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebanyak 0,5 g ditambah 5 ml larutan eter kemudian diuapkan. Selanjutnya ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat ke dalam residu, asam sulfat pekat 1 tetes. Ketika filtrate menghasilkan warna merah-hijau atau violet-biru maka ekstrak positif mengandung terpen (Hanani, 2015).

f. Fenol

Ekstrak sampel sebanyak 0,2 gram ditambahkan dengan larutan FeCl<sub>3</sub> 1%. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, merah, ungu, biru tua, biru, biru kehitaman, atau hijau kehitaman (Harborne, 1987).

#### **4. Uji Penghambatan Enzim Tirosinase**

##### **a) Pembuatan larutan Dapar Fosfat.**

Ditimbang sebanyak 2,7 g KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> dan dilarutkan dalam air suling, sedikit demi sedikit hingga mencukupi volume 400 mL. Kemudian pH larutan diukur dengan menggunakan pH meter. Ditimbang 5,6 g KOH dan larutkan dalam 100 mL air suling. Larutan KOH ditambahkan kedalam larutan KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> hingga mencapai pH 6,8. Larutan dapar fosfat disimpan pada lemari pendingin.

##### **b) Pembuatan larutan L- Tirosin**

Sebanyak 18,2 mg L-Tirosin dimasukkan kedalam labu tentukur 100 mL, ditambahkan dapar fosfat sedikit demi sedikit, dan dihomogenkan. Volumennya dicukupkan hingga 100 mL dengan larutan dapar fosfat.

##### **c) Pembuatan larutan Enzim Tirosinase**

Sebanyak 1 mg enzim tirosinase dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dilarutkan dalam 10 mL larutan dapar fosfat yang telah didinginkan. Larutan enzim tirosinase diletakkan pada wadah yang berisi es agar suhu enzim tetap stabil pada suhu dingin saat pengerjaan.

**d) Pembuatan larutan uji ekstrak etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)**

Ekstrak daun kelor ditimbang sebanyak 5 mg kemudian dilarutkan dengan bantuan DMSO sebanyak 50 µl, dihomogenkan lalu ditambahkan dengan dapar fosfat sampai 1000 µl sehingga diperoleh larutan stok 1000 ppm. Larutan stok kemudian diencerkan sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan, sehingga diperoleh larutan ekstrak dengan konsentrasi masing-masing 100 ppm, 80 ppm, 60 ppm, 40 ppm, dan 20 ppm.

**e) Pembuatan larutan kontrol positif asam kojat**

Sebanyak 5 mg asam kojat dimasukkan kedalam tabung ependorf dan dilarutkan dalam 5 ml dari 50 mM larutan dapar fosfat (pH, 6,5). Kemudian larutan asam kojat diencerkan hingga diperoleh larutan asam kojat dengan konsentrasi yang sama dengan larutan uji.

**f) Penentuan Inhibitor tirosinase**

Uji penghambatan aktivitas enzim tirosinase berdasarkan metode Miyazawa dan Tamura (2006) dengan modifikasi tertentu. Sebanyak 50 µl L-Tirosin 1 mM, 50 µl larutan dapar fosfat 50 mM (pH 6,8), 20 µl larutan enzim tirosinase dan 100 µl larutan sampel dimasukkan ke dalam sumuran pada *microplate*. Campuran tersebut diinkubasi selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian diukur serapannya menggunakan *microplate reader* (ELISA) pada panjang gelombang 490 nm. Dilakukan pengujian blanko tanpa penambahan enzim yaitu digunakan Sebanyak 170 µl larutan dapar fosfat (pH 6,8), 50 µl L-Tirosin 1 mM. Kontrol negatif menggunakan campuran tersebut diatas tanpa

penambahan sampel dan untuk kontrol positif menggunakan asam kojat sebagai pengganti sampel. Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan secara triplo.

Penentuan persentase penghambatan aktivitas tirosinase berdasarkan rumus :

$$\% \text{ penghambatan Tirosinase} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor.

B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor.



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Hasil Ekstraksi Daun Kelor**

Penelitian yang dilakukan menggunakan 900 gram daun kelor, yang selanjutnya dikeringkan, diperoleh simplisia daun kelor 400 gram. Sebanyak 250 gram simplisia daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan larutan penyari etanol 96% sebanyak 3 Liter, diperoleh ekstrak kental sebanyak 1, gram.

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) dengan Metode Maserasi

<b>Berat Sampel</b>	<b>Berat Simplisia yang diekstraksi</b>	<b>Jenis Ekstrak</b>	<b>Berat Ekstrak</b>	<b>Persen (%) Rendemen</b>
900 gram daun kelor	250 gram	Ekstrak Kental	2.1982 gram	0,84 %

**2. Hasil Uji Kadar Air Simplisia**

Simplisia daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) di uji kadar air untuk mengetahui besarnya kandungan air didalam bahan dimana nilai maksimal atau rentang yang diperoleh terkait dengan kemurnian dan kontaminasi.

Tabel 2. Hasil Uji Kadar Air Simplisia Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam) dengan Metode Gravimetric

<b>Parameter Pengukuran</b>	<b>Hasil</b>
Kadar Air	2,06 %

### 3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa

Hasil ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan-kandungan senyawa yang ada didalam daun kelor. Pada uji identifikasi golongan senyawa kimia ini menggunakan metode tabung menggunakan pereaksi untuk uji golongan senyawa tersebut.

Tabel 3. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Golongan Senyawa	Ekstrak Etanol Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> Lam)
Alkaloid	-
Flavonoid	+
Glikosida	-
Saponin	+
Fenol	+

Keterangan : (+) Terdapat golongan senyawa tertentu

(-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu

### 4. Nilai Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Daun Kelor

Pengujian aktivitas inhibitor tirosinase yang dilakukan pada ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebagai sampel untuk mengetahui daya inhibitor terbaik dari beberapa konsentrasi.

Tabel 4. Hasil Persen Inhibitor Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Sampel	Konsentrasi	Persen (%) Inhibitor
Ekstrak Daun Kelor	20 ppm	30,31 %
	40 ppm	35,63 %
	60 ppm	44,46 %
	80 ppm	46,80 %
	100 ppm	53,08 %
Asam kojat	10 ppm	37,77 %
	20 ppm	38,88 %
	40 ppm	41,25 %

	80 ppm	56,27 %
	100 ppm	57,23 %

### 5. Nilai IC<sub>50</sub> Ekstrak Daun Kelor

Nilai IC<sub>50</sub> menunjukkan kemampuan ekstrak dalam menghambat 50% aktivitas tirosinase dimana ekstrak etanol daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebagai sampel.

Tabel 5. Hasil Nilai IC<sub>50</sub> Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Sampel	Nilai IC <sub>50</sub> (µg/mL)	Ket.
Ekstrak Daun Kelor	88,00	Kuat
Asam kojat	65,34	kuat

### B. Pembahasan

Penggelapan kulit terjadi karena adanya pembentukan pigmen melanin di kulit melalui oksidasi tirosin yang dibantu oleh enzim tirosinase membentuk L-DOPA yang kemudian pada tahapan akhirnya akan membentuk pigmen melanin (Chang. 2009). Pada umumnya jumlah melanin pada kulit inilah yang akan menentukan warna kulit kita. Enzim tirosinase dapat digunakan untuk menghambat pembentukan melanin ini (Arbab. 2010).

Tirosinase atau yang juga dikenal dengan nama polifenol oksidase merupakan enzim yang tersebar luas pada hewan dan tumbuhan. Semua tirosinase memiliki persamaan yaitu mempunyai dua atom tembaga tipe III pada sisi aktifnya yang masing-masing diikat oleh 3 residu histidin. Enzim tirosinase dapat mengkatalisis dua reaksi biosintesis melanin yaitu Ohidroksilasi dari asam amino L-tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (LDOPA), dan oksidasi subsekuen dari LDOPA menjadi dopakuinon. Senyawa dopakuinon mempunyai kereaktifan yang

sangat tinggi sehingga dapat mengalami polimerisasi secara spontan membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin (Charissa. 2016).

Penelitian ini menggunakan daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam). Pemilihan daun kelor pada penelitian ini dikarenakan daun Kelor memiliki kandungan flavonoid. Selain itu daun kelor memiliki aktivitas sebagai sumber bahan alami antioksidan (Krisnadi, 2013).

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Metode maserasi digunakan karena metode ini merupakan metode yang mudah, murah dan efektif untuk menghindari kerusakan zat aktif yang termolabil. Ditimbang sebanyak 250 gram simplisia daun kelor, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Masukkan pelarut etanol 96% sebanyak 3 liter. Pelarut etanol 96% digunakan karena pelarut ini merupakan pelarut universal yang dapat menarik hampir seluruh metabolit sekunder, baik yang bersifat polar, semi polar maupun non polar, juga memiliki kandungan air yang kecil sehingga mempercepat proses evaporasi serta terhindar dari tumbuhnya jamur. Proses ekstraksi dilakukan selama 3x24 jam. Hasil maserasi kemudian dipekatkan menggunakan alat *Rotary evaporator* dengan suhu 60°C dan kecepatan 65 rpm hingga diperoleh ekstrak etanol kental, ekstrak kental kemudian didesikator vakum selama 15 menit hal ini bertujuan untuk menarik sisa-sisa pelarut yang masih ada. Hasil ekstraksi daun kelor yang diperoleh adalah sebanyak 2,1982 gram dengan persen (%) rendamen 0,84 %. Rendamen adalah kuantitas (jumlah) ekstrak yang diperoleh dari hasil ekstraksi suatu bahan alam dinyatakan dalam satuan persen (%), apabila nilai rendamen yang diperoleh semakin tinggi maka semakin besar pula ekstrak yang diperoleh.

Kadar air suatu simplisia adalah suatu uji parameter non spesifik yaitu pengukuran suatu kandungan air yang berada didalam bahan dengan tujuan memberikan batasan minimal atau rentang mengenai besarnya kandungan air

didalam bahan, nilai maksimal atau rentang yang diperoleh terkait dengan kemurnian dan kontaminasi (Depkes RI, 2000). Hasil menunjukkan bahwa simplisia daun kelor mengandung kadar air sebesar 2,06 % atau kurang dari 4% sehingga dapat disimpulkan bahwa daun kelor yang digunakan memenuhi persyaratan standar. Hasil tersebut sesuai dengan literatur Farmakope Indonesia karena telah memenuhi persyaratan range yang tertera 2 – 4 %. Kadar air dalam daun kelor kurang dari 4% dapat meminimalisir tumbuhnya jamur dan kapang serta menghasilkan daya tahan penyimpanan dan mutu daun kelor tetap baik.

Berdasarkan hasil pengujian golongan senyawa ekstrak etanol daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam) tidak mengandung senyawa golongan alkaloid (-) pada ketiga reagen pereaksi yakni tidak terdapat endapan merah jingga pada pereaksi dragendorf, tidak terdapat endapan merah kekuningan pada pereaksi mayer dan tidak terdapat endapan coklat pada pereaksi wagner. Hasil (+) mengandung flavonoid setelah dilakukan pengujian diperoleh warna merah dari hasil reaksi tersebut yang menunjukkan adanya flavonoid, (-) tidak mengandung glikosida dari hasil pengujian tidak terbentuk cincin biru hijau, (+) mengandung saponin karena dari hasil uji diperoleh buih, bahkan buih tetap ada setelah penambahan HCl 2N, (+) mengandung fenol karena dari hasil pengujian terbentuk warna hijau kehitaman yang menunjukkan adanya fenol dalam ekstrak daun kelor. Hasil uji identifikasi golongan dipertegas dengan penelitian Pratama Putra (2016) yaitu ekstrak etanol daun kelor mengandung senyawa flavonoid, fenolat, triterpenoid/steroid, dan tanin.

Pengujian inhibitor tirosinase terhadap sampel daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) ini dilakukan dengan menggunakan *microplate reader* (ELISA). Metode ini dipilih karena sederhana, mudah digunakan dan menggunakan jumlah sampel yang sedikit. Penelitian ini menggunakan enzim tirosinase yang disintesis dari

jamur dan L-tirosin sebagai substratnya. Kerja maksimum enzim tirosinase pada pH 6,8 sehingga didapar dengan dapar fosfat pH 6,8 yang telah didinginkan. Enzim tirosinase juga stabil pada suhu  $-20^{\circ}\text{C}$  sehingga dalam penyimpanan dan proses pengerjaan enzim harus tetap berada pada wadah dingin.

Mekanisme kerja *microplate reader* (ELISA) adalah : plat mikrotiter dilapisi dengan antigen kemudian memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah hasil positif palsu kemudian menambahkan antibodi primer dan antibodi sekunder yang terkunjungsi ke enzim. Setelah itu reaksi substrat dan enzim digunakan untuk menghasilkan produk berwarna sehingga menunjukkan reaksi positif.

Pengujian aktivitas enzim tirosinase berdasarkan kemampuan enzim tersebut untuk mengkatalisis oksidasi L-Tirosin sebagai substrat menjadi L-DOPA. Proses oksidasi lanjutan terjadi dengan keberadaan enzim tirosinase dengan katalisator yang kemudian akan mengubah L-DOPA menjadi DOPAquinone. Selanjutnya DOPAquinone secara spontan akan bertautomerisasi menjadi menjadi DOPochrome. Hasil akhir berupa DOPochrome akan memberikan warna keunguan yang dapat menyerap energy sinar tampak pada panjang gelombang 490 nm.

Hasil uji aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) terhadap daya inhibitor dari beberapa konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm, berturut-turut adalah 30,31%, 35,63%, 44,46%, 46,80%, dan 53,08%. Hasil diperoleh dari perhitungan nilai absorbansi yang dilakukan secara triplo untuk setiap konsentrasi. Adapun hasil yang diperoleh dalam bentuk persentase bertujuan untuk mengetahui skala perbandingan aktivitas inhibitor enzim pada setiap konsentrasi sampel.

Hasil nilai  $IC_{50}$  dari uji aktivitas inhibitor tirosinase menunjukkan nilai konsentrasi yang dapat menghambat 50% aktivitas enzim tirosinase ( $IC_{50}$ ) yaitu 88,00  $\mu\text{g/mL}$ . namun aktivitas penghambatan tirosinase dari sampel masih lebih rendah dibandingkan asam kojat sebagai kontrol positif yaitu menunjukkan potensi penghambatan aktivitas tirosinase yang lebih kuat dengan nilai  $IC_{50}$  65,34  $\mu\text{g/mL}$  , nilai  $IC_{50}$  kurang dari 100  $\mu\text{g/mL}$  menunjukkan potensi penghambatan yang kuat, nilai  $IC_{50}$  100-450  $\mu\text{g/mL}$  menunjukkan potensi penghambatan yang kurang kuat, dan 450-700  $\mu\text{g/mL}$  menunjukkan potensi penghambatan aktivitas tirosinase sangat lemah (Zuraida et al, 2019). Dari nilai  $IC_{50}$  sampel maka dapat disimpulkan bahwa potensi penghambatan aktivitas tirosinase dari ekstrak etanol daun kelor menunjukkan aktivitas yang kuat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) memiliki aktivitas sebagai inhibitor tirosinase.
2. Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) memiliki rata-rata persen inhibitor pada konsentrasi (20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm) berturut-turut adalah 30,31%, 35,63%, 44,46%, 46,80%, dan 53,08%.
3. Ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) memiliki nilai IC<sub>50</sub> 88,00 µg/mL.

#### **B. Saran**

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut seperti Fraksinasi dan Isolasi untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung dalam daun kelor (*Moringa oleifera* Lam) sebagai pencerah kulit.




## KEPUSTAKAAN


- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB Press, 2007.
- Ansel, H.C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, Edisi IV*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1989
- Arbab AH, Eltahir MM. *Review On Skin Whitening Agents*. Khartoum Pharm J. 2010.13(1):5-9.
- Arung ET, Kusuma IW, Iskandar YM, Yasutake S, Shimizu K, Kondo R. *Screening of Indonesian plants for tyrosinase inhibitory activity*. Journal Wood Science. 2006.
- Atun, Sri. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam*. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*. Volume 8 No.2, 2014.
- Balsam, M.S. and Sagarin, E. *Cosmetics Science and Technology*, 2nd ed, Vol. 3. John Wiley and Sons, New York. 1972
- Batubara I, Darusman LK, Mitsunaga T, Rahmniwati M, Djauhari E.. *Potency Of Indonesia Medicinal Plants As Tyrosinase Inhibitors And Antioxidant Agent*. Journal of Biologi Science, 2010:138- 144.
- Baumann, Leslie. *The Second Edition of Cosmetic Dermatology: Principles and Practice*. United States, 2009.
- Bisswanger, H. *Enzyme Kineticx : Principle and Methods*. Wiley-VCH Inc. German. 2002. Hal. 151-158.
- Chang, T. S., Ding, H. Y., dan Lin, H. C. Identifying 6,7,4'-trihydroxyisoflavone as a potent tyrosinase inhibitor. *Bioscience, Biotechnology, Biochemistry*. 2005: 1999-2001
- Chang T, Ding HY, Tai SSK, Wu CY. *Mushroom Tyrosinase Inhibitory Effects Of Isoflavones Isolated From Soygerm Koji Fermented With Aspergillus Oryzae BCRC 32288*. Journal of Food chemistry. 2007: 1430- 1438
- Chang TS. *An updated review of tyrosinase inhibitors*. Int J Mol Sci. 2009.10: 2440–75
- Chang Te-Sheng. *Natural Melanogenesis Inhibitor Acting Through The Down-Regulation Of Tyrosinase Activity*. Materials. 2012;5(9):1661-1685.
- Charissa M, Djajadisastra J, Elya B. *Uji aktivitas antioksidan dan penghambatan tirosinase serta uji manfaat gel ekstrak kulit batang taya (Nauclea subdita) terhadap Kulit*. Jurnal Kefarmasian Indonesia. 2016.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit JART, 2010.
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1995.
- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000.
- Endang, Hanani. *Analisis fitokimia*. Buku kedokteran EGC. Jakarta. 2016.
- Ezzedine K, Guinot C, Mauger E, Pistone T, Rafii N, Receveur MC, Galan P, Hercberg S, Malvy D. Expatriates in high- UV index and tropical countries: sun exposure and protection behavior in 9,416 French adults. *Journal of Travel Medicine*. 2007: 85–91.
- Fatmawaty, A. Efektifitas beberapa bahan alam sebagai bahan pemutih kulit: studi in vitro penghambatan aktifitas enzim tirosinase. *Jurnal Bahan Alam Indonesia*, 2010, 7(4), Hal.219.
- Ghasani, A. A.. Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 90% Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lam) Terhadap Konsentrasi Spermatozoa, Morfologi Spermatozoa, Dan Diameter Tubulus Seminiferus Pada Tikus Jantan Galur Sprague. *Skripsi*. Jurusan Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016
- Gopalakrishnan L, Doriya K, Kumar DS. *Moringa oleifera*: A review on nutritive importance and its medicinal application. *Food Science and Human Wellness* 2016;5:49-56
- Harborne. *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata & Iwang Soediro. Terbitan kedua. Bandung: Penerbit ITB. 1987.
- Harborne, J.B dan Williams, C.A.. Advances in flavonoid research since 1992. *Phytochemistry*. 55 (6). 2000: 481-504
- Irmanida, B., dan Adfa, M. Potensi daun kayu bawang (*Protium javanicum*) sebagai penghambat kerja enzim tirosinase. *Sains & Matematika*. 1 (2) 2013: 52– 56.
- Isriany. *Formulasi Kosmetik : produk perawatan kulit dan rambut*.2013.
- Krisnadi AD. *Kelor Super Nutrisi*. Pusat Informasi dan Pengembangan Tanaman Kelor Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat Media Peduli Lingkungan. Blora: 2013

- Kurniasari, A., Anwar, E., & Djajadisastra, J.. Potensi Ekstrak Biji Coklat (*Theobroma cacao* Linn) sebagai Inhibitor Tirosinase untuk Produk Pencerah Kulit. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 2018
- Lewis EA, Tolman WB. *Reactivity of dioxygen-copper systems*. Chemical Reviews. 2004.104:1047-76.
- Lithiwitayawuid K. Stilbenes with Tirosinase Inhibitory Activity. *Current Science*. 2008
- McDonald, K.M., Mock, J., Daloia, A., Parrish, T., Hauer, K., Francis, G., Stillman, A. And Cohn, J.N. Bradykinin Antagonism Inhibits The Antigrowth Effect of Converting Enzyme Inhibition in The Dog Myocardium After Discrete Transmural Myocardial Necrosis. *Circulation*. 1995. 91. Hal 2043-2048.
- Natalia F. E. Mamoto, S. J. *Peran Melanokortin pada melanosit*.2009.
- Nerya, O., Vaya, J., Musa, R., Izrael, S., Ben-Arie, R., dan Tamir, S.. Glabrene and isoliquiritigenin as tyrosinase inhibitors from licorice roots. *Journal Agriculture Food Chemsitry*. 51 (5). 2003: 1201-1207
- Rao, G. V., Mukhopadhyay, T., dan Radhakrishnan, N. Artoindonesianin F, a potent tyrosinase inhibitor from the roots of *Artocarpus heterophyllus* Lam. *Indian Journal of Chemistry*. 49B. 2010: 1264–1266.
- Sanjeeva KKA, Kim EA, Son KT, Jeon YJ. Bioactive properties and potentials cosmeceutical applications of phlorotannins isolated from brown seaweeds: a review. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. 2016: 100–105.
- Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. *Natural Products Isolation, 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press Inc. 2006.
- Seidel, V. *Initial and Bulk Extraction*. In Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, editors. *Natural Products Isolation 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press, 2006.
- Setiadi. *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Cet.I; Yogyakarta, Graha Ilmu. 2007
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 10. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Syamsuni, H. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.


- Toripah, S, S., Abidjulu, J., dan Wehantouw, F., Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Total Fenolik Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk). Program Studi Farmasi FMIPA Universitas Manado.Samratulangi: 2014
- Wahyuningsih, Qori. Aktivitas Penghambatan Tirosinase Dari Ekstrak Etil Asetat Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Tenore) Steen). *Skripsi*. Jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2013.
- World Health Organization. *Global Solar UV index: A Practical Guide*. 2002
- Warrington, J.C., dan Saville, B.A. Tyrosinase inactivation in organic solvent. *Biotechnology and Bioengineering*. 65 (3). 1999: 325–333.
- Winarno, F.G. *Enzim Pangan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1986.
- Zuhud, E.A.M., Siswoyo, E. Sandra, A.Hikmat dan E.Adhiyanto. *Acuan Umum Tumbuhan Obat Indonesia Jilid IX*. Jakarta: Dian Rakyat. 2013
- Zuraida, Sagala. *Uji Aktivitas Inhibisi Terhadap Enzim Tirosinase dari Ekstrak Etanol Daun Papaya (*Carica papaya* L.) Secara In Vitro*. Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945: Jakarta. 2019

**Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian**

**Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel**

### Lampiran 3. Pembuatan Larutan Uji


#### a. Pembuatan Larutan Dapar Fosfat




#### b. Pembuatan Larutan L-Tirosin




## c. Pembuatan Larutan Enzim Tirosinase




## d. Pembuatan Larutan Uji Ekstrak Etanol




## e. Pembuatan Larutan Arbutin



#### Lampiran 4. Uji Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase



**Lampiran 5. Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)**



## Lampiran 6. Hasil Perhitungan

### A. Porsen Rendamen Ekstrak

% Rendamen ekstrak daun kelor

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{Bobot simplisia (gram)}} \times 100\% \\ &= \frac{2.1982 \text{ gram}}{250 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 0,84 \% \end{aligned}$$

### B. Kadar Air

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Air} &= \frac{X_1 - Y}{X} \times 100\% \\ &= \frac{42.7932 \text{ gram} - 42.7313 \text{ gram}}{3 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= \frac{0.0619 \text{ gram}}{3 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= \frac{6,19 \text{ gram}}{3 \text{ gram}} \\ &= 2,06 \% \end{aligned}$$

## C. Perhitungan % Inhibitor tirosinase


Tabel 6. Sampel Ekstrak Daun Kelor

Konsentrasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
20 ppm	0,0645	0,0655	30,31 %
	0,0657		
	0,0664		
40 ppm	0,0603	0,0605	35,63 %
	0,0589		
	0,0624		
60 ppm	0,0520	0,0522	44,46 %
	0,0542		
	0,0505		
80 ppm	0,0492	0,05	46,80 %
	0,0560		
	0,0448		
100 ppm	0,0459	0,0441	53,08%
	0,0462		
	0,0404		
Kontrol (-)	0,094		


Tabel 7. Asam Kojat

Konsentrasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
10 ppm	0,0572	0,0586	37,65 %
	0,0593		
	0,0593		
20 ppm	0,0589	0,0575	38,82 %
	0,0578		
	0,0558		
40 ppm	0,0550	0,0552	41,27 %
	0,0549		
	0,0557		
80 ppm	0,0432	0,0411	56,27 %
	0,0402		
	0,0399		
100 ppm	0,0400	0,0402	57,23%
	0,0411		
	0,0396		
Kontrol (-)	0,094		

## D. Kurva



Gambar 7. kurva sampel



Gambar 8. kurva asam kojat

E. Perhitungan IC<sub>50</sub>

## 1. Sampel

$$Y = 0,2836 x + 25.043$$

$$\text{Diketahui : } y = 50$$

$$a = 25.043$$

$$b = 0,2836 x$$

$$Y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$
$$= \frac{50 - 25,043}{0,2836}$$

$$X = 88,00 \mu\text{g/mL}$$

## 2. Asam Kojat

$$Y = 0,2444 x + 34,029$$

$$\text{Diketahui : } y = 50$$

$$a = 34,029$$

$$b = 0,2444 x$$

$$Y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$
$$= \frac{50 - 34,029}{0,2444}$$

$$X = 65,34 \mu\text{g/mL}$$

### Lampiran 7. Gambar Penelitian




Gambar 9. Pohon kelor



Gambar 10. Sampel Daun Kelor




Gambar 11. Ekstrak kental daun Kelor



Gambar 12. Pengujian Kadar Air Simplisia Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Keterangan:(a) berat cawan tambah sampel ( $X_1$ ); (b) berat cawan sesudah pemanasan ( $Y_1$ ) (c) berat cawan sesudah pemanasan ( $Y_2$ ); (d) berat cawan sesudah pemanasan ( $y_3$ )



Gambar 13. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam)

Keterangan: (a) positif (+) terdapat golongan senyawa flavonoid; (b) Positif (+) terdapat golongan senyawa saponin; (c) negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa glikosida; (d) Positif (+) terdapat golongan senyawa fenolik; (e) negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa alkaloid;



Gambar 14. Sampel pada microplate 96 well



Gambar 15. Pengujian pada ELISA

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



ACHSANUL HUSNA, dilahirkan di Jayapura pada tanggal 19 september tahun 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan SINI dan MULIANI. Saat ini penulis tinggal di salah satu daerah di samata, yaitu di perumahan SURANDAR 3.

Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak arso 13, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN inpres Arso 13. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 arso 14. Lalu menutup pendidikan sekolah menengahnya di SMAN 1 Arso swakarsa.

Setelah menyelesaikan pendidikan wajibnya, penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke sebuah universitas dimana univesitas yang di tempati yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan mengambil konsentrasi FARMASI.