

**HUBUNGAN *POSTTRAUMATIC GROWTH* TERHADAP KUALITAS
HIDUP PASIEN *CA. MAMMAE* DI RSUD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2019**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

SUHARDA CHABIRAH

NIM. 70200115061

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharda Chabirah
NIM : 70200115061
Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Kijang/09 Maret 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 39 A
Judul : Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pasien *Ca. Mammae* di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 17 November 2019

Penyusun,



Suharda Chabirah

NIM: 70200115061

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Hubungan Posttraumatic Growth Terhadap Kualitas Hidup Pasien Ca. Mammæ di RSUD Kota Makassar Tahun 2019*”, yang disusun oleh **Suharda Chabirah**, NIM: 70200115061, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 08 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 08 November 2019 M
11 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI


Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Habibi, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Azriful, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Syamsidar, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum wr. wb

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia dan kekuatan dari-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pasien *Ca. Mammae* di RSUD Kota Makassar”**. Oleh karena itu, pujian dan rasa syukur kepada-Nya sebanyak makhluk yang diciptakan-Nya, seberat Arasy-Nya dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimatnya.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup ini hingga akhir zaman dengan islam sebagai satu-satunya agama yang diridai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, mulai dari persiapan sampai penyelesaian penulisan. Namun, dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, serta tidak lepas dari pertolongan Yang Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Emmi Bujawati, SKM., M. Kes selaku Pembimbing I dan dosen perkuliahan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Bapak Habibi, SKM., M. Kes selaku Pembimbing II dan dosen perkuliahan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Bapak Azriful, SKM., M. Kes selaku Penguji Kompetensi yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Syamsidar, M. Ag selaku Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
9. Bapak Muh. Rusmin, SKM. MARS selaku Penasehat Akademik yang memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.

10. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
11. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat saya Ridha Awaliah S, Rezki Rahmatullah, Vika Yuliandira, Andi Nurhana Magfirah, Marlina Malik, Aisyah Syahrudin, Nurul Iffah, Nurinzana, Hendra Wijaya Sumakul, Muh. Syarwan, Muh. Rizal Ramli, Andi Akram Al-Qadri dan Muh. Syahrul Safri yang selalu menemani, mendukung dan memotivasi saya dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Kepada teman seperjuangan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, Andi Awaliyah Latif dan Hasmi Karina, semoga perjuangan dan pengorbanan kita selama ini berbuah sukses di masa mendatang.
13. Keluarga besar FORMAPID, Teman-teman peminatan Epidemiologi, Posko PBL Timbuseng, Kesmas A dan Covivera 2015 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak mungkin saya lupakan selama menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.
14. Terima kasih kepada teman-teman KKN angkatan 60 Posko Karatuang, Bitu, Nada, Aura, Nisa, Amira, Ical, Nando dan Tutu yang telah memberi pengalaman baru selama kurang lebih 2 bulan di lokasi KKN.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penititan dan penyusunan skripsi.

Secara khusus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, Suriaman, SKM dan Susdiana, Amd. Keb atas seluruh kasih sayang, jasa, pengorbanan, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya sejak Arda masih dalam

kandungan sampai berhasil menyelesaikan studi di Jenjang Universitas yang tidak mampu anakmu balas sampai kapanpun. Terima kasih banyak kepada kakek dan nenekku tercinta (Alm) M. Idi Samad dan Siti Salma yang telah menjaga dan menyayangi Arda dari kecil sampai sekarang ini dan terima kasih banyak juga kepada kakak dan adikku tersayang, Sunanda Chatimah Suriaman, S. Farm., Apt dan Aisyah Putri Andi Sazil yang telah mendukung dan menjadi pendengar keluh kesahku dalam menyelesaikan studi selama ini. Serta ucapan terima kasih kepada keluarga besar yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Samata-Gowa, Oktober 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Tentang Kanker Payudara	18
B. Tinjauan Tentang Kualitas Hidup	36
C. Tinjauan Tentang <i>Posttraumatic Growth</i>	38
D. Kerangka Teori	63
E. Kerangka Konsep	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian	65

C. Populasi dan Sampel Penelitian	66
D. Metode Pengumpulan Data	66
E. Instrumen Penelitian	67
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	70
1. Gambaran Umum Rumah Sakit	70
2. Hasil Univariat	72
a. Karakteristik Responden	72
b. Kualitas Hidup Responden	78
c. Aspek <i>Posttraumatic Growth</i> Responden	78
3. Hasil Bivariat	81
a. Hubungan Hubungan dengan Orang Lain Terhadap Kualitas Hidup Pasien	81
b. Hubungan Peluang Baru Terhadap Kualitas Hidup Pasien	83
c. Hubungan Kekuatan Dalam Diri Terhadap Kualitas Hidup Pasien	84
d. Hubungan Pemngembangan Spiritual Terhadap Kualitas Hidup Pasien	85

e. Hubungan Penghargaan Terhadap Hidup Terhadap Kualitas Hidup Pasien	
.....	87
f. Hubungan <i>Posttraumatic Growth</i> Terhadap Kualitas Hidup Pasien	
.....	88
B. Pembahasan	90
1. Hubungan Antara Penghargaan Terhadap Hidup Terhadap Kualitas Hidup Pasien	
.....	90
2. Hubungan Antara Hubungan Dengan Orang Lain Terhadap Kualitas Hidup Pasien.....	
.....	92
3. Hubungan Antara Kekuatan Dalam Diri Terhadap Kualitas Hidup Pasien	
.....	94
4. Hubungan Antara Peluang Baru Terhadap Kualitas Hidup Pasien	
.....	96
5. Hubungan Antara Pengembangan Spiritual Terhadap Kualitas Hidup Pasien	
.....	98


6. Hubungan <i>Posttraumatic Growth</i> Terhadap Kualitas Hidup Pasien	102
C. Keterbatasan Penelitian	105

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi TNM Kanker Payudara berdasarkan AJCC <i>Cancer Staging Manual</i>	21
Tabel 2.2	Stadium Klinis Berdasarkan Klasifikasi TNM Kanker Payudara Berdasarkan AJCC <i>Cancer Staging Manual</i>	22

- Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
.....
.....
72
- Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
.....
.....
73
- Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan suku pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
.....
.....
74
- Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
.....
.....
75
- Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
.....
.....
75
- Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
.....
.....
76
- Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menderita pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

	
	76
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Terapi yang Diperoleh pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
	76
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Operasi yang Telah Dilakukan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
	77
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Operasi Terakhir pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
	77
Tabel 4.11	Distribusi Responden Berdasarkan Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
	78
Tabel 4.12	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Dengan Orang Lain (<i>relating to others</i>) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
	78
Tabel 4.13	Distribusi Responden Berdasarkan Peluang Baru (<i>new possibilities</i>) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019
	79

Tabel 4.14 Distribusi Responden Berdasarkan Kekuatan Dalam Diri (*personal strength*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....
.....
79

Tabel 4.15 Distribusi Responden Berdasarkan Pengembangan Spiritual (*spiritual change*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....
.....
80

Tabel 4.16 Dstribusi Responden Berdasarkan Penghargaan Terhadap Hidup (*appreciation of life*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....
.....
80

Tabel 4.17 Distribusi Responden Berdasarkan Aspek *Posttraumatic Growth* pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....
.....
81

Tabel 4.18 Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Antara Hubungan Dengan Orang Lain Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....
.....
81

Tabel 4.19 Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Antara Peluang Baru Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....
.....
83

Tabel 4.20 Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Antara Kekuatan Dalam Diri Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....

.....

84

Tabel 4.21 Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Antara Pengembangan Spiritual Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....

.....

85

Tabel 4.22 Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Antara Penghargaan Terhadap Hidup Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....

.....

87

Tabel 4.23 Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Antara *Posttraumatic Growth* Terhadap kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

.....

.....

88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Kerja Psikososial Reaksi <i>Posttraumatic Stress</i>	59
Gambar 2.2	Skema Teori Penilaian Organisme	61
Gambar 2.3	Skema Kerangka Teori	63
Gambar 2.4	Skema Kerangka Konsep	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Master Tabel Sebaran Jawaban dan Penilaian
- Lampiran 4 Output SPSS
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja
- Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari RSUD Kota Makassar
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari RSUD Padjongah Daeng Ngalle

Lampiran 9 Surat Permohonan Pengajuan Kode Etik dari UIN Alauddin Makassar

Lampiran 10 Lembar Rekomendasi Etik

Lampiran 11 Surat Permohonan Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar

Lampiran 12 Surat Izin Penelitian dari BKPMMD Prov. Sul-Sel

Lampiran 13 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari RSUD Kota Makassar

Lampiran 14 Riwayat Hidup Peneliti



ABSTRAK

Nama : Suharda Chabirah

NIM : 70200115061

Judul : Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pasien *Ca. Mammae* di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Kanker merupakan kondisi sel yang *abnormal*, sehingga mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya dan tidak terkendali. *Posttraumatic Growth* merupakan respon psikopatologis reaktif terhadap peristiwa traumatis. Seseorang yang terdiagnosis kanker payudara akan mengalami perubahan fisik, psikologis, fungsi sosial, seksual serta aktifitas sehari-hari. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar dengan jenis penelitian kuantitatif pendekatan analitik observasional dengan metode *cross sectional*. Lokasi penelitian yakni di RSUD Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel menggunakan total *sampling* yang berjumlah 34 responden.

Hasil uji *Chi-Square* diperoleh terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien ($p\ value=0,006$), terdapat hubungan yang signifikan antara peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien ($p\ value=0,001$), terdapat

hubungan yang signifikan antara kekuatan dalam diri (*personal strength*) terhadap kualitas hidup pasien ($p\ value=0,040$), terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan spiritual (*spiritual change*) terhadap kualitas hidup pasien ($p\ value=0,043$) dan terdapat hubungan yang signifikan antara penghargaan terhadap hidup (*appretiation of life*) dengan kualitas hidup pasien ($p\ value=0,043$). Untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang sama diharapkan menggunakan *setting* budaya yang beragam maupun menambahkan perspektif psikologis lainnya.

Kata Kunci : *Posttraumatic Growth, Kualitas Hidup, Kanker Payudara*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker merupakan kondisi sel yang *abnormal*, sehingga mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya dan tidak terkendali (Taufan, 2013). Hampir tidak ada orang yang selamat dari penyakit kanker, data menunjukkan bahwa setiap 11 menit terdapat 1 orang di dunia meninggal karena penyakit kanker dan setiap 3 menit terdapat penderita baru (Yustina, 2013).

Saat ini, salah satu jenis penyakit kanker yaitu kanker payudara menjadi jenis kanker yang sangat menakutkan bagi perempuan di seluruh dunia maupun di Indonesia. Kanker payudara adalah suatu penyakit *neoplasma* ganas dimana pertumbuhan jaringan payudara yang *abnormal* dibandingkan jaringan sekitarnya. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara yang merupakan pembunuh nomor dua setelah kanker serviks yang terjadi pada wanita di dunia (Manik, 2012).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kanker payudara merupakan kanker yang paling umum diderita oleh perempuan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Survei yang dilakukan WHO menyatakan 8-9% perempuan mengalami kanker payudara dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya mencapai 23,6 juta kasus baru per tahun pada 2030. Tiap tahunnya terdapat lebih dari 250.000 kasus baru kanker payudara terdiagnosa di Eropa dan kurang lebih 175.000 di Amerika Serikat. Tahun 2000 diperkirakan 1,2 juta wanita terdiagnosis kanker payudara dan lebih dari 700.000 meninggal karenanya (WHO, 2013).

Berdasarkan data *Global Burden of Cancer* (GLOBOCAN) tahun 2013 menyatakan bahwa secara global terdapat 1,8 juta kasus kanker payudara dan 464.000 kasus menyebabkan kematian. Meskipun kanker payudara dianggap sebagai penyakit di negara maju namun mayoritas 69% dari semua kematian akibat kanker payudara terjadi di negara berkembang. *International Agency for Research on Cancer* (IARC), diketahui pada tahun 2012 terdapat 14,1 juta kasus baru kanker, 8,2 juta kematian akibat kanker dan 32,6 juta orang hidup dengan kanker (dalam waktu 5 tahun dari diagnosis) di seluruh dunia. Berdasarkan data tahun 2012, kasus baru akibat kanker payudara yakni sebesar 1,67 juta kasus atau 25% dari semua penyakit kanker. Sedangkan angka kejadian kanker payudara di beberapa negara di Asia, seperti Jepang diperkirakan berkisar 15-18 per 100.000 penduduk per tahun, Kwait sekitar 15-17 per 100.000 penduduk per tahun dan Cina <10 per 100.000 penduduk per tahun (GLOBOCAN, 2012).

Jenis kanker yang paling umum terjadi pada wanita di Inggris adalah kanker payudara. Tahun 1999-2001, kasus kanker payudara mengalami peningkatan sebesar 6% dan tahun 2008-2010 perkiraan sekitar 550.000-570.000 orang hidup terdiagnosis kanker payudara. Kemudian, tahun 2012 lebih dari 41.000 kasus baru didiagnosa kanker payudara setiap tahunnya (Eccles at al, 2013). Perth, Australia bagian barat pada tahun 2012 terdapat 1.423 kasus baru yang terdiagnosis dan sekitar 238 wanita mengalami kematian akibat kanker payudara (*Cancer Consil Australia*, 2014). Selanjutnya, di Yordania, penderita kanker payudara meningkat 4% per tahunnya dengan insiden tertinggi yakni 36,7% dari semua jenis kanker (Kawar, 2012).

Berdasarkan data GLOBOCAN 2012, insiden kanker payudara sebesar 40 per 100.000 perempuan. Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan perubahan pola hidup penduduk Indonesia. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi kanker payudara di Indonesia adalah 61.682 kasus. Prevalensi kanker payudara menempati urutan kedua setelah prevalensi kanker serviks (Mulyasari, 2017). Data di Indonesia dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2007 diketahui bahwa kanker payudara menempati urutan pertama pasien rawat inap yakni sebesar 16,85% dan pasien rawat jalan sebesar 21,69%. Tahun 2008 ditemukan sebanyak 39.381 kasus baru kanker payudara dan 20.052 terjadi kematian akibat kanker payudara. Sedangkan prevalensi kanker payudara adalah 12 per 100.000 perempuan. Penyakit ini juga dapat diderita pada laki-laki dengan frekuensi sekitar 1% (Mulyasari, 2017).

Berdasarkan estimasi *International Agency for Research on Cancer* (IARC) tahun 2012 diketahui bahwa kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi yaitu sebesar 43,3% dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9%. Prevalensi tertinggi kanker payudara di Indonesia tahun 2013 terdapat pada provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 2,4% dan berdasarkan estimasi jumlah kanker payudara terbanyak terdapat pada provinsi Jawa Tengah yaitu 11.511 kasus (Data Riskesdas, 2013).

Berdasarkan prevalensi kanker pada semua umur di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi ke 9 dengan persentase sebanyak 1,7% kasus kanker di tahun 2013. Untuk kasus kanker payudara di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, tercatat sebanyak 2.975 kasus (Riskesdas, 2013). Berdasarkan data perbandingan di 3 rumah sakit umum daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yakni RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba berdasarkan data pasien pasca operasi kanker payudara

untuk tahun 2015 sebanyak 135 pasien, tahun 2016 sebanyak 92 pasien dan tahun 2017 sebanyak 62 pasien. RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan data pasien pasca operasi kanker payudara untuk tahun 2016 sebanyak 97 pasien dan untuk tahun 2017 sebanyak 81 pasien. Sedangkan RSUD Kota Makassar berdasarkan data pasien pasca operasi kanker payudara untuk tahun 2016 sebanyak 46 pasien, untuk tahun 2017 sebanyak 117 pasien, tahun 2018 sebanyak 70 pasien dan tahun 2019 bulan Januari – April sebanyak 20 pasien.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar semula merupakan puskesmas yang berdiri pada tahun 1975 dengan nama Puskesmas Perawatan Daya. Tahun 1978-2002, Puskesmas Perawatan Daya meningkat menjadi Puskesmas Plus Daya yang kemudian di tahun 2002 resmi berubah statusnya menjadi rumah sakit tipe C dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Berdasarkan data rekam medik pasien pasca operasi rawat inap kanker payudara di RSUD Kota Makassar untuk 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2017 yakni sebanyak 117 pasien rawat inap, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 70 pasien rawat inap pasca operasi kanker payudara.

Seseorang yang terdiagnosis menderita kanker payudara akan mengalami perubahan fisik, psikologis (seperti tingkat depresi dan kecemasan), fungsi sosial, seksual serta aktifitas sehari-hari. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup atau *quality of life* (QOL) penderita (Putu et al, 2015).

Kualitas hidup menurut *World Health Organization Quality of Life* (WHOQOL) merupakan persepsi individu mengenai posisi mereka dalam hidup, baik dari segi budaya maupun sosial budaya. Terdapat empat dimensi kualitas hidup yang harus diperhatikan oleh pasien kanker payudara yaitu :

kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial maupun spiritual (Ferrel, B.R *et al*, 2012).

Posttraumatic Growth (PTG) merupakan respon psikopatologis reaktif terhadap peristiwa traumatis. PTG dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan pendorong apakah pencapaian PTG ini berhasil atau tidak. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor eksternal termasuk di dalamnya tingkat tekanan dari trauma, dukungan sosial dan pengaruh sosiokultural. Sedangkan faktor internal termasuk di dalamnya karakter personal, manajemen distress, gaya koping dan pengungkapan emosi diri (Teixeira & Pereira, 2013).

Menyadari besarnya peran aspek psikologis dalam memberikan dukungan terhadap proses perawatan dan pemulihan kanker, kami memandang perlu untuk membahas lebih jauh bagaimana dinamika *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup penderita kanker payudara pasca operasi yang mengalami trauma akibat penyakit yang dideritanya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah Ada Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pada Pasien *Ca. Mammae* di RSUD Kota Makassar?

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho :

1. Tidak ada hubungan antara penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*) dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
2. Tidak ada hubungan antara hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
3. Tidak ada hubungan antara kekuatan dalam diri (*personal strenght*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
4. Tidak ada hubungan antara peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
5. Tidak ada hubungan antara perkembangan spiritual (*spiritual development*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
6. Tidak ada hubungan antara *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

Ha :

1. Ada hubungan antara penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*) dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
2. Ada hubungan antara hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

3. Ada hubungan antara kekuatan dalam diri (*personal strenght*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
4. Ada hubungan antara peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
5. Ada hubungan antara perkembangan spiritual (*spiritual development*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
6. Ada hubungan antara *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap masing-masing variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

a. Kanker payudara

Kanker payudara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang tercatat namanya sebagai pasien rawat jalan dalam rekam medik RSUD Kota Makassar telah melakukan operasi payudara akibat benjolan yang terdapat di area sekitar payudaranya serta berdomisili di Kota Makassar.

b. *Posttraumatic Growth* (PTG)

PTG yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan positif dari dalam diri penderita sebagai hasil perjuangan penerimaan dirinya yang baru.

Kriteria objektif :

PTG positif : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $> 50\%$ atau jumlah skor $>18,7$.

PTG negatif : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $\leq 50\%$ atau jumlah skor $\leq 18,7$.

c. Penghargaan terhadap hidup (*appretiation for life*)

Penghargaan terhadap hidup yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perubahan dalam diri pasien yang lebih menghargai hidupnya saat ini.

Kriteria objektif :

Tinggi : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $>50\%$ atau jumlah skor >2 .

Rendah : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $\leq 50\%$ atau jumlah skor ≤ 2 .

d. Hubungan dengan orang lain (*relating to others*)

Hubungan dengan orang lain yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana pasien kembali menjalin hubungan dengan orang-orang terdekatnya pasca trauma yang dialaminya.

Kriteria objektif :

Tinggi : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $>50\%$ atau jumlah skor >6 .

Rendah : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $\leq 50\%$ atau jumlah skor ≤ 6 .

e. Kekuatan dalam diri (*personal strenght*)

Kekuatan dalam diri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perubahan yang dialami pasien berupa kekuatan yang dimilikinya terhadap pemecahan

suatu masalah sehingga mereka merasa ketika dihadapkan dengan suatu masalah, mereka dapat mengatasinya dengan mudah.

Kriteria objektif :

Tinggi : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $>50\%$ atau jumlah skor >3 .

Rendah : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $\leq 50\%$ atau jumlah skor ≤ 3 .

f. Peluang baru (*new possibilities*)

Peluang baru yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ketertarikan terhadap hal-hal baru yang dikerjakan oleh pasien pasca trauma yang dideritanya.

Kriteria objektif :

Tinggi : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $>50\%$ atau jumlah skor >3 .

Rendah : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $\leq 50\%$ atau jumlah skor ≤ 3 .

g. Perkembangan spiritual (*spiritual development*)

Perkembangan spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pandangan penderita dalam mencari makna hidup yang sesungguhnya dengan cara mendekatkan diri kepada tuhan.

Kriteria objektif :

Tinggi : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $>50\%$ atau jumlah skor >1 .

Rendah : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $\leq 50\%$ atau jumlah skor ≤ 1 .

h. Kualitas hidup

Kualitas hidup yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengukuran terhadap pasien kanker payudara pasca operasi terhadap sejauh mana mereka dapat beraktivitas secara normal meskipun dalam masa pengobatan.

Kriteria objektif :

Tinggi : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $>62,5\%$ atau jumlah skor >84 .

Rendah : apabila persentase total jawaban responden memiliki nilai $<50\%$ atau jumlah skor ≤ 84 .

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Masalah penelitian ini dibatasi pada hubungan *Posttraumatic Growth* (PTG) terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
- b. Pasien di RSUD Kota Makassar adalah pasien wanita yang terdaftar dalam rekam medik merupakan pasien rawat jalan dan telah melakukan operasi kanker payudara.
- c. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional* untuk mengetahui hubungan antara *Posttraumatic Growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Tabel Sintesa *Posttraumatic Growth* dan Kanker Payudara

No	Nama Peneliti	Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian	Kesimpulan
1	Maulia Mahleda I.P. Nurul Hartini	Juni, 2012	<i>Posttraumatic Growth</i> pada Pasien Kanker Payudara Pasca Mastektomi Usia Dewasa Madya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pasien kanker payudara yang telah melakukan mastektomi antara 1-5 tahun. Subjek penelitian adalah wanita dewasa madya yang berusia 47-55 tahun.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya pasien mengalami emosi negatif setelah menjalani mastektomi. Setelah melakukan perenungan dan pengungkapan diri, mereka merubah pandangan hidupnya. Subjek bisa mengembangkan diri menuju pertumbuhan psikologis, yaitu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dipengaruhi pula oleh adanya dukungan sosial dan keyakinan terhadap tuhan.
2	Basak Baglama, Irem Erdem Atak	November, 2014	<i>Posttraumatic Growth And Related Factors Among</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hubungan antara dukungan	Hasil penelitian ditemukan bahwa pertumbuhan pasca trauma ditemukan

No	Nama Peneliti	Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian	Kesimpulan
			<i>Postoperative Breast Cancer Patients</i>	sosial, harapan disposisi, <i>locus of control</i> eksternal internal dan pertumbuhan <i>posttraumatic</i> di antara pasien kanker payudara pasca operasi. Penelitian ini dilakukan dengan 31 wanita kanker payudara pasca operasi (usia rata-rata = 50,48, SD = 11,59) yang menjalani perawatan pasca operasi. Peserta berasal dari berbagai kota di Republik Turki Siprus Utara.	berhubungan positif dengan harapan sosial dan disposisi. Selain itu, hasilnya tidak mengungkapkan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan <i>posttraumatic</i> dan <i>locus of control</i> .
3	Andhini Prima Ningsih	Januari 2016	Studi Mengenai <i>Posttraumatic Growth</i> Pada Wanita Yang Baru Terdiagnosis Menderita Kanker Payudara Di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana peneliti memberikan deskripsi dan analisis pertumbuhan pasca trauma (pasca pertumbuhan traumatis) pada wanita yang baru didiagnosis dengan kanker payudara. Sampling	Hasil penelitian memperoleh gambaran umum tentang analisis pertumbuhan pasca trauma dialami oleh wanita dengan kanker payudara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari diskusi, dapat dilihat bahwa terdapat empat (4)

No	Nama Peneliti	Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian	Kesimpulan
				<p>teknik yang digunakan adalah <i>non-probability sampling</i>. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang.</p>	<p>pertumbuhan pasca trauma (pasca pertumbuhan traumatis) responden yang signifikan timbul dari perjuangan dalam menghadapi kanker payudara, ini termasuk: spiritual pengembangan, hubungan sosial yang lebih baik, menghormati kehidupan dan kemungkinan baru.</p>
4	Ade Fitri Rahmah & Erlina Listyanti Widuri	Agustus, 2017	<p><i>Posttraumatic Growth</i> Pada Penderita Kanker Payudara</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan fenomenologi. Informan pertama berusia 52 tahun dan mengidap kanker payudara stadium IV. Informan kedua berusia 24 tahun, akan tetapi ketika mengidap kanker payudara informan masih berusia 17 tahun.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan terdapat dua faktor yang memengaruhi aspek <i>posttraumatic growth</i> pada penderita kanker payudara. Faktor eksternal adalah anak dan cucu sebagai <i>life expectation</i> serta dorongan atau motivasi dari kedua orang tua secara terus menerus untuk melakukan pengobatan sehingga akhirnya memicu penguatan</p>

No	Nama Peneliti	Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian	Kesimpulan
					faktor internal. Faktor internal yang meliputi faktor keimanan (spritualitas), faktor keinginan kuat untuk sembuh (optimisme), faktor resiliensi dan faktor <i>reframing</i> .
5	Frida Rahmadhani I Sanny Prakosa Wardhana	Maret, 2017	<i>Posttraumatic Growth</i> pada Wanita Penderita Kanker Payudara Pasca Mastektomi Usia Dewasa Awal	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrumental. Teknik penggalan data yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum. Subjek penelitian adalah tiga wanita dewasa awal yang berusia 20-40 tahun.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek menunjukkan adanya perubahan positif menuju level yang lebih tinggi pada aspek perubahan persepsi, hubungan dengan orang lain dan perubahan falsafah hidup. Dimensi perubahan falsafah hidup menjadi aspek yang paling terlihat dominan. Pada proses munculnya <i>posttraumatic growth</i> , ketiga subjek berhasil melewati tahap perenungan dan pengungkapan diri. Jika dilihat dari prosesnya, dimensi perubahan falsafah

No	Nama Peneliti	Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian	Kesimpulan
					hidup menjadi aspek yang paling mendasari proses munculnya <i>posttraumatic growth</i> .
6	Lia Zairoh Siska Mawaddah	Agustus, 2018	<i>Posttraumatic Growth</i> Pada Wanita Dewasa Madya Penderita Kanker Payudara	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan kepada subjek dan didukung oleh dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 7 orang survivor kanker payudara	Dari hasil temuan data diperoleh dapat disimpulkan bahwa <i>posttraumatic growth</i> pada subjek penelitian sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Aspek yang sangat berkembang dengan baik pada semua subjek adalah pendekatan diri kepada Tuhan yang berupa sholat, mendalami al-Qur'an, mengaji dan bersedekah.

Dari kajian pustaka pada tabel 1.1 dimana, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Perbedaan pertama yaitu dari jurnal tersebut, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif sedangkan yang peneliti akan gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan melihat hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi. Perbedaan kedua yaitu terletak pada sampel yang diteliti, pada jurnal tersebut terdapat 3 responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian sedangkan peneliti akan menggunakan sampel sebanyak 50 responden.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

b. Tujuan khusus

- 1) Mengetahui hubungan antara penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*) dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
- 2) Mengetahui hubungan antara hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
- 3) Mengetahui hubungan antara kekuatan dalam diri (*personal strenght*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

- 4) Mengetahui hubungan antara peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
- 5) Mengetahui hubungan antara perkembangan spiritual (*spiritual development*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
- 6) Mengetahui hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi RSUD Kota Makassar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data masukan untuk mengetahui hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien yang mengidap kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

b. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menjadi tambahan studi pustaka bagi institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

c. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini peneliti dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dan menambah pengetahuan serta pengalaman dalam membuat penelitian ilmiah. Serta menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien yang mengidap kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Kanker Payudara

1. Definisi Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan suatu kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali yang terjadi pada jaringan payudara. Kanker payudara pada umumnya menyerang kaum wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat menyerang kaum laki-laki, walaupun kemungkinan menyerang sangat kecil sekali yaitu 1:100. Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang juga menjadi penyebab kematian terbesar kaum wanita di dunia, termasuk Indonesia (Mulyani dan Rinawati, 2013).

2. Jenis Kanker Payudara

a. Kanker yang Sering Terjadi

1) *Karsinoma Duktal In Situ* (DCIS)

Karsinoma Duktal In Situ (DCIS) merupakan jenis kanker payudara yang paling umum dan paling sering terjadi, namun tidak terlalu berbahaya (*noninvasif*). *Ductal Carcinoma In Situ*, hal ini berarti kanker hanya terletak dalam *duct* (tabung kecil yang membawa susu dari lobula ke puting) (Pamungkas, 2011). DCIS diyakini juga sebagai lesi prakanker. Umumnya lesi prakanker terjadi dalam satu payudara tetapi pasien dengan DCIS berisiko lebih tinggi untuk menderita kanker payudara kontra lateral. DCIS biasanya muncul sebagai *pathologic nipple discharge* dengan atau tanpa massa sehingga paling

tepat untuk mendeteksi adanya DCIS adalah mammogram. (Suyatno dan Emir, 2010).

2) *Karsinoma Lobular In Situ (LCIS)*

Karsinoma lobular in situ merupakan kelainan payudara yang ditandai dengan adanya perubahan sel dalam lobulus atau lobus. LCIS diyakini bukan merupakan lesi premaligna tetapi wanita yang mengalami LCIS akan mendapatkan risiko kanker payudara di kemudian hari (Suyatno dan Emir, 2010).

3) *Karsinoma Invasif*

Karsinoma payudara *invasive* merupakan tumor yang secara histologik heterogen. Mayoritas tumor ini adalah adenokarsinoma yang tumbuh dari terminal duktus. Terdapat lima varian histologik dari adenokarsinoma payudara (Suyatno & Emir, 2010).

- a) *Karsinoma Duktal Invasif* merupakan jenis kanker payudara yang paling yang paling sering terjadi yakni sekitar 75% dari keseluruhan kanker payudara (Pamungkas, 2011). Kanker ini bermula dari jalannya susu atau pada duet, kemudian bermetastasis ke kelenjar getah bening aksila, merastasisi juga ditemukan di tulang, paru-paru, liver dan juga otak (Suyanto & Emir, 2010).
- b) *Karsinoma Lobular Invasif*, merupakan jenis kanker payudara yang sering terjadi yakni sekitar 5-10% dari keseluruhan kanker payudara yang bermula dari kelenjar susu atau *lobules* (Pamungkas, 2011). Jenis kanker ini cenderung tumbuh disekitar *ductus* dan lobules. Multisentris dan bilateral lebih sering terlihat pada karsinoma lobular dibanding karsinoma *ductal*. Jenis ini juga mampu menyebar ke bagian tubuh lain (Suyatno & Emir, 2010).

- c) *Karsinoma Tubular* merupakan jenis kanker payudara yang sering terjadi yakni sekitar 2% dari keseluruhan kanker payudara. Diagnosis ditegakkan apabila lebih dari 75% tumor menunjukkan formasi tubule. Jarang bermetastasis ke kelenjar getah bening aksila (Suyatno & Emir, 2010).
- d) *Karsinoma Medullar* merupakan jenis kanker payudara yang sering terjadi yakni sekitar 5-7% dari keseluruhan kanker payudara. Secara histologik, lesi ditandai dengan diferensiasi buruk, pola pertumbuhan sinkronisasi (*a syncytial growth pattern*), batas tegas, banyak infiltrasi limfosit dan plasma sel dan sedikit atau tanpa DCIS (*Ductal Carcinoma In Situ*) (Suyatno & Emir, 2010).
- e) *Karsinoma Mucinous* atau Kolloid merupakan jenis kanker yang sering terjadi yakni sekitar 3% dari keseluruhan kanker payudara yang ditandai dengan akumulasi yang menonjol dari mucin ekstraseluler melingkupi kelompok sel tumor. Karsinoma koloid memiliki pertumbuhan yang lambat dengan ukuran yang besar (Suyatno & Emir, 2010).

b. Kanker yang Jarang Terjadi

1) Karsinoma Metaplastik

Merupakan jenis kanker payudara yang jarang terjadi yakni kurang dari 5% dari keseluruhan kanker payudara dimana lesi mengandung beberapa tipe sel berbeda yang terlihat tidak khas. Tumor-tumor ini meliputi sel-sel yang secara normal tidak ditemukan dalam payudara, seperti sel-sel kulit atau sel-sel yang membuat tulang (Suyatno dan Emir, 2010).

2) Karsinoma Invasifkribiform

Merupakan kanker dengan diferensiasi baik terdiri atas sel kecil dan *uniform* (Suyatno & Emir, 2010).

3) Karsinoma Papiler

Merupakan jenis kanker payudara yang sangat jarang terjadi yakni kurang dari 1-2% dari keseluruhan kanker payudara. Ditemukan dominan pada wanita *postmenopause* ditandai oleh nodul padat yang sering *multiple* dan *labulated* (Suyatno dan Emir, 2010).

4) Karsinoma Mikropapiler Invasive

Merupakan jenis kanker payudara yang berbeda dan sulit dikenal, umumnya adalah massa padat dan tidak bergerak (*immobile*). Mammografi terdapat gambaran *specula*, *iregular* atau bundar, densitas tinggi dengan atau tanpa mikrokalsifikasi (Suyatno dan Emir, 2010).

Rasjidi (2009) menyatakan tahapan kanker sesuai dengan Sistem Tumor Nodus Metastasia (TNM) AJCC *Cancer Staging Manual* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi TNM Kanker Payudara berdasarkan AJCC *Cancer Staging Manual*

Klasifikasi	Definisi
Tumor Primer	
Tx	Tumor primer tidak didapat
T0	Tidak ada bukti adanya tumor primer
Tis	Karsinoma in situ
Tis (DCIS)	Duktal karsinoma in situ
Tis (DCIS)	Lobular karsinoma in situ
Tis (paget)	<i>Paget's Disease</i> tanpa adanya tumor
T1	Ukuran tumor < 2 cm
T1 mic	Mikroinvasif > 0,1 cm
T1a	Tumor > 0.1 – 0,5 cm
T1b	Tumor > 0,5 - < 1 cm
T1c	Tumor > 1 cm - < 2 cm
T2	Tumor > 2 cm - < 5 cm
T3	Tumor > 5 cm
T4	Tumor dengan segala ukuran disertai dengan adanya perlekatan pada dinding thoraks atau kulit.
T4a	Melekat pada dinding dada, tidak merusak M.

Klasifikasi	Definisi
	<i>Pectoralis major</i>
T4b	Edema (termasuk <i>peau d'orange</i>) atau ulserasi pada kulit, atau adanya nodul satelit pada payudara
T4c	Gabungan antara T4a dan T4b
T4d	<i>Inflammatory carcinoma</i>
Klasifikasi	Definisi
Kelenjar Limfe Region (N)	
Nx	Kelenjar limfe region tidak didapatkan
N0	Tidak ada metastasis pada kelenjar limfe
N1	Metastasis pada kelenjar aksila ipsilateral, bersifat <i>mobile</i> .
N2	Metastasis pada kelenjar limfe aksila ipsilateral, tidak dapat digerakkan (<i>fixed</i>).
N3	Metastasis pada kelenjar limfe infraclavikular, atau mengenai kelenjar <i>mammae</i> interna, atau kelenjar limfe supraclavicular.
Metastasis (M)	
Mx	Metastasis jauh tidak ditemukan
M0	Tidak ada bukti adanya metastasis
M1	Didapatkan metastasis yang telah mencapai organ

Sumber : *Epidemiologi kanker pada wanita, 2010*

Tabel 2.2 Stadium klinis berdasarkan klasifikasi TNM kanker payudara berdasarkan AJCC *Cancer Staging Manual*

Stadium	Ukuran Tumor	Metastasis Kelenjar Limfe	Metastasis Jauh
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
IIa	T0	N1	M0
	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
IIb	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
IIIa	T0	N2	M0
	T1	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1, N3	M0
IIIb	T4	N apapun	M0
	T apapun	N3	M0
IV	T apapun	N apapun	M1

Sumber : *Epidemiologi kanker pada wanita, 2010*

Keterangan:

a. *Stage 0*

Tahap sel kanker payudara tetap didalam kelenjar payudara, tanpa invasi ke dalam jaringan payudara normal yang berdekatan.

b. *Stage I*

Tumor 2 cm atau kurang dan batas yang jelas.

c. *Stage IIa*

Tumor tidak ditemukan pada payudara tetapi sel-sel kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak, atau tumor dengan ukuran 2 cm atau kurang dan telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak (*aksiler*), atau tumor yang lebih besar dari 2 cm tapi tidak lebih dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak.

d. *Stage IIb*

Tumor yang lebih besar dari 2 cm, tetapi tidak ada yang lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke kelenjar getah bening yang berhubungan dengan ketiak, atau tumor yang lebih besar dari 5 cm tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak.

e. *Stage IIIa*

Tumor tidak ditemukan di payudara. Kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak yang melekat bersama atau dengan struktur lainnya, atau kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang dada, atau tumor dengan ukuran berapapun dimana kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, terjadi pelekatan dengan struktur lainnya, atau kanker ditemukan di kelenjar getah bening dekat tulang dada.

f. *Stage IIIb*

Tumor dengan ukuran tertentu dan telah menyebar ke dinding dada dan atau kulit payudara dan mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak yang melekat dengan struktur lainnya, atau mungkin kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening di tulang dada. Kanker payudara *inflamatori* (berinflamasi) dipertimbangkan paling tidak pada tahap IIIb.

g. *Stage IIIc*

Ada atau tidak adanya kanker dipayudara atau mungkin telah menyebar ke dinding dada dan atau kulit payudara dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening baik dimana atau di bawah tulang belakang dan kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak atau ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada.

h. *Stage IV*

Kanker telah menyebar atau metastase ke bagian lain dari tubuh.

3. Patogenesis Kanker Payudara

Sel *abnormal* membentuk klon dan mulai berproliferasi secara *abnormal*, mengabaikan sinyal yang mengatur pertumbuhan dalam lingkungan sel tersebut. Kemudian dicapai suatu tahap dimana sel mendapatkan ciri-ciri invasif dan terjadi perubahan pada jaringan sekitarnya. Sel-sel tersebut menginfiltrasi jaringan sekitar dan memperoleh akses ke limfe dan pembuluh-pembuluh darah, melalui pembuluh darah tersebut sel-sel dapat terbawa ke area lain dalam tubuh untuk membentuk metastase (penyebaran kanker) pada bagian tubuh yang lain. Neoplasia adalah suatu proses pertumbuhan sel yang tidak terkontrol yang tidak mengikuti tuntutan fisiologik, yang dapat disebut benigna atau maligna.

Pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan kanker biasanya disebut dengan karsinogenesis (Mary, 2008).

Transformasi maligna diduga mempunyai sedikitnya tiga tahapan proses seluler, diantaranya yaitu insiasi dimana insiator atau karsinogen melepaskan mekanisme enzimatik normal dan menyebabkan perubahan dalam struktur genetik asam *deoksiribonukleat* seluler (DNA), promosi dimana terjadi pemejanaan berulang terhadap agen yang mempromosikan dan menyebabkan ekspresi informasi abnormal atau genetik mutan bahkan setelah periode laten yang lama, progresi dimana sel-sel yang telah mengalami perubahan bentuk selama insiasi dan promosi mulai menginvasi jaringan yang berdekatan dan bernetastase menunjukkan perilaku maligna (Mary, 2008).

Metastase adalah transplantasi sel-sel ganas dari organ yang satu ke organ yang lain. Proses metastasis tidak terjadi secara acak-acakan atau sembarang, tetapi merupakan susunan kejadian yang rumit. Sekitar 30% tumor padat (malignan) telah bernetastasis ketika kanker terdiagnosis. Sel-sel mempunyai kemampuan yang lebih unik dari pada sel-sel yang normal, yakni sel-sel kanker dapat bergerak ke jaringan lain tanpa terkendali. Penyebaran ke jaringan sekitar dapat menimbulkan perdarahan, nekrosis, pembentukan ulkus dan penggantian dengan jaringan fibrotik. Hal ini dapat menimbulkan gumpalan yang besar, berakar di tempat (tidak dapat digerakkan dengan palpasi), kadang-kadang timbul ulkus dengan perdarahan, serta menyebabkan distorsi pada struktur dan penarikan kulit sekitar seperti yang tampak pada kanker payudara. Infiltrasi setempat dapat disertai dengan infeksi (Mary, 2008).

4. Tanda dan Gejala Kanker Payudara

Tanda paling umum dari kanker payudara adalah adanya sebuah benjolan atau massa baru yang tidak menimbulkan rasa nyeri, keras dan mempunyai sisi-sisi yang tidak teratur. Kanker payudara bisa berbentuk bulat, lembut dan lunak (Pamungkas, 2011). Tanda dan gejala kanker payudara adalah sebagai berikut :

- a. Ada benjolan yang keras di payudara dengan atau tanpa rasa sakit.
- b. Membengkak pada semua atau bagian payudara.
- c. Bentuk puting berubah (retraksi *nipple* atau terasa sakit terus-menerus) atau puting mengeluarkan cairan atau darah (*nipple discharge*).
- d. Adanya benjolan-benjolan kecil di dalam atau kulit payudara (nodul satelit).
- e. Ada luka puting di payudara yang sulit sembuh.
- f. Payudara terasa panas, memerah dan bengkak.
- g. Terasa sakit atau nyeri (bisa juga bukan karena sakit kanker payudara).
- h. Benjolan yang keras itu tidak bergerak (terfiksasi) dan biasanya pada awal-awalnya tidak terasa sakit.
- i. Apabila benjolan itu kanker, awalnya biasanya hanya pada satu payudara.
- j. Adanya benjolan di aksila dengan atau tanpa massa di payudara.
- k. Berwarna kemerahan, bersisik atau menebal pada kulit puting atau payudara.

Pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) mempunyai akurasi untuk membedakan ganas atau jinak sekitar 60%-80% (*error* 20%-40%) oleh karenanya memerlukan pemeriksaan tambahan (Suyatno dan Emir, 2010).

5. Faktor Risiko Kanker Payudara

Kanker payudara tidak seperti kanker leher rahim (*serviks*) yang dapat diketahui etiologi dan perjalanan penyakitnya secara jelas, penyakit kanker payudara belum dapat dijelaskan. Akan tetapi, banyak penelitian yang menunjukkan adanya beberapa faktor yang berhubungan dengan peningkatan risiko atau kemungkinan untuk terjadinya kanker payudara, faktor-faktor tersebut disebut faktor risiko. Wanita yang memiliki faktor risiko belum tentu wanita tersebut pasti akan menderita kanker payudara, tetapi faktor tersebut akan meningkatkan kemungkinan untuk terkena kanker payudara. Faktor risiko yang utama, berhubungan dengan keadaan hormonal (estrogen dominan) dan genetik. Penyebab terjadinya keadaan estrogen dominan karena beberapa faktor risiko di bawah ini dan dapat digolongkan berdasarkan :

a. Faktor demografik

1) Jenis kelamin

Insiden kanker payudara pada wanita dibandingkan pria lebih dari 100:1. Umumnya, 1 dari 9 wanita akan menderita kanker payudara sepanjang hidupnya (Pamungkas, 2011).

2) Usia

Semakin tua usia seorang wanita, maka semakin tinggi risiko untuk menderita kanker payudara. Kategori usia yang paling berisiko terkena kanker payudara yaitu pada usia 50-69 tahun (Mulyani & Rinawati, 2013). Secara anatomi dan fungsional, payudara akan mengalami atrofi dengan bertambahnya usia, kurang dari 25% kanker payudara terjadi sebelum *menopause* sehingga

diperkirakan awal terjadinya tumor jauh sebelum terjadinya perubahan klinis (Utami, 2012).

Kanker payudara merupakan penyakit yang dikaitkan dengan adanya paparan hormon, sehingga kanker payudara lebih banyak ditemukan pada wanita usia tua karena wanita yang berusia tua akan mengalami paparan hormon lebih panjang dibanding dengan wanita usia muda (Utami, 2012).

3) Ras

Wanita kulit putih lebih kecil kemungkinan terkena penyakit kanker payudara dibanding wanita Afrika-Amerika. Hal ini dikarenakan wanita Afrika-Amerika memiliki pertumbuhan tumor yang lebih cepat (Pamungkas, 2011).

4) Status pernikahan

Wanita yang menikah pada usia dimana 30 tahun dan melahirkan anak pertama pada usia diatas 35 tahun memiliki risiko yang lebih besar terkena penyakit kanker payudara, karena pada periode diantara usia *menarche* sampai usia kehamilan pertama terjadi ketidakseimbangan hormon dan jaringan payudara sangat peka akan hal itu. Sehingga periode ini merupakan permulaan dari perkembangan kanker payudara (Rasjidi, 2009).

b. Faktor genetik

Mutasi yang paling banyak terjadi pada kanker payudara adalah pada gen BRCA 1 dan BRCA 2. Sel yang normal, gen ini membantu mencegah terjadinya kanker dengan jalan menghasilkan protein yang dapat mencegah pertumbuhan abnormal. Wanita dengan mutasi pada gen BRCA 1 dan BRCA 2, mempunyai peluang 80% untuk berkembang menjadi kanker payudara selama hidupnya. Perlu diketahui bahwa kanker payudara dan ovarium mempunyai hubungan yang dekat secara genetik. Wanita dengan mutasi pada gen BRCA 1 dan BRCA 2, tidak

hanya berisiko untuk kanker payudara saja, tetapi juga mempunyai peluang yang sama untuk terjadinya kanker ovarium (Rasjidi, 2010).

Rasjidi (2009) menyatakan pada masyarakat umum yang tidak dapat memeriksa gen dan faktor proliferasinya, maka riwayat kanker pada keluarga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker payudara adalah:

- 1) Tiga atau lebih keluarga dari sisi keluarga yang sama terkena kanker payudara atau ovarium.
- 2) Dua atau lebih keluarga dari sisi yang sama terkena kanker payudara atau ovarium usia di bawah 40 tahun.
- 3) Adanya keluarga dari sisi yang sama terkena kanker payudara dan ovarium.
- 4) Adanya riwayat kanker payudara bilateral pada keluarga.
- 5) Adanya riwayat kanker payudara pada pria dalam keluarga.

c. Konsumsi alkohol

Hubungan antara peningkatan risiko kanker payudara dengan konsumsi alkohol lebih kuat diperoleh pada wanita *pascamenopause*. Beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi alkohol akan meningkatkan jumlah estrogen pada urin dan mulut, dimana *hyperinsulinemia* akan merangsang faktor pertumbuhan pada jaringan payudara (*insulin-like growth factor*) (Rasjidi, 2010).

d. Kurang aktivitas fisik

Penelitian dari *women's health initiative* menemukan bahwa aktivitas fisik pada wanita *menopause* sekitar 30 menit per harinya dapat menurunkan 20% risiko kanker payudara pada wanita dengan berat badan normal. Namun, aktivitas fisik yang dikombinasikan dengan diet sehat dapat menurunkan berat badan sehingga pada akhirnya dapat menurunkan jumlah risiko kanker payudara dan penyakit lainnya (Mulyani & Rinawati, 2013).

e. Pola makan yang tidak sehat

Pola makan yang tidak sehat, terutama konsumsi makanan cepat saji (*junk food*), makanan yang dibakar/diasap, maupun makanan yang tinggi lemak. Makanan *junk food* umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat adiktif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa kepada makanan tersebut yang dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, makanan cepat saji/instant yang diawetkan mengandung zat sodium nitrat yang dapat membentuk komponen sejenis zat karsinogenik yaitu nitrosamine yang mempunyai potensi menimbulkan kanker (Mardiah dkk, 2006).

Makanan yang dibakar atau diasap dimana arang mengandung zat karsinogenik yaitu *benzo (a) pyrene* yang merupakan produk dari pembakaran kayu atau arang yang masuk ke dalam daging, ikan, ayam dan makanan lainnya dimana jika masuk ke dalam tubuh dapat berikatan dengan DNA sel kemudian dapat menyebabkan mutasi sel yang selanjutnya dapat berubah menjadi sel kanker (Mardiah dkk, 2006).

Menurut Utami (2012), konsumsi lemak yang berlebih diperkirakan sebagai salah satu faktor risiko terjadinya kanker payudara. Wanita dengan berat badan berlebih memiliki risiko kanker payudara lebih besar setelah *menopause*. Hal ini dikarenakan, setelah *menopause* ovarium akan berhenti menghasilkan esterogen dan esterogen akan dihasilkan oleh jaringan lemak. Apabila seorang wanita mempunyai jaringan lemak yang berlebih setelah *menopause* akan meningkatkan produksi esterogen yang berlebih juga yang dapat meningkatkan perkembangan sel kanker payudara (Pamungkas, 2011).

dan kondisi manusia itu sendiri. Makanan yang baik juga tidak mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia sehingga tidak merusak jaringan dalam tubuhnya. Akhir ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar tidak mengikuti jejak syaitan. Syaitan adalah musuh manusia yang merayu manusia untuk tidak taat kepada Allah SWT, jiwanya keras dan makanan yang dimakannya yakni makanan haram. Orang yang memasukkan kedalam perutnya makanan yang tidak halal akan berdampak buruk pada kesehatan dan ibadahnya.

6. Pencegahan Kanker Payudara

a. Pencegahan primer

- 1) Promosi dan edukasi pola hidup sehat.
- 2) Menghindari faktor risiko (riwayat keluarga, tidak punya anak, tidak menyusui, riwayat tumor jinak sebelumnya, obesitas, kebiasaan tinggi lemak kurang serat, perokok aktif dan pasif).

b. Pencegahan sekunder:

- 1) SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri).
- 2) Pemeriksaan klinik payudara CBE (*Clinical Breast Examination*) untuk menemukan benjolan.
- 3) USG untuk mengetahui batas-batas tumor dan jenis tumor.
- 4) Mammografi untuk menemukan adanya kelainan sebelum adanya gejala tumor dan adanya keganasan.

c. Pencegahan tersier

- 1) Pelayanan di Rumah Sakit (diagnosa dan pengobatan).
- 2) Perawatan paliatif.

7. Diagnosis Kanker Payudara

a. Anamnesis dan pemeriksaan fisik

Anamnesis dan pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengidentifikasi identitas penderita, faktor risiko, perjalanan penyakit, tanda dan gejala, riwayat pengobatan dan riwayat penyakit yang pernah diderita. Setelah faktor risiko untuk kanker payudara ditentukan, pasien kemudian diperiksa untuk *symptom* yang spesifik. Nyeri payudara dan *nipple discharge* adalah keluhan yang sering, tapi tidak selalu penanda kanker, kelainan jinak seperti *fibrocystic disease* dan *papilloma intraduktal* juga bergejala seperti ini. *Malaise*, nyeri tulang dan kehilangan berat badan adalah keluhan yang jarang, tapi merupakan indikasi adanya metastasis jauh (Suyatno dan Emir, 2010).

b. Ultrasonografi (USG) payudara

USG bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari mammografi, selain itu USG juga berperan dalam evaluasi metastasis ke organ *visceral* (Suyatno & Emir, 2010).

c. Mammografi

Mammografi memegang peranan mayor dalam deteksi dini kanker payudara, yaitu sekitar 75% kanker terdeteksi satu tahun sebelum muncul gejala. *Skining mammografi* direkomendasikan setiap 1-2 tahun untuk wanita 40 tahun dan setiap tahun untuk wanita usia 50 tahun atau lebih (Suyatno & Emir, 2010).

d. *Magnetic resonance imaging* (MRI)

MRI berguna dalam skining pasien usia muda dengan densitas payudara yang padat, yang memiliki risiko kanker payudara tinggi. Sensitivitas MRI

mencapai 98%, namun spesifitasnya rendah, biaya pemeriksaan mahal dan waktu pemeriksaan yang lama (Suyatno & Emir, 2010).

e. Biopsy

Pemeriksaan ini memberikan informasi sitologi dan hispatologi yang sangat berguna untuk evaluasi lesi kistik (Suyatno & Emir, 2010).

f. Bone scan, foto toraks, USG abdomen

Pemeriksaan *bone scan* bertujuan untuk evaluasi metastasis ditulang, namun pemeriksaan ini tidak dianjurkan pada stadium dini yang asimtomatis karena hanya 2% hasil yang positif pada kondisi ini, berbeda dengan simtomatis stadium III yang mencapai 25%.

Foto toraks dan USG abdomen bertujuan untuk melihat adanya metastasis di paru, pleura, mediastinum dan organ *visceral* (Suyatno & Emir, 2010).

8. Penatalaksanaan Kanker Payudara

a. Mastektomi

Mastektomi adalah pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat payudara. Tipe mastektomi dan penanganan kanker payudara bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, kesehatan secara menyeluruh, status *menopause*, dimensi tumor, tahapan tumor dan seberapa luas penyebarannya, stadium tumor dan keganasannya status reseptor hormon tumor dan penyebaran tumor, apakah telah mencapai simpul limfe atau belum (Pamungkas, 2011).

b. Kemoterapi

Kemoterapi adalah penggunaan obat anti kanker untuk menghancurkan sel kanker. Obat ini umumnya bekerja dengan menghambat atau mengganggu sintesa DNA dalam siklus sel. Pengobatan kemoterapi bersifat sistemik, berbeda dengan pembedahan atau radiasi yang lebih bersifat *local*. Obat sitostatika dibawa melalui

aliran darah atau diberikan langsung ke dalam tumor, jarang menembus *blood brain barrier* sehingga obat ini sulit mencapai sistem saraf pusat (Suyatno dan Emir, 2010).

c. Terapi Radiasi

Radiasi ionisasi digunakan untuk mengganggu pertumbuhan seluler. Terapi radiasi juga dapat digunakan untuk mengontrol penyakit malignasi bila tumor tidak dapat diangkat secara pembedahan atau bila ada metastasis pada nodus lokal. Tumor radiosensitif adalah tumor yang dapat dihancurkan oleh dosis radiasi yang masih memungkinkan sel normal untuk beregenerasi dalam jaringan normal. Radiasi dapat diberikan pada letak tumor baik dengan mekanisme.

d. Hormonal Terapi

Sel kanker menunjukkan reaksi positif terhadap hormon tertentu. Ada yang progesteron reseptor, ada pula estrogen reseptor. Sel kanker semacam itu tumbuh cepat apabila mendapat asupan hormon tersebut. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka diperlukan terapi hormon (Nurchahyo, 2010).

e. Biologik (*targeted*) Terapi

Targeted Therapy adalah pemberian obat yang secara khusus ditargetkan untuk menghambat pertumbuhan protein tertentu. Ada beberapa jenis sel kanker yang merupakan sekumpulan senyawa protein yang terus tumbuh membesar dan menjalar (Nurchahyo, 2010).

B. Tinjauan Tentang Kualitas Hidup

1. Definisi Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah ukuran subjektif yang menggambarkan kebahagiaan dan kebebasan bagi individu dan seberapa baik buruknya seseorang (Merrian, 2017). Kualitas hidup juga merupakan pengukuran terhadap pasien penyakit kronis, sejauh mana dia dapat beraktivitas secara normal meskipun dalam pengobatan, seberapa banyak penyakit yang diderita mengganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya (Taylor, 2012).

Pengukuran kualitas hidup penting dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk membantu dalam berkomunikasi untuk mencari masalah yang muncul dalam hidup pasien sehingga dapat memberikan intervensi untuk proses penyembuhan pasien, misalnya depresi merupakan salah satu masalah besar pada pasien kanker pada umumnya (Suryo, 2009).

WHO telah mengembangkan instrument pengukuran kualitas hidup secara umum yakni WHOQOL-100 dan WHOQO-BREF. WHO mendefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kehidupan mereka dalam konteks budaya dan nilai kehidupan (WHO, 1999).

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Hidup

Faktor-faktor berikut yang akan memengaruhi kualitas hidup manusia menurut Pradono (2017) :

- a. Usia

Usia yang bertambah pada seseorang secara psikologis akan meningkatkan kualitas hidup seseorang.

b. Jenis kelamin

Perempuan lebih cenderung memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan lebih dapat mengontrol emosi dan dapat menghadapi masalah dibandingkan dengan laki-laki.

c. Pendidikan

Faktor pendidikan akan memengaruhi kualitas hidup seseorang jika semakin tinggi pendidikan seseorang maka pola pikir yang dimiliki mampu mengantisipasi terhadap penurunan kualitas hidup.

d. Pekerjaan

Seseorang yang memiliki pekerjaan akan lebih baik hidupnya dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

e. Perilaku berisiko

Seseorang yang memiliki kebiasaan seperti merokok, minum alkohol, aktivitas fisik yang kurang, pola makan yang tidak baik, akan berpengaruh pada emosi dalam diri sehingga hal tersebut akan menurunkan kualitas hidup.

f. Penyakit kronis

Penyakit kronis dapat termasuk pada perawatan paliatif, dimana seseorang yang mempunyai penyakit kronis seperti kanker stadium lanjut akan menimbulkan kecemasan hingga depresi yang berpengaruh pada kualitas hidup dirinya.

g. Gangguan mental

Seseorang dengan kecemasan dan depresi berat akan berpengaruh pada penurunan kualitas hidup orang tersebut.

C. Tinjauan Tentang Posttraumatic Growth

1. Definisi *Posttraumatic Growth* (PTG)

Beragam peristiwa yang terjadi di dunia berpotensi traumatis bagi manusia. Peristiwa traumatis dapat disebabkan oleh kekejaman manusia itu sendiri, meliputi pemerkosaan, stigmatisasi identitas, kekerasan dan perang. Peristiwa alamiah seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami), kematian orang terdekat dan diagnosis penyakit mematikan juga dapat menjadi pengalaman traumatis dalam kehidupan manusia (Basham, 2011).

Istilah traumatis memiliki dasar kata trauma, yakni berasal dari Bahasa Yunani yang berarti luka, baik untuk luka fisik maupun psikologis karena serangan emosi yang ekstrim (Reber & Reber, 2010). Sedangkan traumatis merupakan pengalaman dahsyat dan menggoncangkan jiwa (KBBI, 2008). Calhoun dan Tedeschi (1998) menggunakan istilah krisis, trauma, serta peristiwa traumatis dalam suatu pemahaman yang sama, yaitu untuk menjelaskan suatu kejadian yang tidak terbayangkan, tidak terkontrol, mengancam, bahkan membahayakan kondisi individu. Suatu kejadian dapat dianggap traumatis apabila mengguncang pandangan hidup dan fungsi emosional individu.

Peristiwa traumatis dapat mengakibatkan berbagai reaksi negatif, meliputi stres yang tampak dalam gangguan emosi, gangguan pemikiran, perilaku bermasalah dan distress yang berdampak pada kesehatan, serta kemungkinan

mengalami gangguan psikiatri (Calhoun & Tedeschi, 1998). Joseph dan Linley (2008) menambahkan bahwa individu yang pernah mengalami kejadian traumatis memiliki kemungkinan untuk mengembangkan keputusasaan, ketidakberdayaan, depresi bahkan kepribadian *borderline*.

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah : 155-157

۞ اِنَّا لَنَنبِئُكَ بِمَا تَعْمَلُ ۝۱۵۵
 ۞ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا عَمِلُوْا ۝۱۵۶
 ۞ اِنَّا لَنَنبِئُكَ بِمَا تَعْمَلُ ۝۱۵۷

Terjemahnya :

“(155) Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (156) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (157) mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”
 (Departemen agama RI, 2010)

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yaitu, dan kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta karena kesulitan dalam mendapatkannya atau hilang dari jiwa dengan terjadinya kematian atau mati syahid di jalan Allah dan dengan berkurangnya buah-buahan kurma, anggur dan biji-bijian karena sedikitnya hasil panen atau rusak dan berilah kabar gembira wahai Nabi, kepada orang-orang yang

bersabar dalam menghadapi persoalan ini dan persoalan-persoalan yang serupa, dengan apa yang membahagiakan mereka dan menyenangkan mereka berupa kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yaitu, dan diantara karakter (sifat) orang-orang yang sabar itu, bahwa sesungguhnya mereka itu ketika ditimpa sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka mengatakan “sesungguhnya kami adalah hamba sahaya milik Allah, di bawah pengaturan perintah dan kendaliNya. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya pada kami dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya melalui kematian dan kebangkitan untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasannya”.

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar dalam surah Al-Baqarah ayat 157 yaitu, orang-orang yang bersabar itu, mereka mendapatkan pujian dari Tuhan mereka dan rahmat agung dari-Nya dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk menuju jalan yang lurus.

Individu yang telah mengalami peristiwa traumatis tidak selalu berakhir menyedihkan dengan beragam kemungkinan gangguan. Peristiwa traumatis juga dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mempercepat perkembangan atau pertumbuhan menjadi manusia yang lebih positif, baik secara individual atau berkelompok (Tedeschi, Park & Calhoun, 1998).

Tedeschi dan Calhoun (dalam Schmidt, 2008) membuka sebuah area penelitian baru yang melihat reaksi positif yang dihasilkan dari suatu traumatik yakni dikenal dengan istilah *Posttraumatic Growth* (PTG). Konsep ini menuju pada perubahan besar yang terjadi pada persepsi seseorang tentang kehidupannya setelah orang tersebut berjuang menghadapi krisis yang terjadi. Individu ini tidak hanya sekedar kembali pada keadaan sebelumnya, tetapi menggunakan trauma

sebagai “sebuah kesempatan untuk perkembangan diri selanjutnya” (Zoellner & Maecker, dalam Schmidt, 2008).

Posttraumatic Growth (PTG) merupakan cabang psikologi positif dimana memandang manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik pasca mengalami kejadian traumatis. PTG bukan hanya kembali kesediakala tetapi juga mengalami peningkatan psikologis yang baik bagi setiap orang. Peningkatan tersebut terlihat dari tiga aspek yang berkembang, yaitu persepsi diri, hubungan dengan orang lain dan falsafah hidup (Tedeschi dan Calhoun, 2004).

PTG memiliki dua pengertian penting. Pertama, Tedeschi & Calhoun menyatakan bahwa PTG dapat terjadi saat seseorang mengalami kejadian yang sangat tidak diinginkan atau tidak menyenangkan. Tingkat stres yang rendah dan proses perkembangan yang normal tidak berhubungan dengan timbulnya PTG. Kedua, perubahan positif yang hanya akan terjadi setelah seseorang melakukan perjuangan, perjuangan ini merujuk pada penerimaan masa lalu dan masa kedepannya dalam kehidupan yang terjadi segera setelah mengalami trauma yang berat (Schmidt, 2008).

Dalam kamus psikologi, *self acceptance* (penerimaan diri) didefinisikan sebagai sebuah sikap seseorang menerima dirinya, sebuah pengakuan realistik terhadap keterbatasan dan rasa puas yang penuh akan talenta maupun keterbatasan dirinya (Arthur, 2010). Penerimaan diri juga berarti kemampuan seseorang untuk mengakui kenyataan diri secara apa adanya.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ
*رواه الطبرانی

Artinya :

“Dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi wassalam bersabda : tetaplah qona’ah (menerima apa adanya), sesungguhnya qona’ah merupakan harta yang tidak akan habis”

Qona’ah berasal dari Bahasa Arab yang berarti cukup, merasa cukup ataupun menerima apa adanya. Qona’ah bukan hanya menerima apa adanya tanpa ada usaha selanjutnya. Berapapun hasil usaha, sedikit atau banyak ia menerimanya dengan lapang dada atau rasa syukur. Jadi, orang yang qona’ah adalah orang yang telah berusaha maksimal dan menerima hasil usahanya tersebut dengan rasa syukur dan ada usaha untuk mencapai yang lebih baik lagi, namun bukan berarti serakah ataupun rakus terhadap dunia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin.

Setiap manusia dikaruniai anugerah kelebihan-kelebihan tertentu, tapi yang semua orang bisa miliki adalah kejujuran, keberanian, ketekunan, kemurahan hati dan kerendahan diri. Hal tersebut tidak lahir dengan sendirinya, namun dari diri kita yang mau mengembangkan kelebihan-kelebihan tersebut. Jika kita memiliki kemauan untuk mengembangkan diri kita, maka kita akan bersyukur, senang dan bangga menerima diri kita.

Hal ini sesuai dengan pengertian dari sikap penerimaan diri yaitu dimana kita menerima segala kelemahan yang kita miliki atau menerima segala sesuatu yang ada dalam diri kita, menerima segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan dan diri kita. Sehingga sikap kita memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan memperlakukan diri kita secara baik disertai dengan rasa syukur, senang dan bangga sambil terus mengusahakan kemajuan.

Adapun firman Allah SWT dalam QS Ar-Ra’d/13:11

رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ لَهُمْ آيَاتُنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَذْيَبًا مُّجِئًا
 لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ لَهُمْ آيَاتُنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَذْيَبًا مُّجِئًا
 لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ لَهُمْ آيَاتُنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Istilah PTG menangkap inti dari fenomena yang terjadi dibandingkan dengan istilah lain karena :

- a. PTG terjadi secara khusus pada beberapa kejadian yang *stressful* dibandingkan pada kejadian dengan level stres yang rendah.
- b. PTG disertai dengan transformasi perubahan kehidupan.
- c. PTG merupakan hasil dari pengalaman traumatik bukan suatu bentuk mekanisme koping dalam menghadapi pengalaman traumatik.
- d. PTG merupakan perkembangan atau kemajuan dari kehidupan seseorang (Linley & Joseph, 2004).

PTG digambarkan sebagai pengalaman individu yang berkembang setelah mengalami kejadian traumatik, setidaknya pada beberapa area. Individu tersebut tidak hanya *survive* tetapi juga memiliki perubahan dari keadaan sebelumnya. PTG tidak hanya kembali pada keadaan semula (normal), tetapi juga merupakan sebuah perbaikan kehidupan yang pada beberapa orang terjadi dengan sangat luar biasa.

PTG bukan merupakan hasil langsung yang terjadi setelah pengalaman traumatik. PTG merupakan perjuangan individu dalam menghadapi realita baru setelah mengalami kejadian traumatik. Kejadian psikologis yang “mengguncang” dapat menyiksa atau mengurangi pemahaman seseorang dalam memahami sesuatu, mengambil keputusan dan perasaan berarti. Kejadian yang “mengguncang” dapat membuat seseorang menganggap bahwa kejadian tersebut merupakan suatu tantangan yang berat, melakukan penyangkalan atau mungkin kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang terjadi, penyebab dan alasan kejadian tersebut terjadi dan dugaan abstrak seperti apa tujuan dari kehidupan

manusia. Setelah mengalami kejadian yang “mengguncang” seseorang akan membangun kembali proses kognitifnya.

2. Aspek *Posttraumatic Growth*

Calhoun & Tedeschi menyebutkan perubahan dalam diri seseorang pasca traumatik yang juga merupakan elemen PTG antara lain :

a. *Appreciation for Life* (penghargaan terhadap hidup)

Merupakan perubahan mengenai hal apa yang penting dalam hidup seseorang. Perubahan yang mendasar adalah perubahan mengenai prioritas hidup seseorang yang juga dapat meningkatkan penghargaan kepada hal-hal yang dimilikinya, misalnya menghargai kehidupannya. Perubahan prioritas tersebut misalnya senyuman anak atau waktu yang dihabiskan untuk bermain bersama anak. “*even the smallest joys in life took on a special meaning*”.

b. *Relating to Others* (hubungan dengan orang lain)

Merupakan perubahan seperti hubungan yang lebih dekat dengan orang lain, lebih intim dan lebih berarti. Seseorang mungkin akan memperbaiki hubungan dengan keluarga atau temannya. Misalnya pada orang tua yang kehilangan anaknya menyatakan bahwa ia lebih empati terhadap siapapun yang sedang sakit dan siapapun yang sedang mengalami kesedihan.

c. *Personal Strength* (kekuatan dalam diri)

Merupakan perubahan yang berupa peningkatan kekuatan personal atau mengenal kekuatan diri yang dimilikinya. Misalnya pada orang tua yang kehilangan anaknya menyatakan “saya dapat mengatur semuanya dengan lebih baik. Hal-hal yang menjadi suatu masalah yang besar sekarang menjadi masalah yang tidak begitu besar bagi saya”.

d. *New Possibilities* (peluang baru)

Merupakan identifikasi individu mengenai kemungkinan baru dalam kehidupan atau kemungkinan untuk mengambil pola kehidupan yang baru dan berbeda. Sebagai contoh misalnya seseorang yang mengalami kehilangan orang tersayang karena suatu penyakit memengaruhi dirinya untuk berjuang menghadapi kesedihan dan menjadikan dirinya seorang suster. Menurutny, menjadi seorang suster ia dapat mencoba memberikan kepedulian dan rasa nyaman pada orang lain yang mengalami penderitaan dan kehilangan. Beberapa orang memperlihatkan ketertarikan yang baru, aktivitas baru dan mungkin memulai pola kehidupan baru yang signifikan.

e. *Spiritual Development* (perkembangan spiritual)

Merupakan perubahan berupa perkembangan pada aspek spiritualitas dan hal-hal yang bersifat eksternal. Individu yang tidak *religious* atau tidak memiliki agama juga dapat mengalami PTG. Mereka dapat mengalami pertempuran yang hebat dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendasar atau pertempuran tersebut mungkin dijadikan sebagai pengalaman PTG.

3. Karakteristik *Posttraumatic Growth*

Aldwin dan Sutton (1998) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kecenderungan khas (karakteristik) yang nampak pada orang yang *posttraumatic growth*. Karakteristik yang dimaksud antara lain peningkatan dalam mengatasi permasalahan, harga diri dan kepercayaan diri, perubahan perspektif serta peningkatan dalam pengetahuan diri.

a. Peningkatan dalam mengatasi permasalahan

Individu yang telah berdamai dengan pengalaman traumatis akan cenderung mengalami peningkatan dalam mengatasi permasalahan. Pengatasan atau

penanganan permasalahan merupakan salah satu hasil proses belajar dari pengalaman traumatis. Keterampilan menangani permasalahan diperoleh dari proses yang melibatkan percobaan (*trial and error*), pencarian informasi dan saran serta pengamatan pada orang dengan permasalahan yang sama.

b. Peningkatan harga diri dan kepercayaan diri

Harga diri dan kepercayaan diri cenderung meningkat pada orang yang mengalami *posttraumatic growth*. Hal ini dapat terjadi karena adanya dampak positif dari kemampuan menangani permasalahan yang semakin berkembang. Perkembangan dalam menangani permasalahan dapat membuat individu semakin lihai dalam mencapai tujuan, dalam mengurangi tekanan psikologis dan fisiologis serta perbaikan dalam interaksi sosial.

c. Perubahan perspektif

Orang-orang yang mengalami *posttraumatic growth* sering menyatakan adanya perubahan perspektif, baik dalam hierarki nilai-nilai atau persepsi tentang situasi traumatis. Contoh yang sering nampak yaitu pada orang-orang yang mengalami situasi yang mengancam jiwa, seperti diagnosis penyakit kronis. Mereka lebih menghargai keluarga dan kesehatannya. Selain itu, perubahan perspektif juga melibatkan peningkatan empati dan perubahan persepsi bahwa hambatan selain peristiwa traumatis bukanlah masalah yang besar atau cenderung lebih diabaikan.

d. Peningkatan dalam pengetahuan diri

Kondisi stres, terutama peristiwa traumatis, seringkali menciptakan ketidakpastian yang justru dapat membuat individu semakin memahami dirinya dan berusaha merekonstruksi diri. Rekonstruksi dilakukan dengan mengubah skema kognitif dan membentuk struktur baru. Peningkatan dalam pengetahuan

diri pada individu yang mengalami *posttraumatic growth* berawal dari menyadari kondisinya, kemudian diikuti dengan kemauan dalam memperbaiki diri.

4. Faktor-faktor *Posttraumatic Growth*

Posttraumatic growth tidak dapat dialami oleh individu yang terpapar trauma secara langsung, karena ia harus mengalami serangkaian proses dengan pengaruh dari beberapa faktor. Calhoun dan Tedeschi (dalam Ramos & Leal, 2012) mengemas beberapa faktor *posttraumatic growth* ke dalam faktor lingkungan atau eksternal dan faktor karakteristik individual atau internal.

a. Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal *posttraumatic growth* yang meliputi tingkat tekanan dari trauma, dukungan sosial dan sosiokultural atau kebudayaan dijelaskan sebagai berikut.

1) Tingkat tekanan dari trauma

Tingkat tekanan dari trauma salah satu bagian penting yang memengaruhi tingkat *posttraumatic growth*. Semakin besar trauma yang dirasakan, maka semakin besar kecenderungan individu untuk melakukan pemrosesan kognitif yang memegang peran penting *posttraumatic growth*, yakni dengan pembentukan kembali asumsi atau pandangan mengenai kehidupannya.

Calhoun dan Tedeschi (1998) menjelaskan bahwa trauma merupakan pandangan hidup serta kemampuan emosional individu yang terganggu karena adanya peristiwa yang mengguncang atau traumatis. Peristiwa traumatis dapat meliputi penculikan, perampokan, kekerasan, kehilangan seseorang, diagnosis penyakit kronis dan memiliki anggota keluarga yang bunuh diri. Terdapat beberapa kualitas peristiwa traumatis yang berpengaruh terhadap proses

posttraumatic growth, antara lain peristiwa yang tidak diharapkan, dipercaya tidak dapat dikontrol, melibatkan ancaman yang membahayakan fisik dan merupakan kejadian tidak biasa. Kualitas peristiwa traumatis lainnya yaitu dampak negatif yang berulang dan berjangka panjang, rentan untuk mengalami perkembangan.

2) Dukungan sosial

Tedeschi dan Colhoun (2004) menekankan bahwa pengalaman dukungan sosial sangat berpotensi untuk memfasilitasi pembentukan dan peningkatan *posttraumatic growth* pada individu yang mengalami trauma. Dukungan sosial dapat diperoleh dari berbagai kelompok sosial, komunitas dan kelompok dukungan. Pengaruh dukungan sosial terhadap *posttraumatic growth* dapat melalui peningkatan perspektif diskusi, penawaran keyakinan dan penggunaan metaphor atau kiasan, seperti dalam karya seni untuk mengungkapkan pengalaman trauma. Orang-orang dapat mempelajari cara berfikir dan pemahaman terhadap peristiwa traumatis, serta cara mengatasi permasalahan dari berinteraksi dengan pada *survivor* di dalam kelompok tersebut. Sejalan dengan penjelasan dimana, Urbayatun (dalam Urbayatun & Widhiarso, 2012) membuktikan bahwa dukungan sosial dapat digunakan sebagai variabel moderator hubungan antara peristiwa traumatis dengan *posttraumatic growth*. Dukungan sosial terbukti memiliki peran yang memperkuat dan memperlemah pertumbuhan pada orang yang telah mengalami trauma.

Ramos dan Leal (2012) menjelaskan bahwa hubungan antara dukungan sosial dengan *posttraumatic growth* dapat dianggap sebagai proses dua arah. *Survivor* dapat mengalami pertumbuhan karena dampak dari dukungan sosial, sebaliknya *posttraumatic growth* juga membuat individu mencari dukungan sosial.

3) Pengaruh sosiokultural

Tedeschi dan Calhoun (2004) menekankan untuk mengupas faktor budaya yang dapat berpengaruh dalam proses pembentukan *posttraumatic growth*. Pengaruh budaya dapat digolongkan menjadi pengaruh *proximate* dan *distal*.

Tedeschi dan Calhoun (2004) menjelaskan bahwa pengaruh budaya *proximate* merupakan pengaruh dari kelompok tertentu, seperti keluarga, teman, kelompok keagamaan dan kelompok dukungan sebaya sangat dibutuhkan bagi penderita untuk mengalami *posttraumatic growth*. Kelompok dukungan sebaya merupakan suatu kelompok yang dikhususkan untuk membantu penderita traumatik supaya lebih menerima atau berdamai dengan kondisi traumatis mereka.

Distal ialah pengaruh dari kecenderungan kebudayaan dalam suatu daerah, seperti budaya barat dan timur atau individu dan kolektif. Orang-orang dari kebudayaan barat meyakini bahwa mereka memiliki potensi yang lebih besar dalam mengontrol segala kejadian di kehidupannya. Oleh karena itu, mereka akan cenderung fokus pada kepribadian atau kualitas diri dalam mencari penyebab traumatis. Sedangkan orang-orang dari kebudayaan timur memiliki keyakinan besar bahwa mereka harus beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi. Keyakinan tersebut membuat mereka lebih mudah memandang peristiwa traumatis sebagai peristiwa yang diluar kuasanya. Adaptasi sering dilakukan dengan penemuan makna dibalik peristiwa yang tidak terduga.

Kecenderungan pemrosesan kognitif pada budaya timur, membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan kejadian traumatis yang dialami. Pemrosesan kognitif terutama pada domain perenungan, memiliki peran keberhasilan pengelolaan distres emosi karena trauma.

Dampak dari perenungan secara reflektif terhadap *posttraumatic growth* juga dibuktikan oleh beberapa penelitian di Indonesia. Perenungan reflektif merupakan perilaku memikirkan peristiwa traumatis dengan cara introspeksi diri

atau mawas diri. Hafnidar, Chang dan Lin (2012) membuktikan bahwa spiritualitas memiliki keterkaitan dengan *posttraumatic growth* melalui mediator pemaafan pada masyarakat Aceh sebagai *survivor* pengalaman trauma konflik Aceh. Masyarakat Aceh memiliki keyakinan kuat dengan ajaran islam bahwa Allah memiliki kedudukan Maha Tinggi memaafkan kesalahan manusia bahkan yang terburuk sekalipun. Maka, melalui perenungan terhadap ajaran tersebut, manusia juga harus memaafkan kesalahan orang lain dan pemaafan diyakini sebagai jalan untuk mengalami pertumbuhan setelah peristiwa traumatis.

b. Faktor internal

Faktor internal merupakan salah satu kumpulan faktor dari dalam individu yang dapat memengaruhi pembentukan *posttraumatic growth*, meliputi karakteristik personal, manajemen distres, gaya koping dan pengungkapan emosi diri. Faktor internal dijelaskan sebagai berikut.

1) Karakter personal

Tedeschi dan Calhoun (2004) menemukan perbedaan *posttraumatic growth* yang ditinjau dari kecenderungan kepribadian. Orang dengan kepribadian *ekstrovert* dan terbuka pada pengalaman (*openess to experience*) memiliki kecenderungan besar untuk mengalami pertumbuhan setelah masa trauma. Terkait kepribadian lain, yaitu neurotik memiliki hubungan namun bersifat lemah, sebaliknya terkait keramahan (*agreeableness*) dan kesadaran (*conscientiousness*) tidak memiliki hubungan dengan *posttraumatic growth*. Hal ini dapat dipahami bahwa orang yang memiliki kecenderungan *ekstrovert* dan terbuka dengan pengalaman akan mencari dukungan sosial, akan lebih mudah memperoleh dan menerima bantuan untuk menuju kondisi *recover* dan pertumbuhan.

Selain itu, Tedeschi dan Calhoun (2004) juga menemukan bahwa optimisme memiliki hubungan positif dengan skor *posttraumatic growth inventory*. Orang dengan kecenderungan optimis lebih mudah untuk menemukan manfaat positif dibalik kejadian traumatis yang ia alami. Optimisme memengaruhi proses *posttraumatic growth*, terutama dalam proses kognitif. Individu yang optimis cenderung lebih mudah untuk memfokuskan perhatian dan sumber-sumbernya pada hal-hal penting dalam hidupnya.

2) Manajemen distres

Peristiwa *stressfull* atau traumatis dapat dipastikan membawa distres bagi individu (Calhoun dan Tedeschi, 1998). Selye (dalam Everly & Lating, 2002) menjelaskan bahwa peristiwa menekan yang dialami telah melampaui batas optimal dari tingkatan kemampuan adaptif individu terhadap stres, maka individu berada dalam area distres. Seiring memasuki area distres, individu juga mengalami penurunan performa/kesehatan dan *well being* secara umum. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa individu memerlukan manajemen distres untuk meminimalisir dampak negatifnya, *recover* dan mencapai *posttraumatic growth*.

Individu yang terpapar peristiwa traumatis seringkali terganggu dengan pikiran dan imaginasi mengenai trauma. Terutama pada tahap awal pengelolaan distres, pikiran dan imaginasi muncul secara otomatis dan cenderung negatif. Meskipun demikian, pada tahap lanjutan pengelolaan distres efektif mendorong individu mengalami *posttraumatic growth*.

Hal tersebut terjadi melalui perenungan (proses kognitif) reflektif yang melibatkan kesadaran terhadap perubahan dan kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah yang baru (Tedeschi & Calhoun, 2004).

3) Gaya koping

Linley dan Joseph (2004) melakukan studi empiris dengan mereview 39 dokumen yang terkait perubahan diri positif setelah trauma. Berdasarkan hasil review tersebut, mereka menemukan bahwa faktor pola mengatasi masalah tertentu sangat berkaitan dengan tingkat pertumbuhan. *Problem focused coping* (penanganan berfokus pada masalah) dan *emotional focus coping* (penanganan berfokus pada emosi) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan. Penanganan berfokus pada masalah yang dimaksud meliputi penerimaan, reinterpretasi secara positif dan penanganan positif dengan keagamaan. Sedangkan penanganan berfokus pada emosi melibatkan dukungan emosi positif.

Hasil review tersebut senada dengan penelitian Urbayatun (2012) mengenai peranan stresor terhadap pertumbuhan pasca trauma pada 274 *survivor* gempa dengan kecacatan fisik yang terjadi tahun 2006 di Bantul, Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 tersebut melibatkan keterampilan pengatasan masalah dan dukungan sosial yang masing-masing digunakan sebagai variabel mediator dan moderator. Variabel tersebut signifikan dalam memengaruhi hubungan antara stres dan *posttraumatic growth*. Pengentasan masalah dapat dijadikan sebagai perantara bagi individu untuk mengalami pertumbuhan setelah terpapar peristiwa traumatis.

4) Pengungkapan emosi diri

Pengungkapan pengalaman trauma dan pemberian dukungan kepada *survivor* lain dapat membuat individu menciptakan perspektif perubahan

dan kemudian terintegrasi menuju perubahan skema. Ketika individu menceritakan kejadian trauma, ia juga mengungkapkan sisi emosional dari pengalamannya. Hal ini membuat individu merasa lebih dekat dan lebih diterima orang lain, lebih mudah berdamai dengan pengalaman traumatisnya, hingga memperoleh perspektif baru untuk mengalami perubahan. Selain itu, cerita mengenai perubahan ini dapat menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi *survivor* lain untuk memulai perubahan yang bermanfaat (Tedeschi & Calhoun, 2004).

Ramos dan Leal (2012) merangkum teori dari beberapa tokoh dan mengemasnya menjadi faktor-faktor yang berhubungan dengan proses *posttraumatic growth*. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu distres, karakteristik pribadi atau kepribadian, pengungkapan emosi, strategi koping, dukungan sosial, karakteristik lingkungan, asumsi dunia, gaya ruminasi, spiritualitas atau religiusitas dan optimisme. Berikut ini akan dibahas beberapa faktor yang belum tercakup dalam penjelasan sebelumnya.

a. Distres

Ramos dan Leal (2012) menjelaskan bahwa pengalaman traumatis merupakan kejadian negatif yang melibatkan distres, kerentanan dan keyakinan bahwa peristiwa tidak dapat diprediksi dan kurang terkontrol dalam kehidupan individu. Distres merupakan dampak negatif dari kejadian traumatis yang meliputi distres emosi (kecemasan, ketakutan, perasaan bersalah dan kemarahan) dan distres pemikiran (terkejut, ketidakpercayaan dan penurunan harga diri).

Selain itu, distres dapat terwujud dalam perilaku bermasalah (peningkatan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, perilaku menarik diri) serta kemungkinan gangguan fisik (lelah, nyeri persendian dan kepala). Gangguan psikologis ekstrim yang meliputi area gangguan psikiatri dapat terjadi namun memiliki kemungkinan yang kecil (Tedeschi & Calhoun, 1998).

Calhoun dan Tedeschi (1998) menekankan bahwa individu yang mengalami *posttraumatic growth* bukan berarti absen dari distres atau tidak mengalami distres sama sekali. Beberapa *survivor* dapat mengelola emosi mereka dengan kuat, namun suatu saat juga dapat terhanyut dalam emosinya. Hal ini menunjukkan bahwa distres dan *posttraumatic growth* merupakan hasil yang masih dapat berkembang dengan iringan distres sebagai stimulasi untuk melakukan pemrosesan kognitif (Tedeschi & Calhoun, 2004).

b. Karakteristik lingkungan atau demografi

Tiga faktor demografi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan yaitu gender, usia dan tingkat pendidikan. Linley dan Joseph (2004) melalui studi empirisnya menyatakan bahwa wanita, anak muda, serta orang-orang dengan pendidikan dan pendapatan tinggi melaporkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya.

c. Keyakinan/dunia yang diasumsikan (*assumptive belief/assumptive world*)

Tedeschi dan Calhoun (2004) menyatakan bahwa setiap orang mengembangkan dan mendasarkan pada serangkaian keyakinan umum serta asumsi mengenai kehidupan yang mendorongnya untuk bertindak. Keyakinan dan asumsi kehidupan dapat membantu individu untuk memahami penyebab peristiwa traumatis terjadi, membantu pemaknaan dan penyusunan tujuan.

Trauma terjadi apabila keyakinan dan asumsi kehidupan individu oleh adanya krisis kehidupan atau yang disebut sebagai kejadian mengguncang. Guncangan terhadap asumsi kehidupan meliputi ancaman terhadap prediksi dan kontrol pada dunianya, serta keamanan, identitas dan masa depan individu (Tedeschi & Calhoun, 2004).

d. Gaya ruminasi atau pemrosesan kognitif

Kegigihan dalam ruminasi atau pemrosesan kognitif merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembentukan *posttraumatic growth*. Tedeschi dan Calhoun (2004) menggunakan istilah pemrosesan kognitif untuk menjelaskan perenungan yang dapat mendorong *survivor* trauma menuju pertumbuhan. Perenungan yang dimaksud meliputi pertanyaan eksistensial seperti apa yang sedang terjadi dan bagaimana mengatasi sesuatu hal yang tidak terkontrol.

Pemrosesan kognitif melibatkan mekanisme pelepasan tujuan dan asumsi-asumsi dasar yang diyakini tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian, disusul dengan pembangunan skema, tujuan, serta makna baru dalam kehidupan individu yang mengalami trauma (Tedeschi & Calhoun, 2004). Orang-orang yang sengaja melakukan pemrosesan kognitif setelah beberapa waktu menjalani trauma akan mudah mengalami pertumbuhan (Tedeschi & Calhoun, 1998).

Pemrosesan kognitif dapat difasilitasi melalui beberapa kegiatan, yaitu menulis jurnal, bercerita atau berdoa. Selain itu, pemrosesan kognitif dapat diperoleh melalui pengungkapan diri di lingkungan sosial yang mendukung (Tedeschi & Calhoun, 2004).

e. Spiritualitas atau religiusitas

Beberapa dekade yang lalu, fenomena mengenai penemuan manfaat positif dibalik penderitaan lebih dikenal dalam konstruk spiritualitas, bahkan dalam beberapa ajaran kepercayaan diberbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, religiusitas dan spiritualitas memiliki hubungan positif dengan penemuan manfaat diantara berbagai populasi orang yang mengalami trauma dan penyakit (Joseph & Linley, 2008).

Hal ini juga sesuai dengan beberapa hasil penelitian mengenai religiusitas dan *posttraumatic growth* berikut ini. Calhoun, Cann, Tedeschi dan McMillan (2000) membuktikan bahwa religiusitas sangat berkaitan dengan pertumbuhan


setelah melalui masa trauma. Shaw, Joseph dan Linley (2008) menemukan tiga hal yang berkaitan dengan peran religiusitas terhadap *posttraumatic growth* melalui studi empiris 11 penelitian. Hasil penemuan tersebut antara lain religiusitas dan spiritualitas bermanfaat sebagai strategi penanganan pasca trauma dan pendorong individu untuk semakin mendekati agamanya. Meta analisis tersebut membuktikan bahwa orang-orang yang *posttraumatic growth* menerapkan coping positif agama, terbuka dengan agama, siap menghadapi pertanyaan eksistensial. Selain itu, mereka lebih berpartisipasi dalam kegiatan agama dan tingkat keagamaan yang telah dimiliki lebih tinggi dibandingkan sebelum trauma. Linley dan Joseph (2004) mengambil sebuah kesimpulan dari studi dokumen bahwa religiusitas memiliki peran dalam mendorong individu untuk mengalami pertumbuhan setelah trauma.

5. Proses *Posttraumatic Growth*

Joseph dan Linley (2008) menjelaskan proses *posttraumatic growth* secara khusus yaitu dengan membedakan arah pemrosesan kognitif-kognitif yang dikemas dalam teori penilaian organisme. Teori penilaian organisme muncul berdasarkan ketiga asumsi berikut, pertama ialah *posttraumatic growth* dapat dipahami sesuai dengan kerangka psikososial. Kedua, teori ini mendasarkan pada meta teori yang terpusat pada manusia, yakni dengan pemahaman bahwa orang-orang cenderung termotivasi secara intrinsik untuk menuju pertumbuhan. Ketiga, teori yang dibangun dalam lingkup literatur psikologi positif baru ini menyajikan teori yang lebih mendetail mengenai hubungan antara proses penilaian dan kepribadian. Gambar dan uraian berikut memberikan pemahaman rinci mengenai proses *posttraumatic growth* yang dipandang melalui teori penilaian organisme.

Individu yang telah mengalami peristiwa traumatis akan merasa tertantang dengan adanya informasi baru dan mengancam. Tantangan dari peristiwa traumatis ini diistilahkan sebagai peristiwa pencetus. Peristiwa pencetus bahkan dapat menghancurkan asumsi-asumsi awal individu mengenai kehidupannya. Kemudian, ia akan menjalani dan menyelesaikan siklus *posttraumatic stress* yang memiliki kerangka terintegrasi dengan *posttraumatic growth*. *Posttraumatic stress* adalah konsep dari Joseph, William dan Yule (dalam Joseph & Linley, 2008) yang menjelaskan proses adaptasi trauma dengan komponen utama yang tertera dalam skema berikut.

- a. Siklus *posttraumatic stress* bermula ketika respon awal individu terhadap kejadian traumatis terwujud dalam bentuk *event cognition*, yakni representasi mengenai kejadian traumatis baik secara disadari atau tidak disadari.
- b. Berdasarkan *event cognition*, mekanisme penilaian berjalan. Mekanisme penilaian dapat berupa pemrosesan kognitif yang terkontrol (disadari) atau otomatis (tidak disadari) yang menunjukkan kebutuhan untuk pemrosesan kognitif emosi. Kecepatan dan kedalaman pemrosesan kognitif emosi dipengaruhi oleh kepribadian, representasi memori serta lingkungan sosialnya.
- c. Proses penilaian selalu dipengaruhi oleh kondisi emosi yang tertekan, sehingga individu cenderung menerapkan *coping* guna mengelola emosi dan memahami pengalaman traumatis yang terjadi. Proses *coping* dapat terjadi di dalam konteks sosial karena mengingat dampak negatif trauma sangat besar, sehingga dukungan dari orang lain sangat dibutuhkan.



Gambar 2.1 Kerangka kerja psikososial reaksi *posttraumatic stress*

Sumber : (Joseph, William dan Yule, 1997). Adaptasi dari “*positive psychological perspectives on posttraumatic stress: An integrative psychosocial framework*” oleh S. Joseph, & P.A. Linely, 2008.

Keterlibatan komponen-komponen dalam siklus ini melaju dengan arah yang terkunci atau selalu berputar melalui komponen-komponen yang terlibat tanpa terdapat ujung siklusnya. Resolusi dari perputaran yang tidak berujung tersebut terletak pada perubahan dalam representasi kognitif. Oleh karena itu, peran dari komponen-komponen dalam siklus *posttraumatic stress* tidak berhenti setelah individu menerima kondisinya. Siklus tersebut akan berlanjut sebagai proses pencetus perubahan yang terwujud melalui dampak tiga keluaran kognisi. Keluaran kognisi yang dimaksud yaitu asimilasi, akomodasi negatif dan akomodasi positif yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Asimilasi

KBBI (2008) mendefinisikan asimilasi sebagai peleburan atau penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Senada dengan definisi tersebut, Joseph dan Linley (2008) menyatakan bahwa usaha individu dalam memahami informasi baru dan mengancam melalui asumsi awal, dapat menyebabkan peleburan antara informasi dan asumsi. Ulasan tersebut menunjukkan bahwa asimilasi akan mengarahkan individu pada asumsi-asumsi awal atau asumsi-asumsi sebelum masa trauma (pratrauma).

b. Akomodasi

Berkebalikan dengan asimilasi, istilah akomodasi lebih merujuk pada sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan (KBBI, 2008). Joseph dan Linley (2008) menjelaskan bahwa akomodasi tercipta ketika individu menilai dan menerima peristiwa traumatis, yakni dengan memahami bahwa informasi


baru dan mengancam tidak lagi sesuai dengan asumsi awal. Akomodasi membuat individu terdorong untuk merubah pandangannya, seperti tewujud dalam pemikiran bahwa kehidupan tidak selalu dapat ditebak dan hal-hal buruk pasti dapat terjadi kapan saja. Akomodasi pada tiap individu trauma dapat dialami dalam dua jalur berbeda, yakni secara negatif atau positif.


1) Akomodasi negatif

Akomodasi negatif diprediksikan dapat membuat individu mengubah keyakinan (*belief*) menjadi semakin negatif. Akibatnya, individu semakin mengembangkan diri menuju psikopatologi seperti depresi, keputusan dan ketidakberdayaan ataupun kepribadian *borderline*.

2) Akomodasi positif

Akomodasi positif mendorong individu mencapai tahap pertumbuhan diri, seperti merasa lebih mampu menghargai hidup dan interaksi dengan orang lain. Perubahan positif membuat individu menikmati hidup dengan manjalani sepenuh hati, mengedepankan pemikiran di sini dan sekarang.





Gambar 2.2 Skema teori penilaian organisme

Sumber :Adaptasi dari “*positive psychological perspectives on posttraumatic stress : An intergrative psychosocial framework*” oleh S. Joseph, & P. A. Linely, 2008


Asimilasi dan akomodasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan skema kepribadiannya. Skema kepribadian kaku akan menyulitkan individu untuk menerima informasi yang bertentangan dengan *belief* awal dan mendorong individu menuju alur asimilasi. Individu akan rentan mengalami *posttraumatic stress*. Sebaliknya, individu yang mengakomodasi informasi baru akan melibatkan diri pada perubahan kepribadian. Perubahan yang terjadi sangat tergantung dengan alur akomodasi informasi, yakni akomodasi negatif akan mendorong individu kepada perubahan menuju psikopatologi atau menuju pertumbuhan.

Uraian tersebut merupakan penjelasan khusus mengenai perbedaan arah atau proses pengolahan kognitif. Pengolahan kognitif atau disebut sebagai pemrosesan kognitif atau ruminasi merupakan salah satu komponen dari berbagai komponen lain yang menyusun *posttraumatic growth*.

Selain dapat dipengaruhi, *posttraumatic growth* yang telah terbentuk dapat memengaruhi faktor-faktor tersebut dan dampaknya dapat semakin memengaruhi tingkat *posttraumatic growth*. Alasan ini membuat Tedeschi dan Calhoun (2004) yakin bahwa *posttraumatic growth* meliputi proses sekaligus hasil.

setiap individu memiliki perbedaan keyakinan asumsi mengenai kehidupan terkait dengan karakter dan sumber kepribadiannya. Ketika individu terpapar peristiwa traumatis, tidak dipungkiri ia akan mengalami tekanan emosi yang berdampak negatif (*distress*) sebagai efek dari pengalaman traumatis (Calhoun & Tedeschi, 1998).

D. Kerangka Teori







Gambar 2.3 Skema Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi dari Mardiana (2007), Price and Wilson (2005), Shaheen dkk (2011) dan Tedeschi & Calhoun (2004)

Keterangan :



E. Kerangka Konsep



Gambar 2.4 Skema Kerangka Konsep

Keterangan :

 : variabel independen

 : variabel dependen



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu pengumpulan data dari sampel baik tentang distribusi karakteristik dan hubungan antar variabel.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di RSUD Kota Makassar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14, Kota Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Juli-September 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode analitik observasional dengan menggunakan desain studi *Cross Sectional*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan sesaat atau dalam suatu periode waktu tertentu dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian (Machfoedz, 2007).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan pasca operasi penyakit kanker payudara yang terdaftar dalam rekam medik di RSUD Kota Makassar Bulan Januari 2018 s/d April tahun 2019 dan berdomisili di Kota Makassar yaitu sebanyak 50 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien pasca operasi kanker payudara yang tercatat dalam rekam medik RSUD Kota Makassar Bulan Januari 2018 s/d April 2019 yaitu sebanyak 50 orang.

3. Teknik pengambilan sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara *total sampling*, dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 50 sampel.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berupa data-data dan keluhan serta gangguan kesehatan dilokasi tempat penelitian dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan rekam medik RSUD tempat penelitian seperti data gambaran umum rumah sakit, jumlah pasien kanker payudara dan lain-lain. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku referensi, skripsi, jurnal dan bersumber dari internet.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang memberikan suatu serangkaian pertanyaan yang telah ditulis dan responden tinggal memilih jawaban yang benar atau salah (Sugiyono, 2012).

Alat ukur yang digunakan yakni kuesioner *Quality of Life* (QOL-BREF) yaitu alat ukur kualitas hidup dan kuesioner *posttraumatic growth inventory* (PTGI). Kuesioner kualitas hidup pasien kanker payudara terdiri dari 24 pertanyaan yang menggunakan skala likert dimana memuat tentang kualitas hidup secara menyeluruh, kesehatan fisik, psikologis, sosial dan lingkungan. Sedangkan kuesioner *posttraumatic growth* dalam penelitian ini terdiri dari 21 pertanyaan yang menggunakan skala guttman dimana memuat tentang aspek penghargaan terhadap hidup, hubungan dengan orang lain, kekuatan dalam diri, peluang baru dan perkembangan spiritual.

Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, kuesioner diuji kevaliditas dan realibilitasnya terlebih dahulu.

1. Uji validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. penelitian ini menggunakan uji validitas dengan bantuan program *SPSS for windows*, dikatakan valid jika nilai

$$r_{hitung} > r_{tabel} \text{ dengan } \alpha=5\%. r \text{ tabel.}$$

2. Uji realibilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat atau instrument pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kuesioner atau angket dikatakan reliabilitas jika memiliki nilai alpha (α) minimal 0,7 (Notoatmodjo, 2012).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. *Data Coding* (Mengkode Data)

Kode data dilakukan dengan memberi kode pada tiap jawaban responden. Pemberian kode dimaksudkan untuk memudahkan dalam memasukkan data.

b. *Data Editing* (Mengedit Data)

Pada tahap ini peneliti memeriksa kelengkapan data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kelengkapannya terlebih dahulu, yaitu kelengkapan jawaban kuesioner, konsistensi atas jawaban dan kesalahan jawaban pada kuesioner.

c. *Data Entry* (Memasukkan Data)

Daftar pertanyaan yang telah dilengkapi dengan pengisian kode jawaban selanjutnya dimasukkan kedalam program *software* SPSS pada komputer untuk dilakukan analisis univariat dan bivariat.

d. *Data Cleaning* (Membersihkan Data)

Pembersihan data merupakan proses terakhir dalam pengolahan data yang berfungsi untuk mengecek kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan data tersebut tidak ada yang salah, sehingga dengan demikian data tersebut telah siap diolah dan dianalisis.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan suatu analisis untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan proporsi dari variabel dependen dan independen yang ada pada penelitian ini.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara faktor independen dengan faktor dependen. Analisis yang digunakan menggunakan uji statistik *Correlation* dengan nilai 0,05.

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan probabilitas kejadiannya. Jika *p value* $>0,05$ maka H_0 diterima dan H_A ditolak, yang berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Sebaliknya, jika *p value* $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat hubungan antara kedua variabel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Rumah Sakit

a. Sejarah singkat dan landasan umum RSUD Kota Makassar

RSUD Kota Makassar merupakan rumah sakit yang terletak di wilayah pemerintah Kecamatan Biringkanaya, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Daya. Dulunya RSUD Kota Makassar merupakan sebuah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan untuk wilayah Biringkanaya. Pada tahun 2002, terbit surat izin rumah sakit dari Dirjen Yanmedik Nomor : HK. 01. 021. 2. 4474 tanggal 28 Oktober 2002 yang diikuti oleh SK Walikota Makassar Nomor : 50 pada tanggal 6 November 2002.

RSUD Kota Makassar adalah rumah sakit tipe B berdasarkan sertifikat kelas rumah sakit umum tipe B keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK. 03. 05/I/1043/12 pada tanggal 20 Juli 2002, yang memberikan pelayanan spesialis dan subspecialis terbatas. RSUD Kota Makassar juga menerima rujukan lanjutan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.

Luas bangunan RSUD Kota Makassar yakni sebesar 12.663 m^3 yang terdiri dari :

1) Gedung A

Terdiri dari ruang kantor dan rekam medik dengan luas 3.200 m^3 dan jumlah tempat tidur sebanyak 272 unit.

2) Gedung B

Terdiri dari ruang UGD, ICU, ICCU, laboratorium, radiologi dan rawat inap dengan luas 3.804 m^3 dan jumlah tempat tidur sebanyak 130 unit.

3) Gedung C

Terdiri dari ruang poliklinik, kantin dan rawat inap dengan luas 3.584 m^3 dan jumlah tempat tidur sebanyak 123 unit.

4) Gedung D

Terdiri dari ruang *laundry*, dapur, sanitasi dan rawat inap dengan luas 8.039 m^3 dan jumlah tempat tidur sebanyak 19 unit.

RSUD Kota Makassar memiliki total 659 tenaga kerja yang terdiri dari 269 PNS, 239 tenaga kontrak dan 140 tenaga sukarela, ditambah dengan 11 orang dokter tamu dan selebihnya merupakan tenaga non-medis.

b. Visi dan misi RSUD Kota Makassar

1) Visi RSUD Kota Makassar

Rumah Sakit Dengan Pelayanan Yang Aman Dan Nyaman Menuju Standar Kota Dunia

2) Misi RSUD Kota Makassar

- a) Mendukung visi dan misi pemerintah kota dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
- b) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di seluruh unit pelayanan.
- c) Melengkapi peralatan medis dan non-medis dengan teknologi kedokteran mutakhir.
- d) Mengadakan dan mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit.
- e) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi.

- f) Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang lebih moderen.
- g) Meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan rumah sakit.

2. Hasil Univariat

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dideskripsikan dengan analisis univariat yang hasilnya nanti memberi gambaran umum mengenai responden.

a. Karakteristik Responden

1) Usia

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia pada Pasien Kanker
Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar
Tahun 2019

Usia	Frekuensi	%
22-32	4	11,8
33-43	6	17,6
44-54	12	35,3
55-65	8	23,5
66-76	4	11,8
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai distribusi responden berdasarkan usia pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, responden yang paling banyak telah melakukan operasi kanker payudara berusia sekitar 44-45 tahun yakni sebanyak 12 responden (35,3%) dan yang paling sedikit berusia sekitar 22-32 tahun dan 66-76 tahun yakni masing-masing sebanyak 4 responden (11,8%).

2) Status perkawinan

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan pada Pasien
Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar
Tahun 2019

Status Perkawinan	Frekuensi	%
Menikah	23	67,6
Janda	8	23,5
Tidak/belum menikah	3	8,8
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai distribusi responden berdasarkan status perkawinan pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden yang telah menikah yakni sebanyak 23 responden (67,6%) dan yang belum menikah yakni sebanyak 3 responden (8,8%).

3) Agama

Hasil penelitian mengenai distribusi responden berdasarkan agama pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, semuanya beragama islam.

4) Suku

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Suku pada Pasien Kanker
Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar
Tahun 2019

Suku	Frekuensi	%
Makassar	17	50,0
Bugis	16	47,1
Mandar	1	2,9
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai distribusi responden berdasarkan suku pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden bersuku Makassar yakni sebanyak 17 responden (50%) dan responden yang bersuku Mandar yakni sebanyak 1 responden (2,9%).

5) Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
SD	5	14,7
SMA	12	35,3
Sarjana	17	50,0
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden menyelesaikan pendidikan setingkat perguruan tinggi yakni sebanyak 17 responden (50%) dan yang menyelesaikan pendidikan setingkat SD yakni sebanyak 5 responden (14,7%).

6) Pekerjaan

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Pekerjaan	Frekuensi	%
IRT	20	58,8
PNS	4	11,8
Wiraswasta	4	11,8
Pegawai swasta	3	8,8
Pelajar	3	8,8
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.5 mengenai distribusi responden berdasarkan pekerjaan pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden bekerja sebagai IRT yakni sebanyak 20 responden (58,5%) dan yang bekerja sebagai pelajar dan pegawai swasta masing-masing sebanyak 3 responden (8,8%).

7) Penghasilan

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan/Bulan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Penghasilan	Frekuensi	%
<Rp 500.000	7	20,6
Rp 501.000-Rp 1.000.000	14	41,2
Rp 1.001.000-Rp 2.000.000	5	14,7
>Rp 2.000.000	8	23,5
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.6 mengenai distribusi responden berdasarkan penghasilan per bulan pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden memiliki penghasilan Rp 501.000-Rp 1.000.000 per bulan yakni sebanyak 14 responden (41,2%) dan yang memiliki penghasilan Rp 1.001.000-Rp 2.000.000 per bulan yakni sebanyak 5 responden (14,7%).

8) Lama menderita

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menderita pada Pasien
Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar
Tahun 2019

Lama Menderita (Tahun)	Frekuensi	%
1-3	15	44,1
4-6	13	38,2
7-9	4	11,8
10-12	2	5,9
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.7 mengenai distribusi responden berdasarkan lama menderita pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden menderita kanker payudara selama 1-3 tahun yakni sebanyak 15 responden (44,1%) dan yang menderita kanker payudara selama 10-12 tahun yakni sebanyak 2 responden (5,9%).

9) Jenis terapi yang diperoleh

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Terapi yang Diperoleh
pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD
Kota Makassar Tahun 2019

Jenis Terapi	Frekuensi	%
Pembedahan dan kemoterapi	29	85,3
Pembedahan	4	11,8
Pembedahan, kemoterapi dan suntik <i>hormone</i>	1	2,9
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.8 mengenai distribusi responden berdasarkan jenis terapi yang diperoleh pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden telah menjalani terapi pembedahan dan kemoterapi yakni sebanyak

29 responden (85,3%) dan yang telah menjalani terapi pembedahan, kemoterapi dan suntik *hormone* yakni sebanyak 1 responden (2,9%).

10) Jumlah operasi yang telah dilakukan

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Operasi yang Telah Dilakukan pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Jumlah Operasi (Kali)	Frekuensi	%
2	20	58,8
3	9	26,5
1	5	14,7
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.9 mengenai distribusi responden berdasarkan jumlah operasi yang telah dilakukan pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 reponden, sebagian besar responden telah menjalani operasi sebanyak 2 kali yakni 20 responden (58,8) dan responden yang telah menjalani operasi sebanyak 1 kali yakni 5 responden (14,7%).

11) Jarak operasi terakhir

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Operasi Terakhir pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Jarak Operasi (Bulan)	Frekuensi	%
24	7	20,6
12	18	52,9
9	3	8,8
8	3	8,8
7	1	2,9
6	2	5,9
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.10 mengenai distribusi responden berdasarkan jarak operasi terakhir pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden memiliki jarak operasi terakhir selama 1 tahun yakni sebanyak 18 responden (52,9%) dan yang memiliki jarak operasi terakhir selama 7 bulan yakni sebanyak 1 responden (2,9%).

b. Kualitas Hidup Responden

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Kualitas Hidup	Frekuensi	%
Baik	17	50
Buruk	17	50
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.11 mengenai distribusi responden berdasarkan kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden yang memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 17 responden (50%).

c. Aspek Posttraumatic Growth Responden

1) Hubungan dengan orang lain (*relating to others*)

Tabel 4.12
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Dengan Orang Lain (*relating to others*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Hubungan Dengan Orang Lain	Frekuensi	%
Baik	17	50
Buruk	17	50
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.12 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan dengan orang lain (*relating to others*) pada pasien kanker

payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden memiliki hubungan dengan orang lain yang baik yakni sebanyak 17 responden (50%).

2) Peluang baru (*new possibilities*)

Tabel 4.13
Distribusi Responden Berdasarkan Peluang Baru (*new possibilities*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Peluang baru	Frekuensi	%
Baik	22	64,7
Buruk	12	35,3
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.13 mengenai distribusi responden berdasarkan peluang baru (*new possibilities*) pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden memiliki peluang baru yang baik yakni sebanyak 22 responden (64,7%).

3) Kekuatan dalam diri (*personal strength*)

Tabel 4.14
Distribusi Responden Berdasarkan Kekuatan Dalam Diri (*personal strength*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Kekuatan Dalam Diri	Frekuensi	%
Baik	26	76,5
Buruk	8	23,5
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai distribusi responden berdasarkan kekuatan dalam diri (*personal strength*) pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian

besar responden memiliki kekuatan dalam diri yang baik yakni sebanyak 26 responden (76,5%).

4) Pembangunan spiritual (*spiritual change*)

Tabel 4.15
Distribusi Responden Berdasarkan Pengembangan Spiritual
(*spiritual change*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca
Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Pengembangan Spiritual	Frekuensi	%
Baik	26	76,5
Buruk	8	23,5
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.15 mengenai distribusi responden berdasarkan pengembangan spiritual (*spiritual change*) pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden memiliki pengembangan spiritual yang baik yakni sebanyak 26 responden (76,5%).

5) Penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*)

Tabel 4.16
Distribusi Responden Berdasarkan Penghargaan Terhadap Hidup
(*appreciation of life*) pada Pasien Kanker Payudara Pasca
Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Penghargaan Terhadap Hidup	Frekuensi	%
Baik	26	76,5
Buruk	8	23,5
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.16 mengenai distribusi responden berdasarkan penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*) pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian responden memiliki penghargaan terhadap hidup yang baik yakni sebanyak 26 responden (76,5%).

6) *Posttraumatic Growth*

Tabel 4.17
Distribusi Responden Berdasarkan Aspek *Posttraumatic Growth* pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

<i>Posttraumatic Growth</i>	Frekuensi	%
Positif	17	50
Negatif	17	50
Total	34	100

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.17 mengenai distribusi responden berdasarkan *posttraumatic growth* pada pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 34 responden, sebagian besar responden yang memiliki *posttraumatic growth* positif yakni sebanyak 17 responden (50%).

3. Hasil Bivariat

- a. Hubungan hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara

Tabel 4.18
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Dengan Orang Lain (*Relating To Others*) Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Hubungan dengan Orang Lain	Kualitas Hidup				Total		<i>p</i> value	CI (95%)	RP
	Baik	Buruk	Baik	Buruk	N	%			
	n	%	n	%					
Baik	13	38,2	4	11,8	17	50	0,006	1,54-1,99	3,3
Buruk	4	11,8	13	38,2	17	50			
Total	17	50	17	50	34	100			

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.18 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari

total 17 responden yang memiliki hubungan dengan orang lain dan kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 13 responden (38,2%), sedangkan dari total 17 responden yang memiliki hubungan dengan orang lain dan kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 13 responden (38,2%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara hubungan dengan orang lain terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,006$. Karena nilai $p<0,005$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara hubungan dengan orang lain terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi. Nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki hubungan dengan orang lain serta kualitas hidup yang baik yakni 1,54 sampai 1,99, sedangkan nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki hubungan dengan orang lain serta kualitas hidup yang buruk yakni 1,01 sampai 1,46 yang menunjukkan bahwa ($CI > 1$) berarti terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan dengan orang lain terhadap kualitas hidup pasien. Nilai $RP=3,3$ yang berarti responden yang memiliki hubungan dengan orang lain baik memiliki peluang 3,3 kali lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki hubungan dengan orang lain yang buruk. Hasil sensitivitas menunjukkan hasil 76,5% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 76,5%. Sedangkan hasil spesifitas menunjukkan hasil 76,5% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 76,5%.

- b. Hubungan peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara

Tabel 4.19
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Peluang Baru (*New Possibilities*) Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Peluang Baru	Kualitas Hidup				Total		<i>p</i> value	CI (95%)	RP
	Baik		Buruk		N	%			
	n	%	n	%					
Baik	16	47	6	17,6	22	64,6		1,82-2,07	
Buruk	1	3	11	32,4	12	35,4	0,001	1,10-1,61	9
Total	17	50	17	50	34	100			

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.19 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 22 responden yang memiliki peluang baru dan kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 16 responden (47%), sedangkan dari total 12 responden yang memiliki peluang baru dan kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 11 responden (32,4%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan peluang baru terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,001$. Karena nilai $p < 0,005$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara peluang baru terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi. Nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki peluang baru serta kualitas hidup yang baik yakni 1,82 sampai 2,07, sedangkan nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki peluang baru serta kualitas hidup yang buruk yakni 1,10 sampai 1,61 yang menunjukkan bahwa (CI >1) berarti terdapat hubungan yang bermakna antara peluang baru terhadap

kualitas hidup pasien. Nilai $RP=9$ yang berarti responden yang memiliki peluang baru baik memiliki peluang 9 kali lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki peluang baru yang buruk. Hasil sensitivitas menunjukkan hasil 94,1% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 94,1 %. Sedangkan hasil spesifitas menunjukkan hasil 35,3% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 35,3%.

- c. Hubungan kekuatan dalam diri (*personal strength*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara

Tabel 4.20
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Kekuatan Dalam Diri
(*Personal Strength*) Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker
Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar
Tahun 2019

Kekuatan Dalam Diri	Kualitas Hidup				Total		<i>p</i> value	CI (95%)	RP
	Baik	Buruk	Baik	Buruk	N	%			
Baik	16	11	47	32,3	27	79,3	0,040	1,82-2,07	4,2
Buruk	1	6	3	17,7	7	20,7			
Total	17	17	50	50	34	100			

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.20 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan kekuatan dalam diri (*personal strength*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 27 responden yang memiliki kekuatan dalam diri dan kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 16 responden (47%), sedangkan dari total 7 responden, yang memiliki kekuatan dalam diri dan kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 6 responden (17,7%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara kekuatan dalam diri terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi menggunakan

uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,040$. Karena nilai $p<0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kekuatan dalam diri terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi. Nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki kekuatan dalam diri serta kualitas hidup yang baik yakni 1,82 sampai 2,07, sedangkan nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki kekuatan dalam diri serta kualitas hidup yang buruk yakni 1,33 ampai 1,85 yang menunjukkan bahwa (CI >1) berarti terdapat hubungan yang bermakna antara kekuatan dalam diri terhadap kualitas hidup pasien. Nilai $RP=4,3$ yang berarti responden yang memiliki kekuatan dalam diri baik memiliki peluang 4,2 kali lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan responden yang kekuatan dalam diri buruk. Hasil sensitivitas menunjukkan hasil 94,1% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang buru yakni sebanyak 94,1%. Sedangkan hasil spesifitas menunjukkan hasil 64,7% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 64,7%.

- d. Hubungan pengembangan spiritual (*spiritual change*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara

Tabel 4.21
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Pengembangan Spiritual
(*Spiritual Change*) Terhadap Kualitas Hidup pada Pasien Kanker
Payudara Pasca Operasi di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Pengembangan Spiritual	Kualitas Hidup				Total		<i>p</i> value	CI (95%)	RP
	Baik		Buruk		N	%			
Baik	16	47	10	29,4	26	85,3		1,82-2,07	
Buruk	1	3	7	20,6	8	14,7	0,043	1,33-1,85	4,7
Total	17	50	17	50	34	100			

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.21 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan perkembangan spiritual (*spiritual change*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 26 responden yang memiliki pengembangan spiritual dan kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 16 responden (47%), sedangkan dari total 8 responden yang memiliki pengembangan spiritual dan kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 7 responden (20,6%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara pengembangan spiritual terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,043$. Karena nilai $p<0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengembangan spiritual terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi. Nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki pengembangan spiritual serta kualitas hidup yang baik yakni 1,82 sampai 2,07, sedangkan nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki pengembangan spiritual serta kualitas hidup yang buruk yakni 1,33 sampai 1,85 yang menunjukkan bahwa (CI >1) berarti terdapat hubungan yang bermakna antara pengembangan spiritual terhadap kualitas hidup pasien. Nilai $RP=4,7$ yang berarti responden yang memiliki pengembangan spiritual baik memiliki peluang 4,7 kali lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki pengembangan spiritual yang buruk. Hasil sensitivitas menunjukkan hasil 94,1% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 94,1%.

Sedangkan hasil spesifitas menunjukkan hasil 58,8% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 58,8%.

- e. Hubungan penghargaan terhadap hidup (*appretiation of life*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara

Tabel 4.22
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Penghargaan Terhadap Hidup (*Appretiation Of Life*) Terhadap Kualitas Hidup Pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi Di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

Penghargaan Terhadap Hidup	Kualitas Hidup				Total		<i>p</i> value	CI (95%)	RP
	Baik	Buruk	Total	Total	<i>p</i> value	CI (95%)			
	n	%	n	%	N	%			
Baik	16	47	10	29,4	26	76,5	0,043	1,82-2,07	4,7
Buruk	1	3	7	20,6	8	23,5			
Total	17	50	17	50	34	100			

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.22 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan penghargaan terhadap hidup (*appretiation of life*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 26 responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup dan kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 16 responden (47%), sedangkan dari total 8 responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup dan kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 7 responden (40,6%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara penghargaan terhadap hidup dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi menggunakan uji statistika *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,043$. Karena nilai $p<0,05$ maka terdapat hubungan yang bermakna antara penghargaan terhadap hidup dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi. Nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup serta kualitas hidup yang baik yakni 1,82 sampai 2,07, sedangkan nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup serta kualitas hidup yang buruk yakni 1,33 sampai 1,58 yang menunjukkan bahwa (CI >1) berarti terdapat hubungan yang bermakna antara penghargaan terhadap hidup dengan kualitas hidup pasien. Nilai $RP=4,7$ yang berarti responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup baik memiliki peluang 4,7 kali lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup yang buruk. Hasil sensitivitas menunjukkan hasil 94,1% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 94,1%. Sedangkan hasil spesifitas menunjukkan hasil 58,8% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 58,8%.

- f. Hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara

Tabel 4.23
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pada Pasien Kanker Payudara Pasca Operasi Di RSUD Kota Makassar Tahun 2019

<i>Posttraumatic Growth</i>	Kualitas Hidup				Total		<i>p value</i>	<i>CI (95%)</i>	<i>RP</i>
	Baik		Buruk		N	%			
	n	%	n	%					
Baik	13	38,2	4	11,8	17	50	0,006	1,54-1,99	3,3
Buruk	4	11,8	13	38,2	17	50			
Total	17	50	17	50	34	100			

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.23 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa dari total 17 responden yang memiliki *posttraumatic growth* positif dan kualitas hidup baik yakni sebanyak 13 responden (38,2%), sedangkan dari total 17 responden yang memiliki *posttraumatic growth* negatif dan kualitas hidup yang buruk yakni sebanyak 13 responden (38,2%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p = 0,006$. Karena nilai $p < 0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pada pasien kanker payudara pasca operasi. Nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki *posttraumatic growth* serta kualitas hidup yang baik yakni 1,54 sampai 1,99, sedangkan nilai CI (95%) untuk responden yang memiliki *posttraumatic growth* serta kualitas hidup responden yang buruk yakni 1,01 sampai 1,46 yang menunjukkan bahwa (CI >1) berarti terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan dengan orang lain terhadap kualitas hidup pasien. Nilai $RP = 3,3$ yang berarti responden yang memiliki *posttraumatic growth* positif memiliki peluang 3,3 kali lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki *posttraumatic growth* yang negatif. Hasil sensitivitas menunjukkan hasil 76,5% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang uruk yakni sebanyak 76,5%. Sedangkan hasil spesifitas menunjukkan hasil 23,5% dimana orang yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik yakni sebanyak 23,5%.

B. Pembahasan

1. Hubungan antara penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*) dengan kualitas hidup.

Penghargaan terhadap hidup merupakan perubahan mengenai hal apa yang penting dalam hidup seseorang. Perubahan yang mendasar adalah perubahan mengenai prioritas hidup seseorang yang juga dapat meningkatkan penghargaan terhadap hal-hal yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh nilai $p\text{ value} = 0,015$ ($p\text{ value} < 0,05$) dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara penghargaan terhadap hidup dengan kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar.

Adapun penghargaan terhadap hidup yang penderita rasakan yaitu mereka lebih mampu menghargai kehidupan yang dapat mereka jalani saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tadeschi dan Calhoun (2004) yaitu penghargaan terhadap hidup penderita meningkat untuk nilai kehidupan sendiri serta rasa perlu meningkatkan prioritas tentang apa yang penting dalam hidupnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Zairoh (2018) mengenai *posttraumatic growth* pada wanita dewasa madya penderita kanker payudara dimana hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan positif menuju ke level yang lebih baik. Subjek dalam penelitian tersebut merubah hidupnya menjadi lebih penting dan berharga, penghargaan terhadap kesempatan baru yang diberikan Tuhan kepada subjek dalam penelitian tersebut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ade Fitri Rahmah (2011) yang menunjukkan bahwa menurut subjek dalam penelitian tersebut kehadiran penyakit kanker tersebut telah menyadarkannya bahwa yang namanya sehat memang tidak ternilai harganya, sehingga mereka lebih meningkatkan tingkat kepeduliannya dan lebih intens untuk memperhatikan kesehatannya dibanding sebelum terdiagnosa penyakit kanker payudara tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh pula responden yang telah melakukan operasi kanker payudara di RSUD Kota Makassar yang memiliki penghargaan terhadap hidup yang baik namun memiliki kualitas hidup buruk yakni sebanyak 29,4%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penderita memiliki riwayat menderita kanker payudara selama 1-3 tahun yakni sebanyak 44,1%. Terdapat 3 fase reaksi emosional penderita kanker ketika mengetahui bahwa penyakit yang dideritanya sudah stadium lanjut. Fase pertama, penderita kanker akan merasakan *shock* mental ketika dirinya diberitahu tentang penyakitnya, yaitu kanker payudara. Fase kedua, penderita kanker akan diliputi rasa takut dan depresi. Fase ketiga, akan muncul reaksi penolakan dan kemurungan, tidak yakin bahwa dirinya menderita kanker. Terkadang mereka menjadi panik dan melakukan hal-hal yang tidak berarti dan sia-sia.

Setelah fase ini berlalu, pada akhirnya penderita kanker akan sadar dan

menerima bahwa jalan hidupnya telah berubah. Sebagian penderita telah berpikir dan merasa lebih realistis dan mempercayakan sepenuhnya kepada dokter untuk melanjutkan pengobatannya (Hawari, dalam Ade Fitri Rahmah, 2011).

言言 双 三 七 天 人 人 天 从 言 二 二 人 言 天 天
 日 三 〇 人

Terjemahnya :

"... Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita.... "

(Departemen Agama RI, 2010)

Kebersaaan (*maiyyah*) Allah dengan makhluknya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, *maiyyah 'ammah* atau kebersamaan secara umum, yang bermakna pemeliharaan dan pengawasan. Kebersamaan ini berlaku bagi orang kafir dan muslim serta seluruh makhluk. Allah maha meliputi mereka. Allah SWT melihat mereka, mendengar mereka dan mengetahui perihal mereka. Kedua, *maiyyah khashah* atau kebersamaan yang khusus dan kebersamaan ini adalah kebersamaan Allah dengan kaum mukminin berupa pertolongan, penguatan, penjagaan dan perlindungan-Nya bagi mereka. Maka kebersamaan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebersamaan khusus bagi kaum mukminin dari kalangan para nabi dan rasul beserta para pengikut mereka.

2. Hubungan antara hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, salah satunya adalah dukungan sosial. Konsep dukungan sosial melibatkan adanya komunikasi antar kelompok. Penderita kanker payudara yang memiliki *support group* dapat saling bertukar informasi, mengekspresikan perasaan serta meningkatkan kemampuan coping individu. Manfaat lain yang diperoleh bagi penderita yaitu meningkatnya

semangat hidup dan tingkat spiritual meningkat. Penderita dapat meningkatkan kualitas hidupnya diantaranya nafsu makan meningkat dan tidak ada gangguan tidur (*American Cancer Society*, 2011).

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh nilai $p\text{ value} = 0,002$ ($p\text{ value} < 0,05$) dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan dengan orang lain terhadap kualitas hidup pasien. Penelitian lain dijelaskan bahwa, penderita kanker yang mempunyai hubungan sosial yang baik akan mampu beradaptasi secara lebih baik dengan penyakitnya. Selain itu, dukungan sosial mempunyai peran penting dalam perbaikan status kesehatan seseorang (Kaplan dalam Hanson, 1995).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sari (2016) pada perempuan yang terkena kanker payudara kelompok ibu rumah tangga maupun perempuan yang bekerja di kantor. Penelitian ini mengemukakan bahwa kedua kelompok tersebut merasakan manfaat positif dukungan sosial terhadap semangat kesembuhan mereka. Adanya dukungan sosial dari teman maupun keluarga mampu menghilangkan tekanan psikologis, rasa malu, sedih, putus asa dan merasa semangat menjalani pengobatan kanker payudara.

Lain halnya dengan penelitian Ozkan dan Ogze dalam Wayanti Wardiyah (2013) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga memiliki peran penting bagi pencegahan masalah psikologis yang kerap muncul pada pasien kanker payudara, dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga terhadap pasien dapat menurunkan depresi pasien, meningkatkan ketenangan dan semangat bagi kesembuhannya.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh pula responden yang telah melakukan operasi kanker payudara di RSUD Kota Makassar yang memiliki hubungan dengan orang lain yang baik namun kualitas hidupnya buruk yakni

11,8% responden. Hal ini dikarenakan strategi *coping* penderita. Asri (2006) mengemukakan bahwa pada umumnya penderita kanker lebih cenderung menggunakan strategi *coping* secara pasif atau menghindar, menerima atau pasrah terhadap keadaannya serta mengekspresikan emosi (marah, kecewa dan putus asa) dalam memandang kehidupannya bersama penyakit tersebut, karena apapun yang dilakukan tidak akan mampu menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dalam Al-Qur'an kita juga dianjurkan untuk saling tolong menolong berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ ۖ لَٰكِن لَّوْ لَمْ يَكُنِ
 لَهُمْ آٰلٌ وَآٰلٌ يَّرْتَضُونَ لَكُنُوا
 سَٰبِقِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain ...”
 (Departemen agama RI, 2010)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam mengarungi dinamika kehidupan sudah merupakan hukum alam manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sekecil apapun aktivitas kita, disadari atau tidak, manusia selalu membutuhkan pihak lain. Apalagi jika seseorang tersebut menghadapi masalah baik ringan maupun berat. Saat itu seseorang mencari dukungan sosial dari orang-orang disekitarnya, sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai. Demikian halnya dengan pasien kanker payudara, mereka membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang paling dekat dengan pasien. Pertolongan sangat dibutuhkan oleh pasien kanker payudara

sehingga ia dapat mengembangkan respon atau *coping* yang efektif untuk beradaptasi dengan baik dalam menangani stressor yang dihadapi terkait penyakitnya baik fisik, psikologis maupun sosial.

3. Hubungan antara kekuatan dalam diri (*personal strenght*) terhadap kualitas hidup.

Kekuatan dalam diri tidak berkaitan dengan kemampuan sebenarnya, melainkan keyakinan yang dimiliki individu. Kekuatan dalam diri pada pasien kanker berfokus pada keyakinan yang dimiliki terhadap kemampuannya untuk melakukan berbagai perilaku perawatan diri atau *self-management*. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menyebutkan bahwa kekuatan dalam diri mempunyai hubungan positif dengan perilaku perawatan diri yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup pasien (Kara & Alberto, dalam Rini, 2011).

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh nilai $p\ value = 0,040$ ($p\ value < 0,05$), dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan dalam diri terhadap kualitas hidup pasien. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Zairoh (2018) mengenai *posttraumatic growth* pada wanita dewasa madya penderita kanker payudara dimana hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan positif menuju ke level yang lebih baik, sehingga seseorang semakin mengenal kekuatan dalam dirinya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ade Fitri Rahmah (2011) menunjukkan bahwa terdapat *positive improvement in life* terhadap subjek penelitian tersebut, dimana dalam menjalankan aktivitas kesehariannya subjek dalam penelitian tersebut sangat termotivasi dan bersemangat. Justru di tengah sakitnya itu, mereka semakin giat bekerja. Menurutny, mereka merasa seolah-olah tidak mengidap penyakit kanker payudara ketika bekerja.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh pula responden yang telah melakukan operasi kanker payudara di RSUD Kota Makassar yang memiliki hubungan dengan orang lain baik namun kualitas hidupnya buruk yakni 11,8% responden. Hal ini dikarenakan jenis terapi yang dijalani oleh beberapa responden menyebabkan buruknya kualitas hidup yang dimilikinya. Penderita merasakan adanya perubahan kehidupan setelah menderita kanker payudara, kehidupan ketika penderita sudah divonis menderita kanker payudara yaitu penderita memiliki fisik yang menjadi lemah. Pengobatan yang penderita jalani memiliki efek yang dirasa sangat menyakitkan dan pengobatan tersebut dilakukan berkali-kali.

Masektomi tidak hanya meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga luka secara psikologis, yakni menurunnya perasaan bangga dan harga diri perempuan. Penderita mengatakan bahwa ketika mereka menjalani pengobatan masektomi menimbulkan trauma tersendiri dibandingkan dengan pengobatan yang lainnya seperti kemoterapi ataupun radiologi. Trauma yang penderita rasakan bukan hanya secara fisik namun memengaruhi kondisi psikologis penderita. Kehilangan salah satu payudaranya untuk pengobatan bukan berarti kanker yang menyerang tubuhnya menjadi hilang juga, namun dibutuhkan beberapa pengobatan setelah masektomi sesuai dengan bagaimana kondisi penderita. Trauma yang dialami penderita yaitu mereka tidak menginginkan pengobatan selanjutnya karena penderita merasa tidak mampu untuk menahan rasa sakitnya.

4. Hubungan antara Peluang Baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup.

New possibilities (peluang baru) merupakan identifikasi individu mengenai kemungkinan peluang baru dalam kehidupannya atau kemungkinan untuk mengambil pola kehidupan yang baru dan berbeda. Beberapa orang akan memperlihatkan ketertarikan pada hal baru, aktivitas baru dan mungkin memulai pola kehidupan baru yang signifikan.

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh nilai $p\text{ value} = 0,001$ ($p\text{ value} < 0,05$), dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara peluang baru terhadap kualitas hidup pasien. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Zairoh (2018) mengenai *posttraumatic growth* pada wanita dewasa madya penderita kanker payudara dimana hasil penelitian ini menunjukkan adanya peluang baru dalam kehidupan seseorang pasca tertimpa musibah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana (2017) yang menyatakan bahwa perubahan pada faktor *new possibilities* ini ditandai dengan identifikasi individu terhadap kemungkinan baru dalam hidupnya bahkan menentukan tujuan baru dalam kehidupannya. Setelah proses berjuang dalam menghadapi kesulitan, penderita mampu menemukan pilihan baru untuk hidupnya di beberapa domain. Penciptaan jalan hidup yang baru terkait dengan persepsi filosofi hidup yang baru dari asumsi masa lalu dan keyakinan yang mengarah pada kemungkinan dan peluang yang akan ada atau yang tidak terpikirkan sebelum trauma.

Hasil analisis terhadap pasien kanker payudara yang telah melakukan operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengembangan spiritual yang baik namun memiliki kualitas hidup buruk yakni sebanyak 35,3% responden. Hal ini disebabkan karna kemungkinan sebagian

besar responden memiliki penghargaan terhadap hidup yang buruk yakni sebanyak 20,6% menyebabkan kualitas hidup pasien buruk. Selain itu, lama menderita kanker payudara juga kemungkinan memengaruhi penghargaan terhadap hidup pasien, responden dengan penghargaan hidup yang buruk sebagian besar mengidap penyakit kanker payudara selama 1-3 tahun yakni sebanyak 44,1%. Penelitian Reid & Walker (2009) menyatakan bahwa lama menderita kanker berhubungan secara signifikan dengan tingkat kecemasan, sehingga akan berakibat terhadap penurunan kualitas hidup pasien.

5. Hubungan antara perkembangan spiritual (*spiritual development*) terhadap kualitas hidup.

Menurut Suhardiyanto (2011), religiusitas merupakan lahirnya dorongan dalam hati untuk melakukan hubungan dengan Allah SWT. Kehidupan adalah perjuangan dan individu harus siap menghadapinya. Keadaan sakit bagi penderita kanker secara psikologis harus disikapi dengan lahirnya dorongan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha memberi cobaan. Hubungan tersebut dapat dilihat pada ketaatan melaksanakan apa yang diyakini sebagai perintah atau kehendak Allah. Pengaruh religiusitas terhadap kualitas hidup pasien kanker selanjutnya adalah meyakini bahwa Allah Maha Agung dan Maha Adil, sehingga pasti akan memberi balasan dan ganjaran sempurna pada suatu waktu yang ditentukan.

Islam mengajarkan individu untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Setiap individu yang beragama akan melakukan ibadah sebagai sebuah kewajiban

memiliki iman dan jangan pula membiarkan diri terpuruk dalam keadaan buruk sekalipun itu berupa penyakit. Hal ini didukung oleh Rippentrop, (dalam Javanmard, 2013) studi menunjukkan bahwa pengaruh spiritualitas bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik orang dengan penyakit kronis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 159 penderita kanker menemukan bahwa spiritualitas memiliki hubungan positif terhadap kualitas hidup pasien berdasarkan analisis *spearman* $p=0,36$ ($p<0,001$) (Bredle, 2011).

Penelitian terkait *the multi-dimensionality of spiritual wellbeing* menyebutkan bahwa adanya kesejahteraan spiritual dapat menghasilkan gaya coping yang kuat dan dapat memberikan kualitas hidup yang baik kepada penderita kanker (Ellis, 2017).

Tingkat religiusitas yang tinggi dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kualitas hidup yaitu dalam kategori tinggi pula. Pada umumnya, pasien kanker payudara meyakini bahwa Allah SWT Maha Agung dan Maha Adil, sehingga pasti akan memberi balasan dan ganjaran sempurna pada satu waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini, seluruh responden merupakan penganut agama islam. Agama islam mengarahkan individu untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Setiap individu yang beragama akan melakukan ibadah sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan, karena jika tidak individu tersebut takut akan menerima hukuman dan jika ibadah dilakukan dengan benar akan menerima pahala. Jadi, apabila religiusitas baik atau segala kewajiban agama dipenuhi maka pasien kanker payudara akan lebih tabah menjalani kondisi penyakitnya dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya.

Hasil analisis terhadap pasien kanker payudara yang telah melakukan operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengembangan spiritual yang baik namun memiliki kualitas hidup buruk yakni sebanyak 35,3% responden. Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup yang buruk yakni sebanyak 20,6%, sehingga memengaruhi kualitas hidupnya. Kebanyakan responden yang memiliki penghargaan terhadap hidup yang buruk akan muncul reaksi penolakan dan kemurungan, tidak yakin bahwa dirinya menderita kanker. Terkadang mereka menjadi panik dan melakukan hal-hal yang tidak berarti dan sia-sia.

Menurut Prapanca (2017) keyakinan merupakan kekuatan yang meyakinkan individu agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, keyakinan memberikan ketentraman kepada individu karena yakin bahwa Allah SWT akan selalu memberi pertolongan. Selain itu, pengetahuan agama tentang larangan dan perintah mampu mengontrol emosi dan sikap negatif dalam diri individu. Pengalaman ini akan memengaruhi mereka dalam menyikapi dan mengatasi berbagai kondisi yang menekan.

6. Hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup.

menyembuhkan hati dari penyakit, seperti ragu-ragu, nifak dan kejahilan, apa yang dapat menyembuhkan badan dengan cara meruqiyah dengannya dan apa yang menjadi sebab diperolehnya rahmat Allah dengan keimanan yang terdapat di dalamnya. Al-Qur'an ini tidak menambah orang-orang kafir ketika mendengarnya, melainkan kekafiran dan kesesatan karena mereka mendustakannya dan tidak mengimaninya.

Semakin besar trauma yang dialami oleh pasien maka akan semakin memengaruhi kualitas hidup mereka. Melihat dari segi agama perlu adanya integrasi yang membuat trauma mendalam tersebut bisa dikurangi. Contohnya dengan pola hidup sehat menurut islam yakni pola pikir (zikir maupun mengaji), pola makan (puasa), berolahraga (shalat) dan pola hidup (akhlak maupun sosial).

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh nilai $p\text{ value} = 0,002$ ($p\text{ value} < 0,05$) dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara *posttraumatic growth* dengan kualitas hidup pasien. Penelitian ini sejalan dengan Heidarzadeh, dkk (2014) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara *posttraumatic growth* dengan kualitas hidup dimensi fisik dan dimensi psikologis dengan signifikan korelasi yang kuat pada pasien kanker. Perubahan *posttraumatic growth* terbesar pada perubahan spiritual dan hubungan dengan sesama. Berbagai masalah yang memengaruhi kondisi fisik pasien dapat menyebabkan berbagai masalah psikososial mengarah pada terganggunya kehidupan sehari-hari serta kualitas hidup.

Penelitian lain dari Jansen (2011) yang menemukan manfaat *posttraumatic growth* pada pasien penderita kanker kolorektal jangka panjang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

posttraumatic growth dengan kualitas hidup secara keseluruhan. Selama proses *hemodialysis* terjadi berbagai perubahan baik fisik maupun psikologis pada tubuh pasien, selama itu dibutuhkan dukungan keluarga serta peran tenaga kesehatan untuk memulihkan atau menumbuhkan psikologi positif maka akan mendukung terbentuknya kualitas hidup pasien yang lebih baik.

Dalam penelitian Mahleda & Hartini (2012) dalam jurnal penelitian yang berjudul *posttraumatic growth* pada pasien kanker payudara pasca mastektomi usia madya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya pasien mengalami emosi negatif setelah menjalani mastektomi. Setelah melakukan perenungan diri dan pengungkapan diri, mereka merubah pandangan hidupnya. Subjek bisa mengembangkan diri menuju perubahan psikologis, yaitu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dipengaruhi juga oleh adanya dukungan sosial dan keyakinan terhadap tuhan.

Hasil analisis mengenai pasien kanker payudara yang telah melakukan operasi di RSUD Kota Makassar menunjukkan bahwa yang memiliki *posttraumatic growth* positif namun memiliki kualitas hidup buruk yakni sebanyak 11,8% responden. Kualitas hidup merupakan salah satu tema penting dalam kehidupan pasien kanker payudara, kualitas hidup banyak dibahas karena dalam kondisi sakit tersebut, pasien mengalami perubahan yang dramatis dalam hidupnya, banyak pembatasan yang harus ditaati, kesulitan untuk beraktivitas atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardianingsih (2014) bahwa pasien mengalami perasaan-perasaan negatif seperti sedih, putus asa, menyesal, kecewa dan malu. Perasaan-perasaan

negatif tersebut bisa menyebabkan depresi serta kecemasan. Penelitian yang dilakukan William (dalam Frida, 2010) mengungkapkan bahwa kualitas hidup dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti perasaan-perasaan negatif dan kecemasan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya adalah :

1. Terdapat beberapa alamat responden yang kurang lengkap.
2. Terdapat beberapa responden yang telah meninggal dunia maupun pindah kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara pasca operasi di RSUD Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*) dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
2. Ada hubungan antara hubungan dengan orang lain (*relating to others*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
3. Ada hubungan antara kekuatan dalam diri (*personal strenght*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
4. Ada hubungan antara peluang baru (*new possibilities*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
5. Ada hubungan antara perkembangan spiritual (*spiritual development*) terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.
6. Ada hubungan antara *posttraumatic growth* terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian yang serupa :

1. Bagi pasien kanker

Bagi pasien kanker payudara sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Allah, memandang bahwa penyakit yang dideritanya itu sebagai hikmah yang diberikan Allah kepadanya dan bukan menyalahkan Allah atas apa yang dideritanya.

2. Bagi keluarga

Bagi keluarga maupun pasangan pasien kanker payudara agar bisa menerima keadaan pasien apa adanya setelah terdiagnosa kanker maupun melakukan pengangkatan payudara dengan memberikan dukungan yang lebih *intens*, sehingga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan pasien kanker payudara.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang serupa diharapkan bisa menggunakan beberapa cara yang belum dilakukan pada penelitian ini seperti menggunakan subjek penelitian dengan *setting* budaya yang beragam maupun menambahkan perspektif psikologis lain yang dapat diteliti untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldwin, C. M, dkk. 1998. *A developmental perspective on post-traumatic growth*. Dalam R. G. Tedeschi, C. L. Park, & L. G. Calhoun (Eds.). *Post-traumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis* (hal. 43–63). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Al-Muhasibi, Imam. 2012. *Tuntunan Merasakan Nikmatnya Hidup Tulus Tanpa Batas*. Pustaka Ulama Klasik. Jakarta : Lentera Hati.
- Andhini, P. Ningsih. 2016. *Studi Mengenai Posttraumatic Growth Pada Wanita Yang Baru Terdiagnosis Menderita Kanker Payudara Di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi*. Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Padjajaran.
- Amru, Hidayat. 2016. *Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara Di Poli Bedah RSUD Panembahan Senopati Bantul*. Jurnal Penelitian. STIKES Jenderal Achmad Yani : Yogyakarta.
- Arthur S, dkk. 2010. *The Penguin Dictionary of Psychology*, Terj. Yudi Santoso, *Kamus Psikologi Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Basag, Baglama & Irem Erdem Atak. 2014. *Posttraumatic Growth And Related Factors Among Postoperative Breast Cancer Patients. Department of Special Education, Ataturk Education Faculty, Near East University, North Cyprus, Mersin 10 Turkey*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 190 (2015) 448 – 454.
- Basham, R.B, dkk. 2011. *Assesing social support: the social support questionnaire*. *Journal of Personality and Social Psychology* 44, (1), 127-139.
- Bredle, J.M, dkk. 2011. *Spiritual wellbeing as a component of health-related quality of life: the functional assessment of chronic illness therapy—spiritual well-being scale (FACIT-Sp)*. *Religions*, 2 (1), 77–94. <https://doi.org/10.3390/rel2010077>.
- Calhoun, L. G, dkk. 2000. *A correlational test of the relationship between posttraumatic growth, religion, and cognitive processing*. *Journal of Traumatic Stress*, 13(3), 521-527.
- Cancer Council Australia, 2014. *Understanding Breast Cancer A Guide For People With Cancer, Their Families And Friends*. Edition august 2014, isbn 9781 9251 36 33 3.
- Clement R. 2000. *Comitment to one's spouse as predictor or maritalquality among older couple*. *Current psychology*.
- Darmojo, R.B. 2004. *Buku Ajar Geriartri*. Jakarta: Balai Penerbit. FKUI.
- Data Rekam Medis RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro.

- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Eccles, A. Suzanne. 2013. *Critical Research Gaps And Translational Priorities For The Successful Prevention And Treatment Of The Breast Cancer*, Biomed Central. Accepted 12 September 2013, Published 1 October 2013 Received 8 August 2013.
- Ellis, K.R, dkk. 2017. *Meaning- based coping, chronic conditions and quality of life in advanced cancer & caregiving*. *Psycho- oncology*, 26 (9), 1316– 1323. doi: 10.1002/pon.4146.
- Everly, G. E, dkk. 2002. *A clinical guide to the treatment of the human stress response (2nd ed.)*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Ferrel, B.R, dkk. 2012. *Quality of Life Instrument-Breast Cancer Patient Version (QOL-BC)*. Measurement Instrument Database for the Social Science.
- Fitri, R. Ade & Erlina. 2011. *Posttraumatic Growth Pada Penderita Kanker Payudara*. Jurnal penelitian. Fakultas psikologi Universitas Ahmad Dahlan : Yogyakarta.
- Frida, I. Rahmadhani & Sanny Prakosa Wardhana. 2017. *Posttraumatic Growth pada Wanita Penderita Kanker Payudara Pasca Mastektomi Usia Dewasa Awal*. Jurnal penelitian. Fakultas Psikologi. Universitas Airlangga.
- GLOBOCAN. 2012. *estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012*.
- Hafnidar, L, dkk. 2012. *Forgiveness as a Mediator for the Relationship between Spirituality and Posttraumatic Growth in Aceh Conflict Victims, Indonesia*. *International Journal of Social Science and Humanity*, 2 (3), 237-241.
- Hanson, G. Peter . 1995. *Nikmatnya stress*. Arcan : Jakarta.
- Hawari, D. 2004. *Kanker Payudara : Dimensi Psikoreligi*. Jakarta : Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ismail, S.M. 2009. *Strategi Pembelajaran Agama berbasis Paikem: Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan*. Semarang: Rsail Media Grup.
- Jansen, L, dkk. 2011. *Benefit Finding and Post-traumatic Growth in Long-Term Colorectal Cancer Survivors: Prevalence, Determinants, and Associations with Quality of Life*.
- Javanmard, G. H. 2013. *Religious Beliefs and Resilience in Academic Students*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 84, 744 – 748.
- Joseph, S, dkk. 1997. *Post-traumatic stress: Psychosocial perspectives on PTSD and treatment*. Chichester: Wiley.
- _____. 2005. *Assessing positive and negative changes in the aftermath of adversity: Psychometric evaluation of the Changes in Outlook Questionnaire*. *Psychological Assessment*, 17, 70- 80.
- Kawar L. N, PhD, RN, CNS, 2012. *Knowledge about Breast Cancer and Negative Influences Affecting Breast Cancer Screening Among Women in Jordan*, *International Journal of Humanities and Social Science School of Nursing*

- California State University Long Beach 1250 Bellflower Blvd Long Beach, CA 90840, USA, Vol. 2 No. 18 : October 2012.
- Koenig, H. G. 2001. *Handbook Of Religion And Mental Health*. New York: Academic Press.
- Larasati, T. A. 2012. *Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RS Abdul Moeloek Provinsi Lampung*. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Universitas Lampung*. Vol. 2, No. 2, 17-20.
- Lincoln, J dan Wilensky.(2008). *Kanker payudara Diagnosis dan solusinya*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Linley, P. A. 2004. *Positive Psychology in Practice*. New Jersey : Hoboken.
- _____. 2008. *Psychological Assessment of Growth Following Adversity: A Review*. S. Joseph, & P. A. Linley (Eds.), *Trauma, recovery, and growth: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress*. (pp.22-36). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Luwia, M. S. 2005. *Probelmatik Dan Perawatan Payudara*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Machfoedz. 2007. *Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Mahlenda, M & Hartini. 2012. *Posttraumatic Growth Pada Pasien Kanker Payudara Pasca Mastektomi Usi Dewasa Madya*. *Jurnal psikologi klinis dan kesehatan mental*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Vol. No. 02, pp. 67-71.
- Manik. 2012. *Riwayat Gaya Hidup Penderita Kanker Payudara Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sumedang*. *Jurnal Penelitian*. Fakultas Ilmu Keperawatan. Universitas Padjadjaran.
- Mardiah, Zakaria, dkk. 2006. *Makanan Antikanker*. Jakarta : Kawan Pustaka.
- Mary, Baradero, dkk. 2008. *Seri Asuhan Keperawatan Klien Kanker*. Jakarta: EGC.
- Maulia, Mahleda. 2012. *Posttraumatic Growth pada Pasien Kanker Payudara Pasca Mastektomi Usia Dewasa Madya*. *Jurnal penelitian*. Fakultas Psikologi. Universitas Airlangga Surabaya.
- Mayasari, R. 2014. *Religiusitas Islam dan Kebahagiaan (Sebuah Telaah dengan Perspektif Psikologi)*. *Al-Munzir*, 7 (2), 81-100.
- Merriam. 2017. *Quality Of Time*. Merriam-Webster (online). [URL:https://www.merriam-webster.com/dictionary/quality%20of%20lif](https://www.merriam-webster.com/dictionary/quality%20of%20lif). Diakses pada tanggal 05 Oktober 2019.
- Morris, Michael & Peng Kaiping. 2010. *Culture and Cause : American and Chinese Attributions for Social and Physical Events*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1994, Vol. 67, No. 6, 949-971.
- Mulyani, N & Mega Rinawati. 2013. *Kanker Payudara Dan PMS Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha medika.
- Mulyasari AD, 2017. *Analisis Faktor Risiko Kanker Payudara Pada RSU. Bahteramas Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017*. *Jurnal Penelitian*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Halu Oleo.

- Notoatmodjo, S. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Novia, Ratnasari. 2016. *Hubungan Efikasi Diri Terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. Jurnal penelitian. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurcahyo, Jalu. 2010. *Awas Bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara*. Jakarta: Tim Wahana.
- Ozkan, S. 2008. *Importance Of Social Support For Functional Status In Breast Cancer Patients*. Asian Pasific Journal Of Cancer Prevention. 9. 601-604.
- Pamungkas, Zaviera. 2011. *Deteksi Dini Kanker Payudara*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Pradono, J, dkk. 2017. *Indonesia Menurut Clasification Of Funtioning, Dissability, And Health (ICF) Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Kesehatan, 9 (24) 1-10.
- Prapanca, P. 2017. *Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Self Resiliensi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar*. E-Journal Bimbingan dan Konseling, 1 (6), 62-70.
- Price, J. 2010. *Vulnerability to Psychopathology: Risk across the Lifespan*. (edisi kedua). New York: Guilford Press.
- Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Tahun 2018.
- Putu, I, dkk. 2015. *Factors Affecting The Quality Of Life Of Patients With Locally Advanced Breast Cancer Who Were Treated According The Protocol Of Surgical*. Universitas Gadjah Mada.
- Rachamawati, Nurfitriana & Halimah. 2017. *Studi Deskriptif Mengenai Gambaran Posttraumatic Growth (PTG) Pada Wanita Penderita Kanker Payudara Pasca Masektomi Di Bandung Cancer Society (Bsc)*. Jurnal penelitian. Fakultas Psikologi UIN Bandung : Bandung.
- Ramos Catarina & Isabel Leal. 2012. *Posttraumatic Growth in the aftermath of trauma: A literature review about related factors and application contexts*. Journal of Psychology, Community & Health, 2012, 1 (1), 1-20.
- Rasjidi, Imam. 2009. *Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker Pada Wanita*. Jakarta: Sagung Seto.
- _____. 2010. *Epidemiologi Penyakit Kanker Pada Wanita*. Jakarta: Sagung Seto.
- Reber, S.A. 2010. *Kamus Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Reid & Walker. 2009. *Quality of life in Caribbean youth with cancer*. West Indian Med Journal, 58 (3) 1-8.
- Riset Kesehatan Dasar (riskesdas). 2013. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ryan, R, dkk. 2001. *To be happy or to be self-fulfilled: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being*. In S. Fiske (Ed.), *Annual Review of Psychology* 52; pp. 111-166. Palo Alto, CA: Annual Reviews, Inc.

- Sari. 2016. *Hubungan Antara Kebersyukuran dengan Resiliensi Pada Penderita Penyakit Kronis*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
- Schmidt, A & Ehmcke. 2008. *The Relation Between Posttraumatic Growth and Resilience in The South African Context*. Tesis. Johannesburg : University of The Witwatersrand. H. 9, 11.
- Selye, H. 1956. *The stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Shaheen, A, dkk. 2011. *Prevalence and psychosocial risk factors of PTSD: 18 months after Kashmir earthquake in Pakistan*. Journal of Affective Disorders, vol.130, p 268–274. doi: 10.1016/j.jad.2010.10.035.
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Riset*. HRD. Alfabeta : Bandung.
- Suryo, Joko. 2009. *Herbal penyembuh Kanker Pada Perempuan*. Yogyakarta: B First.
- Suyatno dan Emir Taris Pasaribu. 2010. *Bedah Onkologi Diagnosis dan Terapi*. Jakarta: Sagung Seto.
- Tedeschi, R.G., & Calhoun. 1998. *Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis*. NJ. Publication: Lawrence Erlbaum Associates.
- _____. 2004. *Posttraumatic Growth : Conceptual Foundation and Empirical Evidence*. Journal of Psychological Inquiry. 15, 1-18. H. 1,2,5-9,12.
- Tapan. 2005. *Kanker, Anti Oksidan Dan Terapi Komplementer*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Taufan, Nugroho. 2013. *Asi Dan Tumor Payudara*. Yogyakarta. Medical Book. Hlm. 123.
- Taylor, S. E. 2012. *Health Psychology*, Eighth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Teixeira, R.J & Pereira. 2013. *Factors Contributing to Posttraumatic Growth and Its Buffering Effect in Adult Children of Cancer Patients undergoing treatment*. Journal of Psychosocial Oncology.
- Urbayaton, Siti & Wahyu Widhiarso. 2012. *Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian Psikologi Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Psikologi Volume 39, No. 2, Desember 2012: 180–188.
- Utami, Sri. 2012. *Aku Sembuh dari Kanker Payudara, Mendeteksi Gejala Dini, Pencegahan, dan Pengobatan*. Jakarta : Oryza.
- Wahyuanasari, I. 2012. *Faktor Risiko Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Usia Produktif*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Wardiyah, Aryanti. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimisme Terhadap Kesembuhan Pada Pasien Kanker Payudara Di RSUDN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta*. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia : Depok.
- Wood, A. M, dkk. 2008. *The Role Of Gratitude In The Development Of Social Support, Stress, And Depression: Two Longitudinal Studies*. Journal of Research in Personality, 42 (8), 54– 87.
- World Health Organization (WHO). 1999. *WHOQOL Annotated Bibliography*. Department Of Mental Health.

- _____ . 2013. *Comprehensive cervical cancer prevention and control: a healthier future for girls and women. WHO guidance note* Geneva: WHO Press.
- Yusra. 2011. *Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Yustina, Olfa. 2013. *Kanker Payudara dan Sadari*. Yogyakarta: Medical Book
- Zairoh, Lia. 2018. *Posttraumatic Growth Pada Wanita Desawa Madya Penderita Kanker Payudara*. Fakultas Psikologi UIN Sunan Ampel. Surabaya
- Zoellner, T & Maercker. 2008. *Posttraumatic Growth in Clinical Psychology-a critical review and introduction of a two component model*. *Clinical Psychology Review*, 26, 626-653.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1**Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RSUD Kota Makassar Tahun 2019.**

Saya yang bernama Suharda Chabirah/70200115061 adalah mahasiswi Program S-1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang sedang melakukan penelitian tentang “Hubungan *Posttraumatic Growth* Terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RSUD Kota Makassar”. Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur. Jika bersedia, silahkan menandatangani lembar persetujuan ini sebagai bukti kesukarelaan Ibu.

Partisipasi Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga Ibu bebas untuk mengundurkan diri setiap saat tanpa sanksi apapun. Semua informasi yang Ibu berikan akan dirahasiakan dan hanya akan dipergunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas partisipasi Ibu dalam penelitian ini.

Peneliti

(Suharda Chabirah)

Makassar,

Responden

()

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian : Semua pertanyaan harus dijawab, berilah tanda (√) pada tempat yang telah disediakan dan isilah titik-titik jika ada pertanyaan yang harus dijawab selain jawaban yang telah tersedia, setiap pertanyaan yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti.

A. Data Demografi

1. Usia saat ini : Tahun
2. Status perkawinan : 1. Tidak/Belum menikah
2. Menikah 3. Janda
3. Agama/kepercayaan : 1. Islam 2. Kristen
3. Hindu 4. Budha
5. Lain-lain (Sebutkan)
4. Suku : 1. Toraja 2. Makassar
3. Bugis 4. Mandar
5. Pendidikan : 1. SD 2. SMP
3. SM 4. DIII
5. Sarjana
6. Pekerjaan : 1. PNS 2. Ibu rumah tangga
3. Peg. Swasta 4. Wiraswasta
7. Penghasilan perbulan : 1. >Rp. 500.000
2. Rp.500.000 – Rp. 1.000.000
3. Rp. 1.050.000 – Rp. 2.000.000
4. <Rp. 2.000.000
8. Lama menderita : Tahun
9. Jenis terapi yang telah diperoleh :

B. Kuesioner Kualitas Hidup

Petunjuk pengisian : berilah tanda (√) pada setiap kolom jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang anda alami.

No	Pertanyaan	Tidak	Sedikit	Sering	Sangat sering
1	Apakah anda mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan yang berat, seperti membawa barang belanjaan atau koper yang berat?				
2	Apakah anda mengalami kesulitan jika berjalan kaki dalam jarak yang jauh?				
3	Apakah anda mengalami kesulitan saat berjalan kaki meskipun dalam jarak yang pendek, misalnya di sekitar rumah anda?				
4	Apakah setiap hari anda harus berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi?				
5	Apakah anda memerlukan bantuan orang lain saat anda makan, berpakaian, mandi atau buang air?				
Dalam seminggu terakhir					
6	Apakah anda mengalami keterbatasan saat bekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari lainnya?				
7	Apakah anda mengalami keterbatasan saat melakukan kegiatan santai atau kegiatan yang merupakan hobi anda?				
8	Apakah anda merasakan sesak napas?				
9	Apakah anda merasa nyeri?				
10	Apakah anda perlu beristirahat?				
11	Apakah anda sulit tidur?				
12	Apakah anda merasakan badan anda lemah?				

13	Apakah anda kehilangan nafsu makan?				
14	Apakah anda merasa mual?				
15	Apakah anda muntah?				
16	Apakah anda sulit buang air besar?				
Dalam seminggu terakhir					
17	Apakah anda diare?				
18	Apakah anda kelelahan?				
19	Apakah nyeri yang dirasakan mengganggu aktivitas anda sehari-hari?				
20	Apakah anda sulit berkonsentrasi pada suatu hal, seperti membaca koran atau menonton TV?				
21	Apakah anda merasa tegang?				
22	Apakah anda merasa khawatir?				
23	Apakah anda merasa mudah tersinggung?				
24	Apakah anda merasa depresi?				
25	Apakah anda mengalami kesulitan untuk mengingat sesuatu?				
26	Apakah kehidupan anda terganggu oleh kondisi fisik atau terapi medis yang anda jalani?				
27	Apakah aktivitas sosial anda terganggu oleh kondisi fisik autoterapi medis yang anda jalani?				
28	Apakah anda mengalami kesulitan akibat kondisi fisik atau terapi medis yang dialami?				
Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ceklis (✓) jawaban yang paling sesuai					
No	pertanyaan	Sangat buruk	Buruk	Baik	Sangat baik
29	Bagaimanakah anda menilai kondisi kesehatan anda secara keseluruhan selama				

	seminggu yang lalu?				
30	Bagaimanakah anda menilai kualitas hidup anda selama seminggu yang lalu?				

C. Kuesioner *Posttraumatic Growth*

Tunjukkan untuk masing-masing pernyataan di bawah di mana pengejaran ini terjadi dalam hidup anda sebagai akibat dari krisis/bencana, menggunakan skala berikut :

0. Saya tidak mengalami perubahan ini sebagai akibat dari krisis saya
1. Saya mengalami perubahan ini pada tingkat yang sangat kecil sebagai akibat dari krisis saya
2. Saya mengalami perubahan ini pada tingkat kecil sebagai akibat dari krisis saya
3. Saya mengalami perubahan ini pada tingkat sedang sebagai akibat dari krisis saya
4. Saya mengalami perubahan ini pada sebagian besar sebagai akibat dari krisis saya
5. saya mengalami perubahan ini ke tingkat yang sangat besar akibat dari krisis saya

No	Pernyataan	0	1	2	3	4	5
1	Saya mengubah prioritas saya tentang apa yang penting dalam hidup						
2	Saya memiliki apresiasi yang lebih besar untuk nilai hidup saya sendiri						
3	Saya mengembangkan minat saya						
4	Saya memiliki perasaan lebih percaya diri						
5	Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah spiritual						
6	Saya lebih jelas melihat bahwa saya dapat mengandalkan orang-orang di masa-masa sulit						
7	Saya membangun jalan baru untuk hidup saya						
8	Saya memiliki rasa kedekatan yang lebih besar dengan yang lain						
9	Saya lebih mau mengekspresikan emosi saya						
10	Saya tahu lebih baik bahwa saya dapat mengatasi kesulitan						
11	Saya dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dalam hidup saya						
12	Saya lebih bisa menerima cara kerjanya						
13	Saya bisa lebih menghargai setiap hari						
14	Peluang baru tersedia yang tidak akan kembali						
15	Saya memiliki lebih banyak belas kasih untuk orang lain						
16	Saya berusaha lebih banyak dalam hubungan saya terhadap orang lain						
17	Saya lebih cenderung mencoba mengubah hal-hal yang perlu diubah						
18	Saya memiliki keyakinan agama yang lebih kuat						
19	Saya menemukan bahwa saya lebih kuat daripada yang saya kira						
20	Saya belajar banyak tentang betapa indahnnya hubungan dengan orang lain						
21	Saya lebih menerima kebutuhan orang lain						

DOKUMENTASI PENELITIAN



MASTER TABEL

Nama	Alamat	Ura	Statur	Agama	Suku	Pond	Kerja	pong	L.mend	terapi	operasi	J.operat	KH6	KH7	KH8	KH9	KH10	KH11	KH12	KH13	KH14	KH15	KH16	KH17	KH18	KH19	KH20	KH21	KH22	KH23	KH24	KH25	KH26	TOT	KAT	
HJ	Komplek perumahan No. K35	4	2	1	3	5	2	2	2	2	2	11h	4	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	4	5	5	3	81	:	
MP	TSI blok G1H1	5	3	1	3	1	2	1	2	1	2	3 2h	4	4	4	5	4	5	3	2	4	3	5	4	3	4	5	0	5	5	4	4	4	4	90	:
MB	Griyantan lortari blok D2/3	3	2	1	3	3	2	3	1	2	2	1 8h	5	2	2	3	2	4	2	3	3	4	2	2	2	2	4	2	4	4	3	3	2	67	:	
M	Komplek YPPKG No. 13	3	2	1	2	5	1	4	2	2	2	2 1h	4	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	77	:	
R	Komplek pascasarjana permai blok A3	4	3	1	2	3	2	2	1	2	2	1 9h	5	2	2	3	2	2	2	4	3	4	2	2	2	2	4	0	4	4	2	2	2	61	:	
RN	BSR blok G18	3	2	1	3	5	1	4	1	2	2	2 1h	4	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	5	74	:		
SN	Jl. dr. ramona larang 3/43	2	2	1	3	5	2	3	1	2	2	2 1h	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	4	2	2	4	77	:		
SA	BTH papabri blok A6714	3	2	1	4	3	4	4	1	2	2	2 1h	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	77	:	
N	BTP blok K786	2	2	1	2	5	3	4	2	2	2	2 1h	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	79	:	
D	Jl. Israkilarang 4/20A	4	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1 1h	2	3	3	5	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	4	0	4	4	2	2	3	68	:	
F	Jl. zamkhan 1/24	4	2	1	3	5	4	2	2	2	2	2 1h	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	77	:	
R	Jl. ruzhhan alauddin	1	1	1	3	3	5	1	2	1	2	2 1h	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	5	0	5	5	4	4	4	92	:	
K	Jl. pendalilan No. 3	3	2	1	2	5	1	4	2	2	2	2 1h	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	5	75	:		
DAL	Jl. maccinisaya No. 209	1	1	1	3	5	5	1	1	1	1	2 2h	4	4	4	3	3	3	2	4	3	5	4	2	4	5	0	5	5	3	3	3	79	:		
AA	Forum KNPI blok AL77	2	2	1	2	5	1	4	2	2	2	3 1h	2	2	3	5	3	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	5	75	:		
RM	Jl. tebuumer	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2 8h	5	2	2	3	2	2	2	2	4	3	4	2	2	2	2	4	2	4	3	3	2	67	:	
W	Antang	3	3	1	3	5	5	4	1	2	2	2 2h	4	4	4	5	4	4	4	2	4	3	5	4	4	4	5	0	5	5	4	4	4	93	:	
HM	Komplek giatidaya	4	3	1	2	1	2	1	1	2	1	2 8h	5	2	2	3	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	3	0	3	3	2	2	56	:	
NH	BTH kalamang permai blok B/7	4	2	1	2	3	2	2	1	2	2	1 9h	5	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	4	2	4	4	2	2	2	64	:
DP	Jl. kerban 40.000 jiwa No. 55	2	2	1	3	1	2	1	2	1	2	3 2h	4	4	3	5	4	4	3	2	3	3	5	4	4	4	5	2	5	5	3	3	2	85	:	
SH	Celaa RT 2 RW 5 lingkungan link PTL	1	2	1	2	5	2	2	1	2	2	2 8h	5	2	2	3	2	2	3	4	3	4	3	2	2	2	2	5	2	5	5	5	5	2	72	:
KS	BTH kadam 1B/18	3	2	1	2	5	2	2	3	2	2	3 2h	4	4	4	5	4	5	4	2	4	4	5	4	4	4	5	3	5	5	4	4	4	4	97	:
IS	Jl. hortanin Timur No. 2	5	3	1	3	1	4	3	1	2	2	2 1h	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4	0	4	4	5	5	5	84	:	
HS	BTH kadam 3 blok C6/4	4	3	1	3	3	2	2	1	2	1	1 1h	3	2	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	0	4	4	2	2	3	65	:	
HDDS	Jl. murtafa da bunga	4	2	1	2	1	2	1	4	2	2	2 2h	4	4	4	5	4	4	3	2	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	97	:		
D	Ablam larang 9A	2	2	1	2	3	2	1	2	2	2	2 1h	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	2	4	3	3	5	5	4	5	4	4	5	86	:	
DB	Forum BPS 2 blok C3/27	3	2	1	2	5	4	4	3	3	3	3 1h	3	4	4	5	4	4	4	3	3	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	92	:	
SK	Jl. jallara blok C3/9	1	1	1	3	5	3	3	1	1	1	2 1h	3	3	3	4	4	3	2	4	2	3	4	3	3	3	3	0	3	3	4	4	3	71	:	
L	Jl. perintur komerdokan km 11 larang 9	5	2	1	2	5	2	2	3	2	2	3 2h	4	4	4	5	4	4	3	2	3	2	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	95	:	
R	Jl. ri drap 2 blok H/152	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3 8h	5	2	2	3	2	2	2	4	3	4	2	2	2	2	5	2	5	5	5	5	2	75	:	
DR	Jl. suakiri No. 3	2	2	1	2	5	2	2	3	2	2	3 1h	5	2	3	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	2	5	2	5	5	5	5	3	74	:	
SM	Jl. sira kanya	3	2	1	2	5	2	2	1	2	2	2 1h	2	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	3	74	:	
MY	Jl. baru 3 blok D/47	5	2	1	3	3	3	3	1	2	2	2 8h	5	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	5	5	2	65	:	
HMR	BPS 2 blok C2/4	3	3	1	3	3	2	2	2	2	2	2 1h	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	0	4	4	4	4	4	3	80	:



1. Analisis Univariat

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 22-32	4	11.8	11.8	11.8
33-43	6	17.6	17.6	29.4
44-54	12	35.3	35.3	64.7
55-65	8	23.5	23.5	88.2
66-76	4	11.8	11.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Agama/kepercayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Islam	34	100.0	100.0	100.0

Suku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Makassar	17	50.0	50.0	50.0
Bugis	16	47.1	47.1	97.1
Mandar	1	2.9	2.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Pendidikan terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	5	14.7	14.7	14.7
SMA	12	35.3	35.3	50.0
Sarjana	17	50.0	50.0	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	4	11.8	11.8	11.8
IRT	20	58.8	58.8	70.6
Pegawai swasta	3	8.8	8.8	79.4
Wiraswasta	4	11.8	11.8	91.2
Pelajar	3	8.8	8.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Penghasilan per bulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <Rp 500.000	7	20.6	20.6	20.6
Rp 501.000-Rp 1.000.000	14	41.2	41.2	61.8
Rp 1.001.000-Rp 2.000.000	5	14.7	14.7	76.5
>Rp 2.000.000	8	23.5	23.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Lama menderita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-3	15	44.1	44.1	44.1
4-6	13	38.2	38.2	82.4
7-9	4	11.8	11.8	94.1
10-12	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Jenis terapi yang telah diperoleh

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pembedahan	4	11.8	11.8	11.8
pembedahan, kemoterapi	29	85.3	85.3	97.1
pembedahan, kemoterapi, hormon	1	2.9	2.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Berapa kali anda telah melakukan operasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 kali	5	14.7	14.7	14.7
2 kali	20	58.8	58.8	73.5
3 kali	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Jarak operasi terakhir anda

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 tahun	18	52.9	52.9	52.9
2 tahun	7	20.6	20.6	73.5
6 bulan	2	5.9	5.9	79.4
7 bulan	1	2.9	2.9	82.4
8 bulan	3	8.8	8.8	91.2
9 bulan	3	8.8	8.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

total kategori kualitas hidup

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	17	50.0	50.0	50.0
Baik	17	50.0	50.0	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Total kategori PTG

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Negatif	17	50.0	50.0	50.0
Positif	17	50.0	50.0	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Total kategori hubungan dengan orang lain (relating to others)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	17	50.0	50.0	50.0
Baik	17	50.0	50.0	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Total kategori peluang baru

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	12	35.3	35.3	35.3
Baik	22	64.7	64.7	100.0
Total	34	100.0	100.0	

total kategori kekuatan dalam diri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	8	23.5	23.5	23.5
Baik	26	76.5	76.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

total kategorik pengembangan spiritual

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	8	23.5	23.5	23.5
Baik	26	76.5	76.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

total kategorik penghargaan terhadap hidup (*appreciation of life*)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	7	20.6	20.6	20.6
Baik	27	79.4	79.4	100.0
Total	34	100.0	100.0	

2. Analisis Bivariat

Posttraumatic Growth x Kualitas Hidup
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total kategorik PTG * total kategorik kualitas hidup	34	100.0%	0	.0%	34	100.0%

Total kategorik PTG * total kategorik kualitas hidup Crosstabulation

Count

		total kategorik kualitas hidup		Total
		Buruk	Baik	
Total kategorik PTG	Negatif	13	4	17
	Positif	4	13	17
Total		17	17	34

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.529 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	7.529	1	.006		
Likelihood Ratio	10.034	1	.002		
Fisher's Exact Test				.005	.003
Linear-by-Linear Association	9.249	1	.002		
N of Valid Cases	34				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Descriptives

total kategorik kualitas hidup			Statistic	Std. Error		
Total kategorik PTG	Buruk	Mean	1.24	.106		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.01		
			Upper Bound	1.46		
		5% Trimmed Mean	1.21			
		Median	1.00			
		Variance	.191			
		Std. Deviation	.437			
		Minimum	1			
		Maximum	2			
		Range	1			
		Interquartile Range	0			
		Skewness	1.372	.550		
		Kurtosis	-.149	1.063		
		Baik		Mean	1.76	.106
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.54
Upper Bound	1.99					
5% Trimmed Mean	1.79					
Median	2.00					
Variance	.191					
Std. Deviation	.437					
Minimum	1					
Maximum	2					
Range	1					
Interquartile Range	0					
Skewness	-1.372			.550		
Kurtosis	-.149			1.063		

Hubungan Dengan Orang Lain x Kualitas Hidup
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total kategorik PTG1 * total kategorik kualitas hidup	34	100.0%	0	.0%	34	100.0%

Total kategorik hubungan dengan orang lain * total kategorik kualitas hidup
Crosstabulation

Count

		total kategorik kualitas hidup		Total
		Buruk	Baik	
Total kategorik PTG1	Buruk	13	4	17
	Baik	4	13	17
Total		17	17	34

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.529 ^a	1	.002	.005	.003
Continuity Correction ^b	7.529	1	.006		
Likelihood Ratio	10.034	1	.002		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	9.249	1	.002		
N of Valid Cases	34				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Descriptives

total kategorik kualitas hidup			Statistic	Std. Error		
Total kategorik PTG1	Buruk	Mean	1.24	.106		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.01		
			Upper Bound	1.46		
		5% Trimmed Mean	1.21			
		Median	1.00			
		Variance	.191			
		Std. Deviation	.437			
		Minimum	1			
		Maximum	2			
		Range	1			
		Interquartile Range	0			
		Skewness	1.372	.550		
		Kurtosis	-.149	1.063		
		Baik	Baik	Mean	1.76	.106
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.54
Upper Bound	1.99					
5% Trimmed Mean	1.79					
Median	2.00					
Variance	.191					
Std. Deviation	.437					
Minimum	1					
Maximum	2					
Range	1					
Interquartile Range	0					
Skewness	-1.372			.550		
Kurtosis	-.149			1.063		

Peluang Baru x Kualitas Hidup
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total kategorik PTG2 * total kategorik kualitas hidup	34	100.0%	0	.0%	34	100.0%

Total kategorik peluang baru * total kategorik kualitas hidup Crosstabulation

Count

		total kategorik kualitas hidup		Total
		Buruk	Baik	
Total kategorik PTG2	Buruk	11	1	12
	Baik	6	16	22
Total		17	17	34

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.879 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	10.432	1	.001		
Likelihood Ratio	14.468	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	12.500	1	.000		
N of Valid Cases	34				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Descriptives

total kategorik kualitas hidup			Statistic	Std. Error		
Total kategorik PTG2	Buruk	Mean	1.35	.119		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.10		
			Upper Bound	1.61		
		5% Trimmed Mean	1.34			
		Median	1.00			
		Variance	.243			
		Std. Deviation	.493			
		Minimum	1			
		Maximum	2			
		Range	1			
		Interquartile Range	1			
		Skewness	.677	.550		
		Kurtosis	-1.766	1.063		
		Baik		Mean	1.94	.059
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.82
Upper Bound	2.07					
5% Trimmed Mean	1.99					
Median	2.00					
Variance	.059					
Std. Deviation	.243					
Minimum	1					
Maximum	2					
Range	1					
Interquartile Range	0					
Skewness	-4.123			.550		
Kurtosis	17.000			1.063		

Kekuatan Dalam Diri x Kualitas Hidup

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
total kategorik PTG3 * total kategorik kualitas hidup	34	100.0%	0	.0%	34	100.0%

total kategorik kekuatan dalam diri * total kategorik kualitas hidup
Crosstabulation

Count

		total kategorik kualitas hidup		Total
		Buruk	Baik	
total kategorik PTG3	Buruk	6	1	7
	Baik	11	16	27
Total		17	17	34

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.497 ^a	1	.034	.085	.043
Continuity Correction ^b	2.878	1	.040		
Likelihood Ratio	4.894	1	.027		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.365	1	.037		
N of Valid Cases	34				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.

b. Computed only for a 2x2 table

ALAUDDIN
MAKASSAR

Descriptives

total kategorik kualitas hidup			Statistic	Std. Error		
total kategorik PTG3	Buruk	Mean	1.59	.123		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.33		
			Upper Bound	1.85		
		5% Trimmed Mean	1.60			
		Median	2.00			
		Variance	.257			
		Std. Deviation	.507			
		Minimum	1			
		Maximum	2			
		Range	1			
		Interquartile Range	1			
		Skewness	-.394	.550		
		Kurtosis	-2.109	1.063		
		Baik		Mean	1.94	.059
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.82
Upper Bound	2.07					
5% Trimmed Mean	1.99					
Median	2.00					
Variance	.059					
Std. Deviation	.243					
Minimum	1					
Maximum	2					
Range	1					
Interquartile Range	0					
Skewness	-4.123			.550		
Kurtosis	17.000			1.063		

Penghargaan Terhadap Hidup x Kualitas Hidup
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
total kategorik PTG5 * total kategorik kualitas hidup	34	100.0%	0	.0%	34	100.0%

total kategorik penghargaan terhadap hidup * total kategorik kualitas hidup
Crosstabulation

Count

		total kategorik kualitas hidup		Total
		Buruk	Baik	
total kategorik PTG5	Buruk	7	1	8
	Baik	10	16	26
Total		17	17	34

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.885 ^a	1	.015		
Continuity Correction ^b	4.087	1	.043		
Likelihood Ratio	6.459	1	.011		
Fisher's Exact Test				.039	.020
Linear-by-Linear Association	5.712	1	.017		
N of Valid Cases	34				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.

b. Computed only for a 2x2 table

MAKASSAR

Descriptives

total kategorik kualitas hidup			Statistic	Std. Error		
total kategorik PTG5	Buruk	Mean	1.59	.123		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.33		
			Upper Bound	1.85		
		5% Trimmed Mean	1.60			
		Median	2.00			
		Variance	.257			
		Std. Deviation	.507			
		Minimum	1			
		Maximum	2			
		Range	1			
		Interquartile Range	1			
		Skewness	-.394	.550		
		Kurtosis	-2.109	1.063		
		Baik		Mean	1.94	.059
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.82
Upper Bound	2.07					
5% Trimmed Mean	1.99					
Median	2.00					
Variance	.059					
Std. Deviation	.243					
Minimum	1					
Maximum	2					
Range	1					
Interquartile Range	0					
Skewness	-4.123			.550		
Kurtosis	17.000			1.063		

Pengembangan Spiritual x Kualitas Hidup

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
total kategorik PTG4 * total kategorik kualitas hidup	34	100.0%	0	.0%	34	100.0%

total kategorik pengembangan spiritual * total kategorik kualitas hidup
Crosstabulation

Count

		total kategorik kualitas hidup		Total
		Buruk	Baik	
total kategorik PTG4	Buruk	7	1	8
	Baik	10	16	26
Total		17	17	34

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.885 ^a	1	.015		
Continuity Correction ^b	4.087	1	.043		
Likelihood Ratio	6.459	1	.011		
Fisher's Exact Test				.039	.020
Linear-by-Linear Association	5.712	1	.017		
N of Valid Cases	34				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

Descriptives

total kategorik kualitas hidup			Statistic	Std. Error		
total kategorik PTG4	Buruk	Mean	1.5882	.12304		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.3274		
			Upper Bound	1.8491		
		5% Trimmed Mean	1.5980			
		Median	2.0000			
		Variance	.257			
		Std. Deviation	.50730			
		Minimum	1.00			
		Maximum	2.00			
		Range	1.00			
		Interquartile Range	1.00			
		Skewness	-.394	.550		
		Kurtosis	-2.109	1.063		
		Baik		Mean	1.9412	.05882
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.8165
Upper Bound	2.0659					
5% Trimmed Mean	1.9902					
Median	2.0000					
Variance	.059					
Std. Deviation	.24254					
Minimum	1.00					
Maximum	2.00					
Range	1.00					
Interquartile Range	.00					
Skewness	-4.123			.550		
Kurtosis	17.000			1.063		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Suharda Chabirah, anak kedua dari tiga orang bersaudara dan seorang putri dari pasangan Suriaman, SKM dan Susdiana, Amd. Keb. Penulis lahir di Pulau Kijang 09 Maret 1998. Penulis mulai mengenyam pendidikan pada tahun 2002 di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Barabba dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 32 Barabba dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bulukumba hingga tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba hingga tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Kesehatan Masyarakat dan mengambil konsentrasi Epidemiologi dan dinyatakan lulus pada tahun 2019.