

**UJI VARIASI LARUTAN NUTRISI DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK
TEH TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN BAYAM HIJAU
(*Amaranthus tricolor* L.) PADA SISTEM
HIDROPONIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUCI RESKIANI
NIM. 60300115052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Reskiani
NIM : 60300115052
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 16 November 1997
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Pondok Alternatif (Depan kampus 2 Uin Samata Gowa)
Judul : Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ekstrak
Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau
(*Amaranthus tricolor* L.) Pada Sistem Hidroponik.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelaryang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Agustus 2019

Penyusun,



Suci Reskiani
NIM: 60300115052



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara **Suci Reskiani**, NIM: 60300115052, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi berjudul "Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor* L.) Pada Sistem Hidroponik., memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 13 Agustus 2019


Hasyimuddin, S.Si., M.Si.
Pembimbing II


Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.
Pembimbing I


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor* L) Pada Sistem Hidroponik", yang disusun oleh Suci Reskiani, NIM: 60300115052, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan 13 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 23 Agustus 2019 M,
22 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Masriany, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Syamsuri, S.S., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

UNIVERSITAS ALAUDDIN
Fakultas Sains dan Teknologi
Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Khalifah, M.Pd

NIP. 0710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Segala puji milik Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi yang berjudul **“Uji_Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor* L.) Pada Sistem Hidroponik”** dapat selesai. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya *uswah* dan *qudwah* dalam menjalankan aktivitas keseharian di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, maupun dari segi sistematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Sebuah persembahan dan sembah sujud serta terima kasih penulis persembahkan kepada Ayahanda **Alm. Genda** dan Ibunda **Hj. Hawania** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, berkorban, bekerja keras sepenuh hati membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah sehingga penulis meraih gelar Sarjana strata satu (S1).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk ini pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pabbari. M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu dekan I, pembantu dekan II, dan pembantu dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.


3. Dr. Mashuri Masri, S.Si, M.Kes. Selaku ketua jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan motivasi untuk saya sehingga dapat selesai dengan tepat waktu.
4. Hasyimuddin, S.Si., M.Si, selaku sekretaris jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus pembimbing II, saya ucapkan banyak terima kasih atas saran, ilmu, nasehat-nasehat serta kesabaran dalam membimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I skripsi saya ucapkan terima kasih telah banyak memberikan dorongan, semangat dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Masriany, S.Si., M.Si, selaku penguji biologi saya ucapkan terima kasih atas masukan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. H. Syamsuri, S.S., M.Ag, selaku penguji agama saya ucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Muhammad Shadiq Sabry, M.Ag, selaku dosen penguji Komprehensif agama yang sangat membantu penulis dalam mempelajari agama lebih dalam lagi.
9. Eka Sukmawati, S.Si.,M.Si ., Isna Rasdiana Azis, S.Si.,M,Sc, selaku dosen penguji komprehensif mikrobiologi dan biologi dasar yang sangat membantu penulis untuk mengingat kembali ilmu yang penulis dapatkan.
10. Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat selesai tepat waktu.
11. Dosen jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membantu penulis untuk dalam proses belajar, serta ilmu yang sangat berguna untuk kedepannya nanti, sehingga dapat memotivasi penulis untuk banyak belajar.

12. Keluarga Besar Jurusan Biologi, serta staf jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat selesai tepat waktu.
13. Keluarga besar penulis (Nurhayati Genda, Azwar Genda, Hasdar juniadi) yang tiada henti menguatkan, mendoakan, memotivasi, dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa berada situasi dan kondisi sekarang.
14. Teman-teman Impul5, (Biologi Angkatan 2015) yang telah menjadi teman perjuangan dalam menggali ilmu pada jurusan Biologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
15. Teman-teman Geng Tiup Lilin (Sahra, Eci, Ika) yang selalu memberi semangat serta membantu selama pengurusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Angkatan 59 Kec. Tombolopao Desa Erelembang Kab. Gowa, terkhusus teman posko penulis dan Ibu sebagai pengganti orang tua penulis selama KKN.
17. Teman team penulis yulia indayani yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
18. Teman-teman Green House (Salda, Musfirah, dan lfha) yang telah memotifasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat jika dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang tidak tercantum namanya dan kepada mereka tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga menjadi ibadah dana mal jariyah. AMIN.

Makassar, 15 Mei 2019

Penulis,



Suci Reskiyani

NIM: 60300115052

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Pandangan Islam Terhadap Tumbuhan	10
B. Tinjauan Umum tentang Tanaman Bayam.....	13
C. Tinjauan Umum tentang Teh.....	17
D. Tinjauan Umum tentang Hidroponik.....	20
E. Karangka Pikir.....	29
F. Hipotesis	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
C. Variabel Penelitian	32
D. Defenisi Operasional Variabel.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Prosedur Kerja	34

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rancangan penelitian	33
Tabel 4.1.	Hasil uji BNT jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>Amaranthus tricolor</i> L.)	38
Tabel 4.2.	Hasil uji BNT rata-rata jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.)	40
Tabel 4.3.	Hasil uji BNT Panjang daun jumlah lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	42
Tabel 4.4.	Hasil uji BNT rata-rata panjang daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	43
Tabel 4.5.	Hasil uji BNT jumlah lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.)	45
Tabel 4.6.	Hasil uji BNT rata-rata lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	46
Tabel 4.7.	Hasil uji BNT tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	48
Tabel 4.8.	Hasil uji BNT rata-rata tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	49
Tabel 4.9.	Hasil uji BNT rata-rata panjang akar tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Morfologi Tanaman Bayam.....	16
Gambar 2.2. Bayam Hijau (<i>A. tricolor</i> L.)	17
Gambar 2.3. Ekstrak teh	20
Gambar 2.4. Hidroponik sistem <i>wick</i>	23
Gambar 2.5. NFT (<i>Nutrient film technique</i>)	24
Gambar 2.6. FHS (<i>Floating hydroponic system</i>)	25
Gambar 2.7. Hidroponik substrat	25
Gambar 2.8. <i>EBB and Flow</i> (Sistem pasang surut)	26
Gambar 2.9. Sistem Aeroponik	26
Gambar 2.10. Sistem Irigasi Tetes	27
Gambar 2.11. Sistem <i>Run to Waste</i>	28
Gambar 4.1. Jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	37
Gambar 4.2. Rata-rata Jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.)	39
Gambar 4.3. Jumlah panjang daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.)	41
Gambar 4.4. Rata-rata jumlah panjang daun bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	42
Gambar 4.5. Lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.)	44
Gambar 4.6. Rata-rata lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	45
Gambar 4.7. Tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	47
Gambar 4.8. Rata-rata Tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	48
Gambar 4.9. Panjang akar tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram alir pembuatan wadah hidroponik, pembuatan nutrisi dan pengukuran pertumbuhan tanaman bayam (<i>A. tricolor</i> L.)	67
Lampiran 2. Rata-rata pertumbuhan tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.) yaitu jumlah daun, panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman dan panjang akar.....	69
Lampiran 3. Hasil Uji Anova (<i>Analysis of variences</i>)	80
Lampiran 4. Hasil Uji BNT rata-rata pertumbuhan tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor</i> L.).....	83
Lampiran 5. Dokumentasi pelaksanaan Penelitian	87



ABSTRAK

Nama : Suci Reskiani
Nim : 60300115052
Judul Skripsi : Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor* L.) Pada Sistem Hidroponik

Bayam merupakan jenis sayuran yang banyak digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia karena banyak mengandung gizi, antara lain protein, mineral, kalsium, zat besi, vitamin A dan C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji variasi larutan nutrisi ekstrak teh terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*Amaranthus tricolor* L.). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2019 di Green House jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 7 perlakuan dengan 4 ulangan yaitu P0 (3 L Air), P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix), P2 (20 gr Teh+30 ml AB mix), P3 (30 gr Teh+20 ml AB mix), P4 (40 gr Teh+10 ml AB mix), P5 (50 gr teh), P6 (50 ml AB mix). Parameter yang diamati adalah jumlah daun, lebar daun, panjang daun, tinggi tanaman dan panjang akar. Berdasarkan uji Anova dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$, yang dilanjutkan uji BNT, ekstrak teh berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bayam hijau (*Amaranthus tricolor* L.) dimana nilai tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (10 gr Teh + 40 ml AB mix) rata-rata jumlah daun (3 helai), lebar daun (2 cm), panjang daun (2 cm), tinggi tanaman (4,62 cm) dan panjang akar (5,9 cm). Dari hasil penelitian bahwa pada perlakuan P1 dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan AB mix dengan penambahan ekstrak teh.

Kata kunci: Bayam, Teh, Hidroponik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Student : SUCI RESKIANI
Id Number : 60300115052
Thesis Title : Test of variations in nutrient solution by adding tea extract to the growth of green spinach (*Amaranthus tricolor* L.) on hydroponic system.

Spinach is a type of vegetable that is widely favored by all Indonesian people because it contains a lot of nutrients, including protein, minerals, calcium, iron, vitamins A and C. This study aims to determine the variation test of tea extract solution on the growth of green spinach plants (*Amaranthus tricolor* L.). This research was conducted from March to April 2019 at the Green House majoring in Biology, Faculty of Science and Technology, Alauddin State Islamic University, Makassar. Using a completely randomized design (CRD) consisting of 7 treatments with 4 treatments, namely P0 (3 L Water), P1 (10 g Tea + 40 ml AB mix), P2 (20 g Tea + 30 ml AB mix), P3 (30 gr Tea + 20 ml AB mix), P4 (40 gr Tea + 10 ml AB mix), P5 (50 gr tea), P6 (50 ml AB mix). The parameters observed were number of leaves, leaf width, leaf length, plant height and root length. Based on the Anova test with a significant value of $0.00 < 0.05$, followed by the LSD test, tea extract significantly affected the growth of green spinach (*Amaranthus tricolor* L.) where the highest value was found in the treatment of P1 (10 g Tea + 40 ml AB mix) average number of leaves (3 strands), leaf width (2 cm), leaf length (2 cm), plant height (4.62 cm) and root length (5.9). From the results of the study that the treatment P1 can be used to minimize the use of AB mix with the addition of tea extracts.

Keyword: Spinach, Tea, Hydroponic



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menjelaskan kekuasaan atas segala rahmat dan segala ciptaan-Nya, baik dari yang terbesar hingga yang terkecil. Manusia sebagai hamba-Nya yang berakal yang senantiasa mempelajari untuk lebih menambah wawasan dalam keislaman dan lebih bersyukur kepada-Nya, dan dari penciptaan tersebut Allah swt. selalu menempatkan faedah-faedah di dalamnya terutama pada jenis tumbuhan. Menurut MIH Farooqi dalam Royyani (2019) bahwa di dalam al-Qur'an Allah swt. menyebutkan ayat tentang tumbuhan sebanyak 33 ayat, salah satunya yaitu, firman Allah swt. dalam QS. Thoha/20: 53 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama RI, 2012).

Menurut tafsir Al-Misbah ayat tersebut menjelaskan bahwa Dialah Tuhan yang menganugerahkan nikmat kehidupan dan pemeliharaan kepada hamba-hamba-Nya. Dengan kekuasaan-Nya, Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan

untukmu, membuka jalan-jalan untuk kamu lalui dan menurunkan hujan di atas bumi sehingga terciptalah sungai-sungai. Dengan air itu Allah swt. menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang berbeda-beda warna, rasa dan manfaatnya. Ada yang berwarna putih dan hitam, ada pula yang rasanya manis dan pahit (Shihab, 2011).

Menurut tafsir ilmi bahwa hubungan antara air dengan tumbuhan diungkapkan dengan jelas oleh Al-Qur'an. Begitupun sumber air yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang berasal dari air hujan, dari dalam tanah dalam bentuk mata air, maupun dari air dipermukaan yang mengalir. Tumbuhan bersama semua ciptaan Allah dan alam semesta, pada dasarnya mempunyai dua fungsi kunci. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki peran untuk kehidupan manusia sedangkan air memiliki peran penting untuk makhluk hidup tanpa air makhluk hidup akan mati (Lajnah, 2011).

Ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan alam di muka bumi dengan berbagai jenis makhluk hidup seperti diciptakannya beraneka ragam tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya tumbuhan makhluk hidup seperti manusia akan mati. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah swt. menciptakan tumbuhan untuk dipelihara, dimana tumbuh-tumbuhan itu akan mengalami proses yang sangat sulit. Tumbuhan itu akan tumbuh dan berkembang dengan bantuan energi cahaya matahari.

Bayam (*Amaranthus tricolor*) merupakan jenis sayuran yang banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia karena memiliki sumber gizi yang dapat memberikan rasa dingin dalam perut, dapat memperlancar pencernaan, dan banyak

mengandung gizi, antara lain protein, mineral, kalsium, zat besi, vitamin A dan C. Selain itu bayam juga banyak mengandung garam-garam mineral yang penting (kalsium, fosfor, besi) untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga kesehatan (Cahyo, 2016).

Bayam (*A. tricolor*) banyak dipromosikan oleh penduduk di negara berkembang. Di dalam negeri kebutuhan gizi semakin hari semakin bertambah sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk, meningkatnya usia, taraf hidup yang lebih baik, dan kesadaran akan pentingnya gizi dalam makanan sehari-hari. Hal ini menyebabkan kenaikan permintaan produk hortikultura khususnya tanaman bayam (*A. tricolor*) sebagai konsumsi masyarakat setiap harinya. Produksi bayam (*A. tricolor*) meningkat dari tahun 2004 hingga 2009 dengan kenaikan rata-rata sebesar 8,96% pertahun (BPS, 2012).

Menurut Nazaruddin (1993), Bayam hijau dapat tumbuh di dataran rendah ataupun dataran tinggi dan tumbuh sepanjang tahun. Tanaman ini banyak membutuhkan air sehingga cocok di tanam pada musim penghujan, akan tetapi tanaman ini juga bisa ditanam pada musim kemarau. Pertumbuhan bayam yang ideal pada derajat keasaman tanah (pH) antara 6-7 dengan suhu optimum antara 20°C-32°C, sehingga bayam cocok ditumbuhkan di hidroponik (Hadi, 2012).

Jika dilihat dari meningkatnya produksi bayam, dapat dikatakan bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap bayam semakin bertambah, namun ketersediaan lahan produktif semakin berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut maka

dapat dicari alternatif lain dalam penanaman sayuran khususnya bayam, yang dapat dilakukan dengan sistem hidroponik (BPS, 2012).

Hidroponik merupakan salah satu cara bercocok tanam yang memanfaatkan air sebagai media nutrisi yang akan langsung diserap oleh tanaman sebagai penunjang tumbuh tanaman. Hidroponik bisa dilakukan di lahan terbatas perkotaan. Nutrisi pada hidroponik diperoleh dengan mencampurkan formula cair A dan B, biasa disebut dengan pupuk AB mix (Sani, 2015).

Hidroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menggunakan media selain tanah. Penanaman dengan menggunakan hidroponik dapat lebih praktis karena media tanam yang digunakan bukan tanah, dapat dikontrol, dan pengamatan dapat dilakukan secara menyeluruh serta lebih mudah karena tanpa membersihkan akar dari kotoran-kotoran yang melekat seperti tanah. Selain itu tanaman juga berada dalam keadaan bersih, tidak kotor dan rusak sehingga dapat mengurangi resiko terserang penyakit. Hidroponik juga tidak memerlukan lahan penanaman yang luas dan dapat dilakukan pada ruang yang terbatas. Dengan kelebihan hidroponik tersebut, maka diharapkan pengamatan pertumbuhan tumbuhan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan suatu media hidroponik (Lingga, 2007).

Sistem hidroponik dikelompokkan menjadi dua, yaitu kultur media dan kultur larutan nutrisi. Kultur media tidak menggunakan air sebagai media, tetapi menggunakan media padat (bukan tanah) yang dapat menyediakan nutrisi, air, dan oksigen serta mendukung akar tanaman seperti halnya fungsi tanah (Lingga, 2007).

Sebaliknya pada kultur larutan nutrisi, penanaman tidak dilakukan menggunakan media tanam atau media tumbuh, sehingga akar tanaman tumbuh di dalam larutan nutrisi atau di udara. Hidroponik rakit apung termasuk kedalam kelompok hidroponik larutan diam. Hal ini dikarenakan larutan nutrisi dibiarkan tergenang didalam wadah tanpa sirkulasi, sehingga akar terapung dan terendam larutan nutrisi (Lonardy, 2006).

Tanaman memerlukan unsur-unsur tertentu untuk membentuk tubuhnya dan memenuhi semua kegiatan hidupnya, unsur-unsur tersebut diserap oleh tanaman dan mempunyai guna tertentu. Budidaya tanaman dengan sistem hidroponik yang perlu diperhatikan adalah pemberian nutrisi. Salah satu nutrisi yang biasa digunakan para petani hidroponik adalah pupuk AB mix, pupuk khusus yang sudah dirancang untuk pupuk hidroponik yang mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, akan tetapi harga jual pupuk tersebut cukup tinggi untuk para petani. Banyak upaya yang dilakukan petani dalam mengurangi pembelian pupuk tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah dengan meramu atau membuat pupuk AB mix (Sani, 2015).

Budidaya sayuran daun secara hidroponik umumnya menggunakan larutan hara berupa larutan hidroponik standar (AB mix). Permasalahannya pada saat ini penggunaan larutan hara AB mix memerlukan biaya yang relatif tinggi. Masyarakat umum memandang bahwa teknologi secara hidroponik memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dalam hal perawatan dan harga pupuk. Alternatif dalam pengembangan teknologi hidroponik sangat diperlukan agar mempermudah masyarakat khususnya petani kecil dalam menerapkan budidaya sayuran, yaitu dengan cara memanfaatkan

beberapa sumber hara dengan harga yang relatif lebih murah, misalnya tanaman teh (Nugraha, 2015).

Teh mengandung senyawa-senyawa bermanfaat seperti *polyphenol*, *tehofilin*, flavonoid, tanin, vitamin C dan vitamin E serta sejumlah mineral Zn, Se, Mo, Ge dan Mg. Kandungan teh yang berupa mineral tersebut merupakan unsur-unsur esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman (Pujianto, 2007). Air teh basi bermanfaat memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun. Kandungan yang terdapat pada air teh basi adalah karbon organik, Tembaga (Cu) 20%, Magnesium (Mg) 10% dan Kalsium (Ca) 13% (Pujianto, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian sebagai upaya pemanfaatan ekstrak teh terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) pada metode hidroponik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana uji variasi larutan nutrisi dengan penambahan ekstrak teh terhadap pertumbuhan tanaman bayam (*A. tricolor*) secara hidroponik?
2. Pada takaran berapakah variasi larutan nutrisi yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman bayam (*A. tricolor*) secara hidroponik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Bibit bayam (*Amaranthus tricolor* L.) yang digunakan diperoleh dari toko pertanian dengan kode 094/Kpts/SR.120/D.2.7/9/2013. Benih tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dilakukan penyemaian setelah itu bayam (*A. tricolor*) dibudidayakan dengan menggunakan hidroponik sistem rakit apung. Pada penelitian ini hal yang diteliti adalah uji variasi larutan nutrisi dengan pemberian ekstrak teh terhadap pertumbuhan tanaman bayam (*A. tricolor*). Ekstrak teh diperoleh dari teh celup yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pada penelitian dengan 5 parameter yang diukur yaitu, penambahan jumlah daun (helai), lebar daun (cm), panjang daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm).

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Adikasari (2012) melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Ampas Teh dan Ampas kopi Sebagai Penambah Nutrisi Pada Pertumbuhan Tanaman Tomat (*Solanum lycopersicum*) Dengan Media Hidroponik. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu faktor dengan empat perlakuan yaitu air 300 mL tanpa ampas teh dan ampas kopi sebagai kontrol (P0), air 300 mL dengan 3 gram ampas teh (P1), air 300 mL dengan 3 gram ampas kopi (P2) dan air 300 mL dengan 3 gram campuran ampas teh dan ampas kopi masing-masing 1,5 gram untuk (P3), masing perlakuan diberi 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi tanaman yang paling baik

adalah pada tanaman dengan 300 mL air ditambah 3 gram campuran ampas teh dan ampas kopi dengan tinggi rata-rata 14,00 cm. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ampas teh dan ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai penambah nutrisi pada pertumbuhan tanaman tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan media hidroponik.

2. Juliati (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pemberian ampas teh dan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman tomat (*Lycopersicum Esculentum* Mill) dengan media hidroponik”. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu faktor dengan empat perlakuan yaitu 300 ml air tanpa ampas teh dan ampas kopi sebagai kontrol (P0), 300 ml air dengan 4 gram ampas teh (P1), 300 ml air dengan 4 gram ampas kopi (P2) dan 300 ml air dengan 4 gram campuran ampas teh dan ampas kopi masing-masing 2 gram (P3), masing-masing perlakuan diberi 4 ulangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 4 gram campuran ampas teh dan ampas kopi mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat (*Lycopersicum esculentum* Mill) dengan media hidroponik.

3. Sumarmi (2016), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Teh Dan Macam Media Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Terong Di Polybag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak teh dan macam media berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong di polybag. Perlakuan konsentrasi ekstrak teh 10 g/l dan Media tanam campuran tanah : pupuk kandang: sekam memberikan pertumbuhan dan hasil terbaik terong.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui uji variasi larutan nutrisi dengan penambahan ekstrak teh terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) secara hidroponik.
2. Untuk mengetahui berapa dari larutan nutrisi dengan penambahan ekstrak teh yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) secara hidroponik.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan alternatif sumber nutrisi yang dapat diterapkan dalam bidang pertanian.
2. Dapat memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan ekstrak teh sebagai nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*).
3. Dapat meningkatkan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik sehingga keterbatasan lahan tidak dijadikan sebuah permasalahan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pandangan Islam Terhadap Sains

Hubungan antara agama dan sains terdiri dari, dialogis, integrasi, topologi konflik yang muncul salah satunya yaitu menurut pemikiran Richard Dawkins, Francis Crick, Steven Pinker serta Stephen Hawking pada abad ke-19. Pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua ekstrim yang saling bertentangan. Bahwa sains dan agama memberikan pernyataan yang berlawanan sehingga orang harus memilih salah satu di antara keduanya. Masing-masing menghimpun penganut dengan mengambil posisi-posisi yang bersebrangan. Sains menegaskan eksistensi agama, begitu juga sebaliknya, keduanya hanya mengakui keabsahan eksistensi masing-masing (Barbour, 2006).

Beberapa ilmuwan menganut independensi dengan memisahkan sains dan agama dalam dua wilayah yang berbeda. Masing-masing mengakui keabsahan eksistensi sains dan agama. Baik agama maupun sains dianggap mempunyai kebenaran sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain, sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai. Pemisahan wilayah ini dapat berdasarkan masalah yang dikaji, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Mereka berpandangan bahwa sains berhubungan dengan fakta, dan agama mencakup nilai-nilai. Dua domain yang terpisah ini kemudian ditinjau dengan perbedaan bahasa dan fungsi masing-masing. Sains hanya mengeksplorasi masalah terbatas pada fenomena alam, tidak

untuk melaksanakan fungsi selain itu. Sedangkan bahasa agama berfungsi memberikan seperangkat pedoman, menawarkan jalan hidup dan mengarahkan pengalaman religius personal dengan praktek ritual dan tradisi keagamaan (Barbour, 2006).

Penafsiran al-Quran tentang ilmu pengetahuan yaitu memahami al-Qur'an melalui sains modern. Dengan kata lain, tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dan sains. Pertama, penafsiran ilmiah terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak menjadi larangan selagi seorang mufassir tetap menjaga kaidah-kaidah penafsiran yang telah disepakati para ahli sekaligus juga tidak melakukannya secara spekulatif. Kedua, memahami hubungan al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat adakah teori-teori ilmiah atau penemuan-penemuan baru yang tersimpul di dalamnya, tetapi dengan melihat adakah al-Qur'an atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau justru mendorong lebih maju. Ketiga, tidak ada penentangan ilmu pengetahuan di dalam ayat-ayatnya Al-Qur'an, bahkan justru banyak mendorong umat Islam untuk lebih banyak memberdayakan akalanya dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat untuk seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Keempat, al-Qur'an adalah kitab hidayah yang memberikan petunjuk dan mengatur manusia seluruhnya baik dalam persoalan aqidah, tasyri' (hukum), muamalah dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Laila, Izzatul, 2014).

Sebagai calon ilmuwan muslim hendaknya kita selalu berlandaskan kepada al-Qur'an untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Adapun ayat yang menggambarkan tentang tumbuhan dengan jelas bahwa Allah swt. menciptakan sesuatu di bumi ini tidak ada yang tidak terdapat faedahnya, sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Kafhi/18:45 yang berbunyi:

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Terjemahnya:

Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2012).

Menurut tafsir Al-Misbah ayat tersebut menjelaskan bahwa Wahai Rasul , sebutlah kepada mereka sebuah perumpamaan yang menggambarkan daya tarik keindahan dunia itu bagaikan air yang turun dari langit dan menyirami tumbuhan yang ada di atas bumi sehingga menjadi hijau dan matang. Tiba-tiba bumi berubah menjadi kering kerontang dan diceraiberaikan oleh angin. Allah swt. Mahakuasa untuk menciptakan atau memusnahkan segala sesuatu (Shihab, 2011).

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan Allah swt. telah menciptakan langit dan bumi dengan ditumbuhkannya macam-macam tumbuhan-tumbuhan yang menghijau. Kemudian diturunkannya air hujan dari langit untuk menumbuhkan suatu tanaman

melalui proses fotosintesis. Tanaman teh merupakan tanaman obat yang memiliki banyak manfaat seabagai antioksidan, antimikroba, antibakteri, dan banyak dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanaman. Tumbuhan akan berkembang secara normal dan tumbuh subur serta aktif apabila sel-selnya dipenuhi dengan air, berhubung air berfungsi sebagai medium berbagai reaksi kimiawi sel. Ketika suatu tanaman kekurangan suplai air, maka kandungan air dalam tumbuhan menurun dan laju perkembangannya yang ditentukan oleh laju semua fungsi-fungsi yang juga menurun. Jika keadaan kekeringan ini berlangsung lama, maka dapat mematikan tumbuhan (Rossi, 2010).

B. Tinjauan Umum Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor* L.)

Sayuran merupakan bahan pangan yang mudah didapatkan diberbagai tempat. Ada beberapa jenis sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Contohnya sayuran yang berasal dari daun daunan seperti bayam (*A. tricolor*) daun singkong, pakis dan sawi. Di pasaran, bayam dijual dalam bentuk untaian yang diikat dengan batangnya. Jenis bayam yang digunakan sebagai sayuran yaitu bayam merah dan bayam hijau (Hasanuddin, 1998).

Bayam (*A. tricolor*) dianggap sebagai raja sayuran karena kandungan gizinya yang tinggi. Bayam banyak mengandung vitamin A, B dan C, selain itu bayam banyak mengandung garam-garam mineral yang penting seperti kalsium, fosfor dan besi. Bayam mengandung zat mineral yang tinggi yaitu zat besi untuk mendorong pertumbuhan badan dan menjaga kesehatan (Rizki, 2013).

Selain sebagai sayuran yang bergizi tinggi, bayam juga dimanfaatkan sebagai obat berbagai macam Penyakit. Kandungan vitamin A dalam bayam berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam menanggulangi penyakit mata, vitamin C dapat membantu menyembuhkan sariawan. Zat besi dapat mencegah penyakit anemia atau anemia gizi besi (Haryadi, 2013).


Bayam (*A. tricolor*) yang terkenal dengan nama ilmiah *Amaranthus tricolor* L. sudah banyak dipromosikan sebagai sayuran yang banyak mengandung gizi bagi penduduk di negara yang sedang berkembang. Karena tanaman bayam memiliki kandungan gizi yang tinggi, maka sayuran bayam sering disebut sebagai raja sayuran atau *king of vegetable* (Rukmana Rahmat, 2010).

Tanaman bayam (*A. tricolor*) yang kini sudah dikenal di seluruh penjuru dunia, menurut penelusuran dari sejarah bayam ternyata tanaman bayam berasal dari daerah Amerika Tropika. Dalam perkembangan selanjutnya, di kawasan Amerika Latin tanaman bayam dipromosikan sebagai bahan pangan sumber protein, terutama bagi negara-negara berkembang. Masuknya tanaman bayam ke Indonesia bersamaan dengan lalu lintas perdagangan luar negeri yang memasarkan barang dagangan ke Indonesia pada abad XIX atau sekitar tahun 1900 (Nasution, 2016).

Tanaman bayam (*A. tricolor*) mempunyai struktur batang, daun, bunga dan alat reproduksi. Bagian batang pada bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Terkadang batangnya mengeras seperti kayu, dan mempunyai cabang banyak. Cabang- cabang pada tanaman bayam (*A. tricolor*) biasanya akan melebar dan tumbuh tunas baru yang sering dipangkas. Daun bayam

umumnya berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing, dan urat-urat daunnya terlihat jelas. Warna pada daun bayam (*A. tricolor*) bervariasi, mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputihan sampai warna merah. Struktur yang terdapat pada daun bayam (*A. tricolor*) liar umumnya kasap dan kadang-kadang berduri (Cahyo, 2016).

Bayam (*A. tricolor*) merupakan tanaman perdu dan tinggi kurang lebih 1,5 meter. Sistem perakarannya menyebar pada kedalaman antara 20-40 cm dan berakar tunggang karena termasuk tanaman berbiji keping dua. Bayam merupakan tanaman yang memiliki morfologi yang berbeda-beda antar jenisnya. Bayam (*A. tricolor*) merupakan jenis sayuran daun dari keluarga *amaranthaceae* yang memiliki sekitar 60 genera, dan terbagi ke dalam 800 spesies bayam (Grubben, 1976). Tanaman bayam (*A. tricolor*) memiliki bunga yang tersusun dan tumbuh tegak, biasanya Bunga keluar dari ujung tanaman ataupun dari ketiak-ketiak daun. Bentuk bunga bayam memanjang mirip ekor kucing dan pembuangannya dapat berlangsung musiman atau tahunan. Alat reproduksi yang dimiliki Oleh tanaman bayam (*A. tricolor*) umumnya dilakukan secara generatif (biji). Dari setiap tandan bunga dapat dihasilkan ratusan hingga ribuan biji bayam. Ukuran biji bayam sangat kecil, bentuknya bulat dan berwarna coklat tua mengkilap sampai hitam (Haryadi, 2013).



Gambar 2.1. Morfologi Tanaman Bayam (*A. tricolor*) (a) Akar, (b) Batang, (c) Daun, (Dokumentasi Pribadi, 2019).

Klasifikasi ilmiah tanaman bayam hijau *A. tricolor* menurut Tjitrosoepomo (2014) adalah sebagai berikut.

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermathopyta

Class : Angiospermae

Subclass : Dicotyledone

Ordo : Caryophyllales

Family : Amaranthaceae

Genus : Amaranthus

Species : *Amaranthus tricolor* L.



Gambar 2.2. Bayam Hijau (*A. tricolor* L.), (Dokumentasi Pribadi, 2019).

C. Tinjauan Umum Teh

Teh merupakan salah satu jenis bahan minuman yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia (Indah, 2013). Menurut Sundari (2009), limbah ampas teh mengandung serat kasar, selulosa dan lignin yang dapat digunakan oleh jamur tiram untuk pertumbuhannya dan mengandung tanin yang dimanfaatkan untuk menolak kehadiran semut. Selain itu ampas teh mengandung berbagai macam mineral seperti karbon organik, Tembaga (Cu) 20%, Magnesium (Mg) 10%, dan Kalsium 13% (Nadya, 2014).

Salah satu produk komoditas dunia yang dihasilkan Indonesia adalah teh. Teh menjadi produk minuman yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Jenis teh

yang dikenal ada 2 macam, yaitu *Camelia sinensis var. sinensis* dari Cina dan *C. sinensis var. assamica* dari India. Zat aktif yang terdapat dalam teh antara lain *katekin, epigalokatekin galat, tanin, teobromin* dan *teofilin* (Ma'roef, 2000).

Air sisa teh, baik yang berupa teh celup atau teh daun, dapat menjadi sumber pupuk yang baik bagi tanaman, meskipun tidak dapat diserap secara langsung. Dalam penggunaan bekas teh celup sebagai pupuk, maka bungkus teh harus dibuka dan disebar atau ditimbun ke dalam pot. Ampas teh tersebut akan menjadi penyedia hara melalui proses dekomposisi (Nadya, 2014).

Teh cukup banyak mengandung mineral, baik makro maupun mikro. Komponen aktif yang terkandung dalam teh, baik yang volatil maupun yang non-volatil antara lain adalah asam amino, peptida, vitamin (C, E dan K), Kalium, Flour, Zinc, Mangan, Magnesium, Betakaroten, Selenium, Copper dan kafein. Kandungan senyawa-senyawa tersebut berbeda-beda antara masing-masing jenis teh (Caroline, 2013).

Katekin dalam teh merupakan senyawa kompleks yang termasuk golongan flavonoid dan termasuk kelas flavanol. Flavanol mempunyai peran sebagai antioksidan dalam teh (Alamsyah, 2006).

Flavonoid merupakan salah satu senyawa golongan fenol yang sering terdapat sebagai glikosida. Senyawa ini juga merupakan senyawa golongan polifenol yang larut dalam air. Flavonoid berfungsi sebagai pengatur pada fotosintesis, sebagai antimikroba dan antivirus. Flavonoid sebagai antimikroba dapat merusak membran plasma, dapat menyebabkan kebocoran sel dan merusak susunan perubahan

premeabilitas dinding sel bakteri pada konsentrasi rendah, sedangkan pada konsentrasi tinggi dapat berkoagulasi dengan protein seluler sehingga menyebabkan kematian. Senyawa ini jarang ditemukan dalam bentuk tunggal melainkan ditemukan dalam bentuk campuran. Senyawa fenol dari tumbuhan mempunyai kemampuan untuk membentuk kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen, sehingga dapat merusak membran sel bakteri (Pervaiz, 2009).

Senyawa alkaloid yang terdapat dalam daun teh adalah kafein. Alkaloid yang terkandung dalam teh mempunyai sifat penyegar, yaitu sebesar 3-4% dari berat kering daun (Alamsyah, 2006). Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terbesar yang terdapat dalam tumbuhan terutama biji, daun, ranting, dan kulit kayu (Inail, 2014).

Alkaloid bersifat toksik terhadap mikroba sehingga efektif membunuh bakteri dan virus. Alkaloid dapat berfungsi sebagai antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif dan Gram positif. Alkaloid diperkirakan mempunyai kemampuan melindungi tumbuhan dari serangan parasit (Schrahmn, 2013).

Senyawa ini tidak berwarna dan paling penting pada daun teh karena dapat menentukan kualitas daun teh dalam pengolahannya, perubahannya selalu dihubungkan dengan semua sifat teh yaitu rasa, warna, dan aroma. Dalam pengolahannya, senyawa tidak berwarna ini, baik langsung maupun tidak langsung selalu dihubungkan dengan semua sifat produk teh, yaitu rasa, warna, dan aroma (Sofyan, 2014).

Klasifikasi tanaman teh berdasarkan Cronquist (1981) adalah sebagai berikut:

Kingdom: Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Ordo : Guttiferales

Familia : Tehaceae

Genus : Camelia

Spesies : Camelia sinensis



Gambar 2.3. Ekstrak teh,
(Dokumentasi pribadi, 2019).

D. Tinjauan Umum Hidroponik

Hidroponik adalah suatu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman. Perbedaan bercocok tanam dengan tanah dan hidroponik yaitu, apabila dengan tanah, zat-zat makanan diperoleh tanaman dari dalam tanah. Sedangkan hidroponik, makanan diperoleh tanaman dari dalam air yang mengandung zat-zat anorganik (Lonardy, 2006).

Sistem budidaya hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanaman dengan penambahan nutrisi hara untuk pertumbuhan. Penunjang keberhasilan dari sistem budidaya ini adalah media yang bersifat porus dan aerasi baik serta tercukupinya nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan beberapa penelitian hidroponik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa macam media padat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Azizah (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlakuan antara media

tanam dengan jenis pupuk berpengaruh sangat nyata terhadap semua variabel pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Menurut hasil penelitian Mas'ud (2009) nutrisi dan media tanam yang berbeda memberikan hasil yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. Pupuk dalam istilah hidroponik disebut juga dengan nutrisi diperlukan tanaman meliputi unsur hara makro dan mikro. Setiap jenis nutrisi hidroponik memiliki komposisi yang berbeda-beda (Perwtasari, 2012).

Air yang digunakan dalam hidroponik hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya pH, kekeruhan, ukuran partikel, unsur-unsur kimia, dan proporsi. Hidroponik diperkarangan cocok untuk sayuran daun, misalnya sawi, selada, caisim dan bayam. Bisa juga digunakan untuk sayuran batang, seperti bawang daun, kangkung, sayuran bunga, seperti brokoli dan bunga kol dan sayuran buah, seperti tomat, paprika, terong, dan mentimun (Karsono, 2002).

Nutrien yang diberikan ada beberapa macam yang dapat digolongkan menjadi 2 yaitu nutrisi yang mengandung unsur hara makro dan nutrisi yang mengandung unsur hara mikro. Nutrien yang mengandung unsur hara makro yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti N, P, K, S, Ca, dan Mg. Nutrien yang mengandung unsur mikro merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, seperti Mn, Cu, Mo, Zn dan Fe (Subandi, 2015).

Sistem hidroponik dapat memberikan suatu lingkungan pertumbuhan yang lebih terkontrol. Dengan pengembangan teknologi, kombinasi sistem hidroponik dengan membran mampu mempergunakan air, nutrisi, pestisida secara nyata lebih

efisien (minimalis sistem) dibandingkan dengan kultur tanah, terutama untuk tanaman berumur pendek. Penggunaan sistem hidroponik tidak mengenal musim dan tidak memerlukan lahan yang luas dibandingkan dengan kultur tanah untuk menghasilkan satuan produktivitas yang sama (Lonardy, 2006).

Salah satu media yang dapat digunakan untuk sistem hidroponik adalah gel. Pengaturan ukuran gel dalam media tanam sangat diperlukan, karena dapat mempercepat proses penyerapan air dan penyimpanan air oleh media. Selain itu ukuran gel juga mempengaruhi penyediaan ruang untuk pengakaran tanaman. Keuntungan lain penggunaan gel dapat menghindarkan adanya hewan tanah, dapat diberi pewarna sehingga dapat mempercantik untuk tanaman hias. (Hakim, 2006) Selain gel masih ada media tanam lain yang dapat dimanfaatkan untuk hidroponik, misalnya arang sekam, arang sekam merupakan hasil dari pembakaran kulit gabah. Menurut Murniati (2009) bahwa arang sekam memiliki sifat kasar sehingga sirkulasi udara tinggi, ringan dengan berat jenis sekitar $0,2 \text{ gr/cm}^3$, kapasitas menahan air tinggi dan dapat menghilangkan pengaruh penyakit karena telah melalui tahap sterilisasi, sehingga relatif bersih dari hama, bakteri dan gulma (Isbandi, 2000).


Media (substrat) ada dua macam, yaitu substrat organik dan substrat anorganik. Substrat organik berupa pakis, sekam bakar, debog pisang, *cocopeat* dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat anorganik meliputi pecahan batu bata, kerikil, gabus dan sebagainya. Media/substrat yang biasa digunakan adalah sekam bakar, *rockwool-gro* dan atau *cocopeat*. Media tanam juga dapat dikombinasikan antara media yang satu dengan media yang lain dengan perbandingan tertentu atau yang

telah direkomendasikan. Misalnya pasir dengan cocopeat dengan perbandingan 1:1, pecahan batu bata dengan debog pisang dan sebagainya (Wasonowati, 2011).

Menurut karsono (2002), hidroponik sebagai cara bertanam tanpa menggunakan media tanah dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Hidroponik sistem *wick*

Sistem sistem *wick* (sumbu), dalam sistem hidroponik ini, sumbu sebagai penyalur larutan nutrisi bagi tanaman dalam media tanam (Rosliana, R dan N. Sistem ini bersifat pasif, karena tidak ada bagian-bagian yang bergerak.




Gambar 2.4 Hidroponik sistem *wick*, (Karsono, 2002).

2. NFT (*Nutrient film technique*)

Hidroponik sistem NFT adalah salah satu sistem hidroponik yang paling terkenal dan banyak digunakan oleh petani ataupun pembudidayaan tanaman. Hidroponik sistem NFT merupakan salah satu sistem hidroponik dengan mempergunakan air sebagai medianya. Air yang sudah mengandung nutrisi itu nantinya harus merendam akar tanaman sedalam kurang lebih 3 mm. supaya air mengalir kepipa-pipa, kita membutuhkan bantuan pompa listrik yang nonstop 24 jam


sesuai waktu yang ditentukan dengan teknik inilah, reaksi tanaman terhadap perubahan formula pupuk dapat segera terlihat.



Gambar 2.5. NFT (*Nutrient film technique*), (Karsono, 2002).

3. FHS (*Floating hydroponic system*) atau rakit apung

Sistem rakit apung (dalam beberapa sumber, juga mirip dengan metode Statis dan *Deep water culture*). Dalam dunia hidroponik, sama terkenal dengan sistem NFT. Cara penanamannya pun lebih mudah dan cocok dipraktikkan di daerah yang belum dialiri listrik. Hidroponik sistem rakit apung merupakan cara menanam tanaman yang diletakkan pada lubang styrofoam yang diapungkan diatas permukaan air yang telah dicampur dengan pupuk dan larutan nutrisi. Tidak perlu ada sirkulasi sehingga tidak membutuhkan pompa listrik.



Gambar 2.6. FHS (*Floating hydroponic system*), (Karsono, 2002).

4. Hidroponik substrat


Sistem hidroponik substrat merupakan metode budidaya tanaman dimana akar tanaman tumbuh pada media selain tanah. Sistem substrat ini merupakan cara bercocok tanam dengan memakai media yang dialiri larutan nutrisi sehingga tanaman memperoleh air, nutrisi, dan oksigen secara cukup.



Gambar 2.7. Hidroponik substrat (Karsono, 2002).

5. *EBB and Flow* (Sistem pasang surut)


EBB and Flow merupakan salah satu sistem hidroponik yang dalam pemberian nutrisinya berjalan secara pasang surut. Untuk menggunakan sistem ini dibutuhkan timer pemberi nutrisi dalam rangkaiannya.



Gambar 2.8. *EBB and Flow* (Sistem pasang surut), (Karsono, 2002).

6. Sistem Aeroponik


Dari asal katanya, aeroponik terdiri dari dua kata yaitu *Aero* yang berarti udara dan *Phonic* yang berarti cara budidaya. Jadi kesimpulannya, sistem ini merupakan cara bercocok tanam di udara, di mana tanaman ditempatkan pada media inert lalu akar tanamannya dibiarkan menggantung di udara tanpa media. Sedangkan kebutuhan nutrisinya dipenuhi dengan cara spraying ke akarnya hingga terbentuk kabut. Penyemprotan nutrisi dilakukan dengan peralatan *springkle* selama 24 jam nonstop atau berseling dengan rentang waktu 10 menit.



Gambar 2.9. Sistem Aeroponik (Karsono, 2002).

7. Sistem irigasi tetes

Bercocok tanam secara hidroponik sistem irigasi tetes terbilang sangat hemat air dan pupuk. Metode ini berkerja dengan cara membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar. Tekniknya sangat sederhana tapi efektif sebagai solusi pertanian dimusim kering.



Gambar 2.10. Sistem Irigasi Tetes (Karsono, 2002).

8. Sistem Bioponik

Sistem bioponik sering juga disebut sebagai hidroponik organik. Konsep dari bioponik ini adalah bercocok tanam dengan air tanpa tanah dan substrat, akan tetapi tanaman tidak kehilangan kandungan yang ada dalam tanah. Artinya, air tersebut tidak hanya mengandung mineral makanan tetapi juga kehidupan mikroorganisme.

9. Sistem *Run to Waste*

Sistem ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Intinya, larutan nutrisi yang ditampung dalam bak tersendiri dapat mengalir menuju akar tanaman, dan kemudian mengalir lagi sebagai limbah menuju bak penampungan.





Fig 1.5a Run-to-waste system (Basic layout): Nutrient run-off drains directly onto the ground.

Gambar 2.11. Sistem *Run to Waste* (Karsono, 2002).



E. Kerangka pikir



F. Hipotesis

1. Variasi larutan nutrisi dengan penambahan ekstrak teh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam (*A. tricolor*) secara hidroponik.
2. Terdapat takaran yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman bayam (*A. tricolor*) secara hidroponik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental yang menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat *validation* atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*dependent variables*). Penelitian ini merupakan eksperimen murni.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2019 di *Green house* jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata-Gowa.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah ekstrak teh sebagai sumber nutrisi dan variabel terikat adalah pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*).

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel antara lain:

1. Selain untuk kesehatan tubuh, teh juga memiliki banyak manfaat untuk tanaman, salah satunya sebagai penambah nutrisi bagi tanaman karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ekstrak teh dalam penelitian ini diperoleh dengan cara teh dilarutkan kedalam 3 L air, dengan takaran masing-masing 10 gram, 20 gram, 30 gram 40 gram, 50 gram.
2. Pertumbuhan tanaman bayam (*A. tricolor*) merupakan suatu peningkatan ukuran sel-sel tunggal atau peningkatan jumlah sel atau keduanya yang ditandai dengan jumlah daun (helai), panjang daun (cm) , lebar daun (cm), tinggi tanaman dan panjang akar (cm).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi (pengamatan), pengukuran langsung dan dibantu dengan kamera. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan dan sehingga terdapat 28 unit percobaan.

P0= 3 L air + 0 gram teh (kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gram teh + 40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gram teh + 30 ml AB mix

P3= 3 L air + 30 gram teh + 20 ml AB mix

P4= 3 L air + 40 gram teh + 10 ml AB mix

P5= 3 L air + 50 gram teh

P6= AB Mix 50 ml (+) (kontrol positif)

Tabel 3.1. Rancangan penelitian

P1		P2		P3		P4	
P ₁ U ₁	P ₁ U ₄	P ₂ U ₁	P ₂ U ₂	P ₃ U ₁	P ₃ U ₂	P ₄ U ₁	P ₄ U ₂
P ₁ U ₃	P ₁ U ₂	P ₂ U ₃	P ₂ U ₄	P ₃ U ₃	P ₃ U ₄	P ₄ U ₃	P ₄ U ₄

P5		P6		P7	
P ₅ U ₁	P ₅ U ₂	P ₆ U ₁	P ₆ U ₂	P ₇ U ₁	P ₇ U ₂
P ₅ U ₃	P ₅ U ₄	P ₆ U ₃	P ₆ U ₄	P ₇ U ₃	P ₇ U ₄

F. Instrumen penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ember, gayung, *cutter*, gunting, gelas ukur, *handspayer*, mistar, net pot, aerator, gelas backer, neraca analitik, terminal, *rock wol*, kamera, alat tulis dan wadah penyemaian.

2. Bahan

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air, teh, benih bayam hijau (*A. tricolor*), *styrofoam*, *aluminium foil* dan nutrisi hidroponik AB mix.

G. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja merupakan modifikasi dari penelitian terdahulu oleh Risnawati (2016) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Media tanam

Persiapan media tanam dengan mempersiapkan alat dan bahan yaitu wadah, aerator, *styrofoam* yang digunakan sebagai penutup wadah. Kemudian *styrofoam* dilubangi untuk menyimpan *netpot*. Kemudian *netpot* tersebut diletakkan pada wadah yang sudah ditutupi dengan *styrofoam* yang telah dilubangi. Kemudian memasang aerator kemudian selang aerator diletakkan didalam wadah. Aerator dinyalakan pada saat wadah sudah berisi nutrisi dan tanaman sudah dipindahkan.

2. Penyemaian

Benih tanaman bayam (*A. tricolor*) disemai menggunakan media *rockwol*. Kemudian benih disimpan ditempat gelap selama 24 jam kemudian setelah benih mulai berkecambah benih disimpan ditempat yang terkena paparan sinar matahari kemudian benih bisa dipindahkan jika sudah muncul daun sejati. Sekitar 7-10 hari untuk siap dipindahkan.

3. Pembuatan larutan

Pembuatan larutan yaitu dengan cara melarutkan 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr dan 50 gr teh masing-masing ke dalam 3 L air kemudian pada perlakuan masing perlakuan ditambahkan larutan nutrisi AB mix dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu P1: 40 mL, P2: 30 mL, P3: 20 mL, dan P4: 10 mL.

4. Penanaman

Pemindahan tanaman dilakukan apabila tanaman sudah memenuhi ciri-ciri tanaman yang sudah siap pindah. Adapun ciri-ciri tanaman yang sudah siap dipindah tanamkan yaitu dengan melihat jumlah daun sejati. Bibit yang siap tanam harus memiliki jumlah daun sejati setidaknya 3-4 helai karena sudah dianggap cocok untuk dipindahkan ke hidroponik. Cara penanaman yaitu dengan cara memasukkan bibit tanaman bayam (*A. tricolor*) pada *netpot* kemudian diletakkan pada wadah yang sudah disediakan.

5. Pemeliharaan

Melakukan pemeriksaan secara kontinyu, pengontrolan nutrisi pada semua wadah, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik yaitu bila dijumpai ada hama, mengambil dan mematikan hama. Bila ada tanaman yang terserang penyakit layu, mencabut tanaman dan segera membuang medianya, wadah penanaman dapat digunakan lagi dengan media dan tanaman yang baru dan sehat.

6. Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung gejala yang terjadi pada setiap perlakuan, dengan pengamatan 1 kali dalam seminggu. Pada penelitian ini ada 5 parameter yang diukur yaitu penambahan jumlah daun (helai), lebar daun (cm), panjang daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm).

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Jumlah daun (helai), jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka sempurna.

2. Panjang daun (cm), mengukur panjang daun dari pangkal sampai ujung daun.
3. Lebar daun (cm), mengukur lebar daun dari samping kanan ke kiri.
4. Tinggi tanaman (cm) diukur menggunakan mistar dari pangkal batang sampai titik tumbuh tertinggi.
5. Panjang akar (cm), mengukur panjang akar tanaman pada saat panen.

H. Teknik pengolahan dan analisis data

Analisis data menggunakan sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel 5\%}}$) atau berbeda sangat nyata ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel 1\%}}$), maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Data dilakukan dengan bantuan software SPSS 24.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pengamatan uji variasi larutan nutrisi dengan penambahan ekstrak teh terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dengan sistem hidroponik.

1. Pengaruh Variasi larutan nutrisi terhadap pertumbuhan Jumlah Daun (Helai)

Adapun hasil dari pengamatan jumlah daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:



Keterangan:

P0= 3 L air (Kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P3= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml AB mix

P4= 3 L Air+ 40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P5= 3 L air + 50 gr Teh

P6= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Gambar 4.1. Jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) (Sumber: Data Primer, 2019).

Berdasarkan gambar 4.1 perlakuan yang memberi pengaruh terbaik terhadap jumlah daun setelah P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif adalah PI (10 gr Teh+40 ml AB mix) dengan jumlah rata-rata 9,5. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji Anova yang disajikan pada lampiran 3. Hasil Uji ANOVA (*Analisis of Varians*) jumlah daun (helai) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dimana nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikansi 5%. Adapun hasil uji BNT disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil uji BNT jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*).

No	Perlakuan	Jumlah Daun
1	P0	4,25 _f
2	P1	9,50 _{ab}
3	P2	9,00 _{bc}
4	P3	8,50 _c
5	P4	7,00 _d
6	P5	5,00 _e
7	P6	10,00 _a

Keterangan:

P0= 3 Liter Air (Kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P3= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml AB mix

P4= 3 L Air+40 gr Teh+ 10 ml AB mix


P5= 3 L air + 50 gr Teh

P6= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada perlakuan P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif didapatkan hasil tidak berbedanya nyata pada perlakuan PI (10 gr Teh+40 ml AB mix). Sedangkan pada perlakuan P0, P2,P3,P4 dan P5 didapatkan hasil berbeda nyata antara perlakuan P6 dan P1.

Adapun rata-rata pertambahan jumlah daun (helai) tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



Keterangan:

P0= 3 L air (Kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml ABmix

P3= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml ABmix

P4= 3 L air + 40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P5= 3 L air + 50 gr Teh

P6= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) (Sumber: Data Primer, 2019).

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix), P2 (20 gr Teh+30 ml AB mix), P3 (30 gr Teh+20 ml AB mix) dan P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif yang menunjukkan adanya rata-rata pertambahan jumlah daun dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Berdasarkan Uji ANOVA (*Analysis of Variates*) pertambahan jumlah daun (helai) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada lampiran 3, menunjukkan adanya nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT)

pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada penambahan jumlah daun dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Hasil uji BNT rata-rata penambahan jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST).

No	Perlakuan	Rata-rata Jumlah Daun
1	P0	0,00 _c
2	P1	3,00 _a
3	P2	2,75 _a
4	P3	2,50 _a
5	P4	1,25 _b
6	P5	0,25 _c
7	P6	3,25 _a

Keterangan:

P0= 3 Liter air (Kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P3= 3 L air + 30 gr Teh+30 ml AB mix

P4= 3 L air + 40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P5= 3 L air + 50 gr Teh


P6= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan gambar 4.2 bahwa pada perlakuan P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif menunjukkan hasil tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2 dan P3 sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*). Sedangkan pada perlakuan P0, P4 dan P5 berbeda nyata terhadap keempat perlakuan tersebut.

2. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Panjang Daun

Adapun hasil dari pengamatan panjang daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini:



Keterangan:

P0= 3 L air (Kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P3= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml AB mix

P4= 3 L air + 40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P5= 3 L air + 50 gr Teh

P6= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Gambar 4.3. Panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) yang memberi pengaruh terbaik setelah P6 (50 ml AB mix) dengan rata-rata panjang daun yaitu 4 cm. Berdasarkan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada lampiran 3, dimana nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Adapun hasil uji BNT disajikan pada tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil uji BNT panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*).

No	Perlakuan	Jumlah panjang Daun
1	P0	0,50 _g
2	P1	4,00 _b
3	P2	2,45 _c
4	P3	2,25 _d
5	P4	1,80 _e
6	P5	1,00 _f
7	P6	4,50 _a

Keterangan:

P₀= 3 L air (Kontrol negatif)

P₁= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P₂= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P₃= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml AB mix

P₄= 3 L air+40 gr Teh+ 10 ml AB mix


P₅= 3 L air + 50 gr Teh

P₆= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa pada perlakuan P₆ (50 ml AB mix) menunjukkan hasil berbeda nyata pada perlakuan P₀, P₁, P₂, P₃, P₄ dan P₅.

Adapun rata-rata pertambahan panjang daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) disajikan pada gambar 4.4 sebagai berikut.



Gambar 4.4. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.4. menunjukkan bahwa P6 dengan konsentrasi (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif dan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) menghasilkan pertambahan panjang daun tertinggi dengan nilai rata-rata yaitu 2 cm. Selanjutnya data tersebut dengan menggunakan uji Anova yang disajikan pada lampiran 3. Berdasarkan hasil uji ANOVA (*Analisis of Varians*) pertambahan panjang daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) menunjukkan adanya nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), dilanjutkan pada uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan panjang daun dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST).


No	Perlakuan	Rata-rata panjang Daun
1	P0	0,00 _c
2	P1	2,00 _a
3	P2	1,12 _b
4	P3	0,67 _{bc}
5	P4	0,30 _c
6	P5	0,00 _c
7	P6	2,00 _a

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5% .

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada perlakuan P6 (50 ml AB mix) dan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) tidak berbeda nyata sedangkan pada perlakuan P0, P2, P3, P4 dan P5 berbeda nyata dengan perlakuan P6 dan P1.

3. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi dengan Penambahan Ekstrak Terhadap Pertumbuhan Lebar Daun

Adapun hasil dari pengamatan lebar daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini:



Gambar 4.5. Jumlah lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa yang memberi pengaruh terbaik pada lebar daun setelah P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif yaitu P1 (10 gr Teh+40) dengan nilai rata-rata 4,25 cm. Berdasarkan Uji ANOVA (*Analisis of Varians*) lebar daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada lampiran 3, dimana nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Adapun hasil uji BNT disajikan pada tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5. Hasil uji BNT lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) 4 MST.

No	Perlakuan	Jumlah Lebar Daun
1	P0	0,50 _e
2	P1	4,25 _b
3	P2	3,25 _c
4	P3	3,00 _c
5	P4	2,50 _d
6	P5	2,25 _d
7	P6	5,00 _a

Keterangan:

P₀= 3 L Air (Kontrol negatif)

P₁= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P₂= 3 L air + 20 gr Teh+20 ml ABmix

P₃= 3 L air + 30 gr Teh+30 ml ABmix

P₄= 3 L Air + 40 gr Teh+ 10 ml AB mix


P₅= 3 L air + 50 gr Teh

P₆= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa pada perlakuan P₆ (50 ml AB mix) berbeda nyata pada perlakuan P₁, P₂, P₃, P₄, P₅ dan P₀. Sedangkan antara perlakuan P₂ dan P₃ dan P₄ dan P₅ tidak berbeda nyata.

Adapun rata-rata pertambahan lebar daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) disajikan pada gambar 4.6 sebagai berikut.



Gambar 4.6. Rata-rata lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.6 menunjukkan bahwa perlakuan yang memberi pengaruh terbaik setelah P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif adalah P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) menghasilkan pertambahan lebar daun tertinggi dengan rata-rata yaitu 2 cm. Berdasarkan Uji ANOVA (*Analisis of Varians*) pertambahan lebar daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada lampiran 3, menunjukkan adanya nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), kemudian dilanjutkan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan lebar daun dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) ke-III (4 MST – 3 MST).

No	Perlakuan	Rata-rata Lebar Daun
1	P0	0,00 _c
2	P1	2,00 _a
3	P2	1,25 _b
4	P3	1,25 _b
5	P4	1,22 _b
6	P5	1,25 _b
7	P6	2,35 _a

Keterangan:

P₀= 3 L air (Kontrol negatif)

P₁= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P₂= 3 L air + 20 gr Teh+40 ml ABmix

P₃= 3 L air + 30 gr Teh+40 ml ABmix

P₄= 3 L Air+40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P₅= 3 L air + 50 gr Teh


P₆= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa pada perlakuan P6 dan P1 menunjukkan tidak berbeda nyata. Sedangkan pada perlakuan P2, P3, P4 dan P5 tidak berbeda nyata dengan keempat perlakuan tersebut.

4. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Tinggi Tanaman

Adapun hasil dari pengamatan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini:



Gambar 4.7. Tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) 4 MST (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.7 perlakuan menunjukkan pengaruh paling baik terhadap tinggi tanaman setelah P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif adalah P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) menghasilkan tinggi tanaman yaitu 12 cm. berdasarkan hasil Uji ANOVA (*Analisis of Varians*) pertambahan tinggi tanaman (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada lampiran 3. dimana nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil uji BNT dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7. Hasil uji BNT pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) 4 MST.

No	Perlakuan	Rata-rata tinggi Tanaman
1	P0	3,12 _f
2	P1	12,00 _b
3	P2	9,50 _c
4	P3	8,50 _d
5	P4	8,00 _d
6	P5	6,00 _e
7	P6	15,00 _a

Keterangan:

P₀= 3 L air (Kontrol negatif)

P₁= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P₂= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P₃= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml AB mix

P₄= 3 L air+40 gr Teh+ 10 ml AB mix


P₅= 3 L air + 50 gr Teh

P₆= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan tabel 4.7 pada perlakuan P₆, P₁, P₂, P₅ dan P₀ menunjukkan hasil berbeda nyata. Sedangkan pada perlakuan P₃ dan P₄ tidak berbeda nyata antara kedua perlakuan tersebut.

Adapun rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) yang dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut.



Gambar 4.8. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) ke III (4 MST- 3 MST) (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.8 perlakuan yang menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi tanaman paling tinggi setelah P6 (10 gr Teh+40 ml AB mix) adalah P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) dengan nilai rata-rata yaitu 4,62. Berdasarkan Uji ANOVA (*Analisis of Varians*) pertambahan tinggi tanaman (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) ke III (4 MST- 3 MST) dapat dilihat pada lampiran 3, menunjukkan adanya nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan tinggi tanaman dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke III (4 MST- 3 MST).


No	Perlakuan	Rata-rata tinggi tanaman
1	P0	0,00 _d
2	P1	4,62 _b
3	P2	2,40 _c
4	P3	1,87 _c
5	P4	2,50 _c
6	P5	1,75 _c
7	P6	8,00 _a

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Pada tabel 4.7 bahwa pada perlakuan P6, P1, P0 menunjukkan hasil berbeda nyata. Sedangkan pada perlakuan P2, P3, P4 dan P5 tidak berbeda nyata antara keempat perlakuan tersebut.

5. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi dengan Penambahan Ekstrak Teh Terhadap Pertumbuhan Panjang Akar

Adapun hasil dari pengamatan panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), dapat dilihat pada grafik 4.9 berikut.



Keterangan:

P0= 3 L air (Kontrol negatif)

P1= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P2= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml AB mix

P3= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml AB mix

P4= 3 L Air+40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P5= 3 L air + 50 gr Teh

P6= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Gambar 4.9. Panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) pada (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.9 menunjukkan perlakuan yang memberi pengaruh terbaik pada pengamatan panjang akar pengamatan panjang akar setelah P6 (50 ml AB mix) adalah perlakuan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) dengan nilai rata-rata yaitu 5,9 cm. Berdasarkan Uji ANOVA (*Analisis of Varians*) penambahan panjang akar (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dapat dilihat pada lampiran 3, menunjukkan adanya nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan berpengaruh nyata terhadap penambahan panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor*), sehingga

dilanjutkan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada penambahan panjang akar dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9. Hasil uji BNT rata-rata penambahan panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.).

No	Perlakuan	Rata-rata Panjang Akar
1	P0	2,75 _d
2	P1	5,90 _b
3	P2	3,17 _c
4	P3	3,07 _c
5	P4	2,57 _d
6	P5	2,00 _e
7	P6	7,95 _a

Keterangan:

P₀= 3 L air (Kontrol negatif)

P₁= 3 L air + 10 gr Teh+40 ml AB mix

P₂= 3 L air + 20 gr Teh+30 ml ABmix

P₃= 3 L air + 30 gr Teh+20 ml ABmix

P₄= 3 L air+40 gr Teh+ 10 ml AB mix

P₅= 3 L air + 50 gr Teh

P₆= 3 L air + 50 ml AB mix (Kontrol Positif)

Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%.

Pada tabel 4.9 bahwa pada perlakuan P₆, P₀, P₁, P₄, dan P₅ menunjukkan hasil berbeda nyata. Sedangkan pada perlakuan P₂, dan P₃, tidak berbeda nyata tidak berbeda nyata antara kedua perlakuan tersebut.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) dengan penambahan ekstrak teh, menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada setiap perlakuan, dimana ada 5 parameter yang diukur yaitu, jumlah daun (helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm).

1. Jumlah daun (helai)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jumlah daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) setelah dilakukan uji Anova menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini diduga karena tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan baik yang dipengaruhi oleh kandungan nutrisi ekstrak teh serta ada pengaruh dari konsentrasi AB mix yang digunakan dengan takaran yang hampir sama, dimana telah diketahui bahwa AB mix merupakan nutrisi yang digunakan dalam proses budidaya hidroponik karena kandungan nutrisinya yang sudah lengkap unsur hara makro dan mikro. Menurut Aseptyo (2013) unsur hara makro dalam nutrisi AB Mix sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman, terutama unsur hara Nitrogen yang berperan penting dalam pembentukan daun, setiap perlakuan dengan tingkat kandungan N menghasilkan tanaman dengan penambahan jumlah daun paling banyak. Hal ini diduga pada perlakuan P6 dan P1 kandungan unsur hara yang paling tinggi pada konsentrasi tersebut adalah nitrogen, hal ini sejalan dengan

penelitian karena yang pada perlakuan P6 dan P1 menghasilkan jumlah daun yang paling banyak.

Menurut penelitian Julianti (2018) yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa ekstrak teh memiliki kandungan nitrogen yang dapat membantu dalam proses pembentukan vegetatif bagian tanaman terutama pada bagian daun, batang dan akar tanaman. Menurut Sani (2015) unsur hara yang paling banyak dibutuhkan tanaman adalah nitrogen. Nitrogen berfungsi sebagai pembentuk klorofil, protein, lemak dan senyawa lainnya. Adanya jumlah nitrogen yang banyak dapat membentuk klorofil yang cukup dalam fotosintesis. Klorofil yang tersedia dalam jumlah yang cukup akan meningkatkan kemampuan daun untuk menyerap energi cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. Hasil fotosintesis yang dihasilkan, digunakan untuk pembelahan dan pemanjangan sel dan pertumbuhan tanaman. Pembelahan dan pemanjangan sel yang terjadi dapat membentuk daun baru.

Menurut (Sylvia, 2009) daun merupakan salah satu organ terpenting dalam suatu pertumbuhan terutama dalam fotosintesis agar tanaman dapat menghasilkan makanan dan mengalami pertumbuhan optimum. Apabila semakin tinggi jumlah daun maka semakin besar pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman.

Jumlah dan rata-rata daun terendah yaitu pada perlakuan P0 kontrol negatif dan P5 (50 gram teh) dapat dilihat bahwa pada perlakuan P0 tanpa adanya pemberian nutrisi dan P5 tidak terjadi penambahan jumlah daun, hal ini diduga karena konsentrasi ekstrak teh terlalu tinggi sehingga tanaman tidak dapat tumbuh

dengan baik dan ketersediaan unsur hara tidak tercukupi. Menurut Pairin dkk (1997) menyatakan bahwa apabila unsur hara makro dan mikro tidak lengkap kesediannya, maka akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

2. Panjang Daun

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap panjang daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) setelah dilakukan uji Anova yang menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Hal tersebut disebabkan kombinasi Nitrogen yang ada dalam ekstrak teh dan AB mix sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*). Sesuai dengan pendapat Slamet (2005) bahwa ekstrak teh mengandung unsur N yang mudah diserap oleh tanaman. Sehingga dapat memacu pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu, batang, akar, dan daun. Kandungan hara esensial ekstrak teh belum lengkap sehingga dibutuhkan bahan pendamping lain untuk memperoleh hasil kompos yang sesuai dengan kebutuhan unsur hara tanaman. Dimana telah diketahui bahwa AB mix merupakan nutrisi yang digunakan dalam proses budidaya hidroponik karena kandungan nutrisinya yang sudah lengkap yaitu unsur hara makro dan mikro.

Dapat dilihat pada perlakuan P0 dan P5 menunjukkan pertumbuhan panjang daun yang lebih rendah dengan ciri-ciri daun berkerut dan kerdil, hal ini diduga karena pada P0 merupakan kontrol negatif tanpa perlakuan sehingga tidak adanya asupan nutrisi tanaman untuk tumbuh. Sedangkan pada perlakuan P5 hal ini diduga tingginya konsentrasi ekstrak teh pada P5 sehingga tanaman mengalami defisiensi N dan suplai N yang berlebihan bagi tanaman dan proses pertumbuhan. Menurut

Ruhnayat (2007) penggunaan konsentrasi larutan nutrisi di atas titik optimum menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Hal ini sejalan dengan pendapat Oviyanti (2016) yang menyatakan kekurangan atau kelebihan Nitrogen menyebabkan pertumbuhan batang dan daun terhambat karena pembelahan dan pembesaran sel terhambat, sehingga bisa menyebabkan tanaman kerdil dan kekurangan klorofil dan menurut Moehasrianto (2011) menyatakan semakin tinggi kepekatan larutan nutrisi yang digunakan jumlah daun yang terbentuk semakin sedikit dan tidak memberi pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pemberian konsentrasi yang berbeda, memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap parameter panjang daun. Adanya respon yang berbeda pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) akibat perbedaan level konsentrasi yang diberikan.

3. Lebar Daun

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap lebar daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) setelah dilakukan uji Anova menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan karena ekstrak teh mengandung unsur-unsur esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman serta adanya kombinasi AB mix sehingga tercukupinya unsur hara, sehingga dapat digunakan dalam proses budidaya hidroponik karena kandungan nutrisinya yang sudah lengkap. Menurut Stephen (2004) dalam Nurmayanti (2008), ekstrak teh mengandung sejumlah mineral Zn, Se, Mo, Ge dan Mg, Nitrogen (N). Kandungan teh yang berupa mineral tersebut merupakan unsur-unsur esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman apabila kekurangan salah satu

dari unsur-unsur tersebut maka pertumbuhan akan terganggu atau mengalami defisiensi menghasilkan lebar daun tertinggi.

Menurut Lakitan (2007), Besarnya lebar daun sangat berpengaruh pada metabolisme tanaman khususnya dalam berfotosintesis dan mampu merangsang proses metabolisme sel yang terjadi didalam jaringan mereistematis pada titik tumbuh daun. Kandungan nutrisi AB mix juga mampu saling bekerja sama untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena kandungan mineral yang menyebabkan berbagai unsur yang ada dalam proses ini terlepas bebas secara berangsur-angsur sehingga dimanfaatkan oleh tanaman.

Pada perlakuan P0 dan P5 memperlihatkan pertumbuhan lebar daun yang lebih rendah dari perlakuan P2,P3 dan P4 karena pada tanaman tersebut menunjukkan ciri-ciri daun berkerut dan kerdil, hal ini disebabkan karena P0 merupakan kontrol negatif tanpa perlakuan sehingga kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh tidak terpenuhi sedangkan perlakuan P5 kandungan nutrisi yang dimiliki tidak memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik. Menurut Ruhnayat (2007) penggunaan konsentrasi larutan nutrisi di atas titik optimum menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat.

4. Tinggi tanaman

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) setelah dilakukan uji Anova menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini diduga karena kebutuhan unsur hara tanaman tercukupi sehingga dapat

dimanfaatkan tanaman, kandungan unsur hara ekstrak teh yaitu unsur hara makro dan mikro dapat mempengaruhi perkembangan vegetatif pada tanaman, seperti tinggi tanaman. Menurut Yuliarti dan Redaksi Agromedia (2007) pada ampas teh unsur hara yang terkandung di dalamnya paling banyak adalah Nitrogen (N), Fosfat. Nitrogen (N) berfungsi untuk merangsang pertunasan dan penambahan tinggi tanaman, selain itu nitrogen dalam jumlah yang cukup berperan dalam mempercepat pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang dan daun. Bersama fosfor, nitrogen digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan.

Pada perlakuan P0 dan P5 memperlihatkan pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih rendah dengan menunjukkan, daun berkerut, dan kerdil bila dibandingkan dengan P6 dan P1 hal ini diduga karena pada P0 tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berkembang sedangkan perlakuan P5 nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tidak terpenuhi sehingga tanaman tidak mengalami pertumbuhan dengan baik. Hal ini diduga karena konsentrasi ekstrak teh terlalu tinggi sehingga senyawa flavonoid tinggi dapat berkoagulasi dengan protein seluler sehingga menyebabkan kematian. Menurut Pervaiz (2009) jika senyawa flavonoid sesuai maka akan bermanfaat sebagai pengatur pada fotosintesis.

Menurut Fuat Fahrudin (2009), penggunaan ekstrak teh memberikan nilai tertinggi terhadap jumlah daun dan luas daun. Air teh sebagian besar mengandung ikatan biokimia yang disebut *polyphenols*, termasuk di dalamnya flavonoid. Pada tanaman, flavonoid memberikan perlindungan terhadap adanya stress lingkungan, sinar ultra violet, serangga, jamur, virus, dan bakteri, di samping sebagai pengendali

hormon dan enzim inhibitor. Asam tannic dan nutrisi lainnya pada teh juga berfungsi untuk menyehatkan tanaman.

Menurut lakitan (2007), pemberian zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi yang sesuai dapat meningkatkan morfogenesis tanaman, tetapi apabila zat pengatur tumbuh diberikan dalam konsentrasi yang berlebihan maka akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan morfogenensis tanaman. Berkurangnya tinggi tanaman, daun yang terbentuk menjadi lebih sedikit sehingga pembentukan karbohidrat hasil asimilasi tanaman juga menurun.

5. Panjang Akar

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap panjang akar pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) setelah dilakukan uji Anova menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10 gr Teh+40 ml AB mix) memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan akar tanaman. Karena tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan akar tanaman seperti dalam ekstrak teh mengandung unsur hara yaitu nitrogen, kalium dan seng (Zn). Menurut Adikasari (2012), nitrogen (N) yang memacu pertumbuhan daun dan batang serta membantu pertumbuhan akar, Kalsium (Ca) yang berperan membantu pertumbuhan ujung akar, Seng (Zn) berperan dalam pembentukan hormon auksin yang bermanfaat untuk merangsang perpanjangan sel batang dan sel akar.

Menurut adikasari (2012) Unsur yang sama-sama dimiliki ampas teh adalah Magnesium (Mg) yang ikut dalam pembentukan zat hijau daun dan menyebarkan unsur fosfor ke seluruh tanaman serta Nitrogen (N) yang memacu pertumbuhan daun,

batang serta membantu pembentukan akar muda. Selain itu menurut Wardon (2011) dalam penelitian adikasari (2012), ampas teh mengandung unsur antioksidan yang sangat ampuh membantu memerangi radikal bebas pada sel tanaman.

Dari semua hasil pertumbuhan yang meliputi jumlah daun (helai), lebar daun, panjang daun, tinggi tanaman dan panjang akar yang tertinggi pada perlakuan P6 (50 ml AB mix) dan P1 dengan konsentrasi (10 gr Teh + 40 ml AB mix) karena unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sesuai sedangkan pada perlakuan P0 tanpa adanya pemberian nutrisi sehingga tanaman tidak dapat tumbuh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pemberian nutrisi yang sesuai akan memberikan hasil yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga tidak lepas dari lingkungan tumbuh. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Buntoro (2014), faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan dari luar tanaman dapat berupa faktor lingkungan. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tanaman dapat berupa faktor fisiologis dan genetika tanaman. Semua unsur hara yang terkandung pada nutrisi hidroponik adalah unsur esensial yang diperlukan tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila unsur hara makro dan mikro tidak lengkap ketersediannya, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman erat kaitannya dengan kedua faktor tersebut, apabila salah satu atau semua faktor tidak mendukung maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian,

perlakuan yang memberi pengaruh terbaik setelah P6 yang merupakan kontrol positif adalah P1 dengan takaran (10 gr Teh + 40 ml AB mix). Dengan takaran tersebut ekstrak teh dapat digunakan untuk menimalisir penggunaan AB mix dalam budidaya tanaman dengan sistem hidroponik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh variasi larutan dengan penambahan ekstrak teh memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) pada semua parameter yaitu jumlah daun, panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman, dan panjang akar.
2. Takaran yang paling memberikan pengaruh terbaik adalah terdapat pada perlakuan P1 (10 gr Teh + 40 ml AB mix) rata-rata jumlah daun P1 (3 helai), lebar (2 cm), panjang daun (2 cm), tinggi tanaman P1 (4,62 cm) dan panjang akar (5,9). Dari hasil penelitian bahwa pada perlakuan P1 dengan konsentrasi (10 gr Teh + 40 ml AB mix) dapat digunakan untuk menimalisir penggunaan AB mix dengan penambahan ekstrak teh pada nutrisi tanaman.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlunya dilakukan pengukuran pH, lebih mengontrol nutrisi tanaman agar pada saat nutrisi kelebihan atau kekurangan bisa diatasi, pengulangan menggunakan wadah yang berbeda, serta melakukan pencegahan untuk menghindari serangga yang dapat merusak tanaman.

KEPUSTAKAAN

- Adikasari, R. Pemanfaatan Ampas Teh dan Ampas Kopi Sebagai Penambah Nutrisi Pada Pertumbuhan Tanaman Tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan Media Hidroponik, 2012. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta [Skripsi].
- Agustina, H. Efisiensi Penggunaan Air pada Tiga Teknik Hidroponik untuk Budidaya Bayam Hijau. Depok. Makalah Biologi FMIPA Universitas Indonesia. (3):12-16 hlm , 2009.
- Alamsyah, AN. *Taklukan Penyakit dengan Teh Hijau*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2006.
- Alamsyah. *Taklukkan Penyakit dengan Teh hijau*. Jakarta: Agrimedia Pustaka, 2006.
- Aseptyo FR, 2013. Pemanfaatan Ampas Tebu Dan Ampas Teh Sebagai Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah Keriting (*Capsicum Annum L.*) Ditinjau Dari Intensitas Penyiraman Air Teh. Skripsi.
- Barbour, Ian G. *Isu dalam Sains dan Agama*. Terj. Damayanti, Yogyakarta: Suka Press, 2006.
- BPS. *Survei Pertanian Produksi Tanaman Sayuran*. PT. Rasokitama Lestari. Jakarta, 2012.
- Buntoro. Pengaruh Takaran Pupuk Kandang dan Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Temu Putih (*Curcuma zedoria L.*). *Vegetalika* Vol. 3(4): 2014.
- Cahyo. *Media Tanam untuk Tanaman Sayur*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2016.
- Campbell, NA. *Biology*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Caroline, Yusi. Karya Ilmiah: Pengaruh Ampas Teh dan Ampas Kopi Terhadap Tanaman Cabe. <<http://yusicaroline.blogspot.com/2013/10/karya-ilmiah-pengaruh-ampas-teh-dan.html>> diakses pada tanggal 15 Oktober.
- Fahrudin, Fuat. Budidaya Caisim (*Brassica juncea L.*) Menggunakan Ekstrak Teh dan Pupuk Kascing. Skripsi. Fakultas Pertanian: UNS, 2007.
- Gardner. *Fisiologi Tanaman Budidaya*. Jakarta: UI Press, 1991.

- Gultoma G. Pengaruh Pemberian Ampas Teh Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L.). *J. Biosains Unimed*. 1 No.2 (September 2013): 43-55.
- Gustiana, A. Pemberian Ampas Teh Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L), Skripsi. Universitas Negeri Medan, 2008.
- Hadi, susanto. *Et al Biologi Jilid 1*. Jakarta: PT. Sunda Kelapa Pustaka, 2012.
- Hakim , N. *Pengelola Kesuburan Tanah Masam dengan Teknologi Pengapuran Terpadu*. Padang: Andalas University, 2006.
- Haryadi, J. *Fakta Buah Dan Sayur Yang Berbahaya*. Cetakan ke I. Jakarta : Niaga Swadaya, 2013.
- Hasanuddin. *Budidaya Bayam*. Jakarta: Pusat Pertanian Trubus. 1998.
- Inall. Petani Organik Jaya: *Ampas Teh dan Ampas Kopi*. Cianjur: HIPOCI, 2014.
- Isbandi, Joko. *Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000.
- Juliati. 2018. Pengaruh Pemberian Ampas Teh Dan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat (*Lycopersicum Esculentum* Mill) Dengan Media Hidroponik (Skripsi). Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Karsono, S. *Hidroponik Skala Rumah Tangga*. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2011.
- Lajnah Pentashuhan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Tafsir ilmi (Tumbuhan dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains)*. Jakarta: Lajnah Pentashushan Mushaf Al-Qur'an, 2011).
- Laila Izzatul. Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan. Volume 9, Nomor 1, Juni 2014.
- Lakitan, B. *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lingga,. *Petunjuk Penggunaan Pupuk. Edisi XVII*. Penebar Swadaya: Jakarta, 2000.

- lonardy, M.V. Respons Tanaman Tomat (*Lycopersicon esculentum Mill.*) Terhadap Suplai Senyawa Nitrogen dari Sumber Berbeda pada Sistem Hidroponik. Universitas Tadulako, Palu, 2006.
- Ma'roef. *Memacu Peningkatan Produksi dan Konsumsi Teh di Era Globalisasi*. ITB, Bandung, 2000.
- Masih, N.A.N. Pengaruh Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Aeromonas hydrophila*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012.
- Nadya. (2008). Air Teh Basi dan Air Bekas Cucian Beras. <<http://www.Bluefame.com>.> Diakses tanggal 11 November 2014.
- Nasution, Sri Bulan. Analisa Kadar Besi (Fe) Pada Bayam Hijau Sesudah Perebusan Dengan Masa Simpan 1 Jam 3 Jam Dan 5 Jam. *Jurnal ilmiah Panmed*, 11 No.1(2016):1-3.
- Ningrum, F.G.K. 2010. Efektivitas Air Kelapa dan Ampas Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpa*) Pada Media Tanam yang Berbeda. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugraha, RU. Sumber Sebagai Hara Pengganti AB mix pada Budidaya Sayuran Daun Secara Hidroponik. *J.Hort Indonesia* 6(1) (2015): 11-19.
- Nurlela. Pengaruh Pemberian Kombinasi Pupuk Kompos Kotoran Domba Dan Ampas Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Seledri (*Apium Graveolensl.*). *Jurnal Pendidikan Biologi (Bioed)*, 4 No.1 (2016):2-9.
- Nurmayanti, T.R., (2008), Efektivitas Air Kelapa dan Ampas Teh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sri Rejeki (*Aglonema donna carmen*) Pada Media Tanam yang Berbeda. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Pervaiz, U. Khan, A. Khan, N et al. The Role of National Tea Research Institute in Tea Production. *Sarhad J. agric vol 25 no 2*. NWFP agricultural university, Peshawar. Pakistan, 2009.
- Perwtasari, Balia. Pengaruh media tanam dan nutrisi terhadap pertumbuhan dan hasil Tanaman pakchoi (*Brassica junceaL.*) Dengan sistem hidroponik. *Agrovigor* , 5 NO. 1(2012):1-12.

- Pujianto, Sri. *Menjeleajahi Dunia Biologi I*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.
- Rizki, Farah. *The Miracle Of Vegetables*. Cetakan ke I. Jakarta : PT Agromedia Pustaka, 2013.
- Rossi, A. 1001 Teh dari Asal-usul, Tradisi, Khasiat, Hingga Racikan Teh. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Royyani, MF. (17 Januari 2019). Tumbuhan dalam al-Qur'an. (Online). Tersedia: [https://alif.id/read/mohammad-fathi-royyani/diakses tanggal 26 juli 2019](https://alif.id/read/mohammad-fathi-royyani/diakses%20tanggal%2026%20juli%202019).
- Ruhnayat, Agus. Penentuan Kebutuhan Unsur Hara N.P.K Untuk Pertumbuhan Tanaman Panili (*Vanilla planifolia Andrews*), Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, 2007.
- Rukmana, Rahmat. *Bayam*. Penebar Swadaya: Jakarta, 2010.
- Sani, B. *Hidroponik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Schramn, L. Going Green: The Role of The Green Tea Component EGCG in Chemoprevention. DOI: 10.4172/2157-2518.1000142. Departement of biological sciences, st. john's university. NY 11439. USA,, 2013.
- Shihab, M Quraish. "*Tafsir Al-Misabah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*". Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Slamet, W. 2005. Pengaruh dosis pemupukan kompos ampas teh terhadap produksi jerami jagung manis (*Zea mays*). *Jurnal of Indonesian Tropical Animal dan Agriculture* 30 (1), 47-52.
- Sofyan, S. Pemanfaatan Ampas teh, Limbah Padi dan Arang Sekam Sebagai Media Tumbuh Bibit Trembesi (*Samanea Saman*)". 2, no 2, (2014): 61-70.
- Subandi, M. Pengaruh Berbagai Nilai Ec (*Electrical Conductivity*) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Bayam (*Amaranthus tricolor L.*) Pada Hidroponik Sistem Rakit Apung (Floating Hydroponics System). 9 No. 9(2015): 1-17.
- Sumarmi. Pengaruh Konsentasi Ekstrak Teh dan Macam Media Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Terong di Polybag. *Joglo* 28 (2): 2016.
- Sunaryono, H. *Kunci Bercocok Tanam Sayur-sayuran Penting di Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung. Hal 154, 1984.


- Syafrudin, B. Z. Pengomposan Limbah Teh Hitam dengan penambahan Kotoran Kambing pada Variasi yang Berbeda dengan Menggunakan Starter EM4 (Effective Microorganism-4), Teknik 28 (2):125-131, 2007.
- Tjitroseopomo, G. *Taksonomi Tumbuhan*. Gajah Mada University Press: 2014.
- Wardon, Krystal. "Using Tea Leaves in The Garden" (online). (<http://www.helium.com/items/2114267-gardening-using-tea-leaves-in-the-garden>, diakses tanggal 25 Juli 2016).
- Wasonowati, Catur. Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Tomat (*Lycopersicon Esculentum*) Dengan Sistem Budidaya Hidroponik. Agrovigor 4 NO. 1 (2011):1-8.
- Widayanti. Pengaruh Pemberian Kompos Ampas Teh Terhadap Sifat Fisik, Kimia Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Jagung, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2008.
- Yuliani, Farida. 2009. Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Merang (*Volvariella Volvaceae*) Yang Ditanam Pada Media erami, Blotong Dan Ampas Tebu Dengan Berbagai Frekwensi Penyiraman. Fakultas Pertanian: UMK Kudus.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram alir pembuatan wadah hidroponik, pembuatan nutrisi dan pengukuran pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*).

Kemudian wadah tersebut
disusun kemudian diisi
dengan larutan nutrisi





Lampiran 2. Rata-rata pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) yaitu jumlah daun, panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman dan panjang akar.

1. Jumlah daun
 - a. Minggu ke-1

- Jumlah Daun

No	Perlakuan (P)	Jumlah helain Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	5	4	4	4	17	4,25
2	P ₁	4	4	5	5	18	4,5
3	P ₂	5	5	5	4	19	4,75
4	P ₃	4	4	4	5	17	4,25
5	P ₄	4	4	4	5	17	4,25
6	P ₅	5	4	4	4	17	4,25
7	P ₆	4	5	4	4	17	4,25

- Tinggi Batang

No	Perlakuan (P)	Tinggi (cm)				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	3	3	2,9	2,9	11,8	2,95
2	P ₁	3,5	3,5	3	3	13	3,25
3	P ₂	3,5	3,2	2,9	3	12,6	3,15
4	P ₃	3,2	3	3	3	12,2	3,05
5	P ₄	3	3	3,1	2,8	11,9	2,98
6	P ₅	3	2,8	2,6	3	11,4	2,85
7	P ₆	3,5	3,5	3,5	3	13,5	3,37

- Lebar Daun

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	1	1	1	0,9	3,9	0,97
3	P ₂	1	0,7	0,7	1	3,4	0,85
4	P ₃	1	0,9	0,7	0,7	3,3	0,82
5	P ₄	0,7	0,8	0,8	0,8	3,1	0,75
6	P ₅	0,8	0,4	0,5	0,5	2,5	0,62
7	P ₆	1	1	1,8	1,8	5,97	1,4

- Panjang Daun

No	Perlakuan (P)	Jumlah Panjang Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	0,5	0,1	0,1	0,2	0,9	0,22
2	P ₁	1,2	1	1,2	1,2	4,6	1,15

3	P ₂	1,3	1,2	1	1	4,5	1,13
4	P ₃	1,2	1,2	1,2	1	4,2	1,05
5	P ₄	1	1,1	1	0,9	4	1,00
6	P ₅	0,9	0,5	0,5	0,5	2	0,5
7	P ₆	1,5	1,3	1,3	1,3	5,4	1,35

b. Minggu 2

- Penambahan jumlah daun

No	Perlakuan (P)	Jumlah helain Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	5	4	4	4	17	4,25
2	P ₁	5	6	6	5	22	5,5
3	P ₂	5	5	5	5	20	5
4	P ₃	5	5	4	5	19	4,75
5	P ₄	5	5	4	5	19	4,75
6	P ₅	5	4	4	4	17	4,25
7	P ₆	5	6	6	5	22	5,5

- Tinggi Batang

No	Perlakuan (P)	Tinggi				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	3,7	3,2	3,1	3	13	3,25
2	P ₁	5	5,2	5,5	5	20,7	5,17
3	P ₂	5,5	5	4,5	4,5	19,5	4,87
4	P ₃	4,5	4,5	4	5,5	18,5	4,62
5	P ₄	4,2	4,2	4,2	4	16,6	4,15
6	P ₅	4	4	4	4	18	4,5
7	P ₆	5,5	5,5	5,5	5,5	22	5,5

- Lebar Daun

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	1,5	1,5	1,5	1,5	6	1,5

3	P ₂	1,2	1	1	1,5	4,7	1,17
4	P ₃	1,2	1	1	1	4,2	1,05
5	P ₄	1	1	1	1	4	1
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	1,5	1,5	2	2	7	1,75

- Panjang Daun

No	Perlakuan (P)	Jumlah helain Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	1,7	1,7	1,5	1,7	6,6	1,65
3	P ₂	1,5	1,5	1,5	1,5	6	1,5
4	P ₃	1,5	1,4	1,4	1,2	5,5	1,37
5	P ₄	1,2	1,2	1,2	1	4,6	1,15
6	P ₅	1	1	1	1	4	1,00
7	P ₆	2	2	2	2	8	2,00

c. Minggu 3

- jumlah daun

No	Perlakuan (P)	Jumlah helain Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	5	4	4	4	17	4,25
2	P ₁	6	7	7	6	26	6,5
3	P ₂	6	6	6	7	25	6,25
4	P ₃	6	6	6	6	24	6,00
5	P ₄	6	6	6	5	23	5,75
6	P ₅	6	5	5	5	21	5,25
7	P ₆	6	7	7	7	27	6,75

- Tinggi Batang

No	Perlakuan (P)	Tinggi				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	3,7	3,2	3,1	3	13	3,25

2	P ₁	7,5	7,5	7,5	7	29,5	7,4
3	P ₂	7,5	7,2	7,5	7	29,2	7,3
4	P ₃	7	7	6,5	6	26,5	6,62
5	P ₄	5	5	6	6	22	5,5
6	P ₅	5	4	4	4	17	4,25
7	P ₆	7	7	7	7	28	7

- Lebar Daun

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	2	2	2,5	2,5	9	2,25
3	P ₂	2	2	2	2	8	2
4	P ₃	1,5	1,5	2	2	7	1,75
5	P ₄	1,2	1,2	1,2	1,5	5,1	1,27
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	2,8	2,8	2,5	2,5	10,6	2,65

- Panjang Daun

No	Perlakuan (P)	Jumlah helain Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	2	2	3	2	9	2,25
3	P ₂	2	2	2	1,9	7,9	1,72
4	P ₃	1,8	1,5	1,5	1,5	6,3	1,57
5	P ₄	1,5	1,5	1,5	1,5	4,5	1,12
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	2,5	2,5	2,5	2,5	10	2,5

d. Minggu 4

- jumlah daun

No	Perlakuan	Jumlah helain Daun	Total	Rata-rata
----	-----------	--------------------	-------	-----------

	(P)	1	2	3	4		
1	p ₀	5	4	4	4	17	4,25
2	P ₁	10	10	9	9	38	9,5
3	P ₂	9	9	9	9	36	9
4	P ₃	9	9	8	8	34	8,5
5	P ₄	7	7	7	7	28	7
6	P ₅	5	5	5	5	20	5
7	P ₆	10	10	10	10	40	10

- Tinggi Batang

No	Perlakuan (P)	Tinggi				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	3,7	3,2	3,1	2,5	12,5	3,12
2	P ₁	12	12	12	12	48	12
3	P ₂	10	10	9	9	38	9,5
4	P ₃	10	8	8	8	34	8,5
5	P ₄	8	8	8	8	32	8
6	P ₅	6	6	6	6	24	6
7	P ₆	15	15	15	15	60	15

- Lebar Daun

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar Daun				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	4,5	4,5	4	4	16	4
3	P ₂	3,5	3,5	3	3	13	3,25
4	P ₃	3	3	3	3	12	3
5	P ₄	2,5	2,5	2,5	2,5	10	2,5
6	P ₅	2,5	2,5	2	2	9	2,25
7	P ₆	5	5	5	5	20	5

- Panjang daun

No	Perlakuan	Pertambahan panjang Daun	Total	Rata-rata
----	-----------	--------------------------	-------	-----------

	(P)	1	2	3	4		
1	P ₀	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5
2	P ₁	4	4	4	4	16	4
3	P ₂	2,5	2,5	2,5	2,3	9,8	2,45
4	P ₃	2	2	2,5	2,5	9,5	2,37
5	P ₄	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2	1,8
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	4,5	4,5	4,5	4,5	18	4,5

5. Panjang akar

No	Perlakuan (P)	Panjang Akar				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	p ₀	2	2	2	2	8	2
2	P ₁	5	5	5	5	20	5
3	P ₂	3	3	3	3	12	3
4	P ₃	3	3	3	3	12	3
5	P ₄	2	2	2	2	8	2
6	P ₅	2	2	2	2	8	2
7	P ₆	7	7	7	7	28	7

Hasil dari pengurangan perminggu

1. Jumlah daun

a. Minggu 2-1

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	1	2	1	0	4	1
3	P ₂	0	0	0	1	1	0,25
4	P ₃	1	1	0	0	2	0,5
5	P ₄	1	1	0	0	2	0,5
6	P ₅	0	0	0	0	0	0
7	P ₇	1	1	2	2	6	1,5

b. Minggu 3-2

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	1	1	1	1	4	1
3	P ₂	1	1	1	1	4	1
4	P ₃	1	1	1	1	4	1
5	P ₄	1	1	1	1	4	1
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	1	1	1	1	4	1

c. Minggu 4-3

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	4	3	2	3	12	3
3	P ₂	3	3	3	2	11	2,75
4	P ₃	3	3	2	2	10	2,5
5	P ₄	1	1	1	2	5	1,25
6	P ₅	1	0	0	0	1	0,25
7	P ₆	4	3	3	3	13	3,25

2. Lebar daun

a. Minggu 2-1

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	0,5	0,5	0,5	0,6	2,1	0,52
3	P ₂	0,2	0,3	0,3	0,5	1,3	0,32
4	P ₃	0,2	0,1	0,3	0,3	0,9	0,22
5	P ₄	0,3	0,2	0,2	0,8	1,5	0,37
6	P ₅	0,2	0,6	0,5	0,5	1,8	0,45
7	P ₇	0,5	0,5	0,2	0,2	1,4	0,35

b. Minggu 3-2

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	0,5	0,5	1	1	3	0,75
3	P ₂	0,8	1	1	0,5	3,3	0,82
4	P ₃	0,3	0,5	1	1	2,8	0,7
5	P ₄	0,2	0,2	0,2	0,5	1,1	0,27
6	P ₅	0	0	0	0	0	0
7	P ₇	1,3	1,3	0,5	0,5	3,6	0,9

c. Minggu 4-3

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	2,5	2,5	1,5	1,5	8	2
3	P ₂	1,5	1,5	1	1	5	1,25
4	P ₃	1,5	1,5	1	1	5	1,25
5	P ₄	1,3	1,3	1,3	1	4,9	1,22
6	P ₅	1,5	1,5	1	1	5	1,25
7	P ₆	2,2	2,2	2,5	2,5	9,4	2,35

3. Panjang Daun

a. Minggu 2-1

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0,4	0,4	0,3	1,1	0,27
2	P ₁	0,5	0,7	0,3	0,5	2	0,5
3	P ₂	0,2	0,3	0,5	0,5	1,5	0,37
4	P ₃	0,3	0,2	0,2	0,2	0,9	0,22
5	P ₄	0,2	0,1	0,2	0,1	0,6	0,15
6	P ₅	0,1	0,5	0,5	0,5	1,6	0,4
7	P ₆	0,5	0,7	0,7	0,7	2,8	0,7

b. Minggu 3-2

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	0,3	0,3	1,5	0,3	2,4	0,6
3	P ₂	0,5	0,5	0,5	1	1,6	0,4
4	P ₃	0,3	0,1	0,1	0,3	0,8	0,2
5	P ₄	0,3	0,3	0,3	0,5	1,4	0,35
6	P ₅	0	0	0	0	0	0
7	P ₇	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5

c. Minggu 4-3

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	2	2	2	2	8	2
3	P ₂	0,5	0,5	0,5	3	1,8	0,45
4	P ₃	0,2	0,5	1	1	2,7	0,67
5	P ₄	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	0,3
6	P ₅	0	0	0	0	0	0
7	P ₇	2	2	2	2	8	2

4. Tinggi

a. Minggu 2-1

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,7	0,2	0,2	0,1	1,2	0,3
2	P ₁	1,5	1,48	2,5	2	7,48	1,87
3	P ₂	2	1,8	1,6	1,5	6,9	1,72
4	P ₃	1,3	1,5	1	2,5	6,3	1,57
5	P ₄	1,2	1,2	1,1	1,2	4,7	1,17
6	P ₅	1	1,2	1,4	1	4,6	1,15
7	P ₇	2	2	2	2,5	8,5	2,12

b. Minggu 3-2

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	2,5	2,3	2	2	8,8	2,2
3	P ₂	2	2,2	3	2,5	9,7	2,42
4	P ₃	2,5	2,5	2,5	0,5	8	2
5	P ₄	0,8	0,8	1,8	2	5,4	1,35
6	P ₅	0	0	0	0	0	0
7	P ₇	2,5	2,5	2,5	2,5	10	2,5

c. Minggu 4-3

No	Perlakuan (P)	Ulangan				Total	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	4,5	4,5	4,5	5	18,5	4,62
3	P ₂	2,5	2,8	1,5	2	8,8	2,2
4	P ₃	3	1	1,5	2	7,5	1,87
5	P ₄	3	3	2	2	10	2,5
6	P ₅	1	2	2	2	7	1,75
7	P ₇	8	8	8	8	32	8

5. Panjang akar

No	Perlakuan	Panjang Akar	Total	Rata-rata
----	-----------	--------------	-------	-----------

	(P)	1	2	3	4		
1	p ₀	3	3	2	3	11	2,75
2	P ₁	6	5,8	5,7	6,1	23,6	5,9
3	P ₂	3,1	3,1	3,3	3,2	12,7	3,17
4	P ₃	3	3,2	3	3,1	12,3	3,07
5	P ₄	2,5	2,6	2,5	2,7	10,3	2,57
6	P ₅	2	2	2	2	8	2
7	P ₆	8	7,9	8,1	7,8	31,8	7,95



Lampiran 3. Hasil Uji Anova (Analysis of variences)

1. Helaian daun

a. Jumlah

ANOVA

Dependent Variable: JUMLAH

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	121.929 ^a	6	20.321	155.182	.000
Intercept	1620.321	1	1620.321	12373.364	.000
PERLAKUAN	121.929	6	20.321	155.182	.000
Error	2.750	21	.131		
Total	1745.000	28			
Corrected Total	124.679	27			

a. R Squared = .978 (Adjusted R Squared = .972)

b. Rata-rata

ANOVA

Dependent Variable: Jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	43,429 ^a	6	7,238	25,333	,000
Intercept	96,571	1	96,571	338,000	,000
Perlakuan	43,429	6	7,238	25,333	,000
Error	6,000	21	,286		
Total	146,000	28			
Corrected Total	49,429	27			

a. R Squared = ,879 (Adjusted R Squared = ,844)

2. Lebar daun

a. Jumlah

ANOVA

Dependent Variable: JUMLAH

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	50.714 ^a	6	8.452	236.667	.000
Intercept	246.036	1	246.036	6889.000	.000
PERLAKUAN	50.714	6	8.452	236.667	.000
Error	.750	21	.036		
Total	297.500	28			
Corrected Total	51.464	27			

a. R Squared = .985 (Adjusted R Squared = .981)

b. Rata-rata

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	13,154 ^a	6	2,192	24,135	,000
Intercept	49,689	1	49,689	547,034	,000
Perlakuan	13,154	6	2,192	24,135	,000
Error	1,908	21	,091		
Total	64,750	28			
Corrected Total	15,061	27			

a. R Squared = ,873 (Adjusted R Squared = ,837)

3. Panjang daun

a. Jumlah

ANOVA

Dependent Variable: JUMLAH

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	51.649 ^a	6	8.608	645.607	.000
Intercept	155.571	1	155.571	11667.857	.000
PERLAKUAN	51.649	6	8.608	645.607	.000
Error	.280	21	.013		
Total	207.500	28			
Corrected Total	51.929	27			

a. R Squared = .995 (Adjusted R Squared = .993)

b. Rata-rata

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	17,982 ^a	6	2,997	12,209	,000
Intercept	21,263	1	21,263	86,619	,000
Perlakuan	17,982	6	2,997	12,209	,000
Error	5,155	21	,245		
Total	44,400	28			
Corrected Total	23,137	27			

a. R Squared = ,777 (Adjusted R Squared = ,714)

4. Tinggi tanaman

a. Jumlah

ANOVA

Dependent Variable: JUMLAH

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	359.625 ^a	6	59.938	266.248	.000
Intercept	2205.438	1	2205.438	9796.761	.000
PERLAKUAN	359.625	6	59.938	266.248	.000
Error	4.728	21	.225		
Total	2569.790	28			
Corrected Total	364.352	27			

a. R Squared = .987 (Adjusted R Squared = .983)

b. Rata-rata

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	160,302 ^a	6	26,717	106,564	,000
Intercept	255,613	1	255,613	1019,538	,000
Perlakuan	160,302	6	26,717	106,564	,000
Error	5,265	21	,251		
Total	421,180	28			
Corrected Total	165,567	27			

a. R Squared = ,968 (Adjusted R Squared = ,959)

5. Panjang akar

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	113,179 ^a	6	18,863	403,181	,000
Intercept	429,789	1	429,789	9186,328	,000
Perlakuan	113,179	6	18,863	403,181	,000
Error	,983	21	,047		
Total	543,950	28			
Corrected Total	114,161	27			

a. R Squared = ,991 (Adjusted R Squared = ,989)

Lampiran 4. Hasil Uji BNT rata-rata pertumbuhan tanaman bayam hijau
(*Amaranthus tricolor* L.)

1. Jumlah daun

		Jumlah			
	Perlakuan	N	1	Subset 2	3
Duncan ^{a,b}	1	4	,00		
	6	4	,25		
	5	4		1,25	
	4	4			2,50
	3	4			2,75
	2	4			3,00
	7	4			3,25
	Sig.			,516	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,286.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

2. Lebar daun

a. Jumlah

		JUMLAH					
	PERLAKUA	N	1	2	Subset 3	4	5
Duncan ^{a,b}	1	4	.500				
	6	4		2.250			
	5	4		2.500			
	4	4			3.000		
	3	4			3.250		
	2	4				4.250	
	7	4					5.000
	Sig.			1.000	.075	.075	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .036.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

b. Rata-rata

	perlakuan	N	Jumlah	Substet
--	-----------	---	--------	---------

		1	2	3
Duncan ^{a,b}	1	4	,000000000000000000	
	5	4	1,2250000000000000	
	3	4	1,2500000000000000	
	4	4	1,2500000000000000	
	6	4	1,2500000000000000	
	2	4		2,0000000000000000
	7	4		2,3500000000000000
	Sig.		1,000	,916

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,091.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

3. Panjang daun a.jumlah

JUMLAH

		Subset								
		PERLAKUAN	N	1	2	3	4	5	6	7
Duncan ^{a,b}	1		4	.5000						
	6		4		1.000					
	5		4			1.8000				
	4		4				2.25000			
	3		4					2.45000		
	2		4						4.000	
	7		4							4.5000
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .013.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

b. rata-rata

Jumlah

	perlakuan	N	Subset		
			1	2	3
Duncan ^{a,b}	1	4	,000		
	6	4	,000		
	5	4	,300		
	4	4	,675	,675	
	3	4		1,125	
	2	4			2,000
	7	4			2,000
	Sig.			,090	,213

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,245.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

4. Tinggi tanaman

a. Jumlah

JUMLAH

	PERLAKUAN	N	Subset						
			1	2	3	4	5	6	
Duncan ^{a,b}	1	4	3.125						
	6	4		6.000					
	5	4			8.000				
	4	4			8.500				
	3	4				9.500			
	2	4					12.000		
	7	4							15.000
	Sig.			1.000	1.000	.151	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .225.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

b. Rata-rata

Jumlah

	perlakuan	N	Subset			
			1	2	3	4
Duncan ^{a,b}	1	4	,000			
	6	4		1,750		
	4	4		1,875		
	3	4		2,400		
	5	4		2,500		
	2	4			4,625	
	7	4				8,000
	Sig.			1,000	,064	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,251.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

5. Panjang akar

	perlakuan	N	Jumlah				
			1	2	3	4	5
Duncan ^{a,b}	6	4	2,000				
	5	4		2,575			
	1	4		2,750			
	4	4			3,075		
	3	4			3,175		
	2	4				5,900	
	7	4					7,950
	Sig.			1,000	,265	,520	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,047.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

Lampiran 5. Dokumentasi pelaksanaan Penelitian



Net pot

Bibit bayam (*A. tricolor*
L)

Terminal



Nutrisi AB mix

Teh

Aerator



Sterofom

Neraca analitik

Gelas ukur



Gelas kimia

Rock woll

Baskom



- Penyemaian




Netpot dipotong persegi dengan ukuran dengan panjang 3 cm dan lebar 3 cm kemudian bagian tengah dilubangi dan diisi dengan 3 bibit bayam (*A. tricolor* L.)



- Pembuatan larutan






Teh ditimbang terlebih dahulu menggunakan neraca analitik dengan berat 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr

Kemudian teh yang sudah ditimbang dilarutkan



- a. P0= 3 L air + 0 gram teh (kontrol negatif)
- b. P1= 3 L air + 10 gram teh + 40 ml AB mix
- c. P2= 3 L air + 20 gram teh + 30 ml AB mix
- d. P3= 3 L air + 30 gram teh + 20 ml AB mix
- e. P4= 3 L air + 40 gram teh + 10 ml AB mix



P1

P2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR





- Bibit bayam yang telah dipindahkan ke media hidroponik



P0

P1

P2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

- pengukuran



- Tanaman minggu ke-4



P6



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





Morfologi

Akar



Batang

Daun

RIWAYAT HIDUP



Suci Reskiani, yang akrab disapa Suci, dilahirkan dalam keadaan sehat di Pangkajene pada tanggal 16 November 1997. Lahir sebagai puteri ke-3 dari pasangan Alm. Genda dan Hj. Hawaniah. Memulai pendidikan di sebuah Taman Kanak-kanak (TK) Bina Ilmu Desa Samaene selama satu tahun dan tamat di tahun 2003. Memasuki gerbang Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SD Inpres 10/73 Patangkai. Setelah usai menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 2009, saya kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di SMPN 1 Lappariaja. Setelah mampu melewati Ujian Nasional di tingkat SMP dan dinyatakan LULUS, maka berlanjutlah pendidikan saya di SMAN 1 Lappariaja pada tahun 2013 Dan selesai pada tahun 2015. Saat ini saat saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.