

**UJI VARIASI LARUTAN NUTRISI DENGAN PENAMBAHAN AMPAS
KOPI TERHADAP PETUMBUHAN TANAMAN BAYAM
HIJAU (*Amaranthus tricolor L.*) DENGAN SISTEM
HIDROPONIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

YULIA INDAYANI
NIM. 60300115064

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Indayani
NIM : 60300115064
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 24 Juli 1997
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Blok A/335 Perum. Bumi Tamalanrea Permai, Makassar.
Judul : Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor* L.) dengan Sistem Hidroponik.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelaryang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Agustus 2019

Penyusun,



Yulia Indayani
NIM. 60300115064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara **Yulia Indayani**, NIM: 60300115064, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi berjudul “Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor L.*) Dengan Sistem Hidroponik), memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 13 Agustus 2019


Hasbi Muddin, S.Si., M.Si.
Pembimbing II


Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.
Pembimbing I

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor L.*) dengan Sistem Hidroponik", yang disusun oleh Yulia Indayani, NIM: 60300115064, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan 13 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 23 Agustus 2019 M.
22 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Masriany, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Syamsuri, S.S., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Muhammad Khalifah, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah menganugrahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“Uji Variasi Larutan Nutrisi Penambahan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor L.*) dengan Sistem Hidroponik”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi Bahasa, maupun dari segi sitematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Sebuah persembahan dan sembah sujud serta terima kasih penulis persembahkan kepada Ayahanda **Alm. Nurdin** dan Ibunda **Hadriah** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, berkorban, bekerja keras sepenuh hati membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah sehingga penulis meraih gelar Sarjana strata satu (S1).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk ini pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari. M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Bapak Dr. Thahir Maloko, M.Hi., selaku Wakil Dekan II dan dosen Komprehensif Agama yang sangat membantu penulis untuk mempelajari agama lebih banyak lagi.
4. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si, M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologi dan dosen Komprehensif Mikrobiologi, atas arahan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Biologi dan pembimbing II atas saran, ilmu nasehat-nasehat serta kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si , selaku penguji atas masukan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Syamsuri, S.S., M.Ag, selaku penguji agama terima kasih sebesar-besarnya atas masukan dan kritikan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I atas saran, ilmu nasehat-nasehat serta kesabaran dalam membimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Isna Rasdiana Azis, S.Si.,M,Sc., selaku penasihat akademik atas bimbingan dan arahan-arahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Ulfa Triyani A. Latif, S.Si, M.Si., selaku dosen Komprehensif ilmu biologi dasar yang sangat membantu penulis untuk mengingat kembali ilmu yang penulis dapatkan.
11. Seluruh Keluarga Besar Jurusan Biologi Serta Staf Jurusan Biologi Fakultas Sain dan Teknologi yang telah memberi banyak arahan serta semangat pada penulis dalam menyusun skripsi.
12. Dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Keluarga besar serta kerabat penulis tercinta yang tiada henti menguatkan, mendoakan, memotivasi, dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa berada situasi dan kondisi sekarang.
14. Teman-teman IMPUL5 (Biologi Angkatan 2015) yang telah menjadi teman perjuangan dalam menggali ilmu pada jurusan Biologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
15. Teman-teman KKN Posko 4 Angkatan 59 Desa Manuju Kec. Manuju Kab. Gowa, setia mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman team penulis Suci Reskiani atas motivasi, dorongan, serta kerja samanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Green House (Salda, Musfirah, dan Musdalifah) yang telah memotifasi, setia mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kakak-kakak dan adek-adek angkatan Biologi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat jika dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang tidak tercantum namanya dan kepada mereka tanpa terkecuali semoga menjadi ibadah dan amal jariyah.

Gowa, 13 Agustus 2019

Penulis



Yulia Indayani

NIM: 60300115064

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Pandangan Islam Terhadap Tumbuhan	12
B. Tinjauan Umum tentang Tanaman Bayam.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Kopi	20
D. Tinjauan Umum tentang Hidroponik.....	21
E. Karangka Pikir	31
F. Hipotesis	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
C. Variabel Penelitian	35
D. Defenisi Operasional Variabel.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	36
G. Prosedur Kerja	36

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
KEPUSTAKAAN	53
LAMPIRAN.....	69
RIWAYAT HIDUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Pada Bayam Hijau.....	18
Tabel 4.1. Hasil uji BNT jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	39
Tabel 4.2. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	41
Tabel 4.3. Hasil uji BNT jumlah panjang daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST	43
Tabel 4.4. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	44
Tabel 4.5. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	46
Tabel 4.6. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	48
Tabel 4.7. Hasil uji BNT pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	50
Tabel 4.8. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	52
Tabel 4.9. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang akar tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Morfologi Tanaman Bayam Hijau.....	15
Gambar 2.2. Ampas Kopi.....	21
Gambar 2.3. Hidroponik Substrak.....	23
Gambar 2.4. Hidroponik NFT.....	24
Gambar 2.5. Hidroponik <i>Drip Irrigation</i>	24
Gambar 2.6. Hidroponik <i>Ebb and Flow System</i>	25
Gambar 2.7. Hidroponik Rakit Apung.....	25
Gambar 2.8. Hidroponik <i>Aeroponik</i>	26
Gambar 2.9. Hidroponik <i>Wick System</i>	27
Gambar 3.1. Rancangan Penelitian.....	34
Gambar 4.1. Jumlah daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	38
Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam Hijau (<i>Amranthus tricolor L.</i>) ke III (4 MST – 3 MST).....	40
Gambar 4.3. Panjang daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>).....	42
Gambar 4.4. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	43
Gambar 4.5. Jumlah lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST...	45
Gambar 4.6. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	47
Gambar 4.7. Tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST	49
Gambar 4.8. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke III (4 MST- 3 MST).....	51
Gambar 4.9. Panjang akar tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram Alir Persiapan Hidroponik	68
Lampiran 2. Pembuatan nutrisi dan pengukuran pertumbuhan tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>).....	68
Lampiran 3. Tabel pengamatan pertumbuhan tanaman bayam hijau (<i>Amranthus tricolor L.</i>) yaitu jumlah daun(helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm) dari 1 MST sampai 4 MST.....	69
Lampiran 4. Hasil uji ANOVA jumlah daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	74
Lampiran 5. Hasil uji BNT jumlah daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	75
Lampiran 6. Hasil uji ANOVA panjang daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	75
Lampiran 7. Hasil uji BNT panjang daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	76
Lampiran 8. Hasil uji ANOVA lebar daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	76
Lampiran 9. Hasil uji BNT lebar daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	77
Lampiran 10 Hasil uji ANOVA tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	77
Lampiran 11. Hasil uji BNT tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	78
Lampiran 12. Hasil uji ANOVA panjang akar bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	78
Lampiran 13. Hasil uji BNT panjang akar bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) 4 MST.....	79
Lampiran 14. Tabel rata-rata pertumbuhan tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) yaitu jumlah daun(helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm).....	79
Lampiran 15. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan jumlah daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	83
Lampiran 16. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan jumlah daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	84
Lampiran 17. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan panjang daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	84
Lampiran 18. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3MST).....	85
Lampiran 19. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan lebar daun bayam	

hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	85
Lampiran 20. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan lebar daun bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	86
Lampiran 21. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	86
Lampiran 22. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) ke-III (4 MST – 3 MST).....	87
Lampiran 23. Dokumentasi pelaksanaan penelitian.....	90
Lampiran 24. Hasil pengamatan tanaman bayam hijau (<i>A. tricolor L.</i>) pada 4 MST	91

ABSTRAK

Nama : YULIA INDAYANI
NIM : 60300115064
Judul Skripsi : Uji Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (*Amaranthus tricolor L.*) Dengan Sistem Hidroponik.

Bayam hijau (*A. tricolor L.*) merupakan salah satu sayuran yang digemari dan dibutuhkan masyarakat mengingat kandungan gizi pada sayuran ini dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain sebagai makanan bayam hijau (*A. tricolor*) juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan takaran berapa pada penambahan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor*) secara hidroponik. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dengan 4 ulangan yaitu air 3 L (P0), air 3 L dengan 10 gr ampas kopi dan 40 mL AB Mix (P1), air 3 L dengan 20 gr ampas kopi dan 30 mL AB Mix (P2), air 3 L dengan 30 gr ampas kopi dan 20 mL AB Mix (P3), air 3 L dengan 40 gr ampas kopi dan 10 mL AB Mix (P4), air 3 L dengan 50 gr ampas kopi (P5), dan air 3 L dengan 50 mL AB Mix (P6). Hasil penelitian menunjukkan pemberian ampas kopi memberi pengaruh nyata terhadap tanaman bayam hijau (*A. tricolor*). Perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap kelima parameter adalah P1 (10 gr ampas kopi + 40 mL AB mix), jumlah daun dengan rata-rata 7,75, panjang daun dengan rata-rata 0,77, lebar daun dengan rata-rata 0,55, tinggi tanaman dengan rata-rata 2,07, dan panjang akar dengan rata-rata 2,07.

Kata kunci: ampas kopi, hidroponik, AB mix dan pertumbuhan bayam hijau (*A. tricolor*)

ABSTRACT

Name : YULIA INDAYANI
Student ID Number : 60300115064
Title : **Test of Nutrient Solution Variations with the Addition of Coffee Dregs to the Growth of Green Spinach Plants (*Amaranthus tricolor L.*) with Hydroponic Systems.**

Green spinach (*A. tricolor L.*) is one of the most popular and needed vegetables because the nutritional content of these vegetables can meet the nutritional needs of the community. Aside from being a food, green spinach can also be used as medicine. This study aims to determine the effect and dosage on the addition of coffee dregs to the growth of hydroponic green spinach (*A. tricolor*) plants. This study used a completely randomized design (RAL) method with 7 treatments with 4 replications, namely 3 L water (P0), 3 L water with 10 gr coffee dregs and 40 mL AB Mix (P1), 3 L water with 20 gr coffee pulp and 30 mL AB Mix (P2), 3 L water with 30 gr coffee dregs and 20 mL AB Mix (P3), 3 L water with 40 gr coffee dregs and 10 mL AB Mix (P4), 3 L water with 50 gr coffee dregs (P5), and 3 L water with 50 mL AB Mix (P6). The results showed that the provision of coffee dregs gave a significant influence on green spinach plants (*A. tricolor*). The results showed that the administration of coffee dregs gave a real effect on green spinach plants (*A. tricolor*). The treatment that gave the best effect on the five parameters was P1 (10 grams of coffee dregs + 40 ml AB mix), the number of leaves with an average of 7.75, leaf length with an average of 0.77, leaf width with an average of 0, 55, plant height with an average of 2.07, and root length with an average of 2.07.

Keywords: coffee dregs, hydroponics, AB mix and green spinach growth (*A. tricolor*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Qur'an telah digambarkan dengan jelas bagaimana Allah swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi yang begitu luas. Melalui al-Qur'an Allah swt. membimbing kita untuk berpikir, menyelidiki, dan mengungkap keajaiban serta rahasia yang ada di dalamnya. Dalam beberapa surah al-Qur'an, Allah swt. menjelaskan bagaimana Dia menurunkan air dari langit dan menumbuhkan bermacam-macam tanaman di muka bumi ini. Oleh karena itu maka patutlah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al- Zumar/39: 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ
 بِهِ زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak memerhatikan, bahwa sesungguhnya Allah swt. menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, Kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal (Kementrian Agama RI, 2012).

Menurut tafsir Ilmi bahwa berulang kali Allah swt. menyebutkan peran tumbuhan sebagai makanan dan obat-obatan bagi manusia di dalam al-Qur'an. Tumbuhan dan air memiliki hubungan yang sangat erat. Tumbuhan dan air dibahas secara bersama karena satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sampai saat ini tumbuhan sebagai makhluk hidup belum tentu ditemukan di bagian lain dari alam semesta. Tumbuhan hanya ditemukan di bumi yang mempunyai cadangan air. Rangkaian kehidupan selanjutnyapun sangat bergantung pada kehadiran tumbuhan. Tanpa tumbuhan makhluk hidup lain mustahil bisa eksis. Air dan tumbuhan itulah yang menjadi materi dasar bagi terjadinya kehidupan di bumi (Lajnah, 2011).

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah swt. menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita pelajari dan manfaatkan dalam kehidupan. Mempelajari bagaimana proses pertumbuhan pada tumbuh-tumbuhan yang ada dimuka bumi ini, serta mengamati berbagai manfaat lainnya selain sebagai makanan. Allah swt. menciptakan sesuatu di muka bumi ini dengan banyak proses agar kita bisa memetik pelajaran dan berpikir atas kebesaran-Nya.

Sayuran merupakan komoditas yang mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi, karena dibutuhkan setiap masyarakat dan permintaannya yang cenderung terus meningkat. Salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai komersial dan digemari masyarakat Indonesia adalah bayam. Bayam mengandung protein, asam askrobat, dan nutrisi mineral seperti Ca, Fe, Mg, P, K, dan Na yang dianggap sebagai nilai gizi pada sayuran. Selain sebagai bahan pangan, bayam dipercaya dapat

digunakan untuk mengobati penyakit disentri, mempercepat pertumbuhan sel serta dapat mempercepat proses penyembuhan bagi orang yang sedang menjalani perawatan setelah sakit (Tafajani, 2011).

Bayam banyak digemari dan dibutuhkan oleh masyarakat mengingat fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan gizi masyarakat karena mengandung zat gizi diantaranya protein, karbohidrat, lemak, zat besi, vitamin A, B, C serta serat (Rukmana, 2010).

Salah satu jenis bayam yang dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat luar yaitu bayam hijau (*Amaranthus tricolor* L.). Jenis bayam ini mempunyai nilai ekonomi tinggi dibandingkan dengan jenis bayam lainnya, hal tersebut disebabkan karena permintaannya yang cukup tinggi (Sunarjono, 2011).

Bayam hijau (*A. tricolor* L.) sering dijadikan tanaman model oleh peneliti karena masa tanam yang tidak terlalu lama yaitu 25-35 hari saja. Ditinjau dari segi manfaat, tanaman ini memiliki prospek yang cukup baik dalam bidang ekonomi, pemenuhan gizi, dan kesehatan masyarakat (Juwita, 2010).

Karena memiliki banyak manfaat, baik sebagai bahan pangan dengan kandungan nutrisi yang tinggi maupun khasiatnya dalam mengobati beberapa penyakit sehingga mempunyai peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, maka pertumbuhan dan produksinya perlu ditingkatkan (Setiawati, 2018).

Kebutuhan sayuran yang terus meningkat berbanding lurus dengan nilai ekonomisnya yang semakin tinggi. Namun, kenaikan ini tidak diimbangi dengan

pertambahan luas lahan yang digunakan untuk penanaman sayuran. Hal ini menjadi kendala. Mengatasi hal tersebut ditempuh berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman, dengan harapan dari lahan yang sempit dapat dihasilkan produksi yang tinggi. Terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan kosong. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penanaman yang dapat menghemat penggunaan lahan, tetapi mampu memproduksi sayuran yang sehat berkualitas. Salah satunya dengan sistem hidroponik, baik tanpa atau dengan rumah kaca (*green house*). Teknologi ini sangat banyak memberikan keuntungan terutama dapat menghemat biaya investasi sekitar 38%, dan mampu menghasilkan sayuran yang dipersyaratkan pasar (Aksa, 2016).

Hidroponik merupakan sistem bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan air atau media pengganti tanah. Sistem hidroponik memiliki berbagai macam tipe (Utami, 2016).

Salah satu sistem hidroponik adalah rakit apung. Rakit apung merupakan salah satu sistem budidaya secara hidroponik tanaman (terutama sayuran) dengan cara menanam tanaman pada lubang *styrofoam* yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam bak penampung atau kolam sehingga akar tanaman terendam dalam larutan nutrisi. Karakteristik sistem ini antara lain adalah terisolasinya lingkungan perakaran sehingga fluktuasi suhu larutan nutrisi akan lebih rendah. Pada sistem ini larutan tidak disirkulasikan, namun dibiarkan tergenang dan ditempatkan dalam suatu wadah tertentu untuk menampung larutan tersebut. Sistem ini termasuk

sistem yang sederhana tetapi ukurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Sani, 2015).

Dalam budidaya hidroponik nutrisi diberikan dalam bentuk larutan yang harus mengandung unsur makro dan mikro. Unsur makro yaitu Nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur (S). Unsur mikro yaitu mangan (Mn), cuprum (Cu), molibdin (Mo), zinkum (Zn) dan besi (Fe). Banyak merek nutrisi yang diperdagangkan di pasaran, namun kualitasnya berbeda-beda. Perbedaan kualitas nutrisi ini dipengaruhi banyak faktor. Perbedaan jenis, sifat, dan kelengkapan kimia bahan baku pupuk yang di gunakan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pupuk yang dihasilkan (Siregar, 2015).

Budidaya sayuran daun secara hidroponik umumnya menggunakan larutan hara berupa larutan hidroponik standar (AB mix). Permasalahannya pada saat ini penggunaan larutan hara AB mix memerlukan biaya yang relatif tinggi. Masyarakat umum memandang bahwa teknologi secara hidroponik memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dalam hal perawatan dan harga pupuk. Alternatif dalam pengembangan teknologi hidroponik sangat diperlukan agar mempermudah masyarakat khususnya petani kecil dalam menerapkan budidaya sayuran, yaitu dengan cara memanfaatkan beberapa sumber hara dengan harga yang relatif lebih murah (Nugraha, 2015).

Salah satu bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber nutrisi untuk pertumbuhan tanaman yaitu ampas kopi. Ampas kopi mengandung 1,2% Nitrogen, 0,02% Fosfor, dan 0,35% Kalium. Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi tanaman, terlebih saat pertumbuhan vegetatif, daun, akar, dan batang.

Apabila unsur nitrogen dalam tanah tercukupi, jumlah klorofil akan meningkat sehingga mampu meningkatkan aktivitas fotosintesis. Fosfor mempengaruhi metabolisme sehingga pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel berjalan dengan lancar. Sementara itu kalium bermanfaat dalam aktivasi enzim, fotosintesis, transport gula, dan pembentukan protein (Putri, 2017).

Ampas kopi ini kebanyakan masih dibuang dan belum dioptimalkan oleh petani atau masyarakat padahal limbah ini masih memiliki daya guna, salah satunya yaitu digunakan sebagai salah satu sumber nutrisi dalam pertumbuhan tanaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui pengaruh variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan sistem hidroponik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) secara hidroponik?
2. Pada takaran berapakah variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) secara hidroponik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Bibit tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) kode varietas KEP No.083/KP ts/SR.120/D.2.7/10/2014/BA 281, kemudian dilakukan penyemaian pada benih. Setelah benih tumbuh, tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) kemudian dibudidayakan secara hidroponik sistem rakit apung dengan memberikan perlakuan penambahan ampas kopi yang dilakukan pada bulan Maret sampai April 2019 di *green house* jurusan biologi UIN Alauddin Makassar, Samata-Gowa.

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Adikasari (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “pemanfaatan ampas teh dan ampas kopi sebagai penambah nutrisi pada pertumbuhan tanaman tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan media hidroponik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi tanaman yang paling baik adalah pada tanaman dengan 300 mL air ditambah 3 gram campuran ampas teh dan ampas kopi dengan tinggi rata-rata 14,00 cm. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ampas teh dan ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai penambah nutrisi pada pertumbuhan tanaman tomat (*Solanum lycopersicum*) dengan media hidroponik.
2. Putri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pemberian ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman selada (*Lactuca sativa* L.)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ampas kopi padat dan cair berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada (*Lactuca sativa* L.). Konsentrasi limbah cair

10g/100mL memberikan pengaruh yang paling baik terhadap pertumbuhan tanaman selada (*Lactuca sativa* L.). Sementara itu peningkatan dosis limbah padat menurunkan hasil pertumbuhan tanaman selada.

3. Juliati (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pemberian ampas teh dan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman tomat (*Lycopersicum Esculentum* Mill) dengan media hidroponik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari masing masing parameter yang paling baik adalah pada pemberian 300 ml air ditambah dengan 4 gram campuran ampas teh dan ampas kopi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 4 gram campuran ampas teh dan ampas kopi mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat (*Lycopersicum esculentum* Mill) dengan media hidroponik.

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) secara hidroponik.
2. Untuk mengetahui takaran berapa dari variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) secara hidroponik.

F. Manfaat penelitian

1. Bagi kampus UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi maupun kampus lain, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Fisiologi Tumbuhan dan Nutrisi Tumbuhan.
2. Bagi petani bayam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal teknik budidaya hidroponik dengan menggunakan ampas kopi sebagai salah satu sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman.
3. Bagi masyarakat yang berada di perkotaan diharapkan dapat memberikan keuntungan dari segi ekologisnya dimana yang telah diketahui bahwa diperkotaan memiliki lahan yang sempit, dengan tehnik budidaya hidroponik ini dapat digunakan oleh masyarakat perkotaan karena tidak memerlukan lahan yang luas sehingga masyarakat perkotaan juga mampu memenuhi sendiri kebutuhan akan gizi.
4. Pemanfaatan ampas kopi ini juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh ampas kopi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Islam Terhadap Tumbuhan

Berbicara tentang al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, kita sering dihadapkan pada pertanyaan klasik: adakah kesesuaian antara keduanya atau sebaliknya, bertentangan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya dicermati bersama ungkapan seorang ilmuwan modern, Einstein bahwa “Tiada ketenangan dan keindahan yang dapat dirasakan hati melebihi saat-saat ketika memerhatikan keindahan rahasia alam. Sekalipun rahasia itu tidak terungkap, tetapi di balik itu ada rasa lebih indah lagi melebihi segalanya, dan jauh di atas bayang-bayang akal kita. Menemukan rahasia dan merasakan keindahan ini tak lain adalah esensi dari bentuk penghambaan”. Dari kutipan tersebut, Einstein seperti ingin menunjukkan bahwa ilmu yang sejati adalah dapat mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan jiwa dengan bertemu dan merasakan kehadiran Sang Pencipta melalui wujud alam raya. Memang dengan mengamati sejarah ilmu dan agama, ditemukan beberapa kesesuaian antara keduanya, antara lain dari segi tujuan, sumber, dan cara mencapai tujuan tersebut. Bahkan, keduanya telah mulai beriringan sejak penciptaan manusia pertama (Lajnah, 2011).

Hubungan antara agama dan sains tidak terlalu harmonis. Seorang Skotlandia yang lahir di Beijing, Ian G. Barbour yang merupakan seorang Doctor ilmu fisika lulusan Universitas Chicago sekaligus pemegang ijazah teologi meneliti dan

mengelompokkan hubungan antara agama dan sains ke dalam empat pendekatan, yakni diantaranya konflik, independensi, dialog dan integrasi. Keempatnya didasarkan pada premis bahwa baik sains maupun agama diakui klaim kognitif masing-masing dalam deskripsi tentang alam fisik (Pranggono, 2008).

Al-Qur'an memang bukan buku pelajaran sains, tetapi sebagai pedoman hidup, dia seharusnya juga mengandung pedoman di bidang yang sangat berpengaruh dalam hidup manusia, yaitu sains dan teknologi. Ayat-Ayat yang menjelaskan tentang sains ternyata cukup banyak. Ada yang terbuka dengan jelas, ada yang tersamar. Ayat-ayat sains ini tersebar di berbagai surat bagaikan percikan di sana-sini. Para ulama tafsir membagi ayat al-Qur'an menjadi ayat *muhkamat* (dengan makna yang jelas atau langsung) dan *mutasyabihat* (makna yang samar). Ayat *mutasyabihat* tidak boleh dijadikan dasar hukum, tetapi rasanya masih bisa dijadikan inspirasi ilmiah. Muhammad Kamil Abdus-Shamad mengatakan bahwa mukjizat al-Qur'an adalah kesesuaiannya dengan semua standar pemikiran manusia. Al-Qur'an bisa dipahami oleh berbagai tingkat intelektual pembacanya, baik oleh gembala unta yang sederhana maupun oleh ulama dan ilmuwan yang canggih. Al-Qur'an berbicara dengan bahasa sastra maupun bahasa ilmiah. Ayat Sains seharusnya diusahakan dibaca dan direnungkan dengan bahasa sains (Pranggono,2008).

Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu, dan salah satu ilmu pengetahuan tersebut adalah ilmu pengetahuan tentang lingkungan, lebih spesifik lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Al-

Qur'an juga sering menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti kekuasaan Allah swt. dan perumpamaan untuk menyampaikan suatu hikmah. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang disebutkan secara jelas namanya dalam al-Qur'an. Penyebutan nama tumbuh-tumbuhan dalam al-Qur'an tentu bukan tanpa maksud, pasti ada sebab dan tujuan penyebutan nama-nama tersebut (Fauzan, 2015).

Di dalam al-Qur'an banyak ditemukan kata atau istilah yang terkait dengan tumbuhan dan pepohonan, seperti bagian-bagian akar, dahan, batang ranting, jenis biji-bijian, sayuran, buah-buahan dan lainnya. Menurut Jamaluddin Husein Mahran, penyebutan terdapat dalam 112 ayat yang tersebar di 47 surah. Banyaknya ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang tumbuhan telah mendorong ulama Islam di masa lalu untuk melakukan kajian sebagai bagian dari upaya tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut (Lajnah, 2009).

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al- Syu'ara'/26: 7-8 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu perbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah swt. dan kebanyakan mereka tidak beriman (Kementrian Agama RI, 2002).

Menurut tafsir al-Misbah menyatakan bahwa apakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati

sebagai ciptaan Allah swt. di bumi ini ? sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahaesa dan Mahakuasa. Sesungguhnya adanya beranekan ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang Pencipta Yang Mahakuasa, akan tetapi kebanyakan kaum ternyata tidak mau beriman (Shihab, 2011).

Al-Qur'an bukanlah kitab sains akan tetapi ia memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip sains yang selalu dikaitkannya dengan metafisik dan spriritual. Allah swt. tidak menjelaskan secara detail tentang segala sesuatu di dalam al-Qur'an, akan tetapi Allah swt. memberikan gambaran besar, pemantik dan juga petunjuk agar manusia menggunakan akal mereka. Allah swt. dalam wahyu-Nya tidak membuat pernyataan yang saintifik, tetapi menunjukkan tanda-tanda (ayat-ayat) berupa fenomena alam dan ciptaan. Jika dipahami secara benar akan mengantarkan kepada kebenaran tertinggi, yaitu Allah swt. Dalam al-Qur'an, ayat yang berbicara tentang ayat-ayat *kauniyah* (sebagai tanda kekuasaan Allah swt.) terdapat 750 ayat (Fauzan, 2015).

Begitu banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk memikirkan serta mempelajari ayat *kauniyah* agar manusia bisa lebih mengenal Tuhan yang mereka sembah Yang Maha Menciptakan yaitu Allah swt. Bumi yang manusia tempati, tanah, angin, hewan, tumbuhan dan material alam yang lain merupakan ciptaan Allah swt. yang patut direnungkan. Salah satu dari unsur alam yang terpenting bagi

kehidupan manusia yang paling tampak dan sering kali terlihat adalah tumbuh-tumbuhan. Selain menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia, Allah swt. juga menggunakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai media untuk menyampaikan pelajaran kepada manusia (Fauzan, 2015).


Allah swt. menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Memelihara dan membangun lingkungan dipermukaan bumi adalah ajaran yang penting dalam Islam, sedangkan mengadakan kerusakan di bumi dilarang. Ajaran ini berasal dari konsep tauhid, yang mengandung arti bahwa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda tidak bernyawa semua adalah makhluk Allah swt. Manusia diangkat sebagai khalifah, kekhalifahan yang menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Dengan kedudukannya itu manusia diberi tanggung jawab yaitu diserahi bumi dengan segala isinya dan tidak boleh diabaikan pula usaha untuk melestarikannya, artinya hendaklah dijaga keseimbangan ekologi dan hindari pencemaran serta diupayakan agar digunakan sehemat mungkin. Bumi bukanlah warisan nenek moyang segelintir orang, melainkan pinjaman dari anak cucu mereka. Selaku pinjaman, maka mereka harus pandai dan adil, tidak ceroboh supaya barang pinjaman itu dapat dikembalikan sesuai aslinya, atau mungkin lebih baik lagi (Tualeka, 2011).

B. Tinjauan Umum Tanaman Bayam

Bayam adalah tanaman yang termasuk dalam Famili Amaranthaceae dengan nama latin *Amaranthus* sp. dan merupakan tanaman perdu dan semak. Bayam memiliki fungsi sangat beragam dan bermanfaat, diantaranya yakni bayam dapat memperbaiki daya kerja ginjal, akarnya dapat digunakan untuk mengobati penyakit disentri, mempercepat pertumbuhan sel. Bayam juga dapat digunakan sebagai bahan untuk masakan seperti gado-gado, sayur bening, dan pecel. Daun bayam juga dapat dimanfaatkan untuk membuat keripik bayam yang rasanya gurih dan renyah (Tafajani, 2011).

Menurut Steenis (2013) taksonomi bayam hijau (*A. tricolor* L.) dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Famili : Amaranthaceae
Genus : *Amaranthus*
Spesies : *Amaranthus tricolor* L.



Gambar 2.1. morfologi tanaman bayam hijau (a) daun, (b) batang, (c) akar (Dokumentasi pribadi, 2019).

Menurut Purti (2017) bahwa secara morfologis bagian-bagian tanaman bayam hijau dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Akar

Bentuk tanaman bayam adalah terma (perdu), tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 sampai 2 m, berumur semusim atau lebih. Sistem perakaran menyebar dangkal pada kedalaman antara 20-40 cm dan berakar tunggang.

b) Batang

Batang tumbuh tegak, tebal, berdaging dan banyak mengandung air, tumbuh tinggi diatas permukaan tanah. Bayam tahunan mempunyai batang yang keras berkayu dan bercabang banyak. Bayam kadang-kadang berkayu dan bercabang banyak.

c) Daun

Daun bayam berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat-urat daun yang jelas. Warna daun bayam bervariasi, mulai dari hijau muda, hijau

tua, hijau keputih-putihan, sampai berwarna merah. Daun bayam liar umumnya kasap (kasar) dan kadang berduri.

d) Bunga

Bunga bayam memiliki ukuran yang kecil, berjumlah banyak terdiri dari daun bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, dan bakal buah 2-3 buah. Bunga keluar dari ujung-ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti malai yang tumbuh tegak. Tanaman ini dapat berbunga sepanjang musim. Perkawinannya bersifat uniseksual yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. Penyerbukan berlangsung dengan bantuan angin dan serangga.

e) Biji

Biji bayam memiliki ukuran yang sangat kecil dan halus, berbentuk bulat, dan berwarna coklat tua sampai mengkilap sampai hitam kelam. Namun ada beberapa jenis bayam yang mempunyai warna biji putih sampai merah, misalnya bayam maksi yang bijinya merah.

Bayam merupakan tanaman semusim, berbentuk perdu atau semak yang banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Tanaman bayam sebagai sayuran daun sudah lama dikenal dan diakrabi masyarakat luas, karena pengaruhnya besar sekali dalam kaitan dengan perbaikan ekonomi rumah tangga, khususnya penyediaan pangan bergizi dan juga sumber tambahan pendapatan (penghasilan) keluarga.

Bayam merupakan bahan sayuran daun yang bergizi tinggi dan digemari oleh semua lapisan masyarakat. Daun bayam dapat dibuat berbagai sayur, bahkan dapat

disajikan sebagai hidangan mewah. Di beberapa negara berkembang bayam dipromosikan sebagai sumber protein nabati, karena berfungsi ganda bagi pemenuhan kebutuhan gizi maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan memiliki banyak vitamin A atau *niacin*, bayam mencegah penyakit mata, memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memiliki sifat anti-kanker sayuran ini juga dapat bermanfaat untuk metabolisme tulang. Karena sifatnya yang rendah kalori membuat bayam sebagai makanan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Kandungan gizi dari 100 gram bayam dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Kandungan gizi pada bayam hijau (Rukmana, 1994)

No.	Kandungan Gizi	Jumlah
1	Kalori	20,74 kkal
2	Lemak	0,30 g
3	Kolestrol	10 mg
5	Sodium	69 mg
6	Karbohidrat	0,61 g
7	Serat	2,58 g
8	Gula	0,47 g
9	Protein	2,63 g
10	Vitamin A	589,17 ug
11	Vitamin C	40 mg
12	Vitamin B12	120 ug
13	Vitamin B3	1,38 mg
14	Kalsium	117 mg
15	Besi	2,70 mg

Perkembangan tanaman dapat dibagi menjadi dua fase, yakni tingkat pertumbuhan dari bibit menjadi tanaman dewasa (fase vegetatif) dan tingkat pembentukan bunga dan buah (fase generatif). Selama masa pertumbuhan dan perkembangannya terdapat unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman khususnya bayam cabut (*Amaranthus*

*tricolor*L.) adalah fosfor. Fosfor berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar semai, mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa pada umumnya dan dapat meningkatkan produksi biji-bijian (Sutejo, 2002).

Kekurangan suatu unsur akan menimbulkan kelainan pada pertumbuhan tanaman dan kelainan ini merupakan tanda yang khusus. Gejala ini timbul karena unsur yang dapat mempengaruhi proses-proses tertentu pada pertumbuhan tanaman tidak ada dan akan menimbulkan tanda-tanda khusus pada daun, menjadi klorosis (berwarna kuning) karena proses pembentukan klorofil terganggu. Kekurangan unsur hara fosfor akan menimbulkan hambatan pada pertumbuhan sistem perakaran, daun dan batang (Juwita, 2010).

C. Tinjauan Umum Tentang Kopi

Kopi adalah salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Konsumsi kopi dunia mencapai 70% berasal dari spesies kopi Arabika, 26% berasal dari spesies kopi Robusta, dan 4% dari spesies kopi lain. Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, kopi sendiri baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab melalui para saudagar Arab (Rahardjo, 2012).

Di Indonesia kopi mulai dikenal pada tahun 1696, yang dibawa oleh VOC. Tanaman kopi di Indonesia mulai diproduksi di pulau Jawa dan hanya bersifat coba-

coba, akan tetapi karena hasilnya memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi perdagangan maka VOC menyebarkannya ke berbagai daerah agar para penduduk menanamnya (Najiyanti, 2004).

Klasifikasi tanaman kopi (*Coffea* sp.) menurut Steenis (2013) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Rubiales
Famili : Rubiaceae
Genus : Coffea
Spesies : *Coffea* sp.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi. Indonesia mampu memproduksi kopi sebanyak 675,8 ribu ton dengan luas lahan 1,24 juta pada tahun 2013 (Direktorat Jendral Perkebunan, 2014). Pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri memiliki prospek yang sangat baik, mengingat masyarakat Indonesia mengonsumsi kopi rata-rata baru mencapai 1,2 Kg perkapita/tahun dibanding dengan negara-negara pengimpor kopi seperti Amerika Serikat 4,3 Kg, Jepang 3,4 Kg, Austria 7,6 Kg, Belgia 8,0 Kg, Norwegia 10,6 Kg dan Finlandia 11,4 Kg perkapita/tahun (Rosniawaty, 2017).

Buah kopi mentah akan berwarna hijau dan ketika matang akan berubah menjadi warna merah. Buah kopi terdiri atas daging buah dan biji. Daging buah

terdiri atas tiga bagian yaitu lapisan kulit luar (eksocarp), lapisan daging buah (mesocarp), dan lapisan kulit tanduk (endocarp). Kulit tanduk buah kopi memiliki tekstur agak keras dan membungkus sepanjang biji kopi daging buah ketika matang mengandung lendir dan senyawa gula yang rasanya manis (Panggabean, 2011).

Banyak orang dewasa yang gemar meminum kopi. Namun, itu adalah fakta bahwa orang jarang tahu tentang kopi. Ampas kopi dapat dimanfaatkan lagi. Bukan untuk dikonsumsi kembali, namun untuk dijadikan pupuk tanaman (Fairuz, 2014).

Ampas kopi merupakan pupu organik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Ampas kopi mampu menambah asupan nitrogen dan fosfor yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tumbuh sehat (Aisyah, 2013).



Gambar 2.2 Ampas kopi (Dokumentasi pribadi, 2019)

D. Tinjauan Umum Tentang Hidroponik

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pertanian merupakan salah sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat, karena sebagian besar kawasan Indonesia merupakan lahan pertanian. Para petani biasanya menggunakan tanah untuk media dalam mengembangkan hasil pertaniannya. Hal

tersebut telah menjadi hal biasa dikalangan dunia pertanian. Melihat banyaknya lahan yang tidak digunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, maka saat ini ada cara lain untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai usaha untuk mengembangkan hasil pertanian, yaitu dengan cara bercocok tanam secara hidroponik (Roidah, 2014).

Hydroponic secara harfiah berarti *Hydro* yaitu air, dan *ponic* yaitu pengerjaan. Sehingga secara umum berarti sistem budidaya pertanian tanpa menggunakan tanah tetapi menggunakan air yang berisi larutan nutrient. Budidaya hidroponik biasanya dilaksanakan di dalam rumah kaca (*greenhouse*) untuk menjaga supaya pertumbuhan tanaman secara optimal dan benar-benar terlindung dari pengaruh unsur luar seperti hujan, hama penyakit, iklim dan lain-lain. Keunggulan dari beberapa budidaya dengan menggunakan sistem hidroponik antara lain yaitu kepadatan tanaman persatuan luas dapat dilipat gandakan sehingga menghemat penggunaan lahan (Roidah, 2014).

Mutu produk seperti bentuk, ukuran, rasa, warna, kebersihan dapat dijamin karena kebutuhan nutrient tanaman dipasok secara terkendali di dalam rumah kaca. Tidak tergantung musim atau waktu tanam dan panen, sehingga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pasar. Jenis hidroponik dapat dibedakan dari media yang digunakan untuk berdiri tegaknya tanaman. Media tersebut biasanya bebas dari unsur hara (steril), sementara itu pasokan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dialirkan ke dalam media tersebut melalui pipa atau disiramkan secara manual. Media tanam tersebut dapat berupa kerikil, pasir, gabus, arang, zeolite atau tanpa media agregat (hanya air). Yang paling penting dalam menggunakan media tanam tersebut harus

bersih dari hama sehingga tidak menumbuhkan jamur atau penyakit lainnya (Roidah, 2014).

Hidroponik terdiri dari berbagai macam jenis, berikut jenis-jenis hidroponik:

1. Hidroponik Substrat.

Hidroponik substrat tidak menggunakan air sebagai media, tetapi menggunakan media padat (bukan tanah) yang dapat menyerap atau menyediakan nutrisi, air, dan oksigen serta mendukung akar tanaman seperti halnya fungsi tanah (Roidah, 2014).



Gambar 2.3 Hidroponik substrak (Natalia, 2017).

2. NFT (*Nutrient Film Technique*)


NFT adalah model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal. Air tersebut tersirkulasi dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Perakaran dapat berkembang di dalam larutan nutrisi, karena disekitar perakaran terdapat selapis larutan nutrisi maka sistem dikenal dengan nama NFT. Kelebihan air akan mengurangi jumlah oksigen, oleh karena itu lapisan nutrisi dalam sistem NFT ini dibuat maksimal tinggi larutan 3 mm, sehingga kebutuhan air (nutrisi) dan oksigen dapat terpenuhi (Roidah, 2014).



Gambar 2.4 Hidroponik NFT (Natalia, 2017).

3. *Drip Irrigation*

Teknik *drip irrigation* mengalirkan nutrisinya melalui sistem irigasi. Nutrisi mengalir melalui selang secara terus-menerus dan dikontrol oleh pengatur waktu (timer). Walaupun modal awal yang dibutuhkan terbilang besar, teknik ini dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik dalam jumlah yang lebih banyak (Natalia, 2017).




Gambar 2.5 Hidroponik *drip irrigation* (Natalia, 2017).

4. *Ebb and Flow System*

Teknik *ebb and flow system* adalah teknik hidroponik yang bekerja dengan cara mengalirkan banyak nutrisi untuk beberapa waktu, lalu mengembalikan nutrisi tersebut kembali ke dalam bak penampung. Nutrisi dialirkan dengan menggunakan


pompa. Umumnya teknik ini menggunakan teknik bertanam secara bertingkat (Natalia, 2017).



Gambar 2.6 Hidroponik *ebb and flow system* (Natalia, 2017).

5. Rakit Apung

Rakit apung atau biasa disebut juga *water culture* merupakan jenis teknik hidroponik yang bekerja dengan sistem pompa udara. Udara dipompa, lalu terbentuk gelembung-gelembung kecil pada air. Gelembung tersebut merupakan suplai oksigen bagi akar tanaman. Umumnya, wadah yang menyangga terbuat dari *styrofoam*. Jenis sayuran yang umum ditanam pada teknik ini adalah kangkung dan bayam, selada (Natalia, 2017).



Gambar 2.7 Hidroponik rakit apung (Natalia, 2017).

6. *Aeroponik*

Sistem kerja *aeroponik* yaitu dengan menyemprotkan nutrisi pada akar tanaman hingga membentuk butiran lembut. Sistem kerja tersebut akan membuat tanaman lebih mudah dalam menyerap nutrisi. Frekuensi penyemprotan diatur oleh timer. Ukuran tanaman yang kecil mempermudah proses penyerapan nutrisi sehingga ketersediaan nutrisi dan oksigen cukup baik (Natalia, 2017).




Gambar 2.8 Hidroponik *Aeroponik* (Natalia, 2017).

7. *Wick System*

Salah satu sistem hidroponik yang sederhana ialah sistem *wick* (sumbu), dalam sistem hidroponik ini, sumbu sebagai penyalur larutan nutrisi bagi tanaman dalam media tanam. Sistem ini bersifat pasif, karena tidak ada bagian-bagian yang bergerak (Laksono, 2017).

Pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan menggunakan sistem ini sangat bergantung pada nutrisi yang diterima dan kecepatan penyaluran nutrisi tersebut. Teknik ini dapat diterapkan pada botol bekas kelebihan teknik *wick system* yaitu ukurannya yang kecil memudahkan untuk dipindah tempatkan, bahan rangkiannya

mudah untuk ditemukan dan harganya relatif murah, serta hemat karena tidak membutuhkan aliran sistem (Natalia, 2017).



Gambar 2.9 Hidroponik *wick system* (Natalia, 2017).

Berdasarkan metode pemberian larutan nutrisinya, kultur media dibedakan menjadi dua yaitu *sub irrigation* (Irigasi bawah permukaan) dan *top irrigation* (irigasi permukaan). Karna *top irrigation* sering diaplikasikan pada sistem hidroponik dengan menggunakan penetes maka sistem ini lebih dikenal dengan sebutan *drip irrigation system* (sistem irigasi tetes). *Sub irrigation* dibagi menjadi dua, yaitu *passive sub irrigation* (sistem irigasi dengan prinsip kapiler), dan *ebb and flow* (sistem irigasi genang dan alir). Pada kultur larutan nutrisi, penanaman dilakukan tidak dengan media tanam atau media tumbuh, sehingga akar tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi atau udara (Sudibyo, 2013).

Masuknya budidaya hidroponik di Indonesia berdampak pada komoditi sayuran yang menunjang aspek ekonomi karena memiliki nilai komersial yang tinggi. Permintaan masyarakat akan beberapa jenis sayuran untuk kebutuhan sehari-hari cenderung meningkat. Kesadaran atas pentingnya asupan gizi yang cukup untuk


tubuh manusia berdampak terhadap meningkatnya pembudidayaan berbagai macam jenis sayuran yang dibutuhkan (Hussain, 2007).

Larutan nutrisi merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman hidroponik, sehingga harus tepat dari segi jumlah komposisi ionnutrisi dan suhu. Nutrisi diberikan dalam bentuk larutan yang mengandung unsur makro dan mikro didalamnya. Selain larutan nutrisi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu media tanam. Ada dua jenis media tanam yang biasa digunakan pada sistem budidaya hidroponik yaitu media tanam organik diantaranya arang sekam, serbuk gergaji, akar pakis, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk media tanam anorganik diantaranya, *hidroton*, *clay*, *rockwool*, dan lain sebagainya. Fungsi dari media tanam pada budidaya hidroponik adalah sebagai tempat tumbuh dan tempat penyimpanan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jenis media tanam yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Laksono, 2017).

Menurut Roidah (2014) bahwa hidroponik memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan sistem hidroponik yaitu diantaranya keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin, perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat (efisien), tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi, tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor dan rusak, hasil produksi lebih continue dan lebih tinggi dibanding dengan penanaman ditanah, harga jual

hidroponik lebih tinggi dari produk non-hidroponik, beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan di luar musim, tidak ada resiko banjir, erosi, kekeringan, atau ketergantungan dengan kondisi alam, serta tanaman hidroponik dapat dilakukan pada lahan atau ruang yang terbatas, misalnya di atap, dapur atau garasi. Selain keuntungan sistem hidroponik juga memiliki kelemahan yaitu investasi awal yang mahal, memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit.

E. Karangka Pikir



F. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) secara hidroponik.
2. Terdapat takaran variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi yang memberikan pengaruh terbaik pada pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) secara hidroponik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental yang menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat menguji, yakni menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat. Penelitian ini merupakan eksperimen murni, yang diteliti pada penelitian ini yaitu pengaruh pemberian ampas kopi terhadap tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L)

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2019 di *Green house* jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Samata-Gowa.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah ampas kopi sebagai sumber nutrisi dan variabel terikat adalah pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.).


D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel antara lain:

1. Ampas kopi adalah sisa minuman kopi yang tidak larut dalam air yang dilarutkan pada 3 L air.
2. Pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) merupakan suatu peningkatan ukuran sel-sel tunggal, atau peningkatan jumlah sel atau keduanya yang ditandai dengan jumlah daun (helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), panjang akar (cm), dan tinggi tanaman (cm).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi (pengamatan), pengukuran langsung dan dibantu dengan kamera. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan dan sehingga terdapat 28 unit percobaan yaitu air 3 L tanpa campuran apapun (P₀), air 3 L dengan 10 gr ampas kopi dan 40 mL AB Mix (P₁), air 3 L dengan 20 gr ampas kopi dan 30 mL AB Mix (P₂), air 3 L dengan 30 gr ampas kopi dan 20 mL AB Mix (P₃), air 3 L dengan 40 gr ampas kopi dan 10 mL AB Mix (P₄), air 3 L dengan 50 gr ampas kopi (P₅), dan air 3 L dengan 50 mL AB Mix (P₆). Rancangan dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 3.1. Rancangan penelitian

F. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wadah, mistar, gelas ukur, netpot, gelas backer, *cutter*, aerator, neraca analitik, *handspayer*, wadah penyemaian, alat tulis dan kamera.

2. Bahan

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air, ampas kopi, benih bayam hijau (*A. tricolor* L.), *styrofoam*, *aluminium foil*, rockwool dan nutrisi hidroponik AB mix.

G. Prosedur Kerja

Prosedur kerja merupakan modifikasi dari Risnawati (2016) sebagai berikut:

1. Persiapan media tanam

Persiapan media tanam dengan mempersiapkan alat-alat seperti wadah (P= 25 cm, L= 17,5 cm, T= 8,5 cm), aerator dan *styrofoam*.

2. Pembibitan

Tanaman sayuran dilakukan dengan menyemaikan benih tanaman bayam (*A. tricolor* L.) tersebut menggunakan media *rockwol*. Waktu yang di butuhkan dalam tahap penyemaian ini yaitu sekitar 7 sampai 10 hari untuk siap dipindah tanam.

3. Penanaman

Pemindahan tanaman dilakukan apabila tanaman sudah memenuhi ciri-ciri tanaman yang sudah siap pindah. Adapun ciri-ciri tanaman yang sudah siap dipindah tanamkan yaitu dengan melihat jumlah daun sejati. Daun sejati adalah daun yang muncul setelah daun lembaga dari kotiledon. Bibit yang siap tanam harus memiliki jumlah daun sejati setidaknya 3-4 helai karena sudah dianggap cocok untuk beradaptasi di lingkungan baru. Cara penanaman yaitu dengan memasukkan bibit tanaman bayam (*A. tricolor* L.) pada netpot yang sudah disediakan kemudian netpot diletakkan pada wadah yang sudah disiapkan.

4. Pemeliharaan

Melakukan pemeriksaan secara rutin setiap harinya serta mengontrolan nutrisi tanaman dengan mencuci wadah dan mengganti nutrisi setiap satu kali dalam 1 minggu.

5. Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung gejala yang terjadi pada setiap perlakuan dan ulangan. Gejala yang diamati yaitu jumlah daun (helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), panjang akar (cm), dan tinggi tanaman (cm). Setiap pengamatan dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada minggu ke-1 (7 hari), minggu ke-2 (14 hari), minggu ke-3 (21 hari), minggu ke-4 (28 hari), kecuali panjang akar dan bobot basah hanya dilakukan pada minggu ke-4.

Adapun pengamatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah daun (helai)

Pengamatan jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka sempurna, kemudian data hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan yang sudah disiapkan.

b. Panjang daun (cm)

Pengamatan panjang daun yaitu dengan mengukur panjang daun dari pangkal sampai ujung daun, kemudian data hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan yang sudah disiapkan.

c. Lebar daun (cm)

Pengamatan lebar daun dilakukan dengan cara mengukur lebar daun dari samping kanan ke kiri, kemudian data hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan yang sudah disiapkan.

d. Tinggi tanaman (cm)

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur panjang tanaman dari pangkal batang keujung daun terjauh dari pangkal batang, kemudian data hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan yang sudah disiapkan.

e. Panjang akar (cm)

Pengamatan panjang akar dilakukan dengan cara mengukur panjang akar tanaman pada saat panen, kemudian data hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan yang sudah disiapkan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh ditunjukkan dalam bentuk tabel dan diagram. Analisis data menggunakan sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{hitung} > F_{tabel 5\%}$) atau berbeda sangat nyata ($F_{hitung} > F_{tabel 1\%}$), maka untuk membandingkan rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Data dilakukan dengan bantuan software SPSS 24.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pengamatan pengaruh pemberian ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan sistem hidroponik maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Jumlah Daun (helai)

Adapun hasil dari pengamatan jumlah daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah masa pertumbuhan 4 MST dengan menggunakan beberapa perlakuan dan berbagai konsentrasi ampas kopi dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.1. Jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST (Sumber: Data Primer, 2019).

Berdasarkan gambar 4.1 perlakuan yang memberi pengaruh terbaik terhadap jumlah daun setelah P6 (50 ml AB mix) sebagai kontrol positif adalah P1 (3L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix) dengan jumlah rata-rata 7,75. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap jumlah daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil uji BNT dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Hasil uji BNT jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.


No.	Perlakuan	Rata-rata jumlah daun
1	P0	4,00 _d
2	P1	7,75 _{ab}
3	P2	7,50 _{ab}
4	P3	7,00 _b
5	P4	7,00 _b
6	P5	6,00 _c
7	P6	8,25 _a

keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix), P2 (3 L air + 20 gr ampas kopi + 300 ml AB mix), P3 (3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix), P4 (3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix), dan P6 (3 L air + 50 ml AB mix) pengaruh yang tidak berbeda nyata. Sedangkan P0 (3 L air) dan P5 (3 L air + 40 gr ampas kopi) menunjukkan berbeda nyata di antara semua perlakuan.

Adapun rata-rata pertambahan jumlah daun (helai) tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) (Sumber: Data Primer, 2019).

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix), P2 (3L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix) dan P6 (3L air 50 ml AB mix) yang memberi pengaruh yang baik di dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) yang disajikan pada lampiran 15. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan jumlah daun pada

tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada penambahan jumlah daun dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Hasil uji BNT rata-rata penambahan jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST).

No.	Perlakuan	Rata-rata jumlah daun
1	P0	0,00 _c
2	P1	1,50 _a
3	P2	1,50 _a
4	P3	1,50 _a
5	P4	1,00 _b
6	P5	1,00 _b
7	P6	1,50 _a


keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Dari tabel di atas menunjukkan P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix), P2 (3L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix), P3 (3L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix) dan P6 (3 L air + 50 ml AB mix) rata-rata jumlah daun yang sama yaitu 1,50.

2. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Panjang dan Lebar Daun (cm)

Adapun hasil dari pengamatan panjang daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah masa pertumbuhan 4 MST dengan menggunakan beberapa perlakuan dan berbagai konsentrasi ampas kopi dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.3. Panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) 4 MST (Sumber: Data Primer, 2019).

Gambar di atas menunjukkan P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) yang memberi pengaruh terbaik setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) dengan rata-rata panjang daun 4,15.

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) yang disajikan pada lampiran 6. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan panjang daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil uji BNT dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Hasil uji BNT panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.


No.	Perlakuan	Rata-rata panjang daun
1	P0	0,80 _f
2	P1	4,15 _b
3	P2	3,30 _c
4	P3	3,07 _c
5	P4	2,67 _d
6	P5	1,60 _e
7	P6	4,65 _a

keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Dari tabel di atas menunjukkan perlakuan dengan rata-rata panjang daun tertinggi setelah P6 (50 ml AB mix) yang merupakan kontrol positif adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) yaitu 4,15.

Adapun rata-rata pertambahan panjang daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) disajikan pada gambar 4.4 berikut.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.4. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar 4.4 menunjukkan perlakuan yang menghasilkan rata-rata pertambahan panjang daun yang tertinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) yang merupakan kontrol positif adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) yaitu dengan rata-rata 0,97. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) yang di sajikan pada lampiran 17. Berdasarkan hasil uji ANOVA tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan panjang daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan panjang daun dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) ke-III (4 MST – 3 MST).


No.	Perlakuan	Rata-rata panjang daun
1	P0	0,00 _e
2	P1	0,77 _b
3	P2	0,47 _c
4	P3	0,35 _{cd}
5	P4	0,35 _{cd}
6	P5	0,25 _d
7	P6	0,97 _a

keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5% .

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perlakuan yang menghasilkan rata-rata pertambahan panjang daun setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) yaitu dengan rata-rata 0,77.

Adapun hasil dari pengamatan lebar daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah masa pertumbuhan 4 MST dengan menggunakan beberapa perlakuan dan berbagai konsentrasi ampas kopi dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.5. Jumlah lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST (Sumber: Data Primer, 2019).

Dari gambar di atas perlakuan yang menunjukkan pengaruh terbaik setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) yang merupakan kontrol positif adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 3,07. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) di sajikan pada lampiran 8. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan lebar daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang

memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil uji BNT dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Hasil uji BNT lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.


No.	Perlakuan	Rata-rata lebar daun
1	P0	0,47 _f
2	P1	3,07 _b
3	P2	2,10 _c
4	P3	1,87 _{cd}
5	P4	1,70 _d
6	P5	1,22 _e
7	P6	3,80 _a

keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Dari tabel di atas hasil uji BNT diketahui bahwa perlakuan yang menunjukkan rata-rata pertambahan lebar daun tertinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 3,07. Sedangkan perlakuan yang menunjukkan pengaruh paling rendah setelah P0 yang merupakan kontrol negatif adalah P5 (50 gm ampas kopi) yaitu dengan rata-rata lebar daun 1,22.

Adapun rata-rata pertambahan lebar daun (cm) tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) disajikan pada gambar 4.6. Dari gambar tersebut perlakuan yang menunjukkan rata-rata pertambahan lebar daun tertinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) yang merupakan kontrol positif adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix).



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.6. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) (Sumber: Data Primer, 2019).

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) yang di sajikan pada lampiran 19. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan lebar daun pada tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan lebar daun dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST).

No.	Perlakuan	Rata-rata lebar daun
1	P0	0,00 _e
2	P1	0,55 _b
3	P2	0,25 _c
4	P3	0,25 _c
5	P4	0,22 _c
6	P5	0,12 _d
8	P6	1,02 _a

keterangan


- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Dari tabel di atas perlakuan yang menunjukkan rata-rata paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 0,55.

3. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Tinggi Tanaman (cm)

Adapun hasil dari pengamatan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah masa pertumbuhan 4 MST dengan menggunakan beberapa perlakuan dan berbagai konsentrasi ampas kopi dapat dilihat pada gambar 4.7.

Dari gambar 4.7 berikut menunjukkan bahwa perlakuan yang pengaruh paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 11,27. Sedangkan perlakuan yang memberikan pengaruh terendah setelah P0 yang memberikan pengaruh terendah adalah P5 (50 gr ampas kopi) yaitu dengan rata-rata 3,55.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.7. Tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) 4 MST (Sumber: Data Primer, 2019).

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) di sajikan pada lampiran 10. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor L.*) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil uji BNT dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7. Hasil uji BNT tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

No.	Perlakuan	Rata-rata tinggi tanaman
1	P0	2,32 _f
2	P1	11,27 _b
3	P2	6,92 _c
4	P3	5,37 _d
5	P4	4,62 _d
6	P5	3,52 _e
7	P6	13,12 _a


keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%

Dari tabel di atas perlakuan yang menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi tanaman yang paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) yang merupakan kontrol positif adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 11,27. Sedangkan perlakuan yang memberi pengaruh paling rendah setelah P0 yang merupakan kontrol negatif adalah P5 (50 gr ampas kopi) dengan rata-rata 3,52.

Adapun rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-I (2 MST- 1 MST), ke-II (3 MST- 2 MST), dan ke- III (4 MST- 3 MST) yang disajikan pada gambar 4.8.

Pada gambar 4.8 berikut diketahui bahwa perlakuan yang menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi tanaman paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 3,32, sedangkan perlakuan yang menunjukkan pengaruh paling rendah setelah P0 yang merupakan kontrol negatif adalah P5 (50 ampas kopi) dengan rata-rata tinggi tanaman yaitu 2,07.



Keterangan

P0 = 3 L air

P1 = 3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3 L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P3 = 3 L air + 30 gr ampas kopi + 20 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.8. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) (Sumber: Data Primer, 2019).

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) di sajikan pada lampiran 21. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan tinggi tanaman dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke III (4 MST- 3 MST).

No.	Perlakuan	Rata-rata tinggi tanaman
1	P0	0,00 _d
2	P1	2,07 _b
3	P2	0,75 _c
4	P3	0,27 _d
5	P4	0,22 _d
6	P5	0,15 _d
7	P6	3,12 _a

keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%


Dari tabel di atas perlakuan yang menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi tanaman yang paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 2,07. Sedangkan perlakuan yang memberi pengaruh paling rendah setelah P0 adalah P5 (50 gr ampas kopi) dengan rata-rata pertambahan tinggi tanaman yaitu 0,15.

4. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Panjang Akar (cm)

Adapun hasil dari pengamatan panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah masa pertumbuhan 4 MST dengan menggunakan beberapa perlakuan dan berbagai konsentrasi ampas kopi dapat dilihat pada grafik 4.9.

Dari gambar grafik 4.9 berikut perlakuan yang menunjukkan pengaruh paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 14. Sedangkan perlakuan yang memberi pengaruh

paling rendah setelah P0 yang merupakan kontrol negatif adalah P5 (50 gr ampas kopi) dengan rata-rata panjang akar yaitu 3.



Keterangan

P0 = 3L air

P1 = 3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix

P2 = 3L air + 20 gr ampas kopi + 30 ml AB mix

P4 = 3 L air + 40 gr ampas kopi + 10 ml AB mix

P5 = 3 L air + 50 gr ampas kopi

P6 = 3 L air + 50 ml AB mix

Gambar 4.9. Panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) pada 4 MST (Sumber: Data Primer, 2019).

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analisis of Varians*) di sajikan pada lampiran 12. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada setiap perlakuan terhadap panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu untuk mengetahui perlakuan manakah yang memberi pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf signifikan 5%. Hasil dari uji BNT pada pertambahan panjang akar dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang akar tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

No.	Perlakuan	Rata-rata panjang akar
1	P0	2,50 _c
2	P1	14,00 _a
3	P2	8,50 _b
4	P3	4,75 _c
5	P4	3,55 _c
6	P5	3,00 _c
7	P6	15,72 _a

keterangan

- Angka yang diikuti dengan huruf kecil yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%.

Dari tabel di atas perlakuan yang menunjukkan rata-rata panjang akar yang paling tinggi setelah P6 (3 L air + 50 ml AB mix) adalah P1 (3 L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) dengan rata-rata 14,00.

B. Pembahasan

Pertumbuhan merupakan suatu proses dalam kehidupan tanaman, dari proses tersebut akan terjadi perubahan ukuran yaitu tanaman akan tumbuh semakin besar dan akan berkolerasi positif dalam menentukan hasil tanaman tersebut secara keseluruhan dikenal oleh sifat genetik disamping faktor-faktor lainnya adalah lingkungan (Agriani, 2010).

Proses pertumbuhan ditandai dengan terbentuknya suatu organ pada tanaman yang mengalami perubahan antara lain terbentuknya daun, batang, biji dan buah. Semua bagian tubuh-tumbuhan yang secara langsung maupun tidak langsung berguna untuk menegakkan kehidupan tumbuhan, yaitu yang terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat (Tjitroseopomo, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penambahan ampas kopi sebagai salah satu sumber nutrisi tumbuhan yang dikombinasikan dengan nutrisi AB mix, menunjukkan hasil yang berbeda-beda dengan semua perlakuan, dimana parameter pertumbuhan yang diukur pada penelitian ini adalah jumlah daun, panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman dan panjang akar yang akan dibahas dibawah ini:

1. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Jumlah Daun (helai)

Adapun hasil pengamatan terhadap jumlah daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah dilakukan uji ANOVA yang menunjukkan bahwa perlakuan memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun. P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix) merupakan perlakuan yang memberi pengaruh terbaik terhadap parameter pengamatan jumlah daun. Hal ini diduga karena unsur hara yang terdapat dalam ampas kopi dan AB mix dalam dosis tersebut mencukupi jumlah unsur hara yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Unsur hara yang berperan penting dalam pertumbuhan daun adalah nitrogen dan fosfor. Seperti pernyataan Latinka (2007) bahwa unsur hara yang mempengaruhi pertumbuhan daun salah satunya adalah unsur hara nitrogen dan fosfor. Kedua unsur hara tersebut terkandung dalam ampas kopi dan nutrisi AB mix.

Menurut Lusito dalam Adikasari (2012) bahwa ampas kopi merupakan pupuk organik yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Ampas kopi mengandung 2,28% nitrogen, fosfor 0,06% dan 0,6 kalium.

Dalam proses pembentukan organ vegetatif daun tanaman membutuhkan unsur hara nitrogen dalam jumlah banyak, karena nitrogen merupakan unsur yang berperan penting dalam membentuk asam amino dan protein sebagai dasar tanaman dalam menyusun daun (Haryanto, 2000).

Ditambahkan Matatula dalam Indriani (2014), apabila jumlah nitrogen lebih banyak dibandingkan dengan unsur hara lainnya, maka tanaman akan menghasilkan protein lebih banyak dan daun akan tumbuh lebih lebar. Atau sebaliknya apabila unsur N yang tersedia cukup dari unsur hara lainnya, maka tanaman akan menghasilkan jumlah lebih banyak dan daunnya yang sangat lebar.

Nitrogen yang terkandung dalam sebelumnya dilakukan pelarutan dibandingkan dengan pemberian limbah kopi padat secara langsung. limbah kopi cukup tersedia jika Nitrogen merupakan unsur penting dalam penyusun klorofil. Selain itu, unsur hara berupa Fosfor yang terdapat dalam limbah kopi berpengaruh dalam diferensiasi sel yang sangat penting dalam pembentukan daun (Surtinah, 2009). Kalium yang terkandung dalam limbah kopi berperan juga dalam proses pembentukan daun, dimana ketersediannya dapat melancarkan proses pembentukan daun Kalium digunakan tanaman untuk aktivasi enzim (Sitompul, 2015).

Kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan daun yang kekuning-kuningan. Hal ini diduga terjadi pada perlakuan yang menunjukkan pengaruh terendah terhadap tanaman uji.

2. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Panjang dan Lebar Daun (cm)

Adapun hasil pengamatan terhadap panjang daun tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah dilakukan uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan memberi pengaruh nyata terhadap panjang dan lebar daun. Adapun perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik pada kedua parameter ini adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix). Hal ini disebabkan karena kombinasi takaran ampas kopi dan AB mix pada perlakuan tersebut mencukupi unsur hara yang dibutuhkan pertumbuhan daun. Kelebihan atau kekurangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh akan berdampak pada tanaman. Apabila dosis dalam jumlah yang berlebihan maka akan berpengaruh pada laju pertumbuhan tanaman dan sebaliknya apabila dosis terlalu rendah maka unsur hara tidak memenuhi kebutuhan tanaman untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Unsur hara yang terdapat dalam ampas kopi dan AB mix yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan bayam hijau (*A. tricolor* L.) salah satunya adalah nitrogen. Selain nitrogen unsur hara yang juga berpengaruh dalam pertumbuhan daun adalah fosfor, dimana apabila tanaman kekurangan fosfor maka pertumbuhan tanaman akan terhambat dan memberi dampak yang buruk.

Menurut Hasibuan (2006) bahwa apabila tanaman mengalami kekurangan nitrogen, tanaman tumbuh lambat dan kerdil. Daunnya berwarna hijau muda. Karena itu nitrogen dibutuhkan dalam jumlah besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, khususnya pembentukan tunas atau perkembangan batang dan daun. Tanpa suplai

nitrogen cukup, pertumbuhan tanaman baik tidak akan terjadi. Kekurangan unsur hara N akan menunjukkan gejala pada tanaman seperti pertumbuhan yang kerdil, pertumbuhan akar terbatas, daun menjadi warna kuning pucat. Seperti yang di jelaskan Karsono (2002) bahwa selain unsur nitrogen, unsur hara yang terkandung didalam nutrisi hidroponik adalah unsur fosfor yang berperan penting pada awal pertumbuhan dan mempercepat perpindahan fase vegetatif ke generatif. Kekurangan unsur fosfor mengakibatkan gejala pertumbuhan lambat.

Fosfor (P) berperan penting dalam transfer energi di dalam sel tanaman. Bila tanaman kekurangan hara P, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, seperti pertumbuhan yang kerdil, hal ini terjadi karena pembelahan sel terganggu (Rosmarkam, 2002).

Pada pertumbuhan daun termasuk jumlah daun, panjang daun dan lebar daun tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara saja melainkan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan salah satunya yaitu tingkat keasaman (pH). Diketahui bahwa pertumbuhan yang baik untuk tanaman bayam adalah pada pH 6 sampai 7.

Menurut Lusito dalam Adikasari (2012), pH ampas kopi sedikit asam, berkisar 6,2 pada skala pH. Ditambahkan oleh Yunus dalam Adikasari (2012) bahwa ampas kopi bersifat asam sehingga menurunkan pH tanah.

Menurut Saparinto (2013), bayam akan tumbuh baik pada pH sekitar 6-7. Bila pH kurang dari 6 maka akan mengurangi kandungan unsur hara yang dapat menyebabkan tanaman akan mudah rebah dan pertumbuhan menjadi terhambat, sementara itu pada pH di atas 7 maka tanaman bayam akan mengalami klorosis. Hal

ini diduga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan daun terhadap perlakuan yang memberi pengaruh rendah pada tanaman uji.

3. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Tinggi Tanaman

Adapun hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) setelah dilakukan uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh nyata. Perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix), hal ini diduga karena kebutuhan unsur hara tanaman tercukupi sehingga dapat di manfaatkan tanaman dalam pertambahan tinggi tanaman. Unsur hara yang berperan dalam pertambahan tinggi tanaman adalah nitrogen. Menurut Yunus dalam Adikasari (2012), ampas kopi mempunyai banyak manfaat, terutama bagi tumbuhan yaitu dapat menambah asupan Nitrogen, Fosfor dan Kalium (NPK) yang dibutuhkan oleh tanaman. Ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena mengandung mineral, karbohidrat, membantu terlepasnya nitrogen sebagai nutrisi tanaman.

Menurut Patti, dkk (2013) menyatakan bahwa nitrogen sangat penting dalam pembentukan klorofil, protoplasma, protein, dan asam nukleat. Nitrogen juga merupakan komponen penyusun auksin, dimana auksin berperan dalam pertumbuhan jaringan meristem apikal yang menyebabkan tanaman bertambah tinggi.

Semakin tinggi konsentrasi ampas kopi yang di berikan menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan tanaman. Pada perlakuan yang memiliki konstrasi ampas kopi yang tinggi, tanaman uji menunjukkan ciri-ciri tumbuh kerdil. Hal ini diduga

terjadi karena semakin tinggi kandungan ampas kopi maka tingkat keasamannya, sehingga menyebabkan tanaman stres. Menurut Tedjaswarana (2012), stres atau cekaman didefinisikan sebagai kondisi lingkungan yang dapat memberi pengaruh buruk pada tumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Stres lingkungan yang dialami oleh tanaman akan mengakibatkan tanaman untuk memperlihatkan perubahan-perubahan pada proses pertumbuhannya. Mulai dari perubahan fisiologi sampai pada perubahan metabolis. Perubahan yang akan terjadi bisa terlihat dengan tanaman tumbuh kerdil, menguning dan bahkan lama-kelamaan akan mati.

4. Pengaruh Variasi Larutan Nutrisi Dengan Penambahan Ampas Kopi Terhadap Panjang Akar

Adapun hasil pengamatan terhadap pertumbuhan panjang akar tanaman bayam (*A. tricolor* L.) setelah dilakukan uji ANOVA menunjukkan bahwa setiap perlakuan memberi pengaruh nyata. Perlakuan yang memberi pengaruh terbaik pada parameter panjang akar adalah P1 (3L air + 10 gr ampas kopi + 40 ml AB mix), hal ini diduga disebabkan karena tercukupinya unsur hara yang dapat dimanfaatkan tanaman dalam pertumbuhan panjang akar. Unsur hara yang terkandung dalam ampas kopi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan akar adalah nitrogen dan fosfor. Menurut Lingga (2002) menyatakan bahwa unsur fosfor bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda.

Nitrogen yang tersedia meningkatkan pertumbuhan jaringan meristem pada ujung akar. Hasil pelarutan limbah kopi juga menyediakan karbohidrat yang

berpengaruh dalam pembelahan jaringan meristem (Hayati, dkk, 2012). Panjang akar menentukan efektivitas akar dalam menjalankan fungsinya dimana panjang akar menentukan luas permukaan akar (Ginting, 2010).

Akar merupakan organ tanaman yang memiliki peranan penting yakni menyerap unsur hara, walaupun unsur hara tersedia dalam jumlah yang banyak akan tetapi pertumbuhan akar terganggu maka akar tidak akan optimal untuk menyerap unsur hara tersebut sehingga proses metabolisme pada tanaman akan terganggu. Seperti yang diungkapkan Fahrudin (2009) bahwa apabila perakaran baik maka pertumbuhan bagian tanaman yang lain akan berkembang baik pula, karena akar dapat menyerap unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Menurut penelitian Putri (2017) menyatakan bahwa perlakuan limbah padat ampas kopi memberikan rerata pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan limbah cair untuk beberapa parameter. Hal ini disebabkan rasio C/N dalam limbah kopi tinggi yaitu sekitar 40. Menurut Mellawati (2002), apabila kadar C/N dalam media tinggi maka proses penguraian karbon (C) tidak sempurna dan membutuhkan waktu yang lebih lama hingga kadar C/N menurun dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, kandungan toksin yang menghambat pertumbuhan seperti tanin dan asam *chlorogenic* yang terkandung dalam limbah padat cukup tinggi. Pada limbah cair, konsentrasi taninnya cenderung lebih rendah karena telah larut bersama air. Menurut Muthukumar, et.al (1985), tanin dapat menurunkan kapasitas oksidasi *alphanaphtylamine* di akar dan menghambat

pertumbuhan akar dan batang. Tanin akan menghambat pertumbuhan dengan cara melukai akar yang mengakibatkan tanaman menjadi kerdil.

Hal ini diduga terjadi terhadap tanaman uji karena dilihat dari takaran ampas kopi pada setiap perlakuan, semakin tinggi kandungan ampas kopi maka semakin menurun pula rata-rata pertumbuhan tanaman uji. Semakin banyak ampas kopi maka semakin sedikit kemungkinan ampas kopi akan larut pada air sehingga mengakibatkan konsentrasi taninnya akan semakin tinggi, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman uji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variasi larutan nutrisi dengan penambahan ampas kopi memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) pada semua parameter yaitu jumlah daun (helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), tinggi tanaman (cm), dan panjang akar (cm).
2. Perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap kelima parameter adalah P1 (10 gr ampas kopi + 40 mL AB mix), jumlah daun dengan rata-rata 7,75, panjang daun dengan rata-rata 4,15, lebar daun dengan rata-rata 3,07, tinggi tanaman dengan rata-rata 11,07, dan panjang akar dengan rata-rata 14.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan untuk melakukan uji pendahuluan untuk menentukan perlakuan yang dapat memberi pengaruh, memerhatikan intensitas cahaya yang mengenai tanaman, melakukan pengukuran pH, lebih mengontrol nutrisi pada tanaman, pengulangan menggunakan wadah yang berbeda, serta melakukan pencegahan untuk menghindari serangga yang dapat merusak tanaman.

KEPUSTAKAAN

- Adikasari, R. 2012. *Pemanfaatan Ampas Teh Dan Ampas Kopi Sebagai Penambah Nutrisi Pada Pertumbuhan Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum) Dengan Media Hidroponik* (Skripsi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aisyah, 2013. Kegunaan Ampas Kopi Bagi Kebun dan Tanaman (Online), [Http://Aisyah.co.id/2013/10/kegunaan-ampas-kopi-bagi-kebun-dan-tanaman](http://Aisyah.co.id/2013/10/kegunaan-ampas-kopi-bagi-kebun-dan-tanaman), diakses tanggal 26 Juli 2019.
- Aksa, M. dkk. Rekayasa Media Tanam Pada Sistem Penanaman Hidroponik Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Sayuran. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*. 2 (2016): 163-168.
- Fahrudin, F. *Budidaya Caisim (Brassicca juncea L.) Menggunakan Ekstrak The dan Pupuk Kascing*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Fairuz, 2014. Pupuk dan Cara Pemupukan. *Jurnal Pertanian*. (Online), <http://ejournal.unesa.ac.id/articie/17105//33/article.pdf>. diakses tanggal 26 Juli 2019
- Fauzan, A. 2015. *Tumbuh-Tumbuhan Dan Buah-Buahan Dalam Al-Quran* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ginting, C. Kajian Biologi Tanaman Selada dalam Berbagai Kondisi Lingkungan pada Sistem Hidroponik. *Agriplus*. 20 No.2 (2010): 107-113.
- Haryanto, dkk. *Sawi dan Salada*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2000.
- Hasibuan, B.E. *Ilmu Tanah*. Medan: FP USU, 2006.
- Hayati, E. Sabarrudin & Rahmawati. Pengaruh Jumlah Mata Tunas dan Komposisi Media Tanam terhadap Pertumbuhan Setek Tanaman Jarak Pagar. *Jurnal Agrista*. 16 No. 3 (2012): 129-134.
- Hussain, A. Jaffar. *Botany*. Chennai: Tamilnadu, 2007.
- Indriani Y H, Prihantoro H. *Hidroponik Sayuran Semusim Untuk Hobi dan Bisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.

- Juliati. 2018. *Pengaruh Pemberian Ampas Teh Dan Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat (*Lycopersicum Esculentum* Mill) Dengan Media Hidroponik* (Skripsi). Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Juwita, R. 2010. *Pertumbuhan dan Nilai Gizi Bayam Cabut (*Amaranthus tricolor* L.) Dengan Pemberian Pupuk Fosfor dan Urin Sapi* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Karsono. Sudiby, dkk. *Hidroponik Skala Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Argo Media Pustaka, 2002.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2012.
- Lajnah Pentashuhan Mushaf Al-Qur'an Badan Libang & Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Tafsir Ilmi (Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*. Jakarta: Lajnah Pentashuhan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Lajnah Pentashuhan Mushaf Al-Qur'an Badan Libang & Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Pelestarian Lingkungan Hidup)*. Jakarta: Lajnah Pentashuhan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Lakitan, B. *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Laksono, R. A. Sugiono D. Karakteristik Agronomis Tanaman Kailan (*Brassica oleraceae* L. var. *acephala* DC.) Kultivar Full White 921 Akibat Jenis Media Tanam Organik dan Nilai EC (*Electrical Conductivity*) pada Hidroponik Sistem Wick. *Jurnal Agrotek Indonesia*. 2 No. 1 (2017) hal: 25-33.
- Lingga, P dan Marsono. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2002.
- Najiyati dan Danarti. *Kopi Budidaya dan Penanganan Lepas Panen Edisi Revisi*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Natalia, C. dkk. Perancangan Interior Fasilitas Edukasi Hidroponik Di Surabaya. *Jurnal Intra*. 5 No. 2 (2017) Hal.97-106.
- Nugraha, R. U. Susila, A. D. Sumber Sebagai Hara Pengganti AB mix pada Budidaya Sayuran Daun Secara Hidroponik. *J. Hort. Indonesia*. 6 No. 1 (April 2015) hal: 11-19.


- Panggabean, E. *Buku Pintar Kopi*. Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka, 2011.
- Patti, P.S. Kaya, E. & Silahooy, C. Analisis Status Nitrogen Tanah dalam Kaitannya dengan serapan N oleh Tanaman Padi Sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Agrologia*. 2 No.1 (2013): 51-58.
- Pranggono B. *Mukjizat Sains Dalam Al-Qur'an Menggali Inspirasi Ilmiah Cetakan V*. Bandung: Islami Ide, 2008.
- Puspa, D. K. 2017. *Pengaruh Sistem Budidaya Organik Dan Hidroponik Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 'Brebes Di Rumah Kaca (Skripsi)*. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Putri, A. H. 2017. *Pengaruh Berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair (Poc) Urin Sapi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Hijau (Amaranthus tricolor L.) (Skripsi)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Putri, N. D., Hastuti, E. D., dan Budihastuti, R. Pengaruh Pemberian Ampas kopi terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada (*Lactuca sativa L.*). *Jurnal Biologi*. 6 No. 4 (Oktober 2017): hal. 41-50.
- Rahardjo, P. *Kopi Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Penebar Swadaya: Jakarta, 2012.
- Risnawati, B. *Pengaruh Penambahan Serbuk Sabut Kelapa (Cocopeat) Pada Media Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (Brassica Juncea L.) Secara Hidroponik (Skripsi)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Roidah, I. S. Pemanfaatan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Hidroponik. *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*. 1.No.2 (2014): hal. 43-50.
- Rosmarkam A. Yuwono N.A. *Ilmu Kesuburan Tanah*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Rosniawaty, S., dkk. Pemanfaatan limbah organik sebagai media tanam dan aplikasi urin ternak pada pembibitan kopi (*Coffe Arabica L.*). *Jurnal Kultivasi*. 16 No. 1 (Maret 2017): hal. 287-292.
- Rukmana, R. *Bayam*. Jakarta Penebar: Swadaya, 2010.

- Rukmana, R. *Bertanam Petsai dan Dawi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Sani, B. *Hidroponik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Saparinto, C. *Grow Your Own Vegetables-Panduan Praktis Menanam 14 Sayuran Komsumsi Populer Di Pekarangan*. Yogyakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Setiawati T. Rahmawati F. dan Supriatun T. Pertumbuhan Tanaman Bayam Cabut (*Amaranthus tricolor* L.) dengan Aplikasi Pupuk Organik Kascing dan Mulsa Serasah Daun Bambu. *Jurnal Ilmu Dasar*. 19 No. 1 (Januari 2018): hal. 37-44.
- Shihab, M.Q. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera hati, 2011.
- Siregar J. dkk. Pengujian Beberapa Nutrisi Hidroponik Pada Selada (*Lactuca sativa* L.) Dengan Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) Termodifikasi. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*. 4 No. 1 (2015) hal.65-72.
- Steenis, V. C.G.G.J. dkk. *Flora*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Sudibyjo, K. *Panduan Cara Hidroponik Sederhana*. Bogor: Parung Farm, 2013.
- Sunardjono, H. *Bertanam 30 Jenis Sayur*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Surtinah. Pemberian Pupuk Organik Super Natural Nutrition (SNN) pada Tanaman Selada (*Lactuca sativa* L.) di Tanah Ultisol. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 6 No. 1 (2009): 20-25.
- Susianah. *Pemisahan Senyawa Organik*. Bandung: ITB, 2012.
- Sutejo, M. Mulyani. *Pupuk dan cara pemupukan*. Jakarta: Rineke cipta, 2002.
- Tafajani, H. *Panduan Komplit Bertanam Sayur dan Buah-buahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011.
- Tedjasawana, R. Cara aplikasi dan takaran pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi krisan balai penelitian tanaman hias. *Jurnal hortikultura*. 21 No. 4 (2011): 306-314.
- Tjitrosoepomo G. *Morfologi tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.


Tualeka, M.W.N. Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam. *Progresiva*. 5 No. 1 (Desember 201) Hal. 131-140.

Utami, K. 2016. *Laju Pertumbuhan Bayam Merah (Alternanthera amoena voss) Secara Hidroponik Dengan Konsentrasi Nutrisi Dan Media Tanam Yang Berbeda* (Skipti). Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Lampiran 1. Diagram alir persiapan hidroponik



Lampiran 2. Pembuatan nutrisi dan pengukuran pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.).



Lampiran 3. Tabel pengamatan pertumbuhan tanaman bayam hijau (*Amranthus tricolor* L.) yaitu jumlah daun(helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm) dari 1 MST sampai 4 MST

1. Pertambahan jumlah daun

a. Minggu ke-1

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	4	4	4	4	16	4
2	P ₁	4	4	4	4	16	4
3	P ₂	4	4	4	4	16	4
4	P ₃	4	4	4	4	16	4
5	P ₄	4	4	4	4	16	4
6	P ₅	3	4	3	3	13	3,25
7	P ₆	4	4	4	4	16	4

b. Minggu ke-2

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	4	4	4	4	16	4
2	P ₁	6	5	5	5	21	5,25
3	P ₂	5	4	6	5	20	5
4	P ₃	5	5	5	6	21	5,25
5	P ₄	5	5	5	5	20	5
6	P ₅	4	5	4	4	17	4,25
7	P ₆	6	6	5	6	23	5,7

c. Minggu ke-3

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	4	4	4	4	16	4
2	P ₁	7	6	6	6	25	6,25
3	P ₂	6	5	7	6	24	6
4	P ₃	6	6	6	6	24	6
5	P ₄	6	6	6	6	24	6
6	P ₅	5	6	5	5	21	5,25
7	P ₆	7	7	6	7	27	6,75

d. Minggu ke-4

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	4	4	4	4	16	4
2	P ₁	9	8	7	7	31	7,75
3	P ₂	8	7	8	7	30	7,5
4	P ₃	7	7	7	7	28	7
5	P ₄	7	7	7	7	28	7
6	P ₅	6	6	6	6	24	6
7	P ₆	9	9	7	8	33	8,25

2. Pertambahan panjang daun

a. Minggu ke-1

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,7	0,7	0,6	0,8	2,8	0,7
2	P ₁	1,8	1,7	1,5	1,5	6,5	1,65
3	P ₂	1,6	1,2	1,4	1,2	5,4	1,35
4	P ₃	1,2	1,2	1,3	1,4	5,1	1,27
5	P ₄	1,2	1,5	1,2	0,8	4,7	1,17
6	P ₅	0,7	1	0,8	0,5	3	0,75
7	P ₆	1,9	1,7	1,7	1,6	6,9	1,72

b. Minggu ke-2

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,8	0,8	0,7	0,9	3,2	0,8
2	P ₁	2,8	2,4	2,1	2,3	9,6	2,4
3	P ₂	2,1	1,8	1,9	1,7	7,5	1,87
4	P ₃	1,8	1,7	1,8	1,9	7,2	1,8
5	P ₄	1,5	1,7	1,4	1,2	5,8	1,45
6	P ₅	1	1,2	1	0,7	3,9	0,97
7	P ₆	2,9	2,6	2,3	2,3	10,1	2,52

c. Minggu ke-3

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,8	0,8	0,7	0,9	3,2	0,8
2	P ₁	3,6	3,3	3,2	3,4	13,5	3,37
3	P ₂	3,1	2,7	2,9	2,6	11,3	2,82
4	P ₃	2,7	2,6	2,7	2,9	10,9	2,72
5	P ₄	2,5	2,6	2,3	1,9	9,3	2,32
6	P ₅	1,3	1,7	1,3	1,1	5,4	1,35
7	P ₆	3,8	3,7	3,6	3,6	14,7	3,67

d. Minggu ke-4

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,8	0,8	0,7	0,9	3,2	0,8
2	P ₁	4,7	3,9	3,9	4,1	16,6	4,15
3	P ₂	3,7	3,2	3,2	3,1	13,2	3,3
4	P ₃	3,1	2,9	3,1	3,2	12,3	3,07
5	P ₄	2,8	2,9	2,6	2,4	10,7	2,67
6	P ₅	1,6	2	1,5	1,3	6,4	1,6
7	P ₆	4,9	4,5	4,6	4,6	18,6	4,65

3. Pertambahan lebar daun

a. Minggu ke-1

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,5	0,3	0,3	0,4	1,5	0,37
2	P ₁	1,3	1,2	1,1	1,2	4,8	1,2
3	P ₂	1,4	1	1,1	1,2	4,7	1,17
4	P ₃	1,1	1	1,2	1,3	4,6	1,15
5	P ₄	1,1	1,2	1,2	1	4,5	1,12
6	P ₅	0,7	0,8	1,1	0,6	3,2	0,8
7	P ₆	1,3	1,2	1,2	1,3	5	1,25

b. Minggu ke-2

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,6	0,4	0,4	0,5	1,9	0,47
2	P ₁	1,7	1,5	1,4	1,6	6,2	1,55
3	P ₂	1,7	1,2	1,3	1,4	5,6	1,4
4	P ₃	1,3	1,2	1,4	1,5	5,4	1,35
5	P ₄	1,3	1,4	1,2	1,2	5,1	1,27
6	P ₅	0,8	0,9	1,2	0,8	3,7	0,92
7	P ₆	1,9	1,6	1,8	1,8	7,1	1,77

c. Minggu ke-3

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,6	0,4	0,4	0,5	1,9	0,47
2	P ₁	2,8	2,5	2,3	2,5	10,1	2,52
3	P ₂	2,3	1,6	1,8	1,7	7,4	1,85
4	P ₃	1,6	1,4	1,7	1,6	6,3	1,57
5	P ₄	1,5	1,6	1,4	1,4	5,9	1,47
6	P ₅	1	1,1	1,3	1	4,4	1,1
7	P ₆	3,1	2,6	2,7	2,7	11,1	2,77

d. Minggu ke-4

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,6	0,4	0,4	0,5	1,9	0,47
2	P ₁	3,3	3,1	2,9	3	12,3	3,07
3	P ₂	2,6	1,9	2	1,9	8,4	2,1
4	P ₃	1,8	1,6	2	1,9	7,5	1,87
5	P ₄	1,7	1,8	1,6	1,7	6,8	1,7
6	P ₅	1,1	1,2	1,4	1,2	4,9	1,22
7	P ₆	4	3,7	3,8	3,7	15,2	3,8

4. Tinggi tanaman

a. Minggu ke-1

No	Perlakuan (P)	Tinggi tanaman pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	2,1	2,2	2,3	2,1	8,7	2,17
2	P ₁	5	4,7	4,3	4,2	18,2	4,55
3	P ₂	4,7	4,3	4,2	3,6	16,8	4,2
4	P ₃	3,9	3,6	4	4,3	15,8	3,95
5	P ₄	3	4	3	3,9	13,9	3,47
6	P ₅	3	3,3	2,3	3,5	12,1	3,02
7	P ₆	4,9	4,8	4,2	4,5	18,4	4,6

b. Minggu ke-2

No	Perlakuan (P)	Tinggi tanaman pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	2,2	2,4	2,5	2,2	9,3	2,32
2	P ₁	8	8,2	7,7	7,6	31,5	7,87
3	P ₂	6,7	5,2	5,6	4,5	22	5,5
4	P ₃	4,5	4,1	4,5	4,9	18	4,5
5	P ₄	3,5	4,7	3,2	4,1	15,5	3,87
6	P ₅	3,1	3,4	2,5	3,7	12,7	3,17
7	P ₆	8,3	8,2	8	8,1	32,6	8,15

c. Minggu ke-3

No	Perlakuan (P)	Tinggi tanaman pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	2,2	2,4	2,5	2,2	9,3	2,32
2	P ₁	9,5	9,3	8,9	9,1	36,8	9,2
3	P ₂	7,5	5,9	6,1	5,2	24,7	6,17
4	P ₃	5,1	4,9	5	5,5	20,5	5,12
5	P ₄	4,1	5,1	3,9	4,5	17,6	4,4
6	P ₅	3,3	3,5	2,7	4	13,5	3,37
7	P ₆	10,1	10	9,8	10,1	40	10

d. Minggu ke-4

No	Perlakuan (P)	Tinggi tanaman pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	2,2	2,4	2,5	2,2	9,3	2,32
2	P ₁	11,6	11,3	11	11,2	45,1	11,27
3	P ₂	9	6,4	6,4	5,9	27,7	6,92
4	P ₃	5,3	5,3	5,3	5,7	21,5	5,37
5	P ₄	4,3	5,2	4,3	4,7	18,5	4,62
6	P ₅	3,5	3,6	2,9	4,1	14,1	3,55
7	P ₆	13,3	13,1	12,9	13,2	52,5	13,12

5. Panjang akar

No	Perlakuan (P)	panjang pada ulangan				Total	Rata-rata (gr)
		1	2	3	4		
1	P ₀	2,5	2,5	2,5	2,5	10	2,5
2	P ₁	16,5	10	16,5	13	56	14
3	P ₂	9	7	9,5	8,5	34	8,5
4	P ₃	6	3	7	3	19	4,7
5	P ₄	4	3,2	4	3	14,2	3,55
6	P ₅	3	3	3	3	12	3
7	P ₆	16,9	13,4	15,9	16,7	62,9	15,7

Lampiran 4. Hasil uji ANOVA jumlah daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.**ANOVA**

Dependent Variable: Jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	48.214 ^a	6	8.036	25.962	.000
Intercept	1289.286	1	1289.286	4165.385	.000
Perlakuan	48.214	6	8.036	25.962	.000
Error	6.500	21	.310		
Total	1344.000	28			
Corrected Total	54.714	27			

a. R Squared = .881 (Adjusted R Squared = .847)

Lampiran 5. Hasil uji BNT jumlah daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

		Jumlah					
		Perlakuan	N	Subset			
				1	2	3	4
Duncan ^{a,b}	1		4	4.00			
	6		4		6.00		
	4		4			7.00	
	5		4			7.00	
	3		4			7.50	7.50
	2		4			7.75	7.75
	7		4				8.25
	Sig.				1.000	1.000	.094

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .310.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

Lampiran 6. Hasil uji ANOVA panjang daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

ANOVA

Dependent Variable: Jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	43.864 ^a	6	7.311	126.356	.000
Intercept	234.321	1	234.321	4050.000	.000
Perlakuan	43.864	6	7.311	126.356	.000
Error	1.215	21	.058		
Total	279.400	28			
Corrected Total	45.079	27			

a. R Squared = .973 (Adjusted R Squared = .965)

Lampiran 7. Hasil uji BNT panjang daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

		Jumlah						
		Subset						
	Perlakuan	N	1	2	3	4	5	6
Duncan ^{a,b}	1	4	.800					
	6	4		1.600				
	5	4			2.675			
	4	4				3.075		
	3	4				3.300		
	2	4					4.1500	
	7	4						4.650
	Sig.			1.000	1.000	1.000	.200	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .058.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

Lampiran 8. Hasil uji ANOVA lebar daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

ANOVA

Dependent Variable: Jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	29.714 ^a	6	4.952	170.492	.000
Intercept	116.036	1	116.036	3994.672	.000
Perlakuan	29.714	6	4.952	170.492	.000
Error	.610	21	.029		
Total	146.360	28			
Corrected Total	30.324	27			

a. R Squared = .980 (Adjusted R Squared = .974)

Lampiran 9. Hasil uji BNT lebar daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

		Jumlah						
		Subset						
	Perlakuan	N	1	2	3	4	5	6
Duncan ^{a,b}	1	4	.475					
	6	4		1.225				
	5	4			1.700			
	4	4			1.875	1.875		
	3	4				2.100		
	2	4					3.075	
	7	4						3.800
	Sig.			1.000	1.000	.161	.076	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .029.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

Lampiran 10. Hasil uji ANOVA tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

ANOVA

Dependent Variable: Jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	390.134 ^a	6	65.022	177.969	.000
Intercept	1271.703	1	1271.703	3480.713	.000
Perlakuan	390.134	6	65.022	177.969	.000
Error	7.673	21	.365		
Total	1669.510	28			
Corrected Total	397.807	27			

a. R Squared = .981 (Adjusted R Squared = .975)

Lampiran 11. Hasil uji BNT tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

		Jumlah						
		Subset						
	Perlakuan	N	1	2	3	4	5	6
Duncan ^{a,b}	1	4	2.325					
	6	4		3.525				
	5	4			4.625			
	4	4			5.375			
	3	4				6.925		
	2	4					11.275	
	7	4						13.125
	Sig.			1.000	1.000	.094	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .365.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

Lampiran 12. Hasil uji ANOVA panjang akar bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.**ANOVA**

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	717,134 ^a	6	119,522	46,184	,000
Intercept	1546,629	1	1546,629	597,621	,000
Perlakuan	717,134	6	119,522	46,184	,000
Error	54,348	21	2,588		
Total	2318,110	28			
Corrected Total	771,481	27			

a. R Squared = ,930 (Adjusted R Squared = ,909)

Lampiran 13. Hasil uji BNT panjang akar bayam hijau (*A. tricolor* L.) 4 MST.

		Jumlah			
			Subset		
	perlakuan	N	1	2	3
Duncan ^{a,b}	1	4	2,500		
	6	4	3,000		
	5	4	3,550		
	4	4	4,750		
	3	4		8,500	
	2	4			14,000
	7	4			15,725
	Sig.			,083	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 2,588.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

Lampiran 14. Tabel rata-rata pertumbuhan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) yaitu jumlah daun(helai), panjang daun (cm), lebar daun (cm), tinggi tanaman (cm) dan panjang akar (cm).

1. Jumlah daun

a. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam I (2 MST – 1 MST)

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	2	1	1	1	5	1,25
3	P ₂	1	0	2	1	4	1
4	P ₃	1	1	1	2	5	1,25
5	P ₄	1	1	1	1	4	1
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	2	2	1	2	7	1,75

b. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam II (3 MST – 2 MST)

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	1	1	1	1	4	1
3	P ₂	1	1	1	1	4	1
4	P ₃	1	1	1	0	3	0,75
5	P ₄	1	1	1	1	4	1
6	P ₅	1	1	1	1	4	1
7	P ₆	1	1	1	1	4	1

c. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman bayam III (4 MST – 3 MST)

No	Perlakuan (P)	Jumlah helaian daun pada ulangan				Total	Rata-rata (helai)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	2	2	1	1	6	1,5
3	P ₂	2	2	1	1	6	1,5
4	P ₃	1	1	1	1	4	1
5	P ₄	1	1	1	1	4	1
6	P ₅	1	0	1	1	3	0,75
7	P ₆	2	2	1	1	6	1,5

2. Panjang daun

a. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam I (2 MST – 1 MST)

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,10
2	P ₁	1	0,7	0,6	0,8	3,1	0,88
3	P ₂	0,5	0,6	0,5	0,5	2,1	0,52
4	P ₃	0,6	0,5	0,5	0,5	2,1	0,52
5	P ₄	0,3	0,2	0,2	0,4	1,1	0,27
6	P ₅	0,3	0,2	0,2	0,2	0,9	0,22
7	P ₆	1	0,9	0,6	0,7	3,2	0,80

b. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam II (3 MST – 2 MST)

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	0,8	0,9	1,1	1,1	3,9	0,97
3	P ₂	1	0,9	1	0,9	3,8	0,50
4	P ₃	0,9	0,9	0,9	1	3,7	0,92
5	P ₄	1	0,9	0,9	0,7	3,5	0,87
6	P ₅	0,3	0,5	0,3	0,4	1,5	0,37
7	P ₆	0,9	1,1	1,3	1,3	4,6	1,15

c. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman bayam III (4 MST – 3 MST)

No	Perlakuan (P)	Panjang daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	1,1	0,6	0,7	0,7	3,1	0,77
3	P ₂	0,6	0,5	0,3	0,5	1,9	0,47
4	P ₃	0,4	0,3	0,4	0,3	1,4	0,35
5	P ₄	0,3	0,3	0,3	0,5	1,4	0,35
6	P ₅	0,3	0,3	0,2	0,2	1	0,25
7	P ₆	1,1	0,8	1	1	3,9	0,97

3. Lebar daun

a. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam I (2 MST – 1 MST)

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,10
2	P ₁	0,4	0,3	0,3	0,4	1,4	0,35
3	P ₂	0,3	0,2	0,2	0,2	0,9	0,22
4	P ₃	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,20
5	P ₄	0,2	0,2	0	0,2	0,6	0,15
6	P ₅	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,12
7	P ₆	0,6	0,4	0,6	0,5	2,1	0,52

b. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam II (3 MST – 2 MST)

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	1,1	1	0,9	0,9	3,9	0,97
3	P ₂	0,6	0,4	0,5	0,3	1,8	0,45
4	P ₃	0,3	0,2	0,3	0,1	0,9	0,22
5	P ₄	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,20
6	P ₅	0,2	0,2	0,1	0,2	0,7	0,17
7	P ₆	1,2	1	0,9	0,9	4	1

c. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman bayam III (4 MST – 3 MST)

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	0,5	0,6	0,6	0,5	2,2	0,55
3	P ₂	0,3	0,3	0,2	0,2	1	0,25
4	P ₃	0,2	0,2	0,3	0,3	1	0,25
5	P ₄	0,2	0,2	0,2	0,3	0,9	0,22
6	P ₅	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,12
7	P ₆	0,9	1,1	1,1	1	4,1	1,02

4. Tinggi tanaman

a. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam I (2 MST – 1 MST)

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0,1	0,2	0,2	0,1	0,6	0,15
2	P ₁	3	3,5	3,4	3,4	13,3	3,32
3	P ₂	2	0,9	1,4	0,9	5,2	1,30
4	P ₃	0,6	0,5	0,5	0,6	2,2	0,55
5	P ₄	0,5	0,7	0,2	0,2	1,6	0,4
6	P ₅	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,15
7	P ₆	3,4	3,4	3,8	3,6	14,2	3,55

b. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman tanaman bayam II (3 MST – 2 MST)

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	1,5	1,1	1,2	1,5	5,3	1,32
3	P ₂	0,8	0,7	0,5	0,7	2,7	0,67
4	P ₃	0,6	0,8	0,5	0,6	2,5	0,62
5	P ₄	0,6	0,4	0,7	0,4	2,1	0,52
6	P ₅	0,2	0,1	0,2	0,3	0,6	0,15
7	P ₆	1,8	1,8	1,8	2	7,4	1,85

c. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman tanaman bayam III (4 MST – 3 MST)

No	Perlakuan (P)	Pertambahan lebar daun pada ulangan				Total	Rata-rata (cm)
		1	2	3	4		
1	P ₀	0	0	0	0	0	0
2	P ₁	2,1	2	2,1	2,1	8,3	2,07
3	P ₂	1,5	0,5	0,3	0,7	3	0,75
4	P ₃	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	0,27
5	P ₄	0,2	0,1	0,4	0,2	0,9	0,22
6	P ₅	0,2	0,1	0,2	0,1	0,6	0,15
7	P ₆	3,2	3,1	3,1	3,1	12,5	3,12

Lampiran 15. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan jumlah daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	7,214 ^a	6	1,202	6,733	,000
Intercept	30,036	1	30,036	168,200	,000
Perlakuan	7,214	6	1,202	6,733	,000
Error	3,750	21	,179		
Total	41,000	28			
Corrected Total	10,964	27			

a. R Squared = ,658 (Adjusted R Squared = ,560)

Lampiran 16. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan jumlah daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

HASIL					
	perlakuan	N	Subset		
			1	2	3
Duncan ^{a,b}	1	4	,00		
	6	4		,75	
	4	4		1,00	1,00
	5	4		1,00	1,00
	2	4			1,50
	3	4			1,50
	7	4			1,50
	Sig.			1,000	,439

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,179.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = 0,05.

Lampiran 17. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan panjang daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2,577 ^a	6	,430	30,838	,000
Intercept	5,760	1	5,760	413,564	,000
Perlakuan	2,577	6	,430	30,838	,000
Error	,293	21	,014		
Total	8,630	28			
Corrected Total	2,870	27			

a. R Squared = ,898 (Adjusted R Squared = ,869)

Lampiran 18. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan panjang daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

		Jumlah					
			Subset				
	perlakuan	N	1	2	3	4	5
Duncan ^{a,b}	1	4	,000				
	6	4		,250			
	4	4		,350	,350		
	5	4		,350	,350		
	3	4			,475		
	2	4				,775	
	7	4					,975
	Sig.			1,000	,270	,171	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,014.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = 0,05.

Lampiran 19. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan lebar daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2,817 ^a	6	,470	136,000	,000
Intercept	3,360	1	3,360	973,345	,000
Perlakuan	2,817	6	,470	136,000	,000
Error	,073	21	,003		
Total	6,250	28			
Corrected Total	2,890	27			

a. R Squared = ,975 (Adjusted R Squared = ,968)

Lampiran 20. Hasil uji BNT rata-rata pertambahan lebar daun bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

		HASIL					
		Subset					
	perlakuan	N	1	2	3	4	5
Duncan ^{a,b}	1	4	,000				
	6	4		,125			
	5	4			,225		
	3	4			,250		
	4	4			,250		
	2	4				,550	
	7	4					1,02
	Sig.		1,000	1,000	,577	1,000	1,000
				0			

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = ,003.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

Lampiran 21. Hasil uji ANOVA rata-rata pertambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

ANOVA

Dependent Variable: jumlah

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	34,239 ^a	6	5,706	128,855	,000
Intercept	24,891	1	24,891	562,065	,000
Perlakuan	34,239	6	5,706	128,855	,000
Error	,930	21	,044		
Total	60,060	28			
Corrected Total	35,169	27			

a. R Squared = ,974 (Adjusted R Squared = ,966)

Lampiran 22. Hasil uji BNT rata-rata penambahan tinggi tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) ke-III (4 MST – 3 MST)

		HASIL				
			Subset			
	perlakuan	N	1	2	3	4
Duncan ^{a,b}	1	4	,000			
	6	4	,150			
	5	4	,225			
	4	4	,275			
	3	4		,750		
	2	4			2,075	
	7	4				3,125
	Sig.			,104	1,000	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,044.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

b. Alpha = ,05.

Lampiran 23. Dokumentasi pelaksanaan penelitian

Gambar 1. Alat



Aerator



Neraca analitik



Wadah



Gelas ukur



Net pot



Gelas backer



Mistar



Terminal colokan



Alat tulis



cutter



kamera

Gambar 2. Bahan



Benih tanaman bayam



Nutrisi AB mix



Ampas kopi



Aluminium foil



Rockwool




Styrofoam

Prosedur kerja:


1. Persiapan media tanam



2. Pembibitan



3. Pembuatan larutan




4. Penanaman



5. Pengukuran tanaman



Lampiran 24. Hasil pengamatan tanaman bayam hijau (*A. tricolor* L.) pada 4 MST



RIWAYAT HIDUP



YuliaIndayani. merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan alm.Nurdin dan Hadriah, yang dilahirkan di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Juli 1997. Saya mulai mengenyam pendidikan di SDN 4 Carawali dan menamatkan diri pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2009, saya melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Panca Rijang dan tamat pada tahun 2012, pada tahun yang sama saya kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan berhasil menamatkan sekolah saya pada tahun 2015. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2015. Saya berhasil untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknolgi di Sekolah Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.