

**UJI KONTROL KUALITAS PRODUK NATA DARI
BUAH SRIKAYA (*Annona squamosa*)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

IRMADAMAYANTI
NIM. 60300115076

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmadamayanti
Nim : 60300115076
Tempat/Tgl. Lahir : Lampa Toa, 29 September 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Biologi
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Uji Kontrol Kualitas Produk Nata Dari Buah Srikaya
(Annona Squamosa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelarnya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2019

Penyusun



Irmadamayanti
Nim. 60300115076


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Irmadamayanti**, NIM: 60300115072 mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi judul: "Uji Kontrol Kualitas Produk Nata Dari Buah Srikaya (*Annona Squamosa*)". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Gowa, 29 Agustus 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
Pembimbing I


Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd.
Pembimbing II

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Kontrol Kualitas Produk Nata Dari Buah Srikaya (*Annona Squamosa*)", yang disusun oleh Irmadamayanti, NIM: 60300115076 mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1441 H, dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 29 Agustus 2019

22 Dzulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI

KETUA : Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd

SEKRETARIS : Isna Rasdiana Azis, S.Si., M.Sc.

MUNAQISY I : St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.

MUNAQISY II : Dr. Mujateba Mustafa, M.Ag.

PEMBIMBING I : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.

PEMBIMBING II : Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd.

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd.

NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji atas kehadiran Allah swt. dan salawat serta salam senantiasa di limpahkan kepada Rasulullah saw. yang senantiasa memberi inspirasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Uji Kontrol Kualitas Produk Nata dari Buah Srikaya (*Annona squamosa*)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda **Umar** dan ibunda **Rasdiana** atas doa dan kasih sayang, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak mengenal kata lelah mulai dari awal sampai akhir semoga Allah swt. selalu melindungi keduanya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang berjasa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:

1. Prof. Hamdan Juhannis, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta jajarannya.
2. Prof. Dr. Khalifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin serta jajarannya.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi serta jajarannya.

4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran selama penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd., sebagai pembimbing II dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran selama penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi.
6. St. Aisyah Sijid S.Pd., M.Kes selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran serta masukan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
7. Dr. Mujetaba Mustafa M.Ag selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran serta masukan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
9. Seluruh dosen jurusan Biologi, staf dan karyawan dalam Lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- 10..Sumiati, S.Pdi yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi dalam penyelesaian penulisan skripsi.
11. Keluarga besar baik di Polewali Mandar atas dukungan dan doa yang sepenuh hati untuk kesuksesan dan keberhasilan saya.
- 12.Teman angkatan saya IMPULS kalian adalah saudara-saudara saya, semoga kita bisa wisuda bersama-sama.
- 13.Teman KKNku kecamatan Lemabang Kabupaten Pinrang Angkatan 60, teman poskoku Desa Buttu Sappa atas motivasi dan dukungannya.

Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.Penulis hanya

berdoa kepada Allah swt. agar rahmat dan hidayah-Nya senantiasa terlimpah kepada seluruh pihak. Akhirnya hanya kepada-Nya penulis bertawakal dan mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda.
Aamiin ya robbal alamin.

Makassar, 26 Agustus 2019

Penyusun

IRMADAMAYANTI
603001150176



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB IPENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-28
A. Tinjauan Ayat yang Relevan	11
B. Tinjauan Umum tentang Srikaya (<i>Annona squamosa</i>).....	12
C. Tinjauan Umum tentang Nata	16
D. Tinjauan Umum tentang Uji Organoleptik pada Nata.....	21
E. Tinjauan Umum tentang <i>Acetobacter xylinum</i>	22
F. Tinjauan Umum tentang Kacang hijau(<i>Phaseolus radiatus</i>).....	25
G. Tinjauan Umum tentang Karbohidrat pada Nata	28
H. Tinjauan Umum tentang Lemak Nabati pada Nata	29

I. Tinjauan Umum tentang Protein Pada Nata.....	30
J. Tinjauan Umum tentang Vitamin Pada Nata.....	31
D. Tinjauan Umum tentang Natrium Pada Nata	32
E. Kerangka Pikir	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34-43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Definisi Operasional Variabel.....	34
E. Prosedur Kerja	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Alat dan Bahan.....	41
H. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44-59
A. Hasil Penelitian	44
1. Uji Kandungan Nutrisi Buah Srikaya.....	44
2. Uji Kandungan Nutrisi pada <i>Nata de Srikaya</i>	45
3. Uji Organoleptik pada <i>Nata de Srikaya</i>	46
B. Pembahasan.....	47
1. Uji Kandungan Nutrisi	50
2. Uji Organoleptik pada <i>Nata de Srikaya</i>	55
BAB V PENUTUP.....	60-61
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
KEPUSTAKAAN.....	62-66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67-100
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Syarat Mutu Nata	38
Tabel 4.1.	Uji Kandungan Nutrisi Buah Srikaya.....	41
Tabel 4.3.	Uji Kandungan <i>Nutris Nata de srikaya</i>	43
Tabel 4.4.	Uji Organoleptik Nata de srikaya	46
Tabel 4.5	Rentang Nilai Kesukaan.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Buah Srikaya (<i>Annona squamosa</i>).....	32
Gambar 2.2.	Kacang hijau (<i>Phaseolus radiatus</i>).....	33
Gambar 2.3.	Hasil Uji Kandungan Nutrisi Pada Buah Srikaya.....	37
Gambar 4.1.	Hasil Uji Organoleptik.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Diagram alur sterilisasi alat	66
Lampiran 2.	Diagram alur pembuatan starter	67
Lampiran 3.	Diagram alur pembuatan <i>Nata de srikaya</i>	68
Lampiran 4.	Foto pembuatan Tauge	69
Lampiran 5.	Foto pembuatan Larutan Tauge	70
Lampiran 6.	Foto Pembuatan Starter Nata de coco	70
Lampiran 7.	Proses Pembuatan Nata Buah Srikaya (<i>Annona squamosa</i>)....	71
Lampiran 8.	Foto pengamatan <i>Nata de srikaya</i> dari hari ke 1-14.....	71
Lampiran 9.	Perhitungan Uji kandungan Nutrisi Buah Srikaya	72
Lampiran 10.	Perhitungan Uji Kandungan Nutrisi Nata de srikaya	72
Lampiran 11.	Angket Penelitian Organoleptik	72
Lampiran 12.	Kuisisioner Uji Organoleptik	76
Lampiran 13.	Uji Protein <i>Nata de srikaya</i>	77
Lampiran 14.	Uji Karbohidrat <i>Nata de srikaya</i>	78
Lampiran 15.	Uji Lemak <i>Nata de srikaya</i>	80
Lampiran 16.	Uji Vitamin <i>Nata de srikaya</i>	81
Lampiran 17.	Uji Natrium <i>Nata de srikaya</i>	83

ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Irmadamayanti
NIM : 60300115076
Judul Skripsi : Uji Kontrol Kalitas Nata dari Buah Srikaya (*Annona Squamosa*)

Srikaya (*Annona squamosa*) merupakan salah satu tanaman buah yang istimewa karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap, sehingga baik digunakan sebagai bahan dasar untuk media pertumbuhan bakteri *Acetobacter xylinum*. Media pertumbuhan yang baik akan menghasilkan nata yang berkualitas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat dalam produk nata dari buah srikaya (*Annona Squamosa*) serta untuk mengetahui respon panelis terhadap warna, tekstur, rasa dan aroma dari produk nata dari buah srikaya (*Annona squamosa*). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019 dan lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Balai Besar Laboratorium Makassar. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan nutrisi pada *nata de srikaya* dalam 1 gram dengan kadar karbohidrat sebesar 3,41%, kadar protein sebesar 0,31%, kadar vitamin sebesar 0,004% dan kadar natrium sebesar 0,01%. Tingkat kesukaan panelis terhadap uji organoleptik *nata de srikaya* tidak berbeda jauh dengan kontrol *nata de coco* (warna, aroma, rasa, dan tekstur) masih dalam batas bisa diterima oleh panelis kecuali aroma pada *nata de srikaya* yang kurang disukai oleh panelis.

Kata kunci: *Nata de Srikaya*, *Actobacter xylinum*, kandungan nutrisi, uji organoleptik

ABSTRACT

Name : Irmadamayanti

Student ID Number : 60300115076

Title : Nata Product Control Test for Srikaya Fruit (*Annona Squamosa*)

Srikaya (*Annona squamosa*) is one of the special fruit plants because it has nutritional content such as vitamin C which is very good for fighting free radicals and contains high enough carbohydrates, so it is good to be used as a base for the growth of the bacterium *Acetobacter xylinum*. The purpose of this study was to determine the nutritional content contained in nata products from srikaya fruit (*Annona Squamosa*) and to determine the panelist's response to the color, texture, taste and aroma of nata products from srikaya fruit (*Annona squamosa*). This research was conducted in May-June 2019 and the research location was conducted at the Ecology Laboratory of the Department of Biology and the Faculty of Science and Technology, Alauddin State Islamic University Makassar and Makassar Laboratory Laboratory. The type of this research was a qualitative research with a descriptive research approach. The results of this study indicate that there is nutrient content in *nata de srikaya* in 1gram with carbohydrate content of 3.41%, protein content of 0.31%, vitamin content of 0.004% and sodium content of 0.01%. The level of preference of the panelists on the Nata de srikaya organoleptic test did not differ greatly from the *nata de coco* dick (color, aroma, taste, and texture) was still within the limits acceptable to the panelists except that the scent on nata de srikaya was less favored by the panelists.

Keywords: Srikaya, *Acetobacter xylinum*, nutrient content, organoleptic test

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan berbagai macam ciptaan-Nya yang ada dimuka bumi ini yang masing-masing memiliki manfaat. Tidak ada ciptaan-Nya yang sia-sia. Bahkan jika diperhatikan dari struktur tubuh makhluk tersebut, yang memiliki struktur yang sangat sederhanapun memiliki manfaat yang sangat besar. Seperti contohnya adalah mikroba yaitu bakteri. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri memiliki struktur tubuh yang cukup sederhana akan tetapi jika dikaji dari segi manfaatnya justru memiliki manfaat yang sangat besar, mulai dari segi pemanfaatan pada bidang kedokteran sampai pada bidang industri pangan. Di era modern saat ini kebanyakan masyarakat memanfaatkan hasil pertanian mereka dengan berbagai jenis olahan makanan salah satunya dengan menggunakan mikroorganisme. Kandungan mikroorganisme dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan olahan makanan. Penggunaan mikroorganisme dalam segala bidang pada dasarnya telah Allah gambarkan sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya QS. al-Furqaan/25: 2 yang berbunyi:

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia Telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Departemen Agama RI, 2012).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. berfirman bahwa Dia-lah yang Maha Esa, Maha tunggal, tempat meminta yang tidak memiliki tandingan dan sekutu. Hanya Dia-lah yang mengatur segala urusan dan tidak ada yang dapat mencampuri ataupun menandingi-Nya. Segala sesuatu yang dijadikan Allah swt. diberi-Nya perlengkapan-perengkapan dan persiapan-persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup (Abdullah, 2004).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan berbagai makhluk hidup yang beraneka ragam dari makhluk yang dapat dilihat dengan mata secara langsung ataupun tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung yaitu pada mikroorganisme. Salah satu contoh mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah sesuatu agar lebih bermanfaat lagi. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang begitu besar untuk menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya. Semua yang telah diciptakan-Nya tiada yang sia-sia karena semua ada manfaatnya tergantung manusia bagaimana mengolahnya. Namun, sejauh ini manusia telah menerapkan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan apa yang telah Allah berikan untuk memenuhi dan memperbaiki kebutuhan hidup. Di zaman sekarang telah banyak inovasi baru yang dapat menguntungkan manusia. Salah satu

mikroorganisme yang bermanfaat bagi manusia adalah mikroba yang digunakan dalam pembuatan makanan misalnya pada nata.

Salah satu contoh pengolahan makanan dari mikroorganisme adalah nata. Kata nata berasal dari bahasa Spanyol yang berarti *krim* dalam bahasa latin yaitu “*nature*” yang berarti *terapung*. Nata merupakan produk fermentasi *Acetobacter xylinum* pada substrat yang mengandung gula. Bakteri tersebut menyukai kondisi asam dan memerlukan nitrogen untuk stimulasi aktivitasnya. Glukosa substrat sebagian akan digunakan bakteri untuk aktivitas metabolisme dan sebagian lagi diuraikan menjadi suatu polisakarida yang dikenal dengan istilah extracelluler selulosa yang berbentuk gel. Polisakarida inilah yang dinamakan nata (Astawan, 2004).

Nata juga dikenal sebagai salah satu produk olahan makanan fermentasi yang berbentuk gelatin seperti agar-agar ataupun kolang kaling yang digunakan sebagai bahan pengisi eskrim, pencampur fruit coctail, dan *youghurt*. Nata ada yang berwarna putih hingga abu-abu muda dan teksturnya kenyal seperti kolang-kaling. Nata juga sangat baik dimanfaatkan sebagai bahan makanan fungsional untuk keperluan diet (Hamad dan Krstiono, 2013), melancarkan proses pencernaan karena memiliki kadar serat yang cukup tinggi dan berfungsi untuk mengatasi kelebihan kolesterol. Nata dapat dibuat dari berbagai macam bahan seperti air kelapa, santan kelapa, tetes tebu (molases), limbah cair tebu, ubi kayu tau limbah tapioka dan sari buah (nanas, melon, jeruk, jambu biji, pisang dan strawberi) (Rizal, 2013).

Dewasa ini kebutuhan manusia akan buah-buahan semakin tinggi dan meningkat, dalam hal ini disebabkan karena banyaknya kandungan nutrisi yang terdapat didalam buah. Salah satu buah yang memiliki banyak kandungan nutrisi yaitu srikaya (*Annona squamosa*), perlu diketahui bahwasanya pada daging buah srikaya terdapat kandungan flavonoid, karbohidrat, asam amino, mineral dan vitamin, dan akarnya juga mengandung nutrisi seperti saponin, tanin dan polifenol. Biji mengandung minyak dan resin. Buah muda mengandung tanin yang secara keseluruhan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis buah-buahan yang mengandung sumber vitamin dan mineral. Beberapa jenis buah seperti srikaya yang umumnya merupakan salah satu sumber nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.

Srikaya merupakan merupakan salah satu buah yang kaya akan nutrisi. Buah srikaya memiliki kemiripan dengan buah sirsak namun berukuran lebih kecil dan tidak berduri pada bagian kulitnya. Buah srikaya memiliki tekstur yang lembut dan kenyal dibagian dalam, dengan bagian luarnya yang keras. Srikaya termasuk tanaman buah yang istimewa dikarenakan kandungan nutrisi buahnya yang cukup tinggi dan hampir semua bagian tanaman memiliki manfaat. Srikaya mengandung antioksidan seperti vitamin C yang membantu melawan radikal bebas didalam tubuh, vitamin A bermanfaat untuk menjaga kulit, kesehatan rambut, serta meningkatkan fungsi pada mata. Kalium dan magnesium yang terdapat dalam buah juga mencegah penyakit jantung (Kementan, 2012).

Mengingat banyak sekali manfaat dari buah srikaya, maka saat ini banyak dilakukan usaha budidaya tanaman srikaya. Srikaya termasuk tanaman tahunan yang tergolong tanaman perdu atau pohon, dengan tinggi 2-7 meter., daun berbentuk elliptis, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Buah majemuk berbentuk bola, kulitnya seperti sisik, daging buahnya matang, lembut, kenyal, putih, manis dan bijinya berwarna hitam mengkilat (Tohir, 1984).

Di Indonesia banyak terdapat berbagai jenis buah-buahan yang mengandung sumber vitamin dan mineral. Beberapa jenis buah seperti srikaya memiliki banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Srikaya merupakan buah yang mudah diperoleh namun cepat rusak dan busuk disebabkan oleh faktor lingkungan yang tak terkendali. Agar tidak mudah rusak dan busuk, srikaya dapat diolah menjadi berbagai jenis produk olahan seperti *nata de srikaya*.

Srikaya sangat baik jika diolah menjadi produk nata karna mengandung banyak karbohidrat yang dibutuhkan oleh bakteri *Acetobacter xylinum* untuk berkembang dengan baik hingga menjadi nata serta penyimpanannya relatif singkat (Ridwan, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan natrium pada produk nata yang terbuat dari buah srikaya serta respon panelis terhadap nata yang terbuat dari buah srikaya.

B. Rumusan Masalah

1. Nutrisi apakah yang terkandung pada produk nata dari buah srikaya (*Annona squamosa*)?
2. Bagaimanakah respon panelis terhadap warna, tekstur, rasa dan aroma dari produk nata dari buah srikaya (*Annona squamosa*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu berupa produk nata yang terbuat dari buah srikaya, kandungan yang terdapat didalamnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan natrium serta respon masyarakat terhadap warna, tekstur, rasa dan aroma.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat dalam produk nata dari buah srikaya (*Annona squamosa*).
2. Untuk mengetahui respon panelis terhadap warna, tekstur, rasa dan aroma dari produk nata dari buah srikaya (*Annona squamosa*).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diklasifikasikan dalam dua hal yaitu:

1. Untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada produk nata dari buah srikaya.

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap warna, tekstur, rasa, dan aroma dari produk nata dari buah srikaya.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan acuan bagi para penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan acuan bagi para penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama.
5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi tambahan tentang kandungan yang terdapat pada produk nata dari buah srikaya serta produk tersebut dapat dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Amiarsi (2015), dengan judul Analisis Parametrik dan Non Parametrik Pengaruh Konsentrasi Sukrosa dan Amonium Sulfat terhadap Mutu *Nata de Melon*. Dalam penelitian tersebut menggunakan bahan yaitu buah melon cv aramis yang diperoleh dari petani Desa Tenjojaya, Ciapus Bogor, dengan nilai persentase kematangan 80-90%. Adapun bahan lain yang digunakan yaitu gula pasir, cuka ZA, air bersih, H₂SO₄ 1,25%, NaOH dan etanol. Biakan *Acetobacter xylinum* murni diperoleh dari Balai Besar Industri Pertanian, Bogor. Dari hasil penelitian ini diperoleh data yaitu tindakan penambahan sukrosa sebanyak 8% lebih efektif meningkatkan rendemen, ketebalan, kadar

serat, kekenyalan serta rasa dari *nata de melon* dibanding dengan penambahan sukrosa lainnya. Penambahan amonium sulfat sebanyak 0,8% juga lebih efektif meningkatkan rendemen, ketebalan, kadar serat, dan kekenyalan dibanding perlakuan penambahan amonium sulfat lainnya. Secara umum tindakan penambahan sukrosa 8% dan amonium sulfat 0,6% cenderung menghasilkan nata de melon yang lebih baik seara kuantitas dan kualitas.

2. Lempang (2006), dengan judul Rendemen dan Kandungan Nutrisi *Nata Pinnata* yang diolah dari Nira Aren. Untuk mengetahui kandungan nutrisi pada *nata pinnata*, makahasil fermentasi *nata pinnata* akan digunakan sebagai sampel dengan analisis kandungan, air, serat, protein, lemak, dan mineral. Penetapan kadar air, serat kasar dan kadar abu dilakukan dengan metode Anonim (1970), penetapan kadar protein berdasarkan metode Kjeldhal (Anonim, 1970), kadar lemak mrngikuti metode Soxhlet (Woodman, 1941) dan kadar abu dilakukan dengan metode Anonim (1970), penetapan kadar protein berdasarkan metode Kjeldhal (Anonim, 1970), kadar lemak mrngikuti metode Soxhlet (Woodman, 1941), dan penetapan kadar vitamin C dilakukan dengan titrasi yodium (Jacobs, 1962). Hasil yang diperoleh pada penelitian yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dilaboratorium nutrisi Fakultas Pertanian UNHAS, kandungan nutrisi *nata pinnata* yang diolah dari nira aren tidak berbeda jauh dengan nutrisi nata lainnya baik yang diolah dari air kelapa atau dari nira kelapa maupun dari kandungan nutrisi kolang kaling.

Nata pinnata mengandung kadar air 97,42%, protein 0,156%, vitamin C 0,003%, serat kasar 0,828% lemak 0,028%, kadar abu 0,093%, kalsium 0,012% dan posfor 0,044%. Secara fisik *nata pinnata* tidak berbeda jauh dengan *nata de coco* yang diolah dari air kelapa. *Nata pinnata* bertekstur lembut, berwarna putih, kenyal serta rasanya seperti kolong kaling. Produk nata merupakan bahan makan yang biasanya ditambahkan sebagai pencampur es teler (Jakobs, 1962).

3. Anha Fajrien dkk (2014), dengan judul penelitian Pengaruh Penambahan Air Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik *Nata De Soya*. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor I adalah konsentrasi air jeruk nipis dalam larutan media nata yang terdiri dari 3 macam, yaitu: $N_1= 1\%$; $N_2= 2,5\%$; $N_3= 5\%$. Faktor II adalah waktu lama fermentasi yang terdiri dari 3 macam, yaitu: $T_2= 12$ hari; $T_2= 14$ hari; $T_3= 16$ hari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil perlakuan konsentrasi jeruk nipis dan lama fermentasi terhadap ketebalan nata berkisar 0.5 cm-1.9 cm, rendemen berkisar 8.7%-45.1%, tekstur berkisar 3.1 N- 14,2 N, serat tidak larut berkisar 0,55%-1,53%,kadar air berkisar 98.75%-99.35%, aroma berkisar 3.6 (netral) sampai 4.5 (agak suka) dan rasa berkisar 3-3.35 (kurang suka). Perlakuan terbaik dari hasil analisi menggunakan metode *Multiple Attribute* diperoleh pada perlakuan konsentrasi air jeruk nipis 1% dan lama fermentasi 16 hari. Pada

perlakuan ini diperoleh nilai rata-rata ketebalan 1.87 cm, rendeman 44.33%, tekstur 8.33 N, serat larut 0.84%, kadar air 99.26%, aroma 3.6 (netral) dan rasa 3 (kurang suka).



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan ayat yang Relevan*

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, tubuh manusia terbentuk dari apa yang dimakannya, dari makanan itu pula dihasilkan tenaga atau energi yang perlu untuk kelangsungan hidup dan untuk aktivitas fisiknya. Apabila tidak ada makanan, niscaya tidak ada kehidupan didunia ini. Selain untuk mempertahankan hidup makanan juga merupakan bagian dari sosial budaya, kegembiraan, rasa kasih sayang, rasa syukur, semua itu biasanya diungkapkan dengan selamatan yang menghadirkan berbagai makan yang lezat-lezat. Demikian juga dalam agama, makanan mempunyai tempat yang sangat penting mislanya dalam Al-qur'an kitab pegangan umat islam terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang makan dan makanan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Maidah/5: 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ



Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Departemen Agama RI, 2012).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah untuk menjauhi makanan atau produk yang tidak memiliki izin atau tidak layak konsumsi (halal tidaknya suatu makanan). Artinya makanan yang bersih dan sehat serta mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Makanan merupakan bahan biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lain-lain. Bioteknologi adalah aplikasi organisme atau bagian tubuh organisme ke dalam teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemanfaatan organisme atau komponen sub selulernya dilakukan dengan terarah dan terkontrol untuk melibatkan multi disiplin serta aplikasi yang terpadu dengan mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika molekuler dan teknik kimia. Bioteknologi dikembangkan dari segala bidang yang memanfaatkan kemampuan dari mikroorganisme atau bagian-bagiannya. Salah satu contohnya adalah dari golongan mikroba yaitu bakteri.

B. Tinjauan Umum tentang Srikaya (*Annona squamosa*)

Srikaya (*Annona squamosa*) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan berasal dari Amerika Selatan, perkembangan tanaman srikaya (*Annona squamosa*) tidak begitu semarak seperti buah lainnya yaitu buah durian, rambutan ataupun mangga. Akan tetapi, buah srikaya sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik bagi kesehatan (Widyastuti,1993).

Indonesia adalah negara dengan berbagai plasma nutfah yang cukup tinggi, dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan buah tropis yang tumbuh dan berkembang dengan pesat (BPTP Jatim 2011). Plasma nutfah bermanfaat sebagai penyedia materi genetik dalam usaha perbaikan sifat tanaman. Srikaya merupakan salah satu kekayaan plasma nutfah Indonesia yang berpotensi sebagai komoditas hortikultura unggulan karena kandungan gizi yang tinggi (Kementan 2012). Srikaya termasuk tanaman buah istimewa dikarenakan kandungan gizi buahnya yang tinggi dan hampir semua bagian tanaman mempunyai manfaat (Kementan 2012).

Srikaya mengandung antioksidan seperti vitamin C yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kulit, kesehatan rambut, serta meningkatkan fungsi mata. Kalium dan magnesium yang terkandung dalam buah juga mencegah penyakit jantung. Srikaya merupakan buah lokal yang memiliki sebaran daerah tumbuh yang luas, namun belum ada data pasti daerah penyebarannya (Alex 2011). Di pulau Jawa diketahui tumbuh di daerah Jakarta dan sekitarnya, Tangerang, Sukabumi, Cirebon, jalur Subang-Indramayu, Surakarta, Yogyakarta dan Kudus. Sebaran daerah tumbuh yang luas tersebut diatas memungkinkan terjadinya keragaman atau variasi tanaman. Keragaman pertanaman srikaya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pemuliaan tanaman. (Soenarsih, 2012).

Srikaya tumbuh mulai dari daerah tropik hingga sub tropik. Di Indonesia tanaman srikaya banyak dijumpai di dataran rendah basah hingga dataran rendah kering dan ketinggian tempat mencapai 800 m di atas permukaan laut (dpl). Untuk

dapat tumbuh secara optimal, srikaya memerlukan sinar matahari penuh dan curah hujan sekitar 1500 mm-2000 mm per tahun. Kelembapan udara yang cocok untuk tanaman srikaya adalah 50%-60%, temperatur udara 20⁰C -35⁰C pada siang hari, dan temperature 18⁰C-27⁰C pada malam hari (Radi, 1997). Buah srikaya termasuk buah sejati tunggal yang berdaging dalam golongan buah buni.

Menurut Tjitrosoepomo (1988) buah buni mempunyai sifat lapisan luar yang sedikit kaku seperti kulit dan lapisan dalam yang tebal, lunak, dan berair, seringkali dapat dimakan. Srikaya termasuk pohon buah-buahan kecil yang tumbuh di tanah berbatu, kering, dan terkena cahaya matahari langsung. Tumbuhan yang asalnya dari Hindia Barat ini akan berbuah setelah berumur 3-5 tahun. Srikaya sering ditanam di pekarangan, dibudidayakan, atau tumbuh liar, dan bisa ditemukan sampai ketinggian 800 m dpl. Perdu atau pohon kecil ini mempunyai tinggi 2-5 m, kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. Daun bertangkai, kaku, letaknya berseling. Helai daun bentuk lonjong sampai jorong menyempit, ujung dan pangkai runcing, tepi rata, panjang 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm, permukaan daun warnanya hijau, bagian bawah hijau kebiruan, sedikit berambut atau gundul. Bunga 2-4 kuntum (berhadapan), keluar dari ujung tangkai atau ketiak daun, warnanya hijau kuning. Buahnya buah semu, bentuk bola atau kerucut, permukaan berbenjol-benjol, warnanya hijau berserbuk putih, penampang 5-10 cm, jika masak, anak buah akan memisahkan diri satu dengan lainnya. Warnanya hijau kebiru-biruan. Daging buah berwarna putih, rasanya manis. Biji masak berwarna hitam mengilap (Anonim, 2009).



Gambar 2.1 Buah Srikaya (*Annona squamosa*).

Menurut Harsono (2009) klasifikasi tanaman srikaya sebagai berikut :

- Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Magnoliales
Familia : Annonaceae
Genus : Annona
Species : *Annona squamosa*

C. Tinjauan Umum Tentang Nata

Nata berasal dari bahasa Spanyol yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai *nature* yang berarti terapung-apung, jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti *cream* (Afri, 1993). Nata merupakan jenis makanan penyegar atau pencuci mulut (*food dessert*) yang memegang andil yang cukup berarti untuk kelangsungan fisiologi secara normal (BPIHP dalam Barlina dan Lay, 1994).

Pemberian nama nata disesuaikan dengan substrat pertumbuhan *Acetobacter xylinum*, sehingga ada beberapa nama nata diantaranya *nata de pina* yaitu nata yang diperoleh dari sari buah nanas, *nata de mango* dari sari buah mangga, *nata de soya* dari limbah tahu, *nata de cacao* dari limbah kakao dan lain sebagainya (Pambayun, 2002).

Nata merupakan bahan menyerupai gel (agar-agar) yang terapung pada medium yang mengandung gula dan asam hasil bentukan mikroorganisme *Acetobacter xylinum*. Nata adalah substansi yang terbentuk di permukaan cairan nutrien, yang sebenarnya merupakan polikel atau polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri *Acetobacter xylinum* yang terakumulasi dan terapung-apung di permukaan cairan nutrien. Adanya gas-gas CO₂ yang dikeluarkan oleh bakteri *Acetobacter xylinum* saat-saat metabolisme yang menempel pada fibril-fibril polisakarida ekstraseluler yang menyebabkan terapung. Nata akan tampak sebagai suatu massa fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau kapas apabila dilihat di bawah mikroskop. Nata adalah salah satu jenis makanan berbentuk gel (agar-agar)

dengan tekstur agak kenyal, padat, putih, dan sedikit transparan (Sutarminingsih, 2004).

Nata dihasilkan dari proses fermentasi pada substrat yang mengandung gula dan nitrogen pada pH yang sesuai dengan perkembangan *Acetobacter xylinum* yaitu berkisar antara 4-4,5. Secara teknis nata dapat dibuat dari campuran berbagai media, karena untuk pertumbuhan dari bakteri *Acetobacter xylinum* dalam pembuatan massa nata diperlukan gula, asam organik dan mineral. Mineral dan asam organik ini dibutuhkan sebagai komponen metabolisme dalam pembentukan kofaktor enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri *Acetobacter xylinum* (Pambayun, 2002).

Nata berupa lapisan putih, kenyal, dan padat sebagai hasil penuaian fermentasi oleh mikroba. Jenis makanan ini mirip dengan kolang-kaling, dapat digunakan sebagai manisan, pengisi es krim, yogurt, jelly, agar-agar, dan sebagai campuran *cocktail*. Nata dapat dibuat dari bermacam-macam bahan dasar yang biasanya diberi nama sesuai dengan bahan dasarnya. Nata yang dibuat dari air kelapa, buah nenas, buah jambu mete, kedelai, dan buah tomat berturut-turut diberi nama *nata de coco*, *nata de pina*, *nata de cashew*, *nata de soya*, dan *nata de tomato*.

Bakteri pembentuk nata yaitu *Acetobacter xylinum* dapat tumbuh dan berkembang membentuk nata karena adanya kandungan air, protein, karbohidrat, dan beberapa mineral pada substrat sebagai nutrisinya. Tidak semua nutrisi yang ada pada substrat dapat terpenuhi maka perlu adanya tambahan nutrisi yang diberikan berupa sukrosa (karbon) dan urea (nitrogen). Penambahan sumber nitrogen anorganik atau organik akan meningkatkan aktivitas *Acetobacter xylinum* dalam

memproduksi nata. Hasil nata yang terbaik merupakan nata yang memiliki kadar serat sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) maksimal dengan kadar serat 4,5%. Pembentukan nata dapat dipengaruhi oleh lama fermentasi, dimana lama fermentasi yang optimum akan menghasilkan kualitas nata terbaik.

Menurut Rosario (1982), nata yang diperoleh dari fermentasi *Acetobacter xylinum* dipengaruhi oleh konsentrasi gula, lama fermentasi, sumber nitrogen, kandungan nutrisi dalam media pertumbuhan yang bersangkutan. Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan *Acetobacter xylinum* antara lain sumber karbon, Nitrogen, tingkat keasaman (pH 3–4), temperatur optimal (28°C – 31°C) dan oksigen. Kandungan karbon dan nitrogen pada air kelapa belum cukup dipakai oleh *Acetobacter xylinum* untuk merombak glukosa menjadi selulosa, sehingga perlu ditambahkan karbon (dari gula) dan nitrogen (ZA atau Urea), bertujuan untuk mencapai rasio karbon (C) dan nitrogen (N) dalam cairan media hingga menjadi 20. Bila rasio menyimpang jauh dari 20, tekstur nata akan cenderung sulit digigit atau mudah hancur (Pambayun, 2002). Hal yang sama dilaporkan oleh Sutarminingsih (2004), penggunaan ZA sebagai sumber N sebesar 0,3% akan memberikan rendemen yang tinggi yaitu 93,3%. Penambahan ZA dapat meningkatkan jumlah polisakarida yang terbentuk. Penambahan ZA yang terlalu tinggi (lebih dari 1%) dapat menyebabkan penurunan rendemen dan derajat putih pada nata yang dihasilkan.

Lapuz (1967) menjelaskan penambahan sumber nitrogen anorganik atau organik akan meningkatkan aktivitas *Acetobacter xylinum* dalam produksi nata.

Pertumbuhan *Acetobacter xylinum* memerlukan vitamin-vitamin tertentu dan vitamin B kompleks. Bahan-bahan bisa didapatkan melalui penambahan sumber nitrogen dari luar, dalam hal ini adalah ammonium fosfat. *Acetobacter xylinum* membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, propil alkohol dan glikol, serta mengoksidasi asam asetat menjadi gas CO₂ dan H₂O (Rahayu, 1993). Komponen selulosa ini akan membentuk jalinan mikrofibil yang panjang dalam cairan fermentasi. Gelembung-gelembung gas CO₂ yang dihasilkan selama fermentasi mempunyai kecenderungan melekat pada jaringan selulosa ini, sehingga menyebabkan jaringan tersebut terangkat ke permukaan cairan (Rahayu, 1993). Serat merupakan salah satu sumber makanan yang penting bagi metabolisme tubuh kita setiap hari. Sumber makanan berserat sangat banyak dan bermacam-macam, sehingga fungsi dan kerjanya juga berbeda-beda. Serat dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut akan berbentuk seperti gel jika dilarutkan dalam air dan mengikat lemak, sehingga lemak tidak akan diserap oleh tubuh tetapi akan dikeluarkan dari tubuh bersama tinja. Selain itu, serat larut juga berperan dalam penurunan kolesterol. Serat tidak larut dapat membantu memperlancar buang air besar, membuat tinja lebih lunak dan akan menjadi mudah untuk dikeluarkan. Serat jenis ini juga dapat membantu mencegah kanker usus dan wasir. Kekurangan serat dapat menimbulkan beberapa penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, *stroke*, kolesterol tinggi, kanker usus besar, *diabetes mellitus*, wasir, gangguan pencernaan, dan bahkan obesitas (kegemukan). Beberapa studi

menunjukkan diet rendah lemak tinggi serat sangat membantu dalam mencegah penyakit tersebut.

Kebutuhan serat orang dewasa setiap harinya sebesar 25 – 35 gram atau 10-13 gram serat per konsumsi 1.000 kkal energi setiap hari. Konsumsi serat untuk anak-anak menurut rumus yang dianjurkan William CL adalah usia (dalam tahun) ditambah 5 gram. Pada pola makan modern kita saat ini sangat sulit untuk memenuhi jumlah kebutuhan serat ideal setiap hari. Bahkan menurut penelitian Puslitbang Departemen Kesehatan RI tahun 2001 ditemukan bahwa rata-rata konsumsi penduduk Indonesia hanya sekitar 10 gram, atau kekurangan konsumsi serat 15–25 gram setiap hari. Mengingat demikian pentingnya peran serat untuk tubuh, maka perlu dibuat strategi untuk memenuhinya. Selain kenyal, nata juga terasa enak dan menarik bila dicampur dengan buah yang lain, seperti campuran *cocktail* dan es campur. Oleh karena itu jenis makanan nata memiliki prospek yang baik di masa mendatang sebagai makanan yang dapat membantu pemenuhan serat bagi tubuh kita.

Seperti selulosa alami pada umumnya, nata sangat baik untuk kesehatan manusia. Nata mengandung serat pangan atau *dietary fiber* yang bermanfaat 5 dalam proses pencernaan makanan di usus halus serta penyerapan air di usus besar (Setiaji et al., 2002). Manfaat yang terdapat dalam nata menjadikan nata semakin digemari masyarakat sebagai campuran dalam hidangan pencuci mulut sehingga banyak pula masyarakat yang memproduksi nata dalam kemasan. Syarat mutu Nata menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Syarat Mutu Nata

No	Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1	Keadaan	-	Normal
2	Bau	-	Normal
3	Rasa	-	Normal
4	Warna	-	Normal
5	Tekstur	-	Normal

Nata yang baik merupakan nata yang terbentuk dengan ciri lapisan permukaan nata. Nata yang terbentuk tidak merata atau bergelombang, menandakan pembentukan lapisan selulosa yang tidak merata (Pambayun, 2002).

D. Tinjauan Umum Uji organoleptik Pada nata

Uji organoleptik merupakan suatu pengujian untuk menentukan warna, rasa, bau dan tekstur yang memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan dengan menggunakan indra manusia yaitu indra penciuman, indra peraba, dan indra pengecap. Sedangkan indra pendengaran praktis tidak digunakan (Deman, 1997).

1. Warna

Warna merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian kualitas bahan pangan. Pemberian bahan pewarna tambahan dengan kadar yang tepat dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Nata pada umumnya memiliki warna putih dan bersih. *Acetobacter xylinum* dapat merubah gula menjadi selulosa dan jalinan selulosa inilah yang menghasilkan warna putih pada nata (Rizal, 2013) dalam (Ridwan, 2018).

2. Tekstur

Tekstur merupakan kemampuan suatu produk untuk kembali ke bentuk semula sebelum produk pecah. Tekstur nata yang baik adalah kenyal. Salah satu hal yang mempengaruhi tekstur nata adalah serat. Kadar serat yang tinggi akan menghasilkan nata dengan keknyalan yang tinggi pula (Manoi, 2007). Tekstur kenyal pada nata juga berhubungan dengan kadar air dan kerapatan jaringan selulosa pada nata maka kemampuan untuk mengikat air menjadi berkurang sehingga tekstur nata akan semakin kenyal (Ridwan, 20018).

3. Aroma

Nata tidak memiliki aroma khusus yang menyengat dan cenderung tidak beraroma. Aroma nata pada umumnya adalah segar (Nuraini dan Sari, 2016). Nata setelah pemanenan sebenarnya memiliki aroma sedikit asam akan tetapi setelah dilakukan perendaman dengan air tawar dan perebusan maka aroma asam tersebut menghilang.

4. Rasa

Rasa secara umum ada empat yaitu manis, pahit, asam dan asin. Kepekaan terhadap rasa terdapat pada kuncup lidah. Nata memiliki rasa yang menyerupai kolang-kaling (Nuraini dan Sari, 2016). Penggunaan ekstrak buah srikaya pada pembuatan nata diduga memiliki rasa yang berbeda hal ini disebabkan karena rasa dari buah srikaya berbeda dari air kelapa.

E. Tinjauan Umum tentang *Acetobacter xylinum*

Bakteri *Acetobacter xylinum* merupakan bakteri gram negatif yang mensintesis selulosa sebagai bagian dari metabolisme glukosa. Selulosa

merupakan polimer alami yang ditemukan secara melimpah di dunia dan merupakan salah satu bagian penting penyusun dinding sel pada tanaman. *Acetobacter xylinum* mensintesis selulosa dari glukosa melalui sejumlah reaksi katalik enzimatik (Teissie, 2000).

Bakteri *Acetobacter xylinum* beraktivitas dapat memecah gula dalam melakukan sintesis selulosa ekstraseluler. Selulosa yang terbentuk berupa benang-benang yang bersama-sama dengan polisakarida berlendir membentuk suatu jalinan secara terus-menerus menjadi suatu lapisan nata. Terbentuknya *pelikel* (lapisan tipis nata) mulai dapat terlihat di permukaan media cair setelah 24 jam inkubasi, bersamaan dengan terjadinya proses penjernihan cairan ada di bawahnya. Jaringan halus yang transparan yang terbentuk di permukaan membawa sebagian bakteri terperangkap di dalamnya. Gas CO₂ yang dihasilkan secara lambat oleh *Acetobacter xylinum* menyebabkan pengapungan ke permukaan (Muchtadi, 1997). Peningkatan jumlah selulosa yang relatif cepat diduga terjadi akibat konsentrasi sel yang terus berkembang di daerah permukaan yang langsung terkontaminasi dengan udara di dalam wadah fermentasi. Pada kultur yang tumbuh, suplai O₂ di permukaan akan merangsang peningkatan massa sel dan enzim pembentuk selulosa yang mengakibatkan meningkatnya produksi selulosa. Gel selulosa tidak terbentuk jika di dalam media tidak tersedia glukosa atau oksigen (Muchtadi, 1997).

Pertumbuhan *Acetobacter xylinum* memerlukan vitamin-vitamin tertentu dan vitamin B kompleks. Bahan-bahan bisa didapatkan melalui penambahan sumber nitrogen dari luar, dalam hal ini adalah ammonium fosfat. *Acetobacter xylinum*

membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, propil alkohol dan glikol, serta mengoksidasi asam asetat menjadi gas CO₂ dan H₂O (Rahayu, 1993).

Aktivitas pembuatan nata terjadi pada kisaran pH 3,5 dengan pH optimum untuk pembentukan nata yaitu 4. Suhu yang memungkinkan untuk pembentukan nata adalah pada suhu kamar antara 28-30°C dengan bantuan bakteri *Acetobacter xylinum* (Nisa, 2002), maka komponen gula yang terdapat di dalamnya dapat dirubah menjadi suatu substansi yang dapat menyerupai gel yang tumbuh pada permukaan media.

Nata adalah selulosa sintetik yang terbentuk dari proses fermentasi yang bersifat anabolik pada media cair, untuk menghasilkan senyawa kompleks selulosa dari pembentukan senyawa sederhana (gula). *Acetobacter xylinum* sangat penting dalam pembentukan nata karena bakteri ini dapat memecah komponen gula dan mampu membentuk polisakarida yang dikenal dengan *ekstracelluler* selulosa. Bakteri nata dapat mengubah kurang lebih 90% gula menjadi selulosa. Selulosa yang dihasilkan bersama-sama dengan *polysakarida* berlendir membentuk suatu jalinan seperti tekstil. Mengingat bahwa nata sebetulnya merupakan pelikel dari bakteri *Acetobacter xylinum*, maka ketebalan nata yang terbentuk dari proses pembuatan nata tergantung pada aktivitas bakteri tersebut. Seperti halnya bakteri lain, aktivitas *Acetobacter xylinum* dipengaruhi oleh kondisi fermentasi, yakni meliputi kandungan nutrisi, jumlah dan umur bakteri. Umur biakan starter pada pembuatan nata sangat mempengaruhi rendemen ketebalan nata. Dalam penelitian ini starter yang digunakan yakni yang telah berumur 9 hari, dimana pada saat itu laju

pembentukan pelikel di atas permukaan media cair dalam botol inkubasi sangat cepat yang menunjukkan jumlah dan aktivitas bakteri sangat tinggi (Lempang, 2006).

Adapun klasifikasi bakteri *Acetobacter xylinum* menurut Uning (1999) adalah sebagai berikut:

Regnum : Monera
 Divisio : Protophyta
 Class : Schizophyceae
 Ordo : Eubacteriales
 Family : Pseudomonaceae
 Genus : Acetobacter
 Spesies : *Acetobacter xylinum*

F. Tinjauan Umum tentang Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus*).

Kacang hijau (*Phaseolus aureus*) adalah salah satu kacang-kacangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kacang hijau tergolong *Leguminoceae* yang merupakan tanaman berkeping dua dan kaya akan zat gizi sebagai cadangan makanan untuk embrio selama proses perkecambahan. Buah kacang hijau berbentuk polong bulat memanjang dengan ukuran 6-15 cm. Berdasarkan mutunya, kacang hijau terbagi menjadi dua macam yaitu kacang hijau biji besar dan biji kecil. Kacang hijau biji besar digunakan untuk bubur dan tepung, sedangkan yang berbiji kecil digunakan untuk pembuatan tauge. Kacang hijau termasuk sumber bahan pangan nabati yang mudah didapat

dan harganya murah. Kacang hijau juga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, yaitu kandungan antitripsin yang sangat rendah, paling mudah dicerna, dan paling kecil memberi pengaruh flatulensi (Yusmarini, 2004).

Kecambah adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang-kacangan yang disemaikan atau melalui perkecambahan. Kecambah yang dibuat dari biji kacang hijau disebut tauge. Vitamin yang ditemukan dalam tauge adalah vitamin C, thiamin, riboflavin, niasin, asam pantothenik, vitamin B6, folat, kolin, β -karoten, vitamin A, vitamin E (α -tokoferol), dan vitamin K. Mineral yang ditemukan dalam tauge adalah kalsium (Ca), besi (Fe), magnesium (Mg), fosfor (P), potasium (K), sodium (Na), zinc (Zn), tembaga (Cu), mangan (Mn), dan selenium (Se). Asam amino esensial bermakna yang terkandung dalam tauge, antara lain yaitu, triptofan, treonin, fenilalanin, metionin, lisin, leusin, isoleusin, dan valin.

Tauge merupakan kecambah yang berasal dari kacang-kacangan seperti kacang hijau atau kacang kedelai. Makanan yang terbentuk melalui proses berkecambah kacang-kacangan ini mengandung nilai gizi tinggi, murah dan mudah didapat. Proses perkecambahan merupakan usaha tumbuhan untuk mengubah persediaan bahan makanan melalui perubahan biologis yaitu pecahnya berbagai komposisi biji menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga siap cerna bagi calon tanaman untuk tumbuh lebih lanjut. Kecambah yang biasa di dapat adalah kecambah dari kacang hijau (Mades, 2016).

Proses fermentasi nata dipengaruhi oleh aktivitas kultur *Acetobacter xylinum* yang mengkonversi nutrisi di dalam media fermentasi menjadi nata. Salah satu faktor yang berperan penting adalah adanya sumber nitrogen yang ditambahkan dalam media fermentasi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri *Acetobacter xylinum*. Sumber nitrogen yang biasa digunakan berasal dari pupuk anorganik seperti ZA atau urea karena harganya murah dan mudah didapat. Hanya saja sumber nitrogen ini bukan merupakan bahan makanan dan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu penggunaan sumber nitrogen organik yang aman dikonsumsi sebagai pengganti nitrogen anorganik (ZA atau urea). Sumber nitrogen organik yang dapat digunakan sebagai pengganti sumber nitrogen anorganik antara lain kecambah kacang hijau. Dengan demikian, nata yang dihasilkan aman dikonsumsi.



Gambar 2.3 Kacang hijau (*Phaseolus radiatus*)

G. Tinjauan Umum tentang Karbohidrat pada Nata

Energi yang digunakan dalam melakukan aktivitas untuk kehidupan sehari-hari didapatkan oleh tubuh dari energi yang dilepaskan didalam tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Akan tetapi kita tidak memperoleh seluruh energi yang kita konsumsi, karena tidak semua energi yang terkandung didalam makanan dapat diubah oleh tubuh ke dalam energi. Dalam proses metabolisme tubuh, energi makanan hanya sebagian diubah kedalam energi kerja. Sedangkan sebagian lagi diubah menjadi panas. Yang termasuk zat makanan sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat dan lemak. Karbohidrat dan lemak sering disebut makanan bahan bakar atau bahan energi (Irianto, 2004).

Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), dengan rumus molekulnya CH_2O . Karbohidrat merupakan unit gula yang individual atau rantai unit yang menyatu. Di seluruh dunia, karbohidrat menyediakan sebanyak 40-80% dari energi yang dikonsumsi oleh manusia (Barasi, 2007).

Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi dalam penyediaan bahan pembentuk protein dan lemak serta menjaga keseimbangan asam dan basa. Didalam jaringan tubuh, karbohidrat dapat diubah menjadi glukosa (sakar anggur) kemudian diserap oleh pembuluh darah melalui jonjot usus. Didalam jaringan tubuh, glukosa akan dioksidasi untuk menghasilkan kalori. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 9 kalori. Apabila kebutuhan energi yang terdapat didalam tubuh telah terpenuhi dan glukosa masih tersedia, maka kelebihan glukosa akan disimpan dalam jaringan otot, oleh karena itu dapat disebut juga gula otot (*glikogen*) yang merupakan zat cadangan dalam tubuh (Irianto, 2004).

Adapun untuk mengetahui kandungan karbohidrat dapat dilakukan dengan melakukan beberapa uji dan salah satu uji yang sering digunakan yaitu uji molisch. Uji molisch merupakan uji yang memperlihatkan terbentuknya cincin ungu yang terjadi diantara dua larutan dalam tabung reaksi bila bahan yang diuji mengandung karbohidrat. Terbentuknya kompleks berwarna ungu pada makanan yang diuji ini karena pengaruh hasil dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam sulfat pekat.

H. Tinjauan Umum Tentang Lemak Nabati pada Nata

Lemak merupakan senyawa organik yang didalamnya mengandung unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Dalam lemak, oksigen lebih sedikit daripada yang terkandung dalam karbohidrat. Itulah sebabnya pada waktu pembakaran, lemak mengikat lebih banyak oksigen sehingga menghasilkan panas yang lebih banyak. Lemak yang disimpan di bawah kulit adalah persediaan energi jangka panjang dan merupakan insulasi dalam tubuh. Lemak merupakan bahan penting dalam membran sel dan sifatnya tidak dapat larut dalam air dimanfaatkan dalam sistem kedap air sejumlah organisme. Fungsi lemak yaitu, sebagai sumber energi utama bagi tubuh setelah karbohidrat, sebagai tempat cadangan makanan, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, sebagai pelindung organ-organ seperti mata, ginjal, dan jantung serta sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah agar tidak kedinginan (Irianto, 2004).

I. Tinjauan Umum tentang Protein pada Nata

Setiap sel yang hidup tersusun dari protein. Protein adalah bahan pembangun tubuh yang utama. Protein merupakan zat yang tersusun dari berbagai asam amino. Protein yang ada didalam tubuh diubah menjadi asam amino. Asam amino yang ada didalam tubuh diedarkan melalui saluran pembuluh darah dan jantung. Adapun fungsi protein bagi tubuh yaitu sebagai bahan pembangun tubuh. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai untuk menggantikan sel-sel tubuh yang sudah rusak. Protein

juga berperan sebagai enzim sedangkan beberapa hormon mempunyai struktur protein (Irianto, 2004).


J. Tinjauan Umum tentang Vitamin pada Nata

Vitamin merupakan senyawa organik yang tidak dapat disusun sendiri oleh tubuh, kecuali vitamin K. Vitamin sangat dibutuhkan didalam tubuh walaupun dalam jumlah sedikit. Vitamin tidak dapat memberikan energi dan tidak dapat dihilangkan karena sangat dibutuhkan agar fungsi tubuh tetap berjalan normal. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung vitamin dalam jumlah yang cukup banyak. Buah-buahan dan sayuran segar sangat membantu penyediaan vitamin. Sekarang telah banyak diketahui jenis-jenis vitamin. Vitamin dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang dapat larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C dan vitamin yang dapat larut dalam lemak, terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K (Irianto, 2004).


Vitamin merupakan senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses metabolisme tubuh. Salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh adalah vitamin C. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen interseluler (Winarno, 2008). Vitamin C atau asam askorbat adalah salah satu vitamin yang terbuat dari turunan heksosa yang larut dalam air dan mudah teroksidasi. Proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim serta oleh katalis tembaga dan besi. Disamping itu, asam askorbat memiliki gugus kromofor yang peka terhadap rangsangan cahaya (Badriyah, 2015).

K. Tinjauan Umum tentang Natrium pada Nata

Natrium adalah komponen yang terdapat dalam plasma sel. Seperti halnya dengan klor, natrium juga berfungsi untuk membantu proses Bergeraknya rangsangan saraf yang berada disepanjang urat saraf serta berfungsi untuk mengatur denyut nadi pada jantung. Kandungan natrium banyak terdapat pada makanan sehari-hari seperti terdapat pada garam dapur, mentega, keju, sayuran hijau dan terutama pada daging (Irianto, 2004).



L. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019 dan lokasi penelitian di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Balai Besar Laboratorium Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah buah Srikaya (*Annona squamosa*) yang terdapat dikota makassar dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak buah srikaya (*Annona squamosa*).

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu:

1. Analisis kandungan nutrisi merupakan suatu upaya untuk mengetahui kandungan kadar karbohidrat, protein, lemak natrium, dan vitamin pada nata dari bahan dasar buah srikaya (*Annona squamosa*).

2. Penentuan kadar karbohidrat menggunakan metode *luff schoorl*, berdasarkan proses reduksi dari larutan *luff schoorl* oleh gula-gula pereduksi.
3. Penentuan kadar protein menggunakan metode kjehdal, mengekstraksi nitrogen total bahan dengan menghancurkan bahan, kemudian dilakukan titrasi HCL.
4. Penentuan kadar lemak menggunakan metode sederhana (soxhlet), lemak diestrak pada sampel heksana kemudian dibebaskan heksan dengan mengeringkan ekstrak lemak heksan dalam oven hingga beratnya konstan.
5. Penentuan kadar vitamin C dengan metode spektrofotometri, spektrofotometri merupakan penetapan kadar campuran melalui spectrum yang tumpang tindih tanpa pemisah terlebih dahulu.
6. Penentuan kadar natrium dengan spektrofotometri serapan atom yaitu penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral dalam keadaan gas (uap).

E. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini yaitu:

1. Sterilisasi Alat

Disiapkan alat dan bahan yang ingin disterilisasi, kemudian dimasukkan alat yang digunakan lalu dibungkus HVS dengan baik dan rapih hingga udara tidak akan masuk. Lalu dimasukkan satu persatu kedalam oven, dan diatur suhu menjadi menjadi 180°C dengan waktu 2 jam. Setelah itu, oven akan berhenti secara otomatis sesuai waktu yang telah diatur selesai, selanjutnya diambil alat alat oven. Kemudian alat dikeluarkan dengan tetap tidak membuka pembungkus kertas pada alat.

2. Pembuatan starter

Pembuatan starter dengan bahan-bahan air kelapa (*Cocos nucifera*) gula pasir, ekstrak taugé, dan asam cuka. Komposisi medium starter terdiri atas 60 gr gula pasir, ekstrak taugé 12 ml, asam asetat 30 ml, dan 600 ml air kelapa (*Cocos nucifera*). Setelah selesai penyiapan medium selanjutnya semua bahan dimasukkan ke dalam panci, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih panci diangkat lalu didinginkan. Setelah itu masukan biakan murni *Acetobacter xylinum* ke dalam larutan sambil diaduk terus menerus hingga merata. Kemudian larutan yang sudah diinokulasi dimasukkan ke dalam botol, lalu tutup dengan plastik buah hingga rapat kemudian diikat menggunakan karet gelang. Lalu botol disimpan di ruang inkubasi selama satu minggu. Starter sudah siap dipergunakan. Adanya perubahan kekeruhan dan terbentuknya lapisan nata yang mengapung pada medium starter nata dari air kelapa tersebut mengindikasikan keberhasilan tahap aklimasi *Acetobacter xylinum* (Ridwan, 2018).

3. Pembuatan Kecambah

Kacang hijau sebanyak 100 gram dicuci bersih, lalu direndam dengan air selama 15 jam, kemudian ditiriskan dan disimpan di wadah yang berlubang, lalu ditutup kemudian kecambah disiram air mengalir jika kecambah sudah mengering dan ditunggu selama 3 hari sampai kecambah berukuran 6 cm.

4. Pembuatan larutan tauge

Menyiapkan 200 gram larutan tauge yang dicampur dengan air sebanyak 400 ml kemudian air dimasak hingga mendidih kurang lebih 10 menit. Ditunggu hingga dingin lalu masukkan air rebusan tauge kedalam botol dan tutup rapat.

5. Proses pembuatan nata dari ekstrak buah srikaya (*Annona squamosa*)

Disiapkan medium fermentasi dilakukan dengan membuat ekstrak buah srikaya (*Annona squamosa*) dengan cara melepas kulit srikaya kemudian dicuci hingga bersih, diambil daging buahnya lalu dipisahkan dari biji sebanyak 200 gr. Kemudian diblender dan dicampur dengan perbandingan 1:3, setelah itu disaring untuk mendapatkan air perasan dari srikaya. Selanjutnya tambahkan larutan tauge sebanyak 12 mL dan gula pasir sebanyak 60 gr. Bahan-bahan kemudian dicampur dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan asam asetat 25% sebanyak 30 ml dari air perasan lalu diaduk supaya tercampur rata. Kemudian dimasukkan kedalam toples dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin dimasukkan 20 ml starter cair bakteri *Acetobacter xylinum* kedalam toples, lalu ditutup menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet gelang. Medium cair fermentasi ekstrak buah srikaya disimpan selama 14 hari pada suhu kamar dan pengamatan dilakukan setiap hari.

6. Prosedur kerja uji

Adapun prosedur kerjanya yaitu:

a. Uji Karbohidrat

Ditimbang sampel sebanyak 1,5 gram masukkan bahan kedalam labu alat dasar kemudian ditambahkan HCl 3 % sebanyak 25 ml lalu dimasukkan kedalam labu alas datar, setelah itu dipanaskan selama 3 jam, dilakukan pengukuran pH kemudian dimasukkan kedalam labu Erlenmeyer 50 ml lalu dicukupkan volumenya dengan aquades kemudian di saring kedalam botol YouC. Panaskan aquades sebanyak 25 ml kemudian tambahkan amilum 0,25 gram setelah itu diambil kaliumiodida sebanyak 20 gram kemudian di larutkan dalam wadah yang berisi aquades 100 ml. sampel diambil sebanyak 2 ml lalu ditambahkan aquades 15 ml, luff 25 ml kemudian dipanaskan selama 20 menit. Setelah 20 menit diangkat dan diamkan hingga dingin lalu titrasi dengan cara dimasukkan natrium tiosulfat 0,1 N kedalam tabung titrasi lalu diambil sampel kemudian ditambahkan kalium iodid sebanyak 15 ml, H_2SO_4 25% sebanyak 25 ml, dititrasi sampai berwarna kuning mudah lalu ditambahkan amilum sebanyak 10 tetes kemudian dititrasi lagi hingga berubah warna menjadi putih susu, lalu dihitung volume titrasi.

b. Uji Protein

Ditimbang sampel sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan reagen selenium mixture 1 sendok, tambahkan sulfuric acid 20 ml kemudian diamkan selama satu hari. Kemudian dipanaskan di lemari asam dengan menggunakan hot plate sampai berubah warna dari warna hitam menjadi warna jernih. Diamkan selama satu hari

kemudian di destilasi selama 4 menit lalu ditambahkan aquades, phenol phtal 0,1%, sodium. setelah itu ditambahkan asam borat 20 ml kemudian didestilasi tambahkan sodium hidrokside kemudian dititrasi lalu tambahkan larutan Hcl 0,1 N pada alat titrasi lalu tambahkan 3 tetes larutan Conway kemudian di titrasi sampai berubah warna menjadi bening.

c. Uji Lemak

Pertama-tama disiapkan wadah kosong kemudian dioven selama 1 jam setelah dimasukkan kedalam desikator selama 30 menit lalu ditimbang wadah kosong tersebut. Kemudian ditimbang sampel sebanyak 1 gram kemudian di masukkan kedalam cawan petri dan diratakan lalu masukkan cawan petri yang berisi nata kedalam oven dan di oven selama 2 jam. Setelah 2 jam di keluarkan dari oven kemudian di masukkan kedalam desikator selama 30 menit. Nata yang sudah kering di cawan petri dipindahkan kedalam wadah kosong yang telah dikethui beratnya, setelah itu dimasukkan kedalam lemari asam untuk penambahan larutan petroleum benzine sebanyak 75 ml kemudian cawan tersebut ditutup dengan aluminium foil dan dilubangi lalu didiamkan selama 2 hari dan ditimbang wadah beserta lemak.

d. Uji Natrium

Ditimbang sampel sebanyak 1 gram kemudian dimasukkan kedalam cawan lalu ditambahkan nitrit acid sebanyak 10 ml di diamkan selama 1 hari, setelah itu di panaskan dihotplate didalam lemari asam dan ditambahkan laruta nitrit acid sebanyak 10 ml jika belum larut kemudian dipanaskan sampai berubah warna,

ditambahkan aquades sebanyak 10 ml kemudian di saring kedalam gelas ukur setelah itu dihomogenkan dan dipindahkan kedalam botol uc lalu diukur absorbansinya menggunakan alat spektrofotometer serapan atom.

e. Uji Vitamin

Disiapkan dan dibuat larutan buffer ditimbang KH_2PO_4 sebanyak 2,4 gram dan $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ sebanyak 0,8 gram lalu dilarutkan kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 500 ml, ditimbang natrium oxalat sebanyak 0,37 gram kemudian dilarutkan lalu dimasukkan kedalam labu ukur 500 ml dihomogenkan. Ditimbang sampel sebanyak 1 gram kemudian digerus lalu dimasukkan kedalam gelas ukur lalu ditambahkan buffer sebanyak 15 ml dihomogenkan dan didiamkan selama 3 menit kemudian disaring setelah itu dimasukkan kedalam labu ukur 25 ml lalu dicukupkan volumenya sampai batas dengan aquades kemudian diukur serapannya pada spektrofotometri.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (Pengamatan) dan purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang didasarkan dengan tujuan dan sudah dipertimbangkan dari peneliti.

Adapun pengujian yang dilakukan berupa uji kimia yang meliputi kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan natrium dan uji organoleptik meliputi aroma dan rasa.

G. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas kimia, batang pengaduk, gelas ukur, talenan, mistar, pisau, sendok, kompor, panci, blender, botol selai, pH indikator, jangka sorong, cawan petri, gelas beker, oven, gunting, sendok, desikator, batang pengaduk, pipet tetes, lemari asam, hotplate, gelas ukur, botol YouC, buret, statif, mortar and pestle, corong, pipet skala, pipet filler,

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah buah srikaya, air kelapa, bakteri *Acetobacter xylinum*, larutan tauge, gula pasir, asam asetat, plastik, karet gelang, Aluminium foil, petroleum benzine, reagen selenium, sulfuri acid, sodium hydroxide, HCl 3 %, asam asetat, NaOH 30 %, H_2SO_4 , amilum, kaliumiodid, natrium tiosulfat 0,1 N, nitrit acid, $KH_2HPO_4 \cdot 2H_2O$.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

2. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah. Analisis parametrik digunakan untuk pengolahan data kuantitatif yang meliputi pengujian kandungan karbohidrat, protein, lemak, natrium, dan vitamin.

a. Pengukuran Kandungan Protein

$$\text{Persentase kadar N} = \frac{(\text{ts} - \text{tb} \times \text{N HCl} \times 14,008 \times 100\%}{\text{Berat Sampel}}$$

$$\text{Kadar Protein \%} = \text{N} \times 6,25$$

ts: Volume titrasi sampel dan

tb: Volume titrasi blangko.

b. Pengukuran Kandungan Karbihidrat

$$\text{Glukosa} = \frac{(\text{Volume titrasi blangko} - \text{Volume titrasi sampel}) \times \text{N. Tio}}{0,1 \text{ N}}$$

$$\text{Glukosa \%} = \frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Kandungan Lemak

$$\text{Kadar Lemak (\%)} = \frac{W_1 - W_0}{W_s} \times 100\%$$

Keterangan:

W0 = Berat labu bundar kosong

Ws = Berat sampel

W1 = Berat labu bundar dan sampel

d. Pengukuran Kandungan Natrium

$$\text{Kadar Natrium (mg)} = \frac{\text{Kn} \times \text{Vas} \times \text{faktor pengenceran}}{\text{berat sampel (g)}}$$

Keterangan:

K_n = Konsentrasi natrium

V_{as} = Volume akhir sampel

e. Pengukuran Kandungan Vitamin

Kadar vitamin pada sampel dapat diperoleh dengan cara mengonversi data absorbansi.

$$V = \frac{\text{Konsentrasi sampel} - \text{Volume akhir sampel}}{\text{Berat sampel}}$$

Keterangan:

V= Vitamnin



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil pengamatan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kandungan Nutrisi Buah Srikaya

Dari hasil analisis percobaan yang dilakukan di laboratorium kesehatan Makassar kandungan nutrisi srikaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Kandungan Nutrisi Buah Srikaya

No	Kandungan Nutrisi	Kode Sampel	Kadar Nutrisi (%)
1	Karbohidrat	KBS	6,88
2	Protein	PBS	2,83
3	Lemak	LBS	2,74
4	Vitamin C	VBS	0,01
5	Natrium	NBS	0.025

Keterangan:

KBS= Karbohidrat Nata srikaya, PBS= Protein Buah Srikaya, LBS= Lemak Buah Srikaya, VBS= Vitamin Buah Srikaya, NBS= Natrium Buah Srikaya

2. Uji Kandungan pada *Nata de Srikaya*


Dari hasil analisis percobaan yang dilakukan di laboratorium kesehatan Makassar kandungan nutrisi nata de srikaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Kandungan Nutrisi *Nata de Srikaya*

No	Kandungan Nutrisi	Kode Sampel	Kadar Nutrisi (%)
1	Karbohidrat	KNA	3,41
2	Protein	PNA	0,30
3	Lemak	LNA	0
4	Vitamin C	VNA	0,004
5	Natrium	NNA	0,01

Keterangan:

KNK= Karbohidrat Nata srikaya, PNK= Protein Nata Srikaya, LNK= Lemak Nata Srikaya, VNK:= Vitamin Nata Srikaya, NNK= Natrium Nata Srikaya



Gambar 4.1 Hasil Uji Kandungan Nutrisi Pada Buah srikaya (*Annona squamosa*) dan *Nata de Srikaya*

3. Uji Organoleptik pada *Nata de Srikaya*


Uji organoleptik pada *nata de srikaya* meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur. Uji ini dilakukan berdasarkan skala hedonik yang digunakan yaitu 1= tidak suka, 2= cukup suka, 3= agak suka, 4= suka, 5= sangat suka (Ridwan, 2018). Responden diminta untuk mengemukakan tentang rasa, aroma, warna dan tekstur dari *nata de srikaya* dengan *nata de coco* sebagai kontrol.

Tabel 4.3 Uji Organoleptik

Jenis nata	Total nilai keseluruhan			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
K ₀	4,5	3,7	2,8	2,4
K ₁	4,0	3,7	2,3	1,9

Keterangan:

K₀= *Nata de coco*, K₁= *Nata de srikaya* sebagai kontrol.



Gambar 4.2 Hasil Uji Organoleptik

Keterangan:

1= tidak suka, 2= cukup suka, 3= Agak suka, 4= suka, 5= sangat suka.

B. Pembahasan

Nata merupakan selulosa sintetik yang terbentuk dari proses fermentasi yang bersifat anabolik pada media cair, untuk menghasilkan senyawa kompleks selulosa dari pembentukan senyawa sederhana (gula). *Acetobacter xylinum* sangat berperan penting dalam pembentukan nata karena adanya bakteri ini dapat memecah komponen gula sehingga mampu membentuk polisakarida yang dikenal dengan *ekstracelluler* selulosa. Bakteri nata dapat mengubah gula kurang lebih 90% gula menjadi selulosa. Selulosa yang dihasilkan bersama-sama dengan polisakarida berlendir membentuk suatu jalinan seperti tekstil (Lempang, 2006).

Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri *Acetobacter xylinum* yaitu sumber karbon atau karbohidrat, sumber nitrogen, serta keasaman (pH) yang berkisar antara 3-4 dalam keadaan optimal dan temperatur yang ideal 28 0C – 31 0C dan oksigen. Aktivitas pembuatan nata hanya terjadi pada kisaran pH 3,5 dengan pH optimum untuk pembentukan nata adalah 4. Suhu yang memungkinkan untuk pembentukan nata adalah pada suhu kamar antara 28-30°C dengan bantuan bakteri *Acetobacter xylinum* (Nisa, 2002), maka komponen gula yang terdapat di dalamnya dapat dirubah menjadi suatu substansi yang menyerupai gel yang tumbuh di permukaan media.

Tahap awal pada proses pembentukan *nata de srikaya* yaitu bakteri *Acetobacter xylinum* yang telah dimasukkan kedalam media ekstrak srikaya tersebut kemudian akan mengonsumsi glukosa sebagai energi untuk pertumbuhan. Bakteri *Acetobacter xylinum* mengalami peningkatan jumlah koloni secara cepat, kemudian

bakteri yang berada pada media tersebut dan memproduksi serat selulosa dalam jumlah banyak dengan bantuan enzim yang diproduksi sendiri oleh bakteri tersebut. Enzim yang berperan dalam pembentukan selulosa merupakan sintetase selulosa (UDP-glukosa: 1,4- β -D glukosa 4- β -D-glukosiltransferase). Proses pembentukan selulosa mengakibatkan bagian permukaan media terlihat keruh atau berbentuk gel dengan viskositas yang lebih tinggi daripada cairan yang ada dibawahnya. Semakin lama lapisan gel tersebut semakin tebal dan sangat jelas terlihat, dan jumlah cairan pada media tersebut semakin sedikit. Alasan mengapa *Acetobacter xylinum* membuat selulosa dalam jumlah besar secara biologi adalah untuk menjaga keberadaannya agar tetap dibagian atas permukaan media pertumbuhan, sehingga bakteri tersebut tetap dapat memperoleh oksigen dalam jumlah yang cukup untuk beraktifitas dan memproduksi selulosa (Darmasnyah, 2010).

Kualitas nata yang dihasilkan ditentukan oleh ketebalan, bobot, kadar protein, dan kadar serat nata sendiri. Semakin tebal dan berat serta tinggi kadar protein maka kualitasnya akan semakin baik. Agar *nata* yang dihasilkan berkualitas tinggi maka diperlukan persyaratan yang mendukung antara lain kondisi tempat pembuatan yang baik (lingkungan yang cocok), adanya penambahan gula, dan lama fermentasi.

Nata adalah produk pangan berupa lapisan selulosa sebagai hasil fermentasi bakteri pembentuk nata, yaitu *Acetobacter xylinum*. Nata merupakan makanan berkalori rendah yang sebagian besar tersusun dari air dan selulosa sehingga sering digunakan sebagai makanan pencuci mulut, bahan pencampur *fruit cocktail*, digunakan sebagai pencampur es teler, coklat buah, jelly dan es krim. Saat ini, nata

tidak hanya dibuat dari air kelapa, namun dalam perkembangannya berbagai media dapat digunakan dengan syarat cukup sumber karbon dan nitrogen serta persyaratan tumbuh yang lain seperti pH dan suhu.

Selain rasanya yang nikmat nata juga memiliki tekstur lembut, berwarna putih, kenyal serta memiliki rasa mirip kolang kaling. Nilai gizinya rendah, kandungan terbesarnya adalah air sehingga produk makanan ini banyak digunakan sebagai sumber makanan rendah energi untuk keperluan diet karena mengandung serat larut berfungsi untuk mengikat lemak, sehingga lemak tidak diserap oleh tubuh tetapi dikeluarkan bersama feses selain untuk keperluan diet juga bermanfaat untuk memperlancar proses pencernaan. Serat yang ada di dalam nata sangat dibutuhkan dalam proses fisiologi bahkan dapat membantu para penderita diabetes dan memperlancar penyerapan makanan di dalam tubuh (Lempang, 2006).

Selain karena kadar serat yang tinggi nata juga merupakan salah satu makanan yang tidak bersifat musiman sehingga mudah didapatkan dan proses pembuatannya pun cukup mudah karena dapat menggunakan peralatan yang sederhana serta ramah lingkungan.

Mengingat peranan nata yang berpengaruh positif terhadap kesehatan, yaitu sebagai penurun kolesterol, glukosa darah pada penderita diabetes mellitus, mencegah konstipasi, mengendalikan berat badan (mencegah obesitas), mencegah kanker kolektral dan bermanfaat pada mikroflora di usus besar, maka nata perlu dikembangkan berbasis berbagai media yang ada di sekitar lingkungan kita (Nugraheni, 2008).

Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kandungan Nutrisi

Karbohidrat adalah hasil alam yang memiliki banyak fungsi penting dalam tanaman maupun hewan. Melalui fotosintesa tanaman merubah karbondioksida menjadi karbohidrat, yaitu dalam bentuk selulosa, pati, dan gula. Karbohidrat dalam tepung terdiri dari karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, pentosa, dextrin, selulosa, dan pati (Setiyono, 2011). Sebagian besar karbohidrat, terutama golongan monosakarida dan disakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dan laktosa mempunyai sifat mereduksi. Sifat mereduksi dari karbohidrat disebabkan oleh adanya gugus aldehida atau gugus keton, atau gugus keton bebas dan gugus OH bebas (Daud, 2012).

Karbohidrat berkontribusi besar dalam menyusun produk pangan pada umumnya (Fennema, 1996) dan merupakan salah satu makronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Lebih dari 70% kebutuhan energy manusia dipenuhi dengan karbohidrat (BeMiller 2010). Sifat fungsional karbohidrat yang penting dalam proses pengolahan pangan, menyebabkan keberadaan karbohidrat yang penting dalam proses pengolahan pangan, menyebabkan keberadaan karbohidrat menjadi komponen yang perlu diperhatikan dan dianalisis.

Analisis total karbohidrat telah lama dilakukan pada berbagai sampel seperti ekstrak (Yemm dan Willis), tanah (Safarik dan Satruckova 1992), produk farmasi (Leyva et al 2007) dan produk pangan (BeMiller 2009). Jumlah karohidrat dalam bentuk pangan perlu diketahui, antara lain untuk: standardisasi identitas pangan,

label nutrisi, deteksi adanya adulterasi dan untuk pengembangan suatu produk pangan. peran karbohidrat yang cukup signifikan terutama dalam produk pangan menjadikan analisis karbohidrat penting.

Adapun hasil analisis karbohidrat pada produk pangan *nata de srikaya* yaitu, sebesar 3,41% dalam 1gram *nata de srikaya* yang diuji. Hasil pengujian kadar karbohidrat pada *nata de srikaya* tidak jauh berbeda dengan kadar pada buah srikaya sebelum diolah menjadi nata yaitu sebesar 6,88%. Kadar karbohidrat yang cukup tinggi pada nata dipengaruhi oleh komponen nutrisi lain yang terdapat pada *nata de srikaya* (kadar air, kadar lemak, dan kadar protein) semakin kecil nilai komponen nutrisi lain pada nata maka akan semakin besar kadar karbohidratnya, dan sebaliknya apabila semakin besar komponen nutrisi pada nata maka akan semakin rendah kadar karbohidratnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh (Fatkurahman et al 2012) menyatakan bahwa kadar karbohidrat yang dihitung secara *by difference* dipengaruhi oleh kandungan nutrisi lain yaitu protein, lemak, air dan abu. Semakin tinggi komponen kadar nutrisi yang lain maka kadar karbohidrat semakin rendah dan sebaliknya jika komponen nutrisi lain semakin rendah maka kadar karbohidrat semakin tinggi.

Protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein merupakan komponen yang banyak terdapat pada sel tanaman dan hewan. Kandungan protein dalam bahan pangan bervariasi baik dalam jumlah maupun jenisnya. Protein merupakan sumber gizi utama, yaitu sebagai sumber amino. Disamping berperan

sebagai sumber gizi, protein dari sumber yang berbeda memiliki kekhasan sifat fungsional yang berpengaruh pada karakteristik produk pangan (Paramita, 2012). Karena adanya kandungan unsur N maka biasanya dalam penentuan jumlah protein dapat dilakukan dengan cara menentukan jumlah nitrogen (N) yang ada dalam bahan pangan.

Hasil analisis kadar protein pada produk pangan *nata de srikaya* yaitu, sebesar 0,30% dalam 1 gram *nata de srikaya* yang diuji. Hasil pengujian kadar karbohidrat pada *nata de srikaya* tidak jauh berbeda dengan kadar pada buah srikaya sebelum diolah menjadi *nata* yaitu sebesar 2,83%. Kadar protein pada *nata de srikaya* lebih kecil dibandingkan pada buah srikaya sebelum menjadi *nata*. Kecilnya nilai protein pada *nata de srikaya* yang dihasilkan karena kemungkinan terjadi leaching pada saat melakukan pencucian dan pemanasan.

Nilai kadar protein yang kecil pada *nata de srikaya* biasanya juga dipengaruhi oleh lama fermentasinya. Penelitian ini didukung oleh Siti, (2006) mengatakan bahwa perlakuan lama fermentasi akan menghasilkan kadar protein yang lebih tinggi.

Lemak adalah bahan yang mengandung asam lemak baik yang dalam bentuk cair disebut minyak sedangkan bentuk padat disebut *fat* (Lemak). Struktur kimia terdiri dari ikatan asam lemak dalam tubuh terutama lemak dengan kandungan kolesterol yang tinggi akan menyebabkan kegemukan dan penyakit seperti jantung, ginjal, diabetes dan hipertensi (Wirakusumah, 2002).

Lemak memiliki peran penting dalam tubuh manusia, sebab lemak merupakan sumber energy yang tinggi selain karbohidrat. Satu gram lemak sesuai dengan rekomendasi dari *Food Nutrition Board of the National Research Council* pada tahun 1948, bahwa antara 20% sampai 25% hendaknya berasal dari lemak (Kuantaf dan kuantaraf, 1990).

Hasil analisis kadar lemak pada produk pangan nata de srikaya yaitu, sebesar 0% dalam 1gram *nata de srikaya* yang diuji. Berbeda dengan kandungan nata, kandungan pada buah srikaya yang digunakan pada pembuatan nata memiliki kadar lemak sebesar 2,74%. Tidak terdapatnya lemak pada nata dikarenakan pada saat peses pembuatan nata adanya penambahan larutan asam asetat sehingga mengakibatkan lemak yang terdapat didalam buah tidak mengendap pada serat nata melainkan terpisah bersama dengan substrat natanya. Juga dipengaruhi oleh ketebalan nata semakin tebal nata maka semakin rapat jaringan selulosa pada nata dan jika terdapat kadar lemak pada nata sebesar 0,2 % dalam 1 gram yang diuji (Susanti, 2006).

Vitamin merupakan senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses metabolisme tubuh. Salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh adalah vitamin C. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen interseluler¹. Vitamin C atau asam askorbat adalah salah satu vitamin yang terbuat dari turunan heksosa yang larut dalam air dan mudah teroksidasi. Proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim serta oleh

katalis tembaga dan besi. Disamping itu, asam askorbat memiliki gugus kromofor yang peka terhadap rangsangan cahaya.

Hasil analisis kadar vitamin C pada *nata de srikaya* sebesar 0,004% , dalam setiap 1 gram nata yang diuji. Kadar vitamin C pada *nata de srikaya* diperoleh dari vitamin C yang terdapat dalam buah srikaya sebelum diolah menjadi nata. Vitamin C atau biasa disebut asam askorbat memiliki sifat mudah larut dalam air dan mudah rusak oleh oksidasi, panas, dan alkali namun stabil pada pH asam.

Kadar vitamin C yang terdapat didalam *nata de srikaya* tidak dipengaruhi oleh pH hal ini disebabkan vitamin C memiliki sifat stabil dalam suasana asam. Vitamin C mudah rusak dalam panas. Namun pada pembuatan *nata de srikaya* terdapat proses perebusan sebelum fermentasi dengan suhu 100⁰C (mendidih) berfungsi untuk mengsterilkan substrat nata, mengakibatkan vitamin C mengalami kerusakan dan dalam pembuatan *nata de srikaya*, sari buah srikaya diencerkan dengan air sehingga kadar vitamin C pada *nata de srikaya* berkurang. Buah srikaya mengandung 0,01% kadar vitamin C, jika dibandingkan dengan kadar setelah menjadi nata yaitu sekitar 0,004% dalam setiap 1 gram *nata de srikaya*.

Natrium merupakan salah satu nutrisi yang berupa mineral yang terdapat dalam buah. Natrium berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa didalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang berbentuk asam. Berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Natrium berperan juga dalam absorpsi glukosa dan sebagai berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama melalui

dinding usus sebagai pompa natrium (Almatsier, 2005). Menurut pardede (2012) perubahan kadar natrium dapat mempengaruhi tekanan darah.

Hasil analisis kandungan natrium pada produk pangan *nata de srikaya* yaitu, sebesar 0,01% dalam 1gram *nata de srikaya* yang diuji. Berbeda dengan kandungan nata, kandungan pada buah srikaya yang digunakan pada pembuatan nata memiliki kadar natrium sebanyak 0,025%.Kandungan natrium yang terdapat pada *nata de srikaya* diperoleh dari buah srikaya sebelum diolah menjadi nata karena pada saat pengujian buah srikaya sebelum menjadi nata terdapat kandungan natrium didalamnya.

2. Uji Organoleptik

Menurut Soekarto (1985), pengawasan dan evaluasi bahan makanan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara teknik, salah satunya adalah evaluasi organoleptik. Untuk melaksanakan suatu penelitian organoleptik, diperlukan panel yang bertindak sebagai alat atau instrumen. Panel tersebut didapatkan dari orang atau sekelompok orang dan yang menjadi anggota panel disebut panelis.

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai uji (warna, rasa, aroma dan tekstur). Data yang diperoleh dengan memberi kuisisioner kepada 10 panelis. Sebelum panelis mengisi kuisisioner. Panelis diminta untuk mencicipi produk nata hasil penelitian sesuai dengan panduan yang tercantum pada lembar kuisisioner. Peneliti tidak memberi tahu panelis tentang perbedaan nata yang akan dikonsumsi. Penilaian tingkat kesukaan panelis menurut Ridwan (2018) terhadap produk nata de srikaya ini ada 5 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.6 Rentang nilai tingkat kesukaan

Nilai	Tingkat Kesukaan
1	Tidak suka
2	Cukup suka
3	Agak suka
4	Suka
5	Sangat suka

Warna dapat memberi petunjuk terhadap perubahan kimia dalam makanan, seperti pencoklatan dan pengkramelan. Warna yang terdapat pada makanan disebabkan oleh pigmen alam atau pewarna yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Pigmen alam merupakan senyawa yang terdapat dalam produk yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Dari penilaian panelis diminta untuk mengamati produk *nata de srikaya* dengan cara melihat penampakan warna nata.

Berdasarkan hasil penilaian panelis terhadap warna *nata de coco* dan *nata de srikaya*, menunjukkan bahwa 10 panelis lebih menyukai warna dari *nata de coco* dibandingkan *nata de Srikaya*. Hal ini dikarenakan unsur warna dari *nata de srikaya* memiliki warna putih pekat, sehingga secara visual penampakan warna *nata* ini kurang menarik, karena warna nata yang dihasilkan tidak putih bersih. Jika dibandingkan dengan *nata de coco* yang putih bersih. Hal ini juga dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti pH, sari buah srikaya, proses perebusan nata dan bakteri *Acetobacter xylinum* yang dapat merubah gula menjadi selulosa dan jalinan

selulosa inilah yang menghasilkan warna bening pada nata (Rizal et al, 2013). Secara umum warna dari produk makanan akan mempengaruhi daya tarik konsumen. Sehingga konsumen cenderung menyukai warna yang mencolok.

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan) atau dengan perabaan jari (Kartika, 1998). Pada uji tekstur ini panelis diminta untuk meraba produk nata menggunakan jari dan memberikan penilaian berdasarkan nilai tingkat kesukaan panelis terhadap kekenyalan nata. Dari hasil penilaian panelis berdasarkan pengamatan visual diperoleh bahwa produk *nata de coco* dan *nata de srikaya* terlihat kenyal dan keduanya mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,7. Maka dapat disimpulkan bahwa kesepuluh panelis menyukai kekenyalan nata de coco dan *nata de srikaya*. Secara teori hal ini ditandai dengan adanya kekokohan lapisan nata yang mengikat selulosa dengan bantuan bakteri *Acetobacter xylinum* yang cukup kuat. Menurut Campbell (2002), rantai selulosa terdiri dari satuan glukosa anhidrida yang saling berikatan melalui atom karbon pertama dan keempat. Secara ilmiah molekul-molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril-fibril yang terdiri dari beberapa molekul selulosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Komposisi kimia dan struktur yang demikian yang membuat kebanyakan bahan yang mengandung selulosa yang bersifat kuat. Sifat kuat yang dimiliki oleh sebagian besar bahan berselulosa membuat bahan tersebut bahan terhadap peruraian secara enzimatik. Berdasarkan kesukaan panelis terhadap tekstur nata cenderung menyukai nata yang mudah kenyal dan tidak keras.

Rasa merupakan bentuk rangsangan yang diterima oleh indera pengecap. Pada uji ini panelis diminta untuk mencicipi rasa *nata de coco* dan *nata de srikaya* tanpa memberi tahu jenis nata yang dikonsumsi. Hasil yang diperoleh dari 10 panelis memutuskan lebih menyukai rasa dari *nata de coco* dibandingkan *nata de srikaya*. Kemungkinan besar karena panelis cenderung terbiasa mengonsumsi *nata de coco*, sementara *nata de Srikaya* baru pertama kali dirasakan. Makanan yang lebih sering dikonsumsi menyebabkan adanya kepekaan indera pengecap terjadi akibat adanya zat kimia yang berkaitan pada reseptor indera perasa pengecap yang kebanyakan terdapat dipermukaan lidah (Sherwood, 2001). Sensivitas indera pengecap dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya usia, kebiasaan merokok dan minum kopi. Hal ini ditandai dengan penurunan sensitivitas indera pengecap secara fisik maupun fungsi organ, dimana proses menua terjadi penurunan jumlah *papila sirkumvalata* seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dipilih panelis secara random yang rentang usia 18-23 tahun dan memenuhi syarat seperti tidak merokok dan minum kopi secara berlebihan.

Dari segi aroma panelis diminta untuk menilai tingkat kesukaan pada *nata de coco* dan *nata de srikaya* dengan cara menghirup aroma nata tersebut. Hasil dari pengamatan panelis bahwa aroma *nata de srikaya* berada pada rentang 1 (tidak suka) dibandingkan *nata de coco*. Aroma pada *nata de srikaya* terasa asam, sebab pada proses tahap pencucian nata dan perebusan yang kurang sempurna. Penilaian panelis terhadap aroma *nata de srikaya* berbeda-beda, akan tetapi secara keseluruhan panelis

lebih menyukai bau dari *nata de coco*. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki perbedaan penciuman, meskipun mereka dapat membedakan bau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:


1. Terdapat kandungan nutrisi pada *nata de srikaya* dalam 1gram dengan kadar karbohidrat sebesar 3,41%, kadar protein sebesar 0,31%, kadar vitamin sebesar 0,004% dan dan kadar natrium sebesar 0,01%.
2. Tingkat kesukaan panelis terhadap uji organoleptik Nata de srikaya tidak berbeda jauh dengan kontrol *nata de coco* (warna, aroma, rasa, dan tekstur) masih dalam batas bisa diterima oleh panelis kecuali aroma pada *nata de srikaya* yang kurang disukai oleh panelis.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan pemanfaatan hasil buah agar pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan, salah satunya dengan pengolahan nata dari buah srikaya dijadikan sebagai suatu industri rumah tangga yang perlu digiatkan karena pengolahan buah srikaya menjadi suatu produk nata yang terbuat dari srikaya cukup sederhana pembuatannya sehingga mudah dilaksanakan masyarakat.
2. *Nata de srikaya* adalah produk olahan pangan yang hampir tidak memiliki rasa sama sekalidan mudah membusuk sehingga jika diolah lebih lanjut dengan

cara dikemas dan penambahan essence yang tepat sesuai dengan keinginan konsumen masih perlu diteliti lagi.

3. Dalam penelitian ini untuk uji organoleptik tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengujian organoleptik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) nata.
4. Dalam penelitian ini menggunakan 10 panelis, disarankan untuk peneliti selanjutnya mengambil panelis lebih dari 10 agar hasil uji organoleptik lebih maksimal.



KEPUSTAKAAN

- Abdullah dan Abdulrahman. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Afri, A.S. Kelapa. (Kajian Sosial-Ekonomi). Aditya Media. Yogyakarta. 1993.
- Alex S. *Budidaya dan khasiat srikaya untuk kesehatan dan bisnis makanan*. Yogyakarta (ID): Pustaka Baru Press. 2011.
- Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Amiarsi Dwi, Dkk. *Analisis Parametrik dan Non Parametrik Pengaruh Konsentrasi Sukrosa dan Amonium Sulfat Terhadap Mutu Nata De Melon*. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. 2015.
- Anonim. *Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists*. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Washington, DC. 1970.
- Apriantono, A. *Analisis Pangan*. Bandung: ITB. 1988.
- Arif, A.B, Dkk. *Optimalisasi cara pencemaran buah cempedak (Arthocarpus champeden)* Jurnal Informatika Pertanian 23(1):35-46. 2014.
- Astawan, Made. *Tetap Sehat dengan Produk Makanan Olahan*. Suakarta: Tiga Serangkai. 2004.
- Badriyah, Lailatul., dan Manggara, B.A. *Penetapan Kadar Vitamin C Pada Cabai Merah (Capsicum annum L.) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS*. Jurnal Wiyata 2 no.1 2015.
- Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) Jatim. *Plasma Nutfah Durian: Promosi dan usaha pelestarian di Jawa Timur*. Warta Plasma Nutfah Indonesia (23): 1-10.2011.
- Barasi, M. E. *At a glance: Ilmu Gizi*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka utama. 2011.
- Champbell, Jane B. Reece., Lawrence. C. Mitchel. *Biologi Edisi Kelima Jilid I*. Jakarta: Erlangga. 2002.

- Demam, John W. *Kimia Makanan*. Bandung: ITB. 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Tafsirnya Jilid III*. Jakarta: Lentera Abadi, 2012.
- Desyanti, M. *Analisa kualitatif dan kuantitatif karbohidrat*. [https://www.scribd.com/doc/147498064/Analisa Kualitatif Dan Kuantitatif-Karbohidrat](https://www.scribd.com/doc/147498064/Analisa-Kualitatif-Dan-Kuantitatif-Karbohidrat). 2013.
- Hamad, A. dan Kristiono. *Pengaruh Penambahan Sumber Nitrogen terhadap Hasil Fermentasi Nata Ce Coco*. Momentum 9(1):62-65. 2013.
- Hendrawan Yusuf, Dkk. *Pengaruh Penambahan Air Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik Nata De Soya*. Malang: Jurnal Bioproses Komoditas Tropis. 1 No.1 2014.
- Irianto, K dan Waluyo, K. *Gizi dan Pola Hidup Sehat*. Bandung: Yrama Widya. 2004.
- Kementerian Pertanian (Kementan). *Budidaya srikaya*. <http://epetani.deptan.go.id>. 2012.
- Kementrian Pertanian (Kementan). *Srikaya Buah Manis dengan Manfaat luar Biasa*. <http://epetani.deptan.go.id>. 2012.
- Kuantaf, j dan Kuantaraf Kathleen H. Liwi jaya. *Makanan Sehat*. Bandung: Indonesia Publishing house. 1999.
- Lapuz, MM. Galledro, EG. Palo, MA. *The Nata Organism-Cultuural Requirements, Characteristic and Identifity*. Philipines. 1967.
- Lay, B. W. *Analisa Mikroba di Laboratorium*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Lempang, M. *Pengolahan nira aren untuk produk fermentasi nata pinnata*. Buletin Penelitian Kehutanan 9 (4) : 308-317. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan. Bogor. 2003.
- Lempang, Mody. *Rendemen dan Kandungan Nutrisi Nata Pinnata yang Diolah dari Nira Aren*. Makassar: Jurnal Prenelitian Hasil Hutan V.24 (2). 2006.
- Mades Fifendy, Dwi Hilda Putri, Shinta Sari Mariah, “*Pengaruh Penambahan Tauge Sebagai Sumber Nitrogen Terhadap Mutu Nata De Kakao*”, Jurnal Saintek, Vol. III, No. (2)2016.

- Majesty, Jannur. dkk. *Pengaruh Penambahan Sukrosa dan Lama Fermentasi Terhadap Kadar Serat Nata Dari Sari Nanas (Nata de Pina)*. Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem 3 no.1 (2015) 80-85.
- Manoi, F. *Penambahan Ekstrak Ampas Nenas Sebagai Medium Campuran Pada Pembuatan Nata De Cashew*. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromaterapi. 18 no (2007). 107-116
- Melina, M. *Pengaruh Penggunaan Jus Kecambah Kacang Hijau Sebagai Sumber Nitrogen Alternatif Terhadap Karakteristik Nata de Besusu*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2016.
- Muchtadi, T. R. *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997.
- Nisa, F.C. *Penurunan tingkat pencemaran limbah cair (whey) tahu pada produksi nata de soya (kajian waktu inkubasi)*. Jurnal Teknologi Pertanian 3:93 – 101. 2002.
- Nugraheni, Mutiara. *Nata dan Kesehatan*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 2008.
- Pambayun, R. *Teknologi Pengolahan Nata de Coco*. Yogyakarta: Kanisius. 2002.
- Pardede, T.R., dan Muftri, S. *Penetapan Kadar Kalium, Natrium dan Magnesium pada Semangka (Citrus vulgaris) Daging Buah Berwarna Kuning dan Merah secara Spektrofotometri Serapan Atom*. Jurnal Darma Agung, 1-7. 2012.
- Qalsum, Umi. *Dkk Analisis Kadar Karbohidrat, Lemak dan Protein dari Tepung Biji Mangga (Mangifera indica L) Jenis Gadung*. Jurnal Akademi Kimia 4 no. 4 (2015): 168-174
- Radi, J. *Budidaya Srikaya*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Rahayu. *Bahan Pangan Hasil Fermentasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi UGM. 1993.
- Ridwan, S. F. *Pemanfaatan Ekstrak Buah Srikaya (Annona squamosa), Nangka (Arthocarpus heterophylla), dan Sukun (Arthocarpus altilis) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Nata*. Skripsi. Fakultas Saions dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

- Rizal, H.M., D.M. Pandiangan dan A. Saleh. *Pengaruh penambahan gula, asam asetat, dan waktu fermentasi terhadap kualitas nata de corn*. Jurnal Teknik Kimia 19(1):34-39. 2013.
- Rizal, M. D. Pandiangan, D.M., A. Pengaruh dan Waktu Fermentasi Terhadap Kualitas *Nata De Corn*. Jurnal Teknik Kimia. No 1, vol 19. 2013.
- Rosario, R. *Traditional Philippino Fermented Foods Processing Of the Oriental Fermented Foods*. Taiwan. 1982.
- Saputri, Hindri. *Penetapan Kadar Besi, Kalium, Natrium dan Magnesium dalam Jambu Air (Syzygium aqueum) dan jambu Semarang (Syzygium samarangense) Secara Spektrofotometri Serapan Atom*. USU. 2017.
- Sherwood L. *Fisiologi manusia*. Edisi ke-2. Jakarta: Penerbit EGC. 2001.
- Shihab, MQ. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Soekarto, S. *Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi*. Jakarta: Dian rakyat. 1985.
- Soenarsih SDAS, Sudarsono, Djoefrie HMHB, WahyuYEK. 2012. *Keragaman spesies pala (Myristica Spp.) maluku utara berdasarkan penanda morfologi dan agronomi*. J Litri 18(1): 1-9.
- Sutarminingsih, C.H. *Peluang Usaha Nata De Coco*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Teissie, Natalie Eynard Justine. *Electrotransformation of Bacteria*. New York: Springer. 2000.
- Tjitrosoepomo. *Morfologi tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1988.
- Tohir, Kaslan. A. *Bercocok Tanam Pohon Buah* Jakarta: Pradnya Paramita. 1984.
- Tubagus, Robi A. *Karakteristik Fisik dan Kimia Nata DE Milko dari Susu Substndar Dengan Variasi Lama Inkubasi*. Jurnal Ilmu Ternak 18 (2). 2018.
- Wahyuni, Sri. *Uji Kadar Protein dan Lemak Pada Keju Kedelai dengan Perbandingan Inokulum Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus lactis yang Berbeda*. Surakarta: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.

Widyastuti, Y. E. *Srikaya*. Jakarta: Penebar Swadaya. 1993.

Wirakusumah, Emma S. *Buah dan Sayuran untuk Terapi*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2002.

Yusmarini, Usman Pato, Vonny Setiaries Johan, “*Pengaruh Pemberian Beberapa Jenis Gula dan Sumber Nitrogen Terhadap Produksi Nata De Pina*”, *Sagu*, Vol. 3, No. 1, 2004.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 1. Diagram alur sterilisasi alat

Semua alat yang akan digunakan seperti pinset, botol selei, sendok, gelas beker, gelas ukur, dan cawan petri



Peralatan tersebut dibungkus dengan kertas



Alat-alat tersebut disterilisasi di oven dengan suhu 180° C selama 2 jam




Alat siap digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Diagram alur sterilisasi alat




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Lampiran 2. Diagram alur pembuatan starter



Lampiran 3. Alur pembuatan srikaya



Lampiran 4. Foto Pembuatan Tauge



Keterangan:

1. Kacang hijau sebanyak 1 liter dicuci bersih
2. Kemudian direndam selama 15 jam lalu ditiriskan
3. Setelah disimpan selama 3 hari, sampai terbentuk kecambah
4. Dihitung panjang kecambahnya 2 – 6 cm. Selanjutnya dicuci sampai bersih lalu ditiriskan.
5. Kecambah siap untuk digunakan

Lampiran 5. Foto Pembuatan Larutan Tauge



Keterangan :

1. Kecambah ditimbang sebanyak 200 gram
2. Kecambah dimasukkan kedalam panci
3. Ditambahkan air sebanyak 400 ml
4. Dimasak hingga mendidih selama kurang lebih 10 m
5. Larutan dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat.

Lampiran 6. Foto Pembuatan Starter *Nata de Coco*



Keterangan :

1. Ditambahkan gula sebanyak 60 gram
2. Ditambahkan 12 ml larutan taugé
3. Ditambahkan asam asetat sebanyak 30 ml


4. Setelah itu dimasak dan setelah dingin diukur pH nya
5. Kemudian dimasukkan kedalam botol
6. Setelah itu ditambahkan bakteri *Acetobacter xylinum*
7. Kemudian disimpan selama 7 hari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7. Proses pembuatam Nata dari buah Srikaya (*Annona squamosa*)





Keterangan:

1. Buah srikaya
2. Setelah itu dibersihkan dan dibuang kulitnya
3. Setelah itu dipisahkan dari bijinya
4. Kemudian ditimbang buah sebanyak 200 gram
5. Lalu diblender dan tambahkan air sebanyak 600 ml
6. Dimasak
7. Ditambahkan gula sebanyak 60 gram

8. Ditambahkan 12 ml larutan tauge
9. Ditambahkan asam asetat sebanyak 30 ml dan diaduk hingga rata
10. Setelah dingin diukur pH
11. Dimasukkan kedalam botol
12. Ditambahkan bakteri *Acetobacter xylinum* sebanyak 20 ml
13. Setelah itu ditutup rapat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 8. foto pengamatan *nata de srikaya* dari hari ke 1-14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M. KASSAF

Keterangan:

1. *Nata de srikaya* hari pertama
2. *Nata de srikaya* hari ke-dua
3. *Nata de srikayat* hari ke-tiga
4. *Nata de srikayat* hari ke-empat
5. *Nata de srikaya* hari ke-lima
6. *Nata de srikaya* hari ke-enam
7. *Nata de srikaya* hari ke-tujuh
8. *Nata de srikaya* hari ke-delapan
9. *Nata de srikaya* hari ke-sembilan
10. *Nata de srikaya* hari ke-sepuluh
11. *Nata de srikaya* hari ke-sebelas
12. *Nata de srikaya* hari ke-dua belas
13. *Nata de srikaya* hari ke-tiga belas
14. *Nata de srikaya* hari ke-empat belas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 10. Perhitungan uji kandungan nutrisi nata de Srikaya

Karbohidrat

$$\text{Glukosa} = \frac{(\text{Volume titrasi blanko} - \text{Volume titrasi sampel}) \times N. \text{Tio}}{0,1 \text{ N}}$$

$$= \frac{(25 - 20,1) \times 0,099526}{0,1}$$

$$= 4,87 \text{ ml}$$

$$= 9,7 \text{ mg} + (2,5 \times 0,87)$$

$$= 11,875 \text{ mg}$$

$$\text{Glukosa \%} = \frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{mg sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{11,875 \times 50/10}{1566,8} \times 100\%$$

$$= 3,78 \times 0,95$$

$$= 3,59 \%$$

Protein

$$= \frac{(\text{Volume titrasi} - \text{Volume blanko}) \times N}{\text{Berat sampel} \times 1000} \times 100 \%$$

$$= \frac{(0,6 - 0,2) \times 0,0937399}{1,071 \times 1000} \times 100 \%$$

$$= 0,04903 \times 6,25$$

$$= 0,30\%$$

Lemak

$$= \frac{\text{Berat cawan isi} - \text{Berat cawan kosong}}{\text{Bobot sampel}} \times 100 \%$$

$$= \frac{62,4078 - 62,4078}{1,0780} \times 100 \%$$

= 0 %

Natrium

$$= \frac{\text{Konsentrasi natrium} \times \text{Volume akhir sampel}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0750 \times 25}{1,6337} \times 100 \%$$

$$= 144,77 \text{ mg/kg}$$

$$= 0,01\%$$

Vitamin

$$= \frac{\text{Konsentrasi sampel} - \text{Volume akhir sampel}}{\text{Berat sampel}}$$

$$= \frac{3,7310 - 0,025}{0,0022131}$$

$$= 42,14 \text{ mg/kg}$$

$$= 0,004\%$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran II. Angket Penelitian Organoleptik

Nama :

Usia :

Tanggal pengujian :

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
<i>Nata de coco</i>				

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka



Angket Penelitian Organoleptik

Nama :

Usia :

Tanggal pengujian :

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
<i>Nata de Srikaya</i>				

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 12. Kuisiener uji organoleptik


Nama	Status	Sampel	Kriteria			
			Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
R1	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	4	3	1
R2	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	3	1	1
R3	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	4	1	1
R4	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	4	1	2
R5	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	3	2	3	1
R6	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	3	3	3
R7	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	4	3	3
R8	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	4	3	3
R9	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	5	5	3	3
R10	Mahasiswa	<i>Nata de Srikaya</i>	4	4	2	1

MAKASSAR

Nama	Status	Sampel	Kriteria			
			Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
R1	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	4	4	3	2
R2	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	4	3	2	1
R3	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	4	4	3	2
R4	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	4	3	2	1
R5	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	4	4	3	3
R6	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	5	4	3	3
R7	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	5	5	3	2
R8	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	5	4	3	1
R9	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	5	3	3	5
R10	Mahasiswa	<i>Nata de coco</i>	5	3	3	4

MAKASSAR

Lampiran 13. Uji Protein *Nata de srikaya (Annona squamosa)*



Keterangan:


1. Sampel
2. Ditimbang sampel
3. Ditambahkan sulfid acid sebanyak 20 ml
4. Kemudian dipanaskan dilemari asam dengan hot plate
5. Lalu ditunggu hingga berubah warna menjadi jernih
6. Kemudian didestilasi
7. Ditambahkan HCl 0,1 N pada alat titrasi
8. Kemudian ditambahkan 3 tetes larutan conway
9. Kemudian dititrasi sampai berubah warna menjadi bening



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 14. Uji Karbohidrat Nata dari buah Srikaya (*Annona squamosa*)






Keterangan:

1. Sampel *Nata srikaya (Annona squamosa)*
2. Ditimbang *Nata srikaya (Annona squamosa)*
3. *Nata srikaya* dimasukkan kelabu eflum
4. Setelah itu, dimasukkan larutan H_2SO_4 kedalam gelas ukur
5. Kemudian dicampur dengan larutan H_2SO_4
6. Dipanaskan selama 3 jam hingga berubah warna

7. Kemudian dipindahkan ke dalam boto UC
8. Diukur pHnya
9. Dibuatkan larutan Kalium Iodida dan amilum
10. Sampel diambil sebanyak 2 ml dan aquades 15 ml
11. Ditambahkan luff sebanyak 25 ml
12. Dipanaskan kembali selama 20 menit
13. Ditambahkan kalium iodida sebanyak 15b ml
14. Ditambahkan H_2SO_4 sebanyak 25 ml
15. Kemudian dititrasi dan tambahkan amilum sebanyak 10 tetes
16. Kemudian dititrasi lagi hingga berubah warna menjadi putih susu


Lampiran 15. Uji Lemak Nata de Srikaya (*Annona squamosa*)



Keterangan:

1. Sampel bahan *Nata de srikaya*
2. Ditimbang sampel dan wadah kosong
3. Disiapkan cawan petri yang berisi aluminium foil
4. Dimasukkan sampel kedalam cawan petri lalu disebar
5. Cawan petri yang berisi sampel serta wadah dimasukkan kedalam oven selama 2 jam
6. Kemudian dimasukkan kedalam desikator selama 30 menit
7. Kemudian ditimbang wadah kosong
8. Kemudian sampel dimasukkan kedalam wadah kosong yang telah diketahui beratnya
9. Ditambahkan larutan petroleun benzine sebanyak 75 ml, lalu ditutup dengan aluminium foil dan dilubangi
10. Didiamkan selama 2 hari dan ditimbang wadah beserta lemak

Lampiran 16. Uji Vitamin Nata de Srikaya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AUDDIN
M A K A S S A R

Keterangan:

1. Sampel
2. Ditimbang sampel kemudian digerus
3. Disiapkan larutan buffer
4. dicampurkan larutan buffer
5. Lalu dimasukkan kedalam labu ukur 500 ml
6. Ditimbang natrium oxalat sebanyak 0,37 gram kemudian dimasukkan kedalam labu ukur
7. Sampel dimasukkan ke labu ukur dan ditambahkan buffer sebanyak 15 ml lalu dihomogenkan dan dicukupkan volumenya kemudian diukur serapannya pada spektrofotometri

Lampiran 17. Uji Kandungan Natrium *Nata de Srikaya*



Keterangan:

1. Sampel
2. Ditimbang sampel
3. Ditambahkan nitrid acid sebanyak 10 ml
4. Dipanaskan dihotplate didalam lemari asam
5. Ditambahkan lagi nitrid acid sampai berubah warna
6. Setelah berubah warna menjadi bening didiamkan hingga dingin
7. Disaring kedalam gelas ukur
8. Dipindahkan kedalam botol UC lalu diukur absorbansinya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 9. Perhitungan uji kandungan nutrisi buah srikaya (*Annona squamosa*)

Karbohidrat

$$\text{Glukosa} = \frac{(\text{Volume titrasi blanko} - \text{Volume titrasi sampel}) \times N. \text{Tio}}{0,1 \text{ N}}$$

$$= \frac{(25 - 13,1) \times 0,099526}{0,1}$$

$$= 11,84 \text{ ml}$$

$$= 27,6 \text{ mg} + (2,54 \times 0,84)$$

$$= 29,616 \text{ mg}$$

$$\text{Glukosa \%} = \frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{mg sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{29,616 \times 50/10}{10,2102} \times 5 \times 100\%$$

$$= 7,25 \times 0,95$$

$$= 6,88\%$$

Protein

$$= \frac{(\text{Volume titrasi} - \text{Volume blanko}) \times N}{\text{Berat sampel} \times 1000} \times 100\%$$

$$= \frac{(4,0 - 0,2) \times 0,0937399}{1,145 \times 1000} \times 100\%$$

$$= 0,3578 \times 6,25$$

$$= 2,83\%$$

Lemak


$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Berat cawan isi} - \text{Berat cawan kosong}}{\text{Bobot sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{34,2644 - 34,2643}{1,0541} \times 100 \% = 2,74\% \end{aligned}$$

Natrium

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Konsentrasi natrium} \times \text{Volume akhir sampel}}{\text{Berat sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{0,1501 \times 25}{1,4614} \times 100 \% \\ &= 226,91 \text{ mg/kg} \\ &= 0,025\% \end{aligned}$$

Vitamin

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Konsentrasi sampel} - \text{Volume akhir sampel}}{\text{Berat sampel}} \\ &= \frac{4,9865 - 0,025}{0,0021675} \\ &= 108,18 \text{ mg/kg} \\ &= 0,025\% \end{aligned}$$



Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Kurniaty
Usia : 22 th
Tanggal pengujian : 05 Juni 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Nk	4	4	3	1

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Devi Aulia

Usia : 20 th

Tanggal pengujian : 05 Juni 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Nk	4	3	1	1

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Suriani
Usia : 21 th
Tanggal pengujian : 05 Juli 2015

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
NE	4	4	3	3

Nilai kesukaan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka



Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Pusri
Usia : 26
Tanggal pengujian : 05 Juni 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
NK	4	4	1	2

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Fitriah Erachna

Usia : 22 tahun

Tanggal pengujian : 05 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Nk	3	2	3	1

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Fitriani
Usia : 22 tahun
Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Nk	4	3	3	3

Nilai kesukaan:

- 1 = Tidak suka
- 2 = Cukup suka
- 3 = Agak suka
- 4 = Suka
- 5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : RACDATUL ATEAL

Usia : 22

Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
NK	4	4	3	3

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Suharta

Usia : 23 tahun

Tanggal pengujian : 05 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
NK	4	4	3	3

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Irmawati
Usia : 22 tahun
Tanggal pengujian : 5 juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
NK	5	5	3	3

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Fachrudin

Usia : 21

Tanggal pengujian : 25 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
NE	4	4	2	1

Nilai kesukaan:

- 1 = Tidak suka
- 2 = Cukup suka
- 3 = Agak suka
- 4 = Suka
- 5 = Sangat suka



Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Devi Aulia

Usia : 20 th

Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	4	3	2	1

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka



Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Suriani
Usia : 21 th
Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	4	4	3	2

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka



Angket Penelitian Organoleptik

Nama : FURNIATY

Usia : 22 th

Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	4	4	2	1

Nilai kesukaan:

- 1 = Tidak suka
- 2 = Cukup suka
- 3 = Agak suka
- 4 = Suka
- 5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Putri
Usia : 21
Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	4	4	3	2

Nilai kesukaan:

- 1 = Tidak suka
- 2 = Cukup suka
- 3 = Agak suka
- 4 = Suka
- 5 = Sangat suka



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Suhalla
Usia : 22 tahun
Tanggal pengujian : 05 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
kontrol	4	4	3	3

Nilai kesukaan:

- 1 = Tidak suka
- 2 = Cukup suka
- 3 = Agak suka
- 4 = Suka
- 5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : RAODATUL ATFAL

Usia : 22

Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	5	4	3	3

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Irmawati
Usia : 22 tahun
Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	5	5	3	2

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Fakhriannisa

Usia : 21 tahun

Tanggal pengujian : 05 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	5	4	3	1

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Fitriah Surahana

Usia : 22 tahun

Tanggal pengujian : 05 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	5	5	3	5

Nilai kesukaan:

1 = Tidak suka

2 = Cukup suka

3 = Agak suka

4 = Suka

5 = Sangat suka




Angket Penelitian Organoleptik

Nama : Fitriani
Usia : 22 tahun
Tanggal pengujian : 5 Juli 2019

Sampel	Kriteria Penelitian			
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma
Kontrol	5	3	3	4

Nilai kesukaan:

- 1 = Tidak suka
- 2 = Cukup suka
- 3 = Agak suka
- 4 = Suka
- 5 = Sangat suka



BIOGRAFI



Nama lengkap **Irmadamayanti**, yang biasa disapa Irma atau Anthy. Saya dilahirkan di Lampa Toa, 29 September 1997. Lahir sebagai sulung dari empat bersaudara, dari pasangan Umar dan Rasdiana.

Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SD Inpres 039 Lampa Toa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mapilli. Setelah mampu melewati Ujian Nasional di tingkat SMP dan dinyatakan LULUS, saya melanjutkan karir pendidikan saya di SMA Negeri 1 Tinambung pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Kemudian di tahun 2015 lulus untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yakni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R